【基础】人口学资料

出生日期: _____

年龄: _____ 周岁

性别: ○ 男 ○ 女

民族: ○ 汉 ○ 其他 _____

职业: ○ 体力 ○ 非体力

婚姻状况: ○ 未婚 ○ 已婚 ○ 离异 ○ 丧偶

身高: _____ cm

体重: _____ Kg

2015年美国风湿病学会(ACR)/欧洲抗风湿病联盟(EULAR)痛风分类标准

步骤	分类	评分
第一步：纳入标准(只在符合本 条件情况下，采用下列的评分 体系)	至少一次外周关节或滑囊发作性肿胀，疼痛或压痛	○ 否 ◉ 是
第二步：充分标准(如果具备， 则可直接分类为痛风而无需下 列其他“要素”)	有症状的关节或滑囊存在单钠尿酸盐晶体(如在滑液中)或痛风石	◉ 否 ○ 是
第三步：标准(不符合“充分标准”情况下使用)		**标准 / 评分**
临床		
症状发作曾累及关节/滑囊	踝关节或中足(作为单关节或寡关节的一部分发作而没有累及第 一跖趾关节)	1: 1
	累及第一跖趾关节(作为单关节或寡关节发作的一部分)	2: 2
关节炎发作特点(包括以往的发作)		
受累关节“发红”(患者自述或医师观察到) 受累关节不能忍受触摸、按压 受累关节严重影响行走或无法 活动	符合左栏1个特点	1: 2
	符合左栏2个特点	2: 2
	符合左栏3个特点	3: 1
发作或者曾经发作的时序特征 无论是否抗炎治疗，符合下列两项或两项以上为1次典型发作		
到达疼痛高峰的时间<24h 症状在≤14d内缓解 发作间期症状完全消退 (恢复至基线水平)	1次典型的发作	1: 2
	典型症状反复发作(即2次或2次以上)	2: 2
痛风石的临床证据		

透明皮肤下的皮下结节有浆液 或粉笔灰样物质，常伴有表面 血管覆盖，位于典型的部位； 关节、耳廓、鹰嘴黏液囊、指 腹、肌腱(如跟腱)	存在	4: 2
实验室检查		
血尿酸：通过尿酸酶方法测定 理想情况下，应该在患者没有 接受降尿酸治疗的时候和症状 发生4周后进行评分(如发作间 期)，如果可行，在这些条件下 进行复测。并以最高的数值为准	接受降尿酸治疗的时候和症状 发生4周后进行评分(如发作间 期)，如果可行，在这些条件下进行复测。并以最高的数值为 准	-4: 1
	血尿酸240- <360μmol/L	0: 1
	血尿酸360- <480μmol/L	2: 1
	血尿酸480- <600μmol/L	3: 1
	血尿酸≥600μmol/L	0: 2
单尿酸盐阴性	有症状关节或滑囊进行滑液分 析(需要有有经验的检查者进行 检测)	-2: 2
影像学		
尿酸盐沉积在(曾)有症状的关 节或滑囊中的影像学证据：超 声中“双轨征”或双能CT显示 有尿酸盐沉积	存在(任何一个)	4: 1
痛风相关关节损害的影响学证 据：双手和/或足在传统影像学 表现有至少一处骨侵蚀	存在	4: 2
总分（自动计算）		2

【动态表格】实验室检查_妊娠试验

是否进行了妊娠试验?： ◉ 是 ○ 否

检查结果	单位	临床评估	范围值下限	范围值上限	备注

【非表单】临床研究流程图

验证阶段		筛选期入组	治疗中	复查	
时间		治疗前3天	接受治疗第1个月	接受治疗第3个月	接受治疗第6个月
签署知情同意书		●			
临床试验异常记录		●	●	●	●
维医辨证分型		●			
问诊	主诉	●	●	●	●
	既往史	●	●	●	●
	一般情况	●	●	●	●
	临床症状	●	●	●	●
查体	生命体征	●	●		
	舌象	●	●		
	脉象	●	●		
实验室检查	血常规	●	●		
	尿常规	●	●		
	便常规	●	●		
	肝功能	●	●		
	肾功能	●	●		
	心电图	●	●		
	B超	●	●		
	胸片	●	●		
具体治疗药物使用（根据维医异常体液分型和病情选用，并连续服用6个月）					
维医治疗	布祖力糖浆		●	●	●
	塔尔亚克丸		●	●	●
	米西克莫提地力蜜膏		●	●	●
	罗乐胃蜜膏		●	●	●
总结	1.首次治疗时间为第一天，每次时间窗均以首次治疗时间为基线。				●
	2.全部病例观察结果，3个月内完成数据管理统计分析总结工作。				●

【排版】知情同意书

知情同意书

本人: _____ 自愿接受维吾尔医药物干预治疗，并就以下各项内容进行声明及承诺:

1、医生已经向我就国家免费维吾尔医干预治疗的有关政策和技术要求进行了详细说明，包括:

1）免费范围，费用负担；（维吾尔医药干预治疗免费，其他自费或者社会支持）；

2）维吾尔医药干预治疗的基本知识，包括药物及其副作用；

3）治疗流程；

4）治疗中的注意事项；

2、我已经了解了艾滋病的维吾尔医药干预治疗及其有关注意事项，并做出以下承诺:

1）积极配合医生，按照要求进行规范的治疗，包括:

☆ 严格按时服药，不漏服、不擅自停药；

☆ 严格按量服药，不擅自增减药量；

☆ 不将药物分给他人服用；

☆ 严格按照医生确定的方案服药，没有医嘱不擅自更改方案和剂量；

2）严格按照要求定期进行各种随访检测及规范治疗；

3）及时报告发生的药物反应，以使其能及时评估并采取措施处理。

病人签字: _____

医生签字: _____

【图片】示意图



base64图片

test

分组

年龄: _____

姓名: _____

测试所有控件

分割线标题

警告警告警告警告

请在这里输入内容

永远相信美好的事情即将发生

单行文本:

多行文本:

计数器:

超链接:

数组:

单选框组: ○ 选项一 ○ 选项二 ○ 选项三

多选框组: ☐ 选项一 ☐ 选项二 ☐ 选项三

下拉选择器:

级联选择器:

树形选择器:

年:

日期时间:

时间范围: —

日期范围: —

日期时间范围: —

时间:

周:

日期:

月:

月: