
```

% Бастапқы мәндер
h = [0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1.1];
t = [0.246, 0.319, 0.377, 0.428, 0.474];

% Әрбір тәжірибе үшін еркін түсу үдеуін есептеу
g = (2 * h) ./ (t.^2);

% Орташа мәні
G = mean(g);

% Ауытқулар
dg = G - g;

% Қателіктер мен қорытынды шамаларды есептеу
Q = sqrt(sum(dg.^2) / (length(h) - 1));
Qs = Q / sqrt(length(h));
T = Qs * 2.8;
C = T + G;
L = (T / G) * 100;


% Нәтижелерді үтірден кейін 4 цифрмен шығару
fprintf('g1 = %.4f\n', g(1));
fprintf('g2 = %.4f\n', g(2));
fprintf('g3 = %.4f\n', g(3));
fprintf('g4 = %.4f\n', g(4));
fprintf('g5 = %.4f\n', g(5));
fprintf('G = %.4f\n', G);
fprintf('dg1 = %.4f\n', dg(1));
fprintf('dg2 = %.4f\n', dg(2));
fprintf('dg3 = %.4f\n', dg(3));
fprintf('dg4 = %.4f\n', dg(4));
fprintf('dg5 = %.4f\n', dg(5));
fprintf('Q = %.4f\n', Q);
fprintf('Qs = %.4f\n', Qs);
fprintf('T = %.4f\n', T);
fprintf('C = %.4f\n', C);
fprintf('L = %.4f\n', L);

% -----
% Биіктіктің уақытқа тәуелділік графигін салу: h(t)
% -----
figure;
plot(t, h, 'ro-', 'Linewidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'r', 'DisplayName',
'Tәжірибелік нүктелер h(t)');
title('Биіктіктің уақытқа тәуелділік графигі: h(t)');
xlabel('t (уақыт, c)');
ylabel('h (биіктік, м)');
grid on;
legend('Location', 'northwest');

g1 = 9.9147
g2 = 9.8269
g3 = 9.8502

```

$g_4 = 9.8262$
 $g_5 = 9.7919$
 $G = 9.8420$
 $dg_1 = -0.0727$
 $dg_2 = 0.0150$
 $dg_3 = -0.0082$
 $dg_4 = 0.0158$
 $dg_5 = 0.0501$
 $Q = 0.0457$
 $Q_s = 0.0204$
 $T = 0.0572$
 $C = 9.8992$
 $L = 0.5812$



Published with MATLAB® R2026b