

图的邻接矩阵

- 定义：对于图 $G=(V,E)$ ，构造一个矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$
其中 $n = |V|$ ；

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & (v_i, v_j) \in E; \\ 0 & \text{否则;} \end{cases}$$

称 A 是图 G 的邻接矩阵。

- 置换矩阵：相当于将单位矩阵中相应的行与行，或者列与列互换的矩阵。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$


$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$$

$$(PA)P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{12} \\ a_{31} & a_{33} & a_{32} \\ a_{21} & a_{23} & a_{22} \end{pmatrix}$$

P就是一个置换矩阵


- 邻接矩阵中图的性质：



无向图的邻接
矩阵是对称的！

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(1) $A=(a_{ij})_{n \times n}$ 中，第 i 行或第 i 列中非0元素的个数等于顶点 v_i 的度。(无向图)



(2) $A=(a_{ij})_{n \times n}$ 中，第*i*列中非0元素的个数等于顶点 v_i 的入度，第*i*行中非0元素的个数等于顶点 v_i 的出度。(有向图)

(3) $B=A^2$ 。

$$B=A^2=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$
$$=(b_{ij})_{n \times n}$$


b_{ij} 表示 v_i 两步到达 v_j 的路径数目

(4) 有向图中: $C=AA^T$ 。

$$C = (c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ & \cdots & & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$c_{ij} = \sum \alpha_{ik} \alpha_{jk}$$

c_{ij} 表示以 v_i, v_j 为始点的终点数目。




(5) 有向图中: $D=A^T A$ 。

$$D = (c_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ & \cdots & & \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ & \cdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$$d_{ij} = \sum \alpha_{ik} \alpha_{jk}$$

d_{ij} 表示以 v_i, v_j 为终点的始点数目。



定理14.11

- 设 A 为有向图 D 的邻接矩阵，则 A 的 l 次幂 A^l 中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 长度为 l 的通路数，其中 $a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到自身长度为 l 的回路数。
- 证明略。

$$A^2 = A \cdot A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$0 \times 0 + 1 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times 1 + 0 \times 0 + 0 \times 0 = 1$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (a_{ij}^{(2)})$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 4 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 & 1 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = (a_{ij}^{(3)})$$

其中：

$$a_{ij}^{(3)} = \sum_{k=1}^7 a_{ik}^{(2)} a_{kj} = \sum_{k=1}^7 a_{ik} a_{kj}^{(2)}$$

一般有：

$$A^k = (a_{ij}^{(k)})_{7 \times 7}$$

其中：

$$a_{ij}^{(k)} = \sum_{h=1}^7 a_{ih}^{(k-1)} a_{hj}$$

现在来看看 $a_{ij}^{(k)}$ 的值有什么实际意义。以 $a_{ij}^{(2)}$ 为例：

$$a_{ij}^{(2)} = \sum_{k=1}^7 a_{ik} a_{kj} = a_{i1}a_{1j} + a_{i2}a_{2j} + \dots + a_{i7}a_{7j}$$

$$a_{il} \cdot a_{lj} \neq 0 \text{ 当且仅当 } a_{il} = a_{lj} = 1$$

表示从 v_i 出发两步到达 v_j 的路径数目

同理

$a_{ij}^{(k)}$ 表示从 v_i 出发 k 步到达 v_j 的路径数目

若要追问这一路径是什么？
途经哪几个点？
只要回溯 $a_{ij}^{(k)}$ 是如何形成即可求得

例如 $a_{17}^{(3)}$, 我们来看一下它的形成过程:

$$A_1^{(1)} =$$

$$(0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0)$$

15

$$A_1^{(2)} = (0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 0) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0)$$

15 54 154

$$A_1^{(3)} = (1\ 0\ 0\ 1\ 0\ 1\ 0) \times \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = (1\ 1\ 2\ 0\ 2\ 0\ 1)$$

154 47 1547

上例只是讨论从一点到另一点是否有路相通？
有几条路相通？

思考：若存在多条路相通，哪一条是最短的？