



Las pesquerías del Pacífico Noreste: Análisis del Área FAO 67

Universidad de Cádiz

Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales

Asignatura: Pesquerías.

Profesora: Remedios Cabrera Castro

Autores: Christian Dibari y Yule Petisco Lucero

Curso: 2026–2027

Puerto Real, Cádiz

Octubre 2026

Las Áreas FAO

Las áreas FAO constituyen una división geográfica a escala global implementada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura con el fin de estandarizar la recolección, el análisis y la difusión de las estadísticas pesqueras internacionales. Su relevancia científica radica en que facilitan la evaluación del estado de las poblaciones ícticas, la monitorización de los volúmenes de extracción y la formulación de estrategias de gobernanza y conservación adecuadas para cada ecosistema marino (FAO, 2004).

Características Oceanográficas Principales de la Zona

El Área FAO 67 comprende las aguas del Pacífico Noreste, abarcando desde el norte de California hasta el mar de Bering y el golfo de Alaska (FAO, s.f.). Desde una perspectiva oceanográfica, este caladero está dominado por sistemas de corrientes subárticas, destacando la Corriente de Alaska y la influencia meridional de la Corriente de California (FAO, 2004). Esta demarcación se caracteriza por ser una de las regiones marinas con mayor productividad primaria del planeta, impulsada por procesos de mezcla estacional y afloramientos costeros (upwelling) que promueven una intensa inyección de nutrientes hacia la zona fótica (FAO, 2004). Estas condiciones propician dinámicas tróficas complejas y altamente productivas, condicionadas asimismo por una marcada variabilidad térmica estacional y fluctuaciones de salinidad derivadas de los aportes continentales y los ciclos de deshielo (MarinTrust, 2023).

Especies Capturadas: Grupo Taxonómico, Características Principales y División ISSCAPP Correspondiente.

Las extracciones pesqueras en esta zona se concentran de manera prioritaria en recursos demersales y pelágicos de elevado valor comercial, así como en diversas poblaciones de crustáceos e invertebrados bentónicos (FAO, s.f.).

Peces pelágicos y demersales: Destaca la explotación del abadejo de Alaska (*Theragra chalcogramma* / *Gadus chalcogrammus*) y del bacalao del Pacífico (*Gadus macrocephalus*) (MarinTrust, 2023). De igual modo, los salmónidos del Pacífico (*Oncorhynchus spp.*) desempeñan un papel ecológico y socioeconómico fundamental en la región, complementados por la intensa explotación de fletán o halibut del Pacífico (*Hippoglossus stenolepis*) y diversas especies de cangrejos de gran tamaño (FAO, 2004).

Theragra chalcogramma* / *Gadus chalcogrammus

- **Grupo taxonómico:** Peces óseos (Actinopterygii), Orden Gadiformes, Familia Gadidae (MarinTrust, 2023).
- **Características principales:** Es una de las especies de pescado blanco más abundantes del mundo. Vive principalmente en aguas demersales y pelágicas del norte del Pacífico. Posee una gran fecundidad, lo que le permite sostener pesquerías masivas, y constituye un eslabón trófico fundamental al servir de presa para mamíferos marinos, aves y peces piscívoros más grandes. Su carne es altamente valorada para la industria de congelados y surimi.
- **División ISSCAAP:** Grupo 3 (Peces de mandíbula ósea / Cod, hakes, haddocks - Código ISSCAAP: 32) (FAO, 2004).

Gadus macrocephalus

- **Grupo taxonómico:** Peces óseos (Actinopterygii), Orden Gadiformes, Familia Gadidae (FAO, 2004).
- **Características principales:** Especie demersal de hábitos bentónicos que habita en la plataforma continental y el talud superior del Pacífico Norte. Se caracteriza por su gran tamaño y cabeza voluminosa. Es un depredador tope que se alimenta de cangrejos, camarones y peces pequeños, siendo clave tanto ecológicamente como en los mercados internacionales de pescado blanco.
- **División ISSCAAP:** Grupo 3 (Peces de mandíbula ósea / Cod, hakes, haddocks - Código ISSCAAP: 32) (FAO, 2004).

Oncorhynchus spp.

- **Grupo taxonómico:** Peces óseos (Actinopterygii), Orden Salmoniformes, Familia Salmonidae (FAO, 2004).
- **Características principales:** Nacen en corrientes de agua dulce, migran hacia el océano abierto para madurar y regresan a sus ríos natales para desovar y morir. Tienen un ciclo vital muy estricto y una profunda importancia ecológica, ya que transfieren nutrientes marinos hacia los ecosistemas terrestres y fluviales a través de sus migraciones masivas.
- **División ISSCAAP:** Grupo 3 (Peces de mandíbula ósea / Salmons, trouts, smelts - Código ISSCAAP: 23) (FAO, 2004).

Hippoglossus stenolepis

- **Grupo taxonómico:** Peces óseos (Actinopterygii), Orden Pleuronectiformes, Familia Pleuronectidae (FAO, 2004).

- **Características principales:** Es el lenguado de mayor tamaño del mundo, con cuerpos fuertemente comprimidos y aplanados lateralmente, adaptados a la vida bentónica. Es un pez demersal muy longevo y de crecimiento lento, altamente depredador, capturado principalmente mediante flotas de palangre bajo cuotas muy restrictivas.
- **División ISSCAAP:** Grupo 3 (Peces de mandíbula ósea / Flounders, halbuts, soles - Código ISSCAAP: 31) (FAO, 2004).

Paralithodes camtschaticus

- **Grupo taxonómico:** Crustáceos (Malacostraca), Orden Decapoda, Familia Lithodidae (MarinTrust, 2023).
- **Características principales:** Invertebrado bentónico de gran tamaño y gran valor comercial en el golfo de Alaska y mar de Bering. Se caracteriza por su caparazón espinoso y largas extremidades. Habita en fondos marinos fríos y soporta pesquerías de carácter altamente regulado debido a las fluctuaciones históricas de sus stocks.
- **División ISSCAAP:** Grupo 4 (Crustáceos / Crab, sea-spiders - Código ISSCAAP: 42) (FAO, 2004).

Flotas que Operan en la Zona

Las pesquerías desarrolladas en el Pacífico Nordeste operan bajo un marco de alta tecnificación y estrictas normativas de gestión implementadas por las jurisdicciones de Estados Unidos y Canadá (MarinTrust, 2023). Las flotas comerciales que operan en el área se dividen principalmente en:

1. Flotas industriales de altura y arrastreros congeladores (factory trawlers): Embarcaciones dotadas de alta tecnología para la detección, captura masiva y procesamiento a bordo de especies de gran biomasa como el abadejo (MarinTrust, 2023).
2. Flotas de palangre y artes fijas: Orientadas a la extracción selectiva de recursos demersales de alto valor en el mercado, tales como el bacalao y el fletán (FAO, 2004).
3. Flotas costeras y artesanales: Con una alta participación en la pesca litoral y en la recolección estacional de salmón durante sus fases migratorias fluviales (FAO, s. f.). Asimismo, la región destaca por la implementación de rigurosos programas de observadores científicos a bordo y sistemas de control electrónico para garantizar la trazabilidad y la sostenibilidad operativa (MarinTrust, 2023).

Capturas Globales Registrada

El Área FAO 67 registra algunos de los volúmenes de desembarco de pescado blanco más elevados a nivel mundial (FAO, 2004). Los niveles de captura están dominados masivamente por el abadejo de

Alaska, cuyas cuotas globales autorizadas (TAC) frecuentemente alcanzan o superan el millón y medio de toneladas métricas anuales en las subregiones norteamericanas del mar de Bering, las islas Aleutianas y el golfo de Alaska (MarinTrust, 2023).

Históricamente, los volúmenes de extracción han evidenciado fluctuaciones interanuales asociadas a la variabilidad climática y oceanográfica a gran escala, si bien la aplicación de modelos de gestión científica basados en cupos estrictos ha permitido consolidar pesquerías de gran escala bajo exigentes estándares de certificación ecológica (FAO, 2004).

Otros Datos de Interés

Particularidades ecológicas e históricas: Los ecosistemas marinos del Pacífico Nordeste exhiben una notable vulnerabilidad frente al cambio climático y al incremento térmico de las aguas superficiales, variables que inciden de forma directa en el éxito del reclutamiento y la dinámica poblacional de especies clave como el abadejo y el salmón (FAO, 2004).

Referencias Consultadas (Bibliografía y webgrafía)

- FAO. (2004). Trends in oceanic captures and clustering of large marine ecosystems: Fisheries in the Pacific Ocean Region 67. FAO Fisheries Technical Paper. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://www.fao.org/4/Y4449E/Y4449E00.pdf>
- MarinTrust. (2023). Alaska Pollock in FAO Area 67, Bering Sea and Aleutian Islands: Byproduct fishery assessment. MarinTrust Standard Version. [https://www.marin-trust.com/sites/marintrust/files/approved-raw-materials/VNM07 Alaska pollock in FAO 67 BSAI byproduct surveillance July 2023 Final.pdf](https://www.marin-trust.com/sites/marintrust/files/approved-raw-materials/VNM07%20Alaska%20pollock%20in%20FAO%2067%20BSAI%20byproduct%20surveillance%20July%202023%20Final.pdf)