

## Stochastik I

### 2. Übung

#### Aufgabe 5 (4,5 Punkte)

*Beispiel 1.3.4.* Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

- (i) Für einen Ring  $\mathcal{R}$  auf einer nicht-leeren Menge  $\Omega$  und ein  $\omega_0 \in \Omega$  definiert die folgende Vorschrift ein Prä-Maß  $\delta_{\omega_0}$  auf  $\mathcal{R}$  (genannt das *Lebesgue'sche Prä-Maß mit Atom  $\omega_0$* ):

$$\delta_{\omega_0}(A) := \begin{cases} 1 & , \quad \omega_0 \in A \\ 0 & , \quad \text{sonst} \end{cases}, \quad A \in \mathcal{R}.$$

- (ii) Seien  $\Omega$  eine abzählbar-unendliche Menge und  $\mathcal{A} := \{A \subseteq \Omega : A \text{ oder } A^c \text{ endlich}\}$  die Algebra auf  $\Omega$  aus Aufgabe 4 (iii). (Als Algebra ist  $\mathcal{A}$  gemäß Proposition 1.1.13 insbesondere ein Ring auf  $\Omega$ ). Dann definiert die folgende Vorschrift einen Inhalt, aber kein Prä-Maß auf  $\mathcal{A}$ :

$$\mu(A) := \begin{cases} 1 & , \quad A^c \text{ endlich} \\ 0 & , \quad A \text{ endlich} \end{cases}, \quad A \in \mathcal{A}.$$

#### Aufgabe 6 (4,5 Punkte)

Seien  $\Omega$  eine *abzählbare*, nicht-leere Menge und  $\mathfrak{P}(\Omega)$  die Potenzmenge von  $\Omega$ . Für jedes  $\omega \in \Omega$  bezeichne  $\delta_\omega$  das in Beispiel 1.3.4 (i) eingeführte Dirac-Maß auf  $\mathfrak{P}(\Omega)$  mit Atom  $\omega$ . Ferner bezeichne  $\#A$  die Kardinalität einer (abzählbaren) Menge  $A \in \mathfrak{P}(\Omega)$ : Im Falle einer endlichen Menge  $A$  spezifiziert  $\#A$  die Anzahl der Elemente in  $A$  — insbesondere gilt  $\#\emptyset = 0$ , und im Falle einer abzählbar-unendlichen Menge  $A$  gilt  $\#A = \infty$ . Zudem verwende man die Konvention  $\sum_{i \in I} \infty = \infty$  für jede abzählbare, nicht-leere Menge  $I$ . Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

- (i) Durch die Vorschrift  $\zeta(A) := \#A$ ,  $A \in \mathfrak{P}(\Omega)$ , ist ein Maß  $\zeta$  auf  $\mathfrak{P}(\Omega)$  definiert. Man nennt dieses das *Zählmaß auf  $\mathfrak{P}(\Omega)$* .
- (ii) Es gilt  $\zeta(\cdot) = \sum_{\omega \in \Omega} \delta_\omega(\cdot)$ .
- (iii) Jedes Maß  $\mu$  auf  $\mathfrak{P}(\Omega)$  ist von der Form  $\mu(\cdot) = \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega \delta_\omega(\cdot)$  mit  $p_\omega := \mu(\{\omega\})$ .

#### Aufgabe 7 (3 Punkte)

*Proposition 1.3.6.* Seien  $\mathcal{R}$  ein Ring auf einer nicht-leeren Menge  $\Omega$ ,  $\mu$  ein Inhalt auf  $\mathcal{R}$  und  $A, B, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{R}$ . Beweisen Sie die folgenden Aussagen:

- (i) Es gilt  $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$ , falls  $A \subseteq B$  und  $\mu(A) < \infty$ .
- (ii) Es gilt  $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \geq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$ , falls  $A_1, A_2, \dots$  paarweise disjunkt sind und  $\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \in \mathcal{R}$ .

#### Aufgabe 8 (4 Punkte)

*Proposition 1.3.8.* Seien  $\mathcal{R}$  ein Ring auf einer nicht-leeren Menge  $\Omega$  und  $\mu$  ein Inhalt auf  $\mathcal{R}$ . Beweisen Sie für die folgenden Aussagen die Implikationen „(ii) $\Rightarrow$ (i)“ und „(iv) $\Rightarrow$ (iii)“:

- (i)  $\mu$  ist ein Prä-Maß.
- (ii)  $\mu$  ist stetig von unten.
- (iii)  $\mu$  ist stetig von oben.
- (iv)  $\mu$  ist  $\emptyset$ -stetig.