

---

---

# DISKRETNNA MATEMATIKA

## VJEŽBE

U ovoj skripti su dijelom natipkani zadaci koji su rješavani na vježbama iz Diskretne matematike u akademskoj godini 2009./2010.

Skripta može pomoći studentima u boljem shvaćanju gradiva, ali ne može zamjeniti vježbe.

Zadaci i rješenja:  
MAROJE MAROHNIĆ i MATIJA BAŠIĆ.

Natipkali i uredili:  
IVAN KRIJAN, MARKO BOŽIĆ, IVAN GAVRAN i MARIO BERLJafa.

Zagreb, 28. 10. 2009.

---

---

## Sadržaj

<b>1</b>	<b>Osnovni principi prebrojavanja</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Permutacije skupova</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Kombinacije</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Permutacije i kombinacije s ponavljanjem</b>	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>Rekurzivne relacije</b>	<b>18</b>
5.1	Homogene linearne rekurzije s konstantnim koeficijentima . . . . .	18
5.2	Nehomogene linearne rekurzije s konstantnim koeficijentima . . . . .	19
5.3	Modeliranje pomoću rekurzija . . . . .	20
<b>6</b>	<b>Funkcije izvodnice</b>	<b>23</b>
6.1	Obične funkcije izvodnice . . . . .	23
6.2	Eksponencijalne funkcije izvodnice . . . . .	28
<b>7</b>	<b>Formula uključivanja i isključivanja</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Teorija grafova</b>	<b>34</b>
8.1	Uvod . . . . .	34
8.2	Povezanost grafova . . . . .	37
8.3	Težinski grafovi . . . . .	41
8.4	Planarnost grafa . . . . .	43
8.5	Arhimedova tijela . . . . .	45
8.6	Eulerovi i Hamiltonovi grafovi . . . . .	46

# 1 Osnovni principi prebrojavanja

Za konačan skup  $A$ , s  $|A|$  ćemo označavati broj elemenata (kardinalitet) skupa  $A$ .

## Teorem 1.1. Pravilo sume.

Broj elemenata unije međusobno u parovima disjunktih skupova  $A_i$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  ( $A_i \cap A_j = \emptyset$ ,  $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $i \neq j$ ) jednak je sumi broja elemenata skupova  $A_i$ .

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i|.$$

**Primjer 1.1.** Iz grada A u grad B možemo doći brodom, autom ili avionom. Postoje dva morska, dva cestovna i tri zračna puta. Na koliko načina možemo doći iz grada A u grad B?

**Rješenje.** Uvedimo sljedeće skupove,  $AB$  neka je skup svih puteva iz grada A u grad B,  $M$  neka je skup svih morskih,  $Z$  zračnih, te  $C$  cestovnih puteva iz grada A u grad B. Jasno je da vrijedi

$$M \cap Z = Z \cap C = C \cap M = \emptyset,$$

stoga možemo primijeniti pravilo sume, odnosno

$$|AB| = |M \cup Z \cup C| = |M| + |Z| + |C| = 2 + 3 + 2 = 7.$$

✓

**Definicija 1.2.** Neka je  $n \in \mathbb{N}$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ , te  $A_i$  skupovi, s  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$  označavamo **Kartezijev produkt** skupova  $A_i$ ,

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i\}.$$

## Teorem 1.3. Pravilo produkta.

Neka je  $n \in \mathbb{N}$ , za konačne skupove  $A_i$ ,  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  vrijedi

$$|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = \prod_{i=1}^n |A_i|.$$

## Teorem 1.4. Princip bijekcije.

Neka su  $S$  i  $T$  konačni skupovi. Tada je broj elemenata skupa  $S$  jednak broju elemenata skupa  $T$  ako i samo ako postoji bijekcija između skupa  $S$  i skupa  $T$ .

**Primjer 1.2.** Da bi iz grada A došli u grad B, moramo proći kroz gradove B i C. Iz grada A u grad B možemo doći na 2 načina, iz B u C na 5, te iz grada C u grad D na 3 načina. Na koliko načina možemo doći iz grada A u grad D?

**Rješenje.** Neka je  $AD$  skup svih puteva između gradova A i D,  $AB$  skup svih puteva između A i B,  $BC$  skup svih puteva između B i C, te  $CD$  neka je skup svih puteva između gradova C i D. Svakom  $p \in AD$  možemo bijektivno pridružiti uređenu trojku  $(p_1, p_2, p_3)$ , gdje je  $p_1 \in AB$ ,  $p_2 \in BC$ ,  $p_3 \in CD$ . Sada primjenom principa bijekcije i pravila produkta dobivamo da je

$$|AD| = |AB \times BC \times CD| = |AB| \cdot |BC| \cdot |CD| = 2 \cdot 5 \cdot 3 = 30.$$

✓

**Zadatak 1.3.** Odredite broj prirodnih djelitelja broja 600.

[Rj. 24]

**Uputa.** Broj prirodnih djelitelja prirodnog broja  $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$  prikazanog u raspisu na proste faktore je  $(\alpha_1 + 1) \cdot (\alpha_2 + 1) \cdot \dots \cdot (\alpha_k + 1)$ . Dokaži!

**Zadatak 1.4.** Odredite broj uređenih parova nenegativnih cijelih brojeva  $(x, y)$  koji zadovoljavaju nejednadžbu

$$x^2 + y^2 \leq 5.$$

[Rj. 8]

**Uputa.** Ukoliko je  $x \geq 3$  jasno je da rješenja ne postoje, dakle, preostaje promotriti slučajeve kada je  $x \in \{0, 1, 2\}$ . Kako bi došli do konačnog rješenja, je li potrebno broj rješenja u svakom pojedinom slučaju pomnožiti ili zbrojiti?

Još jedan način je da promotrimo skupove definirane sa  $S_i = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : x^2 + y^2 = i\}$ ,  $i \in \{0, 1, \dots, 5\}$ . Je li potrebno pomnožiti ili zbrojiti međusobno brojeve elemenata skupova  $S_i$ ?

**Primjer 1.5.** Neka su definirani skupovi  $X = \{1, 2, \dots, 100\}$  te

$$S = \{(a, b, c) : a, b, c, \in X, a < b, a < c\}.$$

Koliko je  $|S|$ ?

**Rješenje.** Broj  $a$  može biti bilo koji broj iz skupa  $X \setminus \{100\}$ , fiksiramo li broj  $a$  iz tog skupa, broj  $b$  i broj  $c$  tada, zbog uvjeta možemo izabrati na  $100 - a$  načina (bilo koji broj između  $a + 1$  i  $100$ , uključivo). Konačno, traženi broj je

$$|S| = \sum_{a=1}^{99} (100 - a)^2 = \sum_{a=1}^{99} a^2 = \frac{99 \cdot 100 \cdot 199}{6} = 328350.$$

✓

**Teorem 1.5. Princip komplementa.**

Neka su  $A$  i  $S$  konačni skupovi takvi da je  $A \subseteq S$ . Tada je

$$|S \setminus A| = |S| - |A|.$$

**Primjer 1.6.** Koliko ima prirodnih brojeva manjih od  $10^n$  koji sadrže znamenku 4?

**Rješenje.** Jasno je da svi takvi brojevi mogu sadržavati  $1, 2, \dots, n$  znamenki 4. Jednostavnije nam je prebrojati koliko ima prirodnih brojeva manjih od  $10^n$  koji ne sadrže znamenku 4. Prirodnih brojeva manjih od  $10^n$  ima  $10^n - 1$ . Sve prirodne brojeve manje od  $10^n$  možemo promatrati kao  $n$ -znamenaste (na početku može biti nekoliko nula, jedini koji nam “ne valja” je onaj koji sadrži samo nule). Dakle, prirodnih brojeva manjih od  $10^n$  koji ne sadrže znamenku 4 ima  $9^n - 1$ , svaka znamenka može biti bilo koja osim 4, te još moramo odbaciti slučaj kada su sve znamenke jednake 0. Konačno, odgovor na pitanje zadatka je

$$(10^n - 1) - (9^n - 1) = 10^n - 9^n.$$

✓

**Definicija 1.6.** Neka je  $S$  skup. **Partitivni skup**  $\mathcal{P}(S)$  je skup koji sadrži sve podskupove skupa  $S$ .

**Teorem 1.7.** Neka je  $S$  konačan skup i  $|S| = n \in \mathbb{N}_0$ . Tada je  $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$ .

**Dokaz.** Ukoliko je  $S$  prazan skup, jasno je da je jedini podskup skupa  $S$  samo prazan skup, pa tvrdnja vrijedi, jer je  $2^0 = 1$ . Pretpostavimo sada da je  $n \in \mathbb{N}$ . Neka je  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . Promotrimo sve binarne nizove duljine  $n$ , svaki od njih će određivati jedan podskup skupa  $S$ . Ukoliko je na  $i$ -tom mjestu u nizu broj 1, onda se  $a_i$  nalazi, a ukoliko je 0 onda se ne nalazi u podskupu određenom s tim nizom. Jasno je da smo na ovaj način odredili sve moguće podskupove skupa  $S$  i da svakom podskupu odgovara točno jedan binarni niz duljine  $n$ . Na

svakom mjestu u binarnom nizu može se nalaziti broj 1 ili broj 0, dakle, takvih nizova ima  $2^n$ . Prema principu bijekcije, zaključujemo da je  $|\mathcal{P}(S)| = 2^n$ . Ovime je dokaz gotov. ■

**Primjer 1.7.** Na svako polje ploče  $n \times n$  upisan je broj koji je jednak broju pravokutnika koji sadrže to polje. Odredi sumu svih upisanih brojeva.

**Rješenje.** Uvedimo koordinatni sustav kao na slici.

$n$						
$\vdots$						
$j$				$b$		
$\vdots$						
2						
1						
	1	2	...	$i$	...	$n$

Svakom polju s brojem  $b$  odgovara točno  $b$  pravokutnika koji sadrže to polje. Zato je suma svih brojeva  $b$  jednaka sumi površine svih pravokutnika na ploči. Svaki pravokutnik je jednoznačno određen svojim dimenzijama i pozicijom donjeg lijevog polja.  $x$  koordinatu donjeg lijevog polja pravokutnika dimenzija  $i \times j$  možemo odabrati na  $n - i + 1$  načina (bilo koji broj između 1 i  $n - i + 1$ , uključivo), analogno,  $y$  koordinatu možemo odabrati na  $n - j + 1$  načina. Dakle, pravokutnika dimenzija  $i \times j$  na danoj ploči ima  $(n - i + 1)(n - j + 1)$ . Konačno, traženo rješenje je

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n \left\{ \sum_{j=1}^n [(n - i + 1)(n - j + 1) \cdot i \cdot j] \right\} &= \sum_{i=1}^n \left\{ [(n - i + 1) \cdot i] \cdot \sum_{j=1}^n [(n - j + 1) \cdot j] \right\} \\
 &= \left\{ \sum_{i=1}^n [(n + 1) \cdot i - i^2] \right\} \cdot \left\{ \sum_{j=1}^n [(n + 1) \cdot j - j^2] \right\} \\
 &= \left[ (n + 1) \cdot \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n i^2 \right]^2 \\
 &= \left[ (n + 1) \cdot \frac{n(n + 1)}{2} - \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6} \right]^2 \\
 &= \left[ \frac{n(n + 1)(n + 2)}{6} \right]^2.
 \end{aligned}$$

✓

## 2 Permutacije skupova

**Definicija 2.1.** Neka je  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  skup koji ima  $n$  **različitih** elemenata, te neka je  $r \in \{1, 2, \dots, n\}$ . Uređenu  $r$ -torku  $(b_1, b_2, \dots, b_r)$  međusobno različitih elemenata iz  $A$  nazivamo  **$r$ -permutacija** skupa  $A$ .

**Napomena 2.2.** Ako je  $r = n$ , onda ćemo reći da se radi o **permutaciji** skupa  $A$ .

**Primjer 2.1.** Neka je  $A = \{a, b, c, d\}$ . Napišite sve 2-permutacije skupa  $A$ .

**Rješenje.**

$$\begin{array}{lll} (a, b), & (a, c), & (a, d), \\ (b, a), & (b, c), & (b, d), \\ (c, a), & (c, b), & (c, d), \\ (d, a), & (d, b), & (d, c). \end{array}$$

✓

**Napomena 2.3.**  $(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)$  **nisu** 2-permutacije. Također primjetite da je **važan poredak**.

**Definicija 2.4.** Za prirodan broj  $n$  definiramo  $n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$  ( $n$  **faktorijel**), dodatno  $0! = 1$ .

**Napomena 2.5.** Primjetite da faktorijele brzo rastu (već  $7! = 5040$ ), stoga se u praksi često koristi Stirlingova formula koja ih (za velike  $n$ ) dobro aproksimira:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1.$$

**Teorem 2.6.** Neka je  $A$  neprazan skup s  $n \in \mathbb{N}$  elemenata, te neka je  $r \in \{1, 2, \dots, n\}$ ,  $r$ -permutacija skupa  $A$  ima

$$P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

**Dokaz.** Prvi element  $r$ -permutacije možemo odabrati na  $n$  načina, drugi na  $n-1$ , itd.  $r$ -ti na  $n-r+1$  način. Stoga je

$$P_r^n = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1) = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-r+1) \cdot \frac{(n-r)!}{(n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)!}.$$

■

**Primjer 2.2.** Koliko se nizova slova duljine 5 može sastaviti iz hrvatske abecede, tako da su na prvom i petom mjestu različiti samoglasnici, a na ostala tri mjesta međusobno različiti suglasnici. (Hrvatska abeceda ima 30 slova, od kojih su 5 samoglasnici, a ostalo suglasnici.)

**Rješenje.** Na prvo mjesto možemo postaviti bilo koji od 5 samoglasnika, pa nam za peto mjesto ostaju 4 izbora, točnije, postoji  $P_2^5$  načina za popuniti prvo i peto mjesto. Drugo, treće i četvrto mjesto možemo popuniti na ukupno  $P_3^{25}$  načina. Sada, za bilo koji način popunjavanja prvog i petog mjesta, postoji  $P_3^{25}$  načina popunjavanja preostala tri mjesta. Dakle, konačno rješenje je

$$P_2^5 \cdot P_3^{25} = 5 \cdot 4 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 23 = 276000.$$

✓

**Primjer 2.3.** Na zabavi je 7 mladića i 3 djevojke. Na koliko načina ljude možemo posložiti u red tako da

- (a) tri djevojke čine jedan blok,
- (b) mladići se nalaze na prvoj i posljednjoj poziciji i nema susjednih djevojaka.

**Rješenje.**

- (a) Blok od tri djevojke možemo postaviti na 8 različitih mjesta (tako da je prva djevojka u bloku na jednom od 1. do 8. mjesta u redu, uključivo). Djevojke unutar toga bloka možemo rasporediti na  $3!$  načina. Mladiće (kojih ima 7) moramo rasporediti na preostalih 7 mjesta, što možemo učiniti na  $7!$  načina. Dakle, rješenje je  $8 \cdot 3! \cdot 7! = 3! \cdot 8!$ .
- (b) Rasporedimo najprije mladiće u red, to možemo učiniti na  $7!$  načina. Sada u red moramo smjestiti još 3 djevojke. Prvu djevojku možemo smjestiti između prvog i drugog, drugog i trećeg, itd. šestog i sedmog mladića. Dakle, za prvu djevojku imamo 6 načina, slično, nakon što smo smjestili prvu djevojku, za drugu imamo 5 načina, a konačno za treću 4 načina. Rješenje je  $7! \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4$ .

✓

**Primjer 2.4.** Na polici se nalazi  $m + n$  različitih knjiga od kojih je  $m$  matematičkih, a ostale su iz lijepe književnosti.

- (a) Na koliko načina možemo te knjige rasporediti na policu ako želimo da na prvih  $m$  mjesta budu knjige iz matematike?
- (b) Koliko je rasporeda knjiga na polici ako želimo da sve matematičke knjige budu jedna do druge?

**Rješenje.**

- (a) Knjige iz matematike možemo rasporediti na  $m!$  načina, preostale knjige na  $n!$  pa je konačno rješenje  $m! \cdot n!$ .
- (b) Blok od  $m$  matematičkih knjiga možemo na policu smjestiti na  $n + 1$  načina (prva matematička knjiga u tom bloku može biti na bilo kojem od prvog do  $(n + 1)$ -vog mjesta, uključivo). Unutar tog bloka matematičke knjige možemo smjestiti na  $m!$  načina, još preostaje razmjestiti preostale knjige, a to možemo na  $n!$  načina. Konačno, postoji ukupno  $(n + 1) \cdot m! \cdot n! = m! \cdot (n + 1)!$  načina.

✓

**Primjer 2.5.** Koliko ima parnih brojeva između 20000 i 70000 takvih da su znamenke svakog broja međusobno različite.

**Rješenje.** Na prvom mjestu može se nalaziti bilo koja znamenka iz skupa  $\{2, 3, \dots, 6\}$ . Moramo posebno promotriti slučaj kada je prva znamenka parna, te kada je neparna.

- 1° Ukoliko je prva znamenka parna, nju možemo izabrati na 3 načina. Zadnju znamenku tada možemo izabrati na 4 načina (bilo koja parna znamenka osim one koja je već odabrana kao prva), a preostale tri znamenke na  $8 \cdot 7 \cdot 6$  načina. Dakle, u ovom slučaju imamo  $3 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$  načina.
- 2° Ukoliko je prva znamenka neparna, nju možemo izabrati na 2 načina, zadnju na 5, a preostale 3 opet na  $8 \cdot 7 \cdot 6$ , što nam daje još  $2 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8$

Dakle, konačno rješenje je  $6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot (3 \cdot 4 + 2 \cdot 5) = 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 22 = 7392$ .

✓

**Zadatak 2.6.** Neka je  $S$  skup prirodnih brojeva čije znamenke su iz skupa  $\{1, 3, 5, 7\}$  takvih da se niti jedna znamenka ne ponavlja.

- (a) Odredite  $|S|$ . [Rj. 64]
- (b) Odredite  $\sum_{n \in S} n$ . [Rj. 117856]

**Uputa.** Pokušajte nekako “pametno” grupirati brojeve u skupu  $S$ .

**Zadatak 2.7.** Na koliko načina se može razmjestiti 8 kula na šahovku ploču tako da se nikoje dvije kule ne napadaju?

- (a) Bez dodatnih uvjeta. [Rj. 8!]
- (b) Tako da se kule razlikuju. [Rj.  $(8!)^2$ ]

(Kula napada sva polja u istom retku i stupcu u kojem se nalazi.)

**Primjer 2.8.** Na koliko načina  $n$  ljudi može sjesti oko okruglog stola? Dva rasporeda smatramo jednakim ako se jedan iz drugoga može dobiti rotacijom.

- (a) Bez dodatnih uvjeta.
- (b) Tako da Anja i Marko sjede jedno do drugoga. ( $n \geq 2$ )

**Rješenje.**

- (a) Možemo razmišljati na dva načina. Najprije poslažemo ljude normalno u red, što možemo učiniti na  $n!$  načina. Sada, "krajeve" tog reda spojimo u krug, vidimo da se svaki raspored ponavlja točno  $n$  puta, dakle, odgovor je  $(n-1)!$ .  
Drugi način je da izaberemo jednu osobu i nju smatramo početkom, sada je jasno da preostale ljude možemo razmjestiti na  $(n-1)!$  načina.
- (b) Anju i Marka možemo smatrati jednim blokom i ujedno njega smatrati početkom, Anju i Marka unutar toga bloka možemo rasporediti na 2 načina, a preostalih  $n-2$  ljudi na  $(n-2)!$  načina. Dakle, odgovor je  $2 \cdot (n-2)!$ .

✓

**Zadatak 2.9.** Odredite broj načina na koji možemo posjesti  $n$  bračnih parova oko okruglog stola tako da

- (a) muškarci i žene alterniraju, [Rj.  $n! \cdot (n-1)!$ ]
- (b) svaka žena sjedi do svog muža. [Rj.  $2^n \cdot (n-1)!$ ]

**Primjer 2.10.**

- (a) S koliko nula završava broj  $100!$ ?
- (b) S kojim eksponentom prost broj  $p$  ulazi u rastav broja  $n!$  na proste faktore?

**Rješenje.**

- (a) Primjetimo da će broj  $100!$  završiti s onoliko nula koliko puta se broj 5 pojavljuje u njegovom raspisu na proste faktor. (Za svaki par brojeva 2 i 5 u raspisu broja  $n!$  na proste faktore dobijemo jednu nulu na njegovom kraju, ali broj 2 se sigurno pojavljuje više puta od broja 5.) Konačno, broj  $100!$  završava s  $\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{100}{25} \right\rfloor = 24$  nule. (U (b) dijelu zadatka je objašnjeno zašto vrijedi korištena formula.)
- (b) Prost broj  $p$  se u raspisu broja  $n!$  na proste faktore pojavljuje onoliko puta koliko ulazi u raspis svakog od brojeva iz skupa  $\{1, 2, \dots, n\}$  na proste faktore. Broj  $p$  se u svim brojevima koji su djeljivi s  $p$ , a nisu djeljivi s  $p^2$  pojavljuje jednom, u svim onima koji su djeljivi s  $p^2$ , ali nisu s  $p^3$  još jednom, itd. Dakle, ukupni broj pojavljivanja prostog broja  $p$  u raspisu broja  $n!$  na proste faktore je  $\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$ .

✓

**Napomena 2.7.** Suma  $\sum_{k=1}^{\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor$  je konačna, jer za sve prirodne brojeve  $k$  takve da je  $p^k > n$  vrijedi  $\left\lfloor \frac{n}{p^k} \right\rfloor = 0$ .



**Zadatak 2.11.**  $n$  kandidata za neki posao se predstavlja pred tročlanom komisijom. Svaki od članova komisije rangira kandidate prema svom kriteriju. Pravilo je da će neki kandidat biti prihvaćen ako su ga barem dvojica članova komisije stavila na prvo mjesto. Izračunajte u koliko će se posto slučajeva izabrati neki kandidat.

$$\left[ \text{Rj. } \frac{3n-2}{n^2} \cdot 100\% \right]$$

**Uputa.** Povoljne ishode, tj. one u kojima će netko biti izabran prebrojite tako da prvo prebrojite ishode u kojem su nekog kandidata izabrala točno dva člana komisije, a zatim i one u kojima su ga izabrala sva 3 člana komisije.

### 3 Kombinacije

**Definicija 3.1.** Neka su  $n$  i  $r$  prirodni brojevi takvi da je  $n \geq r$ . Neka je  $A$  skup koji sadrži  $n$  različitih objekata. Za  $r$ -člani podskup skupa  $A$  kažemo da je  **$r$ -kombinacija** skupa  $A$ .

**Primjer 3.1.** Odredite sve 3-kombinacije skupa  $\{a, b, c, d\}$ .

**Rješenje.**

$$\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\}.$$

✓

**Napomena 3.2.** Nije bitan poredak!

**Definicija 3.3.** Neka je  $n$  prirodan i  $r$  nenegativan cijeli broj,  $n \geq r$ . **Binomni koeficijent** je broj

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!}$$

kojeg čitamo “ $n$  povrh  $r$ ”.

**Napomena 3.4.** Za  $r > n$  definiramo  $\binom{n}{r} = 0$ .

**Teorem 3.5.** Neka su  $n$  i  $r$  prirodni brojevi takvi da je  $n \geq r$ . Broj  $r$ -kombinacija  $n$ -članog skupa je

$$C_r^n = \binom{n}{r}.$$

**Dokaz.** Znamo da  $r$ -permutacija  $n$ -članog skupa ima  $P_r^n = \frac{n!}{(n-r)!}$ . Kod kombinacija poredak nije bitan, stoga se iz jedne  $r$ -kombinacije dobije točno  $r!$  različitih  $r$ -permutacija. Zaključujemo:

$$C_r^n = \frac{P_r^n}{r!} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!} = \binom{n}{r}.$$

■

**Primjer 3.2.** Na koliko načina možemo odabrati grupu od 5 osoba iz grupe od 4 profesora i 7 studenata

- (a) ako nema restrikcija,
- (b) tako da u grupi budu točno 2 profesora,
- (c) tako da u grupi budu barem 3 profesora,
- (d) tako da određeni profesor i student ne budu u grupi?

**Rješenje.**

(a) Iz grupe od  $4 + 7 = 11$  ljudi moramo izabrati 5, odgovor je  $\binom{11}{5}$  načina.

(b) 2 profesora možemo izabrati na  $\binom{4}{2}$  načina, a preostalih troje ljudi na  $\binom{7}{3}$ , rješenje je  $\binom{4}{2} \cdot \binom{7}{3}$ .

(c) Posebno promatramo dva (disjunktna!) slučaja.

1° Odabrana su točno 3 profesora, imamo  $\binom{4}{3} \cdot \binom{7}{2} = 4 \cdot \binom{7}{2} = 25$  načina.

2° Odabrana su točno 4 profesora, imamo  $\binom{4}{4} \cdot \binom{7}{1} = 7$  načina.

Dakle, imamo sveukupno 32 načina.

**Napomena 3.6.** Netočno bi bilo najprije odabrati 3 profesora, a zatim od preostalih 8 ljudi još dvije osobe. Više puta bi brojali istu situaciju u kojoj su sva četiri profesora izabrana. Zašto?

- (d) Pošto ne smijemo izabrati jednog profesora i jednog studenta, preostaje nam 9 ljudi od kojih moramo izabrati grupu od 5 ljudi, odnosno, imamo  $\binom{9}{5}$  načina.

✓

**Primjer 3.3.** Na koliko načina možemo podijeliti 240 studenata u 3 jednakobrojne skupine tako da

- (a) prva skupina ide na vježbe iz Vjerojatnosti, druga na vježbe iz Diskretne matematike, a treća na Engleski,  
 (b) sve tri skupine idu na vježbe iz Diskretne matematike?

**Rješenje.**

- (a) Najprije odaberemo studente za prvu skupinu, zatim od ostatka studente za drugu skupinu, a preostale studente smjestimo u treću skupinu. Što nam daje  $\binom{240}{80} \cdot \binom{160}{80}$  načina.  
 (b) Razmišljamo isto kao u (a) dijelu zadatka, samo što nam u ovom slučaju nije bitno u koju će prostoriju koja grupa ići (u svima se slušaju vježbe iz Diskretne matematike), pa je odgovor  $\frac{\binom{240}{80} \cdot \binom{160}{80}}{3!}$  načina.

✓

**Teorem 3.7.** Neka su  $n$  i  $r$  prirodni brojevi takvi da je  $n \geq r$ . Za binomne koeficijente vrijedi.

- (1) **Simetrija.**

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r}.$$

- (2) **Pascalova formula.**

$$\binom{n}{r} = \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r}.$$

**Dokaz.** Provesti ćemo ga na dva načina.

- (i) Algebarski način.

(1)

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!} = \frac{n!}{(n-r)! \cdot [n - (n-r)]!} = \binom{n}{n-r}.$$

(2)

$$\begin{aligned} \binom{n-1}{r-1} + \binom{n-1}{r} &= \frac{(n-1)!}{(r-1)! \cdot (n-r)!} + \frac{(n-1)!}{r! \cdot (n-r-1)!} \\ &= \frac{(n-1)!}{(r-1)! \cdot (n-r-1)!} \cdot \left( \frac{1}{n-r} + \frac{1}{r} \right) \\ &= \frac{(n-1)!}{(r-1)! \cdot (n-r-1)!} \cdot \frac{n}{r \cdot (n-r)} \\ &= \frac{n!}{r! \cdot (n-r)!} = \binom{n}{r}. \end{aligned}$$

(ii) Kombinatorni način.

- (1) Broj s lijeve strane jednak je broju  $r$ -članih podskupova  $n$ -članog skupa. Broj s desne strane jednak je broju  $(n - r)$ -članih podskupova  $n$ -članog skupa. Ta dva broja su očito jednaka, jer za svaki izbor  $r$ -članog podskupa jednoznačno odredimo jedan  $(n - r)$ -člani podskup i obratno.
- (2) Ukoliko je  $n = r$  identitet trivijalno vrijedi, jer je  $\binom{n}{n} = \binom{n-1}{n-1} = 1$ . Pretpostavimo sada da je  $r < n$ . Prema definiciji je izraz s lijeve strane broj  $r$ -kombinacija  $n$ -članog skupa. Pokažimo da je tome jednak i broj s desne strane. Promatrajmo proizvoljan skup  $S$  koji ima  $n$  elemenata. Neka je  $x \in S$ . Sve  $r$ -kombinacije možemo podijeliti u dvije (disjunktne!) familije  $r$ -članih podskupova skupa  $S$ :

- one koje sadrže element  $x$ :  $\mathcal{A} = \{X \subseteq S : |X| = r, x \in X\}$ ,
- te one koje ne sadrže element  $x$ :  $\mathcal{B} = \{X \subseteq S : |X| = r, x \notin X\}$ .


Vrijedi  $|\mathcal{A}| = \binom{n-1}{r-1}$  (svaki skup familije  $\mathcal{A}$  sastoji se od elementa  $x$  i još  $r - 1$  elemenata od preostalih  $n - 1$  elemenata skupa  $S$ ),  $|\mathcal{B}| = \binom{n-1}{r}$ . Očito je da familije  $\mathcal{A}$  i  $\mathcal{B}$  u uniji daju sve  $r$ -člane podskupove skupa  $S$ . Ovime je dokaz gotov. ■

**Zadatak 3.4.** Neka su  $n$  i  $k$  prirodni brojevi takvi da je  $n \geq k$ . Koliko ima binarnih nizova duljine  $n$  koji sadrže  $k$  nula i  $n - k$  jedinica?  $\left[ \text{Rj. } \binom{n}{k} \right]$

**Primjer 3.5.** “Metoda kuglica i štapića.”

Na koliko načina možemo  $n \in \mathbb{N}$  jednakih kuglica rasporediti u  $m \in \mathbb{N}$  različitih kutija?

**Rješenje.**



Promatrajmo niz kuglica i pregrada kao na gornjoj slici. Kuglice lijevo od prve pregrade pripadaju prvoj kutiji, kuglice između prve i druge pregrade drugoj kutiji, itd. kuglice nakon zadnje pregrade zadnjoj kutiji. Dakle, imamo niz od  $n$  kuglica i  $m - 1$  pregrada. Svaki niz određuje točno jedan raspored kuglica po kutijama. Pregrade možemo razmjestiti na  $\binom{n+m-1}{m-1}$  načina, što je i odgovor na pitanje zadatka. ✓

**Zadatak 3.6.** Neka su  $m$  i  $n$  prirodni brojevi. Odredite broj nenegativnih cjelobrojnih rješenja jednadžbe

$$x_1 + x_2 + \dots + x_m = n.$$

$$\left[ \text{Rj. } \binom{n+m-1}{m-1} \right]$$

**Primjer 3.7.** Koliko ima uređenih četvorki  $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{N}^4$  takvih da je  $x_1 x_2 x_3 x_4 = 9000$ .

**Rješenje.**  $9000 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5^3$ .

Svaki faktor broja 9000 je oblika  $x_i = 2^{\alpha_i} \cdot 3^{\beta_i} \cdot 5^{\gamma_i}$ ;  $\alpha_i, \gamma_i \in \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $\beta_i \in \{0, 1, 2\}$ ,  $i \in \{1, 2, 3, 4\}$ . Da bi bilo  $x_1 x_2 x_3 x_4 = 9000$ , mora vrijediti

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 &= 3, \\ \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 &= 2, \\ \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4 &= 3. \end{aligned}$$

Postoji  $\binom{6}{3}$  različitih rješenja prve jednadžbe,  $\binom{5}{3}$  druge, te  $\binom{6}{3}$  zadnje. Odgovor na pitanje zadatka je  $\binom{6}{3}^2 \cdot \binom{5}{2} = 4000$ . ✓

**Primjer 3.8.** Koliko ima najkraćih puteva u cjelobrojnoj mreži od  $(0, 0)$  do  $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ ?

- (a) Bez dodatnih uvjeta.
- (b) Koji prolaze točkom  $(p, q)$ , gdje je  $p \in \mathbb{N}$ ,  $p < m$  i  $q \in \mathbb{N}$ ,  $q < n$ .
- (c) Koji ne prolaze segmentom  $[(p, q), (p + 1, q)]$ , gdje je  $p \in \mathbb{N}$ ,  $p < m - 1$  i  $q \in \mathbb{N}$ ,  $q < n$ .

**Rješenje.** Najprije primjetimo da su svi putevi koji se sastoje samo od kretanja desno i gore jednako dugi i da su to najkraći putevi. Svaki niz od  $x \in \mathbb{N}_0$  slova ‘D’ (desno) i  $y \in \mathbb{N}_0$  slova ‘G’ (gore) određuje točno jedan put od  $(x_0, y_0) \in \mathbb{N}_0^2$  do  $(x_0 + x, y_0 + y)$ . Npr. “GGGDDGDGGDDDD” nam određuje put od  $(x_0, y_0)$  do  $(x_0 + 6, y_0 + 6)$ .

- (a) Nizova duljine  $m + n$  koji sadrže  $m$  slova ‘D’ i  $n$  slova ‘G’ ima  $\binom{m+n}{m}$  (izaberemo  $m$  mjesta na kojima će biti slovo ‘D’, a na preostalima tada mora biti slovo ‘G’), to je i odgovor u ovom slučaju.
- (b) Najprije iz  $(0, 0)$  dođemo u  $(p, q)$ , a zatim iz njega u  $(m, n)$ . Prvi dio puta možemo izabrati na  $\binom{p+q}{p}$  načina, a drugi na  $\binom{m-p+n-q}{m-p}$  načina. Dakle, postoji  $\binom{p+q}{p} \cdot \binom{m-p+n-q}{m-p}$  puteva.
- (c) U ovom slučaju ćemo od svih mogućih (najkraćih) puteva oduzeti one koji prolaze tim segmentom, a tim segmentom prolaze svi putevi koji vode od  $(0, 0)$  u  $(p, q)$ , iz njega u  $(p + 1, q)$ , a zatim u  $(m, n)$ . Ukupno ima  $\binom{m+n}{m}$  puteva. “Loših” puteva ima  $\binom{p+q}{p} \cdot \binom{m-p-1+n-q}{m-p-1}$ . Konačno, rješenje je  $\binom{m+n}{m} - \binom{p+q}{p} \cdot \binom{m-p-1+n-q}{m-p-1}$  puteva.

✓

**Definicija 3.8.** Neka je  $n$  prirodan broj. Neka je  $A$  skup s  $2n$  elemenata. **Sparivanje** je particija skupa  $A$  na dvočlane podskupove.

**Primjer 3.9.** Neka je  $n \in \mathbb{N}$ . Odredite koliko ima različitih sparivanja skupa  $A$  koji sadrži  $2n$  elemenata.

**Rješenje.** Dati ćemo dva načina rješavanja.

- (i) Permutacija skupa  $A$  ima  $(2n)!$ . Permutacija jednog sparivanja skupa  $A$  ima  $n!$ . Dakle, iz svakog sparivanja skupa  $A$  možemo dobiti točno  $2^n \cdot n!$  permutacija skupa  $A$  (svaki član sparivanja, koji je dvočlani skup, možemo “unutar sebe” permutirati 2 puta). Iz dva različita sparivanja nikako ne možemo dobiti dvije jednake permutacije. Također, iz svih mogućih sparivanja dobiti ćemo sve permutacije. Dakle, svih mogućih sparivanja skupa  $A$  ima  $\frac{(2n)!}{2^n \cdot n!}$ .
- (ii) Najprije od  $2n$  elemenata izaberemo 2, zatim od preostalih  $2n - 2$  još 2, itd. zadnja preostala 2 “stavimo” u  $n$ -ti skup. No, nije nam bitan poredak tako dobivenih dvočlanih skupova, stoga je rješenje

$$\frac{\prod_{i=0}^{n-1} \binom{2n-2i}{2}}{n!} = \frac{1}{n!} \cdot \prod_{i=0}^{n-1} \frac{(2n-2i)(2n-2i-1)}{2} = \frac{(2n)!}{2^n \cdot n!}.$$

✓

## 4 Permutacije i kombinacije s ponavljanjem

**Definicija 4.1.** Uređenu  $r$ -torku  $(x_1, x_2, \dots, x_r)$  (ne nužno različitih) elemenata skupa  $S$  nazivamo  $r$ -permutacijom s ponavljanjem.

**Primjer 4.1.**  $A = \{a, b, c\}$ . Odredi sve 2-permutacije s ponavljanjem skupa  $A$ .

**Rješenje.**  $(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (c, c)$  ✓

Nameće se pitanje: koliko je  $r$ -permutacija s ponavljanjem skupa od  $n$  elemenata?

**Teorem 4.2.** Postoji točno  $n^r$   $r$ -permutacija s ponavljanjem  $n$ -članog skupa.

**Dokaz.** Prvi član uređene  $r$ -torke možemo odabrati na  $n$  načina, drugi također na  $n$  načina (jer se elementi smiju ponavljati), ..., i  $r$ -ti na  $n$  načina. U svemu, uređenu  $r$ -torku možemo odabrati na  $n^r$  načina. ■

**Zadatak 4.2.** Na koliko načina možemo 6 vrsta voća kojeg imamo u neograničenim količinama podijeliti između 10 djece tako da svako dijete dobije po jednu voćku? [Rj.  $6^{10}$ ]

**Napomena 4.3.** Kada voća ne bismo imali u neograničenim količinama, zadatak bi bio puno složeniji.

**Definicija 4.4. Konačni multiskup**  $M$  na skupu  $S$  je uređen par  $(S, m)$  gdje je  $m : S \rightarrow \mathbb{N}_0$  funkcija takva da je  $\sum_{x \in S} m(x)$  konačan broj. Za  $x \in S$  broj  $m(x)$  zovemo *kratnost od  $x$* .

**Definicija 4.5.** Neka je  $M = (S, m)$  multiskup. Uređenu  $r$ -torku  $(x_1, x_2, \dots, x_r)$ ,  $x_i \in M$ ,  $\forall i \in \{1, 2, \dots, r\}$ , takvu da je broj pojavljivanja elementa  $x_i$  manji od  $m(x_i)$  zovemo  $r$ -permutacija multiskupa. Ako je  $\sum_{x \in S} m(x) = r$ , govorimo o *permutaciji multiskupa  $M$* .

**Primjer 4.3.**  $M = \{a, a, b, b, c, c, c\} = \{a^2, b^2, c^3\}$  Koliko ima permutacija multiskupa  $M$ ?

**Rješenje.** Možemo razmišljati na dva načina.

**1. način.** Broj permutacija 7-članog skupa je  $7!$ . Kako je  $M$  multiskup, više puta smo brojali neke permutacije (prvi  $a$  i drugi  $a$  ne razlikujemo). Svaka permutacija istih elemenata skupa rezultira istom permutacijom multiskupa  $M$ . Zato je traženi broj  $\frac{7!}{2! \cdot 2! \cdot 3!}$ .

**2. način.** Odabiremo prvo dva mjesta (od sedam) na koje ćemo *smjestiti*  $a$ -ove. To možemo učiniti na  $\binom{7}{2}$  načina.  $c$ -ove zatim možemo rasporediti na  $\binom{5}{3}$  načina, a za  $b$ -ove je preostao samo još jedan način  $\binom{2}{2}$ . Ukupno je broj permutacija multiskupa jednak  $\binom{7}{2} \cdot \binom{5}{3} \cdot \binom{2}{2} = \frac{7!}{2! \cdot 3! \cdot 2!}$ . ✓

Analogno određujemo i broj permutacija općenitog multiskupa.

**Teorem 4.6.** Broj permutacija multiskupa  $\{x_1^{m_1}, x_2^{m_2}, \dots, x_k^{m_k}\}$ , pri čemu je  $\sum_{i=1}^k m_i = N$ , jednak je

$$\binom{N}{m_1} \cdot \binom{N-m_1}{m_2} \cdot \dots \cdot \binom{N-m_1-m_2-\dots-m_{k-1}}{m_k} = \frac{N!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_k!}$$

**Zadatak 4.4.** Odredi broj ternarnih nizova (nizovi nula, jedinica i dvojki) koji imaju 2 nule, 3 jedinice i 5 dvojki. [Rj.  $\frac{10!}{2! \cdot 3! \cdot 5!}$ ]

**Primjer 4.5.** Koliko ima peteroznamenastih brojeva kojima su znamenke elementi multiskupa  $\{7^4, 2^2, 4^1, 6^1\}$ ?

**Rješenje.** Zadatak ćemo riješiti razbijanjem na nekoliko slučajeva u ovisnosti o tome koliko istih znamenaka sadrži traženi petroznamenasti broj. U opisu svakog slučaja navodimo multiskupove zbroja kratnosti 5 čiji će elementi biti znamenke traženog broja.

$$1^\circ \{7^4, 2^1\}, \{7^4, 4^1\}, \{7^4, 6^1\}$$

Broj permutacija svakog od triju multiskupova jednak je  $\frac{5!}{4!}$ , i zato je ukupan broj brojeva u prvom slučaju jednak  $\#_1 = 3 \cdot \frac{5!}{4!} = 15$

$$2^\circ \{7^3, 2^1, 4^1\}, \{7^3, 2^1, 6^1\}, \{7^3, 6^1, 4^1\}$$

$$\#_2 = 3 \cdot \frac{5!}{3!} = 60$$

$$3^\circ \{7^3, 2^2\}$$

$$\#_3 = \frac{5!}{2! \cdot 3!} = 10$$

$$4^\circ \{7^2, 2^2, 6^1\}$$

$$\#_4 = 2 \cdot \frac{5!}{2! \cdot 2! \cdot 1!} = 60$$

$$5^\circ \{7^2, 2^1, 4^1, 6^1\}, \{7^1, 2^2, 4^1, 6^1\}$$

$$\#_5 = 2 \cdot \frac{5!}{2!} = 120$$

Dakle, takvih je brojeva ukupno  $\# = \sum_{i=1}^5 \#_i = 265$

(Ovakav problem ne bismo mogli općenito riješiti — barem zasad)

✓

**Primjer 4.6.** Pokaži da je broj  $4n!$  djeljiv s  $2^{3n}$  i  $3^n$

**Rješenje.** Promotrimo multiskup  $M = \{a_1^4, a_2^4, \dots, a_n^4\}$ . Broj permutacija tog multiskupa (**prirodan broj!**) je  $\frac{(4n)!}{4! \cdot 4! \cdot \dots \cdot 4!} = \frac{(4n)!}{2^{3n} \cdot 3^n} \in \mathbb{N}$

✓

**Napomena 4.7.** Slično, zbog kombinatorne interpretacije znamo i da je izraz oblika  $\frac{n!}{r!(n-r)!}$  prirodan broj.

**Definicija 4.8.** Za  $r$ -člani  $\left(\sum_{x \in S} m(x) = r\right)$  multiskup  $M = (S, m)$  kažemo da je  **$r$ -kombinacija s ponavljanjem** skupa  $S$ .

**Primjer 4.7.** Ispiši sve 2-kombinacije skupa  $S = \{a, b, c\}$ .

**Rješenje.**  $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, a\}, \{b, b\}, \{c, c\}$ .

✓

**Napomena 4.9.** Ovo su dvočlani **podmultiskupovi** multiskupa  $M = \{a^\infty, b^\infty, c^\infty\}$  (svaki od elemenata možemo odabrati koliko god puta želimo).

Sada želimo odrediti broj  $r$ -kombinacija s ponavljanjem  $n$ -članog skupa. Neka je  $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  zadani skup. Tada s  $x_i$  označimo broj ponavljanja elementa  $a_i$  u  $r$ -kombinaciji. Problem se tada svodi na određivanje broja nenegativnih cjelobrojnih rješenja jednadžbe

$$x_1 + x_2 + \dots + x_n = r. \quad (1)$$

Taj problem rješavamo *metodom štapića i kuglica*, opisanom u **Primjeru 3.5.** na stranici 12.

**Teorem 4.10.** Broj  $r$ -kombinacija s ponavljanjem  $n$ -članog skupa jednak je  $\binom{n+r-1}{n-1} = \binom{n+r-1}{r}$ .

**Napomena 4.11.** Ponovno naglasimo da smo promatrali slučaj kad se svaki član skupa  $S$  može pojaviti po volji mnogo puta (U kontekstu jednadžbe (1) to znači da elementi  $x_i$  nisu odozgo ograničeni.) Onaj drugi slučaj, kad će postojati ograničenja na broj ponavljanja određenog elementa u skupu bit će riješen kasnije.

**Primjer 4.8.** U Bologni se prodaju tri vrste sendviča: sa šunkom, tunom i vegetarijanski. Na koliko načina student može naručiti 6 sendviča?

**Rješenje.** Tražimo sve šesteročlane podskupove multiskupa  $\{S^\infty, T^\infty, V^\infty\}$ , odnosno broj nenegativnih cjelobrojnih rješenja jednadžbe  $x_1 + x_2 + x_3 = 6$ . Taj je broj jednak  $\binom{6+3-1}{3-1} = \binom{8}{2}$ .

✓

**Primjer 4.9.** Koliko ima cjelobrojnih rješenja jednadžbe

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 50$$

uz uvjete:  $x_1, x_4, x_5 \geq 0$ ;  $2 \leq x_3 \leq 7$ ;  $x_2 \geq 2$

**Rješenje.** Uvest ćemo supstituciju  $[y_1 = x_1, y_2 = x_2 - 2, y_3 = x_3 - 2, y_4 = x_4, y_5 = x_5]$ , nakon čega početna jednadžba glasi

$$y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 46 \quad (2)$$

uz uvjete  $y_i \geq 0, i \in \{1, 2, \dots, 5\}$  i  $y_3 \leq 5$

Jednostavnom supstitucijom svodimo uvjet  $x \geq c, c \in \mathbb{N}$  na  $x \geq 0$ , što znamo riješiti. Uvjet  $y_3 \leq 5$  također ćemo pokušati svesti na poznatu situaciju. Poslužiti ćemo se principom komplementa: broj cjelobrojnih rješenja jednadžbe (2) uz uvjet  $y_3 \leq 5$  jednak je razlici broja rješenja bez ikakvih dodatnih uvjeta i broja rješenja uz uvjet  $y_3 > 5$ , tj.  $y_3 \geq 6$ . Broj rješenja uz uvjet  $y_3 \geq 6$  određujemo supstitucijom  $z_3 = y_3 - 6$ , te  $z_i = y_i$ , za  $i = 1, 2, 4, 5$  pa govorimo o jednadžbi  $z_1 + z_2 + z_3 + z_4 + z_5 = 40$ . Na kraju, broj cjelobrojnih nenegativnih rješenja početne jednadžbe jednak je  $\binom{46+5-1}{46} - \binom{40+5-1}{40} = \binom{50}{4} - \binom{44}{4}$ . ✓

**Primjer 4.10.** Koliko ima  $r$ -podskupova skupa  $\{1, 2, \dots, n\}$  takvih da ne sadrže dva uzastopna broja?

**Rješenje.** Promatramo brojeve  $b_1, b_2, \dots, b_r$  takve da vrijedi

$$1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_r \leq n - r + 1$$

Sada označimo  $a_1 = b_1, a_2 = b_2 + 1, a_3 = b_3 + 2, \dots, a_r = b_r + r - 1$

Među brojevima  $a_1 \dots a_r$  nema uzastopnih i za njih vrijedi

$$1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_r \leq n$$

Postoji bijekcija između  $r$ -torki  $(a_1, a_2, \dots, a_r)$  i  $(b_1, b_2, \dots, b_r)$ .

Dakle, potrebno je odgovoriti na koliko načina možemo odabrati  $r$  elemenata od njih  $n - r + 1$ . Odgovor je  $\binom{n-r+1}{r}$ . ✓

## Problemi distribucije

1. Želimo odrediti broj rasporeda  $m$  različitih objekata u  $n$  različitih kutija tako da

(a) u svaku kutiju možemo staviti najviše jedan objekt:

$$n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-m+1).$$

(b) svaka kutija može sadržavati proizvoljno mnogo objekata:

$$n^m.$$

(c) svaka kutija može sadržavati samo jedan objekt, a na raspolaganju je  $r_1$  objekata prve vrste,  $\dots, r_k$  objekata  $k$ -te vrste:

$$\frac{n!}{r_1! \cdot \dots \cdot r_k!}, \text{ gdje je } n = \sum_{i=1}^k r_i.$$

(d) svaka kutija može sadržavati proizvoljan broj objekata, ali poredak unutar kutije je bitan:

$$n \cdot (n+1) \cdot (n+2) \cdot \dots \cdot (n+m-1).$$

2. Želimo odrediti broj rasporeda  $m$  identičnih objekata u  $n$  različitih kutija tako da

(a) u svaku kutiju stavimo najviše jedan objekt:

$$\binom{n}{m}.$$

(b) u svaku kutiju stavimo proizvoljan broj objekata:

$$\binom{n+m-1}{m}.$$



(c) niti jedna kutija ne bude prazna:

Tražimo broj cjelobrojnih rješenja jednadžbe  $r_1 + r_2 + \dots + r_n = m$ ,  $r_i \geq 1$ .

Uz supstituciju  $s_i = r_i - 1 \Rightarrow s_1 + \dots + s_n = m - n + 1$ .

Rješenje je, stoga

$$\binom{m-n+n-1}{n-1} = \binom{m-1}{n-1}.$$

Koliko postoji particija  $n$ -članog skupa? Ne postoji jednostavan način za računanje istoga.

**Definicija 4.12.**  $n$ -ti **Bellov broj**,  $B_n$  kao broj particija  $n$ -članog skupa. Dodatno, definiramo  $B_0 = 1$ .

**Teorem 4.13.** Vrijedi

$$B_n = \sum_{k=1}^n \binom{n-1}{k-1} B_{n-k}.$$

**Definicija 4.14.** Definiramo **Stirlingove brojeve druge vrste**  $S(n, k)$  kao broj  $k$ -članih particija  $n$ -članog skupa.

**Napomena 4.15.** Ponekad se koristi oznaka  $S(n, k) = \left\{ \begin{matrix} n \\ k \end{matrix} \right\}$ .

**Teorem 4.16.** Vrijedi

$$S(n+1, k) = S(n, k-1) + kS(n, k).$$

Lako vidimo da je  $S(n, 1) = S(n, n) = 1$ ,  $\forall n \in \mathbb{N}$ . Sada možemo konstruirati tablicu iz koje lako očitavamo Stirlingove brojeve druge vrste.

$n \backslash k$	1	2	3	4	5	6
1	1					
2	1	1				
3	1	3	1			
4	1	7	6	1		
5	1	15	25	10	1	
6	1	31	90	65	15	1

## 5 Rekurzivne relacije

### 5.1 Homogene linearne rekurzije s konstantnim koeficijentima

Izraz oblika  $c_r a_{n+r} + c_{r-1} a_{n+r-1} + \dots + c_0 a_n = 0$  nazivamo **homogena linearna rekurzija s konstantnim koeficijentima reda  $r$** .

Tražimo rješenje u obliku  $a_n = x^n$ . Uvrštavajući dobivamo

$$c_r x_{n+r} + c_{r-1} x_{n+r-1} + \dots + c_0 x_n = 0 \quad / : x^n$$

$$c_r x_r + c_{r-1} x_{r-1} + \dots + c_0 x_0 = 0,$$

taj izraz se naziva **karakteristična jednadžba**.

**Teorem 5.1.** Ako su  $x_1, x_2, \dots, x_r$  međusobno različita rješenja karakteristične jednadžbe, onda je svako rješenje početne rekurzije oblika  $a_n = A_1 x_1^n + A_2 x_2^n + \dots + A_r x_r^n$ , gdje  $A_1, \dots, A_r$  određujemo iz početnog uvjeta.

**Primjer 5.1.** Riješite rekurzivnu relaciju:

$$a_n = 2a_{n-1} + a_{n-2} - 2a_{n-3}; \quad a_1 = 1, a_2 = 2, a_3 = 3.$$

**Rješenje.** Uvrštavanjem  $x^n$  u  $a_n - 2a_{n-1} - a_{n-2} + 2a_{n-3} = 0$  dobivamo karakterističnu jednadžbu

$$x^n - 2x^{n-1} - x^{n-2} + 2x^{n-3} = 0 \quad / : x^{n-3},$$

$$x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0.$$

Izračunamo nultočke:  $-1, 1, 2$ , pa je opće rješenje:  $a_n = A \cdot (-1)^n + B \cdot 1^n + C \cdot 2^n$ . Sada iz početnih uvjeta imamo:

$$\left. \begin{array}{lcl} 1 & = & a_1 = A \cdot (-1) + B + C \cdot 2 \\ 2 & = & a_2 = A \cdot 1 + B + C \cdot 4 \\ 3 & = & a_3 = A \cdot (-1) + B + C \cdot 8 \end{array} \right\} \Rightarrow A = \frac{1}{6}, B = \frac{1}{2}, C = \frac{1}{3}.$$

Iz čega imamo rješenje  $a_n = \frac{(-1)^n}{6} + \frac{1}{2} + \frac{2^n}{3}$ . ✓

**Teorem 5.2.** Ako su rješenja karakteristične jednadžbe  $x_1, \dots, x_m$  s kratnostima  $k_1, \dots, k_m$ , onda je opće rješenje rekurzije dano formulom

$$\begin{aligned} a_n &= (A_{11} + A_{12}n + \dots + A_{1k_1}n^{k_1-1})x_1^n \\ &+ (A_{21} + A_{22}n + \dots + A_{2k_2}n^{k_2-1})x_2^n \\ &\vdots \\ &+ (A_{m1} + A_{m2}n + \dots + A_{mk_m}n^{k_m-1})x_m^n. \end{aligned}$$

**Primjer 5.2.** Riješite rekurziju:

$$a_n - 7a_{n-1} + 15a_{n-2} - 9a_{n-3} = 0; \quad a_0 = 1, a_1 = 2, a_2 = 3.$$

**Rješenje.** Karakteristična jednadžba:  $x^3 - 7x^2 + 15x - 9 = 0 \Rightarrow x_1 = 1, x_2 = x_3 = 3$ , sada je opće rješenje

$$a_n = A \cdot 1^n + B \cdot 3^n + C \cdot n \cdot 3^n.$$

Iz početnih uvjeta imamo

$$\left. \begin{array}{lcl} 1 & = & a_0 = A + B \\ 2 & = & a_1 = A + 3B + 3C \\ 3 & = & a_2 = A + 9B + 18C \end{array} \right\} \Rightarrow A = 0, B = 1, C = -\frac{1}{3}.$$

Uvrstimo u opće rješenje i imamo  $a_n = \left(1 - \frac{n}{3}\right) \cdot 3^n$ . ✓

**Zadatak 5.3.** Riješite rekurziju

$$a_n + a_{n-2} = 0; \quad a_0 = 1, a_1 = 1.$$

$$\left[ \text{Rj. } a_n = \frac{1-i}{2} \cdot i^n + \frac{1+i}{2} \cdot (-i)^n \right]$$

## 5.2 Nehomogene linearne rekurzije s konstantnim koeficijentima

Izraz oblika  $c_r a_{n+r} + \dots + c_1 a_{n+1} + c_0 a_n = f(n)$ , gdje je  $f$  neka funkcija od  $n$ , nazivamo **nehomogena linearna rekurzija s konstantnim koeficijentima  $r$ -tog reda**.

Postupak za rješavanje:

- (1) Nalazimo opće rješenje pripadne homogene jednadžbe  $a_n^H$ .
- (2) Tražimo partikularno rješenje  $a_n^P$  prema tablici (koja slijedi).
- (3) Opće rješenje je  $a_n = a_n^H + a_n^P$ , a koeficijente određujemo iz početnih uvjeta.

$f(n)$	$a_n^P$
$C \cdot b^n$	(a) $b$ nije korijen karakteristične jednadžbe; $a_n^P = A \cdot b^n$
	(b) $b$ je korijen karakteristične jednadžbe kratnosti $k$ ; $a_n^P = A \cdot n^k \cdot b^n$
$p(n) \in \mathbb{R}[x]$ , stupanj od $p = m$	(a) $1$ nije korijen karakteristične jednadžbe; $a_n^P = p_1(n)$ , polinom stupnja $n$ s neodređenim koeficijentima
	(b) $1$ je korijen karakteristične jednadžbe kratnosti $k$ ; $a_n^P = n^k \cdot p_1(n)$
$C \cdot n^m \cdot b^n$	(a) $b$ nije korijen karakteristične jednadžbe; $a_n^P = p_1(n) \cdot b^n$ , stupanj od $p_1 = m$
	(b) $b$ je korijen karakteristične jednadžbe kratnosti $k$ ; $a_n^P = n^k \cdot p_1(n) \cdot b^n$

ovdje nam  $C$ ,  $b$  i  $A$  predstavljaju neke konstante.

**Primjer 5.4.** Riješite rekurziju

$$a_{n+1} - 5a_n = 4n^2 + 2n + 6; \quad a_1 = 1.$$

**Rješenje.** Rješavanjem karakteristične jednadžbe pripadne homogene rekurzije dobivamo  $a_n^H = A \cdot 5^n$ . Dalje, vidimo da partikularno rješenje moramo tražiti u obliku  $a_n^P = Bn^2 + Cn + D$ , uvrštavanjem u danu rekurziju dobivamo

$$B(n+1)^2 + C(n+1) + D - 5Bn^2 - 5Cn - 5D = 4n^2 + 2n + 6$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$-4Bn^2 + (2B - 4C)n + (B + C - 4D) = 4n^2 + 2n + 6.$$

Izjednačavajući koeficijente s lijeve i desne strane (kao u jednakosti polinoma) nalazimo  $B = -1$ ,  $C = -1$ ,  $D = -2$ . Konačno, uvrštavanjem  $a_n = a_n^H + a_n^P$  u početni uvjet

$$1 = a_1 = 5A - 1 - 1 - 2 = 5A - 4,$$

nalazimo da je  $A = 1$ . Rješenje dane rekurzije je  $a_n = 5^n - n^2 - n - 2$ . ✓

**Primjer 5.5.** Riješite rekurziju

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} + n \cdot 3^n \quad a_0 = 2, a_1 = 3.$$

**Rješenje.** Karakteristična jednačina pripadne homogene rekurzije dana je s  $x^2 - 6x + 9 = 0$ , te ima rješenja  $x_1 = x_2 = 3$ . Dakle,  $a_n^H = A \cdot 3^n + B \cdot n \cdot 3^n$ . Sada vidimo u kakvom obliku moramo tražiti partikularno rješenje, odnosno  $a_n^P = n^2 \cdot (an + b) \cdot 3^n$ . Uvrštavanjem u danu rekurziju imamo

$$n^2 \cdot (an + b) \cdot 3^n = 6 \cdot (n-1)^2 \cdot [a(n-1) + b] \cdot 3^{n-1} - 9 \cdot (n-2)^2 \cdot [a(n-2) + b] \cdot 3^{n-2} + n \cdot 3^n / : 3^n$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$n^2 \cdot (an + b) = 2 \cdot (n^2 - 2n + 1) (an - a + b) - (n^2 - 4n + 4) (an - 2a + b) + n$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$(1 - 6a)n + (6a - 2b) = 0.$$

Dakle,  $a = \frac{1}{6}$ ,  $b = \frac{1}{2}$ . Sada, uvrštavanjem  $a_n = a_n^H + a_n^P$  u početne uvjete dobivamo  $A = 2$ ,  $B = \frac{-5}{3}$ . Konačno rješenje je  $a_n = \frac{3^{n-1}}{2} \cdot (n^3 + 3n^2 - 10n + 12)$ . ✓

**Zadatak 5.6.** Riješite rekurziju

$$a_n - 3a_{n-1} + 2a_{n-2} = 2^n; \quad a_0 = 3, a_1 = 8.$$

$$[\text{Rj. } a_n = (2n+1) \cdot 2^n + 2]$$

**Primjer 5.7.** Riješite sustav rekurzija

$$\left. \begin{aligned} a_n &= -2a_{n-1} + 4b_{n-1}, \\ b_n &= -5a_{n-1} + 7b_{n-1}; \end{aligned} \right\} \quad a_1 = 4, b_1 = 1.$$

**Rješenje.** Iz prve rekurzije dobivamo  $b_{n-1} = \frac{a_n + 2a_{n-1}}{4}$ , odnosno  $b_n = \frac{a_{n+1} + 2a_n}{4}$ . Uvrštavajući dobiveno u drugu rekurziju dobivamo da je potrebno riješiti rekurziju

$$a_n - 5a_{n-1} + 6a_{n-2} = 0; \quad a_1 = 4, a_2 = -2a_1 + 4b_1 = -4.$$

Rješenje dobivene rekurzije je  $a_n = 2^{n+3} - 4 \cdot 3^n$ , a sada lako nalazimo i da je  $b_n = 2^{n+3} - 5 \cdot 3^n$ . ✓

## 5.3 Modeliranje pomoću rekurzija

**Primjer 5.8.** Na koliko načina možemo ploču  $1 \times n$  popločati pločicama dimenzija  $1 \times 1$  i  $1 \times 2$ ?

**Rješenje.** Neka je  $a_n$  broj načina iz zadatka. Promotrimo prvu pločicu. Ukoliko je ona dimenzija  $1 \times 1$  ostatak ploče možemo popločati na  $a_{n-1}$  načina, a ukoliko je ona dimenzija  $1 \times 2$  onda ostatak možemo popločati na  $a_{n-2}$  načina. Dakle, vrijedi rekurzija

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}.$$

Početni uvjeti su  $a_1 = 1$ ,  $a_2 = 2$ . Preostaje nam samo za primjetiti da je  $a_n = F_{n+1}$ , gdje je  $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$  Fibonaccijev niz. ✓

**Napomena 5.3.** Fibonaccijev niz je definiran s  $F_1 = F_2 = 1$ , te  $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$ ,  $\forall n \geq 3$ . Zatvorena formula za Fibonaccijeve brojeve dana je s

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[ \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right], \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

**Primjer 5.9.**

- (a) Odredite broj podskupova skupa  $\{1, 2, \dots, n\}$  koji nemaju susjednih elemenata.  
 (b) Koliko ima binarnih nizova duljine  $n$  koji nemaju susjednih jedinica?

**Rješenje.** Kao u dokazu **Teorema 1.7.** konstruiramo bijekciju između skupova opisanih pod (a) i binarnih nizova opisanih pod (b) (dakle, odmah vidimo da je pod (a) i pod (b) jednak odgovor). Pretpostavimo da znamo odgovor za svaki prirodan broj manji od  $n$ . Označimo s  $a_n$  traženi broj. Na zadnje mjesto u nizu možemo staviti ili 0 ili 1 (ili ćemo uzeti  $n$ -ti element ili nećemo). Ukoliko je 0, onda očito imamo  $a_{n-1}$  načina, a ukoliko je to 1, onda na  $(n-1)$ -vom mjestu ne smije biti 1, pa imamo  $a_{n-2}$  načina. Dakle, dobili smo rekurziju

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2},$$

s početnim uvjetima  $a_1 = 2$ ,  $a_2 = 3$ , konačno  $a_n = F_{n+2}$ . ✓

**Primjer 5.10.** Na koliko maksimalno područja  $n$  pravaca dijeli ravninu?

**Rješenje.** Zanima nas maksimalni broj, stoga možemo pretpostaviti da nikoja dva pravca nisu paralelna i da se nikoja tri ne sijeku u istoj točki. Označimo s  $a_n$  traženi broj. Kada na  $n-1$  pravac dodamo još jedan, dobivamo  $n$  dijelova ravnine više no što smo imali. Očito je  $a_1 = 2$ , dakle, trebamo riješiti

$$a_n = a_{n-1} + n; \quad a_1 = 2.$$

Tipični način rješavanja dobivene rekurzije znamo, pokažimo sada tzv. **teleskopiranje**.


$$\begin{aligned} a_n &= a_{n-1} + n = [a_{n-2} + (n-1)] + n = \dots \\ &= 2 + 2 + 3 + \dots + n = \\ &= \frac{n(n+1)}{2} + 1. \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 5.11.** Neka je  $r_n$  broj djelova na koje dijagonale konveksnog  $n$ -terokuta dijele njegovu unutrašnjost. Pretpostavimo da se nikoje 3 dijagonale ne sijeku u istoj točki. Nađite rekurziju i zatvorenu formulu za  $r_n$ .

$$\left[ \text{Rj. } r_n = \frac{n^4 - 6n^3 + 23n^2 - 42n + 24}{24} \right]$$

**Uputa.** Dodamo  $n$ -tu točku i prebrojimo koliko novih djelova dobijemo. To radimo na taj način da tu novu točku spajamo s preostalima i to jednu po jednu i gledamo koliko smo novih djelova dobili u svakom koraku.



Tražena rekurzija je

$$r_n = r_{n-1} + \frac{n^3 - 6n^2 + 17n - 18}{6}, \quad \forall n \geq 4, r_3 = 1,$$

koju lako rješavamo teleskopiranjem.

## 6 Funkcije izvodnice

Do sada smo pod rješenjem kombinatornih problema uglavnom podrazumijevali zatvorenu formulu, npr.  $n!$  za broj permutacija ili  $\binom{n}{k}$  za broj  $k$ -kombinacija skupa od  $n$  elemenata. No svi kombinatorni problemi nemaju rješenje u obliku zatvorene formule pa smo npr. sa  $S(n, k)$  označili broj  $k$  particija skupa od  $n$  elemenata, a  $B_n$  za broj particija skupa od  $n$  elemenata. Neke probleme (odredite broj  $k$  kombinacija konačnog multiskupa, pogledajte **Primjer 4.9.** na stranici 16, odredite broj permutacija s ponavljanjem konačnog multiskupa, pogledajte **Primjer 4.3.** na stranici 14) trebalo je rastaviti na slučajeve i onda riješiti svaki slučaj posebno, pogledajte **Primjer 4.5.** na stranici 14. Kod takvih problema od velike pomoći su nam *funkcije izvodnice* koje ne samo da možemo shvatiti kao rješenje danog problema već su i moćan tehnički alat za rješavanje kombinatornih problema.

### 6.1 Obične funkcije izvodnice

**Primjer 6.1.** Na koliko načina možemo "usitniti" novčanicu od 20 kn ako na raspolaganju imamo kovanice od 1, 2 i 5 kn?

**Rješenje.** Označimo sa  $x, y$  i  $z$  broj kovanica od jedne, dvije i pet kuna. Tada problem glasi:

Koliko ima rješenja jednadžbe  $x + 2y + 5z = 20$ ,  $x, y, z \geq 0$ ,  $x, y, z \in \mathbb{Z}$ ?

Problem možemo riješiti rastavljanjem na slučajeve po npr. varijabli  $z$ . No dobili bismo previše slučajeva, a i želimo naći metodu koja rješava sve slične probleme.

Promotrimo izraz:

$$\left( \begin{array}{c} \textcircled{0} + \textcircled{1} + \textcircled{1}\textcircled{1} + \dots \end{array} \right) \cdot \left( \begin{array}{c} \textcircled{0} + \textcircled{2} + \textcircled{2}\textcircled{2} + \dots \end{array} \right) \cdot \left( \begin{array}{c} \textcircled{0} + \textcircled{5} + \textcircled{5}\textcircled{5} + \dots \end{array} \right)$$

Raspišemo li ovaj produkt dobivamo sumu u kojoj svaki pribrojnik odgovara nekom iznosu isplaćenom u kovanicama po 1, 2 ili 5 kn. Jedan takav pribrojnik je

$$\textcircled{1}\textcircled{1}\textcircled{1}\textcircled{2}\textcircled{5}\textcircled{5}\textcircled{5}$$

Rješenje je broj pribrojnika za koje se dobije da im je suma 20.

Uz supstituciju

$$\textcircled{1} = x$$

slijedi:

$$f(x) = (1 + x + x^2 + x^3 + \dots) \cdot (1 + x^2 + x^4 + \dots) \cdot (1 + x^5 + x^{10} + \dots)$$

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots$$

Treba odrediti koeficijent  $a_{20}$  (oznaka  $\langle x^{20} \rangle$ ). Grubom silom dobivamo:

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{20}x^{20} + \dots$$

[Rj.  $a_{20} = 29$ ]

Došli smo do funkcije izvodnice za niz  $(a_n)$ . U osnovi smo problem riješili rastavljanjem (točnije, popisivanjem) svih mogućih slučajeva, no zbog kompaktnije notacije rješenje je ipak bilo jednostavnije za odrediti. ✓

**Definicija 6.1.** Za niz  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  pridružena *funkcija izvodnica* (skraćeno FI) je formalni red potencija  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ .

Red nazivamo formalnim jer ne razmatramo pitanje konvergencije kao kod Taylorovih redova. Nas ne zanima vrijednost u određenoj točki  $x$  već isključivo koeficijenti. Osnovne operacije s formalnim redovima identične su kao i kod Taylorovih redova.

**Definicija 6.2.** Neka su  $f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  i  $f_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$  funkcije izvodnice. Tada definiramo:

$$(f_1 + f_2)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \quad (3)$$

$$(f_1 f_2)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} x^n \quad (4)$$

$$\frac{d}{dx} f_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1} \quad (5)$$

$$\int f_1(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \quad (6)$$

Pročitajte poglavlje predavanja iz funkcija izvodnica i provjerite možete li izvesti osnovne operacije: iz danog niza odredite mu pripadnu funkciju izvodnicu i iz dane funkcije izvodnice odredite pripadni niz.

Prilikom određivanja koeficijenata koristimo svojstva Taylorovih redova:

**Geometrijski red** (konvergira za  $|x| < 1$ )

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots = \frac{1}{1-x}$$

Prisjetimo se još nekih tvrdnji koje vrijede za Taylorove redove :

**Binomni poučak**

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

**Opći binomni poučak**

$$(1 \pm x)^\alpha = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} (\pm x)^k$$

**Definicija 6.3.** Neka je  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$ . Tada se opći binomni koeficijent  $\binom{\alpha}{n}$  definira kao

$$\binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!}$$



Pomoću funkcija izvodnica možemo opravdati metodu za rješavanje linearnih rekurzija s konstantnim koeficijentima. Ovdje će nas više zanimati modeliranje kombinatornih problema (kombinacije konačnog multiskupa, permutacije s ponavljanjem).

### Interpretacija binomnog poučka pomoću funkcija izvodnica

$\binom{n}{k}$  = broj  $k$ -kombinacija  $n$ -članog skupa

Neka je  $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$   $n$ -člani skup, te  $A = \{S_{i_1}, S_{i_2}, \dots, S_{i_k}\} \subseteq S$   $k$ -člani podskup od  $S$ . Na koliko načina možemo odabrati  $A$ ?

Prvi element možemo uzeti 0 puta ili jednom, drugi element možemo uzeti 0 puta ili jednom, ... i  $n$ -ti element možemo uzeti 0 puta ili jednom, odnosno:

$$(1+x) \cdot (1+x) \cdot \dots \cdot (1+x) = (1+x)^n$$

Dakle  $f(x) = (1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$  je funkcija izvodnica za broj kombinacija  $n$ -članog skupa.

Što je s kombinacijama s ponavljanjem  $n$ -članog skupa?  
Svaki element možemo uzeti proizvoljno mnogo puta!

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x+x^2+\dots) \cdot (1+x+x^2+\dots) \cdots (1+x+x^2+\dots) \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x} \cdots \frac{1}{1-x} \\ &= \left( \frac{1}{1-x} \right)^n \\ &= a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots \end{aligned}$$

Dobiveni red nazivamo funkcijom izvodnicom za kombinacije multiskupa  $\{S_1^\infty, S_2^\infty, \dots, S_n^\infty\}$ .

### Pravilo inverzije

$$\begin{aligned} \binom{-n}{k} &= \frac{(-n)(-n-1)\cdots(-n-k+1)}{k!} \\ &= \frac{(-1)^k (n+k-1)(n+k)\cdots(n)}{k!} \\ &= (-1)^k \binom{n+k-1}{k} \end{aligned}$$

Vratimo se sad primjeru  $k$ -kombinacija multiskupa  $\{S_1^\infty, S_2^\infty, \dots, S_n^\infty\}$ :

$$\begin{aligned} f(x) &= \left( \frac{1}{1-x} \right)^n \\ &= (1-x)^{-n} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} (-x)^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{n+k-1}{k} (-1)^k x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} x^k \end{aligned}$$

**Zadatak 6.2.** Odredite funkciju izvodnicu za broj kombinacija multiskupa  $\{a^2, b, c^2, d\}$  te odredite koliko ima 4-kombinacija.

**Rješenje.** Elemente  $a$  i  $c$  možemo uzeti 0,1 ili 2 puta, dok elemente  $b$  i  $c$  možemo uzeti ili ne uzeti:

$$f(x) = (1 + x + x^2)(1 + x)(1 + x + x^2)(1 + x)$$

Sada je lako to izmnožiti te potom očitati  $\langle x^4 \rangle$

$$\begin{aligned} f(x) &= 1 + 4x + 8x^2 + 10x^3 + 8x^4 + 4x^5 + x^6 \\ \implies \langle x^4 \rangle &= 8 \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 6.3.** Odredite funkciju izvodnicu za broj kombinacija multiskupa  $\{a^{10}, b^7, c^{12}\}$  te odredite koliko ima 15-kombinacija.

**Rješenje.** Element  $a$  možemo uzeti proizvoljan broj puta, od 0 do 10,  $b$  od 0 do 7 puta i  $c$  od 0 do 12 puta:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1 - x + \dots + x^{10}}{1 - x^{11}} \cdot \frac{1 - x + \dots + x^7}{1 - x^8} \cdot \frac{1 - x + \dots + x^{12}}{1 - x^{13}} \\ &= \frac{1 - x}{1 - x^{11}} \cdot \frac{1 - x}{1 - x^8} \cdot \frac{1 - x}{1 - x^{13}} \cdot (1 - x)^{-3} \\ &= \left\{ (1 - x)^{-3} = \sum_k \binom{-3}{k} (-x)^k = \sum_k \binom{k+2}{k} x^k \right\} = \\ &= (1 - x^8 - x^{11} - x^{13} + x^{19} + \dots) \cdot \sum_k \binom{k+2}{k} x^k \\ \implies \langle x^{15} \rangle &= \binom{15+2}{15} - \binom{7+2}{7} - \binom{4+2}{4} - \binom{2+2}{2} = 79 \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 6.4.** Na koliko načina se 24 jednaka bombona može raspodijeliti među 4 djece tako da svako dijete dobije barem 3, ali ne više od 8 bombona?

**Rješenje.** Svakom od njih četvero možemo dati 3, 4, ... ili 8 bombona.

$$\begin{aligned} f(x) &= (x^3 + x^4 + \dots + x^8)^4 \\ &= x^{12} \cdot (1 + x + \dots + x^5)^4 \\ &= x^{12} \cdot \left( \frac{1 - x^6}{1 - x} \right)^4 \\ &= x^{12} \cdot (1 - x^6)^4 (1 - x)^{-4} \\ &= x^{12} \cdot (1 - 4x^6 + 6x^{12} - 4x^{18} + x^{24}) \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-4}{k} (-x)^k \\ &= (x^{12} - 4x^{18} + 6x^{24} - 4x^{30} + x^{36}) \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \binom{k+3}{k} x^k \\ \langle x^{24} \rangle &= \binom{12+3}{12} - 4 \cdot \binom{6+3}{6} + 6 \cdot \binom{3}{0} \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 6.5.** Broj particija  $p_1(n)$  od  $n$  u različite sumande jednak je broju particija  $p_2(n)$  od  $n$  u neparne sumande. Dokažite!

**Rješenje.** Naći ćemo funkcije izvodnice za oba problema, i pokazati da su jednake! Same brojeve takvih particija ne znamo izračunati, pa nam funkcije izvodnice uvelike pomažu u ovom slučaju.

Pogledajmo particije od  $n = 6$  u različite i u neparne sumande:

$$\begin{array}{ll} 6 & = 1+2+3 & = 1+1+1+1+1+1 \\ & = 1+5 & = 1+1+1+3 \\ & = 2+4 & = 1+5 \\ & = 6 & = 3+3 \end{array}$$

Funkciju izvodnicu  $f_1$  za računanje  $p_1(n)$  nije teško odrediti, svaki od sumanda možemo uzeti 0 ili 1 put, dakle:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= (1+x) \cdot (1+x^2) \cdots (1+x^n) \cdots \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^k) \end{aligned}$$

Analogno odredimo i  $f_2$ , smijemo uzimati samo neparne sumande, ali ih možemo uzeti proizvoljno mnogo puta:

$$\begin{aligned} f_2(x) &= (1+x+x^2+\cdots) \cdot (1+x^3+x^6+\cdots) \cdot (1+x^5+x^{10}+\cdots) \cdots \\ &= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^3} \cdot \frac{1}{1-x^5} \cdots \end{aligned}$$

Preostaje pokazati da su te dvije funkcije jednake:

$$\begin{aligned} f_1(x) &= \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^k) \\ &= \prod_{k=1}^{\infty} \left( \frac{1-x^{2k}}{1-x^k} \right) \\ &= \frac{1-x^2}{1-x} \cdot \frac{1-x^4}{1-x^2} \cdot \frac{1-x^6}{1-x^3} \cdot \frac{1-x^8}{1-x^4} \cdots \\ &= f_2(x) \end{aligned}$$

Jer se svi faktori oblika  $1-x^{2k}$  pokrate. ✓

**Napomena 6.4.** Pogrešno bi bilo funkciju izvodnicu za broj particija u različite sumande iz prethodnog zadatka definirati kao  $f(x) = \underbrace{(1+x) \cdot (1+x) \cdots (1+x)}_{n \text{ puta}}$ . Do tog rezultata dolazimo razmišljajući na sljedeći način; u

rastavu broja  $n$  na različite sumande, jedinicu ćemo uzeti ili ne uzeti, analogno, dvojku ćemo uzeti ili ne uzeti itd. To razmišljanje je definitivno točno, ali nam ovdje **svaki od odabira nije "jednako vrijedan"**, kao kod npr. odabira  $k$ -članog podskupa  $n$ -članog skupa! Primjetimo da bismo u tom slučaju koeficijent  $\langle x^n \rangle$  koji odgovara broju rastava broja  $n$  na različite sumande dobili na jedan jedini način; iz svake zgrade odaberemo  $x$  (dakle ni iz jedne ne odaberemo 1) i sve ih pomnožimo. Vidjeli smo da za  $n = 6$  takav prikaz nije jedinstven (zapravo, za svaki  $n \in \mathbb{N}$ ,  $n \geq 3$  takav prikaz nije jedinstven). Uočimo da svaki od navedenih rastava u primjeru za  $n = 6$  odgovara jednom od načina na koji možemo dobiti  $x^n$  iz funkcije  $f_1$  i obratno:

$$1 + 2 + 3 \longleftrightarrow x^1 \cdot x^2 \cdot x^3$$

$$1 + 5 \longleftrightarrow x^1 \cdot x^5$$

$$2 + 4 \longleftrightarrow x^2 \cdot x^4$$

$$6 \longleftrightarrow x^6$$

Jasno je da isto vrijedi za svaki  $n \in \mathbb{N}$ . Rješavanje raznih kombinatornih problema pomoću funkcija izvodnica naizgled zaobilazi "problem" zbrajanja, stvar se svodi na množenje, zapravo je u pozadini

$$x^n \cdot x^m = x^{n+m}$$

Upravo bi iz tih razloga bilo jednako krivo definirati dotičnu funkciju kao  $f(x) = (1+x) \cdot (1+2x) \cdots (1+nx)$ .

## 6.2 Eksponecijalne funkcije izvodnice

Veza permutacija i kombinacija  $n$ -članog skupa:

$$a_k = P_k^n = \binom{n}{k} \cdot k! \implies \binom{n}{k} = \frac{a_k}{k!}$$

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

Dakle  $e(x) = \sum_{k=0}^n \frac{a_k}{k!} x^k$  je eksponecijalna funkcija izvodnica za permutacije  $n$ -članog skupa.

**Definicija 6.5.** Za niz  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  pridružena *eksponecijalna funkcija izvodnica* (skraćeno EFI) je formalni red potencija  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$ .

**Definicija 6.6.** Neka su  $e_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$  i  $e_2(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{n!} x^n$  eksponecijalne funkcije izvodnice. Tada definiramo:

$$(e_1 + e_2)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n + b_n}{n!} x^n \quad (7)$$

$$(e_1 e_2)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{a_k b_{n-k}}{n!} x^n \quad (8)$$

$$\frac{d}{dx} e_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{(n-1)!} x^{n-1} \quad (9)$$

$$\int e_1(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{(n+1)!} x^{n+1} \quad (10)$$

**Primjer 6.6.** Neka je  $S = \{a_1^{n_1}, a_2^{n_2}, \dots, a_k^{n_k}\}$  multiskup. Odredite eksponecijalnu funkciju izvodnicu za permutacije multiskupa.

**Rješenje.** Element  $a_i$  možemo uzeti od 0 do  $n_i$  puta, i tako  $\forall i = 1, 2, \dots, k$ :

$$e(x) = \left(1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^{n_1}}{n_1!}\right) \cdot \left(1 + \frac{x}{1!} + \dots + \frac{x^{n_2}}{n_2!}\right) \cdots \left(1 + \frac{x}{1!} + \dots + \frac{x^{n_k}}{n_k!}\right)$$

✓

**Primjer 6.7.** Koliko ima riječi duljine 4 sastavljenih od slova  $B, A, N, A, N$  i  $A$ ?

**Rješenje.** Traže se 4-permutacije multiskupa  $S = \{A^3, B, N^2\}$ . Slovo  $A$  možemo uzeti od 0 do 3 puta,  $B$  uzeti ili ne, a  $C$  možemo uzeti 0, 1 ili 2 puta:

$$\begin{aligned} e(x) &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}\right) \cdot (1+x) \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!}\right) \\ &= 1 + 3x + 4x^2 + \frac{19}{6}x^3 + \frac{19}{12}x^4 + \frac{1}{2}x^5 + \frac{1}{12}x^6 \end{aligned}$$

$$\frac{a_4}{4!} = \langle x^4 \rangle = \frac{19}{12} \implies a_4 = 38$$

✓

**Zadatak 6.8.** Koliko ima ternarnih nizova duljine  $n$ , tako da imamo paran broj nula, neparan broj jedinica i proizvoljno dvojki?

**Rješenje.** Za nule uzimamo samo parne potencije, za jedinice neparne, a za dvojke sve:

$$\begin{aligned}
 e(x) &= \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots\right) \cdot \left(x + \frac{x^3}{3!} + \dots\right) \cdot \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) \\
 &= \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \cdot e^x \\
 &= \frac{1}{4} \cdot (e^{2x} - e^{-2x}) \cdot e^x \\
 &= \frac{1}{4} \cdot (e^{3x} - e^{-x}) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(3x)^k}{k!} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!}\right) \\
 &= (7) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{3^k - (-1)^k}{k!} x^k
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \langle x^n \rangle &= \frac{1}{4} \cdot \frac{3^n - (-1)^n}{n!} \\
 \implies a_n &= \frac{3^n - (-1)^n}{4}
 \end{aligned}$$

✓

**Napomena 6.7.** Tokom rješavanja koristili smo rezultate koje dobijemo zbrajanjem, odnosno oduzimanjem sljedećih jednačbi:

$$\begin{aligned}
 e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \\
 e^{-x} &= 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots
 \end{aligned}$$

**Definicija 6.8.** Deranžman je permutacija bez fiksnih točaka.

**Zadatak 6.9.** Odredite EFI za deranžmane!

**Rješenje.** Označimo broj deranžmana  $n$ -članog skupa sa  $d_n$ , EFI za broj deranžmana sa  $d(x)$ . Sada je

$$d(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{n!} x^n.$$

Skup svih permutacija  $S_n$  skupa od  $n$  elemenata, možemo razdvojiti na disjunktnu uniju  $\bigcup_{k=0}^n S_n^{(k)}$  gdje je  $S_n^{(k)}$  skup svih permutacija  $n$ -članog skupa koje imaju  $k$  fiksnih točaka, i to za svaki  $k = 0, 1, \dots, n$ . Dobivamo

$$n! = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} d_{n-k}$$

Pomnožimo dobiveni rezultat sa  $\frac{x^n}{n!}$ , imamo

$$x^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d_{n-k}}{n!} x^n, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^{\infty} x^n &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d_{n-k}}{n!} x^n \\
\frac{1}{1-x} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{d_{n-k}}{n!} x^n \\
&= (8) = \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \right) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d_n}{n!} x^n \right) \\
&= e^x \cdot d(x)
\end{aligned}$$

$$\Rightarrow d(x) = \frac{1}{1-x} \cdot e^{-x}$$

Preostaje razviti dobivenu funkciju:

$$\begin{aligned}
d(x) &= \frac{1}{1-x} \cdot e^{-x} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} x^n
\end{aligned}$$

Sada lako vidimo koliki je broj deranžmana  $n$ -članog skupa, naime  $\langle x^n \rangle = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$  pa je

$$d_n = n! \cdot \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

✓

## 7 Formula uključivanja i isključivanja

Za dva disjunktna skupa,  $A$  i  $B$ , znamo da je broj elemenata njihove unije jednak zbroju elemenata u svakom od njih. Općenito vrijedi  $|X \cup Y| \leq |X| + |Y|$  (pri zbrajanju kardinalnih brojeva skupova dvaput su brojeni elementi presjeka). Vrijedi

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

### Teorem 7.1. Formula uključivanja i isključivanja

Neka je  $S$  konačan skup i  $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq S$ . Tada je broj elemenata njihove unije

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^{n-1} \cdot |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

Odatle slijedi:

$$|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| = |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

**Zadatak 7.1.** Neka je  $S = \{1, 2, \dots, 10^6\}$ . Koliko je brojeva iz  $S$  koji nisu djeljivi ni s dva, ni s tri niti sa četiri?

**Rješenje.** Označimo:  $A_i = \{x \in S : i|x\}$ . Vrijedi  $|A_i| = \left\lfloor \frac{10^6}{i} \right\rfloor$ . Nas zanima  $|\bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4|$ , a on je, prema drugoj tvrdnji prethodnog teorema, jednak

$$\begin{aligned} |\bar{A}_2 \cap \bar{A}_3 \cap \bar{A}_4| &= |S| - |A_2| - |A_3| - |A_4| + |A_2 \cap A_3| + |A_2 \cap A_4| + |A_3 \cap A_4| - |A_2 \cap A_3 \cap A_4| \\ &= 166666 \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 7.2.** Koliko brojeva dijeli barem jedan od brojeva  $10^{60}$ ,  $20^{50}$ ,  $30^{40}$ ?

**Rješenje.** Označimo  $A = \{d \in \mathbb{N} : d|10^{60}\}$ ,  $B = \{d \in \mathbb{N} : d|20^{50}\}$ ,  $C = \{d \in \mathbb{N} : d|30^{40}\}$

Kako je  $10^{60} = 2^{60} \cdot 5^{60}$  svi brojevi iz  $A$  su oblika  $2^{\alpha_1} \cdot 5^{\alpha_2}$ , uz  $\alpha_1, \alpha_2 \leq 61$ . Zato je  $|A| = 61^2$ . Istim zaključivanjem nalazimo  $|B| = 101 \cdot 51$  i  $|C| = 41^3$ . Zanima nas i koliko ima brojeva koji su istovremeno i u  $A$  i u  $B$ . Oni u svom rastavu na proste faktore smiju imati samo dvojke i petice, pri čemu dvojke smije biti najviše 60 (zbog oblika brojeva iz  $A$ ), a petica najviše 50 (zbog oblika brojeva iz  $B$ ). Zato je  $|A \cap B| = 61 \cdot 51$

Slično je i  $|B \cap C| = 41^2$ ,  $|A \cap C| = 41^2$ ,  $|A \cap B \cap C| = 41^2$ . Sada prema formuli uključivanja i isključivanja nalazimo  $|A \cap B \cap C| = 73001$

✓

**Zadatak 7.3.** Pustinjom putuje karavana od devet deva. Nakon odmora u oazi, potrebno je promijeniti redoslijed deva tako da niti jedna deva ne hoda iza one deve iza koje je hodala prije dolaska u oazu. Na koliko je načina to moguće napraviti?

**Rješenje.** Ako je  $S$  skup svih redoslijeda deva, a  $A_i = \{\text{redoslijed u kojem } i\text{-ta deva hoda iza } (i-1)\text{-te deve}\}$ , želimo utvrditi koliko je  $|\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_9|$ . Znamo da je  $|S| = 9!$  i  $|A_k| = 8!$ , za  $2 \leq k \leq 9$  (dvije deve promatramo kao blok). Isto tako znamo da za sve  $i, j$  vrijedi  $|A_i \cap A_j| = 7!$  (promatramo ili dva bloka od dvije deve i još 5 deva ili, u slučaju da su  $i$  i  $j$  uzastopni, jedan blok od tri deve i još 6 deva). Sličnim razmišljanjem dolazimo do  $|A_i \cap A_j \cap A_k| = 6!, \dots, |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_9| = 1$ . Zato je traženi broj redoslijeda

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_9| &= |S| - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^9 \cdot |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_9| \\ &= 9! - 8 \cdot 8! + \binom{8}{2} \cdot 7! - \binom{8}{3} \cdot 6! + \dots - 1 \\ &= \sum_{k=0}^8 (-1)^k \cdot \binom{8}{k} \cdot (9-k)! \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 7.4.** Na početku nove sezone RK Zagreb potpisuje ugovore s pojačanjima. Na potpisivanje je došlo  $n$  rukometaša, svaki u pratnji agenta i liječnika. Na koliko načina možemo tu grupu od  $3n$  ljudi rasporediti u tročlane grupe sastavljene od jednog rukometaša, jednog agenta i jednog liječnika, ali tako da nijedan rukometaš nije u grupi s oba svoja pratitelja?

**Rješenje.** Svih mogućih grupiranja u trojke ima  $n!$  (rukometaš određuje grupu, a zatim agente i liječnike možemo rasporediti po grupama na  $n!$  načina). Neka je  $A_i$  skup onih grupiranja u kojima je  $i$ -ti rukometaš u grupi sa svojim liječnikom i agentom. Tada je  $|A_i| = (n-1)!$  (jedna je grupa zadana, brojimo načine na koliko se može sastaviti preostalih  $n-1$  grupa),  $|A_i \cap A_j| = (n-2)!, \dots, |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| = 1$ . Na kraju je

$$\begin{aligned} |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n| &= n!^2 - \sum_{i=1}^n |A_i| + \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| - \dots + (-1)^n \cdot |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \\ &= n!^2 - n \cdot (n-1)!^2 + \binom{n}{2} \cdot (n-2)!^2 - \binom{n}{3} \cdot (n-3)!^2 + \dots + (-1)^n \cdot \binom{n}{n} 0!^2 \\ &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \cdot \binom{n}{k} \cdot (n-k)!^2 \end{aligned}$$

✓

**Zadatak 7.5.** Odredi broj deranžmana  $n$ -članog skupa

**Rješenje.** Neka je  $S_n$  skup svih permutacija  $n$ -članog skupa. Nas zanima koliko je permutacija  $\pi \in S_n$  takvih da je  $\pi(i) \neq i, \forall i$ . Uvedimo oznaku  $A_i = \{\pi \in S_n : \pi(i) = i\}$

$$\begin{aligned} |S_n| &= n! \\ |A_i| &= (n-1)! \\ |A_i \cap A_j| &= (n-2)! \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| &= 1 \end{aligned}$$

Sada, slično kao u prethodna dva zadatka, dolazimo do formule za broj deranžmana

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \cdot \binom{n}{k} \cdot (n-k)!$$

✓

**Definicija 7.2.** Eulerova funkcija broja  $n$ ,  $\varphi(n)$ , je broj prirodnih brojeva manjih ili jednakih od  $n$  koji s brojem  $n$  nemaju zajedničkih djelitelja

**Zadatak 7.6.** Pronađi izraz za Eulerovu funkciju

**Rješenje.** Broj  $n$  možemo prikazati kao umnožak njegovih prostih faktora,  $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$

Neka je  $A_i$  skup svih višekratnika broja  $p_i$ ,  $1 \leq i \leq k$

$$\varphi(n) = |\bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_k| = n - |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k|$$

$$\begin{aligned} |A_i| &= \frac{n}{p_i} \\ |A_i \cap A_j| &= \frac{n}{p_i \cdot p_j} \\ &\vdots \\ &\vdots \\ &\vdots \\ |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k| &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \varphi(n) &= n - \left( \frac{n}{p_1} + \frac{n}{p_2} + \dots + \frac{n}{p_k} - \frac{n}{p_1 \cdot p_2} - \frac{n}{p_1 \cdot p_3} - \dots - \frac{n}{p_{k-1} \cdot p_k} + \dots + (-1)^k \cdot \frac{n}{p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k} \right) \\ &= n \left( 1 - \frac{1}{p_1} \right) \left( 1 - \frac{1}{p_2} \right) \cdot \dots \cdot \left( 1 - \frac{1}{p_k} \right) \end{aligned}$$



✓

**Zadatak 7.7.** Koliko je najkraćih puteva u cjelobrojnoj mreži od ishodišta do točke  $(7, 5)$  koji ne prolaze segmentima  $[(2, 2), (3, 2)]$  i  $[(4, 2), (4, 3)]$

$$\left[ \text{Rj. } \binom{7+5}{7} - \binom{2+2}{2} \cdot \binom{4+3}{4} - \binom{4+2}{2} \cdot \binom{3+2}{2} + \binom{2+2}{2} \cdot 1 \cdot \binom{3+2}{2} \right]$$