Clinical5 衍生积分问卷

研究用版本 | 适用于 ≥40 岁、无既往 COPD 诊断者

每项选一个答案并相加。身高、体重建议使用测量值。

条目	选项	分值
年龄（岁）	40–44	**0**
	45–49	**1**
	50–54	**2**
	55–59	**3**
	60–64	**4**
	65–69	**5**
	70–74	**6**
	≥75	**7**
性别	女	**0**
	男	**2**
BMI（kg/m²）	<18.5	**3**
	18.5≤BMI<24.0	**1**
	24.0≤BMI<28.0	**0**
	≥28.0	**1**
吸烟暴露（包年）	0	**0**
	>0 且 ≤10	**1**
	>10 且 ≤20	**2**
	>20 且 ≤40	**2**
	>40	**3**
哮喘史	无	**0**
	有	**6**

BMI = 体重（kg）/ 身高（m）²；包年 = 每日平均吸烟支数 ÷ 20 × 吸烟年数。

戒烟者计入既往累积暴露；不同阶段吸烟量不同时，分别计算后相加。

总分：_____ 分（0–21 分）

总分 ≥3 分：筛查阳性，建议进一步肺功能检查。

本量表预测支气管舒张前气流受限，不能直接确诊慢阻肺。

低于阈值仍可能漏诊；有持续症状或临床疑虑时应进一步评估。

缺项不按 0 分处理；该版本尚需前瞻性实施验证。