

# Den naturlige logaritme og eksponentiel vækst

**Eksempel 1.1.** pH-værdien af en opløsning er defineret som

$$pH = -\log(a_{H^+}),$$

hvor  $a_{H^+}$  betegner hydrogenionaktiviteten.  $a_{H^+}$  er ca. stofmængdekonzentrationen af  $H^+$ -ioner i opløsningen. Hvis vi antager, at en opløsning har en stofmængdekonzentration på  $10^{-3} \text{ mol/L}$   $H^+$ -ioner. Så vil pH-værdien af opløsningen være (ca.)  $-\log(10^{-3}) = 3$ .

## Den naturlige logaritme

**Definition 1.2.** Den naturlige logaritme er den entydige funktion  $\ln$ , der opfylder, at

$$\ln(e^x) = x,$$

og

$$e^{\ln(x)} = x,$$

hvor  $e$  er Euler's tal. ( $e \approx 2.7182$ )

Funktionen  $e^x$  kaldes for den naturlige eksponentialfunktion, og vi vil senere beskrive den nærmere.

**Sætning 1.3** (Regneregler for  $\ln$ ). *For den naturlige logaritme  $\ln$  gælder der for  $a, b > 0$ , at*

$$i) \ln(a \cdot b) = \ln(a) + \ln(b),$$

$$ii) \ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b),$$

$$iii) \ln(a^x) = x \ln(a).$$

## Eksponentiel vækst

Vi vil hovedsagligt bruge logaritmebegrebet i forbindelse med eksponentiel vækst.

**Definition 1.4.** Hvis vi har en sammenhæng  $y = b \cdot a^x$  for konstanter  $a, b$ , så siges sammenhængen mellem  $x$  og  $y$  at være eksponentiel. En funktion  $f$  med forskriften

$$f(x) = b \cdot a^x$$

siges at være en eksponentiel funktion.

Eksponentiel vækst vokser ved at gange med fremskrivningsfaktoren  $a$  efter hver tidsenhed.

**Eksempel 1.5.** Lad os sige, at vi har en bakteriekoloni med ubegrænset næringsstof og plads, og lad os se på væksten af en enkelt bakterie i kolonien. Lad os sige, at den en gang per time deler sig i to. Så vil den efter 1 time være to bakterier, efter to timer være 4 bakterier, efter 3 timer være 8 bakterier osv. Efter hver time ganger vi altså bakterieantallet med 2. Antallet af bakterier  $B$  må derfor kunne beskrives som

$$B(t) = B_0 \cdot 2^t,$$

hvor  $t$  er tiden i timer, og  $B_0$  er antallet af bakterier til tid  $t = 0$ , da  $B(0) = B_0 2^0 = B_0$ . Dette er eksponentiel vækst, da  $a = 2$ , og  $b = B_0$ .

**Eksempel 1.6.** Vi tager et lån i banken og låner 100000kr. Banken giver os en månedlig rente på 1%. Efter hver måned skal vi altså gange med 1,01, og en model for mængden vi skylder, hvis vi ikke afdrager på lånet er

$$f(x) = 100.000 \cdot (1,01)^t,$$

hvor  $t$  er tiden efter vores lån i måneder. Efter 3 år vil vi derfor skyld

$$f(36) = 100.000 \cdot (1,01)^{36} \approx 143.000$$

## Opgave 1

- i) Hvad er pH-værdien for en opløsning med en  $H^+$ -koncentration på  $10^{-10}$ ?
- ii) Hvad er  $H^+$ -koncentrationen for en opløsning med pH-værdi 7,5?
- iii) En opløsning har volumen 500L og indeholder 1 mol  $H^+$ . Hvad er pH-værdien af opløsningen?

## Opgave 2

Løs følgende ligninger

1)  $\ln(x) = 1$

2)  $\ln(x) = e$

3)  $\ln(3x + 7) = 3$

4)  $\ln(x^2) = e^4$

## Opgave 3

Bestem følgende:

- |                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 1) $\ln(e)$        | 2) $\ln(e^3)$           |
| 3) $\ln(\sqrt{e})$ | 4) $\ln(\sqrt[5]{e^4})$ |

## Opgave 4

- i) En person låner 40000 som forbrugslån. Han skal betale 19% i årlig rente. Opstil en model for de penge han skylder som funktion af tiden målt i år, hvis han ikke afdrager på lånet. Hvornår skylder han 100.000?
- ii) En radioaktiv isotop har en halveringstid på 2 sekunder, og vi starter med et kilo af isotopen. Opstil en model for massen af isotopen som funktion af tiden målt i sekunder. Hvornår er der 10 gram tilbage? Hvornår er der 0?

## Opgave 5

- i) Bevis, at  $\ln(ab) = \ln(a) + \ln(b)$ .
- ii) Bevis, at  $\ln(\frac{a}{b}) = \ln(a) - \ln(b)$ .
- iii) Bevis, at  $\ln(a^x) = x \ln(a)$ .