

Mere sandsynlighed

Symmetrisk sandsynlighedsfordeling

Vi brugte sidste gang følgende sætning op til flere gange i de tilfælde, hvor vi havde et symmetrisk sandsynlighedsfelt.

Sætning 1.1. *Hvis vores udfaldsrum er endeligt og har symmetrisk fordeling, så gælder der for en hændelse A , at*

$$P(A) = \frac{\# \text{gunstige udfald}}{\# \text{mulige udfald}}.$$

Eksempel 1.2. Vi skal bestemme sandsynligheden for at slå et primtal, hvis vi slår med to terninger. Vi bruger Sætning 1.1, og skal altså afgøre, hvilke udfald, der er gunstige. Det er udfaldene 2, 3, 5, 7 og 11. Der er $6 \cdot 6$ mulige udfald for at slå med to terninger. Vi mangler kun kun at bestemme antallet af måder, vi kan slå hvert primtal.

- Vi kan slå en toer ved at slå (1,1).
- Vi kan slå en treer ved at slå (1,2) og (2,1).
- Vi kan slå en femmer ved at slå (1,4), (4,1), (2,3) og (3,2).
- Vi kan slå en syver ved at slå (1,6), (6,1), (2,5), (5,2), (4,3) og (3,4).
- Vi kan slå en ellever ved at slå (6,5) og (5,6).

Lægger vi alle disse lige sandsynlige udfald sammen, så får vi 15 gunstige udfald. Sandsynligheden for at slå et primtal med to terninger er derfor

$$P(\text{primtal}) = \frac{15}{36}.$$

Eksempel 1.3. Vi skal bestemme sandsynligheden for at to personer i klassen deler fødselsdag. I klassen er der 26 elever. Det vil vise sig, at det er lettere at bestemme sandsynligheden for at ingen personer deler fødselsdag. Vi antager, at alle dage er lige sandsynlige som fødselsdag (og ser derfor bort fra d. 29 februar og sæsonvise afvigelser), og bestemmer antallet af gunstige udfald. For den første persons fødselsdag har vi derfor 365 valg, den næste 364, så 363 osv. Antallet af gunstige udfald er derfor af multiplikationsprincippet

$$365 \cdot 364 \cdot 363 \cdots 340.$$

Antallet af mulige udfald for fødselsdage er 365^{26} . Derfor er sandsynligheden for at ingen personer deler fødselsdag givet ved

$$P(\text{ingen deler fødselsdag}) = \frac{365 \cdot 364 \cdots 340}{365^{26}} \approx 0.4$$

Det vil derfor sige, at sandsynligheden for, at mindst to deler fødselsdag er

$$P(\text{mindst to deler fødselsdag}) \approx 1 - 0.4 = 0.6.$$

Altså er der omtrent 60% sandsynlighed for at to i klassen deler fødselsdag.

Opgave 1

- i) En nummerplade består af to bogstaver og 5 tal. Hvor mange forskellige nummerplader findes der? Hvis nummerplader blev uddelt med symmetrisk fordeling, hvad er så sandsynligheden for at få en nummerplade, der har dine initialer?
- ii) Hvis tre personer i klassen skal vælges til at gøre rent, hvad er så sandsynligheden for, at det bliver dig og de to, der sidder ved siden af dig?
- iii) Hvad er sandsynligheden for, at mindst en i klassen deler din fødselsdato?

Opgave 2

I Netflix-serien *Squid Game* skal 16 deltagere krydse to broer bestående af hver 18 glaspaneler i det femte spil. De kan springe frem og tilbage mellem de to broer, men hver gang de træder frem til næste glaspanel, vil kun en af de to broers glaspanel kunne bære dem. Når de har passeret de 18 paneler, har de krydset broen og er i sikkerhed.

- i) Hvad er sandsynligheden for at den første person overlever?
- ii) Hvor mange personer skal der i gennemsnit bruges for at krydse broerne?
- iii) Hvor mange personer vil der i gennemsnit være tilbage, når de har krydset broerne?

Opgave 3

Du er med i game-showet *Let's Make a Deal*. I dette gameshow beder showets vært, Monty Hall, dig om at vælge en dør blandt tre døre. Bag to af dørene står en ged, og bag den sidste dør står en ny bil. Lad os for spillets skyld antage, at du godt vil vinde en bil, og ikke en ged. Du vinder den genstand, der står bag din valgte dør.

- i) Hvad er sandsynligheden for at vinde en bil?

Efter, at du har valgt en dør, åbner Monty en dør, hvor der står en ged bag. Du får nu valget mellem at blive på din valgte dør eller skifte mening.

- ii) Afgør, om du skal skifte mening eller blive stående for at maksimere sandsynligheden for, at du får en bil.
- iii) Hvad er sandsynligheden for at vinde en bil, hvis du skifter dør?
- iv) Hvad er sandsynligheden for at vinde en bil, hvis du ikke skifter dør?

Opgave 4

I poker får hver spiller uddelt en hånd på 5 kort (eller 7 kort).

- i) Hvor mange forskellige hænder er der i poker?
- ii) Hvis du har fem kort med samme kulør, så har du en flush. På hvor mange forskellige måder kan du få flush? Hvad er sandsynligheden for flush så?