1.e

Eksponentialfunktion gennen to punkter.

Topunktsformlen for ekspontialfunktioner

Har vi to punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) , så kan vi finde den entydige rette linje med ligning y = ax + b, der skærer gennem disse punkter ved brug af topunktsformlen. Vi kan tilsvarende finde en entydig eksponentialfunktion, der skærer gennem to punkter. Vi starter med at huske på, hvordan en eksponentialfunktion er defineret

Definition 1.1 (Eksponentialfunktion). Lad a, b > 0. Så kaldes en funktion f givet ved

$$f(x) = b \cdot a^x$$

for en eksponential funktion. Tallet b kaldes for begyndelses værdien og tallet a kaldes for fremskrivningsfaktoren.

Sætning 1.2. Givet to punkter (x_1, y_1) og (x_2, y_2) er der en entydig eksponential-funktion f givet ved

$$f(x) = b \cdot a^x,$$

hvis graf går gennem disse punkter. Fremskrivningsfaktoren a er givet ved

$$a = \sqrt[(x_2 - x_1)]{\frac{y_2}{y_1}}.$$

Skæringen med y-aksen b er givet ved

$$b = \frac{y_1}{a^{x_1}}.$$

Bevis. Vi skal bestemme en eksponentiel funktion

$$f(x) = b \cdot a^x,$$

der går gennem punkterne (x_1, y_1) og (x_2, y_2) . Vi må derfor have, at $y_1 = b \cdot a^{x_1}$ og $y_2 = b \cdot a^{x_2}$. Vi finder nu forholdet mellem y_2 og y_1 som

$$\frac{y_2}{y_1} = \frac{b \cdot a^{x_2}}{b \cdot a^{x_1}} \\ = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} \\ = a^{x_2 - x_1}.$$

1.e

Vi tager nu $x_2 - x_1$ 'te roden på begge sider af lighedstegnet.

$$\sqrt{(x_2-x_1)}\sqrt{\frac{y_2}{y_1}} = \sqrt{(x_2-x_1)}\sqrt{a^{x_2-x_1}} = a,$$

og vi har altså bestemt a, siden a > 0. Da vi ved, at $y_1 = b \cdot a^{x_1}$, så får vi ved at dividere igennem med a^{x_1} , at

$$\frac{y_1}{a^{x_1}} = \frac{b \cdot a^{x_1}}{a^{x_1}} = b,$$

og beviset er færdigt.

Bemærk, at vi gerne vil have, at punkterne ligger over x-aksen.

Eksempel 1.3. Vi skal bestemme den eksponentialfunktion, der går gennem (1, 2) og (3, 8). Vi bruger topunktsformlen for eksponentialfunktioner, og får

$$a = \sqrt[3-1]{\frac{8}{2}} = \sqrt[2]{4} = 2,$$

og

$$b = \frac{2}{2^1} = 1.$$

Den eksponentialfunktion, der går gennem disse punkter er derfor

$$f(x) = 1 \cdot 2^x = 2^x.$$

Opgave 1

Bestem de eksponentialfunktioner, der går gennem følgende par af punkter (Uden Maple)

1) (0,3), (1,6)

(2) (1,3), (3,27)

3) (1, 2), (3, 8)

4) (0,4), (3,8)

5) (1, e), $(3, e^3)$

6) (2,8), (4,32)

Opgave 2 (med Maple)

Vi har efter 3 år 6750kr på en konto og efter 7 år 7433kr på samme konto. Beløbet på kontoen kan beskrives ved eksponentiel vækst

- i) Bestem den eksponentialfunktion, der beskriver beløbet på kontoen efter x år.
- ii) Afgør, hvornår meget der står på kontoen efter 12 år.
- iii) Hvornår står der 10.000kr på kontoen?

Opgave 3 (med Maple)

Vi har placeret en radioaktiv isotop på en vægt. Den vejer til start 1 kg. Efter 10 dage vejer den 0.997kg. Henfaldet af isotopen antages at kunne beskrives ved eksponentiel vækst.

- i) Bestem den eksponentialfunktion, der beskriver vægten af den radioaktive isotop.
- ii) Hvor meget vejer isotopen efter en måned?
- iii) Hvornår er vægten af isotopen halveret?

Opgave 4 (med Maple)

En bakteriekoloni vokser med 5%hver time. Efter 8 timer er der i kolonien 1.3 mia bakterier.

- i) Bestem forskriften på den eksponentialfunktion, der beskriver antallet af bakterier i kolonien.
- ii) Hvad var begyndelsesværdien for eksponentialfunktionen?
- iii) Hvornår overstiger antallet af bakterier 3 mia.?

Opgave 5 (med Maple)

i) En eksponentialfunktion er givet ved

$$f(x) = b \cdot 1.3^x.$$

Udnyt, at f(2) = 7 til at bestemme b.

ii) En eksponentialfunktion er givet ved

$$g(x) = 0.743 \cdot a^x$$

Udnyt, at g(0.1) = 1.236 til at bestemme a.