
# Funktionstyper

## Sammensatte funktioner

En sammensat funktion er - som navnet hentyder til - funktioner, der er sat sammen. Mere præcist har vi en definition.

**Definition 1.1.** Har vi to funktioner  $f: A \to B$  og  $g: B \to C$ , så kan vi bestemme den sammensatte funktion af f og g som

Dette skrives også til tider  $g(f(x)) = g \circ f(x)$ . I dette tilfælde kaldes g for den indre funktion og f for den ydre funktion.



**Eksempel 1.2.** Lad f og g være givet ved henholdsvist

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ og } g(x) = 3 \cdot x.$$

Så er den sammensatte funktion f(g(x)) bestemt ved

$$f(g(x)) = \sqrt{3 \cdot x}.$$

Tilsvarende er den sammensatte funktion g(f(x)) bestemt ved

$$g(f(x)) = 3\sqrt{x}.$$

**Eksempel 1.3.** CO<sub>2</sub>-koncentrationen i en beholder kan tilnærmes ved  $f(x) = 10 \cdot x + 385$ , hvor f er i ppm (parts per million) og x er antallet af en bestemt type bakterier i mio. Antallet af bakterier (i mio.) i beholderen kan i et begrænset tidsinterval beskrives ved  $g(t) = 2 \cdot 1.07^t$ , hvor t beskriver tiden i timer. CO<sub>2</sub>-koncentrationen som funktion af tid kan derfor beskrives ved

$$f(g(t)) = 10 \cdot (2 \cdot 1.07^t) + 385 = 20 \cdot 1.07^t + 385.$$

## Stykvist definerede funktioner


En stykvist defineret funktion er en funktion, der er defineret på forskellige måder alt efter hvad x er.

**Eksempel 2.1.** Et taxafirma tager følgende pris for taxakørsel: De første to kilometer koster 10kr pr kilometer, de næste 5km koster 7 kr pr kilometer, og resten at afstanden koster taxaen 5kr pr kilometer. Vi kan definere prisen p(x) som en stykvist defineret funktion:

$$p(x) = \begin{cases} 10 \cdot x, & 0 \le x \le 2, \\ 7 \cdot x + 6, & 2 < x \le 7, \\ 5 \cdot x + 20, & 7 < x, \end{cases}$$

hvor x er antal kilometer kørt og p(x) er prisen i kr.

Grafen for p kan ses på Figur 1.



Figur 1: Pris for taxa som funktion af kørte km.


## Opgave 1

En stykvist defineret funktion f er givet ved

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 4, & \text{hvis } x < -2, \\ -4x + 12, & \text{hvis } x \ge 2. \end{cases}$$


- i) Bestem f(-2).
- ii) Bestem f(-5).
- iii) Løs ligningen f(x) = 0.

En stykvist defineret funktion f er givet ved følgende graf.



- i) Bestem f(4)
- ii) Bestem f(3)
- iii) Løs ligningen f(x) = 6

Bestem en forskrift for følgende stykvist definerede funktioner.




Følgende tre stykvist definerede funktioner er givet

$$f(x) = \begin{cases} x + 5, & \text{hvis } -3 \le x < -2, \\ -0.5x + 4, & \text{hvis } -2 \le x < 2. \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} -2x - 2, & \text{hvis } -5 < x \le 3, \\ x - 11, & \text{hvis } 3 < x < 5. \end{cases}$$

$$h(x) = \begin{cases} x + 5, & \text{hvis } -5 < x < -4, \\ x + 2, & \text{hvis } -4 \le x < 0, \\ -x + 7, & \text{hvis } 0 \le x < 2. \end{cases}$$



For følgende funktioner f og g, bestem så den sammensatte funktion f(g(x)) og g(f(g)).

$$f(x) = \sqrt{x} \text{ og } g(x) = x^2$$
  
 $f(x) = 2x^3 \text{ og } g(x) = 10x + 3$   
 $f(x) = \ln(x) \text{ og } g(x) = \frac{1}{x}$   
 $f(x) = \sqrt[10]{x} \text{ og } g(x) = x^{20}$ 

### Opgave 6

For  $f(x) = x^2$  og g(x) = 2x + 3 løs ligningen

$$f(g(x)) = 0.$$

#### Opgave 7

Bestem for følgende funktion den indre og ydre funktion

1) 
$$\sqrt{2x+1}$$

2) 
$$2^{x^2-7}$$

3) 
$$\frac{1}{-4x+12}$$

4) 
$$e^{2x-4}$$

$$5) \ln(2x)$$

6) 
$$\log_5(7x^2)$$

7) 
$$(x+10)^3$$

8) 
$$3^{\log_{10}(2x)+7}$$

#### Opgave 8

En stykvist defineret funktion f er givet ved

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{hvis } x \ge 0, \\ -x^2, & \text{hvis } x < 0. \end{cases}$$

- i) Bestem f(3).
- ii) Bestem f(-4).
- iii) Løs ligningen f(x) = -64.

Prisen for at rejse x kilometer med taxafirmaet taxA kan beskrives ved funktionen f givet ved

$$f(x) = \begin{cases} 20x + 50, & \text{hvis } x \le 8, \\ 16x + 82, & \text{hvis } 8 < x \le 15, \\ 12x + 142, & \text{hvis } 15 < x. \end{cases}$$

- i) Bestem prisen for at køre 10km med taxA.
- ii) Afgør, hvor langt man kan køre for 250 kr.
- iii) Tegn grafen for f i Maple og verificér dit svar fra i) og ii).