

Título de Plática: Primeros auxilios-Convulsiones.

Las convulsiones son episodios repentinos de actividad eléctrica anormal en el cerebro que provocan cambios físicos y conductuales. Estos episodios pueden variar en intensidad y duración, desde movimientos bruscos y pérdida de conciencia hasta episodios más sutiles, como miradas fijas o confusión breve.

Las convulsiones pueden tener múltiples orígenes. Entre los más comunes se encuentran:

- **Epilepsia:** la causa más frecuente y crónica.
- **Traumatismos craneales:** golpes en la cabeza que alteran la actividad cerebral.
- **Infecciones:** meningitis, encefalitis u otras infecciones del sistema nervioso central.
- **Trastornos metabólicos:** hipoglucemia, desequilibrio de electrolitos.
- **Fiebre elevada en niños pequeños:** convulsiones febriles.
- Consumo de drogas o abstinencia de alcohol.

Ante una crisis convulsiva, los pasos a seguir son claros y deben aplicarse con calma:

1. Mantener la calma y proteger a la persona: Coloca a la persona en un espacio seguro, retirando objetos duros o punzantes. Afloja la ropa ajustada, especialmente alrededor del cuello. No intentes sujetar sus movimientos; deja que el episodio siga su curso.

2. Colocar a la persona de lado: Apenas sea posible, pon a la persona en posición lateral de seguridad. Esto facilita la respiración y evita que se atragante con saliva, vómito o sangre en caso de mordida en la lengua.

3. Proteger la cabeza: Coloca algo blando (una prenda doblada, una mochila, una chaqueta) debajo de la cabeza para evitar lesiones por golpes contra el suelo.


4. Controlar el tiempo: Mide la duración de la convulsión. Si dura más de 5 minutos, se considera una emergencia médica (estatus epiléptico) y requiere asistencia inmediata.

5. No introducir nada en la boca: Es un mito peligroso pensar que hay que meter un objeto o los dedos para evitar que la persona “se trague la lengua”. Esto puede causar asfixia o fracturas dentales. La lengua no se “traga”.

6. No dar líquidos ni medicación: Nunca intentes dar agua, comida ni medicación durante la convulsión. Se debe esperar a que la persona recupere totalmente la conciencia.

Cuando la crisis finaliza, la persona suele entrar en una fase de confusión y cansancio extremo:

- Hablar con calma y explicar lo que ocurrió.
- Acompañar a la persona hasta que recupere la orientación.
- Evitar que se levante de golpe o realice actividades peligrosas, como conducir o manejar maquinaria.



¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 46823

Nombre: **Miguel Angel Antonio Falcón**

11/12/2025

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

