

Título de Plática:	Agentes cancerígenos en el trabajo
---------------------------	---

¿Qué son los agentes cancerígenos en la empresa?

Aunque los agentes cancerígenos más frecuentes en el medio laboral son sustancias químicas, como el benceno, los cromatos, el tricloroetileno, el polvo de madera y otros, también tienen efectos cancerígenos ciertos agentes físicos, como los rayos X o los rayos UV, y algunos agentes biológicos, como los virus de la hepatitis B y C.

Las sustancias pueden estar presentes en el trabajo tanto porque se usan como materia prima, como productos intermedios, subproductos o residuos que se generan o pueden generarse en el proceso laboral (trabajos de soldadura, humos diésel, polvo de madera, polvo de sílice, etc).

Es importante:

- Conocer los productos que utilices. La empresa debe disponer de un listado de productos presentes en cada lugar de trabajo, así como de una ficha de datos de seguridad de cada uno de ellos. En caso de duda, preguntar a tu responsable.

En el entorno laboral se han identificado los 8 compuestos con una mayor exposición entre los trabajadores susceptibles de provocar cáncer:

1. Radiación ultravioleta (UV) solar. Es el agente cancerígeno al que están expuestos más trabajadores, principalmente de sectores como la construcción o la agricultura. En estos sectores, sus trabajadores se encuentran expuestos a los rayos solares a lo largo de su jornada laboral, mientras realizan su actividad al aire libre y, por tanto, tienen un mayor riesgo a desarrollar cáncer de piel.
2. Componentes de los humos de combustión de motores diésel (entre otros). La generación de humos y otros productos derivados de la combustión puede provocar compuestos susceptibles de causar cáncer, principalmente de pulmón. Por colectivos, los trabajadores más expuestos serían los trabajadores del transporte por carretera, del mantenimiento de vehículos y de algunas actividades de la construcción.
3. Sílice cristalina. Componente natural que, además de encontrarse en las rocas y la arena, también se encuentra en materiales para la construcción, como el hormigón y el ladrillo. La exposición a partículas pequeñas de sílice que se encuentran en el aire, se asocian al cáncer de pulmón.

Existen varias vías por las que los agentes cancerígenos pueden afectar a nuestro organismo:

- Por inhalación: respirar gases o vapores (humos diésel, vapores gasolina, etc.), polvo (como la sílice) y nieblas (ácidos fuertes como el sulfúrico, entre otros).
- Por ingestión: comer o beber en el lugar de trabajo donde las manos, la comida o los cubiertos han estado en contacto con cancerígenos.
- Por absorción a través de la piel: contacto con sustancias cancerígenas.
- Por exposición a radiaciones ionizantes naturales (luz solar) o artificiales (rayos X).
- Por objetos punzantes, agujas contaminadas, etc.

¿Qué opinas del tema de hoy? ¿Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy? ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tu trabajo o en tu hogar?

IBM: 24269	Nombre: JOSÉ ANTONIO DÍAZ SOTO J.	Fecha: 17/10/2025
-------------------	--	--------------------------

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

