

Título de Plática: Después de comer, ¿por qué da sueño?

Todos hemos experimentado ese momento en el que después de una comida, nos invade una sensación irresistible de dormir. Pero **¿alguna vez te has preguntado por qué ocurre este fenómeno de sueño?** La respuesta no es tan simple como podrías pensar.

Esta sensación de somnolencia coloquialmente en México se le llama el “**mal del puerco**”, y formalmente se denomina **somnolencia postprandial** (del latín *post*, después, y *prandium*, almuerzo o comida).



Los expertos y autoridades de salud coinciden que la somnolencia postprandial puede atribuirse a varios factores, uno de los cuales es la redistribución de la sangre. **Después de comer**, una gran parte de la sangre se desplaza hacia los vasos sanguíneos del sistema gastrointestinal para ayudar en la digestión y absorción de nutrientes. Esta redistribución puede resultar en una disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que provoca una sensación de **cansancio y somnolencia**.

Otra causa importante es la **elección de alimentos**. Consumir comidas altas en azúcares puede causar un aumento rápido en los niveles de glucosa en sangre, desencadenando la liberación de insulina. Esta hormona facilita la entrada de triptófano en el cerebro, un aminoácido precursor de la serotonina, que regula el ciclo sueño-vigilia. Como resultado, podemos experimentar una disminución en el estado de alerta y sentirnos más somnolientos.



Además, **el tamaño y la composición de la comida** pueden influir en la somnolencia postprandial. Comer en exceso o consumir alimentos pesados y difíciles de digerir puede requerir más energía por parte del cuerpo, lo que puede provocar una sensación de fatiga y sueño después de la comida.

Los **síntomas** de somnolencia postprandial son, precisamente, sueño después de comer, pesadez en el cuerpo, cansancio, poca concentración y hasta confusión. Como consecuencia de la somnolencia generada, las personas suelen tener un **menor desempeño en la resolución de tareas** (tanto ejecutivas como físicas), registrar un déficit en el desempeño laboral y estar **propensas a accidentes**.

Para contrarrestar la somnolencia postprandial, se recomienda:

- Evitar alimentos altos en azúcares o grasas.
- Mantenerse ocupado después de comer, como agregar un poco de actividad física como una caminata corta.
- Tomar un café americano chico.

De cualquier forma, es necesario que, si sufres constantemente de somnolencia postprandial, consultes a tu médico para descartar cualquier trastorno o enfermedad.



¿Qué opinas del tema de hoy? ¡Comparte alguna experiencia similar al tema de hoy! ¿Puedes prevenir algún riesgo similar en tú trabajo o en tu hogar?

IBM: 51976

Nombre: César Javier Bibó Pérez

Fecha: 29-11-2024

Recuerda **vivir** las
TRES RESPONSABILIDADES de
seguridad y **cumple**
constantemente las
10 REGLAS CRÍTICAS

