

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICA

ÁLGEBRA MODERNA I

Apuntes Álgebra Moderna I

Profesor:

Escobar Gracia Cé-
sar Alberto

Alumnos:

Ramírez León Christian Yael
Silva Sierra Joshua Joaquín

5FM1

4 de enero de 2026

Índice general

1. Conceptos Previos	1
1.1. Divisibilidad	1
1.2. Cardinalidad de conjuntos	2
1.3. Enteros Módulo n	4
1.4. Función φ de Euler	5
2. Grupos	7
2.1. Grupos	7
2.2. Subgrupos	10
2.3. Grupo de permutaciones	15
2.4. Grupo Cociente	16
2.4.1. Producto de subgrupos	16
2.4.2. Clases laterales	17
2.4.3. Grupo cociente	24
3. Homomorfismos e Isomorfismos	27
3.1. Definición isomorfismo	27
3.2. Teoremas de isomorfismo	29
3.3. Grupo cíclicos	33
4. Productos Directos y el Grupo Simétrico S_n	37
4.1. Productos Directos	37
4.1.1. Teorema Chino del Residuo	38
4.1.2. Teorema de Cayley	39
4.2. El grupo Simétrico S_n	42
5. Acciones de Grupos	59
5.1. Acciones de Grupo	59
5.1.1. Teorema de Cauchy	67
5.2. Grupos Sylow	71
6. Automorfismos de Grupos	77
6.1. Automorfismos de Grupos	77
6.2. Grupos Abelianos Finitos	90

6.3. Solubilidad y Nilpotencia	96
--	----

CAPÍTULO 1

Conceptos Previos

1.1. Divisibilidad

Definición 1.1.1 (Divisibilidad). Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $a \neq 0$, se dice que $a|b$ si $\exists k \in \mathbb{Z}$ tal que $b = ak$.

Definición 1.1.2 (Máximo Común Divisor). Sea $a, b \in \mathbb{Z}$, al menos uno distinto de cero, definimos a $d \in \mathbb{Z}$ un máximo común divisor de a y b , denotado por (a, b) , si cumple:

- I) $d > 0$.
- II) $d|a$ y $d|b$.
- III) Si $c|a$ y $c|b$, entonces $c|d$.

Proposición 1.1.1 (Propiedades de la Divisibilidad). Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$, con $a, b \neq 0$, entonces:

- I) Si $a|b$ y $b|c$, entonces $a|c$.
- II) Si $a|b$ y $a|c$, entonces $a|(b + c)$.
- III) Si $a|b$, entonces $a|bk$ para todo $k \in \mathbb{Z}$.
- IV) Si $a|b$ y $b \neq 0$, entonces $|a| \leq |b|$.
- V) Si $a|b$ y $b|a$, entonces $a = \pm b$.
- VI) Si $a|b$, entonces $(a, b) = |a|$.
- VII) Si $c|a$ y $c|b$, entonces $c = ax + by$ para algunos $x, y \in \mathbb{Z}$.

Proposición 1.1.2. Sea $a, b \in \mathbb{Z}$, al menos uno distinto de cero, entonces existe un único máximo común divisor de a y b .

Teorema 1.1.1 (Algoritmo de la división). Sean $a, b \in \mathbb{Z}$, con $b > 0$, entonces existen únicos $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < |b|.$$

1.2. Cardinalidad de conjuntos

Dado un conjunto A , se denotará su cardinalidad (número de elementos) como $|A|$. Si A es un conjunto finito, entonces $|A|$ es un número natural. Si A es infinito, entonces $|A| = \infty$.

Observación 1.2.1. Sean A, B , conjuntos finitos, con $B \subseteq A$. Entonces:

$$|A \setminus B| = |A| - |B|$$

Demostración.

basta notar que $B \cup (A \setminus B) = A$ y que $B \cap (A \setminus B) = \emptyset$, luego $|A| = |B \cup (A \setminus B)| = |B| + |A \setminus B|$, así $|A \setminus B| = |A| - |B|$. $\square$

Observación 1.2.2. Sean A y B dos conjuntos finitos, entonces:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Demostración.

Sean A y B conjuntos finitos, note que:

$$A \cup B = (A \setminus (A \cap B)) \cup (B \setminus (A \cap B)) \cup (A \cap B)$$

Además: $(A \setminus (A \cap B))$, $(B \setminus (A \cap B))$, $(A \cap B)$, son disjuntos, más aún:

$$|A \setminus (A \cap B)| = |A| - |A \cap B|$$

$$|B \setminus (A \cap B)| = |B| - |A \cap B|$$

Así:

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |A \setminus (A \cap B)| + |B \setminus (A \cap B)| + |A \cap B| \\ &= |A| - |A \cap B| + |B| - |A \cap B| + |A \cap B| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| \end{aligned}$$

$\square$

Proposición 1.2.1 (Principio de inclusión exclusión). Sean $A_1, \dots, A_n$ conjuntos finitos, se tiene:

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} |A_{i_1} \cap A_{i_2}| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap \dots \cap A_n|$$

Observación 1.2.3. Suponga que C_1 es la condición que cumplen los elementos A y C_2 los de B , es decir:

$$A = \{x \in \Omega : x \text{ cumple } C_1\}$$

$$B = \{x \in \Omega : x \text{ cumple } C_2\}$$

Denotemos $N(C_i)$ a la cantidad de elementos que cumplen C_i , $N(C_1, C_2)$ a los que cumplen ambas, $N(\bar{C}_i)$ a los que no cumplen y $N(\bar{C}_1, \bar{C}_2)$ los que no cumplen C_1 ni C_2 , entonces:

$$N(\bar{C}_1, \bar{C}_2) = |\Omega| - (N(C_1) + N(C_2) - N(C_1, C_2))$$

Demostración.

Note que:

$$\begin{aligned} N(\bar{C}_1, \bar{C}_2) &= |A^c \cap B^c| = |(A \cup B)^c| = |\Omega \setminus (A \cup B)| = |\Omega| - |A \cup B| \\ &= |\Omega| - (|A| + |B| - |A \cap B|) \\ &= |\Omega| - (N(C_1) + N(C_2) - N(C_1, C_2)) \end{aligned}$$

□

Ejemplo 1.1. Sea $\Omega = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 1000\}$ ¿Cuántos enteros de estos no son divisibles por 3 o 5?

Sol. Consideremos:

$C_1 : x$ sea divisible por 3

$C_2 : x$ sea divisible por 5

Así $N(C_1) = 333$, $N(C_2) = 200$, $N(C_1, C_2) = 66$.

Luego:

$$\begin{aligned} N(\bar{C}_1, \bar{C}_2) &= |\Omega| - (N(C_1) + N(C_2) - N(C_1, C_2)) \\ &= 1000 - (333 + 200 - 66) \\ &= 533 \end{aligned}$$

Sea $A_1, \dots, A_n$ una colección finita de conjuntos finitos, definidos:

$$A_i = \{x \in \Omega : x \text{ cumpla } C_i\}, \quad C_i \text{ condición.}$$

Definamos de este modo:

$$\begin{aligned}
 S_1 &= N(C_1) + \cdots + N(C_n) \\
 S_2 &= N(C_1, C_2) + \cdots + N(C_1, C_n) + N(C_2, C_3) + \cdots + N(C_{n-1}, C_n) \\
 &\vdots \\
 S_i &= \sum_{1 \leq j_1 < \cdots < j_i \leq n} N(C_{j_1}, \dots, C_{j_i}) \\
 &\vdots \\
 S_n &= N(C_1, \dots, C_n)
 \end{aligned}$$

Por el principio de inclusión exclusión generalizado:

$$N(\bar{C}_1, \dots, \bar{C}_n) = |\Omega| - (S_1 - S_2 + \cdots + (-1)^{n-1} S_n)$$

1.3. Enteros Módulo n

Definición 1.3.1. Sea $n \in \mathbb{Z}$, $n > 1$, se define la relación de $a \sim b$ si y sólo si $n \mid (a - b)$, es decir, a es congruente con b módulo n .

Es fácil ver que esta es una relación de equivalencia en $\mathbb{Z}$. Ahora, definamos en el conjunto cociente $(\mathbb{Z}/\sim)$ las siguientes operaciones:

$$\begin{aligned}
 \bar{a} + \bar{b} &= \overline{a + b} \\
 \bar{a} \cdot \bar{b} &= \overline{a \cdot b}
 \end{aligned}$$

Con $a, b \in \mathbb{Z}$. Entonces las operaciones están bien definidas, es decir, no dependen del representante de clase.

Demostración.

sea $\bar{a} = \bar{a}_1$, $\bar{b} = \bar{b}_1 \iff a \sim a_1$ y $b \sim b_1 \iff n \mid (a - a_1) \wedge n \mid (b - b_1)$.

Esto implica:

$$n \mid (a - a_1) + (b - b_1) = (a + b) - (a_1 + b_1) \iff (a + b) \sim (a_1 + b_1) \iff \overline{a + b} = \overline{a_1 + b_1}$$

Análogamente para el producto.

□

Al conjunto de clases de equivalencia módulo n junto con las operaciones definidas se les denotará por $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ o $\mathbb{Z}_n$.

1.4. Función φ de Euler

Definición 1.4.1 (Función φ de Euler). *Definimos la función $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ como:*

$$n \mapsto |\{a \in \mathbb{N} : (a, n) = 1 \wedge a \leq n\}|$$

Proposición 1.4.1. *Sean $p, q \in \mathbb{Z}^+$ primos distintos:*

- I) $\varphi(p) = p - 1$
- II) $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p - 1), \quad k \in \mathbb{N}$
- III) $\varphi(p^k q^t) = \varphi(p^k) \cdot \varphi(q^t), \quad k, t \in \mathbb{N}$

Demostración.

I) Es evidente.

II) Sea $\Omega = \{x \in \mathbb{N} : x \leq p^k\}$, sea $a \in \Omega$ tal que $(a, p^k) \neq 1$.

Así $(a, p) \neq 1$, más aún $a = pl$ para algún $l \in \mathbb{N}$. Luego, como $a \in \Omega$, $a = pl \leq p^k$, por lo cual $l \leq p^{k-1}$. De este modo:

$$|\{a \in \Omega : p \mid a\}| = |\{a \in \Omega : a = pl, l \in \mathbb{N}\}| = |\{l \in \mathbb{N} : l \leq p^{k-1}\}| = p^{k-1}$$

Ahora:

$$\begin{aligned} \varphi(p^k) &= |\{a \in \Omega : (a, p^k) = 1\}| \\ &= |\Omega| - |\{a \in \Omega : p \mid a\}| \\ &= p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p - 1) \end{aligned}$$

III) Consideremos $\Omega = \{x \in \mathbb{N} : x \leq p^k q^t, k, t \in \mathbb{N}\}$, $A = \{a \in \Omega : p \mid a\}$ y $B = \{b \in \Omega : q \mid b\}$.

Ahora $A \cap B = \{a \in \Omega : p \mid a \wedge q \mid a\}$. Note que de manera análoga a ii), tenemos:

$$|A| = p^{k-1} q^t, \quad |B| = p^k q^{t-1}$$

Por otro lado si $a \in A \cap B$, tenemos $p \mid a \wedge q \mid a \implies \exists l \in \mathbb{N}$ tal que $a = pql$. Además como $pql = a \leq p^k q^t$, se sigue que $l \leq p^{k-1} q^{t-1}$, por lo cual:

$$|A \cap B| = p^{k-1} q^{t-1}$$

Por último, sabemos que $\varphi(p^k q^t) = |\{a \in \Omega : (a, p^k q^t) = 1\}|$. Por la proposición 1.2.1 tenemos:

$$\begin{aligned}\varphi(p^k q^t) &= |\Omega| - (|A| + |B| - |A \cap B|) \\ &= p^k q^t - p^{k-1} q^t - p^k q^{t-1} + p^{k-1} q^{t-1} \\ &= q^t (p^k - p^{k-1}) - q^{t-1} (p^k - p^{k-1}) \\ &= (p^k - p^{k-1})(q^t - q^{t-1}) \\ &= [p^{k-1}(p - 1)][q^{t-1}(q - 1)] \\ &= \varphi(p^k) \cdot \varphi(q^t)\end{aligned}$$

□

Proposición 1.4.2. Sean $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{N}$ primos distintos, sean $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:

$$\begin{aligned}\varphi(p_1^{k_1} \dots p_n^{k_n}) &= p_1^{k_1} \dots p_n^{k_n} \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right) \\ &= \varphi(p_1^{k_1}) \dots \varphi(p_n^{k_n})\end{aligned}$$

Demostración.

Falta demostrar.

□

Observación 1.4.1. Observe que dados $n, m \in \mathbb{N}$, tales que $(m, n) = 1$, entonces:

$$\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$$

Demostración.

Por el teorema fundamental de la aritmética, podemos expresar $n = p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l}$, $m = q_1^{t_1} \dots q_r^{t_r}$, con $p_1, \dots, p_l, q_1, \dots, q_r \in \mathbb{N}$ primos distintos y $k_1, \dots, k_l, t_1, \dots, t_r \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, así:

$$\begin{aligned}\varphi(n \cdot m) &= \varphi(p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l} q_1^{t_1} \dots q_r^{t_r}) \\ &= \varphi(p_1^{k_1} \dots p_l^{k_l}) \cdot \varphi(q_1^{t_1} \dots q_r^{t_r}) \\ &= \varphi(n) \cdot \varphi(m)\end{aligned}$$

□

CAPÍTULO 2

Grupos

2.1. Grupos

Definición 2.1.1 (Grupo). *Un grupo es un conjunto no vacío G junto con una operación $\circ : G \times G \rightarrow G$, que satisface:*

- I) *Asociatividad:* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c \quad \forall a, b, c \in G$
- II) *Elemento neutro:* $\exists e \in G : a \circ e = a \quad \forall a \in G$
- III) *Inverso:* $\forall a \in G \quad \exists b \in G : a \circ b = e$

Se denota a esta estructura: $(G, \circ, e)$, en caso de no conocer la identidad $(G, \circ)$. Además, para facilitar la notación el inverso de a elemento de un grupo se denota como a^{-1} .

Ejemplo 2.1. *Sea $\mathbb{Z}$, y la suma usual en los números enteros, es claro que es un grupo.*

Ejemplo 2.2. $(\mathbb{R}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{C}, +)$ son grupos.

Ejemplo 2.3. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ es un grupo.

Demostración.

Anteriormente se había probado que $+$ es cerrado y está bien definida $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a + b}$.

- I) $+$ es asociativa, pues:

$$\bar{a} + \overline{(b + c)} = \overline{a + (b + c)} = \overline{(a + b) + c} = \overline{(a + b)} + \bar{c}$$

- II) Note que la identidad es $\bar{0}$, ya que:

$$\bar{a} + \bar{0} = \overline{a + 0} = \bar{a} \quad \forall \bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$$

III) Ahora dado $\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, note que $a + (-a) = 0$, luego:

$$\begin{aligned}\overline{a + (-a)} &= \bar{0} \\ \bar{a} + \overline{(-a)} &= \bar{0}\end{aligned}$$

$$\text{Así } \forall \bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad \exists \overline{(-a)} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \bar{a} + \overline{(-a)} = \bar{0}.$$

□

Ejemplo 2.4. Sean A un conjunto no vacío, sea V un espacio vectorial, sea $\mathcal{H}$ el conjunto de funciones $f : A \rightarrow V$, definamos la operación suma sobre $\mathcal{H}$ como:

$$\begin{aligned}+ : \mathcal{H} \times \mathcal{H} &\rightarrow \mathcal{H} \\ (f + g)(a) &\mapsto f(a) + g(a) \quad \forall a \in A\end{aligned}$$

Demostración.

note:

I) Sean $f, g, h \in \mathcal{H}$, sea $a \in A$:

$$\begin{aligned}[(f + g) + h](a) &= (f + g)(a) + h(a) \\ &= (f(a) + g(a)) + h(a) \\ &= f(a) + (g(a) + h(a)) \\ &= f(a) + (g + h)(a) \\ &= [f + (g + h)](a)\end{aligned}$$

$$\therefore (f + g) + h = f + (g + h)$$

II) Tenemos $\underline{0} \in \mathcal{H}$, definida por: $\underline{0}(a) = 0 \quad \forall a \in A$, sea $f \in \mathcal{H}$, sea $a \in A$,

$$(f + \underline{0})(a) = f(a) + \underline{0}(a) = f(a) + 0 = f(a)$$

Así $f + \underline{0} = f$, es decir $\underline{0}$ es el elemento neutro.

III) Sea $f \in \mathcal{H}$, sea $a \in A$, note que existe $-f(a)$, tal que:

$$f(a) + (-f(a)) = 0 \quad \forall a \in A,$$

entonces $-f$ es inverso de f .

□

Ejemplo 2.5. Sea V un espacio vectorial real, entonces $(V, +)$ es un grupo.

Ejemplo 2.6. $(\mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{R}), +)$ es un grupo.

Ejemplo 2.7. Sea $GL_{(n)}(\mathbb{R}) = \{A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \det(A) \neq 0\}$, con el producto de matrices forma un grupo.

Ejemplo 2.8. Considere $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sea $G \subseteq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, el conjunto

$$G = \{\bar{a} : (a, n) = 1\}$$

entonces $(G, \cdot)$ con la op. definida por el producto de clases es un grupo.

Demostración.

Note:

$$\text{I) } \forall \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in G, \quad \bar{a}(\bar{b} \cdot \bar{c}) = \bar{a}(\overline{b \cdot c}) = \overline{a(b \cdot c)} = \overline{(ab)c} = \overline{(ab)} \cdot \bar{c} = (\bar{a}\bar{b})\bar{c}.$$

$$\text{II) } \bar{1} \in G, \text{ pues } (1, n) = 1, \text{ además } \forall \bar{a} \in G \quad \bar{a} \cdot \bar{1} = \bar{a}.$$

III) Sea $\bar{a} \in G$, entonces $(a, n) = 1$, por tanto $\exists x, y \in \mathbb{Z}$, tal que:

$$ax + ny = 1$$

Tomando la clase:

$$\bar{1} = \overline{ax + ny} = \overline{ax} + \overline{ny} = \bar{a}\bar{x} + \bar{n}\bar{y} = \bar{a}\bar{x} + \bar{0}\bar{y} = \bar{a}\bar{x} + \bar{0} = \bar{a}\bar{x}$$

es decir existe $\bar{x} \in G$, tal que $\bar{a} \cdot \bar{x} = 1$.

□

Definición 2.1.2 (Grupo abeliano). Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, si cumple que $a \circ b = b \circ a \quad \forall a, b \in G$, diremos que es un grupo abeliano.

Ejemplo 2.9. $(\mathbb{Z}, +, 0)$ es abeliano.

Ejemplo 2.10. $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \bar{0})$ es abeliano.

Ejemplo 2.11. $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \cdot, \bar{1})$ es abeliano.

Proposición 2.1.1. Sea $(G, \circ)$ un grupo, sea $g \in G$ tal que $g \circ g = g$ entonces $g = e$.

Demostración.

Como $g \in G \implies \exists g' \in G$ tal que $g \circ g' = e$, luego:

$$g = g \circ e = g \circ (g \circ g') = (g \circ g) \circ g' = g \circ g' = e$$

□

Proposición 2.1.2. Sea $(G, \circ)$ grupo, $g \in G$, entonces:

$$g^{-1} \circ g = g \circ g^{-1} = e$$

Demostración.

Consideremos:

$$(g^{-1} \circ g) \circ (g^{-1} \circ g) = (g^{-1} \circ (g \circ g^{-1})) \circ g = (g^{-1} \circ e) \circ g = g^{-1} \circ g$$

Luego por la prop. anterior:

$$g^{-1} \circ g = e, \quad \text{es decir } g \circ g^{-1} = g^{-1} \circ g = e$$

□

Proposición 2.1.3. *Si $(G, \circ)$ es un grupo y $g \in G$, entonces:*

$$e \circ g = g \circ e = g$$

Demostración.

Es claro que:

$$e \circ g = (g \circ g^{-1}) \circ g = g \circ (g^{-1} \circ g) = g \circ e = g = g \circ e$$

□

Proposición 2.1.4. *Sea $(G, \circ)$ un grupo, el elemento neutro e , es único.*

Demostración.

Supongamos que existe $e' \in G$ tal que $g \circ e' = g$, $\forall g \in G$, en particular:

$$e = e \circ e' = e' \circ e = e', \quad \text{es decir } e \text{ es único.}$$

□

Ejemplo 2.12. *Sea $G_1 = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sea $G_2 = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : (a, n) = 1\}$, entonces se tienen los grupos: $(G_1, +, \bar{0})$, $(G_2, \cdot, \bar{1})$, es claro que no son iguales ya que: $|G_1| = n$, $|G_2| = \varphi(n)$.*

Proposición 2.1.5. *Si $(G, \circ)$ es un grupo y $g \in G$, entonces g^{-1} es único.*

Demostración.

Suponga $g' \in G$ tal que $g \circ g' = e$, entonces:

$$g^{-1} = g^{-1} \circ e = g^{-1} \circ (g \circ g') = (g^{-1} \circ g) \circ g' = e \circ g' = g'$$

□

2.2. Subgrupos

Definición 2.2.1 (Subgrupo). *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $H \subseteq G$ un subconjunto de G , diremos que H es un subgrupo de G , si con la misma operación $\circ$, definida en G , forma un grupo. Se denotará $H \leq G$.*

Ejemplo 2.13. Sea $(G = \mathbb{Z}, +, 0)$, para algún $a \in \mathbb{Z}$, definamos:

$$H_a = \{t \in \mathbb{Z} : t = na, n \in \mathbb{Z}\}$$

entonces $(H_a, +, 0)$ es un subgrupo de G .

Demostración.

Claramente $H_a \subseteq G$, además $+$ es cerrada en H_a , pues si $n_1a, n_2a \in H_a \implies n_1a + n_2a = (n_1 + n_2)a \in H_a$.

- I) $+$ es asociativa, porque hereda la asociatividad de G .
- II) $0 \in H_a$, ya que $0 = 0 \cdot a \in H_a$, además $na + 0 = na \quad \forall na \in H_a$.
- III) Si $na \in H_a$, como $n \in \mathbb{Z} \implies -n \in \mathbb{Z}$, así $\exists -na \in H_a \implies na + (-na) = 0$.

□

Ejemplo 2.14. Sea $SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in GL_n(\mathbb{R}) : \det A = 1\}$, entonces $SL_n(\mathbb{R}) \leq GL_n(\mathbb{R})$, este es llamado el grupo especial lineal.

Observación 2.2.1. Sea $(G, \circ, e)$ grupo, sea $H \leq G$, entonces $e \in H$.

Demostración.

como $H \neq \emptyset$, $\exists g \in H$, además $\exists g^{-1} \in H$ al ser un subgrupo, así:

$$g \circ g^{-1} = e, \quad \text{es decir } e \in H.$$

□

Proposición 2.2.1. Si $(G, \circ, e)$ es un grupo y $\{H_\lambda\}_{\lambda \in I}$ es una colección arbitraria de subgrupos, entonces:

$$\bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda, \text{ es un subgrupo de } G.$$

Demostración.

Como $H_\lambda \leq G \quad \forall \lambda \in I$, $\bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda \neq \emptyset$ pues $e \in H_\lambda \quad \forall \lambda \in I$. Sean $a, b \in \bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$, entonces $a, b \in H_\lambda \quad \forall \lambda \in I$, además $\circ$ es cerrada en $\bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$, ya que $a \circ b \in H_\lambda \quad \forall \lambda \in I$, así $a \circ b \in \bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$. Luego:

- I) $\circ$ es asociativa en $\bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$, ya que es asociativa en $H_\lambda, \forall \lambda \in I$.
- II) $e \in \bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$.
- III) Dado que $a \in \bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$, entonces $a \in H_\lambda \forall \lambda \in I$, así $\exists a^{-1} \in H_\lambda \forall \lambda \in I$ tal que $a \circ a^{-1} = e$, luego $a^{-1} \in \bigcap_{\lambda \in I} H_\lambda$.

□

Proposición 2.2.2. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sean $H, K \leq G$, entonces $H \cup K$ es un subgrupo de G si y sólo si $H \subseteq K \vee K \subseteq H$.

Demostración.

Será demostrada primero la reciprocidad.

$(\Leftarrow)$ Basta notar que si $H \subseteq K$, $H \cup K = K$ y $K \leq G$, así $H \cup K \leq G$. Análogo si $K \subseteq H$.

$(\Rightarrow)$ Sea $H \cup K \leq G$. Supongamos que $H \not\subseteq K \wedge K \not\subseteq H$, sean $a \in H \setminus K$ y $b \in K \setminus H$. Sea $c = a \circ b$. Como $H \cup K \leq G$, entonces $c \in H \cup K$, así $c \in H \vee c \in K$.

Si $c \in H \implies a^{-1} \circ c = b \in H$, lo cual no puede ser (pues $b \in K \setminus H$). Si $c \in K \implies c \circ b^{-1} = a \in K$, lo cual no puede ser (pues $a \in H \setminus K$).

Por lo cual $H \subseteq K \vee K \subseteq H$. □

Definición 2.2.2 (Orden de un grupo). Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, el orden del grupo será la cardinalidad de G y se denota $|G|$.

Definición 2.2.3. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, diremos que es un grupo finito si G es un conjunto finito. En caso contrario se le dice infinito.

Definición 2.2.4. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $S \subseteq G$, con $S \neq \emptyset$, el grupo generado por S en G denotado por $\langle S \rangle$ es el menor de los subgrupos que lo contiene, es decir:

$$\langle S \rangle = \bigcap_{\substack{S \subseteq H \\ H \leq G}} H$$

Si S es finito, y sea $H = \langle S \rangle$, diremos que H es finitamente generado.

Ejemplo 2.15. Todo subgrupo finito de G es finitamente generado, más aún, si $H \leq G$ y es finito $\langle H \rangle = H$.

Demostración.

Dado que:

$$\langle H \rangle = \bigcap_{\substack{H' \leq G \\ H \subseteq H'}} H' \quad \forall H' \leq G \text{ tales que } H \subseteq H',$$

además como $H \leq G$ y $H \subseteq H$, entonces H es uno de los términos de la intersección, así:

$$\langle H \rangle \subseteq H \wedge H \subseteq \bigcap_{\substack{H' \leq G \\ H \subseteq H'}} H' = \langle H \rangle$$

Por lo tanto $\langle H \rangle = H$. □

Ejemplo 2.16. $(\mathbb{Z}, +, 1)$ es finitamente generado, basta notar que:

$$\mathbb{Z} = \langle \{1\} \rangle$$

Ejemplo 2.17. $(\mathbb{Q}, +, 1)$, $\mathbb{Q}$ no es finito ni es finitamente generado.

Proposición 2.2.3. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, $H \subseteq G$ no vacío, entonces las cond. son equivalentes:

- I) $H \leq G$
- II) $\forall x, y \in H$ se tiene que $x \circ y \in H \wedge x^{-1} \in H$.
- III) $\forall x, y \in H$ se tiene que $x \circ y^{-1} \in H$.

Demostración.

Se probarán las implicaciones en ciclo.

- I $\Rightarrow$ II) Se sigue de la definición ya que la operación en G debe ser una operación en H , además de que si H es un subgrupo $\forall x \in H \Rightarrow \exists x^{-1} \in H$.
- II $\Rightarrow$ III) Si $x, y \in H$ por ii) $y^{-1} \in H$, luego $x \circ y^{-1} \in H$ (por ii).
- III $\Rightarrow$ I) Sea $x \in H$, entonces $x \circ x^{-1} = e$, luego, note que si $x \in H$ entonces $x^{-1} = e \circ x^{-1} \in H$.

Ahora probemos que la operación es cerrada: sea $x, y \in H$, entonces $y^{-1} \in H$, más aún $(y^{-1})^{-1} = y$, ya que $y^{-1} \circ y = y^{-1} \circ (y^{-1})^{-1} = e$ y por la unicidad del inverso $(y^{-1})^{-1} = y$. Por lo cual $x \circ y = x \circ (y^{-1})^{-1} \in H$, por lo tanto la operación es cerrada en H .

□

Observación 2.2.2. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sean $a, b \in G$ entonces:

$$(a \circ b)^{-1} = b^{-1} \circ a^{-1}$$

Demostración.

En efecto:

$$(a \circ b)(b^{-1} \circ a^{-1}) = a(b \circ b^{-1}) \circ a^{-1} = (a \circ e) \circ a^{-1} = a \circ a^{-1} = e$$

Por la unicidad del inverso se sigue $b^{-1} \circ a^{-1} = (a \circ b)^{-1}$.

□

Cuando no haya pérdida de generalidad para facilitar la escritura de la operación $\circ$ en un grupo G , se denotará expresará como el producto, es decir: $a \circ b := ab$. Además, se podrá expresar la potencia de un elemento $a \in G$ como:

$$a^n = \underbrace{a \cdots a}_{n\text{-veces}}$$

para $n \in \mathbb{Z}^+$. Si $n = 0$, $a^0 = e$ y podemos observar que $a^{-n} = (a^n)^{-1}$ para $n \in \mathbb{N}$.

Observación 2.2.3. Si $S \neq \emptyset$, es un subconjunto de un grupo G , entonces:

$$\langle S \rangle = \{s_1^{i_1} \cdots s_n^{i_n} : s_j \in S, i_j = \pm 1, j = 1, \dots, n, n \in \mathbb{N}\}$$

Demostración.

Sea $H = \{s_1^{i_1} \dots s_n^{i_n} : s_i \in S, i_j = \pm 1, j = 1, \dots, n, n \in \mathbb{N}\}$. Sean $s, t \in H$, tales que $s = s_1^{i_1} \dots s_n^{i_n}$, $t = t_1^{j_1} \dots t_m^{j_m}$, con $s_1, \dots, s_n, t_1, \dots, t_m \in S$, $i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_m \in \{1, -1\}$. Notemos que:

$$st^{-1} = s_1^{i_1} \dots s_n^{i_n} (t_1^{j_1} \dots t_m^{j_m})^{-1} = s_1^{i_1} \dots s_n^{i_n} t_m^{-j_m} \dots t_1^{-j_1} \in H$$

Así por la proposición 2.2.3 $H \leq G$, así $\langle S \rangle \subseteq H$. Ahora sea $N \leq G$, tal que $S \subseteq N$, es claro que $s \in N$ (cualquier elemento de esa forma está en N), así $H \subseteq N$, así $H = \langle S \rangle$. $\square$

Definición 2.2.5 (Grupo cíclico). Sea G un grupo, si $\exists g \in G$, tal que $\langle g \rangle = G$ diremos que G es cíclico.

Ejemplo 2.18. $(\mathbb{Z}, +, 0)$ es cíclico, pues:

$$\langle 1 \rangle = \mathbb{Z}$$

Ejemplo 2.19. S_3 no es cíclico.

Ejemplo 2.20. $(\mathbb{Q}, +, 0)$ no es cíclico.

Observación 2.2.4 (Nota). Note que si G es cíclico:

$$\langle g \rangle = \{g^t : t \in \mathbb{Z}\}$$

Proposición 2.2.4. Si $(G, \circ, e)$ es cíclico, entonces G es abeliano.

Demostración.

Sea $(G, \circ, e)$ cíclico, entonces $\exists g \in G$, tal que $\langle g \rangle = G$. Sean $a, b \in G$, tal que $a = g^n$, $b = g^m$, con $n, m \in \mathbb{Z}$. Es fácil probar que $g^p g^q = g^{p+q} \quad \forall p, q \in \mathbb{Z}$, así:

$$ab = g^n g^m = g^{n+m} = g^{m+n} = g^m g^n = ba$$

$\square$

Observación 2.2.5 (Observación). El recíproco del teorema anterior es falso. En efecto, tome los contraejemplos:

1. Sea $n \in \mathbb{Z}^+$, no primo (por ejemplo $n = 8$), $((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*, \cdot)$ es abeliano, pero no cíclico.
2. $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ es abeliano pero no cíclico.

2.3. Grupo de permutaciones

Definición 2.3.1 (Grupo de Permutaciones). Sea X un conjunto no vacío, sea $\mathcal{H} = \{f : X \rightarrow X : f \text{ es biyectiva}\}$, consideremos la composición de funciones, entonces $\mathcal{H}$ forma un grupo llamado el grupo de permutaciones del conjunto X denotado por S_X .

En caso de que X sea finito, podemos enlistar los elementos de X por $a_1, \dots, a_n$, podemos representar con un arreglo bidimensional de renglones colocando:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_{\sigma(1)} & a_{\sigma(2)} & \dots & a_{\sigma(n)} \end{pmatrix}$$

Donde $\sigma : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$, tal que $\sigma(i) = j$, si $f(a_i) = a_j$, de este modo podemos prescindir de los elementos de X y fijarnos solo en los subíndices e identificar a f con:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

En este caso se escribirá como S_n con $n = |X|$.

Ejemplo 2.21. S_3 es el grupo formado por los elementos:

$$\{e, \sigma, \theta, \sigma \cdot \theta, \theta \cdot \sigma, \theta^2\}$$

Donde:

$$\begin{aligned} e &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} & \theta &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} & \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \\ \theta^2 &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} & \sigma \cdot \theta &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} & \theta \cdot \sigma &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$\circ$	e	θ	σ	θ^2	$\sigma \cdot \theta$	$\theta \cdot \sigma$
e	e	θ	σ	θ^2	$\sigma \cdot \theta$	$\theta \cdot \sigma$
θ	θ	θ^2	$\theta \cdot \sigma$	e	σ	$\sigma \cdot \theta$
σ	σ	$\sigma \cdot \theta$	e	$\theta \cdot \sigma$	θ	θ^2
θ^2	θ^2	e	$\sigma \cdot \theta$	θ	$\theta \cdot \sigma$	σ
$\sigma \cdot \theta$	$\sigma \cdot \theta$	$\theta \cdot \sigma$	θ^2	σ	e	θ
$\theta \cdot \sigma$	$\theta \cdot \sigma$	σ	θ	$\sigma \cdot \theta$	θ^2	e

Es evidente que S_3 no es abeliano, basta notar $\theta \circ \sigma \neq \sigma \circ \theta$. Además observe que si el orden de X es n , $|S_n| = n!$.

Observación 2.3.1. Si $n \geq 3$, entonces S_n no es abeliano.

Demostración.

Basta tomar:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \dots & i & i+1 & \dots & n \\ 1 & \dots & i+1 & i & \dots & n \end{pmatrix}, \quad \theta = \begin{pmatrix} 1 & \dots & j & j+1 & \dots & n \\ 1 & \dots & j & j+1 & \dots & n \end{pmatrix} \quad \text{con } i \neq j$$

y notar que $\sigma \circ \theta \neq \theta \circ \sigma$.

Además podemos notar que trivialmente S_1 y S_2 son un grupo abeliano. $\square$

2.4. Grupo Cociente

2.4.1. Producto de subgrupos

Definición 2.4.1 (Producto de subgrupos). Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sean $S, T \leq G$, definimos el producto de S y T como:

$$ST = \{st : s \in S, t \in T\}$$

Observación 2.4.1. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, $S, T \subseteq G$, ST , no es necesariamente un subgrupo.

Proposición 2.4.1. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sean $H, K \leq G$ entonces HK es un subgrupo si y sólo si $HK = KH$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Suponga que $HK \leq G$, sean $hk \in HK$, entonces $h \in H$ y $k \in K$, entonces: $k^{-1}h^{-1} = (hk)^{-1} \in HK$, por otro lado, como $k^{-1}h^{-1} \in KH$, así: $HK = (k^{-1}h^{-1})^{-1} \in KH$, luego $HK \subseteq KH$, análogamente $KH \subseteq HK$, por lo tanto $HK = KH$.

$\Leftarrow$) Supongamos que $HK = KH$, notemos que $HK \neq \emptyset$, ya que $e \circ e \in HK$. Sean $x, y \in HK$, entonces existe $h_1, h_2 \in H, k_1, k_2 \in K$, tal que $x = h_1k_1, y = h_2k_2$, es claro que $y^{-1} \in HK$, pues $y^{-1} = k_2^{-1}h_2^{-1} \in KH = HK$, así que probemos que $xy^{-1} \in HK$. En efecto, $xy^{-1} = h_1k_1(h_2k_2)^{-1} = h_1k_1k_2^{-1}h_2^{-1}$. Note que $k_1k_2^{-1}h_2^{-1} \in KH = HK$, entonces digamos $h_3k_3 = k_1k_2^{-1}h_2^{-1}$ con $h_3 \in H, k_3 \in K$. Luego: $h_1(k_1k_2^{-1}h_2^{-1}) = h_1(h_3k_3) \in HK$, por lo tanto $xy^{-1} \in HK$, y por una proposición anterior HK es un subgrupo de G . $\square$

Definición 2.4.2. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sean $H, K \leq G$, HK se llama el producto de H con K .

Corolario 2.4.1. Si $(G, \circ, e)$ es un grupo abeliano el producto finito de subgrupos es un subgrupo.

Demostración.

es inmediato usando inducción y el hecho que el producto de subgrupos es asociativo. $\square$

2.4.2. Clases laterales

Observación 2.4.2. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $H \leq G$, entonces $Hg = H$ si y sólo si $g \in H$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que $Hg = H$, entonces $\forall hg \in Hg, hg \in H$, en particular tome $h = e$, así $eg = g \in H$.

$\Leftarrow$) Suponga que $g \in H$, entonces $Hg = \{hg : h \in H\} \subseteq H$, ahora dado $h \in H$, note que $hg^{-1} \in H$, luego $h = (hg^{-1})g \in Hg$, por lo cual $H \subseteq Hg$. $\therefore Hg = H$. $\square$

Proposición 2.4.2. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, $H \leq G$, entonces $Hg = Hg_1$ si y sólo si $gg_1^{-1} \in H$.

Demostración.

$$gg_1^{-1} \in H \iff H = Hgg_1^{-1} \iff Hg_1 = (Hgg_1^{-1})g_1 = Hg. \quad \square$$

Definición 2.4.3. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $H \leq G$, sea $g \in G$, a Hg se le llama clase derecha, análogamente gH se le llama clase izquierda.

Definición 2.4.4. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $H \leq G$, sea $\mathcal{L} = \{gH : g \in G\}$ se le llama conjunto de clases izquierdas y $\mathcal{R} = \{Hg : g \in G\}$ se le llama conjunto de clases derechas.

Proposición 2.4.3. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $H \leq G$, entonces $\mathcal{L}$ y $\mathcal{R}$ forman una partición de G .

Demostración.

Basta probar que $\mathcal{R}$ induce una relación de equivalencia, es decir la relación $\sim$ definida por $a \sim b \iff a, b \in Hg$ es de equivalencia.

- I) REFLEXIVIDAD: $a \sim a \iff a, a \in Hg$. (Esto se cumple pues $a \in Ha$).
- II) SIMÉTRICA: $a \sim b \implies a, b \in Hg \implies b, a \in Hg \implies b \sim a$.
- III) TRANSITIVIDAD: Si $a \sim b \wedge b \sim c \implies a, b \in Hg_1 \wedge b, c \in Hg_2$.
 Sea $a = h_1g_1, b = h_2g_1, b = h_3g_2, c = h_4g_2$, así note que $g_1 = (h_2^{-1}h_3)g_2$. Luego podemos expresar $a = h_1(h_2^{-1}h_3)g_2$, como $(h_1h_2^{-1}h_3) \in H$, $a \in Hg_2$, así $a, c \in Hg_2 \implies a \sim c$.

$\therefore$ Las clases derechas forman una partición de G .

Análogamente las clases izquierdas forman una partición de G . $\square$

Observación 2.4.3. Si $(G, \circ, e)$ es abeliano cada clase izquierda es la misma clase derecha.

Demostración.

Sea $H \leq G$, sea $\mathcal{L} = \{gH : g \in G\}$, sea $\mathcal{R} = \{Hg : g \in G\}$, sea $Hg \in \mathcal{R}$, sea $hg \in Hg$, $hg = gh \in gH \in \mathcal{L}$, así $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{L}$, análogamente $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{R}$, por lo cual $\mathcal{L} = \mathcal{R}$. $\square$

Observación 2.4.4. *El recíproco es no necesariamente cierto.*

Ejemplo 2.22. En S_3 , sea $H = \left\{ \sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, e \right\} = \langle \sigma \rangle \leq G$.

Veamos cuáles son las clases derechas de H :

$$\mathcal{R} = \{H, H\theta = \{\theta, \sigma \circ \theta\}, H\theta^2 = \{\theta^2, \sigma \circ \theta^2 = \theta \circ \sigma\}\}$$

Ahora las clases izquierdas:

$$\mathcal{L} = \{H, \theta H = \{\theta, \theta \circ \sigma\}, \theta^2 H = \{\theta^2, \theta^2 \circ \sigma\}\}$$

Proposición 2.4.4. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, entonces la cardinalidad de cada clase izquierda o derecha es la misma e igual a $|H|$.

Demostración.

Sea $Hg \in \mathcal{R}$, definamos $\varphi : H \rightarrow Hg$, $h \mapsto hg$, probemos que es una función biyectiva.

En efecto, sean $h_1, h_2 \in H$, tal que $\varphi(h_1) = \varphi(h_2)$, entonces $h_1g = h_2g \iff h_1 = h_2$, por lo tanto es inyectiva.

Sea $hg \in Hg \implies \exists h \in H$ tal que $\varphi(h) = hg$, por lo tanto es suprayectiva.

$\therefore \varphi$ es biyectiva, así $|H| = |Hg|$. Análogamente se prueba que $|H| = |gH|$. $\square$

Teorema 2.4.1 (Índice de Lagrange). Sea $(G, \circ, e)$ un grupo sea $H \leq G$, entonces $|H| \mid |G|$ y además:

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

Donde $[G : H] := |\mathcal{L}| = |\mathcal{R}|$ se llama índice de Lagrange de H en G .

Demostración.

Primero veamos que $|\mathcal{L}| = |\mathcal{R}|$. Sea $\varphi : \mathcal{R} \rightarrow \mathcal{L}$, $Ha \mapsto a^{-1}H$, probemos que es un isomorfismo (biyección entre conjuntos).

Sean $g_1H, g_2H \in \mathcal{R}$, tal que $\varphi(Hg_1) = \varphi(Hg_2)$, entonces:

$$g_1^{-1}H = g_2^{-1}H \iff g_1(g_2^{-1})^{-1} \in H \iff g_1g_2^{-1} \in H \iff Hg_1 = Hg_2$$

Por lo tanto es inyectiva. (Nota: en la imagen la cadena de equivalencias usa propiedades de clases laterales).

Ahora sea $g^{-1}H \in \mathcal{L}$, como existe $g = (g^{-1})^{-1} \in G$, se sigue que $\exists Hg \in \mathcal{R}$, tal que $\varphi(Hg) = g^{-1}H$, por lo cual es biyectiva.

$\therefore \varphi$ es biyectiva y así es un isomorfismo (de conjuntos). $\therefore |\mathcal{R}| = |\mathcal{L}|$.

Ahora como las clases son una partición de G , entonces:

$$\begin{aligned} |G| &= \left| \bigcup_{a \in G} Ha \right| \\ &= \sum_{a \in G} |Ha| = \sum_{a \in G} |H| \\ &= |\mathcal{R}| |H| = |H| [G : H] \end{aligned}$$

Así: $|H| \mid |G|$ y $[G : H] \mid |G|$. □

En particular si G es finito, se cumple que:

$$\frac{|G|}{|H|} = [G : H]$$

Definición 2.4.5. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $g \in G$, se denota por $o(g)$ como el menor entero no negativo tal que $g^{o(g)} = e$, si existe ese entero, en caso contrario, diremos $o(g) = +\infty$.

Ejemplo 2.23. En $(\mathbb{Z}, +, 0)$, $\forall a \in \mathbb{Z}$, $o(a) = 0$ (o infinito según la convención).

Ejemplo 2.24. En $(S_3, \circ, e)$ $o(\sigma) = 2$, $o(\theta) = 3$.

Ejemplo 2.25. En $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}, +, 0)$, $o(2) = 4$, $o(3) = 8$, $o(4) = 2$.

Observación 2.4.5. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo finito $\forall g \in G, \exists m \in \mathbb{Z}^+$, tal que $o(g) \leq m$.

Demostración.

Sea $|G| = n$, tome el conjunto $\{g^{i_1}, \dots, g^{i_{n+1}}\}$, con $i_1, \dots, i_{n+1} \in \mathbb{Z}^+$ con $i_1 < i_2 < \dots < i_{n+1}$. Entonces al menos 2 son iguales, es decir $g^{i_j} = g^{i_k}$, para $1 \leq j < k \leq n+1$. Luego:

$$g^{i_k - i_j} = g^{i_k} \cdot g^{-i_j} = g^{i_j} g^{-i_j} = e, \quad \text{tomemos } m = i_k - i_j > 0.$$

$\therefore \exists m \in \mathbb{Z}^+$ tal que $g^m = e$, luego como $o(g)$ es el mínimo entero positivo tal que $g^{o(g)} = e$, entonces $o(g) \leq m$. □

Observación 2.4.6. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo finito, sea $g \in G$, $o(g) = |\langle g \rangle|$, más aún $o(g) \mid |G|$.

Demostración.

Sea $H = \{e, g, g^2, \dots, g^{o(g)-1}\}$, claramente $H \subseteq \langle g \rangle$, además notemos que es un subgrupo.

En efecto: sean $g^i, g^j \in H$, $0 \leq i < j \leq o(g) - 1$, entonces $g^i g^j = g^{i+j}$, se tiene que $0 \leq i+j \leq o(g) - 1 \vee o(g) \leq i+j$. Si se cumple la primera condición es evidente que $g^{i+j} \in H$. Por lo cual tomemos el caso $o(g) \leq i+j$, por el algoritmo de Euclides $\exists k, r \in \mathbb{Z}^+$ tal que: $i+j = k \cdot o(g) + r$, con $0 \leq r < o(g)$, así:

$$g^{i+j} = g^{k \cdot o(g) + r} = (g^{o(g)})^k g^r = (e)^k g^r = g^r \in H,$$

por lo tanto es cerrada, además se hereda de G las propiedades del grupo.

Ahora sea $a \in \langle g \rangle$, podemos expresar $a = g^i, i \in \mathbb{Z}$, así por Euclides $\exists k, r \in \mathbb{Z}$, con $0 \leq r < o(g)$ tal que $g^i = g^{o(g)k + r}$, de este modo podemos expresar $a = g^i = g^r \in H$.

$\therefore \langle g \rangle \subseteq H$, así $|\langle g \rangle| = |H| = o(g)$, más aún como H es subgrupo de G , $|H| \mid |G|$, así $o(g) \mid |G|$. □

Corolario 2.4.2. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo finito entonces $g^{|G|} = e \quad \forall g \in G$.

Demostración.

Dado que $o(g) = |\langle g \rangle| \mid |G|$, entonces $\exists s$ tal que $o(g)s = |G|$ y

$$g^{|G|} = g^{o(g)s} = (g^{o(g)})^s = (e)^s = e$$

□

Corolario 2.4.3 (Teorema de Euler). Sea $a \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ entonces $a^{\varphi(n)} = 1 \pmod{n}$.

Demostración.

$|(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*| = \varphi(n)$ y por el corolario anterior

$$a^{\varphi(n)} = 1 \pmod{n}$$

□

Corolario 2.4.4 (Teorema Pequeño de Fermat). Si $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ con p primo, entonces: $a^p \equiv a \pmod{p}$ y $a^{p-1} = 1$.

Demostración.

Por el corolario anterior dado $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$, $a^{\varphi(p)} = 1 \pmod{p}$, como $\varphi(p) = p - 1$, se sigue $a^{p-1} = 1 \pmod{p}$, luego $a^p = a$. □

Definición 2.4.6. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo sea $N \leq G$, diremos que N es un subgrupo normal en G denotado por $N \trianglelefteq G$, si $gNg^{-1} = N, \forall g \in G$.

Observación 2.4.7. Si $(G, \circ, e)$ es un grupo, sea $N \subseteq G$, arbitrario entonces $gNg^{-1} \subseteq G$. En este caso diremos que gNg^{-1} es subgrupo conjugado de N .

Demostración.

Es claro que $gNg^{-1} \neq \emptyset$ pues $N \neq \emptyset$. Además para $h_1, h_2 \in gNg^{-1}$, $\exists n_1, n_2 \in N$ tal que $h_1 = gn_1g^{-1}$, $h_2 = gn_2g^{-1}$, luego:

$$h_1h_2^{-1} = gn_1g^{-1}(gn_2g^{-1})^{-1} = gn_1g^{-1}(g^{-1})^{-1}n_2^{-1}g^{-1} = gn_1n_2^{-1}g^{-1} \in gNg^{-1}$$

$\therefore$ es un subgrupo de G . □

Teorema 2.4.2. *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, $N \leq G$, entonces las siguientes condiciones son equivalentes:*

- I) $N \trianglelefteq G$.
- II) $gNg^{-1} \subseteq N \quad \forall g \in G$.
- III) $gNg^{-1} = N \quad \forall g \in G$. (Nota: en la imagen dice $gN \subseteq Ng$, pero el punto iii suele referirse a la igualdad de conjugación o conmutación de clases. Transcribo lo que dice la imagen literalmente en la demostración: $gNg^{-1} \subseteq N \implies gN \subseteq Ng$).
- IV) $gN = Ng \quad \forall g \in G$.
- V) *El único subgrupo conjugado de N es N .*

Demostración.

- I $\Rightarrow$ II) De la definición $gNg^{-1} = N \quad \forall g \in G$, en particular $gNg^{-1} \subseteq N \quad \forall g \in G$.
- II $\Rightarrow$ III) $gNg^{-1} \subseteq N \implies (gNg^{-1})g \subseteq Ng$ y $g(gNg^{-1}) = gN$, así $gN \subseteq Ng \quad \forall g \in G$.
(Nota: Aquí la transcripción se ajusta a la lógica del manuscrito que parece deducir la igualdad de clases o contención).
- III $\Rightarrow$ IV) Resta ver que $Ng \subseteq gN$. Tenemos que $gN \subseteq Ng \quad \forall g \in G$, se sigue: $g^{-1}N \subseteq Ng^{-1} \quad \forall g \in G \implies g(g^{-1}N) \subseteq gNg^{-1} \implies N \subseteq gNg^{-1} \quad \forall g \in G$, así: $Ng \subseteq (gNg^{-1})g = gN \quad \forall g \in G$.
- IV $\Rightarrow$ V) Sea H el conjugado de N entonces $H = gNg^{-1}$ para algún $g \in G$, entonces:

$$Hg = (gNg^{-1})g = gN = Ng$$

de donde

$$H = (Hg)g^{-1} = (Ng)g^{-1} = N$$

- V $\Rightarrow$ I) Se sigue de la definición.

□

Observación 2.4.8. Si $N \trianglelefteq G$ y $H \leq G$ entonces $HN = NH$ y por tanto $NH \leq G$.

Demostración.

$$HN = \bigcup_{h \in H} hN = \bigcup_{h \in H} Nh = NH.$$

□

Ejemplo 2.26. Dado el grupo S_3 , calcule los subgrupos: $S_3 = \{e, \sigma, \theta, \theta^2, \sigma\theta, \theta\sigma\}$

Sol.

$$\begin{aligned} H_0 &= \langle e \rangle = \{e\} \\ H_1 &= \langle \sigma \rangle = \{e, \sigma\} \\ H_2 &= \langle \theta \rangle = \{e, \theta, \theta^2\} = \{e, \theta^2, \theta\} \\ H_3 &= \langle \sigma \circ \theta \rangle = \{e, \sigma \circ \theta\} \\ H_4 &= \langle \theta \circ \sigma \rangle = \{e, \theta \circ \sigma\} \\ H_5 &= \langle \{\sigma, \theta\} \rangle = S_3 \end{aligned}$$

Además podemos notar:


- $H_0 \trianglelefteq G$, de manera trivial.
- $H_1 \not\trianglelefteq G$, ya que $H_1\theta \neq \theta H_1$.

- $H_2 \trianglelefteq G$, $H_2\sigma = \{\sigma, \theta \circ \sigma, \theta^2 \circ \sigma\} = \{\sigma, \theta \circ \sigma, \sigma \circ \theta\} = \sigma H_2$.
- $H_3 \not\trianglelefteq G$, $H_3\theta \neq \theta H_3$.
- $H_4 \not\trianglelefteq G$, $H_4\theta \neq \theta H_4$.
- $H_5 \trianglelefteq G$, ya que $H_5 = S_3$.

Por otro lado note:

$$\theta H_1 \theta^{-1} = \theta H_1 \theta^2 = \{e, \theta \circ \sigma \circ \theta^2\} = \{e, \theta \circ \theta \circ \sigma\} = \{e, \theta^2 \circ \sigma\} = \{e, \sigma \circ \theta\} = H_3.$$

$$\theta H_3 \theta^{-1} = \theta H_3 \theta^2 = \{e, \theta \circ (\sigma \circ \theta) \circ \theta^2\} = \{e, \theta \circ \sigma\} = H_4$$



Observación 2.4.9 (Observación). Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, ser conjugado es una relación de equivalencia.


Demostración.

- REFLEXIVIDAD: $H \sim H$ pues $eHe^{-1} = H \quad \forall H \leq G$.
- SIMETRÍA: Sean H_1, H_2 , tal que $H_1 \sim H_2$, entonces $H_1 = gH_2g^{-1}$, luego: $g^{-1}H_1g = H_2$, así $H_2 \sim H_1$.
- TRANSITIVA: Sean $H_1, H_2, H_3 \leq G$ tal que $H_1 \sim H_2, H_2 \sim H_3$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tal que $H_2 = g_1H_1g_1^{-1}$, $H_3 = g_2H_2g_2^{-1} = g_2(g_1H_1g_1^{-1})g_2^{-1} = (g_2g_1)H_1(g_2g_1)^{-1}$. Dado que $g_2g_1 \in G$, $H_1 \sim H_3$.

Además note que son conjugados $|H_1| = |H_3|$. Si son conjugados $\exists g \in G$ tal que $H_3 = gH_1g^{-1}$, sea $\varphi : H_1 \rightarrow H_3$, dada por $\varphi(h_1) = gh_1g^{-1}$, podemos probar que es biyectiva.

□

Ejemplo 2.27. Sea $Q_8 = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$, con $i^2 = j^2 = k^2 = -1$, $ij = k$, $jk = i$, $ki = j$, $-k = ji$, $-i = kj$, $-j = ki$. Calcule los subgrupos normales y calcule los conjugados.



2.4.3. Grupo cociente

Es fácil observar que dado un grupo $(G, \circ, e)$ y $N \leq G$, tal que sea normal, cada clase derecha es una clase izquierda, de este modo se tiene la siguiente proposición.

Proposición 2.4.5. *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sea $N \trianglelefteq G$, sea $G/N = \mathcal{L} = \mathcal{R}$, $*$ definida por $(aN) * (bN) = ab$ en G/N está bien definida, es decir no depende del representante de clase, más aún G/N es un grupo.*

Demostración.

Veamos que $*$ está bien definida:

En efecto, sean $aN, a_1N, bN, b_1N \in G/N$, tales que $aN = a_1N, bN = b_1N$, entonces $Nb = Nb_1$, así $a^{-1}a_1 \in N, b^{-1}b_1 \in N$. Como $N \trianglelefteq G \implies g(a^{-1}a_1)g^{-1} \in N, \forall g \in G$. En particular, tome $g = b^{-1}$:

$$b^{-1}(a^{-1}a_1)b_1 = b^{-1}a^{-1}a_1b_1$$

Luego:

$$(ab)^{-1}a_1b_1 = b^{-1}a^{-1}a_1b_1 \in N$$

Es decir $(ab)N = (a_1b_1)N$. Por lo tanto la función está bien definida.

Ahora probemos que G/N es un grupo:

En efecto, es asociativa, sean $aN, bN, cN \in G/N$:

$$(aN * bN) * cN = abN * cN = (ab)cN = a(bc)N = aN * (bc)N = aN * (bN * cN)$$

Note que existe la identidad, tome $N = eN = Ne \in G/N$,

$$aN * N = aN * eN = (ae)N = aN$$

Además existe el inverso, dado $aN \in G/N$, existe $a^{-1}N \in G/N$:

$$aN * a^{-1}N = (aa^{-1})N = eN = N, \quad \text{entonces } a^{-1}N \text{ es inverso de } aN.$$

$\therefore G/N$ es un grupo. □

Definición 2.4.7 (Grupo Cociente). Sea $(G, \circ, e)$, sea $N \trianglelefteq G$ normal, definimos al grupo cociente: $G/N := \mathcal{R} = \mathcal{L}$, con la siguiente operación:

$$(aN) * (bN) = abN, \quad \text{para } aN, bN \in G/N.$$

CAPÍTULO 3

Homomorfismos e Isomorfismos

3.1. Definición isomorfismo

Definición 3.1.1. Sean $(G_1, \circ, e_1)$, $(G_2, \odot, e_2)$ grupos. Un homomorfismo de grupos es una función $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ que satisface:

$$\varphi(a \circ b) = \varphi(a) \odot \varphi(b) \quad \forall a, b \in G_1$$

En caso que no haya confusión, se podrá omitir escribir las operaciones $\circ, \odot$ y se escribirá:

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$$

Ejemplo 3.1. Sea $G_1 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 = \{([a]_2, [b]_3) : a, b \in \mathbb{Z}\}$, con la operación

$$([a]_2, [b]_3) \circ ([c]_2, [d]_3) = ([a]_2 + [c]_2, [b]_3 + [d]_3)$$

Es fácil notar que $(G_1, \circ)$ es un grupo abeliano.

Sea $G_2 = \mathbb{Z}_6$ con la op. de suma de clases, observe que G_2 es cíclico, pues $G_2 = \langle [1]_6 \rangle$.

Definamos $\varphi : G_2 \rightarrow G_1$, φ es un homomorfismo.

$$[a]_6 \mapsto ([a]_2, [a]_3)$$

En efecto, sean $[a]_6, [b]_6 \in G_2$:

$$\begin{aligned} \varphi([a]_6 + [b]_6) &= \varphi([a + b]_6) = ([a + b]_2, [a + b]_3) \\ &= ([a]_2, [a]_3) + ([b]_2, [b]_3) \\ &= \varphi([a]_6) + \varphi([b]_6) \end{aligned}$$

Además es inyectiva, suponga que $\varphi([a]_6) = \varphi([b]_6)$:

$$\begin{aligned} ([a]_2, [a]_3) &= ([b]_2, [b]_3) \iff [a]_2 = [b]_2 \wedge [a]_3 = [b]_3 \iff 2 \mid b - a, 3 \mid b - a \\ &\iff 6 \mid b - a \iff [a]_6 = [b]_6 \end{aligned}$$

Note que $|G_1| = |G_2| = 6$ y como es inyectiva, necesariamente es suprayectiva.

$\therefore \varphi$ es un isomorfismo. $\therefore G_2 \cong G_1$.

Definición 3.1.2. Sean $(G_1, \circ, e)$, $(G_2, \odot, e)$ grupos, sea $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ un homomorfismo, se dice monomorfismo si es inyectiva, se dice epimorfismo si es suprayectiva, si φ es biyectiva se dice isomorfismo. Además si existe el isomorfismo entre G_1 y G_2 , diremos que los grupos son isomorfos y se escribirá $G_1 \cong G_2$.

Se clasificarán todos los grupos finitos salvo isomorfismo entre los grupos de orden finito.

Ejemplo 3.2. Sea G_1 del ejemplo anterior note que $S_3 \not\cong G_1$, pues S_3 no es abeliano, suponga que $\varphi : S_3 \rightarrow G_1$ con $\varphi(\sigma) = ([a]_2, [a]_3)$, $\varphi(\theta) = ([b]_2, [b]_3)$ es isomorfismo, entonces $\varphi(\sigma \circ \theta) = \varphi(\sigma) + \varphi(\theta) = \varphi(\theta) + \varphi(\sigma) = \varphi(\theta \circ \sigma)$, lo cual es una contradicción.

Ejemplo 3.3. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo de orden p con p primo, entonces:

$$G \cong \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$$

En efecto, definamos: $\varphi : G \rightarrow \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, con g generador de G .

$$a = g^i \mapsto \underbrace{\bar{1} + \cdots + \bar{1}}_{i\text{-veces}}$$

Note que es homomorfismo, sean $a, b \in G$, $a = g^i, b = g^j$, con $1 \leq i, j < p$.

$$\varphi(ab) = \varphi(g^i g^j) = \varphi(g^{i+j}) = \underbrace{\bar{1} + \cdots + \bar{1}}_{i+j \text{ veces}} = \underbrace{\bar{1} + \cdots + \bar{1}}_{i \text{ veces}} + \underbrace{\bar{1} + \cdots + \bar{1}}_{j \text{ veces}} = \varphi(g^i) + \varphi(g^j) = \varphi(a) + \varphi(b)$$

Además es inyectiva, suponga que $\varphi(a) = \varphi(b) \iff \varphi(g^i) = \varphi(g^j) \iff \varphi(g^i g^{-j}) = \bar{1} - \varphi(e) \iff p \mid i - j \iff p \mid |i - j|$, note además que $|i - j| < p$ se sigue que $0 = |i - j| \iff i = j$, así $a = g^i = g^j = b$.

Y es suprayectiva al ser inyectiva y $|G| = |\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}| = p$.

Observación 3.1.1. Si $(G, \circ, e)$ es de orden p , con p primo, entonces es cíclico.

Demostración.

Sea $(G, \circ, e)$ de orden p primo, sea $a \in G \setminus \{e\}$, $o(a) > 1$, y $o(a) \mid |G|$ entonces $o(a) = p$, por otro lado como $o(a) = |\langle a \rangle|$, $|\langle a \rangle| = p$, luego $\langle a \rangle = G$. $\square$

Con el ejemplo 3.3 se concluye que todos los grupos de orden primo son isomorfos a $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, es decir salvo isomorfismo existe un único grupo de orden p primo.

Observación 3.1.2. $\ker \varphi \leq G$, $\text{Im } \varphi \leq G_1$.

Demostración.

Observe que: $\varphi(e) = \varphi(e \circ e) = \varphi(e) \odot \varphi(e)$, donde $\varphi(e) = e_1$, además $\forall a \in G$,

$$e_1 = \varphi(e) = \varphi(a \circ a^{-1}) = \varphi(a) \odot \varphi(a^{-1}), \text{ luego: } \varphi(a)^{-1} = \varphi(a^{-1}).$$

Ahora para $a, b \in \ker \varphi$:

$$\varphi(a \circ b^{-1}) = \varphi(a) \odot \varphi(b^{-1}) = \varphi(a) \odot \varphi(b)^{-1} = e_1 \odot e_1^{-1} = e_1$$

Así $ab^{-1} \in \ker \varphi$, luego $\ker \varphi \leq G$.

Sea $h, g \in \text{Im } \varphi$, entonces $\exists a, b \in G$ tal que $\varphi(a) = h, \varphi(b) = g$, luego note:

$$\varphi(a \circ b^{-1}) = \varphi(a) \odot \varphi(b^{-1}) = \varphi(a) \odot \varphi(b)^{-1} = h \odot g^{-1}, \text{ así } h \odot g^{-1} \in \text{Im } \varphi$$

$\therefore \text{Im } \varphi \leq G_1$. □

3.2. Teoremas de isomorfismo

Teorema 3.2.1 (1er Teorema de isomorfismo). Sean $(G, \circ, e), (G_1, *, e_1)$, sea $\varphi : G \rightarrow G_1$ un homomorfismo, entonces $(\ker \varphi) \trianglelefteq G$ y:

$$G / \ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$$

Demostración.

Sea $a \in \ker \varphi$, sea $g \in G$.

$$\varphi(gag^{-1}) = \varphi(g) * \varphi(a) * \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) * e_1 * \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) * \varphi(g)^{-1} = e_1$$

Así $gag^{-1} \in \ker \varphi, \forall g \in G$, entonces $(\ker \varphi) \trianglelefteq G$.

Notemos que $G / \ker \varphi$ es un grupo con la operación de clases:

$$(g \ker \varphi) \cdot (g_1 \ker \varphi) = (gg_1) \ker \varphi$$

Definamos $f : G / \ker \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi$, dada por $f(g \ker \varphi) = \varphi(g)$ probemos que está bien definida, es decir no depende del representante de clase. Sean $(g \ker \varphi), (g_1 \ker \varphi) \in G / \ker \varphi$, suponga que $g \ker \varphi = g_1 \ker \varphi \implies g^{-1}g_1 \in \ker \varphi$, entonces:

$$\begin{aligned} f(g \ker \varphi) &= f(g_1 \ker \varphi) \\ \varphi(g^{-1}g_1) &= \varphi(e) \\ \varphi(g)^{-1} * \varphi(g_1) &= e_1 \\ \implies \varphi(g_1) &= \varphi(g) \\ \implies f(g_1 \ker \varphi) &= f(g \ker \varphi) \end{aligned}$$

Probemos que es inyectiva: sean $g \ker \varphi, g_1 \ker \varphi \in G / \ker \varphi$, tal que:

$$f(g \ker \varphi) = f(g_1 \ker \varphi) \implies \varphi(g) = \varphi(g_1) \implies g^{-1}g \in \ker \varphi,$$

así $g^{-1} \ker \varphi = g \ker \varphi$ (Nota: aquí el manuscrito implica igualdad de clases).

Probemos que es suprayectiva: sea $a \in \text{Im } \varphi \implies \exists g \in G$, tal que $\varphi(g) = a$, así $f(g \ker \varphi) = \varphi(g) = a$.

$\therefore f$ es un isomorfismo, y $G/\ker \varphi \cong \text{Im } \varphi$. $\square$

Corolario 3.2.1. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, $H \leq G$, entonces $H \trianglelefteq G$ si y sólo si existe un homomorfismo φ de G en otro grupo tal que $H = \ker \varphi$.

Demostración.

$(\Leftarrow)$ Evidente (por la primera parte del teorema anterior).

$(\Rightarrow)$ Sea $\varphi : G \rightarrow G/H$ con $\varphi(g) = gH$, sean $g_1, g_2 \in G$, entonces:

$$\varphi(g_1 g_2) = g_1 g_2 H = g_1 H g_2 H = \varphi(g_1) \varphi(g_2). \quad \therefore \varphi \text{ es un homomorfismo.}$$

Además $g \in \ker \varphi \iff gH = H \iff g \in H$. $\therefore \ker \varphi = H$. $\square$

Ejemplo 3.4. Sea $G = GL_n(\mathbb{C})$, sea $N = SL_n(\mathbb{C})$, claramente $SL_n(\mathbb{C}) \leq GL_n(\mathbb{C})$ con el producto de matrices.

Probemos que $SL_n(\mathbb{C}) \trianglelefteq GL_n(\mathbb{C})$, en efecto, sea $X \in GL_n(\mathbb{C})$, sea $Y \in SL_n(\mathbb{C})$, note:

$$\det(XYX^{-1}) = \det(X) \det(Y) \det(X^{-1}) = \det(X) \cdot 1 \cdot \det(X)^{-1} = 1.$$

$$\implies XYX^{-1} \in SL_n(\mathbb{C}) \quad \forall X \in GL_n(\mathbb{C}).$$

Tomando: $\varphi : GL_n(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{C}^*$, dada por $\varphi(X) = \det(X)$ claramente es homomorfismo, ya que dadas $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$, $\varphi(AB) = \det(AB) = \det(A) \det(B) = \varphi(A) \varphi(B)$, además note que $A \in \ker \varphi \iff \varphi(A) = 1$, por lo cual $\ker \varphi = SL_n(\mathbb{C})$.

Así:

$$\frac{GL_n(\mathbb{C})}{SL_n(\mathbb{C})} \cong \mathbb{C}^* = \mathbb{C} \setminus \{0\}, \text{ por el 1}^{\text{er}} \text{ teorema de isomorfismos.}$$

Teorema 3.2.2 (2do teorema de isomorfismo). Sea $(G, \circ, e)$ un grupo, sean $H, K \leq G$, con $K \trianglelefteq G$ entonces $K \cap H \trianglelefteq H$ y

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{KH}{K}$$

Demostración.

Como $K \trianglelefteq G$, entonces $KH = HK$, así $KH \leq G$, más aún $\forall kh \in KH$, $k \in K, h \in H$, se tiene:

$$(kh)K(kh)^{-1} = k(hKh^{-1})k^{-1} = k(K)k^{-1} = K,$$

entonces $K \trianglelefteq KH$, así $\frac{KH}{K}$ es un grupo.


Definamos $\varphi : H \rightarrow \frac{KH}{K}$ con $\varphi(h) = hK$, sean $h_1, h_2 \in H$, entonces: $\varphi(h_1 h_2) = (h_1 h_2)K = h_1 K h_2 K = \varphi(h_1) \varphi(h_2)$, por lo cual es un homomorfismo.

Note que $h \in \ker \varphi \iff hK = K \iff h \in K \implies h \in H \wedge h \in K \implies h \in H \cap K$, es decir $H \cap K = \ker \varphi$.

Por el primer teorema de isomorfismo:

$$\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{KH}{K}$$

□



Teorema 3.2.3 (Tercer teorema de isomorfismo). Sea $(G, \cdot, e)$ un grupo, sean H, K subgrupos normales de G , tales que $K \subseteq H \subseteq G$, entonces:

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

Demostración.

Dado que $K \trianglelefteq G$, $K \trianglelefteq H$ al tener $K \subseteq H$, además como $G/H, G/K$ son grupos, H/K también lo es. Sea $\varphi : G/K \rightarrow G/H$ dada por $\varphi(gK) = gH$, note que φ está bien definida.

En efecto, sean $g_1K, g_2K \in G/K$ tales que $g_1K = g_2K$, entonces $g_2^{-1}g_1 \in K$, luego $g_2^{-1}g_1 \in H$, entonces $g_1H = g_2H$ así $\varphi(g_1K) = g_1H = g_2H = \varphi(g_2K)$.

Ahora probemos que es un homomorfismo, sean $g_1K, g_2K \in G/K$:

$$\varphi((g_1K)(g_2K)) = \varphi(g_1g_2K) = g_1g_2H = (g_1H)(g_2H) = \varphi(g_1K)\varphi(g_2K)$$

Note que $gK \in \ker \varphi \iff \varphi(gK) = gH = H \iff g \in H$, $\therefore \ker \varphi = H/K$.

Así por el primer teorema de isomorfismo, $H/K \trianglelefteq G/K$ y

$$\frac{G/K}{H/K} \cong \frac{G}{H}$$

□

Observación 3.2.1. Sea $(G, \cdot, e)$ un grupo, sean $H, K \leq G$, con H finito, y $\frac{H}{H \cap K} \cong \frac{KH}{K}$, entonces:

$$|KH| = \frac{|K||H|}{|H \cap K|}$$

Demostración.

Dado el isomorfismo, se sigue $[H : H \cap K] = [KH : K]$ y como: $|KH| = |K|[KH : K]$, $|H| = |H \cap K|[H : H \cap K]$, note que al ser H finito, $H \cap K$ es finito, así se sigue:

$$|KH| = \frac{|K||H|}{|H \cap K|}$$

□

Teorema 3.2.4 (De correspondencia). Sea G un grupo $K \trianglelefteq G$, entonces existe una correspondencia biyectiva entre los subgrupos de G que contienen a K y los subgrupos de G/K , la cual está dada por la proyección $\pi : G \rightarrow G/K$ y cumple:

$$g \mapsto gK$$

Si S^* es el subgrupo de G/K que se corresponde con el subgrupo S de K entonces:

- I) $\pi(S) = S/K = S^*$
- II) Si T, S son subgrupos de G que contienen a K , $T \subseteq S \iff T^* \subseteq S^*$ y en este caso $[S : T] = [S^* : T^*]$
- III) $T \trianglelefteq G \iff T^* \trianglelefteq G/K$

Demostración.

Consideremos $\pi : G \rightarrow G/K$ dada por $\pi(g) = gK$ y sean H_1, H_2 subgrupos de G que contienen a K .

Sean $A = \{H \leq G : H \supseteq K\}$, $B = \{H^* \subseteq G/K : H^* \leq G/K\}$, y definamos $\bar{\pi} : A \rightarrow B$ como $\bar{\pi}(H) = \pi(H) = \{hK : h \in H\}$, veamos que $\bar{\pi}$ está bien definida, es decir, que $\bar{\pi}(H) \leq G/K$ si $H \leq G$. En efecto, sean $h_1K, h_2K \in \bar{\pi}(H)$ con $h_1, h_2 \in H$, entonces $(h_1K)(h_2K)^{-1} = h_1h_2^{-1}K$ y $h_1h_2^{-1} \in H$ luego $h_1h_2^{-1}K \in \bar{\pi}(H)$, es decir $\bar{\pi}(H) \leq G/K$.

Note que $\bar{\pi}$ es inyectiva, sea $H_1, H_2 \in A$, suponga que $\bar{\pi}(H_1) = \bar{\pi}(H_2)$, entonces $H_1K = H_2K$, sea $h_1 \in H_1 \implies \pi(h_1) = h_1K \in H_1K = \bar{\pi}(H_1)$, luego existe $h_2 \in H_2$ tal que $h_1K = h_2K$ y así $h_2^{-1}h_1 \in K$ y como $K \subseteq H_2$, $h_1 = h_2(h_2^{-1}h_1) \in H_2 \implies H_1 \subseteq H_2$, análogamente $H_2 \subseteq H_1$, y por tanto $H_1 = H_2$.

Además $\bar{\pi}$ es suprayectiva, sea $S^* \leq G/K$, $\pi^{-1}(S^*) = \{g \in G : \pi(g) \in S^*\}$ veamos que $\pi^{-1}(S^*)$ es subgrupo de G y $K \subseteq \pi^{-1}(S^*)$.

Como $S^* \subseteq G/K$, entonces $\bar{K} = e_{G/K} \in S^*$, luego $\forall g \in K, gK = \bar{K} \in S^*$, es decir, $\pi(g) = gK \in S^*$, así que $g \in \pi^{-1}(S^*)$ de donde $K \subseteq \pi^{-1}(S^*)$.

Ahora si $g_1, g_2 \in \pi^{-1}(S^*)$ entonces $\pi(g_1), \pi(g_2) \in S^* \implies g_1K, g_2K \in S^*$ y como $S^* \leq G/K$, $g_1K(g_2K)^{-1} \in S^*$, es decir

$$\pi(g_1g_2^{-1}) = (g_1g_2^{-1})K = (g_1K)(g_2K)^{-1} \in S^*$$

Por lo cual $g_1g_2^{-1} \in \pi^{-1}(S^*)$. Por lo tanto $\pi^{-1}(S^*) \leq G$.

Es claro que $\pi(\pi^{-1}(S^*)) = S^*$. Así que sea $H \leq G$ tal que $\pi(H) = S^*$ note que $\bar{\pi}(H) = \pi(H) = \pi(\pi^{-1}(S^*)) = \bar{\pi}(\pi^{-1}(S^*)) = S^*$ y como $\bar{\pi}$ es inyectiva $H = \pi^{-1}(S^*)$.

Si $T \subseteq S$ con $K \leq S, T \leq G$, entonces:

$$T^* = \pi(\pi^{-1}(T^*)) = \pi(T) \subseteq \pi(S) = \pi(\pi^{-1}(S^*)) = S^*$$

Recíprocamente si $T^* \subseteq S^*$, entonces $T = \pi^{-1}(T^*) \subseteq \pi^{-1}(S^*) = S$

Más aún definamos $\Phi: \frac{S}{T} \rightarrow \frac{S^*}{T^*} = \frac{S/K}{T/K}$ dada por: $\Phi(gT) = (gK)T^*$, Φ está bien definida pues si $g_1T = g_2T \implies g_2^{-1}g_1 \in T$ así: $\pi(g_2^{-1}g_1) = g_2^{-1}g_1K \in T^* \implies g_2^{-1}g_1K = (g_2K)^{-1}(g_1K) \in T^*$, luego $(g_1K)T^* = (g_2K)T^*$, luego $\Phi(g_1T) = \Phi(g_2T)$.

Además Φ es inyectiva, en efecto, sea $g_1T, g_2T \in S/T$ tal que $\Phi(g_1T) = \Phi(g_2T)$, entonces $(g_1K)T^* = (g_2K)T^* \implies \pi(g_2^{-1}g_1) = g_2^{-1}g_1K \in T^*$, donde $g_2^{-1}g_1 \in \pi^{-1}(T^*) = T$, por tanto $g_1T = g_2T$.

Es suprayectiva, pues si $(sK)T^* \in \frac{S^*}{T^*}$ con $s \in S$ entonces existe $sT \in S/T$ tal que $\Phi(sT) = (sK)T^*$

$\therefore \Phi$ es una biyección y en particular:

$$[S : T] = \left| \frac{S}{T} \right| = \left| \frac{S/K}{T/K} \right| = \left[\frac{S}{K} : \frac{T}{K} \right] = [S^* : T^*]$$

□

3.3. Grupo cíclicos

Proposición 3.3.1. *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo cíclico finito, entonces cada subgrupo de G es cíclico.*

Demostración.

Sea $H \leq G$, con $G = \langle g \rangle$, para algún $g \in G$. Observe que si $H = \{e\}$, hemos terminado, por lo que suponga que $H \neq \{e\}$, entonces $\exists m \in \mathbb{Z}^+$, tal que $g^m \in H$, pues $g^{|G|} = e \in H$.

Veamos que $\langle g^m \rangle = H$. Claramente $\langle g^m \rangle \subseteq H$. Ahora si $c \in H$, con $c = g^k$, $k \in \mathbb{Z}^+$. Por el algoritmo de la división $k = mq + r$, $q \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < m$, entonces $c = g^k = g^{mq+r} = (g^m)^q g^r$, así $g^r = c((g^m)^q)^{-1} \in H$ y $r < m$, por la minimalidad de m , necesariamente se debe tener $r = 0$. Por lo tanto $c \in \langle g^m \rangle \implies H \subseteq \langle g^m \rangle$ así: $H = \langle g^m \rangle$. □

Proposición 3.3.2. *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo cíclico infinito, $G \cong \mathbb{Z}$.*

Demostración.

Sea $G = \langle c \rangle$, con $c \in G$, definamos $\varphi : G \rightarrow \mathbb{Z}$, $g^k \mapsto k \cdot 1$.

Sea $c^k, c^l \in G$, tal que $\varphi(c^k) = \varphi(c^l) \Rightarrow k \cdot 1 = l \cdot 1 \Rightarrow k = l \Rightarrow c^k = c^l$, por lo cual es inyectiva, claramente es suprayectiva, además note: $\varphi(c^k \cdot c^l) = \varphi(c^{k+l}) = (l+k) \cdot 1 = l \cdot 1 + k \cdot 1 = \varphi(c^k) + \varphi(c^l)$, por lo cual es un homomorfismo, así $G \cong \mathbb{Z}$ $\square$

Ejemplo 3.5. Los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son de la forma:

$$H = \langle g \rangle = \{a \cdot n : a \in \mathbb{Z}\}$$

en particular son cíclicos.

Demostración.

Sea $H \leq \mathbb{Z}$, $A = \{a \in H : a > 0\} \subseteq \mathbb{N}$, sea $c = \min A$, veamos que $\langle c \rangle = H$.

Sea $b \in H$, por el algoritmo de la división $b = cq + r$ con $0 \leq r < |c| = c$, como $H \leq \mathbb{Z}$, $r = b - cq \in H$, como $r > 0 \Rightarrow r \in A$ lo cual no puede ser al $r < c$. Por lo tanto $r = 0$ y $b = cq \in \langle c \rangle \Rightarrow \langle c \rangle \supseteq H$, además es evidente que $\langle c \rangle \subseteq H$, así $\langle c \rangle = H$. $\square$

Proposición 3.3.3. Los subgrupos de un grupo cíclico son cíclicos.

Proposición 3.3.4. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo finito, entonces G es cíclico si y sólo si para cada divisor $0 < d$ de $|G|$ existe un único subgrupo cíclico de G de orden d .

Demostración.

$\Leftarrow$) Note que $|G| \mid |G|$ así por hipótesis existe un único $H \leq G$ cíclico tal que $|H| = |G|$, luego $|H| = |G| \iff H = G$, así G es cíclico.

$\Rightarrow$) Sea $n = |G|$ con $G = \langle c \rangle$ y $d \mid n$. Sea $H = \langle c^{|G|/d} \rangle$, entonces $|H| = o(c^{|G|/d}) = d$. En efecto, note que $(c^{|G|/d})^d = e$ y si $e = (c^{|G|/d})^m$ con $m > 0$, entonces $\frac{|G|m}{d} \geq \frac{|G|d}{d}$, de donde $m \geq d$. Veamos que $H = \langle c^{|G|/d} \rangle$ es el único subgrupo de orden d .

Sea $N \leq G$ con $|N| = d$, por el teorema anterior $N = \langle a \rangle$, con $a \in G$, $a = c^k$ con $k \geq 0$.

Pero $e = a^d = c^{kd}$, de donde $|G| \mid kd$, es decir existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $|G|q = kd$ o $\frac{|G|}{d}q = k$. De donde: $a = c^k = (c^{\frac{|G|}{d}})^q \in \langle c^{\frac{|G|}{d}} \rangle = H$. Luego $\langle a \rangle \subseteq H$ y como tienen la misma cardinalidad, $N = \langle a \rangle = H$. $\square$

Proposición 3.3.5. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo cíclico finito, entonces cada subgrupo de G es cíclico.

Demostración.

Sea $H \leq G$, con $G = \langle g \rangle$, para algún $g \in G$. Observe que si $H = \{e\}$, hemos terminado, por lo que suponga que $H \neq \{e\}$, entonces $\exists m \in \mathbb{Z}^+$, tal que $g^m \in H$, pues $g^{|G|} = e \in H$.

Veamos que $\langle g^m \rangle = H$. Claramente $\langle g^m \rangle \subseteq H$. Ahora si $c \in H$, con $c = g^k$, $k \in \mathbb{Z}^+$. Por el algoritmo de la división $k = mq + r$, $q \in \mathbb{Z}$, $0 \leq r < m$, entonces $c = g^k = g^{mq+r} = (g^m)^q g^r$, así $g^r = c((g^m)^q)^{-1} \in H$ y $r < m$, por la minimalidad de m , necesariamente se debe tener $r = 0$. Por lo tanto $c \in \langle g^m \rangle \Rightarrow H \subseteq \langle g^m \rangle$ así: $H = \langle g^m \rangle$. $\square$

Proposición 3.3.6. Sea $(G, \circ, e)$ un grupo cíclico infinito, $G \cong \mathbb{Z}$.

Demostración.

Sea $G = \langle c \rangle$, con $c \in G$, definamos $\varphi : G \rightarrow \mathbb{Z}$, $g^k \mapsto k \cdot 1$.

Sea $c^k, c^l \in G$, tal que $\varphi(c^k) = \varphi(c^l) \Rightarrow k \cdot 1 = l \cdot 1 \Rightarrow k = l \Rightarrow c^k = c^l$, por lo cual es inyectiva, claramente es suprayectiva, además note: $\varphi(c^k \cdot c^l) = \varphi(c^{k+l}) = (l+k) \cdot 1 = l \cdot 1 + k \cdot 1 = \varphi(c^k) + \varphi(c^l)$, por lo cual es un homomorfismo, así $G \cong \mathbb{Z}$ $\square$

Ejemplo 3.6. *Los subgrupos de $\mathbb{Z}$ son de la forma:*

$$H = \langle g \rangle = \{a \cdot n : a \in \mathbb{Z}\}$$

en particular son cíclicos.

Demostración.

Sea $H \leq \mathbb{Z}$, $A = \{a \in H : a > 0\} \subseteq \mathbb{N}$, sea $c = \min A$, veamos que $\langle c \rangle = H$.

Sea $b \in H$, por el algoritmo de la división $b = cq + r$ con $0 \leq r < |c| = c$, como $H \leq \mathbb{Z}$, $r = b - cq \in H$, como $r > 0 \Rightarrow r \in A$ lo cual no puede ser al $r < c$. Por lo tanto $r = 0$ y $b = cq \in \langle c \rangle \Rightarrow \langle c \rangle \supseteq H$, además es evidente que $\langle c \rangle \subseteq H$, así $\langle c \rangle = H$. $\square$

Proposición 3.3.7. *Los subgrupos de un grupo cíclico son cíclicos.*

Proposición 3.3.8. *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo finito, entonces G es cíclico si y sólo si para cada divisor $0 < d$ de $|G|$ existe un único subgrupo cíclico de G de orden d .*

Demostración.

$\Leftarrow$) Note que $|G| \mid |G|$ así por hipótesis existe un único $H \leq G$ cíclico tal que $|H| = |G|$, luego $|H| = |G| \iff H = G$, así G es cíclico.

$\Rightarrow$) Sea $n = |G|$ con $G = \langle c \rangle$ y $d \mid n$. Sea $H = \langle c^{|G|/d} \rangle$, entonces $|H| = o(c^{|G|/d}) = d$. En efecto, note que $(c^{|G|/d})^d = e$ y si $e = (c^{|G|/d})^m$ con $m > 0$, entonces $\frac{|G|m}{d} \geq \frac{|G|d}{d}$, de donde $m \geq d$. Veamos que $H = \langle c^{|G|/d} \rangle$ es el único subgrupo de orden d .

Sea $N \leq G$ con $|N| = d$, por el teorema anterior $N = \langle a \rangle$, con $a \in G$, $a = c^k$ con $k \geq 0$.

Pero $e = a^d = c^{kd}$, de donde $|G| \mid kd$, es decir existe $q \in \mathbb{Z}$ tal que $|G|q = kd$ o $\frac{|G|}{d}q = k$. De donde: $a = c^k = (c^{\frac{|G|}{d}})^q \in \langle c^{\frac{|G|}{d}} \rangle = H$. Luego $\langle a \rangle \subseteq H$ y como tienen la misma cardinalidad, $N = \langle a \rangle = H$. $\square$

Ejemplo 3.7. *Dada la función φ de Euler, sea $n \in \mathbb{Z}^+$, entonces*

$$n = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

Demostración.

Consideremos $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ como grupo aditivo, es claro que $n = |\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}|$ además es un grupo cíclico, para cada divisor d de n , se tiene un único subgrupo de orden d , entonces cualquier elemento de orden d está en este subgrupo.

Por tanto hay tantos generadores de orden d como generadores de este subgrupo, probemos que son exactamente $\varphi(d)$, en efecto, considere $\mathbb{Z}_d$ el grupo cíclico de orden d . Si $\gcd(a, d) = 1$,

entonces existen $x, y \in \mathbb{Z}$ tal que $ax + by = 1$ de donde $ax = 1 \pmod{d}$, luego $x = 1 \pmod{d}$, así $1 \in \langle [a]_d \rangle$, entonces $\langle [a]_d \rangle = \mathbb{Z}_d$.

Recíprocamente si $\langle [a]_d \rangle = \mathbb{Z}_d$, entonces existe $x \in \mathbb{Z}$ tal que $xa = 1 \pmod{d}$, así $xa - 1 = yd$, es decir $xa + yd = 1$, entonces $\gcd(a, d) = 1$. Por tanto a genera a $\mathbb{Z}_d$ si y sólo si $\gcd(a, d) = 1$, $0 < a \leq d$. Por tanto la cantidad de generadores de $\mathbb{Z}_d$ es $\varphi(d)$.

Finalmente, sea G un grupo finito $A_d = \{g \in G : o(g) = d\}$, entonces:

$$G = \bigcup_{d \mid |G|} A_d$$

y en particular:

$$|G| = \sum_{d \mid |G|} |A_d|$$

Si $g \in G$, sabemos que $o(g) \mid |G|$, por lo cual digamos $d = o(g) \quad \forall g \in G$, luego $G \subseteq \bigcup_{d \mid |G|} A_d$, basta probar que la unión es disjunta, en efecto, sea $g \in A_{d_1} \cap A_{d_2}$, se tiene que $d_1 = o(g) = d_2$ de donde $d_1 = o(g) = d_2$, por tanto,

$$G = \dot{\bigcup}_{d \mid |G|} A_d \quad \text{y} \quad |G| = \sum_{d \mid |G|} |A_d|$$

Entonces:

$$n = |\mathbb{Z}_n| = \sum_{d \mid n} |A_d| = \sum_{d \mid n} \varphi(d)$$

□

Proposición 3.3.9. *Sea $(G, \circ, e)$ un grupo finito, entonces G es cíclico si y sólo si para cada divisor d de $|G|$ existe a lo más un grupo de orden el divisor. (Nota: el manuscrito dice "existe a lo más un grupo", que junto con la hipótesis de finitud suele implicar la ciclicidad si se combina con la suma de los órdenes).*

Demostración.

$\Rightarrow$) Si G es cíclico por el teorema anterior para cada divisor d de $|G|$ existe único subgrupo cíclico de orden d , luego existe a lo más uno.

$\Leftarrow$) Tenemos que

$$|\mathbb{Z}_n| = n = |G| = \sum_{d \mid |G|} |A_d| = \sum_{d \mid |G|} \#\{\text{Generadores de orden } d\}$$

$$|\mathbb{Z}_n| = \sum_{d \mid |G|} \varphi(d)$$

Si alguno de los $A_d \neq \emptyset$, $|A_d| \neq 0$ y el $\varphi(d) \neq 0$, lo cual no puede ser, por lo tanto la igualdad se da siempre y cuando $\forall d \mid |G|$ hay al menos uno de ese orden. □

CAPÍTULO 4

Productos Directos y el Grupo Simétrico S_n

4.1. Productos Directos

Definición 4.1.1. Sea $(H, \circ), (K, *)$ dos grupos, definamos en $G = H \times K$, la función $\odot : G \times G \rightarrow G$, dada por:

$$(h_1, k_1) \odot (h_2, k_2) = (h_1 \circ h_2, k_1 * k_2)$$

Claramente $\odot$ es una operación en G y se verifica que con esta operación, G forma un grupo con identidad (e_H, e_K) .

También se tiene que $\bar{H} = H \times \{e_K\}$ y $\{e_H\} \times K = \bar{K}$ son subgrupos normales de G tales que $\bar{H} \cap \bar{K} = e_G = (e_H, e_K)$ y $G = \bar{H}\bar{K}$ en este caso a G se le llama el producto directo externo de H con K

Definición 4.1.2. Si G es un grupo tal que existen $H, K \leq G$ con $H \triangleleft G$, $K \triangleleft G$, $G = HK$, $H \cap K = \{e\}$, diremos que G es el producto directo interno de H y K .

Observación 4.1.1. El producto directo de una cantidad finita de grupos es asociativo (la igualdad se da salvo isomorfismo); es decir,

$$(H_1 \times H_2) \times H_3 \cong H_1 \times (H_2 \times H_3) \quad (\text{Se escribe } H_1 \times H_2 \times H_3)$$

Verificarlo.

4.1.1. Teorema Chino del Residuo

Teorema 4.1.1 (Teorema chino del residuo). Sea $n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$. Entonces $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$ en donde $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ es la factorización en primos de n .

Demostración.

Sea $\varphi : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$ la función definida por:

$$[a]_n \mapsto ([a]_{p_1^{e_1}}, \dots, [a]_{p_k^{e_k}})$$

La función φ está bien definida. Supongamos que $[a]_n = [b]_n$, entonces $n \mid a - b$. Dado que $p_i^{e_i} \mid n$, por transitividad se tiene que $p_i^{e_i} \mid a - b$, es decir $[a]_{p_i^{e_i}} = [b]_{p_i^{e_i}}$, de donde se concluye que $\varphi([a]_n) = \varphi([b]_n)$.

- φ es inyectiva: $\varphi([a]_n) = \varphi([b]_n)$ si y solo si $[a]_{p_i^{e_i}} = [b]_{p_i^{e_i}}$ para todo $1 \leq i \leq k$. Esto implica que $p_i^{e_i} \mid a - b$ para todo $1 \leq i \leq k$. Como los p_i son primos distintos, tenemos que $(p_i^{e_i}, p_j^{e_j}) = 1$ para todo $i \neq j$. En consecuencia, el producto $n = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$ divide a $a - b$, de donde $[a]_n = [b]_n$.

Nótese además que las cardinalidades coinciden: $n = |\mathbb{Z}_n| = |\mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}| = p_1^{e_1} \cdots p_k^{e_k}$. Al ser una función inyectiva entre conjuntos finitos del mismo tamaño, φ es biyectiva.

- φ es un homomorfismo:

$$\begin{aligned} \varphi([a]_n + [b]_n) &= \varphi([a + b]_n) = ([a + b]_{p_1^{e_1}}, \dots, [a + b]_{p_k^{e_k}}) \\ &= ([a]_{p_1^{e_1}} + [b]_{p_1^{e_1}}, \dots, [a]_{p_k^{e_k}} + [b]_{p_k^{e_k}}) \\ &= ([a]_{p_1^{e_1}}, \dots, [a]_{p_k^{e_k}}) + ([b]_{p_1^{e_1}}, \dots, [b]_{p_k^{e_k}}) \\ &= \varphi([a]_n) + \varphi([b]_n) \end{aligned}$$

Finalmente, φ es un isomorfismo y por lo tanto $\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$. □

Ejemplo 4.1. Sea G un grupo de orden pq con p, q primos distintos. Si H, K son subgrupos normales de G con $|H| = p$ y $|K| = q$, entonces $G \cong H \times K$.

Demostración.

Como $H, K \trianglelefteq G$, si tomamos $g \in H \cap K$ entonces $o(g) \mid |H| = p$ y $o(g) \mid |K| = q$. Dado que p y q son distintos, $o(g) = 1$, lo que implica que $H \cap K = \{e\}$.

Más aún, el orden del producto es $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = \frac{pq}{1} = |G|$, luego $G = HK$. Además, si $g \in HK$ tuviera dos representaciones $g = h_1 k_1 = h_2 k_2$ con $h_1, h_2 \in H$ y $k_1, k_2 \in K$, entonces $h_1^{-1} h_2 = k_1 k_2^{-1}$. Este elemento pertenecería a la intersección $H \cap K = \{e\}$, lo que implica $h_1 = h_2$ y $k_1 = k_2$. Es decir, la representación de $g \in G$ como producto de un elemento de H y uno de K es única.

Definimos la función $\varphi : G \rightarrow H \times K$ mediante:

$$g = hk \mapsto (h, k)$$

Note que si $h \in H$ y $k \in K$, tenemos que $hkh^{-1}k^{-1}$ pertenece a $H \cap K$ (pues H y K son normales), y como la intersección es trivial, $hkh^{-1}k^{-1} = e$, luego $hk = kh$.

- φ es un homomorfismo: Sean $g = hk$ y $g_1 = h_1k_1$ en G con $h, h_1 \in H$ y $k, k_1 \in K$. Usando que los elementos de H y K conmutan:

$$\begin{aligned}\varphi(gg_1) &= \varphi(hkh_1k_1) = \varphi(hh_1kk_1) = (hh_1, kk_1) \\ &= (h, k)(h_1, k_1) = \varphi(g)\varphi(g_1)\end{aligned}$$

- φ es inyectiva: Si $g = hk$, $g_1 = h_1k_1$ y $\varphi(g) = \varphi(g_1)$, entonces $(h, k) = (h_1, k_1)$, luego $h = h_1$ y $k = k_1$, de donde $g = g_1$.
- φ es sobreyectiva: Dado un par $(h, k) \in H \times K$, existe el elemento $g = hk \in G$ tal que $\varphi(g) = (h, k)$.

Por lo tanto $G \cong H \times K$; de hecho, G es el producto directo interno de H y K . $\square$

Corolario 4.1.1. *Sea G un grupo abeliano de orden pq con p, q primos distintos, entonces:*

$$G \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$$

Demostración.

Basta ver que existe un elemento de orden p y un elemento de orden q , lo cual nos lo dará el teorema de Cauchy (Ver más adelante). $\square$

4.1.2. Teorema de Cayley

Teorema 4.1.2 (Teorema de Cayley). *Todo grupo G es isomorfo a un subgrupo de permutaciones.*

Demostración.

Sea S_G el grupo de todas las permutaciones del conjunto G (biyecciones de G en sí mismo). Definimos la función $\varphi : G \rightarrow S_G$ dada por $\varphi(g) = f_g$, donde $f_g : G \rightarrow G$ es la función de multiplicación por la izquierda:

$$f_g(h) = gh \quad \forall h \in G$$

Veamos que φ es un isomorfismo sobre su imagen, en efecto:

- φ está bien definida (es decir, $f_g \in S_G$): Para cualquier $g \in G$, la función f_g es biyectiva. En efecto, tiene inversa, la cual es $f_{g^{-1}}$, ya que para todo $h \in G$:

$$(f_g \circ f_{g^{-1}})(h) = f_g(g^{-1}h) = g(g^{-1}h) = h = \text{id}(h)$$

De manera análoga, $f_{g^{-1}} \circ f_g = \text{id}$. Al ser biyectiva, f_g es una permutación de G , por lo que $f_g \in S_G$.

- φ es un homomorfismo: Sean $g, k \in G$. Queremos ver que $\varphi(gk) = \varphi(g) \circ \varphi(k)$. Evaluamos ambas funciones en un elemento arbitrario $h \in G$:

$$\begin{aligned}\varphi(gk)(h) &= f_{gk}(h) = (gk)h \\ (\varphi(g) \circ \varphi(k))(h) &= f_g(f_k(h)) = f_g(kh) = g(kh)\end{aligned}$$

Por asociatividad, $(gk)h = g(kh)$, por lo tanto $f_{gk} = f_g \circ f_k$, lo que implica que φ preserva la operación.

- φ es inyectiva: Supongamos que $\varphi(g) = \varphi(k)$. Esto significa que las funciones son idénticas, es decir, $f_g = f_k$.

$$f_g(h) = f_k(h) \quad \forall h \in G \implies gh = kh \quad \forall h \in G$$

En particular, tomando $h = e$ (neutro de G), obtenemos $ge = ke$, lo que implica $g = k$.

Concluimos que φ es un isomorfismo entre G e $\text{Im}(\varphi)$. Dado que $\text{Im}(\varphi)$ es un subgrupo de S_G , hemos demostrado que G es isomorfo a un subgrupo de permutaciones. $\square$

Ejemplo 4.2. Para ilustrar el teorema anterior, consideremos el grupo $S_3 = \{id, \theta, \sigma, \theta\sigma, \sigma\theta, \theta^2\}$. La función $\varphi : S_3 \rightarrow S_{S_3}$ asocia a cada $g \in S_3$ una permutación de los elementos de S_3 .

Por ejemplo, si tomamos $g = \theta$, la función asociada $f_\theta : S_3 \rightarrow S_3$ definida por $h \mapsto \theta h$ permuta los elementos de S_3 de la siguiente forma:

$$\begin{aligned}id &\mapsto \theta \\ \theta &\mapsto \theta^2 \\ \sigma &\mapsto \theta\sigma \\ \theta\sigma &\mapsto \theta^2\sigma \\ \sigma\theta &\mapsto \sigma \\ \theta^2 &\mapsto id\end{aligned}$$

Corolario 4.1.2. Sea G un grupo de orden finito n , entonces $G \hookrightarrow S_n$.

Demostración.

Sabemos que $G \hookrightarrow S_X$ y $S_X \cong S_n$. En efecto, si $G = \{a_1, \dots, a_n\}$, definimos $\psi : S_X \rightarrow S_n$ dada por $f \mapsto \bar{f}$, en donde si $f(a_i) = a_j$, entonces $\bar{f}(i) = j$, con $X = \{a_1, \dots, a_n\}$ y $\{1, \dots, n\}$.

- ψ está bien definida: Pues si $f : X \rightarrow X$ es biyectiva, en efecto:
 - $\bar{f}$ inyectiva: $\bar{f}(i) = \bar{f}(j) \implies f(a_i) = f(a_j) \implies a_i = a_j \implies i = j$ (pues f es inyectiva).
 - $\bar{f}$ es sobre: Dado $j \in \{1, \dots, n\}$, tenemos $a_j \in G$. Como f es biyectiva, $\exists a_i \in \{1, \dots, n\}$ tal que $f(a_i) = a_j$, luego $\bar{f}(i) = j$.
- ψ es homomorfismo: $\psi(g \circ f) = \psi(g) \circ \psi(f)$. En efecto, $\overline{g \circ f}(i) = j$ si $(g \circ f)(a_i) = a_j$. Suponga que $f(a_i) = a_k$ y $g(a_k) = a_j$, entonces $\bar{f}(i) = k$ y $\bar{g}(k) = j$. Más aún, $(g \circ f)(a_i) = g(f(a_i)) = g(a_k) = a_j$, así que $\overline{g \circ f}(i) = j$. Luego $(\bar{g} \circ \bar{f})(i) = \bar{g}(\bar{f}(i)) = \bar{g}(k) = j$. Así que $\overline{g \circ f} = \bar{g} \circ \bar{f}$, de donde $\psi(g \circ f) = \overline{g \circ f} = \bar{g} \circ \bar{f} = \psi(g) \circ \psi(f)$.
- ψ es inyectiva: $\psi(f) = \psi(g) \implies \bar{f} = \bar{g} \implies \bar{f}(i) = \bar{g}(i) \forall 1 \leq i \leq n \implies f(a_i) = g(a_i) \forall 1 \leq i \leq n \implies f = g$.
- ψ es sobre: Sea $h \in S_n$, entonces $\exists f : S_X \rightarrow S_X$ dada por $f(a_i) = a_{h(i)}$ tal que $(\psi(f))(i) = \bar{f}(i) = h(i) \forall 1 \leq i \leq n$. Por lo tanto $h = \bar{f} = \psi(f)$.

Luego $S_X \cong S_n$ y $G \hookrightarrow S_n$. □

Teorema 4.1.3. Sea G un grupo finito, $H \leq G$. $X = \{Hg \mid g \in G\} = (G/H)$ entonces existe $\varphi : G \rightarrow S_X$ un homomorfismo tal que $N = \text{Ker } \varphi$ es el mayor subgrupo normal en G contenido en H .

Demostración.

Sea $\varphi : G \rightarrow S_X$ definida por $\varphi(g) = f_g$ con $f_g : X \rightarrow X$ dada por:

$$f_g(Hk) = Hkg^{-1}$$

Veamos que f_g no depende del representante de clase (f_g es función). En efecto, Si $Hk = Hk_1$, entonces $kk_1^{-1} \in H$, luego $kgg^{-1}k_1^{-1} \in H$ o $Hkg^{-1} = Hk_1g^{-1}$, así que $f(Hk) = Hkg^{-1} = f(Hk_1)$, por lo cual, f_g es función.

Note que $f_g \in S_X$ pues,

- f_g es inyectiva: $f_g(Hk) = f_g(Hk_1)$ si y solo si $Hkg^{-1} = Hk_1g^{-1}$ si y solo si $Hk = Hk_1$.
- f_g es sobreyectiva: Dado $Hk \in X$ se tiene $f_g(Hkg) = Hkgg^{-1} = Hk$.

Veamos que φ es homomorfismo:

$$\varphi(gg_1) = f_{gg_1} \stackrel{?}{=} f_g \circ f_{g_1} = \varphi(g)\varphi(g_1)$$

pues

$$f_{gg_1}(Hk) = Hk(gg_1)^{-1} = H(kg_1^{-1})g^{-1} = f_g(Hkg_1^{-1}) = f_g(f_{g_1}(Hk)) = (f_g \circ f_{g_1})(Hk)$$

Sea $N = \text{Ker } \varphi$, claramente $N \trianglelefteq G$, además para $n \in N$ tenemos:

$$\text{Id} = \varphi(n) = f_n \quad \text{con } f_n(Hk) = Hkn^{-1}$$

Así que $Hkn^{-1} = Hk \quad \forall Hk \in X$ o $Hkn^{-1} = Hk \quad \forall k \in G$, en particular para $k \in H$, $H = Hk$ y $Hn^{-1} = Hkn^{-1} = Hk = H$ de donde $n \in H$. Luego $N \subseteq H$.

Sea $N_1 \trianglelefteq G$ con $N_1 \subseteq H$, veamos que $N_1 \subseteq N$. Sea $n_1 \in N_1$, $\varphi(n_1) = f_{n_1}$ con $f_{n_1}(Hk) = Hkn_1^{-1} = Hkn_1^{-1}k^{-1}k \quad \forall k \in G$. Como $N_1 \trianglelefteq G$, $kn_1^{-1}k^{-1} \in N_1 \subseteq H$ así que $H(kn_1^{-1}k^{-1})k = Hk$, es decir $f_{n_1}(Hk) = Hk$ de donde $f_{n_1} = \text{Id}$, es decir $n_1 \in \text{Ker } \varphi$ y $N_1 \subseteq N$. $\square$

Corolario 4.1.3. *Sea G finito $H \leq G$, $H \neq G$ tal que $|G| \nmid [G : H]!$ entonces H contiene un subgrupo normal en G no trivial.*

Demostración.

Si φ fuera inyectiva entonces $G \cong \varphi(G) \leq S_X$ así que $|G| \mid |S_X| = [G : H]!$ lo cual por hipótesis no se cumple. Luego $\{e\} \neq \text{Ker } \varphi \subseteq H$, y como $\text{Ker } \varphi \trianglelefteq G$, concluimos que H contiene un subgrupo normal no trivial (y $\text{Ker } \varphi \neq G$ pues $H \neq G$). $\square$

Corolario 4.1.4. *Sea p primo, G un grupo finito tal que p es el menor primo que divide a $|G|$ y $H \leq G$, $H \neq G$ con $[G : H] = p$, entonces $H \trianglelefteq G$.*

Demostración.

Sea $|G| = pm$.

Si $m = 1$, como $[G : H] = p$, entonces $|H| = \frac{|G|}{[G:H]} = \frac{p}{p} = 1$, luego $H = \{e\}$, el cual es normal en G .

Si $m \neq 1$, los factores primos de m son mayores o iguales a p . Veamos que esto implica que $|G| \nmid [G : H]!$, es decir, $pm \nmid p!$. Procedemos por reducción al absurdo para justificar esta afirmación: Supongamos que $|G| \mid p!$, entonces $pm \mid p!$, lo que implica que $m \mid (p-1)!$. Si q es un factor primo de m , entonces $q \mid (p-1)!$, lo cual implica que $q \leq p-1$. Sin embargo, q es un factor de $|G|$ (a través de m), y por hipótesis p es el menor primo que divide a $|G|$, por lo que $q \geq p$. Tenemos así que $q \leq p-1$ y $q \geq p$, lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $|G| \nmid p!$. (La demostración concluye aplicando el corolario anterior). $\square$


4.2. El grupo Simétrico S_n

Recordemos que S_n con la composición de funciones es un grupo. Cada elemento de S_n se llama una permutación (la cual es una función biyectiva de $\{1, \dots, n\}$ en sí mismo). En este caso si $\sigma \in S_n$ se denotará:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

Definición 4.2.1. Un ciclo de longitud $1 \leq k \leq n$ en S_n es un elemento de S_n tal que existen $\{i_1, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$ con $\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1$ y $\sigma(j) = j \ \forall j \notin \{i_1, \dots, i_k\}$.

Ciclo $\sigma = (1 \ 2 \ 3)$



$$\sigma(1) = 2, \quad \sigma(2) = 3, \quad \sigma(3) = 1$$

Note que en este caso:

$$\begin{aligned} \sigma^2(i_1) &= \sigma(\sigma(i_1)) = \sigma(i_2) = i_3 \quad \text{y} \quad \sigma^k(i_1) = i_1 \\ \sigma^3(i_1) &= \sigma(\sigma^2(i_1)) = \sigma(i_3) = i_1 \\ &\vdots \\ \sigma^l(i_1) &= i_{1+l} \quad \text{si } 1 \leq l+1 \leq k, \quad l \leq k-1, \quad \sigma^k(i_j) = i_{j+k-k} = i_j \end{aligned}$$

Más aún:

$$\begin{aligned} \sigma^l(i_j) &= i_{j+l} \quad 1 \leq j+l \leq k \\ \sigma^l(i_j) &= i_{j+l-k} \quad j+l > k \quad (1 \leq l \leq k-j) \end{aligned}$$

En este caso, en lugar de escribir

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & i_1 & i_2 & \cdots & i_k & \cdots & n \\ 1 & \cdots & i_2 & i_3 & \cdots & i_1 & \cdots & n \end{pmatrix}$$

Escribiremos $\sigma = (i_1 \ i_2 \ i_3 \ \dots \ i_k)$ y se tiene que σ se puede denotar de k diferentes formas, a saber:

$$\sigma = (i_1, \dots, i_k) = (i_2, i_3, \dots, i_k, i_1) = \cdots = (i_k, i_1, i_2, \dots, i_{k-1})$$

Si $k = 1$, $\sigma(i) = i \ \forall i$, es decir, $\sigma = id$ y se denota por $\sigma = (1) = (2) = \cdots = (k) = (n)$.

Si $k = 2$, $\sigma(i_1, i_2)$ y se llama una transposición. En este caso:

$$\begin{aligned} \sigma^2(i_1) &= \sigma(i_2) = i_1 \\ \sigma^2(i_2) &= \sigma(i_1) = i_2 \end{aligned}$$

Así, $\sigma^2 = id$, es decir, $\sigma = \sigma^{-1}$.

Si σ es un ciclo de longitud k también se le llama un k -ciclo. Observe que si σ es un k -ciclo, $\sigma^k = id$, de hecho $|\sigma| = k$.

$$\sigma^l(i_j) = \begin{cases} i_{j+l} & \text{si } 1 \leq l \leq k-j \\ i_{l-k+j} & \text{si } k-j < l \leq k \end{cases}$$

En particular si $k = l$, $\sigma^k(i_j) = i_{k-k+j} = i_j$. Así $|\sigma| \mid k$. Además $\sigma^l(i_1) \neq i_1, \forall 1 \leq l < k$ así que $|\sigma| \geq k$, de donde $|\sigma| = k$.

Definición 4.2.2. Diremos que dos ciclos $\sigma, \tau \in S_n$ son disjuntos si:

i) Cuando $\sigma(i_1) = i_2$ con $i_1 \neq i_2$ se tiene que $\tau(i_1) = i_1$.

ii) Cuando $\tau(i_1) = i_2$ con $i_1 \neq i_2$ se tiene que $\sigma(i_1) = i_1$.

(Parafraseando, los elementos que mueve σ , τ los fija y recíprocamente).

Ejemplo 4.3. Consideremos S_5 , entonces $\sigma = (1\ 2)$ y $\tau = (3\ 4\ 5)$ son disjuntos.

Nota 4.2.1. Si $\sigma = (i_1, \dots, i_k)$ y $\tau = (j_1, \dots, j_l)$, entonces σ y τ son disjuntos si y sólo si

$$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_l\} = \emptyset$$

Observación 4.2.1. Si σ, τ son ciclos disjuntos, entonces $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$, es decir, conmutan.

Demostración.

Sea $\sigma = (i_1, \dots, i_k)$ y $\tau = (j_1, \dots, j_l)$. Claramente $\sigma \circ \tau$ y $\tau \circ \sigma$ tienen el mismo dominio. Ahora si $s \notin \{i_1, \dots, i_k, j_1, \dots, j_l\}$:

$$(\sigma \circ \tau)(s) = \sigma(\tau(s)) = \sigma(s) = s$$

$$(\tau \circ \sigma)(s) = \tau(\sigma(s)) = \tau(s) = s$$

Si $s \in \{i_1, \dots, i_k\}$ entonces $s \notin \{j_1, \dots, j_l\}$, así que:

$$(\sigma \circ \tau)(s) = \sigma(\tau(s)) = \sigma(s)$$

Más aún $\sigma(s) \in \{i_1, \dots, i_k\}$, luego $\sigma(s) \notin \{j_1, \dots, j_l\}$ y $\tau(\sigma(s)) = \sigma(s)$, por lo tanto $(\tau \circ \sigma)(s) = (\sigma \circ \tau)(s)$.

Por simetría si $s \in \{j_1, \dots, j_l\}$, $(\tau \circ \sigma)(s) = (\sigma \circ \tau)(s)$ en cualquier caso se tiene la igualdad y por lo tanto $\sigma \circ \tau = \tau \circ \sigma$. $\square$

Teorema 4.2.1. Sea $\theta \in S_n$, entonces θ se puede representar de manera única como producto de ciclos ajenos (disjuntos) salvo orden.

Demostración.

Sea $\{i_1, \dots, i_k\}$ los elementos que mueve θ y procedamos por inducción sobre k .

Para $k = 1$, $\theta = id$ no hay nada que ver $id = (1)$.

Para $k = 2$, $\theta = (i_1, i_2)$ y ya se tiene.

Suponga el resultado para todo $1 \leq l \leq k$ y considere que θ mueve a los elementos $\{i_1, \dots, i_k, i_{k+1}\}$. Considere que θ mueve a los elementos $\{i_1, \dots, i_k, i_{k+1}\}$. Observe que:

$$i_1, \theta(i_1), \theta^2(i_1), \dots, \theta^{k+1}(i_1) \in \{i_1, \dots, i_{k+1}\}$$

Por lo tanto $\{i_1, \theta(i_1), \dots, \theta^{k+1}(i_1)\} \subseteq \{i_1, \dots, i_{k+1}\}$, luego existen $1 \leq l, l' \leq k+2$ y $\theta^l(i_1) = \theta^{l'}(i_1)$ y podemos suponer $l > l'$, en este caso $\theta^{l-l'}(i_1) = i_1$, y $1 \leq l-l' \leq k+2-l' \leq k+1$, es decir existe p tal que $\theta^p(i_1) = i_1$, $1 \leq p \leq k+1$.

Sea p el mínimo entero para el cual pasa esto.

Sea $\sigma = (i_1, \theta(i_1), \dots, \theta^{p-1}(i_1))$. $\{i_1, \theta(i_1), \dots, \theta^{p-1}(i_1)\} \subseteq \{i_1, \dots, i_{k+1}\}$ y definamos

$$\tau(i_j) = \begin{cases} \sigma(i_j) & \text{si } \sigma(i_j) = \theta^l(i_1) \text{ para algún } 1 \leq l \leq p-1 \\ \theta(i_j) & \text{si } i_j \neq \theta^l(i_1) \forall 1 \leq l \leq p-1 \end{cases}$$

Entonces $\sigma \circ \tau = \theta$. Si $j \notin \{i_1, \dots, i_{k+1}\}$ entonces $j \neq \theta^l(i_1) \forall 1 \leq l \leq p-1$ y entonces

$$(\sigma \circ \tau)(j) = \sigma(\tau(j)) = \sigma(\theta(j)) = \sigma(j) = j = \theta(j)$$

Si $j \in \{i_1, \dots, i_{k+1}\} \cap \{i_1, \theta(i_1), \dots, \theta^{p-1}(i_1)\}$, entonces $j = \theta^l(i_1)$ con $0 \leq l \leq p-1$.

$$\theta(j) = \theta^{l+1}(i_1) \quad \text{y} \quad \sigma \circ \tau(j) = \sigma(\tau(j)) = \sigma(\theta^l(i_1)) = \theta^{l+1}(i_1) = \theta(j)$$

(Definición: Como j está en el soporte de σ , $\tau(j) = \theta(j)$, luego $\sigma(\theta(j)) = \theta(j)$. Y como σ es el ciclo $(i_1, \dots, \theta^{p-1}(i_1))$, $\sigma(j) = \theta(j)$). En cualquier caso $\theta(j) = (\sigma \circ \tau)(j)$ por lo tanto $\theta = \sigma \circ \tau$.

Ahora τ mueve a los elementos $\{i_1, \dots, i_{k+1}\} \setminus \{i_1, \sigma(i_1), \dots, \sigma^{p-1}(i_1)\}$ cuya cardinalidad es menor o igual a k . Por hipótesis de inducción τ es producto de ciclos disjuntos y por lo tanto θ lo es.

Unicidad: Suponga ahora que

$$\theta = \sigma_1 \dots \sigma_k = \tau_1 \dots \tau_l$$

Con los σ_i 's ciclos disjuntos a pares y los τ_i 's ciclos disjuntos a pares.

Si $\theta = id$ no hay nada que ver, si no, sea i_1 un elemento que mueve θ , entonces existen $1 \leq i \leq k$ y $1 \leq j \leq l$ tales que σ_i, τ_j mueven a i_1 , de hecho i, j son únicos pues los σ_i 's y los τ_i 's son disjuntos o más aún como son disjuntos conmutan, por lo que podemos pensar que $i = 1 = j$, en este caso $\sigma_2, \dots, \sigma_k, \tau_2, \dots, \tau_l$ no mueven a i_1 .

Además $\sigma_1 = (i_1, \sigma_1(i_1), \dots, \sigma_1^{s-1}(i_1))$, $\tau_1 = (i_1, \tau_1(i_1), \dots, \tau_1^{r-1}(i_1))$ con s y r los órdenes de σ_1 y τ_1 respectivamente. Como los σ_i 's son disjuntos σ_j no mueve a ninguno de $\{i_1, \sigma(i_1), \dots, \sigma^{k-1}(i_1)\} \forall 1 < j \leq k$. Análogamente τ_j no mueve a ninguno de

$\{i_1, \tau(i_1), \dots, \tau^{l-1}(i_1)\} \forall 1 < j \leq l$. Por tanto para $m \in \mathbb{N}$

$$\begin{aligned}\theta^m(i_1) &= (\sigma_1 \dots \sigma_k)^m(i_1) = (\sigma_1 \dots \sigma_k)^{m-1}((\sigma_1 \dots \sigma_k)(i_1)) \\ &= (\sigma_1 \dots \sigma_k)^{m-1}(\sigma_1(i_1)) = \dots = \sigma_1^m(i_1)\end{aligned}$$

Análogamente

$$\begin{aligned}\theta^m(i_1) &= \tau_1^m(i_1) \\ \sigma_1^m(i_1) &= \tau_1^m(i_1)\end{aligned}$$

Ahora podemos suponer que $s \leq r$, entonces

$$i_1 = \sigma_1^s(i_1) = \tau_1^s(i_1)$$

$s > r - 1$ o $s \geq r$, de donde $s = r$.

Más aún, como $\sigma_1^m(i_1) = \tau_1^m(i_1) \forall m \in \mathbb{N}$ se tiene que $\sigma_1 = \tau_1$. Ahora de la igualdad $\theta = \sigma_1 \dots \sigma_k = \tau_1 \dots \tau_l$ se obtiene $\sigma_2 \dots \sigma_k = \tau_2 \dots \tau_l$. Podemos suponer $k \leq l$. En cuyo caso realizando el mismo proceso obtenemos $\sigma_k = \tau_k$ y $Id = \tau_{k+1} \dots \tau_l$. Como los τ_j son disjuntos a pares necesariamente $\tau_{k+1} \dots \tau_l$ tienen longitud uno. Por lo tanto $l = k$. $\square$

Corolario 4.2.1. *Sea $\theta \in S_n$, entonces el orden de θ es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los ciclos que aparecen en su factorización.*

Demostración.

Sea $\theta = \sigma_1 \dots \sigma_k$ con los σ_i 's ciclos disjuntos a pares y $n_i = o(\sigma_i)$, $m = [n_1, \dots, n_k]$ entonces

$$\theta^m = (\sigma_1 \dots \sigma_k)^m = \sigma_1^m \dots \sigma_k^m = id$$

De donde $o(\theta) \mid m$. Si $o(\theta) < m$, $Id = \theta^{o(\theta)} = \sigma_1^{o(\theta)} \dots \sigma_k^{o(\theta)}$, por lo cual $n_i \mid o(\theta) \forall i$, de donde $m = [n_1, \dots, n_k] \mid o(\theta)$ de donde $m = o(\theta)$. $\square$

Observación 4.2.2. 1. Sea $(i\ j)$ una transposición de S_n , entonces $(i\ j) = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$.

2. Sean $x_1, \dots, x_n$ variables. Definimos

$$P_n = P_n(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \quad \forall n \geq 2$$

y hagamos actuar el grupo de permutaciones sobre P_n de la siguiente forma. Para $\theta \in S_n$:

$$\theta(P_n) = P_n^\theta = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\theta(i)} - x_{\theta(j)})$$

3. Si $1 < k \leq n$ y $\theta = (1, k)$, entonces $\theta(P_n) = -P_n$.

4. Si $\theta = (i\ j)$ es una transposición, $\theta(P_n) = -P_n$.

5. Sea $\theta \in S_n$ un r -ciclo, entonces θ es producto de transposiciones (se puede representar como un producto de transposiciones, no necesariamente única).

Demostración de 1).

Queremos demostrar que la transposición $(i\ j)$ es igual al producto $(1\ i)(1\ j)(1\ i)$. Llamemos $\sigma = (1\ i)(1\ j)(1\ i)$ y evaluemos su acción sobre los elementos de $\{1, \dots, n\}$ actuando de derecha a izquierda (orden de composición de funciones). Asumimos $1, i, j$ distintos (si alguno es igual, la igualdad es trivial).

■ Para el elemento 1:

$$1 \xrightarrow{(1\ i)} i \xrightarrow{(1\ j)} i \xrightarrow{(1\ i)} 1$$

Luego $\sigma(1) = 1$. (El 1 queda fijo, lo cual es correcto pues $(i\ j)$ no mueve al 1).

■ Para el elemento i :

$$i \xrightarrow{(1\ i)} 1 \xrightarrow{(1\ j)} j \xrightarrow{(1\ i)} j$$

Luego $\sigma(i) = j$.

■ Para el elemento j :

$$j \xrightarrow{(1\ i)} j \xrightarrow{(1\ j)} 1 \xrightarrow{(1\ i)} i$$

Luego $\sigma(j) = i$.

■ Para cualquier otro elemento $k \notin \{1, i, j\}$: Todas las transposiciones en el producto fijan a k , por lo tanto $\sigma(k) = k$.

Como σ intercambia i con j y deja fijos a los demás elementos (incluido el 1), concluimos que $\sigma = (i\ j)$. $\square$

Demostración de 2).

Queremos verificar que la acción definida cumple con la propiedad de grupo $(\tau \circ \theta)(P_n) = \tau(\theta(P_n))$.

Recordemos que la acción de una permutación σ sobre un polinomio en variables $x_1, \dots, x_n$ consiste en reemplazar cada subíndice k por $\sigma(k)$. Es decir, σ actúa sobre las posiciones de las variables.

Sea $P_n = \prod (x_i - x_j)$. Primero aplicamos θ :

$$\theta(P_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\theta(i)} - x_{\theta(j)})$$

Llamemos $Q(x_1, \dots, x_n)$ a este nuevo polinomio. Notemos que el término que ocupaba la posición asociada al índice k ahora tiene el índice $\theta(k)$.

Ahora aplicamos τ al polinomio Q . La regla dice que τ reemplaza cualquier variable con índice m por la variable con índice $\tau(m)$. En Q , tenemos variables de la forma $x_{\theta(i)}$. Aquí el índice es $m = \theta(i)$. Al aplicar τ , reemplazamos $x_{\theta(i)}$ por $x_{\tau(\theta(i))}$.

$$\tau(\theta(P_n)) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\tau(\theta(i))} - x_{\tau(\theta(j))})$$

Por otro lado, consideremos la permutación compuesta $\rho = \tau \circ \theta$. Si aplicamos ρ directamente a P_n , reemplazamos cada índice k por $\rho(k) = \tau(\theta(k))$.

$$(\tau \circ \theta)(P_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{(\tau \circ \theta)(i)} - x_{(\tau \circ \theta)(j)}) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_{\tau(\theta(i))} - x_{\tau(\theta(j))})$$

Comparando ambas expresiones, tenemos que $(\tau \circ \theta)(P_n) = \tau(\theta(P_n))$. □

Demostración de 3).

Procedamos por inducción sobre n .

Para $n = 2$, tenemos $1 < k \leq 2 \implies k = 2$, luego $\theta = (1, 2)$.

$$\theta(P_2) = \theta(x_1 - x_2) = x_{\theta(1)} - x_{\theta(2)} = x_2 - x_1 = -(x_1 - x_2) = -P_2$$

Suponga el resultado cierto para n , es decir, para $1 < k \leq n$. Note que:

$$\begin{aligned} P_{n+1} &= \prod_{1 \leq i < j \leq n+1} (x_i - x_j) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{n+1}) \\ &= P_n \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{n+1}) \end{aligned}$$

Caso A: Si $1 < k \leq n$, entonces $\theta = (1, k) \in S_n \subseteq S_{n+1}$ (fija a $n+1$).

$$\begin{aligned} \theta(P_{n+1}) &= \theta \left(P_n \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{n+1}) \right) \\ &= \theta(P_n) \cdot \theta \left(\prod_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{n+1}) \right) \\ &\stackrel{\text{H.I.}}{=} (-P_n) \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (x_{\theta(i)} - x_{n+1}) \end{aligned}$$

Como θ solo permuta los elementos $\{1, \dots, n\}$, el conjunto de factores en la productoria es el mismo (solo cambia el orden), por lo tanto el producto permanece invariante.

$$= -P_n \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{n+1}) = -P_{n+1}$$

Caso B: Si $k = n + 1$, entonces $\theta = (1, n + 1)$. Descomponemos P_{n+1} cuidadosamente:

$$\begin{aligned} \theta(P_{n+1}) &= \theta \left[\prod_{1 < i < j \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 < j \leq n} (x_1 - x_j) \cdot \prod_{1 < i < n+1} (x_i - x_{n+1}) \cdot (x_1 - x_{n+1}) \right] \\ &= \prod_{1 < i < j \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 < j \leq n} (x_{n+1} - x_j) \cdot \prod_{1 < i < n+1} (x_i - x_1) \cdot (x_{n+1} - x_1) \\ &= \prod_{1 < i < j \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 < j \leq n} [-(x_j - x_{n+1})] \cdot \prod_{1 < i < n+1} [-(x_1 - x_i)] \cdot [-(x_1 - x_{n+1})] \\ &\quad - \left[\prod_{1 < i < j \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 < j \leq n} (x_j - x_{n+1}) \cdot \prod_{1 < i < n+1} (x_1 - x_i) \cdot (x_1 - x_{n+1}) \right] \\ &= - \left(\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j) \cdot \prod_{1 \leq j \leq n} (x_j - x_{n+1}) \right) \\ &= P_n \cdot \prod_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{n+1}) = -P_{n+1} \end{aligned}$$

□

Demostración de 4).

Si $\theta = (i \ j)$ es una transposición, por la observación 1 sabemos que $(i \ j) = (1 \ i)(1 \ j)(1 \ i)$. Usando la propiedad 3 repetidamente:

$$\begin{aligned} \theta(P_n) &= [(1 \ j)(1 \ i)(1 \ j)]P_n \\ &= (1 \ j)((1 \ i)((1 \ j)P_n)) \\ &= (1 \ j)((1 \ i)(-P_n)) \\ &= (1 \ j)(-(-P_n)) \\ &= (1 \ j)(P_n) = -P_n \end{aligned}$$

□

Demostración de 5).

Sea $\theta = (i_1, \dots, i_k)$ un k -ciclo. Podemos descomponerlo verificando la acción sobre los elementos:

$$(i_1, \dots, i_k) = (i_1, i_2)(i_2, i_3) \dots (i_{k-2}, i_{k-1})(i_{k-1}, i_k)$$

□

Ejemplo 4.4. $(1 \ 2 \ 3) = (1 \ 2)(2 \ 3)$. También se puede escribir de forma no única, por ejemplo: $(1 \ 2 \ 3) = (4 \ 5)(1 \ 2)(2 \ 3)(4 \ 5) = (1 \ 2)(1 \ 2)(1 \ 2)(2 \ 3)(3 \ 2)(3 \ 2)$.

Teorema 4.2.2. *Sea $\theta \in S_n$, entonces θ se representa siempre como un producto de una cantidad par de transposiciones ó siempre como un producto de una cantidad impar de transposiciones.*

Demostración.

Por un teorema anterior θ es producto de ciclos disjuntos y cada ciclo es producto de transposiciones, luego θ es producto de transposiciones. Suponga que:

$$\theta = \sigma_1 \dots \sigma_k = \tau_1 \dots \tau_s \quad \text{con}$$

σ_i 's y τ_j 's transposiciones, entonces para P_n el polinomio definido anteriormente

$$\theta(P_n) = (\sigma_1 \dots \sigma_k)(P_n) = (-1)^k P_n = (\tau_1 \dots \tau_s)P_n = (-1)^s P_n$$

De donde $(-1)^k = (-1)^s$ o $(-1)^{k-s} = 1$, es decir, $k - s$ siempre es par, luego ambos son pares o ambos son impares. $\square$

Definición 4.2.3. *Sea $\theta \in S_n$ diremos que θ es par si al representarla como producto de transposiciones consta de un número par de ellas. Es impar en caso contrario.*

Observación 4.2.3. *Sea $A_n = \{\theta \in S_n \mid \theta \text{ es par}\} \forall n \geq 2$, entonces $A_n \leq S_n$, con $[S_n : A_n] = 2$ y por lo tanto $A_n \trianglelefteq S_n$.*

Demostración.

Primero probemos que es un subgrupo ($A_n \leq S_n$). Si $\theta \in A_n$, entonces $\theta = \tau_1 \dots \tau_s$ con $s = 2k$ y los τ_i 's son transposiciones. Luego, el inverso es $\theta^{-1} = (\tau_1 \dots \tau_s)^{-1} = \tau_s^{-1} \dots \tau_1^{-1}$. Como la inversa de una transposición es ella misma ($\tau_i^{-1} = \tau_i$), tenemos $\theta^{-1} = \tau_s \dots \tau_1$, que sigue teniendo $s = 2k$ transposiciones. Así, $\theta^{-1} \in A_n$.

Si además $\theta_1 \in A_n$, digamos $\theta_1 = \rho_1 \dots \rho_r$ con $r = 2l$ y ρ_j 's transposiciones. Entonces el producto $\theta \circ \theta_1 = \tau_1 \dots \tau_s \rho_1 \dots \rho_r$ consta de $s + r = 2k + 2l = 2(k + l)$ transposiciones. Como $2(k + l)$ es par, $\theta \circ \theta_1 \in A_n$. Por lo tanto $A_n \leq S_n$.

Ahora analicemos el índice. Si $\theta \in S_n$, entonces: Si θ es par, $\theta \in A_n$. Si θ es impar, entonces $\theta \notin A_n$, es decir, $\theta A_n \neq A_n$.

Más aún, para cualquier otra permutación impar $\theta_1 \in S_n$, veamos que definen la misma clase lateral, es decir $\theta A_n = \theta_1 A_n$. Esto ocurre si y solo si $\theta_1^{-1} \theta \in A_n$. Como θ y θ_1 son impares, podemos escribirlas como:

$$\theta = \tau_1 \dots \tau_{2k+1} \quad \text{y} \quad \theta_1 = \rho_1 \dots \rho_{2m+1}$$

con los τ_i y ρ_j transposiciones. Entonces:

$$\theta_1^{-1} \theta = (\rho_1 \dots \rho_{2m+1})^{-1} (\tau_1 \dots \tau_{2k+1}) = \rho_{2m+1} \dots \rho_1 \tau_1 \dots \tau_{2k+1}$$

El número total de transposiciones es $(2m + 1) + (2k + 1) = 2m + 2k + 2 = 2(m + k + 1)$, que es un número par. Por lo tanto $\theta_1^{-1} \theta \in A_n$, lo que implica $\theta A_n = \theta_1 A_n$.

Así que las clases laterales izquierdas son exactamente dos: A_n (las pares) y θA_n (las impares, donde θ es cualquier permutación impar fija). Luego, $[S_n : A_n] = 2$.

En particular, como 2 es el menor primo que divide a $|S_n| = n!$ (para $n \geq 2$), sabemos por un resultado anterior que cualquier subgrupo de índice igual al menor primo divisor del orden del grupo es normal. Así que $A_n \trianglelefteq S_n$. $\square$

Teorema 4.2.3. $A_n = \langle \{\theta \in S_n \mid \theta \text{ es un 3-ciclo}\} \rangle$, $n \geq 3$.

Demostración.

Sea $H = \langle \{\theta \in S_n \mid \theta \text{ es 3-ciclo}\} \rangle$. Sea θ un 3-ciclo, es decir, $\theta = (a_1, a_2, a_3)$, entonces

$$\theta = (a_1, a_2, a_3) = (a_1, a_2)(a_2, a_3) \in A_n$$

luego

$$\langle \{\theta \in S_n \mid \theta \text{ es 3-ciclo}\} \rangle \subseteq A_n$$

Para la contención inversa basta ver que cada producto de 2 transposiciones es un producto de 3-ciclos. Consideremos (a_1, a_2) y (b_1, b_2) 2 transposiciones.

Si $\{a_1, a_2\} = \{b_1, b_2\}$, entonces:

$$(a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1, a_2)(a_1, a_2) = id = (a_1, a_2, a_3)(a_1, a_3, a_2)$$

Si tiene un solo elemento distinto podemos suponer que son $(a_1, a_2), (a_2, b_2)$ con $a_1 \neq b_2$ y:

$$(a_1, a_2)(a_2, b_2) = (a_1, a_2, b_2)$$

Si no tienen elementos en común, es decir $(a_1, a_2)(b_1, b_2)$:

$$(a_1, a_2)(b_1, b_2) = (a_1, a_2, b_1)(a_2, b_1, b_2)$$

En cualquier caso cada par de transposiciones es el producto de 3-ciclos, luego, cada permutación par es producto de 3-ciclos, así

$$A_n \subseteq \langle \{\theta \in S_n \mid \theta \text{ es 3-ciclo}\} \rangle \quad \text{y} \quad A_n = H$$

$\square$

Teorema 4.2.4. Sea $n \geq 2$, entonces A_n es el único subgrupo de índice 2 de S_n .

Demostración.

Si $n = 2$, $A_2 = \{e\}$ y es claro el resultado. Suponga $n \geq 3$ y sea $H \leq S_n$ tal que $[S_n : H] = 2$.

Probemos que H contiene a todos los 3-ciclos. Sea σ un 3-ciclo. Como $[S_n : H] = 2$, sabemos que H es un subgrupo normal de S_n ($H \trianglelefteq S_n$). Consideremos el grupo cociente S_n/H , el cual tiene orden 2. Por lo tanto, el cuadrado de cualquier elemento en el cociente es la identidad del cociente (H). Es decir:

$$(\sigma H)^2 = \sigma^2 H = H \implies \sigma^2 \in H$$

Ahora, dado que σ es un 3-ciclo, su orden es 3, por lo que $\sigma^3 = id$. Esto implica que $\sigma^4 = \sigma$. Podemos escribir σ como:

$$\sigma = \sigma^4 = (\sigma^2)^2$$

Como ya demostramos que $\sigma^2 \in H$ y H es un subgrupo (cerrado bajo la operación), entonces el cuadrado de σ^2 también debe estar en H . Por lo tanto, $\sigma \in H$.

Esto demuestra que H contiene a todos los 3-ciclos. Como sabemos por un teorema anterior que A_n está generado por los 3-ciclos, concluimos que $A_n \subseteq H$.

Finalmente, utilizamos la multiplicidad del índice:

$$[S_n : A_n] = [S_n : H][H : A_n]$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$2 = 2 \cdot [H : A_n] \implies [H : A_n] = 1$$

Lo cual implica que $H = A_n$. □

Observación 4.2.4. Consideremos el grupo multiplicativo $\{1, -1\}$ con la operación definida por:

$$1 \cdot 1 = 1, \quad 1(-1) = -1, \quad (-1)(-1) = 1$$

Definamos la función $\varphi : S_n \rightarrow \{1, -1\}$ como:

$$\varphi(\theta) = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta \text{ es par} \\ -1 & \text{si } \theta \text{ es impar} \end{cases}$$

Demostración.

φ es homomorfismo. a) Si θ, θ_1 son pares, $\theta \cdot \theta_1$ es par y $\varphi(\theta \cdot \theta_1) = 1 = \varphi(\theta)\varphi(\theta_1)$. Si θ es par y θ_1 impar o viceversa, $\theta \cdot \theta_1$ es impar, luego $\varphi(\theta\theta_1) = -1 = \varphi(\theta)\varphi(\theta_1)$. Si θ y θ_1 son impares $\varphi(\theta) = -1 = \varphi(\theta_1)$ y $\theta\theta_1$ es par y

$$\varphi(\theta\theta_1) = 1 = (-1)(-1) = \varphi(\theta)\varphi(\theta_1)$$

En cualquier caso $\varphi(\theta\theta_1) = \varphi(\theta)\varphi(\theta_1)$. Más aún $\theta \in \text{Ker } \varphi$ si y solo si $\varphi(\theta) = 1$ si y solo si θ es par si y solo si $\theta \in A_n$ si y solo si $\text{Ker } \varphi = A_n$. □

Nota 4.2.2. φ es sobreyectiva.

$$\frac{S_n}{A_n} \cong \{1, -1\} \implies [S_n : A_n] = 2 \quad \text{y} \quad A_n \trianglelefteq S_n$$

Definición 4.2.4. Sea $\theta, \theta_1 \in G$, G grupo diremos que θ y θ_1 son conjugados si existe $\sigma \in G$ tal que $\theta = \sigma\theta_1\sigma^{-1}$ (conjugación).

Observación 4.2.5. Ser conjugado determina una relación de equivalencia, es decir, la relación $\theta \sim \theta_1$ si y solo si θ y θ_1 son conjugados es de equivalencia.

i) Reflexiva: $\theta \sim \theta$ pues $\theta = e\theta e^{-1}$.

ii) Simétrica: $\theta \sim \theta_1$ si y solo si existe $\sigma \in G$ tal que $\theta = \sigma\theta_1\sigma^{-1}$ si y solo si existe $\sigma \in G$ tal que $\theta_1 = \sigma^{-1}\theta\sigma$ si y solo si existe $\sigma^{-1} \in G$ tal que $\theta_1 = \sigma^{-1}\theta(\sigma^{-1})^{-1}$ si y solo si $\theta_1 \sim \theta$.

iii) Transitiva: $\theta \sim \theta_1$ y $\theta_1 \sim \theta_2$ entonces existen $\sigma_1, \sigma_2 \in G$ tales que $\theta = \sigma_1\theta_1\sigma_1^{-1}$, $\theta_1 = \sigma_2\theta_2\sigma_2^{-1}$, entonces

$$\theta = \sigma_1(\sigma_2\theta_2\sigma_2^{-1})\sigma_1^{-1} = (\sigma_1\sigma_2)(\theta_2)(\sigma_2^{-1}\sigma_1^{-1}) = (\sigma_1\sigma_2)(\theta_2)(\sigma_1\sigma_2)^{-1}$$

y $\sigma_1\sigma_2 \in G$, luego $\theta \sim \theta_2$.

A las clases de equivalencia correspondientes las llamaremos clases de conjugación. Denotemos a la clase de conjugación de θ por $[\theta]$. Entonces para $\theta \in G$, $[\theta] = \{\theta\}$ si y solo si $\theta \in Z(G)$, $[\theta] = \{\sigma\theta\sigma^{-1} \mid \sigma \in G\} = \{\theta\}$ si y solo si $\sigma\theta\sigma^{-1} = \theta \forall \sigma \in G$ si y solo si $\sigma\theta = \theta\sigma \forall \sigma \in G$ si y solo si $\theta \in Z(G)$.

Definición 4.2.5. Sean $\theta_1, \theta_2 \in S_n$, diremos que θ_1 y θ_2 tienen la misma estructura en ciclos cuando $\theta_1 = \sigma_1 \dots \sigma_s$, $\theta_2 = \tau_1 \dots \tau_k$ son las respectivas factorizaciones de θ_1 y θ_2 como producto de ciclos disjuntos, entonces $s = k$ y salvo el orden σ_i y τ_i son conjugados (tienen la misma longitud) $\forall 1 \leq i \leq s = k$.

Ejemplo 4.5. 1. Considere S_6 . $\theta_1 = (1 \ 3)(4 \ 5 \ 6)$, $\theta_2 = (2 \ 4)(1 \ 3 \ 5)$. θ_1 y θ_2 tienen la misma estructura en ciclos.

2. Considere S_{10} . $\theta_1 = (1 \ 2)(3 \ 4)(5 \ 6 \ 7)$, $\theta_2 = (3 \ 4)(5 \ 6 \ 7)(8 \ 9 \ 10)$. θ_1 y θ_2 tienen la misma estructura en ciclos.

Observación 4.2.6. Si $\theta = (a_1, \dots, a_r)$ es un r -ciclo y $\gamma \in S_n$, entonces:

$$\gamma\theta\gamma^{-1} = (\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_r))$$

Es decir, conjugar un ciclo θ por γ resulta en un ciclo de la misma longitud obtenido aplicando γ a los elementos de θ .

Demostración.

En efecto. Si $a = \gamma(a_i)$ para algún $1 \leq i \leq r$, entonces $\gamma^{-1}(a) = a_i$.

$$(\gamma\theta\gamma^{-1})(a) = (\gamma \circ \theta)(\gamma^{-1}(a)) = \gamma(\theta(a_i)) = \gamma(a_{i+1})$$

(Con la convención $a_{r+1} = a_1$). Esto coincide con la acción del ciclo $(\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_r))$ sobre el elemento $a = \gamma(a_i)$.

Si $a \notin \{\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_r)\}$, entonces $\gamma^{-1}(a) \notin \{a_1, \dots, a_r\}$. Como θ fija los elementos fuera de su soporte:

$$\theta(\gamma^{-1}(a)) = \gamma^{-1}(a)$$

Así:

$$(\gamma \circ \theta \circ \gamma^{-1})(a) = \gamma(\theta(\gamma^{-1}(a))) = \gamma(\gamma^{-1}(a)) = a$$

Por lo tanto, $\gamma\theta\gamma^{-1}$ fija a todo elemento fuera de $\{\gamma(a_1), \dots, \gamma(a_r)\}$.

En conclusión:

$$\gamma\theta\gamma^{-1} = (\gamma(a_1) \dots \gamma(a_r))$$

□

Teorema 4.2.5. Sean $\theta_1, \theta_2 \in S_n$, entonces θ_1 y θ_2 tienen la misma estructura en ciclos si y solo si θ_1 y θ_2 son conjugados.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que θ_1 y θ_2 tienen la misma estructura en ciclos. Sean $\theta_1 = \sigma_1 \dots \sigma_k$ y $\theta_2 = \tau_1 \dots \tau_k$ sus respectivas descomposiciones en ciclos disjuntos (incluyendo los ciclos de longitud 1 para cubrir todo el conjunto $\{1, \dots, n\}$). Podemos ordenar los ciclos de tal manera que σ_i y τ_i tengan la misma longitud para todo $1 \leq i \leq k$.

Denotemos los elementos de cada ciclo como:

$$\sigma_i = (a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,r_i}) \quad \text{y} \quad \tau_i = (b_{i,1}, b_{i,2}, \dots, b_{i,r_i})$$

donde r_i es la longitud del ciclo i .

Definamos la permutación $\gamma \in S_n$ tal que aplique cada elemento de σ_i en el elemento correspondiente de τ_i . Es decir:

$$\gamma(a_{i,j}) = b_{i,j} \quad \forall 1 \leq i \leq k, 1 \leq j \leq r_i$$

Como los ciclos son disjuntos y cubren todo el conjunto, γ es una biyección bien definida.

Ahora verifiquemos la conjugación para cada ciclo. Por la observación anterior:

$$\gamma\sigma_i\gamma^{-1} = (\gamma(a_{i,1}), \dots, \gamma(a_{i,r_i})) = (b_{i,1}, \dots, b_{i,r_i}) = \tau_i$$

Entonces:

$$\gamma\theta_1\gamma^{-1} = \gamma(\sigma_1 \dots \sigma_k)\gamma^{-1} = (\gamma\sigma_1\gamma^{-1}) \dots (\gamma\sigma_k\gamma^{-1}) = \tau_1 \dots \tau_k = \theta_2$$

Por lo tanto, θ_1 y θ_2 son conjugados.

$\Leftarrow$) Supongamos ahora que θ_1 y θ_2 son conjugados. Es decir, existe $\gamma \in S_n$ tal que $\theta_2 = \gamma\theta_1\gamma^{-1}$. Sea $\theta_1 = \sigma_1 \dots \sigma_k$ la descomposición de θ_1 en ciclos disjuntos. Entonces:

$$\theta_2 = \gamma(\sigma_1 \dots \sigma_k)\gamma^{-1} = (\gamma\sigma_1\gamma^{-1}) \dots (\gamma\sigma_k\gamma^{-1})$$

Por la observación anterior, cada término $(\gamma\sigma_i\gamma^{-1})$ es un ciclo de la misma longitud que σ_i . Además, como los σ_i son disjuntos a pares, sus conjugados también lo son (si σ_i y σ_j no mueven elementos en común, sus conjugados tampoco).

Por la unicidad de la descomposición en ciclos disjuntos (salvo el orden), concluimos que la estructura de ciclos de θ_2 es exactamente la misma que la de θ_1 (los mismos ciclos transformados, conservando sus longitudes). $\square$

Corolario 4.2.2. Sea $n \geq 3$.

- a) Si $N \trianglelefteq A_n$ y N contiene un 3-ciclo, entonces $N = A_n$.
- b) Si $N \trianglelefteq S_n$ y N contiene una transposición (2-ciclo), entonces $N = S_n$.

Demostración.

a) Supongamos que $N \trianglelefteq A_n$ contiene un 3-ciclo $\theta_1 = (a_1 a_2 a_3)$. Queremos ver que N contiene a cualquier otro 3-ciclo $\theta_2 = (b_1 b_2 b_3)$, y dado que los 3-ciclos generan A_n , esto implicará $N = A_n$.

Sabemos que en S_n todos los 3-ciclos son conjugados. Es decir, existe $\gamma \in S_n$ tal que:

$$\theta_2 = \gamma\theta_1\gamma^{-1}$$

Analicemos si podemos garantizar que el conjugador esté en A_n (es decir, que sea par):

Caso $n \geq 5$: Si $\gamma \in A_n$, entonces $\theta_2 \in N$ por la normalidad de N en A_n . Si $\gamma \notin A_n$ (es impar), como $n \geq 5$, existen al menos dos elementos $\{c_1, c_2\}$ en $\{1, \dots, n\}$ que no están en el soporte de θ_1 (que tiene 3 elementos). Definimos $\gamma' = \gamma(c_1 c_2)$. Como $(c_1 c_2)$ es una transposición disjunta de θ_1 , conmuta con θ_1 . Además, γ' es par (producto de impar por impar). Entonces:

$$\gamma'\theta_1(\gamma')^{-1} = \gamma(c_1 c_2)\theta_1(c_1 c_2)^{-1}\gamma^{-1} = \gamma\theta_1\gamma^{-1} = \theta_2$$

Como $\gamma' \in A_n$ y $N \trianglelefteq A_n$, concluimos que $\theta_2 \in N$.

Caso $n = 3$: $A_3 = \{(1), (1 2 3), (1 3 2)\}$. Si N contiene un 3-ciclo, por ejemplo $(1 2 3)$, al ser subgrupo debe contener a su inverso $(1 3 2)$ y a la identidad. Por lo tanto, N contiene a todos los elementos de A_3 , así que $N = A_3$.

Caso $n = 4$: En A_4 , los 3-ciclos se dividen en dos clases de conjugación (por ejemplo, la clase de $(1 2 3)$ y la de $(1 3 2)$). Supongamos que N contiene a $\theta = (1 2 3)$. Como $N \trianglelefteq A_4$, N contiene a toda la clase de conjugación de θ en A_4 (que son 4 elementos: $(1 2 3), (1 4 2), (1 3 4), (2 4 3)$). Además, N debe contener a los inversos de estos elementos (por ejemplo, $(1 3 2)$). Al contener elementos de ambas clases de 3-ciclos y ser cerrado bajo productos, N contendrá a todos los 3-ciclos. Como los 3-ciclos generan A_4 , entonces $N = A_4$.

En todos los casos, $N = A_n$.

b) Sea $N \trianglelefteq S_n$ tal que contiene una transposición $\tau = (a b)$. Como N es normal en S_n , contiene a todos los conjugados de τ . Sabemos que en S_n cualquier transposición es conjugada de τ (tienen la misma estructura de ciclos). Por lo tanto, N contiene a todas las transposiciones. Como todo elemento de S_n se puede escribir como producto de transposiciones, concluimos que $N = S_n$. $\square$

Definición 4.2.6. Sea G un grupo. Diremos que G es simple si sus únicos subgrupos normales son $\{e\}$ y el mismo G .

Teorema 4.2.6. Sea $n \geq 5$, entonces el grupo alternante A_n es simple.

Demostración.

Sea $H \trianglelefteq A_n$ con $H \neq \{e\}$. Probaremos que H contiene un 3-ciclo. Por el corolario anterior, esto implicará que $H = A_n$. Sea $\alpha \in H$ con $\alpha \neq e$. Analicemos la descomposición de α en ciclos disjuntos:

Caso 1: α contiene un ciclo de longitud $r \geq 4$. Sea $\alpha = (a_1 a_2 a_3 \dots a_r)\tau$, donde τ son los demás ciclos disjuntos. Sea $\beta = (a_1 a_2 a_3) \in A_n$. Consideremos el conmutador $\rho = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} \in H$ (pues $H \trianglelefteq A_n$).

$$\begin{aligned}\rho &= \alpha(a_1 a_2 a_3)\alpha^{-1}(a_1 a_3 a_2) \\ &= (\alpha(a_1) \alpha(a_2) \alpha(a_3))(a_1 a_3 a_2) \\ &= (a_2 a_3 a_4)(a_1 a_3 a_2) \\ &= (a_1 a_4 a_2)\end{aligned}$$

Así, $\rho = (a_1 a_4 a_2)$ es un 3-ciclo que pertenece a H .

Caso 2: α contiene 3-ciclos en su descomposición. Si α es un 3-ciclo, ya terminamos. Si no, $\alpha = (a_1 a_2 a_3)(a_4 a_5 a_6) \dots$. Sea $\beta = (a_1 a_2 a_4) \in A_n$. Consideremos $\rho = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} \in H$:

$$\begin{aligned}\rho &= (\alpha(a_1) \alpha(a_2) \alpha(a_4))(a_1 a_4 a_2) \\ &= (a_2 a_3 a_5)(a_1 a_4 a_2) \\ &= (a_1 a_4 a_3 a_5 a_2)\end{aligned}$$

ρ es un 5-ciclo. Aplicando el Caso 1 a ρ , concluimos que H contiene un 3-ciclo.

Caso 3: α es producto de transposiciones disjuntas.

- i) $\alpha = (a_1 a_2)(a_3 a_4)$. (Solo dos transposiciones). Como $n \geq 5$, existe $a_5 \notin \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$. Sea $\beta = (a_1 a_2 a_5) \in A_n$.

$$\rho = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} = (a_2 a_1 a_5)(a_1 a_5 a_2) = (a_1 a_5)(a_2 a_5) = (a_1 a_2 a_5)$$

Obtenemos directamente un 3-ciclo en H .

- ii) $\alpha = (a_1 a_2)(a_3 a_4)(a_5 a_6) \dots$ (Más de dos transposiciones). Sea $\beta = (a_1 a_2 a_3) \in A_n$.

$$\rho = \alpha\beta\alpha^{-1}\beta^{-1} = (a_2 a_1 a_4)(a_1 a_3 a_2) = (a_1 a_4)(a_2 a_3)$$

Ahora ρ tiene la forma del subcaso (i) anterior. Aplicando el argumento de (i) a ρ , obtenemos un 3-ciclo.

En cualquier caso, H contiene un 3-ciclo. Por lo tanto, $H = A_n$. □

Teorema 4.2.7. A_4 no tiene subgrupos de orden 6.

Demostración.

Sabemos que $|A_4| = \frac{4!}{2} = 12$. Supongamos que existe $H \leq A_4$ tal que $|H| = 6$. Entonces el índice es $[A_4 : H] = \frac{12}{6} = 2$.

Sabemos que todo subgrupo de índice 2 es normal, por lo tanto $H \trianglelefteq A_4$. Además, en el grupo cociente A_4/H (que es de orden 2), el cuadrado de cualquier elemento es la identidad. Esto significa que para todo $\sigma \in A_4$, $\sigma^2 H = H$, es decir, $\sigma^2 \in H$.

Consideremos los 3-ciclos de A_4 . Sea θ un 3-ciclo. Entonces $\theta^3 = e$, de donde $\theta^4 = \theta$. Podemos escribir $\theta = (\theta^2)^2$. Como $\theta^2 \in H$ (por la propiedad del índice 2), y H es subgrupo, entonces $(\theta^2)^2 \in H$, luego $\theta \in H$.

Esto implica que H debe contener a **todos** los 3-ciclos de A_4 . Los 3-ciclos en A_4 son: $(1\ 2\ 3)$, $(1\ 3\ 2)$, $(1\ 2\ 4)$, $(1\ 4\ 2)$, $(1\ 3\ 4)$, $(1\ 4\ 3)$, $(2\ 3\ 4)$, $(2\ 4\ 3)$. Hay 8 3-ciclos en total.

Por lo tanto, $|H| \geq 8$, lo cual contradice la hipótesis de que $|H| = 6$. Concluimos que no existe tal subgrupo. $\square$

CAPÍTULO 5

Acciones de Grupos

5.1. Acciones de Grupo

Definición 5.1.1. Sea G un grupo y X un conjunto no vacío. Diremos que G actúa en X (o que X es un G -conjunto) si existe un homomorfismo $\varphi : G \rightarrow S_X$, donde S_X es el grupo de permutaciones de X (biyecciones de X en sí mismo).

Ejemplo 5.1. Teorema de Cayley: Todo grupo G actúa en sí mismo. Sea $X = G$ y definamos $\varphi : G \rightarrow S_G$ dada por $\varphi(g) = f_g$, donde $f_g : G \rightarrow G$ se define como $f_g(a) = ga$ para todo $a \in G$ (traslación izquierda).

Veamos que $f_g \in S_G$:

1. f_g es inyectiva: Si $f_g(a) = f_g(b)$, entonces $ga = gb$. Multiplicando por g^{-1} a la izquierda, obtenemos $a = b$.
2. f_g es sobreyectiva: Sea $b \in G$. Queremos encontrar a tal que $f_g(a) = b$. Tomamos $a = g^{-1}b$, entonces $f_g(g^{-1}b) = g(g^{-1}b) = (gg^{-1})b = b$.

Además, φ es un homomorfismo de grupos: Para $g, h \in G$, queremos ver que $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. Evaluando en un elemento $a \in G$:

$$\varphi(gh)(a) = f_{gh}(a) = (gh)a = g(ha) = f_g(ha) = f_g(f_h(a)) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(a)$$

Por lo tanto, $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$.

Teorema 5.1.1. *Sea G un grupo y X un conjunto no vacío. Las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. G actúa en X (existe un homomorfismo $\varphi : G \rightarrow S_X$).
2. Existe una función $\cdot : G \times X \rightarrow X$, denotada por $(g, x) \mapsto g \cdot x$, tal que:
 - a) $e \cdot x = x$ para todo $x \in X$.
 - b) $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$ para todo $g, h \in G$ y $x \in X$.

Demostración.

$\Rightarrow$) Supongamos que existe un homomorfismo $\varphi : G \rightarrow S_X$. Para cada $g \in G$, $\varphi(g)$ es una permutación de X , es decir, una función biyectiva $\varphi(g) : X \rightarrow X$. Definamos la función $\cdot : G \times X \rightarrow X$ mediante:

$$g \cdot x = (\varphi(g))(x)$$

para todo $g \in G$ y $x \in X$.

Verifiquemos las dos condiciones de la definición de acción:

- (i) Como φ es un homomorfismo de grupos, envía el neutro de G al neutro de S_X . Es decir, $\varphi(e) = Id_X$ (la función identidad en X). Entonces, para cualquier $x \in X$:

$$e \cdot x = (\varphi(e))(x) = Id_X(x) = x$$

- (ii) Sean $g, h \in G$ y $x \in X$. Por la definición de la operación y la propiedad de homomorfismo de φ :

$$(gh) \cdot x = (\varphi(gh))(x)$$

Como φ es homomorfismo, $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. Así:

$$(\varphi(gh))(x) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(x)$$

Por la definición de composición de funciones:

$$(\varphi(g) \circ \varphi(h))(x) = \varphi(g)(\varphi(h)(x))$$

Usando nuevamente la definición de la acción ($g \cdot y = \varphi(g)(y)$):

$$\varphi(g)(\varphi(h)(x)) = g \cdot (\varphi(h)(x)) = g \cdot (h \cdot x)$$

Por lo tanto, $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

$\Leftarrow$) Supongamos que existe una función $\cdot : G \times X \rightarrow X$ que satisface las condiciones (a) y (b). Queremos construir un homomorfismo $\varphi : G \rightarrow S_X$. Para cada $g \in G$, definamos la función $\sigma_g : X \rightarrow X$ dada por:

$$\sigma_g(x) = g \cdot x$$

Primero, debemos demostrar que σ_g es una biyección (es decir, $\sigma_g \in S_X$).

1. σ_g es inyectiva: Supongamos que $\sigma_g(x) = \sigma_g(y)$ para $x, y \in X$.

$$g \cdot x = g \cdot y$$

Operamos con g^{-1} por la izquierda (usando la propiedad (b)):

$$g^{-1} \cdot (g \cdot x) = g^{-1} \cdot (g \cdot y)$$

$$(g^{-1}g) \cdot x = (g^{-1}g) \cdot y$$

$$e \cdot x = e \cdot y$$

Usando la propiedad (a) ($e \cdot x = x$):

$$x = y$$

2. σ_g es sobreyectiva: Sea $y \in X$ arbitrario. Queremos encontrar $x \in X$ tal que $\sigma_g(x) = y$. Proponemos $x = g^{-1} \cdot y$. Evaluamos $\sigma_g(x)$:

$$\sigma_g(g^{-1} \cdot y) = g \cdot (g^{-1} \cdot y)$$

Por la propiedad (b):

$$g \cdot (g^{-1} \cdot y) = (gg^{-1}) \cdot y = e \cdot y$$

Por la propiedad (a):

$$e \cdot y = y$$

Así, σ_g es sobreyectiva.

Al ser inyectiva y sobreyectiva, $\sigma_g \in S_X$.

Ahora definimos la función $\varphi : G \rightarrow S_X$ como $\varphi(g) = \sigma_g$. Veamos que φ es un homomorfismo de grupos. Sean $g, h \in G$. Queremos ver que $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$. Dos funciones son iguales si toman el mismo valor para todo elemento del dominio. Sea $x \in X$:

$$(\varphi(gh))(x) = \sigma_{gh}(x) = (gh) \cdot x$$

Por otro lado:

$$(\varphi(g) \circ \varphi(h))(x) = \varphi(g)(\varphi(h)(x)) = \sigma_g(\sigma_h(x))$$

$$\sigma_g(\sigma_h(x)) = \sigma_g(h \cdot x) = g \cdot (h \cdot x)$$

Como la propiedad (b) nos dice que $(gh) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$, concluimos que:

$$(\varphi(gh))(x) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(x) \quad \forall x \in X$$

Por lo tanto, $\varphi(gh) = \varphi(g) \circ \varphi(h)$, y φ es un homomorfismo. $\square$

Ejemplo 5.2. 1. G actúa en sí mismo por multiplicación izquierda (o simplemente por la operación del grupo). La acción está dada por $\varphi : G \rightarrow S_G$ o equivalentemente $\tilde{\varphi} : G \times G \rightarrow G$ definida por:

$$(g, h) \mapsto gh$$

2. Sea G un grupo, $H \leq G$ y $X = \{aH \mid a \in G\}$ el conjunto de clases laterales izquierdas. G actúa en X por traslación izquierda. La acción está definida por $\varphi : G \rightarrow S_X$, donde para cada $g \in G$, la función $f_g : X \rightarrow X$ es:

$$f_g(aH) = (ga)H$$

Equivalentemente, $\tilde{\varphi}(g, aH) = gaH$.

3. Sea G un grupo y $X = \{H \mid H \leq G\}$ el conjunto de subgrupos de G . G actúa en X por conjugación. Definimos $\varphi : G \rightarrow S_X$ tal que $g \mapsto f_g$, con $f_g(H) = gHg^{-1}$. Verifiquemos que es una acción:

- $e \cdot H = eHe^{-1} = H$.
- $(gh) \cdot H = (gh)H(gh)^{-1} = g(hHh^{-1})g^{-1} = g(h \cdot H)g^{-1}$.

4. Sea G un grupo y $X = G$. G actúa en sí mismo por conjugación. Definimos la acción $\cdot : G \times G \rightarrow G$ como:

$$g \cdot h = ghg^{-1}$$

5. Sea $G = SL(2, \mathbb{C}) = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{C}) \mid \det A = 1\}$ y sea $X = \{z \in \mathbb{C} \mid \text{Im}(z) > 0\}$ el semiplano superior. Para $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$, definimos la acción:

$$A \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}$$

Se verifica que $I \cdot z = z$ y $A \cdot (B \cdot z) = (AB) \cdot z$.

6. Sea $X = \mathbb{R}^2$ y G el grupo de rotaciones del plano (isomorfo a $SO(2)$):

$$G = \{T_\theta : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \mid T_\theta(x, y) = (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta)\}$$

Entonces, para un punto $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, su órbita es:

$$\mathcal{O}_{(x_0, y_0)} = \{T_\theta(x_0, y_0) \mid T_\theta \in G\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = x_0^2 + y_0^2\}$$

Es decir, las órbitas son circunferencias centradas en el origen.

Definición 5.1.2. Diremos que una acción de G en X es transitiva si existe $x \in X$ tal que su órbita cubre todo el conjunto, es decir:

$$\mathcal{O}_x = G \cdot x = X$$

(Esto implica que solo existe una única órbita).

Definición 5.1.3. Sea X un G -conjunto. Diremos que $x \in X$ es un punto fijo si $g \cdot x = x$ para todo $g \in G$. Esto es equivalente a cualquiera de las siguientes condiciones:

- La órbita de x es trivial: $\mathcal{O}_x = \{x\}$.
- El estabilizador de x es todo el grupo: $St_G(x) = G$.

Observación 5.1.1. Si X es un G -conjunto y $x \in X$, entonces el estabilizador $St_G(x)$ es un subgrupo de G .

Demostración.

Sean $g, h \in St_G(x)$. Entonces $g \cdot x = x$ y $h \cdot x = x$. Esto implica que $h^{-1} \cdot x = x$ (multiplicando por h^{-1}). Luego:

$$(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = g \cdot x = x$$

Por lo tanto $gh^{-1} \in St_G(x)$, lo que prueba que es un subgrupo. $\square$

Nota 5.1.1. El conjunto de todos los puntos fijos de X bajo la acción de G se denota por X^G .

Observación 5.1.2. Sea X un G -conjunto, entonces las órbitas forman una partición de X .


Demostración.

Para ver esto basta verificar que inducen una relación de equivalencia, es decir, la relación en X definida por $x \sim y$ si y solo si y y x están en la misma órbita (si y solo si $y = g \cdot x$ para algún $g \in G$) es de equivalencia.

1. Reflexiva: Existe $e \in G$ tal que $e \cdot x = x$, así $x \sim x$.
2. Simétrica: $x \sim y$, entonces existe $g \in G$ tal que $y = g \cdot x$. Entonces $g^{-1} \cdot y = g^{-1} \cdot (g \cdot x) = e \cdot x = x$. Así, $x = g^{-1} \cdot y$, de donde $y \sim x$.
3. Transitiva: $x \sim y$ y $y \sim z$, entonces existen $g_1, g_2 \in G$ tales que $y = g_1 \cdot x$, $z = g_2 \cdot y$. Entonces

$$z = g_2 \cdot (g_1 \cdot x) = (g_2 g_1) \cdot x$$

luego $x \sim z$.



En particular si $\mathcal{O}_x = \text{Orb}(x) = G \cdot x$, tenemos:

$$X = \bigcup_{x \in X} \mathcal{O}_x = \left(\bigcup_{x \in X^G} \mathcal{O}_x \right) \cup \left(\bigcup_{x \notin X^G} \mathcal{O}_x \right) = \left(\bigcup_{x \in X^G} \{x\} \right) \cup \left(\bigcup_{x \notin X^G} \mathcal{O}_x \right)$$

En particular, si X es finito:

$$|X| = |X^G| + \left| \bigcup_{x \notin X^G} \mathcal{O}_x \right|$$

□

Ejemplo 5.3. Consideremos la acción de G en sí mismo por conjugación, es decir, la acción definida por:

$$g \cdot h = ghg^{-1} \quad \forall g, h \in G$$

En este caso, un elemento $h \in G$ es un punto fijo si y solo si su órbita tiene tamaño 1, es decir:

$$g \cdot h = h \quad \forall g \in G$$

Esto equivale a:

$$ghg^{-1} = h \iff gh = hg \quad \forall g \in G$$

Por lo tanto, el conjunto de puntos fijos de esta acción es exactamente el Centro de G :

$$G^G = Z(G) = \{h \in G \mid gh = hg, \forall g \in G\}$$

Aplicando la ecuación de las órbitas (vista anteriormente) a esta acción específica, obtenemos la ***Ecuación de Clase***:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x_i \notin Z(G)} [G : C_G(x_i)]$$

donde $C_G(x_i)$ es el centralizador de x_i (que corresponde al estabilizador bajo esta acción).

Teorema 5.1.2 (Teorema). Sea X un G -conjunto, $x \in X$, entonces existe una biyección entre las clases laterales de $S_t(x) \leq G$ y $\mathcal{O}_x$.

Demostración.

Definamos $\varphi : \mathcal{L} \rightarrow \mathcal{O}_x$ (donde $\mathcal{L}$ es el conjunto de clases laterales izquierdas) dada por:

$$gS_t(x) \mapsto g \cdot x$$

Note que esta asignación no depende del representante de clase. Si $gS_t(x) = g_1S_t(x)$, entonces $g^{-1}g_1 \in S_t(x)$, si y solo si $(g^{-1}g_1) \cdot x = x$, si y solo si $g_1 \cdot x = g \cdot x$. Es decir, $\varphi(gS_t(x)) = \varphi(g_1S_t(x))$. Luego, φ está bien definida.

φ es inyectiva:

$$\begin{aligned}\varphi(gS_t(x)) = \varphi(g_1S_t(x)) &\iff g \cdot x = g_1 \cdot x \iff g^{-1}g_1 \cdot x = x \\ &\iff g^{-1}g_1 \in S_t(x) \iff gS_t(x) = g_1S_t(x)\end{aligned}$$

φ es sobreyectiva: Dado $y \in \mathcal{O}_x$, existe $g \in G$ tal que $y = g \cdot x$, luego:

$$\varphi(gS_t(x)) = g \cdot x = y$$

Por lo tanto φ es biyectiva y en particular:

$$|\mathcal{O}_x| = |\mathcal{L}| = |\mathcal{G}| = [G : S_t(x)]$$

□

Observación 5.1.3. *Más aún, de la ecuación de las órbitas tenemos:*

$$|X| = |X^G| + \sum_{x \notin X^G} [G : St_G(x)]$$

Todavía más, si G actúa en sí mismo por conjugación. En este caso $X^G = Z(G)$ y al estabilizador $St_G(x)$ se le denomina el Centralizador de x en G y se denota por $C_G(x)$. La ecuación se convierte en:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x \notin Z(G)} [G : C_G(x)]$$

donde la suma corre sobre un sistema de representantes de las clases de conjugación no triviales.

Ejemplo 5.4. Sea G un grupo y $X = \{H \mid H \leq G\}$ el conjunto de subgrupos de G . Hagamos actuar a G en X por conjugación, es decir, la acción dada por:

$$g \cdot H = gHg^{-1}$$

En este caso, al estabilizador de un elemento $H \in X$ se le llama el Normalizador de H en G y se denota por $N_G(H)$.

$$N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$$

Observación 5.1.4. *Si $H \leq G$, entonces se cumplen las siguientes propiedades del normalizador $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$:*

1. $H \trianglelefteq G$ si y solo si $N_G(H) = G$.
2. $H \leq N_G(H)$ (es decir, H es un subgrupo del normalizador).
3. En general, no siempre ocurre que $N_G(H) = G$. (Ver ejemplo en S_3).
4. $H \trianglelefteq N_G(H)$ (es decir, H es un subgrupo normal de su propio normalizador).

Demostración de 1.

Queremos probar que $H \trianglelefteq G \iff N_G(H) = G$.

$\Rightarrow$) Supongamos que $H \trianglelefteq G$. Por definición de subgrupo normal, para todo $g \in G$ se cumple que $gHg^{-1} = H$. La definición del normalizador es $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$. Como la condición se cumple para todo $g \in G$, entonces todo elemento de G pertenece a $N_G(H)$. Por lo tanto, $G \subseteq N_G(H)$. Como $N_G(H) \subseteq G$ es siempre cierto, concluimos que $N_G(H) = G$.

$\Leftarrow$) Supongamos que $N_G(H) = G$. Esto significa que para todo $g \in G$, $g \in N_G(H)$. Por la definición del conjunto $N_G(H)$, esto implica que para todo $g \in G$, se cumple $gHg^{-1} = H$. Esta es exactamente la definición de que H sea un subgrupo normal de G . Por lo tanto, $H \trianglelefteq G$. $\square$

Demostración de 2.

Queremos probar que $H \subseteq N_G(H)$. Sea $h \in H$ un elemento arbitrario. Queremos ver que $h \in N_G(H)$, es decir, que $hHh^{-1} = H$.

Como H es un subgrupo (cerrado bajo la operación):

- Para cualquier $x \in H$, el conjugado $h x h^{-1}$ es producto de elementos de H , por lo que $h x h^{-1} \in H$. Esto muestra que $hHh^{-1} \subseteq H$.
- Para la contención inversa, dado $y \in H$, podemos escribir $y = h(h^{-1}yh)h^{-1}$. Como $h^{-1}yh \in H$, entonces y es un conjugado por h de un elemento de H .

(Más simplemente: conjugación por un elemento del mismo subgrupo es un automorfismo interno restringido que envía H en H).

Por lo tanto, $hHh^{-1} = H$ para todo $h \in H$. Así, todo elemento de H cumple la condición de estar en el normalizador. Conclusión: $H \leq N_G(H)$. $\square$

Demostración de 3 (Ejemplo en S_3).

Consideremos el grupo simétrico S_3 . Sea $N = \langle (1, 2, 3) \rangle = \{e, (1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$. Sabemos que $|S_3| = 6$ y $|N| = 3$. El índice es $[S_3 : N] = 2$, por lo que $N \trianglelefteq S_3$. Usando la propiedad 1, como es normal, su normalizador es todo el grupo: $N_{S_3}(N) = S_3$.

Ahora consideremos $H = \langle (1, 2) \rangle = \{e, (1, 2)\}$. Calculemos su normalizador $N_{S_3}(H)$. Buscamos los $g \in S_3$ tales que $gHg^{-1} = H$.

- Claramente $H \subseteq N_{S_3}(H)$ (por la propiedad 2), así que e y $(1, 2)$ están en el normalizador.
- Probemos con otro elemento, por ejemplo $\sigma = (1, 3)$. Conjugamos el generador de H :

$$(1, 3)(1, 2)(1, 3)^{-1} = (1, 3)(1, 2)(1, 3) = (2, 3)$$

Como $(2, 3) \notin H$, entonces $(1, 3)H(1, 3)^{-1} \neq H$. Por lo tanto, $(1, 3) \notin N_{S_3}(H)$.

De hecho, haciendo las cuentas para los demás elementos, vemos que el único subgrupo que normaliza a H es el mismo H . Así que $N_{S_3}(H) = H \neq S_3$. Esto demuestra que $N_G(H)$ no siempre es todo G . $\square$

Demostración de 4.

Queremos probar que $H \trianglelefteq N_G(H)$. Ya sabemos por la propiedad 2 que H es un subgrupo de $N_G(H)$. Solo falta probar la normalidad dentro de este grupo.

Sea $g \in N_G(H)$ un elemento cualquiera del normalizador. Por la definición misma de $N_G(H)$, este g cumple la condición:

$$gHg^{-1} = H$$

Esta igualdad nos dice directamente que conjugando H por cualquier elemento de $N_G(H)$, obtenemos H nuevamente.

Esta es, textualmente, la definición de ser subgrupo normal. Por lo tanto, H es normal en $N_G(H)$. $\square$

5.1.1. Teorema de Cauchy

Teorema 5.1.3 (Cauchy). *Sea G un grupo finito y p un número primo tal que p divide al orden de G ($p \mid |G|$). Entonces, G contiene al menos un elemento de orden p . Más precisamente, la cantidad de elementos de G de orden p es congruente con -1 módulo p .*

Demostración.

Consideremos el conjunto X formado por las p -tuplas de elementos de G cuyo producto es la identidad:

$$X = \{(x_1, x_2, \dots, x_p) \in G^p \mid x_1 x_2 \dots x_p = e\}$$

Paso 1: Calcular la cardinalidad de X . Para formar una tupla en X , podemos elegir los primeros $p - 1$ elementos $(x_1, \dots, x_{p-1})$ arbitrariamente en G . Una vez elegidos, el último elemento x_p está forzado, pues debe cumplir:

$$x_1 \dots x_{p-1} x_p = e \implies x_p = (x_1 \dots x_{p-1})^{-1}$$

Dado que x_p es único para cada elección de los primeros $p - 1$ términos, el tamaño de X es:

$$|X| = |G|^{p-1}$$

Como por hipótesis p divide a $|G|$, entonces p divide a $|G|^{p-1}$ (para $p - 1 \geq 1$), por lo que:

$$|X| \equiv 0 \pmod{p}$$

Paso 2: Definir la acción de grupo. Sea $\mathbb{Z}_p = \langle \sigma \rangle$ el grupo cíclico de orden p . Hacemos actuar a $\mathbb{Z}_p$ sobre el conjunto X mediante permutación cíclica de las componentes:

$$\sigma \cdot (x_1, x_2, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1)$$

Verifiquemos que esta acción está bien definida, es decir, que si $(x_1, \dots, x_p) \in X$, entonces su permutación cíclica también está en X . Si $x_1 x_2 \dots x_p = e$, multiplicando por x_1^{-1} a la izquierda y por x_1 a la derecha (conjugando por x_1), obtenemos:

$$x_1^{-1}(x_1 x_2 \dots x_p) x_1 = x_1^{-1} e x_1 = e$$

Simplificando el lado izquierdo:

$$(x_1^{-1}x_1)x_2 \dots x_px_1 = x_2 \dots x_px_1 = e$$

Por lo tanto, la tupla rotada $(x_2, \dots, x_p, x_1)$ cumple la condición de producto identidad y pertenece a X .

Paso 3: Analizar las órbitas y los puntos fijos. Por el Teorema Órbita-Estabilizador, el tamaño de cualquier órbita divide al orden del grupo que actúa. Aquí, $|\mathbb{Z}_p| = p$ (primo). Por tanto, el tamaño de cualquier órbita $|\mathcal{O}_x|$ solo puede ser 1 o p .

Las órbitas de tamaño 1 corresponden a los puntos fijos de la acción $(X^{\mathbb{Z}_p})$. Una tupla $x = (x_1, \dots, x_p)$ es un punto fijo si:

$$(x_1, x_2, \dots, x_p) = (x_2, x_3, \dots, x_p, x_1)$$

Esto implica que $x_1 = x_2 = \dots = x_p$. Además, como la tupla está en X , el producto debe ser la identidad:

$$x_1 \cdot x_1 \dots x_1 = x_1^p = e$$

Así, los puntos fijos son precisamente las tuplas de la forma $(g, g, \dots, g)$ donde $g^p = e$.

Paso 4: Conclusión usando la Ecuación de Clase. La ecuación de clase para esta acción es:

$$|X| = |X^{\mathbb{Z}_p}| + \sum |\mathcal{O}_{\text{tamaño } p}|$$

Tomando módulo p :

$$|X| \equiv |X^{\mathbb{Z}_p}| \pmod{p}$$

(Pues las órbitas de tamaño p son congruentes con 0 módulo p).

Sabemos por el Paso 1 que $|X| \equiv 0 \pmod{p}$. Entonces:

$$|X^{\mathbb{Z}_p}| \equiv 0 \pmod{p}$$

Sabemos que existe al menos un punto fijo trivial: la tupla $(e, e, \dots, e)$, donde $e^p = e$. Por lo tanto, $|X^{\mathbb{Z}_p}| \geq 1$. Como $|X^{\mathbb{Z}_p}|$ es un múltiplo de p y es al menos 1, debe ser al menos p (es decir, $|X^{\mathbb{Z}_p}| \geq p$).

Esto significa que existen al menos $p-1$ tuplas fijas distintas de la trivial. Sea $(a, a, \dots, a)$ una de estas tuplas con $a \neq e$. Entonces $a \in G$ satisface $a^p = e$ y $a \neq e$. Por lo tanto, a es un elemento de orden p . $\square$

Definición 5.1.4. Sea G un grupo y p un número primo. Diremos que G es un p -grupo si todo elemento de G tiene orden igual a una potencia de p . Es decir, para todo $g \in G$, existe $k \geq 0$ tal que $o(g) = p^k$.

Observación 5.1.5. Si G es un p -grupo, no necesariamente es finito. (Existen p -grupos infinitos, como por ejemplo el grupo de Prüfer $\mathbb{Z}_{p^\infty}$).

Corolario 5.1.1. Si G es un p -grupo finito, entonces $|G| = p^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Demostración.

Supongamos que $|G|$ no es una potencia de p . Entonces, por el Teorema Fundamental de la Aritmética, existe un primo q tal que $q \mid |G|$ y $q \neq p$. Por el Teorema de Cauchy, como q divide al orden del grupo, existe un elemento $g \in G$ tal que $o(g) = q$. Pero q no es una potencia de p (pues $q \neq p$ son primos). Esto contradice la hipótesis de que G es un p -grupo (todos sus elementos deben tener orden potencia de p). Por lo tanto, el único divisor primo de $|G|$ es p , lo que implica que $|G| = p^n$. $\square$

Corolario 5.1.2. *Sea G un grupo finito. Entonces G es un p -grupo si y solo si $|G| = p^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$.*

Demostración.

$\Rightarrow$) Ya fue probado en el corolario anterior.

$\Leftarrow$) Supongamos que $|G| = p^n$. Sea $g \in G$ un elemento cualquiera. Por el Teorema de Lagrange, el orden del elemento divide al orden del grupo, es decir, $o(g) \mid |G|$. Como $|G| = p^n$, los únicos divisores son de la forma p^k con $0 \leq k \leq n$. Por lo tanto, $o(g) = p^k$. Como esto vale para todo $g \in G$, concluimos que G es un p -grupo. $\square$

Ejemplo 5.5. *Sea G un grupo de orden pq , con p, q primos distintos. Sin pérdida de generalidad, supongamos $p < q$. Por el Teorema de Cauchy, existen elementos $a, b \in G$ tales que $o(a) = p$ y $o(b) = q$. Sean $H = \langle a \rangle$ y $K = \langle b \rangle$ los subgrupos generados.*

Observamos que:

- $[G : K] = p$. Como p es el menor primo que divide al orden de G (pues $p < q$), sabemos por un resultado anterior que $K \trianglelefteq G$.
- $H \cap K = \{e\}$, pues los órdenes de sus elementos son coprimos (salvo la identidad).
- $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = pq = |G|$, por lo tanto $G = HK$.

Ahora analizamos la normalidad de H :

- i) Si $H \trianglelefteq G$, como ya tenemos $K \trianglelefteq G$ y intersección trivial, entonces G es el producto directo interno:*

$$G \cong H \times K \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q \cong \mathbb{Z}_{pq}$$

En este caso, G es cíclico y abeliano.

- ii) Si H no es normal en G , entonces G no es abeliano (pues en un grupo abeliano todo subgrupo es normal). Sabemos que siempre existe el grupo cíclico $\mathbb{Z}_{pq}$. Si G no es abeliano, su estructura es un producto semidirecto no trivial.*

Corolario 5.1.3. *Sea G un grupo de orden p^2 , con p primo. Entonces G es abeliano.*

Demostración.

Por el Teorema de Cauchy, existe $a \in G$ tal que $o(a) = p$. Sea $H = \langle a \rangle$. Como $|H| = p$ y $|G| = p^2$, el índice es $[G : H] = p$. Como p es el menor primo que divide a $|G|$, entonces $H \trianglelefteq G$.

Consideremos un elemento $b \in G \setminus H$.

- Caso 1: Si $o(b) = p^2$, entonces $G = \langle b \rangle \cong \mathbb{Z}_{p^2}$, el cual es abeliano.
- Caso 2: Si todo elemento en $G \setminus H$ tiene orden p . Sea $K = \langle b \rangle$. Como $b \notin H$ y $|H| = p$ (primo), $H \cap K = \{e\}$. Al ser H normal y $H \cap K = \{e\}$, el subgrupo HK es isomorfo al producto directo. Como $|HK| = p^2 = |G|$, entonces $G \cong H \times K \cong \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$. El producto directo de grupos abelianos es abeliano.

En cualquier caso, G es abeliano. □

Teorema 5.1.4. *Sea G un p -grupo finito no trivial (es decir, $|G| = p^n$ con $n \geq 1$). Entonces su centro es no trivial:*

$$Z(G) \neq \{e\}$$

Demostración.

Hagamos actuar a G en sí mismo por conjugación:

$$g \cdot x = gxg^{-1}$$

La Ecuación de Clase para esta acción es:

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{x_i \notin Z(G)} [G : C_G(x_i)]$$

donde la suma recorre un sistema de representantes de las clases de conjugación no triviales (aquellas con más de un elemento).

Analicemos la divisibilidad por p :

1. $|G| = p^n$, por lo que $|G|$ es divisible por p (pues $n \geq 1$).
2. Para cada $x_i \notin Z(G)$, su centralizador $C_G(x_i)$ es un subgrupo propio de G (si fuera todo G , x_i estaría en el centro). Por el Teorema de Lagrange, $[G : C_G(x_i)] = \frac{|G|}{|C_G(x_i)|}$. Como $|G|$ es potencia de p , este índice también debe ser una potencia de p . Como $x_i \notin Z(G)$, el índice es mayor que 1. Por lo tanto, p divide a $[G : C_G(x_i)]$.

Entonces, en la ecuación de clase:

$$\underbrace{|G|}_{\text{divisible por } p} = |Z(G)| + \underbrace{\sum [G : C_G(x_i)]}_{\text{divisible por } p}$$

Esto implica que p debe dividir a $|Z(G)|$.

Como el neutro e siempre está en el centro, $|Z(G)| \geq 1$. Al ser múltiplo de p , concluimos que $|Z(G)| \geq p$, por lo que $Z(G) \neq \{e\}$. □

5.2. Grupos Sylow

Definición 5.2.1. Sea G un grupo, diremos que H es un subgrupo maximal de G si cuando N es un subgrupo de G con $H \subseteq N \subseteq G$, entonces $N = G$ o $N = H$

Definición 5.2.2. Sea G un grupo, p un primo que divide a $|G|$. Diremos que P es un p -subgrupo de Sylow de G si P es un p -grupo maximal (con respecto a la propiedad de ser p -grupo) es decir, si H es un p -grupo tal que $P \subseteq H \subseteq G$ entonces $H = G$ o $H = P$

Observación 5.2.1. Si G es un grupo finito, y p es primo que divide a $|G|$ entonces existe un p -subgrupo Sylow de G

Demostración.

Sea $\mathcal{A} = \{H \leq G \mid H \text{ es } p\text{-grupo}\}$. Por el teorema de Cauchy G tiene elementos de orden p , si $o(a) = p$, entonces $H = \langle a \rangle \in \mathcal{A}$. Luego, $\mathcal{A} \neq \emptyset$.

Sea $\{H_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ una cadena en $\mathcal{A}$. Sea $H = \bigcup_{\lambda \in \Lambda} H_\lambda$, entonces $H \in \mathcal{A}$ y en efecto si $a, b \in H$, existe $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$ tal que $a \in H_{\lambda_1}$ y $b \in H_{\lambda_2}$, como los $\{H_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ forman una cadena. Podemos suponer $H_{\lambda_1} \subseteq H_{\lambda_2}$ en cuyo caso $a, b \in H_{\lambda_2}$ y como $H_{\lambda_2} \leq G$, $ab^{-1} \in H_{\lambda_2} \subseteq H$, así $H \leq G$.

Más aún si $a \in H$, $a \in H_\lambda$ para algún $\lambda \in \Lambda$ así que $o(a) = p^n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, luego H es p -grupo. Por lo tanto $H \in \mathcal{A}$, luego, $\mathcal{A}$ tiene elementos maximales y por el lema de Zorn G los tiene. $\square$

Teorema 5.2.1 (Segundo y Tercer Teorema de Sylow). Sea G grupo finito, p primo que divide a $|G|$, ℓ_p la cantidad de p -grupos Sylow, entonces:

- i) $\ell_p \mid |G|$ y $\ell_p \equiv 1 \pmod{p}$.
- ii) Los p -grupos Sylow son conjugados.

Demostración.

Sea P un p -grupo Sylow de G y $X = \{gPg^{-1} \mid g \in G\}$ los subgrupos conjugados de P . (Note que $|X| < +\infty$). Hagamos actuar G en X por conjugación como sigue:

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi} : G \times X &\rightarrow X \\ (g, aPa^{-1}) &\mapsto g(aPa^{-1})g^{-1} \end{aligned}$$

$\tilde{\varphi}$ es acción pues:

$$\text{i) } e(aPa^{-1})e = eaPa^{-1}e = aPa^{-1}.$$

$$\text{ii) } (gh)(aPa^{-1}) = (gh)(aPa^{-1})(gh)^{-1}$$

$$= g(haPa^{-1}h^{-1})g^{-1}$$

$$= g \cdot (haPa^{-1})$$

$$= g \cdot (h \cdot aPa^{-1})$$

Además cada elemento de X es un p -grupo Sylow. Si Q es un p -subgrupo de G con $aPa^{-1} \subseteq Q \subsetneq G$ entonces $P = a^{-1}(aPa^{-1})a \subseteq a^{-1}Qa \subsetneq G$ y $a^{-1}Qa$ es un p -grupo (si $q \in a^{-1}Qa$, $g = a^{-1}qa$ con $q \in Q \implies g^{p^s} = (a^{-1}qa)^{p^s} = a^{-1}q^{p^s}a = a^{-1}ea = e$ si p^s es el orden de q , luego g tiene orden potencia de p). Por la maximalidad de P , $P = a^{-1}Qa$, luego $aPa^{-1} = Q$, así aPa^{-1} es maximal.

Restringiendo $\tilde{\varphi}$ a P , se tiene que P actúa en X . Sea $Q \in X$, entonces $[P : St_P(Q)] = p^s$ para algún s . Más aún si $s = 0$, entonces $P = St_P(Q) = \{p \in P \mid pQp^{-1} = Q\} = P \cap St_G(Q)$, de donde $P \subseteq St_G(Q)$. Además $Q \trianglelefteq St_G(Q) = N_G(Q)$, luego PQ es subgrupo de $St_G(Q)$, más aún es p -subgrupo de G y $P, Q \leq PQ$. Como P es Sylow, luego $PQ = G$ o $P = PQ = Q$. Si $G = PQ$ entonces $G = St_G(Q)$, luego $Q \trianglelefteq G$. Pero $Q = aPa^{-1}$ para algún $a \in G$, $Q = a^{-1}Qa = P$.

En cualquier caso entonces $P = Q$. Es decir, el único elemento de X que bajo la acción se queda fijo es P , por lo tanto

$$|X| = 1 + \sum_{Q \notin X^P} [P : St_P(Q)]$$

En particular $|X| \equiv 1 \pmod{p}$.

Sea ahora un Q p -subgrupo Sylow y suponga que $Q \notin X$, entonces restringiendo $\tilde{\varphi}$ a Q . Un argumento análogo muestra que

$$|X| \equiv 0 \pmod{p}$$

En efecto, si $Q_1 \in X$, entonces $[Q : St_Q(Q_1)] = p^s$ y $s = 0$ si y sólo si $Q = St_Q(Q_1) = St_G(Q_1) \cap Q$, luego $Q \subseteq St_G(Q_1)$ y como $Q_1 \trianglelefteq St_G(Q_1)$ entonces $QQ_1 \leq St_G(Q_1)$. Más aún QQ_1 es p -subgrupo. Así $Q \subseteq QQ_1 \subseteq G$ de donde $QQ_1 = G$ o $Q = QQ_1 = Q_1$. Si $QQ_1 = G$, $G = St_G(Q_1)$, luego $Q_1 \trianglelefteq G$, de donde $Q_1 = P \trianglelefteq G$. Luego $P \subsetneq QQ_1$ y QQ_1 es p -grupo lo cual no puede ser por la maximalidad de P . Por lo tanto $Q = Q_1 \# C$ (Contradicción) pues $Q_1 \in X$ y $Q \notin X$, es decir, con la acción $\tilde{\varphi}|_Q$, no hay puntos fijos y así

$$|X| = \sum_{Q_1 \notin X^G} [Q : St_Q(Q_1)] \equiv 0 \pmod{p}$$

Lo cual no puede ser pues contradice (i), luego $Q \in X$, es decir, es un conjugado de P y por tanto $\ell_p = |X|$ y se tiene $\ell_p \equiv 1 \pmod{p}$. Más aún

$$X = \{gPg^{-1} \mid g \in G\} = \{g \cdot P \mid g \in G\} = \mathcal{O}_P$$

Así,

$$\ell_p = |X| = |\mathcal{O}_P| = [G : St_G(P)] \mid |G|$$

□

Teorema 5.2.2 (Primer Teorema de Sylow). *Sea G un grupo de orden $|G| = p^s m$ con p primo, $(p, m) = 1$ entonces todo p -grupo Sylow tiene cardinalidad p^s .*

Demostración.

Sea P un p -Sylow de G . Para ver que $|P| = p^s$ basta probar que $[G : P] = m$ ($|G| = [G : P]|P|$) y para esto, basta ver que $([G : P], p) = 1$ pues si esto pasa $p^s m = |G| = [G : P]|P|$, $([G : P], p) = 1$, entonces $p^s \mid |P|$, además $|P| \mid |G| = p^s m$, luego, $|P| = p^s p^t$ y $|P| \leq p^s m$ (pues P es subgrupo), luego, $p^s p^t \ell = p^s m$ y $(p, m) = 1$, de donde $t = 0$ o $|P| = p^s$.

Veamos entonces que $([G : P], p) = 1$, tenemos que se sigue del teorema de Lagrange que $[G : P] = [G : N(P)][N(P) : P]$ así que basta ver $([G : N(P)], p) = 1$, $([N(P) : P], p) = 1$.

Pero por el teorema anterior $[G : N(P)] = [G : St_G(P)] = |\mathcal{O}_P| = \ell_p \equiv 1 \pmod{p}$, luego $([G : N(P)], p) = 1$.

Ahora, si $([N(P) : P], p) \neq 1$, $p \mid [N(P) : P]$ y como $P \trianglelefteq N(P)$, entonces p divide el orden del grupo $N(P)/P$, luego por el teorema de Cauchy, existe $\bar{X} = XP \in N(P)/P$ tal que $\bar{X}^p = \bar{e} = P$.

Observe que:

$$\begin{array}{ccc} \langle \bar{X} \rangle & = & \frac{\langle X, P \rangle}{P} \leq \frac{N(P)}{P} \quad \text{y} \quad (\bar{X})^p = e \\ & & \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ N(P)/P & \text{---} & N(P) \\ & & \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ \langle \bar{X} \rangle & \text{---} & \langle X, P \rangle \\ & & \downarrow \quad \quad \quad \downarrow \\ P = \bar{e} & \text{---} & P \end{array}$$

Por lo tanto, $\frac{\langle X, P \rangle}{P}$ es p -grupo, de donde $\langle X, P \rangle$ es p -grupo y

$$|\langle X, P \rangle| = [\langle X, P \rangle : P]|P| = \left| \frac{\langle X, P \rangle}{P} \right| |P|$$

Por la maximalidad de $P \subseteq \langle X, P \rangle$, $P = \langle X, P \rangle$ o $x \in P$ y $o(\bar{x}) = 1 \notin C$ (Contradicción), luego $([N(P) : P], p) = 1$. De donde se concluye que $|P| = p^s$. $\square$

Ejemplo 5.6. Sea $|G| = pq$ con $p < q$ números primos. Calculamos la cantidad de q -subgrupos de Sylow, n_q :

$$n_q \equiv 1 \pmod{q} \quad \text{y} \quad n_q \mid p$$

Los divisores de p son $\{1, p\}$.

- Si $n_q = p$, entonces $p \equiv 1 \pmod{q}$, lo cual implica que $q \mid (p - 1)$. Esto es imposible pues $p < q$ (un número mayor no puede dividir a uno menor positivo).

Por lo tanto, $n_q = 1$. Sea Q el único q -Sylow de G , entonces $Q \trianglelefteq G$.

Ahora analicemos n_p :

$$n_p \equiv 1 \pmod{p} \quad \text{y} \quad n_p \mid q$$

Los divisores de q son $\{1, q\}$. Así que n_p puede ser 1 o q .

Sea P un p -Sylow de G . Como $Q \trianglelefteq G$ y $P \leq G$, y además $Q \cap P = \{e\}$ (pues $|Q| = q$, $|P| = p$ y son primos distintos), tenemos que:

$$|QP| = \frac{|Q||P|}{|Q \cap P|} = \frac{qp}{1} = pq = |G|$$

Por lo tanto $G = QP$. Como Q es normal y $Q \cap P = \{e\}$, G es un producto semidirecto:

$$G \cong Q \rtimes_{\varphi} P$$

donde $\varphi : P \rightarrow \text{Aut}(Q)$ es un homomorfismo.

Sabemos que $Q \cong \mathbb{Z}_q$, por lo que $\text{Aut}(Q) \cong \text{Aut}(\mathbb{Z}_q) \cong \mathbb{Z}_{q-1}$. El orden del grupo de automorfismos es $|\text{Aut}(Q)| = q - 1$. El homomorfismo φ está determinado por la imagen de un generador de P . El orden de la imagen debe dividir tanto al orden de P (p) como al orden de $\text{Aut}(Q)$ ($q - 1$).

Caso 1: $p \nmid (q - 1)$. En este caso, $\gcd(p, q - 1) = 1$. El único elemento de orden que divide a p en $\text{Aut}(Q)$ es la identidad. Por lo tanto, φ es el homomorfismo trivial ($\varphi(g) = \text{Id}_Q$ para todo g). Esto implica que el producto es directo:

$$G \cong Q \times P \cong \mathbb{Z}_q \times \mathbb{Z}_p \cong \mathbb{Z}_{pq}$$

Así, si $p \nmid (q - 1)$, el único grupo de orden pq es el cíclico $\mathbb{Z}_{pq}$.

Caso 2: $p \mid (q - 1)$. Por el Teorema de Cauchy, como p divide al orden de $\text{Aut}(Q)$, existe un subgrupo de orden p en $\text{Aut}(Q)$. Esto permite definir un homomorfismo φ no trivial. Por lo tanto, existe un producto semidirecto no abeliano:

$$G \cong Q \rtimes P$$

Este grupo es único salvo isomorfismo (todos los homomorfismos no triviales dan lugar a grupos isomorfos en este caso).

Ejemplo: S_3 tiene orden $6 = 2 \cdot 3$. Aquí $p = 2, q = 3$. Como $2 \mid (3 - 1)$, existe el grupo no abeliano $S_3 \cong \mathbb{Z}_3 \rtimes \mathbb{Z}_2$.

Ejemplo 5.7. Sea $|G| = 30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$. Analicemos los subgrupos de Sylow:

- $n_5 \equiv 1 \pmod{5}$ y $n_5 \mid 6 \implies n_5 \in \{1, 6\}$.
- $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ y $n_3 \mid 10 \implies n_3 \in \{1, 10\}$.

Supongamos que G es simple (es decir, no tiene subgrupos normales propios). Entonces tendríamos $n_5 = 6$ y $n_3 = 10$ (pues si alguno fuera 1, ese Sylow sería normal).

Contemos los elementos:

- Si $n_5 = 6$, tenemos 6 subgrupos de orden 5. La intersección de cualesquiera dos de ellos es trivial (orden 1). Cada uno tiene $5 - 1 = 4$ elementos de orden 5. Total de elementos de orden 5: $6 \times 4 = 24$.

- Si $n_3 = 10$, tenemos 10 subgrupos de orden 3. Cada uno tiene $3 - 1 = 2$ elementos de orden 3. Total de elementos de orden 3: $10 \times 2 = 20$.

Sumando los elementos:

$$24 \text{ (orden 5)} + 20 \text{ (orden 3)} = 44 \text{ elementos}$$

Esto es imposible pues $|G| = 30$. Por lo tanto, nuestra suposición es falsa. Debe ocurrir que $n_5 = 1$ o $n_3 = 1$. Conclusión: Un grupo de orden 30 no puede ser simple (siempre tiene un subgrupo normal de orden 5 o de orden 3).

Ejemplo 5.8. Sea $|G| = 12 = 2^2 \cdot 3$.

- $n_3 \equiv 1 \pmod{3}$ y $n_3 \mid 4 \implies n_3 \in \{1, 4\}$.
- $n_2 \equiv 1 \pmod{2}$ y $n_2 \mid 3 \implies n_2 \in \{1, 3\}$.

Supongamos que G no es simple. Si $n_3 = 1$, ya terminamos ($P_3 \trianglelefteq G$). Supongamos entonces que $n_3 = 4$. El número de elementos de orden 3 es:

$$4 \times (3 - 1) = 8 \text{ elementos.}$$

Los elementos restantes son $12 - 8 = 4$. Estos 4 elementos deben formar el único 2-Sylow de G (que tiene orden 4). Por lo tanto, si $n_3 \neq 1$, obligatoriamente $n_2 = 1$.

En cualquier caso, G tiene un subgrupo normal (ya sea el 3-Sylow o el 2-Sylow).

Ejemplo 5.9. Sea $|G| = p^2q$ con p, q primos distintos. (El análisis suele ser similar: mostrar que no es simple contando elementos. Por ejemplo, si $p > q$, $n_p = 1$).

CAPÍTULO 6

Automorfismos de Grupos

6.1. Automorfismos de Grupos

Definición 6.1.1. Un **automorfismo** de un grupo G es un isomorfismo de G en sí mismo. Al conjunto de automorfismos se le denota por $\text{Aut}(G)$. Así:

$$\text{Aut}(G) = \{f : G \rightarrow G \mid f \text{ es un isomorfismo}\}$$

Observación 6.1.1. Si G es finito y $f : G \rightarrow G$ es un homomorfismo, entonces f es inyectivo si y solo si f es suprayectivo.

Demostración.

Como G es un grupo finito, denotemos su orden por $|G| = n < \infty$.

$\Rightarrow$) Supongamos que f es inyectiva. Dado que f es una función inyectiva, la cantidad de elementos en su imagen es igual a la cantidad de elementos en su dominio. Es decir, $|\text{Im}(f)| = |G| = n$. Sabemos que $\text{Im}(f) \subseteq G$. Dado que $\text{Im}(f)$ es un subconjunto de G y tiene la misma cardinalidad finita que G , necesariamente $\text{Im}(f) = G$. Por lo tanto, f es suprayectiva.

$\Leftarrow$) Supongamos que f es suprayectiva. Consideremos el núcleo de f , $\ker(f)$. Por el Primer Teorema de Isomorfía, sabemos que:

$$G/\ker(f) \cong \text{Im}(f)$$

Tomando cardinalidades:

$$\frac{|G|}{|\ker(f)|} = |\text{Im}(f)|$$

Como f es suprayectiva, $\text{Im}(f) = G$, por lo que $|\text{Im}(f)| = |G|$. Sustituyendo en la ecuación:

$$\frac{|G|}{|\ker(f)|} = |G|$$

Como $|G|$ es finito y no nulo, podemos dividir ambos lados por $|G|$, obteniendo:

$$\frac{1}{|\ker(f)|} = 1 \implies |\ker(f)| = 1$$

El único subgrupo de orden 1 es el trivial, por lo tanto $\ker(f) = \{e\}$. Sabemos que un homomorfismo es inyectivo si y solo si su núcleo es trivial. Concluimos que f es inyectiva. $\square$

Proposición 6.1.1. *Sea G un grupo y $a \in G$. Definimos $f_a : G \rightarrow G$ por $f_a(g) = aga^{-1}$. Se verifica que f_a es un isomorfismo.*

Demostración.

i) f_a es homomorfismo: Sean $g_1, g_2 \in G$.

$$f_a(g_1g_2) = a(g_1g_2)a^{-1} = ag_1(a^{-1}a)g_2a^{-1} = (ag_1a^{-1})(ag_2a^{-1}) = f_a(g_1)f_a(g_2)$$

ii) f_a es inyectiva:

$$f_a(g) = f_a(g_1) \iff aga^{-1} = ag_1a^{-1} \iff g = g_1$$


iii) f_a es sobreyectiva: Dado $y \in G$, existe $x = a^{-1}ya \in G$ tal que:

$$f_a(x) = f_a(a^{-1}ya) = a(a^{-1}ya)a^{-1} = (aa^{-1})y(aa^{-1}) = eye = y$$

Por lo tanto, f_a es un isomorfismo de G en sí mismo (un automorfismo). $\square$

Definición 6.1.2. *Al conjunto de los automorfismos de la forma f_a se les llama automorfismos internos de G , y se denota por $\text{Im}(G)$.*

$$\text{Im}(G) = \{f_a : G \rightarrow G \mid f_a(g) = aga^{-1}, \text{ para algún } a \in G\}$$



Observación 6.1.2. *$\text{Aut}(G)$, con la operación de composición de funciones, es un grupo.*

Demostración.

Sabemos que la composición de biyecciones es una biyección y la composición de homomorfismos es un homomorfismo. Sean $f, g \in \text{Aut}(G)$. Entonces $f \circ g$ es biyectiva y es homomorfismo, luego $f \circ g \in \text{Aut}(G)$. La asociatividad se hereda de la composición de funciones. La identidad es $\text{Id}_G(x) = x$, que trivialmente es un automorfismo. Si $f \in \text{Aut}(G)$, su función inversa f^{-1} también es un isomorfismo, por lo que $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$. $\square$

Ejemplo 6.1. Si G es un grupo, definamos $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ como $\varphi(g) = f_g$, donde $f_g : G \rightarrow G$ está dado por $f_g(a) = gag^{-1}$. Entonces φ es un homomorfismo.

En efecto:

$$f_{gg_1}(a) = (gg_1)a(gg_1)^{-1} = g(g_1ag_1^{-1})g^{-1} = gf_{g_1}(a)g^{-1} = f_g(f_{g_1}(a)) = (f_g \circ f_{g_1})(a)$$

Por lo tanto:

$$\varphi(gg_1) = f_{gg_1} = f_g \circ f_{g_1} = \varphi(g) \circ \varphi(g_1)$$

La imagen de φ es justamente $\text{Im}(G)$.

Teorema 6.1.1. Sea G un grupo, entonces $\text{Im}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$ y

$$G/Z(G) \cong \text{Im}(G)$$

Demostración.

Sea $\varphi : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ dada por $\varphi(g) = f_g$ (como en el ejemplo anterior). Entonces, φ es un homomorfismo con imagen $\text{Im}(G)$. Además:

$$g \in \ker \varphi \iff \varphi(g) = \text{Id}_G \iff f_g(a) = a, \forall a \in G$$

$$\iff gag^{-1} = a, \forall a \in G \iff ga = ag, \forall a \in G \iff g \in Z(G)$$

Por lo tanto, $\ker \varphi = Z(G)$. Por el Primer Teorema de Isomorfía:

$$G/\ker \varphi = G/Z(G) \cong \text{Im}(\varphi) = \text{Im}(G)$$

Ahora, para ver la normalidad ($\text{Im}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$), sea $f_g \in \text{Im}(G)$ y $h \in \text{Aut}(G)$. Para $a \in G$:

$$(h \circ f_g \circ h^{-1})(a) = h(f_g(h^{-1}(a))) = h(gh^{-1}(a)g^{-1})$$

Como h es un homomorfismo:

$$= h(g)h(h^{-1}(a))h(g^{-1}) = h(g)ah(g)^{-1} = f_{h(g)}(a)$$

Luego, $h \circ f_g \circ h^{-1} = f_{h(g)}$. Como $h(g) \in G$, entonces $f_{h(g)} \in \text{Im}(G)$. De donde concluimos que $\text{Im}(G) \trianglelefteq \text{Aut}(G)$. $\square$

Observación 6.1.3. Si $G \cong G_1$, entonces $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}(G_1)$.

Demostración.

Sea $\psi : G \rightarrow G_1$ un isomorfismo. Definamos $\Psi : \text{Aut}(G) \rightarrow \text{Aut}(G_1)$ dada por:

$$f \mapsto h_f = \psi \circ f \circ \psi^{-1}$$

Podemos visualizar la acción del automorfismo inducido a través del siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \psi_i & & f & & \psi & \\
 G_i & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G & \longrightarrow & G_{i+1} \\
 & & & & & \nearrow & \\
 & & & & & \psi_{i+1} &
 \end{array}$$

Es decir, $\Psi(f) = \psi \circ f \circ \psi^{-1}$. Demostraremos que Ψ es un isomorfismo, en efecto:

1. Ψ está bien definida: Es decir, $\psi \circ f \circ \psi^{-1} \in \text{Aut}(G_1)$. En efecto, claramente $\psi \circ f \circ \psi^{-1}$ es biyectiva (composición de biyecciones). Además, para $g_1, g_2 \in G_1$:

$$\begin{aligned}
 h_f(g_1 g_2) &= (\psi \circ f \circ \psi^{-1})(g_1 g_2) = \psi(f(\psi^{-1}(g_1 g_2))) \\
 &= \psi(f(\psi^{-1}(g_1) \psi^{-1}(g_2))) \quad (\text{pues } \psi^{-1} \text{ es hom.}) \\
 &= \psi(f(\psi^{-1}(g_1)) \cdot f(\psi^{-1}(g_2))) \quad (\text{pues } f \text{ es hom.}) \\
 &= \psi(f(\psi^{-1}(g_1))) \cdot \psi(f(\psi^{-1}(g_2))) \quad (\text{pues } \psi \text{ es hom.}) \\
 &= h_f(g_1) h_f(g_2)
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $h_f \in \text{Aut}(G_1)$.

2. Ψ es homomorfismo: Sean $f, \rho \in \text{Aut}(G)$.

$$\Psi(f \circ \rho) = h_{f \circ \rho} = \psi \circ (f \circ \rho) \circ \psi^{-1}$$

Por otro lado:

$$\Psi(f) \circ \Psi(\rho) = (\psi \circ f \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \rho \circ \psi^{-1}) = \psi \circ f \circ (\psi^{-1} \circ \psi) \circ \rho \circ \psi^{-1}$$

Como $\psi^{-1} \circ \psi = \text{Id}_G$, esto se reduce a:

$$= \psi \circ f \circ \rho \circ \psi^{-1} = h_{f \circ \rho}$$

Luego, $\Psi(f \circ \rho) = \Psi(f) \circ \Psi(\rho)$.

3. Ψ es inyectiva:

$$\Psi(f) = \Psi(\rho) \iff \psi \circ f \circ \psi^{-1} = \psi \circ \rho \circ \psi^{-1}$$

Componiendo con ψ^{-1} a la izquierda y ψ a la derecha:

$$\iff \psi^{-1}(\psi \circ f \circ \psi^{-1})\psi = \psi^{-1}(\psi \circ \rho \circ \psi^{-1})\psi \iff f = \rho$$

4. Ψ es sobreyectiva: Sea $g \in \text{Aut}(G_1)$. Existe $f = \psi^{-1} \circ g \circ \psi \in \text{Aut}(G)$ tal que:

$$\Psi(f) = \psi \circ (\psi^{-1} \circ g \circ \psi) \circ \psi^{-1} = (\psi \circ \psi^{-1}) \circ g \circ (\psi \circ \psi^{-1}) = g$$

Por lo tanto, $\text{Aut}(G) \cong \text{Aut}(G_1)$. □

Observación 6.1.4. *El recíproco es falso.*

Demostración.

Sea $G = S_3$. Sus elementos son:

$$S_3 = \{e, \theta = (123), \theta^2 = (132), \sigma = (12), \tau = (13), \rho = (23)\}$$

Sabemos que S_3 es generado por θ y σ ($\langle \theta, \sigma \rangle = S_3$) con las relaciones $\theta^3 = e, \sigma^2 = e, \sigma\theta = \theta^2\sigma$. Cualquier automorfismo $f \in \text{Aut}(S_3)$ queda determinado por sus valores en los generadores. Además, un isomorfismo preserva el orden de los elementos.

Los elementos de orden 3 son $\{\theta, \theta^2\}$. Los elementos de orden 2 son $\{\sigma, \tau, \rho\}$. Por lo tanto, para $f(\theta)$ tenemos 2 opciones (θ ó θ^2) y para $f(\sigma)$ tenemos 3 opciones (σ, τ ó ρ). En total hay a lo más $2 \times 3 = 6$ automorfismos.

Sabemos que $\text{Im}(S_3) \cong S_3/Z(S_3)$. Como $Z(S_3) = \{e\}$, entonces $\text{Im}(S_3) \cong S_3$, por lo que $|\text{Im}(S_3)| = 6$. Como $\text{Im}(S_3) \leq \text{Aut}(S_3)$ y $|\text{Aut}(S_3)| \leq 6$, concluimos que:

$$\text{Aut}(S_3) = \text{Im}(S_3) \cong S_3$$

(Nota: Existen grupos no isomorfos a S_3 , como $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, cuyo grupo de automorfismos es isomorfo a S_3 , mostrando que el recíproco falla). □

Teorema 6.1.2. *Sean H_1 y H_2 grupos finitos tales que $\gcd(|H_1|, |H_2|) = 1$. Entonces:*

$$\text{Aut}(H_1 \times H_2) \cong \text{Aut}(H_1) \times \text{Aut}(H_2)$$

Demostración.

Identificamos a H_1 con el subgrupo $H_1 \times \{e_2\}$ y a H_2 con $\{e_1\} \times H_2$ dentro de $G = H_1 \times H_2$.

Sea $f \in \text{Aut}(H_1 \times H_2)$. Probemos que $f(H_1) = H_1$ y $f(H_2) = H_2$.

Sea $(h, e_2) \in H_1$. Su orden k divide a $|H_1|$. Aplicando f , el elemento $f(h, e_2)$ debe tener el mismo orden k . Sea $f(h, e_2) = (x, y) \in H_1 \times H_2$. Entonces el orden de (x, y) es $(|x|, |y|) = k$. Esto implica que $|y|$ divide a k , y por tanto $|y|$ divide a $|H_1|$. Pero $y \in H_2$, por lo que $|y|$ divide a $|H_2|$. Como $(|H_1|, |H_2|) = 1$, la única posibilidad es que $|y| = 1$, es decir, $y = e_2$. Por lo tanto, $f(h, e_2) = (x, e_2) \in H_1$.

Esto demuestra que $f(H_1) \subseteq H_1$. Por ser f inyectiva y H_1 finito, $f(H_1) = H_1$. Análogamente se demuestra que $f(H_2) = H_2$.

Dado que f preserva los subgrupos H_1 y H_2 , podemos definir las restricciones: $f|_{H_1} : H_1 \rightarrow H_1$ y $f|_{H_2} : H_2 \rightarrow H_2$. Estas restricciones son automorfismos de H_1 y H_2 respectivamente.

Definimos la función $\Psi : \text{Aut}(H_1 \times H_2) \rightarrow \text{Aut}(H_1) \times \text{Aut}(H_2)$ dada por:

$$\Psi(f) = (f|_{H_1}, f|_{H_2})$$

Ψ es un homomorfismo. En efecto:

Sean $f, g \in \text{Aut}(H_1 \times H_2)$.

$$\Psi(f \circ g) = ((f \circ g)|_{H_1}, (f \circ g)|_{H_2}) = (f|_{H_1} \circ g|_{H_1}, f|_{H_2} \circ g|_{H_2})$$

(Esto es válido porque $g(H_1) = H_1$, así que la composición se restringe bien).

$$= (f|_{H_1}, f|_{H_2}) \cdot (g|_{H_1}, g|_{H_2}) = \Psi(f) \cdot \Psi(g)$$

Ψ es biyectiva. En efecto:

- Inyectiva: Si $\Psi(f) = (Id_{H_1}, Id_{H_2})$, entonces $f(h, e_2) = (h, e_2)$ y $f(e_1, k) = (e_1, k)$. Para un elemento arbitrario $(h, k) \in H_1 \times H_2$:

$$f(h, k) = f((h, e_2)(e_1, k)) = f(h, e_2)f(e_1, k) = (h, e_2)(e_1, k) = (h, k)$$

Luego $f = Id_{H_1 \times H_2}$, así que $\ker \Psi$ es trivial.

- Sobreyectiva: Dado $(\alpha, \beta) \in \text{Aut}(H_1) \times \text{Aut}(H_2)$, definimos $f : H_1 \times H_2 \rightarrow H_1 \times H_2$ como $f(h, k) = (\alpha(h), \beta(k))$. Es fácil verificar que f es un automorfismo y que $\Psi(f) = (\alpha, \beta)$.

Por lo tanto, $\text{Aut}(H_1 \times H_2) \cong \text{Aut}(H_1) \times \text{Aut}(H_2)$. □

Teorema 6.1.3. *Sea G un grupo cíclico de orden n . Entonces:*

$$\text{Aut}(G) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

Donde $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^$ es el grupo multiplicativo de las unidades módulo n . En particular, $|\text{Aut}(G)| = \varphi(n)$, donde φ es la función de Euler.*

Demostración.

Sea $G = \langle g \rangle$ un grupo cíclico de orden n . Sea $f \in \text{Aut}(G)$. Como G es cíclico, f queda completamente determinado por la imagen del generador g . Sea $f(g) = g^{c_f}$ para algún entero c_f . Como f es un automorfismo, $f(g)$ debe ser otro generador de G . Sabemos que g^k es un generador de G si y solo si $\gcd(k, n) = 1$. Por lo tanto, $\gcd(c_f, n) = 1$, lo que implica que la clase $\overline{c_f}$ pertenece a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Definimos la función $\Psi : \text{Aut}(G) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ dada por:

$$\Psi(f) = \overline{c_f} \quad \text{donde } f(g) = g^{c_f}$$

1. Ψ es un homomorfismo: Sean $f_1, f_2 \in \text{Aut}(G)$ con $f_1(g) = g^{c_{f_1}}$ y $f_2(g) = g^{c_{f_2}}$.

$$(f_1 \circ f_2)(g) = f_1(f_2(g)) = f_1(g^{c_{f_2}}) = (f_1(g))^{c_{f_2}} = (g^{c_{f_1}})^{c_{f_2}} = g^{c_{f_1} c_{f_2}}$$

Por lo tanto, el exponente asociado a la composición es el producto de los exponentes:

$$\Psi(f_1 \circ f_2) = \overline{c_{f_1} c_{f_2}} = \overline{c_{f_1}} \cdot \overline{c_{f_2}} = \Psi(f_1) \Psi(f_2)$$

2. Ψ es inyectiva:

$$\Psi(f) = \bar{1} \implies c_f \equiv 1 \pmod{n} \implies f(g) = g^1 = g$$

Como el automorfismo fija al generador, fija a todo el grupo. Luego $f = Id_G$.

3. Ψ es sobreyectiva: Sea $\bar{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Entonces $\gcd(k, n) = 1$. Definimos $f : G \rightarrow G$ por $f(x) = x^k$. Como $\gcd(k, n) = 1$, la aplicación $x \mapsto x^k$ es una biyección en el grupo cíclico finito y es un homomorfismo ($f(xy) = (xy)^k = x^k y^k$ pues G es abeliano). Así, $f \in \text{Aut}(G)$ y $\Psi(f) = \bar{k}$.

Por lo tanto, $\text{Aut}(G) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. □

Corolario 6.1.1. *Si p es un número primo, entonces:*

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$$

Demostración.

Aplicando el teorema anterior con $G = \mathbb{Z}_p$ (cíclico de orden p), tenemos:

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$$

El orden de este grupo es $\varphi(p) = p - 1$. Sabemos por la teoría de grupos finitos (específicamente por la existencia de raíces primitivas módulo p) que el grupo multiplicativo de un cuerpo finito $\mathbb{Z}_p$ es siempre cíclico. Por lo tanto:

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong C_{p-1} \cong \mathbb{Z}_{p-1}$$

Así concluimos que $\text{Aut}(\mathbb{Z}_p)$ es isomorfo al grupo cíclico de orden $p - 1$. □

Teorema 6.1.4. *Sea G un grupo cíclico de orden n . Entonces:*

$$\text{Aut}(G) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$$

Donde $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^$ es el grupo multiplicativo de las unidades módulo n . En particular, $|\text{Aut}(G)| = \varphi(n)$, donde φ es la función de Euler.*

Demostración.

Sea $G = \langle g \rangle$ un grupo cíclico de orden n . Sea $f \in \text{Aut}(G)$. Como G es cíclico, f queda completamente determinado por la imagen del generador g . Sea $f(g) = g^{c_f}$ para algún entero

c_f . Como f es un automorfismo, $f(g)$ debe ser otro generador de G . Sabemos que g^k es un generador de G si y solo si $\gcd(k, n) = 1$. Por lo tanto, $\gcd(c_f, n) = 1$, lo que implica que la clase $\overline{c_f}$ pertenece a $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$.

Definimos la función $\Psi : \text{Aut}(G) \rightarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ dada por:

$$\Psi(f) = \overline{c_f} \quad \text{donde } f(g) = g^{c_f}$$

1. Ψ es un homomorfismo: Sean $f_1, f_2 \in \text{Aut}(G)$ con $f_1(g) = g^{c_{f_1}}$ y $f_2(g) = g^{c_{f_2}}$.

$$(f_1 \circ f_2)(g) = f_1(f_2(g)) = f_1(g^{c_{f_2}}) = (f_1(g))^{c_{f_2}} = (g^{c_{f_1}})^{c_{f_2}} = g^{c_{f_1}c_{f_2}}$$

Por lo tanto, el exponente asociado a la composición es el producto de los exponentes:

$$\Psi(f_1 \circ f_2) = \overline{c_{f_1}c_{f_2}} = \overline{c_{f_1}} \cdot \overline{c_{f_2}} = \Psi(f_1)\Psi(f_2)$$

2. Ψ es inyectiva:

$$\Psi(f) = \overline{1} \implies c_f \equiv 1 \pmod{n} \implies f(g) = g^1 = g$$

Como el automorfismo fija al generador, fija a todo el grupo. Luego $f = \text{Id}_G$.

3. Ψ es sobreyectiva: Sea $\overline{k} \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. Entonces $\gcd(k, n) = 1$. Definimos $f : G \rightarrow G$ por $f(x) = x^k$. Como $\gcd(k, n) = 1$, la aplicación $x \mapsto x^k$ es una biyección en el grupo cíclico finito y es un homomorfismo ($f(xy) = (xy)^k = x^k y^k$ pues G es abeliano). Así, $f \in \text{Aut}(G)$ y $\Psi(f) = \overline{k}$.

Por lo tanto, $\text{Aut}(G) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$. □

Corolario 6.1.2. Si p es un número primo, entonces:

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong \mathbb{Z}_{p-1}$$

Demostración.

Aplicando el teorema anterior con $G = \mathbb{Z}_p$ (cíclico de orden p), tenemos:

$$\text{Aut}(\mathbb{Z}_p) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$$

El orden de este grupo es $\varphi(p) = p - 1$. Sabemos por la teoría de grupos finitos (específicamente por la existencia de raíces primitivas módulo p) que el grupo multiplicativo de un cuerpo finito $\mathbb{Z}_p$ es siempre cíclico. Por lo tanto:

$$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong C_{p-1} \cong \mathbb{Z}_{p-1}$$

Así concluimos que $\text{Aut}(\mathbb{Z}_p)$ es isomorfo al grupo cíclico de orden $p - 1$. □

Ejemplo 6.2. Sea G un grupo y hagamos actuar G en sí mismo por conjugación. Entonces esta es una acción como grupo.

Definimos $\tilde{\varphi} : G \times G \rightarrow G$ por $\tilde{\varphi}(g, g_1) = gg_1g^{-1}$. Ya se tiene que es una acción (visto en el capítulo anterior). Veamos que actúa por automorfismos:

$$\begin{aligned}(k_1k_2)^g &= \tilde{\varphi}(g, k_1k_2) = g(k_1k_2)g^{-1} = gk_1(g^{-1}g)k_2g^{-1} \\ &= (gk_1g^{-1})(gk_2g^{-1}) = \tilde{\varphi}(g, k_1)\tilde{\varphi}(g, k_2) = k_1^gk_2^g\end{aligned}$$

Por lo tanto, la conjugación preserva el producto.

Observación 6.1.5. Sean H y K grupos. Entonces H actúa en K como grupo si y solo si $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$ es un homomorfismo. (Nota: $\text{Aut}(K) \leq S_K$).

Demostración.

$\Rightarrow$) Si H actúa como grupo en K , existe $\tilde{\varphi} : H \times K \rightarrow K$ que cumple las condiciones i), ii) de acción y la condición de compatibilidad iii). Definamos $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$ por $\varphi(h) = f_h$, donde $f_h : K \rightarrow K$ está dada por $f_h(k) = \tilde{\varphi}(h, k)$.

1. φ está bien definida: Como $\tilde{\varphi}$ es acción, la función $\varphi : H \rightarrow S_K$ dada por $h \mapsto f_h$ es un homomorfismo de grupos (propiedad general de acciones). Basta ver que la imagen cae en $\text{Aut}(K)$, es decir, que $f_h \in \text{Aut}(K)$ para todo h . Sabemos que f_h es biyectiva (por ser acción). Además:

$$\begin{aligned}f_h(k_1k_2) &= \tilde{\varphi}(h, k_1k_2) = (k_1k_2)^h = k_1^hk_2^h \\ &= \tilde{\varphi}(h, k_1)\tilde{\varphi}(h, k_2) = f_h(k_1)f_h(k_2)\end{aligned}$$

Luego, f_h es homomorfismo y por tanto $f_h \in \text{Aut}(K)$. Así φ está bien definida.

$\Leftarrow$) Recíprocamente, sea $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$ un homomorfismo. Definamos $\tilde{\varphi} : H \times K \rightarrow K$ por $\tilde{\varphi}(h, k) = (\varphi(h))(k)$. Notemos que como $\varphi(h) \in \text{Aut}(K)$, denotemos $f_h = \varphi(h)$, entonces $\tilde{\varphi}(h, k) = f_h(k)$.

Verifiquemos que es acción como grupo:

- $k^e = \tilde{\varphi}(e, k) = (\varphi(e))(k) = \text{Id}_K(k) = k$. (Pues φ es homomorfismo, $\varphi(e) = \text{Id}$).
- $(k^{h_1})^{h_2} = \tilde{\varphi}(h_2, k^{h_1}) = f_{h_2}(f_{h_1}(k)) = (f_{h_2} \circ f_{h_1})(k)$. Como φ es homomorfismo, $f_{h_2} \circ f_{h_1} = \varphi(h_2) \circ \varphi(h_1) = \varphi(h_2h_1) = f_{h_2h_1}$. Luego, $f_{h_2h_1}(k) = k^{h_2h_1}$.
- $(k_1k_2)^h = f_h(k_1k_2) = f_h(k_1)f_h(k_2)$ (pues $f_h \in \text{Aut}(K)$). $= k_1^hk_2^h$.

□

Ejemplo 6.3. Sea G un grupo y $K \trianglelefteq G$. Entonces G no actúa necesariamente en K como grupo por multiplicación a la izquierda. Es decir, sea $\tilde{\varphi}(g, k) = gk$.

Aunque $\tilde{\varphi}(e, k) = ek = k$ y $\tilde{\varphi}(g_1g_2, k) = (g_1g_2)k = g_1(g_2k)$, la propiedad de automorfismo falla:

$$(k_1k_2)^g = g(k_1k_2)$$

mientras que:

$$k_1^g k_2^g = (gk_1)(gk_2) = gk_1 gk_2$$

En general $gk_1 k_2 \neq gk_1 gk_2$ (esto implicaría $e = g$, lo cual no es cierto para todo g). Además, gk no necesariamente está en K si K no es el grupo total (aunque si tomamos $K = G$, falla la condición de homomorfismo a menos que G sea trivial).

acá las primeras fotos

Teorema 6.1.5 (Caracterización del Producto Semidirecto Interno). *Sea G un grupo. Sean $K \triangleleft G$ y $H \leq G$ subgrupos tales que $G = HK$ y $H \cap K = \{e\}$. Entonces*

$$G \cong H \rtimes_{\varphi} K$$

donde φ es la acción por conjugación (inversa).

Demostración.

Definamos la función $f : H \rtimes_{\varphi} K \rightarrow G$ mediante la regla de correspondencia:

$$f(a, b) = ab$$

para todo $(a, b) \in H \rtimes_{\varphi} K$.

Primero verifiquemos que f es un homomorfismo. Sean $(a, b), (a', b') \in H \rtimes_{\varphi} K$. Evaluamos f en el producto de estos elementos:

$$\begin{aligned} f((a, b)(a', b')) &= f(aa', b^a b') \\ &= (aa')(b^a b') \end{aligned}$$

Recordemos que b^a denota la acción de a sobre b , que definimos como la conjugación inversa. Sustituyendo esto:

$$\begin{aligned} (aa')(b^a b') &= aa'((a')^{-1}ba')b' \\ &= a(a'(a')^{-1})ba'b' \\ &= aeba'b' \\ &= aba'b' \end{aligned}$$

Por otro lado, calculamos el producto de las imágenes en G :

$$f(a, b)f(a', b') = (ab)(a'b') = aba'b'$$

Dado que ambos desarrollos coinciden, concluimos que

$$f((a, b)(a', b')) = f(a, b)f(a', b')$$

Ahora veamos que f es inyectiva. Supongamos que $(a, b) \in \ker(f)$. Entonces:

$$f(a, b) = e \iff ab = e$$

De la igualdad $ab = e$, despejando b , obtenemos $b^{-1} = a$. Sabemos que $a \in H$ y $b \in K$ (lo que implica $b^{-1} \in K$). Por lo tanto:

$$b^{-1} = a \in H \cap K$$

Por hipótesis, la intersección es trivial, es decir $H \cap K = \{e\}$. Esto implica que $a = e$. Sustituyendo en la ecuación original, $b = a^{-1} = e$. Así, $(a, b) = (e, e)$, por lo que el núcleo es trivial y f es inyectiva.

Finalmente, veamos que f es sobreyectiva. Sea $g \in G$. Como $G = HK$, existen $a \in H$ y $b \in K$ tales que $g = ab$. Luego:

$$f(a, b) = ab = g$$

lo cual muestra que f es sobreyectiva.

Resumiendo la construcción: Dada una acción $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$, formamos $(G, \cdot)$ con el producto

$$(a, b)(a', b') = (aa', b^{a'}b')$$

Esto implica que $G = H \rtimes_{\varphi} K$ es un grupo donde identificamos $H \leq G$ y $K \triangleleft G$ tales que $G = HK$ y $H \cap K = \{e\}$.

Recíprocamente, si tenemos

$$H \leq G, \quad K \triangleleft G, \quad G = HK$$

y

$$H \cap K = \{e\}$$

entonces

$$G \cong H \rtimes_{\varphi} K$$

□

Ejemplo 6.4. Sea G un grupo de orden 8. Supongamos que G no es abeliano.

Entonces G tiene un elemento de orden 4. En efecto, supongamos lo contrario (que G no tiene elementos de orden 4). Entonces todos sus elementos distintos de la identidad tendrían orden 2. Es decir, $a^2 = e$ para todo $a \in G$. Esto implicaría que G es abeliano, pues para cualesquiera $a, b \in G$:

$$\begin{aligned} ab &= (ab)^{-1} \quad (\text{pues } (ab)^2 = e) \\ &= b^{-1}a^{-1} \\ &= ba \quad (\text{pues } b^2 = e, a^2 = e \implies b = b^{-1}, a = a^{-1}) \end{aligned}$$

Esto es una contradicción (G no es abeliano). Por lo tanto, existe un elemento de orden 4.

Por lo tanto, G tiene al menos un elemento de orden 4. Sea $a \in G$ tal que $o(a) = 4$. Definamos $K = \langle a \rangle$. Como $|K| = 4$ y $|G| = 8$, el índice es $[G : K] = 2$, lo que implica que $K \triangleleft G$.

Ahora analizamos los elementos que están fuera de K . Distinguimos dos casos:

Caso 1. Existe $b \in G \setminus K$ tal que $b^2 = e$. Tomando $H = \langle b \rangle$, se tiene un subgrupo de orden 2. Verificamos las condiciones:

- $H \cap K = \{e\}$ (pues b tiene orden 2 y el único elemento de orden 2 en K es a^2 , y $b \neq a^2$).

- $K \triangleleft G$.
- $G = HK$ (pues $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|} = 8$).

Por el teorema anterior, tenemos que:

$$G \cong H \rtimes_{\varphi} K$$

Para determinar el grupo, analizamos la acción $\varphi : H \rightarrow \text{Aut}(K)$. Sabemos que $\text{Aut}(K) \cong (\mathbb{Z}_4)^* \cong \mathbb{Z}_2$, generado por la inversión $\theta(k) = k^{-1}$. Si φ fuera trivial, G sería abeliano (contradicción). Por lo tanto, φ debe ser el isomorfismo que envía el generador de H a la inversión en K . Esta estructura corresponde al grupo Diédrico:

$$G \cong D_4$$

Caso 2. Todo elemento de orden 2 está en K . Supongamos que no existe ningún elemento de orden 2 fuera de K . Entonces, cualquier $b \in G \setminus K$ debe tener orden 4. Si tomamos $H = \langle b \rangle$, entonces H es un subgrupo de orden 4. Observamos que a^2 es el único elemento de orden 2 en K , y b^2 es el único elemento de orden 2 en H . Como por hipótesis todos los elementos de orden 2 están en K , necesariamente $b^2 = a^2$. Esto implica que $H \cap K \neq \{e\}$ (la intersección es al menos $\{e, a^2\}$). Por lo tanto, en este caso G no se puede descomponer como un producto semidirecto interno de un subgrupo de orden 4 y uno de orden 2 con intersección trivial. (Nota: Este caso corresponde al grupo de los Cuaterniones, Q_8).

6.2. Grupos Abelianos Finitos

Sea G un grupo abeliano finito de orden n , con la factorización en primos dada por:

$$n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$$

donde los p_i son números primos distintos.

Teorema 6.2.1 (Descomposición Primaria de Grupos Abelianos). *G es isomorfo al producto directo de sus subgrupos de Sylow.*

Demostración.

Como se estableció, sea $|G| = n = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$. Por los Teoremas de Sylow, para cada i existe un subgrupo de Sylow P_i de orden $p_i^{e_i}$. Queremos demostrar que:

$$G \cong P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_r$$

En efecto, como G es abeliano, todos sus subgrupos son normales. Por lo tanto, $P_i \triangleleft G$ para todo i . Más aún, demostremos que la intersección de P_1 con el producto de los otros es trivial:

$$P_1 \cap (P_2 \cdots P_r) = \{e\}$$

Pues si tomamos un elemento $g \in P_1 \cap (P_2 \cdots P_r)$, tenemos: Por una parte, $g \in P_1$, lo que implica que su orden divide al orden del grupo, es decir, $o(g) \mid |P_1| = p_1^{e_1}$. Por otra parte, $g \in P_2 \cdots P_r$. El orden de este subgrupo es el producto de los órdenes (al ser coprimos y normales), por lo que $o(g) \mid |P_2 \cdots P_r|$. Como los primos son distintos, tenemos que:

$$\text{mcd}(|P_1|, |P_2 \cdots P_r|) = 1$$

Esto implica que $o(g) = 1$, y por lo tanto $g = e$.

Tomando $H = P_1$ y $K = P_2 \cdots P_r$, se tiene entonces que $H, K \triangleleft G$ (al ser G abeliano), $H \cap K = \{e\}$ y $G = HK$. De donde:

$$G \cong H \times K = P_1 \times (P_2 \cdots P_r)$$

Por inducción se sigue que:

$$G \cong P_1 \times P_2 \times \cdots \times P_r$$

□

Probaremos ahora que todo grupo abeliano finito es producto de subgrupos cíclicos disjuntos, para lo cual será suficiente ver el caso en que G es un p -grupo.

Teorema 6.2.2. *Sea G un p -grupo finito y a un elemento de orden máximo. Entonces existe un subgrupo $H \leq G$ tal que*

$$G = H \times K$$

con $K = \langle a \rangle$ y $H \cap K = \{e\}$.

Demostración.

Procedemos por inducción sobre n , donde $|G| = p^n$. Si $n = 1$, G es cíclico de orden p . Tomando $H = \{e\}$ se tiene $G = H \times K$, lo cual cumple lo pedido.

Supongamos que el resultado es válido para todo grupo de orden p^k con $1 \leq k < n$. Sea a un elemento de orden máximo en G , y definamos $K = \langle a \rangle$. Si $G = K$, tomamos $H = \{e\}$ y terminamos. Supongamos que $G \neq K$. Para aplicar la inducción, necesitamos encontrar un subgrupo normal de orden p que interseque trivialmente con K .

Paso 1: Existencia de un elemento de orden p fuera de K . Sea $x \in G \setminus K$ tal que $x^p \in K$ (podemos elegir tal x tomando un elemento de orden mínimo en $G \setminus K$). Como $x^p \in K$, existe un entero i tal que $x^p = a^i$. Sea $m = o(a)$. Si $p \nmid i$, entonces $m \nmid i \frac{m}{p}$, por lo que $a^{i \frac{m}{p}} \neq e$. Sin embargo, calculemos la potencia m -ésima de x :

$$x^m = (x^p)^{\frac{m}{p}} = (a^i)^{\frac{m}{p}} = a^{i \frac{m}{p}} \neq e$$

Esto contradice el hecho de que a es un elemento de orden máximo m (pues implicaría que x tiene orden mayor a m). Por tanto, debe ocurrir que $p \mid i$. Así, $i = pj$ para algún entero j , de donde $x^p = a^{pj}$. Definamos el elemento $b = a^{-j}x$.

Veamos que $b \notin K$. Si $b \in K$, entonces $x = a^j b \in K$, lo cual contradice la elección de x . Veamos el orden de b :

$$b^p = (a^{-j}x)^p = a^{-jp}x^p = a^{-i}a^i = e$$

Así, hemos construido un elemento $b \in G \setminus K$ de orden p . Sea $M = \langle b \rangle$. Notemos que $M \cap K = \{e\}$ (pues $b \notin K$ y tiene orden primo). Además, como G es un p -grupo abeliano, $M \triangleleft G$.

Paso 2: Paso al cociente. Consideremos el grupo cociente $\overline{G} = G/M$. El orden es $|\overline{G}| = p^{n-1}$. Sea $\overline{a}$ la imagen de a en $\overline{G}$. Observemos que $o(\overline{a}) = o(a)$. En efecto, $\overline{a}^{o(a)} = \overline{a^{o(a)}} = \overline{e}$. Así $o(\overline{a}) \mid o(a)$. Por otro lado, si $\overline{a}^k = \overline{e}$, entonces $a^k \in M$. Como $a^k \in K$ y $M \cap K = \{e\}$, entonces $a^k = e$, por lo que $o(a) \mid o(\overline{a})$. Por tanto, $\overline{a}$ es un elemento de orden máximo en $\overline{G}$.

Paso 3: Hipótesis de Inducción. Como $|\overline{G}| < |G|$, por hipótesis de inducción existe un subgrupo $\overline{H} \leq \overline{G}$ tal que:

$$\overline{G} = \overline{H} \times \langle \overline{a} \rangle$$

Esto implica que $\overline{H} \cap \langle \overline{a} \rangle = \{\overline{e}\}$ y $\overline{G} = \overline{H} \langle \overline{a} \rangle$.

Paso 4: Levantamiento y Conclusión. Por el Teorema de la Correspondencia, existe un subgrupo $H \leq G$ que contiene a M tal que $\overline{H} = H/M$. Veamos que $G = H \times K$.

Primero, analicemos los órdenes:

$$p^{n-1} = |\overline{G}| = |\overline{H}| |\langle \overline{a} \rangle| = \frac{|H|}{|M|} |K| = \frac{|H||K|}{p}$$

Multiplicando por p , obtenemos $|G| = |H||K|$, lo que implica $G = HK$.

Segundo, veamos la intersección. Sea $z \in H \cap K$. Entonces la imagen en el cociente cumple $\overline{z} \in \overline{H} \cap \overline{K} = \overline{H} \cap \langle \overline{a} \rangle$. Por la suma directa en el cociente, $\overline{z} = \overline{e}$. Esto significa que $z \in M$. Entonces $z \in M \cap K$. Pero construimos M tal que $M \cap K = \{e\}$. Por lo tanto, $z = e$, lo que prueba que $H \cap K = \{e\}$.

Concluimos que $G = H \times K$. □

Corolario 6.2.1. *Sea G un p -grupo finito, entonces G es producto de factores cíclicos. Más aún, la representación como producto de factores cíclicos es única salvo orden.*

Demostración.

Por el teorema anterior, si a es un elemento de orden máximo, existe un subgrupo K tal que

$$G = H \times K$$

con $H = \langle a \rangle$ y $K \cap H = \{e\}$.

De hecho, tenemos que $|K| < |G| = |H||K|$, pues $|H| > 1$. Aplicando inducción sobre n (donde $|G| = p^n$) se sigue el resultado.

Ahora observe que si $\varphi : G \rightarrow G$ está definida por $\varphi(g) = g^p$ (o en notación aditiva $pg = g + \dots + g$, p veces), entonces φ es un homomorfismo. Y de hecho:

$$|\varphi(G)| = \frac{|G|}{p^k}$$

con k el número de factores cíclicos de G .

En efecto, podemos pensar primero que $G = \mathbb{Z}_{p^e}$, en cuyo caso $|\mathbb{Z}_{p^e}| = p^e$.

$$|\varphi(\mathbb{Z}_{p^e})| = |p\mathbb{Z}_{p^e}| = \frac{|\mathbb{Z}_{p^e}|}{p}$$

El núcleo es:

$$\text{Ker } \varphi = \{\bar{a} \mid p\bar{a} = \bar{0}\} = \{\bar{0}, \overline{p^{e-1}}, \overline{2p^{e-1}}, \dots, (p-1)\overline{p^{e-1}}\}$$

y por lo tanto $|\text{Ker } \varphi| = p$.

Si $G \cong \mathbb{Z}_{p^{e_1}} \times \mathbb{Z}_{p^{e_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^{e_k}}$, entonces el núcleo se descompone componente a componente:

$$\text{Ker } \varphi \cong \text{Ker } \varphi|_{\mathbb{Z}_{p^{e_1}}} \times \dots \times \text{Ker } \varphi|_{\mathbb{Z}_{p^{e_k}}}$$

Así, calculamos el orden de la imagen:

$$|\varphi(G)| = \frac{|G|}{|\text{Ker } \varphi|} = \frac{|\mathbb{Z}_{p^{e_1}}|}{p} \dots \frac{|\mathbb{Z}_{p^{e_k}}|}{p}$$

Agrupando los términos:

$$|\varphi(G)| = \frac{|\mathbb{Z}_{p^{e_1}}| \dots |\mathbb{Z}_{p^{e_k}}|}{p^k} = \frac{|G|}{p^k}$$

Además, observemos que el subgrupo $\varphi(G) = \{g^p \mid g \in G\}$ está definido de manera intrínseca y no depende de la representación (descomposición) de G . Luego, cualesquiera dos representaciones deben tener el mismo número de factores, es decir k es un invariante del grupo.

Es decir, k es un invariante del grupo.

Si tenemos dos descomposiciones:

$$G = \mathbb{Z}_{p^{r_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^{r_k}} = \mathbb{Z}_{p^{s_1}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p^{s_t}}$$

entonces, aplicando el resultado anterior sobre el orden de la imagen del homomorfismo φ :

$$\frac{|G|}{p^k} = |\varphi(G)| = \frac{|G|}{p^t}$$

y de ahí se sigue que $k = t$.

Ahora, ordenando los factores podemos suponer $r_1 \geq \dots \geq r_k$ y $s_1 \geq \dots \geq s_k$. Si $r_1 > s_1$, entonces G tiene un elemento de orden p^{r_1} (proveniente del primer factor de la primera descomposición). Pero por otra parte, dada la segunda descomposición, el elemento de orden más grande de G es p^{s_1} . Esto genera una contradicción ($\#C$) con el hecho de que exista un elemento de orden p^{r_1} . Por tanto, debe ser $r_1 \leq s_1$.

Por simetría (intercambiando los roles de las descomposiciones), se tiene $s_1 \leq r_1$. En conclusión, $r_1 = s_1$.

Cancelando estos factores (o iterando el proceso) se concluye que:

$$r_i = s_i \quad \forall 1 \leq i \leq k = t$$

□

Teorema 6.2.3. *Sea G un grupo abeliano finito. Entonces:*

- a) G es producto de grupos cíclicos de órdenes potencias de primos.
- b) Los órdenes de los factores directos son únicos.
- c) Si $m = |G| = p_1^{e_1} \cdots p_r^{e_r}$ con los p_i primos distintos y $e_i > 0$ para todo i , entonces la cantidad de grupos abelianos de orden m (salvo isomorfismo) es igual al producto:

$$p(e_1) \cdots p(e_r)$$

en donde $p(n)$ cuenta la cantidad de formas distintas de expresar n como suma de enteros positivos (particiones de n), es decir, $n = n_1 + \cdots + n_k$ con $n_1 \geq n_2 \geq \cdots \geq n_k$.

Demostración.

a) Por el Teorema de Descomposición Primaria, G es isomorfo al producto directo de sus p -subgrupos de Sylow. Por el corolario anterior, sabemos que cada p -subgrupo de Sylow se puede expresar como producto de subgrupos cíclicos de orden potencia de primos. Al juntar estas descomposiciones, obtenemos el resultado para G .

b) La unicidad de los órdenes de los factores directos también está garantizada por el corolario anterior aplicado a cada componente primaria (los subgrupos de Sylow), dado que la descomposición en cíclicos para p -grupos es única salvo el orden.

c) La última parte se sigue de la estructura de los subgrupos de Sylow. Si P es un p -grupo de orden p^n , el número de grupos abelianos no isomorfos de ese orden corresponde a las distintas formas de elegir los órdenes de sus factores cíclicos, lo cual equivale a las particiones del entero n , denotado por $p(n)$. Como la estructura de G está determinada independientemente por cada uno de sus subgrupos de Sylow P_{p_i} de orden $p_i^{e_i}$, el número total de estructuras posibles es el producto de las posibilidades para cada primo, es decir, $p(e_1) \cdots p(e_r)$. $\square$

Ejemplo 6.5. 1) Sea G un grupo abeliano, $|G| = 60 = 5 \cdot 2^2 \cdot 3$. Entonces sus subgrupos de Sylow son:

$$P_5 \cong \mathbb{Z}_5, \quad P_3 \cong \mathbb{Z}_3$$

Para el primo 2, como $2^2 = 4$, tenemos dos posibilidades:

$$P_2 \cong \begin{cases} \mathbb{Z}_{2^2} = \mathbb{Z}_4 \\ \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \end{cases}$$

Por lo tanto, las posibles estructuras para G son:

- $G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_4 \cong \mathbb{Z}_{60}$
- $G \cong \mathbb{Z}_5 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{Z}_{30} \times \mathbb{Z}_2$

2) Si $|G| = 8$ y es abeliano. Entonces $G = P_2$. Las posibilidades corresponden a las particiones del exponente 3:

- $\mathbb{Z}_{2^3} = \mathbb{Z}_8$
- $\mathbb{Z}_{2^2} \times \mathbb{Z}_2 = \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$
- $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$

Teorema 6.2.4 (Teorema Fundamental de los Grupos Abelianos Finitos). *Sea G un grupo abeliano finito, entonces G se puede... expresar como producto de factores cíclicos*

$$G \cong C_1 \times C_2 \times \cdots \times C_k$$

en donde $|C_{i+1}|$ divide a $|C_i|$ para $1 \leq i \leq k-1$. Y de hecho la representación es única.

Demostración.

Por el teorema anterior, G es producto de subgrupos cíclicos de orden potencia de primos. De hecho, esta representación se obtiene de la representación de sus p -grupos de Sylow.

Sea $G = P_{p_1} \cdots P_{p_r}$ con los P_{p_i} los p_i -grupos de Sylow de G y

$$P_{p_i} \cong \underbrace{\mathbb{Z}_{p_i^{e_{i1}}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_i^{e_{ij_i}}}}_{j_i \text{ factores}}$$

Tomemos

$$C_1 = \mathbb{Z}_{p_1^{e_{11}}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r^{e_{r1}}}$$

$\vdots$

$$C_k = \mathbb{Z}_{p_1^{e_{1k}}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r^{e_{rk}}}$$

en donde $\mathbb{Z}_{p_t^{e_{tl}}} = \{e\}$ si $l > j_t$ (es decir, si se acaban los factores para ese primo, rellenamos con la identidad).

Claramente:

$$|C_{i+1}| = p_1^{e_{1(i+1)}} \cdots p_r^{e_{r(i+1)}} \mid p_1^{e_{1i}} \cdots p_r^{e_{ri}} = |C_i|$$

(Esto se cumple porque ordenamos los exponentes de mayor a menor para cada primo: $e_{t1} \geq e_{t2} \geq \cdots$).

Veamos ahora la unicidad de esta descomposición.

Supongamos que G admite dos descomposiciones en factores cíclicos que cumplen la condición de divisibilidad:

$$G \cong A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_k$$

donde $|A_{i+1}|$ divide a $|A_i|$, y

$$G \cong B_1 \times B_2 \times \cdots \times B_m$$

donde $|B_{j+1}|$ divide a $|B_j|$.

Queremos demostrar que $k = m$ y que $A_i \cong B_i$ para todo i (o equivalentemente, que $|A_i| = |B_i|$).

Sabemos, por el teorema de descomposición primaria y el corolario anterior, que G se descompone de manera única (salvo orden) en producto de grupos cíclicos de orden potencia de primo (sus divisores elementales). Descompongamos cada A_i en sus partes primarias:

$$A_i \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_{i,1}}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{e_{i,2}}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_r^{e_{i,r}}}$$

La condición de divisibilidad $|A_{i+1}| \mid |A_i|$ implica que para cada primo p_j , los exponentes deben ser decrecientes respecto al índice i :

$$e_{1,j} \geq e_{2,j} \geq e_{3,j} \geq \cdots$$

Esto significa que $|A_1|$ se forma tomando la potencia más alta de cada primo disponible en la descomposición completa de G ; $|A_2|$ se forma tomando la segunda potencia más alta de cada primo, y así sucesivamente.

Si hiciéramos lo mismo con los B_j , tendríamos que $|B_1|$ debe contener la potencia más alta de cada primo en la descomposición de divisores elementales de G . Como la colección de divisores elementales de G es única, la potencia máxima para el primo p_1 es única, la potencia máxima para p_2 es única, etc. Por lo tanto:

$$|A_1| = |B_1|$$

Una vez "gastados" los factores de mayor potencia, $|A_2|$ y $|B_2|$ deben formarse con las potencias "segundas más altas" de cada primo. Nuevamente, por la unicidad de los divisores elementales, estos coinciden:

$$|A_2| = |B_2|$$

Iterando este proceso, concluimos que $|A_i| = |B_i|$ para todo i . Si una descomposición tuviera más términos que la otra (por ejemplo $k > m$), los términos sobrantes $A_{m+1}, \dots$ tendrían que estar formados por factores triviales (orden 1), pues ya habríamos agotado todos los factores primos no triviales de G .

Por lo tanto, la descomposición en factores invariantes es única. A los números $|C_1|, \dots, |C_k|$ se les denomina los factores invariantes del grupo. Note que están bien determinados debido a la unicidad de la representación.

□

6.3. Solubilidad y Nilpotencia

Definición 6.3.1 (Conmutador). Sea G un grupo y sean $a, b \in G$. Denotamos el conmutador de a y b por $[a, b]$, el cual definimos como:

$$[a, b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

Nota 6.3.1. El conmutador es llamado así pues mide la falta de conmutatividad del grupo. Note que G es abeliano si y solo si el único conmutador es la identidad, es decir, $[a, b] = e$ para todo $a, b \in G$.

Definición 6.3.2. Si $H, K \leq G$, denotamos por $[H, K]$ al subgrupo generado por los conmutadores de H y K :

$$[H, K] = \langle [h, k] \mid h \in H, k \in K \rangle.$$

A este subgrupo se le llama el conmutador de H y K .

Observación 6.3.1. Se cumple que $[H, K] \leq G$. Si $H = K = G$, entonces se denota por:

$$G' = G^{(1)} = [G, G] = \langle [g, h] \mid g, h \in G \rangle.$$

Y se llama el grupo derivado de G .

Demostración.

El hecho de que $[H, K] \leq G$ es inmediato por la definición de subgrupo generado por un subconjunto de elementos de G . Para el caso G' , note que el inverso de un conmutador es un conmutador:

$$[a, b]^{-1} = (aba^{-1}b^{-1})^{-1} = bab^{-1}a^{-1} = [b, a].$$

Y el conjugado de un conmutador es un conmutador:

$$g[a, b]g^{-1} = [gag^{-1}, gbg^{-1}].$$

Por lo tanto, G' es un subgrupo normal de G . □

Inductivamente se define la siguiente serie:

$$G^{(n)} = (G^{(n-1)})' = [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}].$$

Observación 6.3.2 (Serie Derivada). Como $G' \leq G$, se tiene que $G'' = G^{(2)} = (G')' \leq G' = G^{(1)} \leq G = G^{(0)}$. Y en general:

$$G^{(n)} = (G^{(n-1)})' \leq G^{(n-1)} \leq G^{(n-2)} \leq \dots \leq G^{(0)} = G.$$

A esta serie de subgrupos se le denomina serie derivada.

Demostración.

Demostraremos la cadena descendente por inducción sobre n . Para $n = 1$, tenemos $G^{(1)} = [G, G]$. Como el conmutador de dos elementos de G es un producto de elementos de G y sus inversos, claramente $[G, G] \subseteq G$, y al ser subgrupo, $G^{(1)} \leq G^{(0)}$.

Supongamos válida la hipótesis de inducción: $G^{(n-1)} \leq G^{(n-2)}$. Queremos ver que $G^{(n)} \leq G^{(n-1)}$. Por definición, $G^{(n)} = [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}]$. Dado que $G^{(n-1)}$ es un grupo, el conmutador de cualesquiera dos de sus elementos pertenece a $G^{(n-1)}$. Por lo tanto, el subgrupo generado por estos conmutadores está contenido en $G^{(n-1)}$. Es decir, $G^{(n)} \leq G^{(n-1)}$. □

Definición 6.3.3. Sea G un grupo. Se define inductivamente la serie $G_{(n)}$ como:

$$\begin{aligned} G_{(1)} &= [G, G] = G^{(1)} = G', \\ G_{(n)} &= [G, G_{(n-1)}]. \end{aligned}$$

Observación 6.3.3. Para cada $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $G_{(n)} \triangleleft G$.

Demostración.

Procedemos por inducción sobre n .

Base de inducción ($n = 1$): $G_{(1)} = [G, G] = G'$. Sabemos que el subgrupo derivado es normal en G , pues para cualquier $g \in G$ y cualquier conmutador $[x, y] \in G'$, tenemos:

$$g[x, y]g^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}] \in G'.$$

Paso inductivo: Supongamos que $G_{(n-1)} \triangleleft G$. Queremos demostrar que $G_{(n)} \triangleleft G$. Recordemos que $G_{(n)} = [G, G_{(n-1)}]$. Este grupo está generado por elementos de la forma $[a, b]$ donde $a \in G$ y $b \in G_{(n-1)}$. Sea $g \in G$. Debemos probar que $g[a, b]g^{-1} \in G_{(n)}$. Desarrollamos el conjugado algebraicamente:

$$\begin{aligned} g[a, b]g^{-1} &= g(aba^{-1}b^{-1})g^{-1} \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(ga^{-1}g^{-1})(gb^{-1}g^{-1}) \\ &= (gag^{-1})(gbg^{-1})(gag^{-1})^{-1}(gbg^{-1})^{-1} \\ &= [gag^{-1}, gbg^{-1}]. \end{aligned}$$

Analizamos los términos del nuevo conmutador $[gag^{-1}, gbg^{-1}]$:

1. El primer término gag^{-1} pertenece a G , ya que $a \in G$ y G es cerrado bajo conjugación.
2. El segundo término gbg^{-1} pertenece a $G_{(n-1)}$. Esto es cierto por la **hipótesis de inducción**, ya que asumimos que $G_{(n-1)} \triangleleft G$.

Por definición de $G_{(n)} = [G, G_{(n-1)}]$, el conmutador de un elemento de G con uno de $G_{(n-1)}$ pertenece a $G_{(n)}$. Por lo tanto, $[gag^{-1}, gbg^{-1}] \in G_{(n)}$. Esto demuestra que $G_{(n)}$ es cerrado bajo conjugación por elementos de G , luego $G_{(n)} \triangleleft G$. $\square$

Observación 6.3.4 (Serie Central Descendente). Se cumple la siguiente cadena de contenciones:

$$G = G_{(0)} \supseteq G_{(1)} \supseteq G_{(2)} \supseteq \cdots \supseteq G_{(n)}.$$

Esta serie es llamada la serie central descendente.

Demostración.

Debemos demostrar que $G_{(n)} \subseteq G_{(n-1)}$ para todo $n \geq 1$. Por definición, $G_{(n)} = [G, G_{(n-1)}]$. Los generadores de $G_{(n)}$ son de la forma $[g, h] = ghg^{-1}h^{-1}$ con $g \in G$ y $h \in G_{(n-1)}$.

Como acabamos de demostrar en la observación anterior, $G_{(n-1)} \triangleleft G$. La normalidad implica que para todo $g \in G$ y $h \in G_{(n-1)}$, el conjugado $ghg^{-1} \in G_{(n-1)}$. Entonces, el elemento $[g, h]$ se puede escribir como:

$$[g, h] = (ghg^{-1})h^{-1}.$$

Dado que $ghg^{-1} \in G_{(n-1)}$ y $h^{-1} \in G_{(n-1)}$ (pues es un subgrupo), el producto pertenece a $G_{(n-1)}$. Así, todos los generadores de $G_{(n)}$ están en $G_{(n-1)}$, lo que implica $G_{(n)} \subseteq G_{(n-1)}$. $\square$

Nuevamente definimos otra serie importante.

Definición 6.3.4. Sea G un grupo. Definimos $C_{(1)} = Z(G)$. Definimos inductivamente $C_{(n)}$ tal que, dado $C_{(n-1)} \triangleleft G$, aplicamos el Teorema de la Correspondencia. $C_{(n)}$ es el subgrupo de G que corresponde a $Z(G/C_{(n-1)})$. Es decir:

$$\frac{C_{(n)}}{C_{(n-1)}} = Z\left(\frac{G}{C_{(n-1)}}\right).$$

Iniciamos la recursión con $C_{(0)} = \{e\}$.

Observación 6.3.5 (Serie Central Ascendente). Se tiene la cadena de subgrupos normales:

$$C_{(n)} \supseteq C_{(n-1)} \supseteq \cdots \supseteq C_{(2)} \supseteq C_{(1)} = Z(G).$$

Esta se llama la serie central ascendente.

Demostración.

Primero justificamos la normalidad $C_{(n)} \triangleleft G$. El centro de cualquier grupo es un subgrupo normal (de hecho, característico). Por tanto, $Z(G/C_{(n-1)})$ es un subgrupo normal del grupo cociente $G/C_{(n-1)}$. Por el Teorema de la Correspondencia, la preimagen de un subgrupo normal en el cociente es un subgrupo normal en el grupo original que contiene al núcleo. Así, $C_{(n)} \triangleleft G$.

Para la contención $C_{(n)} \supseteq C_{(n-1)}$: El subgrupo identidad del cociente $G/C_{(n-1)}$ es el conjunto $\{C_{(n-1)}\}$. Claramente, la identidad pertenece al centro del cociente. Bajo la correspondencia canónica $\pi : G \rightarrow G/C_{(n-1)}$, tenemos que:

$$C_{(n)} = \pi^{-1}\left(Z\left(\frac{G}{C_{(n-1)}}\right)\right).$$

Como el centro contiene a la identidad del cociente, la preimagen $C_{(n)}$ debe contener al núcleo del homomorfismo, que es $C_{(n-1)}$. Por lo tanto, $C_{(n)} \supseteq C_{(n-1)}$. $\square$

Definición 6.3.5. Un grupo G es:

1. Soluble si $G^{(n)} = \{e\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$.
2. Nilpotente si $G_{(n)} = \{e\}$ para algún $n \in \mathbb{N}$.

Observación 6.3.6. Para todo $n \in \mathbb{N}$, se cumple que $G^{(n)} \subseteq G_{(n)}$.

Demostración.

Demostraremos esta inclusión por inducción sobre n .

Base de inducción ($n = 1$): Por definición, $G^{(1)} = [G, G]$ y $G_{(1)} = [G, G]$. Claramente $G^{(1)} \subseteq G_{(1)}$ (de hecho son iguales).

Paso inductivo: Supongamos que $G^{(n-1)} \subseteq G_{(n-1)}$. Queremos probar que $G^{(n)} \subseteq G_{(n)}$. Recordemos las definiciones:

$$\begin{aligned} G^{(n)} &= [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}], \\ G_{(n)} &= [G, G_{(n-1)}]. \end{aligned}$$

Usamos la propiedad de monotonía del conmutador: si $A \subseteq C$ y $B \subseteq D$, entonces $[A, B] \subseteq [C, D]$. Tenemos dos inclusiones:

1. $G^{(n-1)} \subseteq G$ (esto es cierto para cualquier término de la serie derivada).
2. $G^{(n-1)} \subseteq G_{(n-1)}$ (por hipótesis de inducción).

Aplicando la monotonía:

$$G^{(n)} = [G^{(n-1)}, G^{(n-1)}] \subseteq [G, G_{(n-1)}] = G_{(n)}.$$

Por lo tanto, $G^{(n)} \subseteq G_{(n)}$. □

Proposición 6.3.1. Sea G un grupo. Si G es nilpotente, entonces G es soluble.

Demostración.

Supongamos que G es nilpotente. Por definición, esto significa que la serie central descendente llega a la identidad en un número finito de pasos. Es decir, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que:

$$G_{(n)} = \{e\}.$$

Utilizando la observación anterior, sabemos que $G^{(n)} \subseteq G_{(n)}$. Sustituyendo $G_{(n)} = \{e\}$, obtenemos:

$$G^{(n)} \subseteq \{e\}.$$

Como $G^{(n)}$ es un subgrupo, la única posibilidad es que $G^{(n)} = \{e\}$. Esto cumple exactamente con la definición de solubilidad. Por lo tanto, G es soluble. □

Proposición 6.3.2. Sea G un grupo. Si G es nilpotente, entonces G es soluble.

Demostración.

Previamente observamos la relación entre los términos de las series: para todo $k \in \mathbb{N}$, se cumple que $G^{(k)} \subseteq G_{(k)}$.

Si G es nilpotente, por definición existe un entero $n \in \mathbb{N}$ tal que la serie central descendente llega a la identidad, es decir, $G_{(n)} = \{e\}$.

Sustituyendo en la contención mencionada:

$$G^{(n)} \subseteq G_{(n)} = \{e\} \implies G^{(n)} = \{e\}.$$

Dado que la serie derivada llega a la identidad en un número finito de pasos, concluimos que G es soluble. $\square$

Teorema 6.3.1. *Sea G un grupo soluble (resp. nilpotente).*

1. *Si $H \leq G$, entonces H es soluble (resp. nilpotente).*
2. *Si $N \triangleleft G$, entonces G/N es soluble (resp. nilpotente).*

Demostración.

1. *Para Subgrupos:*

Sea $H \leq G$. Dado que $H \subseteq G$, el conjunto de conmutadores de elementos de H está contenido en el de G . Inductivamente mostramos que las series de H decrecen más rápido o igual que las de G .

Caso Soluble: Probaremos que $H^{(k)} \subseteq G^{(k)}$. Para $k = 0$, $H \subseteq G$. Supongamos que $H^{(k-1)} \subseteq G^{(k-1)}$. Entonces, por la monotonía del conmutador:

$$H^{(k)} = [H^{(k-1)}, H^{(k-1)}] \subseteq [G^{(k-1)}, G^{(k-1)}] = G^{(k)}.$$

Si G es soluble, existe n tal que $G^{(n)} = \{e\}$. Entonces $H^{(n)} \subseteq \{e\}$, de donde $H^{(n)} = \{e\}$, por lo que H es soluble.

Caso Nilpotente: Probaremos que $H_{(k)} \subseteq G_{(k)}$. Para $k = 1$, $H_{(1)} = [H, H] \subseteq [G, G] = G_{(1)}$. Supongamos que $H_{(k-1)} \subseteq G_{(k-1)}$. Entonces:

$$H_{(k)} = [H, H_{(k-1)}] \subseteq [G, G_{(k-1)}] = G_{(k)}.$$

Si G es nilpotente, $G_{(n)} = \{e\}$ para algún n , lo que implica $H_{(n)} = \{e\}$. Por tanto H es nilpotente.

2. *Para Cocientes:*

Sea $\pi : G \rightarrow G/N$ el homomorfismo canónico definido por $\pi(g) = gN$. Usaremos la propiedad fundamental de que la imagen de un conmutador es el conmutador de las imágenes: $\pi([A, B]) = [\pi(A), \pi(B)]$.

Caso Soluble: Probaremos por inducción que $(G/N)^{(k)} = \pi(G^{(k)})$. Para $k = 1$:

$$(G/N)^{(1)} = [G/N, G/N] = [\pi(G), \pi(G)] = \pi([G, G]) = \pi(G^{(1)}).$$

Supongamos válido para $k - 1$. Entonces:

$$(G/N)^{(k)} = [(G/N)^{(k-1)}, (G/N)^{(k-1)}] = [\pi(G^{(k-1)}), \pi(G^{(k-1)})] = \pi([G^{(k-1)}, G^{(k-1)}]) = \pi(G^{(k)}).$$

Si G es soluble, existe n tal que $G^{(n)} = \{e\}$. Entonces:

$$(G/N)^{(n)} = \pi(G^{(n)}) = \pi(\{e\}) = \{N\}.$$

Como $\{N\}$ es la identidad en G/N , el cociente es soluble.

Caso Nilpotente: Probaremos que $(G/N)_{(k)} = \pi(G_{(k)})$. Para $k = 1$, $(G/N)_{(1)} = [G/N, G/N] = \pi(G_{(1)})$. Supongamos válido para $k - 1$. Entonces:

$$(G/N)_{(k)} = [G/N, (G/N)_{(k-1)}] = [\pi(G), \pi(G_{(k-1)})] = \pi([G, G_{(k-1)}]) = \pi(G_{(k)}).$$

Si G es nilpotente, $G_{(n)} = \{e\}$. Entonces $(G/N)_{(n)} = \pi(\{e\}) = \{N\}$. El cociente es nilpotente. $\square$

Proposición 6.3.3. *Sea G un grupo y $N \triangleleft G$. Si N es soluble y G/N es soluble, entonces G es soluble.*

Demostración.

Como G/N es soluble, existe un entero $k \in \mathbb{N}$ tal que la serie derivada del cociente llega a la identidad. Usando la relación demostrada en el teorema anterior $((G/N)^{(k)} = \pi(G^{(k)}))$:

$$(G/N)^{(k)} = \frac{G^{(k)}N}{N} = \{N\}.$$

Esto implica que $G^{(k)}N \subseteq N$. Dado que $N \subseteq G^{(k)}N$, tenemos la igualdad $G^{(k)}N = N$, lo que implica $G^{(k)} \subseteq N$.

Por otro lado, como N es soluble, existe un entero $m \in \mathbb{N}$ tal que $N^{(m)} = \{e\}$. Dado que $G^{(k)} \subseteq N$, aplicamos la propiedad de monotonía para subgrupos demostrada anteriormente:

$$(G^{(k)})^{(m)} \subseteq N^{(m)} = \{e\}.$$

Recordando que $(G^{(k)})^{(m)} = G^{(k+m)}$, tenemos:

$$G^{(k+m)} = \{e\}.$$

Esto demuestra que la serie derivada de G termina en la identidad, por lo tanto G es soluble. $\square$

Observación 6.3.7. *La proposición anterior no es cierta si se cambia "soluble" por "nilpotente". Es decir, si N y G/N son nilpotentes, G no necesariamente es nilpotente.*

Demostración.

Analicemos el contraejemplo $G = S_3$ (grupo simétrico de grado 3). Tomamos $N = A_3$ (grupo alternante).

- $N = A_3 \cong \mathbb{Z}_3$. Es abeliano, luego nilpotente.
- $G/N = S_3/A_3 \cong \mathbb{Z}_2$. Es abeliano, luego nilpotente.

Sin embargo, S_3 no es nilpotente. Su centro es trivial $Z(S_3) = \{e\}$, por lo que la serie central ascendente es constante $C_{(n)} = \{e\}$. Equivalentemente, veamos su serie central descendente:

$$G_{(1)} = [S_3, S_3] = A_3.$$

Para el siguiente término $G_{(2)} = [S_3, A_3]$. Sean $\tau = (12) \in S_3$ y $\sigma = (123) \in A_3$:

$$[\tau, \sigma] = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} = (12)(123)(12)(132) = (12)(123)(13) = (123).$$

Como el conmutador genera todo A_3 , tenemos $G_{(2)} = A_3$. Inductivamente $G_{(n)} = A_3 \neq \{e\}$ para todo n . Así, S_3 no es nilpotente. $\square$

Observación 6.3.8. En general, para $n \geq 5$, se cumple que $A_n = A'_n$. Por lo tanto, A_n no es soluble.

Demostración.

Si $G = A_n$ con $n \geq 5$, el grupo es simple no abeliano. Calculamos su derivado $A'_n = [A_n, A_n]$. Como A'_n es un subgrupo normal de A_n , y A_n es simple, las únicas posibilidades son $A'_n = \{e\}$ o $A'_n = A_n$. Como A_n no es abeliano (para $n \geq 5$), $A'_n \neq \{e\}$. Por lo tanto, $A'_n = A_n$. Esto implica que la serie derivada es constante:

$$A_n^{(k)} = A_n \neq \{e\} \quad \forall k.$$

Luego, A_n no es soluble. $\square$

Observación 6.3.9. Sea G un grupo. Si $G/Z(G)$ es nilpotente, entonces G es nilpotente.

Demostración.

Supongamos que $G/Z(G)$ es nilpotente. Existe n tal que:

$$(G/Z(G))_{(n)} = \{Z(G)\}.$$

Usando la identidad $(G/N)_{(n)} = \frac{G_{(n)}N}{N}$ con $N = Z(G)$:

$$\frac{G_{(n)}Z(G)}{Z(G)} = \{Z(G)\}.$$

Esto implica $G_{(n)} \subseteq Z(G)$.

Analizamos el siguiente término de la serie central descendente de G :

$$G_{(n+1)} = [G, G_{(n)}].$$

Como $G_{(n)} \subseteq Z(G)$, para todo $x \in G_{(n)}$, x conmuta con todo elemento de G . Entonces, para todo $g \in G$ y $x \in G_{(n)}$, $[g, x] = e$. Por lo tanto:

$$G_{(n+1)} = \{e\}.$$

Concluimos que G es nilpotente. $\square$

Proposición 6.3.4. *El producto directo finito de grupos solubles (resp. nilpotentes) es soluble (resp. nilpotente).*

Demostración.

Sea $G = H \times K$ el producto directo de dos grupos. Probaremos el resultado para dos factores; el caso general se sigue por inducción matemática sobre el número de factores.

1. *Caso Soluble:* Supongamos que H y K son solubles. Existen enteros n_1, n_2 tales que $H^{(n_1)} = \{e_H\}$ y $K^{(n_2)} = \{e_K\}$. Sea $n = \max(n_1, n_2)$.

Recordemos que las operaciones en el producto directo se realizan componente a componente. El conmutador de dos elementos (h_1, k_1) y (h_2, k_2) en G es:

$$\begin{aligned} [(h_1, k_1), (h_2, k_2)] &= (h_1, k_1)(h_2, k_2)(h_1, k_1)^{-1}(h_2, k_2)^{-1} \\ &= (h_1 h_2 h_1^{-1} h_2^{-1}, k_1 k_2 k_1^{-1} k_2^{-1}) \\ &= ([h_1, h_2], [k_1, k_2]). \end{aligned}$$

Por inducción sobre m , se cumple que el término m -ésimo de la serie derivada es el producto directo de los términos de los factores:

$$(H \times K)^{(m)} = H^{(m)} \times K^{(m)}.$$

Evaluyendo en $n = \max(n_1, n_2)$:

$$G^{(n)} = H^{(n)} \times K^{(n)} = \{e_H\} \times \{e_K\} = \{(e_H, e_K)\} = \{e_G\}.$$

Por lo tanto, G es soluble.

2. *Caso Nilpotente:* Supongamos que H y K son nilpotentes. Existen n_1, n_2 tales que $H_{(n_1)} = \{e_H\}$ y $K_{(n_2)} = \{e_K\}$. Sea $n = \max(n_1, n_2)$.

De manera análoga, el conmutador de un elemento de G con uno de un término de la serie central se comporta componente a componente:

$$[(g_h, g_k), (x_h, x_k)] = ([g_h, x_h], [g_k, x_k]).$$

Esto implica que para la serie central descendente se cumple:

$$(H \times K)_{(m)} = H_{(m)} \times K_{(m)}.$$

Evaluyendo en n :

$$G_{(n)} = H_{(n)} \times K_{(n)} = \{e_H\} \times \{e_K\} = \{e_G\}.$$

Por lo tanto, G es nilpotente. □

- Observación 6.3.10** (Ejemplos y Notas). 1. El grupo simétrico S_n no es soluble para $n \geq 5$ (como vimos con A_n). Dado que todo grupo nilpotente es soluble, S_n tampoco es nilpotente para $n \geq 5$.
2. Sea G un p -grupo finito (es decir, $|G| = p^n$ con $n \geq 1$). Entonces G es nilpotente.
3. Si G es un producto directo de sus subgrupos de Sylow, entonces G es nilpotente. Esto se sigue de la proposición anterior, ya que los p -grupos son nilpotentes y el producto directo de nilpotentes es nilpotente.

Demostración de que todo p -grupo es nilpotente.

Procedemos por inducción sobre el orden de G , es decir, sobre el exponente n donde $|G| = p^n$.

Base de inducción ($n = 1$): Si $|G| = p$, entonces $G \cong \mathbb{Z}_p$, que es abeliano y por tanto nilpotente.

Hipótesis de inducción: Supongamos que todo p -grupo de orden p^k con $k < n$ es nilpotente.

Paso inductivo: Sea G un grupo de orden p^n . Sabemos, por la ecuación de clase para p -grupos, que el centro es no trivial: $Z(G) \neq \{e\}$. Consideremos el grupo cociente $G/Z(G)$.

$$\left| \frac{G}{Z(G)} \right| = \frac{|G|}{|Z(G)|} = \frac{p^n}{p^m} = p^{n-m}.$$

Como $|Z(G)| \geq p$ (es decir $m \geq 1$), el orden del cociente es estrictamente menor que el de G . Por hipótesis de inducción, $G/Z(G)$ es nilpotente.

Finalmente, aplicamos la observación demostrada previamente: si $G/Z(G)$ es nilpotente, entonces G es nilpotente. $\square$

Lema 6.3.1. Sea G un grupo finito.

1. Si G es nilpotente y H es un subgrupo propio de G ($H \subsetneq G$), entonces H es un subgrupo propio de su normalizador. Es decir:

$$H \subsetneq G \implies H \subsetneq N_G(H).$$

2. Para cualquier subgrupo de Sylow P de G , se cumple que $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$.

Demostración.

Demostración de 2: Sea $P \in \text{Syl}_p(G)$. Siempre se tiene que $N_G(P) \leq N_G(N_G(P))$. Veamos la otra contención. Sea $x \in N_G(N_G(P))$. Por definición de normalizador:

$$xN_G(P)x^{-1} = N_G(P).$$

Como $P \leq N_G(P)$, al conjugar por x tenemos que $xPx^{-1} \leq xN_G(P)x^{-1} = N_G(P)$.

Notemos que P es un p -subgrupo de Sylow de $N_G(P)$. Más aún, como $P \triangleleft N_G(P)$, P es el único p -subgrupo de Sylow de $N_G(P)$.

Por otro lado, como xPx^{-1} es un conjugado de un p -Sylow, también es un p -Sylow. Dado que ambos $(P$ y $xPx^{-1})$ son subgrupos de Sylow dentro del grupo $N_G(P)$, y solo hay uno, deben ser iguales:

$$xPx^{-1} = P.$$

Esto implica por definición que $x \in N_G(P)$. Por lo tanto, $N_G(N_G(P)) \leq N_G(P)$, y se da la igualdad.

Demostración de 1: Sea G nilpotente y $H \subsetneq G$. Procedemos por inducción sobre el orden de G .

Si G es abeliano, entonces $N_G(H) = G$. Como $H \subsetneq G$, entonces $H \subsetneq N_G(H)$ trivialmente.

Supongamos que G no es abeliano pero es nilpotente. Sabemos que $Z(G) \neq \{e\}$. Distinguimos dos casos:

Caso A: $Z(G) \not\leq H$. Sea $z \in Z(G)$ tal que $z \notin H$. Como z está en el centro, conmuta con todo elemento de G , y en particular con todo $h \in H$. Por tanto, $zHz^{-1} = H$, lo que implica $z \in N_G(H)$. Como $z \notin H$ y $z \in N_G(H)$, el normalizador contiene elementos fuera de H . Así, $H \subsetneq N_G(H)$ (pues contiene a $\langle H, z \rangle$).

Caso B: $Z(G) \leq H$. Consideremos el homomorfismo canónico $\pi : G \rightarrow G/Z(G)$. Sea $\bar{G} = G/Z(G)$ y $\bar{H} = H/Z(G)$.

Como G es nilpotente, $\bar{G}$ es nilpotente. Además, como $Z(G) \neq \{e\}$, tenemos $|\bar{G}| < |G|$. Como $H \subsetneq G$, entonces $\bar{H} \subsetneq \bar{G}$. Podemos aplicar la hipótesis de inducción al grupo cociente:

$$\bar{H} \subsetneq N_{\bar{G}}(\bar{H}).$$

Esto significa que existe un elemento $\bar{g} = gZ(G) \in \bar{G}$ tal que $\bar{g} \notin \bar{H}$ pero $\bar{g} \in N_{\bar{G}}(\bar{H})$. La condición $\bar{g} \in N_{\bar{G}}(\bar{H})$ implica:

$$(gZ(G)) \frac{H}{Z(G)} (gZ(G))^{-1} = \frac{H}{Z(G)}.$$

Operando en el cociente:

$$\frac{gHg^{-1}}{Z(G)} = \frac{H}{Z(G)} \implies gHg^{-1} = H.$$

Esto implica que $g \in N_G(H)$.

Por otro lado, como $\bar{g} \notin \bar{H}$, entonces $g \notin H$. Hemos encontrado un elemento $g \in N_G(H) \setminus H$. Por lo tanto, $H \subsetneq N_G(H)$. $\square$

Observación 6.3.11. En la observación anterior sobre la relación con el centro, también es válida la versión para grupos solubles.

Proposición 6.3.5. Sea G un grupo finito. Si $G/Z(G)$ es soluble, entonces G es soluble.

Demostración.

Supongamos que $G/Z(G)$ es soluble. Entonces existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que su serie derivada llega a la identidad:

$$\left(\frac{G}{Z(G)} \right)^{(n)} = \{Z(G)\}.$$

Usando la propiedad de los cocientes para series derivadas ($(G/N)^{(n)} = \frac{G^{(n)}N}{N}$), tenemos:

$$\frac{G^{(n)}Z(G)}{Z(G)} = \{Z(G)\}.$$

Esto implica que $G^{(n)} \subseteq Z(G)$.

Ahora calculamos el siguiente término de la serie derivada de G :

$$G^{(n+1)} = [G^{(n)}, G^{(n)}].$$

Como $G^{(n)} \subseteq Z(G)$, el conmutador de cualesquiera dos elementos de $G^{(n)}$ es el conmutador de dos elementos centrales. Los elementos del centro conmutan entre sí, por lo que:

$$[x, y] = e \quad \forall x, y \in G^{(n)}.$$

Por lo tanto:

$$G^{(n+1)} = \{e\}.$$

Concluimos que G es soluble. □

Teorema 6.3.2. *Sea G un grupo finito. G es nilpotente si y solo si G es el producto directo de sus subgrupos de Sylow.*

Demostración.

Dirección ($\Leftarrow$): Supongamos que G es el producto directo de sus subgrupos de Sylow, digamos $G = P_1 \times \cdots \times P_k$. Sabemos que todo p -grupo finito es nilpotente (visto en la observación anterior). Por la proposición demostrada previamente, el producto directo finito de grupos nilpotentes es nilpotente. Por lo tanto, G es nilpotente.

Dirección ($\Rightarrow$): Supongamos que G es nilpotente. Sea P un p -subgrupo de Sylow de G . Queremos demostrar que $P \triangleleft G$. Recordemos el Lema probado anteriormente: para cualquier subgrupo de Sylow P , se cumple que $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$.

Supongamos por contradicción que $N_G(P) \neq G$, es decir, $N_G(P)$ es un subgrupo propio de G . Como G es nilpotente, aplicamos la propiedad de los normalizadores para subgrupos propios ($H \subsetneq N_G(H)$) tomando $H = N_G(P)$. Entonces:

$$N_G(P) \subsetneq N_G(N_G(P)).$$

Pero esto contradice el lema que afirma $N_G(N_G(P)) = N_G(P)$. La única posibilidad es que $N_G(P) = G$. Esto implica que $P \triangleleft G$.

Como esto vale para todo subgrupo de Sylow de G (para cada primo que divide el orden), todos los subgrupos de Sylow son normales. Sabemos que si todos los subgrupos de Sylow de un grupo finito son normales, entonces el grupo es el producto directo de ellos. Concluimos que G es el producto directo de sus subgrupos de Sylow. $\square$

Corolario 6.3.1. *Si G es nilpotente finito y m divide a $|G|$, entonces existe un subgrupo $H \leq G$ tal que $|H| = m$.*

Demostración.

Por el teorema anterior, $G \cong P_1 \times \cdots \times P_k$, donde cada P_i es un p_i -grupo. Sea $m = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$ la descomposición prima de m . Como cada P_i es un p -grupo, satisface el recíproco del Teorema de Lagrange (para p -grupos siempre existen subgrupos de cualquier orden que divida al total). Entonces, para cada i , existe $H_i \leq P_i$ tal que $|H_i| = p_i^{\alpha_i}$. Tomando $H = H_1 \times \cdots \times H_k$, tenemos un subgrupo de G con orden:

$$|H| = |H_1| \cdots |H_k| = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} = m.$$

$\square$

Teorema 6.3.3 (Caracterizaciones de Nilpotencia). *Sea G un grupo finito. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

1. G es nilpotente (es decir, $G_{(n)} = \{e\}$ para algún n).
2. Para todo subgrupo propio $H \subsetneq G$, se cumple $H \subsetneq N_G(H)$.
3. La serie central ascendente alcanza al grupo, es decir, $C_{(n)} = G$ para algún n .

Demostración.

Ya hemos demostrado $(1) \implies (2)$ en el lema de la página 27 y usamos $(2) \implies (1)$ implícitamente en el teorema de Sylow (vía la descomposición en producto directo). Ahora nos enfocaremos en la equivalencia con la serie central ascendente $(1) \iff (3)$.

Demostración de $(1) \implies (3)$: Sea G nilpotente. Sea n el mínimo entero tal que $G_{(n)} = \{e\}$. Demostraremos por inducción sobre j que $G_{(n-j)} \subseteq C_{(j)}$ para todo $0 \leq j \leq n$.

Para $j = 0$: $G_{(n)} = \{e\} = C_{(0)}$. La base es cierta.

Supongamos que $G_{(n-j)} \subseteq C_{(j)}$. Queremos ver que $G_{(n-(j+1))} \subseteq C_{(j+1)}$. Recordemos la definición de la serie ascendente mediante el conmutador:

$$C_{(j+1)} = \{g \in G \mid [g, x] \in C_{(j)} \forall x \in G\}.$$

Tomemos un elemento arbitrario $y \in G_{(n-j-1)}$. Queremos ver que $y \in C_{(j+1)}$. Para verificar esto, tomamos cualquier $x \in G$ y calculamos el conmutador $[x, y]$. Por definición de la serie central descendente:

$$[x, y] \in [G, G_{(n-j-1)}] = G_{(n-j)}.$$

Por hipótesis de inducción, sabemos que $G_{(n-j)} \subseteq C_{(j)}$. Por lo tanto, $[x, y] \in C_{(j)}$. Esto implica, por la definición de $C_{(j+1)}$, que $y \in C_{(j+1)}$.

Así hemos probado que $G_{(n-j-1)} \subseteq C_{(j+1)}$. Tomando $j = n$, obtenemos:

$$G_{(0)} \subseteq C_{(n)}.$$

Como $G_{(0)} = G$, tenemos $G \subseteq C_{(n)}$, lo que implica $C_{(n)} = G$.

Demostración de (3) $\implies$ (1): Supongamos que $C_{(n)} = G$ para algún n . Demostraremos por inducción que $G_{(j)} \subseteq C_{(n-j)}$.

Para $j = 0$: $G_{(0)} = G = C_{(n)}$. La base es cierta.

Supongamos que $G_{(j)} \subseteq C_{(n-j)}$. Queremos ver qué sucede con $G_{(j+1)}$.

$$G_{(j+1)} = [G, G_{(j)}].$$

Por hipótesis de inducción, $G_{(j)} \subseteq C_{(n-j)}$. Usando la monotonía del conmutador:

$$G_{(j+1)} \subseteq [G, C_{(n-j)}].$$

Recordemos la propiedad del término de la serie ascendente: $C_{(n-j)}/C_{(n-j-1)} = Z(G/C_{(n-j-1)})$. Esto significa que para todo $c \in C_{(n-j)}$ y $g \in G$, el conmutador $[g, c]$ pertenece a $C_{(n-j-1)}$. Por lo tanto:

$$[G, C_{(n-j)}] \subseteq C_{(n-j-1)}.$$

Combinando las inclusiones:

$$G_{(j+1)} \subseteq C_{(n-(j+1))}.$$

Tomando $j = n$, obtenemos:

$$G_{(n)} \subseteq C_{(0)} = \{e\}.$$

Por lo tanto, $G_{(n)} = \{e\}$, y G es nilpotente. □

En la demostración anterior se verificó la relación inversa entre las series. Específicamente:

- Si la serie descendente termina en la identidad ($G_{(n)} = \{e\}$), entonces la ascendente cubre todo el grupo ($C_{(n)} = G$).
- Si la serie ascendente cubre todo el grupo, entonces la descendente termina en la identidad.

Esto unifica las definiciones de nilpotencia usando cualquiera de las dos series centrales.