
b
Human lymph node — cell types where a foundation model leads
(Visium, 4,035 spots; 9 of 34 types shown, marker-gene PCC)
AIDO 0.44 0.60 0.59 0.54 0.20 0.50 0.34 0.55 -0.35
OmniCell 0.55 0.50 0.50 0.49 0.59 0.05 0.41 -0.04 -0.47
Novae 0.58 0.14 0.39 0.25 0.10 0.07 0.14 -0.15 0.15
cell2location 0.53 0.53 0.34 0.23 0.31 0.47 0.22 0.37 0.43
Tangram 0.49 0.07 0.32 0.15 0.08 0.38 0.36 0.32 0.28
SToFM 0.46 0.49 0.13 0.02 0.19 0.15 0.16 0.16 0.09
scGPT-spatial 0.42 0.22 0.32 0.25 0.48 0.26 0.24 -0.26 0.43
GraphST 0.38 0.46 0.24 0.27 0.27 0.32 0.30 0.27 0.34
OmiCLIP 0.09 0.35 -0.07 0.16 0.12 0.24 -0.09 0.11 0.25
Nicheformer 0.15 0.15 0.14 0.17 0.19 -0.13 -0.10 0.16 -0.15
HEIST 0.02 0.08 0.01 0.09 -0.00 0.08 -0.02 -0.02 0.03
STPath -0.04 0.02 0.08 -0.00 0.04 -0.11 0.03 0.00 0.03
VSMC
T_CD4+
DC_pDC
T_TIM3+
NKT
T_Treg
ILC
B_mem
T_CD8+_cytotoxic
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
per-cell-type PCC (predicted proportions vs marker expression)