

夹逼原理及例题

夹逼原理及例题

本段内容要点:

夹逼原理（两边夹原理）

二项式公式用于不等式放缩

系列例题，包括 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k q^n = 0, \quad (k \in \mathbb{N}, |q| < 1).$$

定理:[夹逼原理]:

设有三个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足:

(a) $x_n \leq y_n \leq z_n, n = 1, 2, \dots,$

(b) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a,$


定理:[夹逼原理]:

设有三个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足:


$$(a) \quad x_n \leq y_n \leq z_n, n = 1, 2, \cdots,$$

$$(b) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a,$$

则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$.



例₁: $x_n = \frac{\sin n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$



例₁: $x_n = \frac{\sin n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$

往证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$

例₁: $x_n = \frac{\sin n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$

往证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$

由于 $0 < \left| \frac{\sin n}{n} \right| < \frac{1}{n}, \quad \text{而} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$

例₁: $x_n = \frac{\sin n}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$

往证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$

由于 $0 < \left| \frac{\sin n}{n} \right| < \frac{1}{n}, \quad \text{而} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0.$




例2: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$

例2: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$

解: 记 $x_n = n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right),$

则 $n \cdot \frac{n}{n^2 + n\pi} \leq x_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2 + \pi}.$



例2: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$

解: 记 $x_n = n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right),$

则 $n \cdot \frac{n}{n^2 + n\pi} \leq x_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2 + \pi}.$

即 $\frac{n^2}{n^2 + n\pi} \leq x_n \leq \frac{n^2}{n^2 + \pi}.$

例2: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$

解: 记 $x_n = n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right),$

则 $n \cdot \frac{n}{n^2 + n\pi} \leq x_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2 + \pi}.$

即 $\frac{n^2}{n^2 + n\pi} \leq x_n \leq \frac{n^2}{n^2 + \pi}.$

因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + \pi} = 1.$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1.$

例3: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$

其中 $a_i > 0, i = 1, \cdots, k, k \in \mathbb{N}$ 是确定的数.

例3: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$

其中 $a_i > 0, i = 1, \cdots, k, k \in \mathbb{N}$ 是确定的数.

记 $x_n = (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$ $a = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}.$

例3: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$

其中 $a_i > 0, i = 1, \cdots, k, k \in \mathbb{N}$ 是确定的数.

记 $x_n = (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$ $a = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}.$

则 $(a^n)^{\frac{1}{n}} \leq x_n \leq (ka^n)^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}$

例3: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$

其中 $a_i > 0, i = 1, \cdots, k, k \in \mathbb{N}$ 是确定的数.

记 $x_n = (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$ $a = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}.$

则 $(a^n)^{\frac{1}{n}} \leq x_n \leq (ka^n)^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}$

$$a \leq x_n \leq \sqrt[n]{k}a$$

例3: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$

其中 $a_i > 0, i = 1, \cdots, k, k \in \mathbb{N}$ 是确定的数.

记 $x_n = (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}}, \quad \underline{a = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}}.$

则 $(a^n)^{\frac{1}{n}} \leq x_n \leq (ka^n)^{\frac{1}{n}}, \quad n \in \mathbb{N}$

$a \leq x_n \leq \sqrt[n]{k}a$ 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1,$
所以据夹逼原理, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

例3: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$


其中 $a_i > 0, i = 1, \cdots, k, k \in \mathbb{N}$ 是确定的数.

记 $x_n = (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}},$ $a = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}.$

则 $(a^n)^{\frac{1}{n}} \leq x_n \leq (ka^n)^{\frac{1}{n}}, n \in \mathbb{N}$

$a \leq x_n \leq \sqrt[n]{k}a$ 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{k} = 1,$
所以据夹逼原理, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}.$


$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

例₄: $x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

故 $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1},$

$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

$$\text{故} \boxed{\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}}, \quad x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n}$$

例₄: $x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

故 $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}$,

$$x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n}$$

$$< \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

故 $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}$,

$$x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n}$$

$$< \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

故 $\frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1}$,

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n} \\ &< \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} \\ &= \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

$$\text{故 } \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1},$$

$$x_n^2 < \frac{1}{2n+1}$$

$$x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n}$$

$$< \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

$$= \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{2n+1}$$

$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

$$\text{故 } \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1},$$

$$x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n}$$

$$< \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

$$= \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{2n+1}$$

$$x_n^2 < \frac{1}{2n+1}$$

$$0 < x_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

$$\text{例}_4: x_n = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}$$

解: 因为 $(n+1)(n-1) = n^2 - 1 < n^2$,

$$\text{故 } \frac{n-1}{n} < \frac{n}{n+1},$$

$$x_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n}$$

$$< \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{7} \cdot \dots \cdot \frac{2n-2}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1}$$

$$= \frac{1}{x_n} \cdot \frac{1}{2n+1}$$

$$x_n^2 < \frac{1}{2n+1}$$

$$0 < x_n < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$$

$$\text{所以 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} = 0.$$

注:二项式公式用于不等式放缩

注:二项式公式用于不等式放缩

当 $a > 1$ 时,
$$a^n = [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k$$

注:二项式公式用于不等式放缩

$$\begin{aligned} \text{当 } a > 1 \text{ 时, } a^n &= [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k \\ &= 1 + n(a - 1) + \frac{n(n-1)}{2}(a - 1)^2 + \dots + (a - 1)^n \end{aligned}$$

注:二项式公式用于不等式放缩

$$\begin{aligned} \text{当 } a > 1 \text{ 时, } a^n &= [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k \\ &= 1 + n(a - 1) + \boxed{\frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2} + \dots + (a-1)^n \end{aligned}$$

所以,

$$a^n \geq \frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2$$

注:二项式公式用于不等式放缩

$$\begin{aligned} \text{当 } a > 1 \text{ 时, } a^n &= [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k \\ &= 1 + n(a - 1) + \boxed{\frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2} + \dots + (a-1)^n \end{aligned}$$

所以,

$$a^n \geq \frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2 \quad \boxed{a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).}$$

这里使用了 $n > 2$ 时, $n - 1 > \frac{n}{2}$.

注:二项式公式用于不等式放缩

$$\begin{aligned} \text{当 } a > 1 \text{ 时, } a^n &= [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k \\ &= 1 + n(a - 1) + \boxed{\frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2} + \dots + (a-1)^n \end{aligned}$$

所以,

$$a^n \geq \frac{n(n-1)}{2}(a-1)^2 \quad \boxed{a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).}$$

当然也可以使用

$$a^n \geq \boxed{\frac{(n-1)^2}{2}}(a-1)^2, (n > 2).$$

注:二项式公式用于不等式放缩

$$\text{当 } a > 1 \text{ 时, } a^n = [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k$$
$$= 1 + n(a - 1) + \frac{n(n - 1)}{2}(a - 1)^2 + \dots + (a - 1)^n$$

所以,

$$a^n \geq \frac{n(n - 1)}{2}(a - 1)^2$$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a - 1)^2, (n > 2).$$

当然也可以使用

$$a^n \geq \frac{(n - 1)^2}{2}(a - 1)^2, (n > 2).$$

$$C_n^k$$

事实上,


$$a^n > n \text{ 的 } k \text{ 次多项式} * (a - 1)^k, n > N_0.$$

例₅: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{\underline{n \rightarrow \infty}} \sqrt[n]{n} = 1.$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, \quad (n > 2).$$

例₅: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$



证明:

因为 $\sqrt[n]{n} > 1$, 故 $(\sqrt[n]{n})^n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2$

例5: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$

证明:

因为 $\sqrt[n]{n} > 1$, 故 $(\sqrt[n]{n})^n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2$

即 $n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2.$

例5: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$

证明:

因为 $\sqrt[n]{n} > 1$, 故 $(\sqrt[n]{n})^n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2$

即 $n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2.$

故 $0 < \sqrt[n]{n} - 1 \leq \frac{2}{\sqrt{n}}$

例5: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$

证明:

因为 $\sqrt[n]{n} > 1$, 故 $(\sqrt[n]{n})^n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2$

即 $n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2.$

故 $0 < \sqrt[n]{n} - 1 \leq \frac{2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$

例5: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$

证明:


因为 $\sqrt[n]{n} > 1$, 故 $(\sqrt[n]{n})^n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2$

即 $n > \frac{n^2}{4}(\sqrt[n]{n} - 1)^2.$


故 $0 < \sqrt[n]{n} - 1 \leq \frac{2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$

据夹逼原理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} - 1 = 0,$

即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1.$


$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, \quad (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$


$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, \quad (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

$$|nq^n| = n|q|^n = n \frac{1}{(|q|^{-1})^n}.$$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, \quad (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

$$|nq^n| = n|q|^n = n \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

$$|nq^n| = n|q|^n = n \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

因 $|q|^{-1} > 1$, 故

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n^2}{4}(|q|^{-1} - 1)^2, (n > 2).$$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

$$|nq^n| = n|q|^n = n \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

因 $|q|^{-1} > 1$, 故

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n^2}{4}(|q|^{-1} - 1)^2, (n > 2).$$

$$\text{从而 } |nq^n| \leq n \cdot \frac{4}{n^2} \cdot \frac{1}{(|q|^{-1} - 1)^2}$$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

$$|nq^n| = n|q|^n = n \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

因 $|q|^{-1} > 1$, 故

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n^2}{4}(|q|^{-1} - 1)^2, (n > 2).$$

$$\begin{aligned} \text{从而 } |nq^n| &\leq n \cdot \frac{4}{n^2} \cdot \frac{1}{(|q|^{-1} - 1)^2} = \frac{4}{n} \cdot \frac{1}{(|q|^{-1} - 1)^2} \\ &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, (n > 2).$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$


$$|nq^n| = n|q|^n = n \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

因 $|q|^{-1} > 1$, 故

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n^2}{4}(|q|^{-1} - 1)^2, (n > 2).$$


$$\begin{aligned} \text{从而 } |nq^n| &\leq n \cdot \frac{4}{n^2} \cdot \frac{1}{(|q|^{-1} - 1)^2} = \frac{4}{n} \cdot \frac{1}{(|q|^{-1} - 1)^2} \\ &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

据夹逼原理, $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$


$$a^n \geq \frac{n^2}{4}(a-1)^2, \quad (n > 2).$$

例₆: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

例₇: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$


$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

例7: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

$$\boxed{(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3} \geq \frac{n}{6} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdot (|q|^{-1} - 1)^3$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

例7: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

这里使用了 $n > 3$ 时, $n - 1 > \frac{n}{2}$, $n - 2 > \frac{n}{3}$.

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

例7: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

$$\begin{aligned} & \geq \frac{n}{6} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdot (|q|^{-1} - 1)^3 \\ & = \frac{n^3}{36} (|q|^{-1} - 1)^3 \quad (n > 3) \end{aligned}$$

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3 \geq \frac{n}{6} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdot (|q|^{-1} - 1)^3$$

$$= \frac{n^3}{36} (|q|^{-1} - 1)^3 \quad (n > 3)$$

例6: $\lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$

例7: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

所以

$$|n^2 q^n| \leq n^2 \frac{36}{n^3} \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)}$$

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3 \geq \frac{n}{6} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdot (|q|^{-1} - 1)^3$$

$$\text{例}_6: \lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$$

$$= \frac{n^3}{36} (|q|^{-1} - 1)^3 \quad (n > 3)$$

$$\text{例}_7: \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

所以

$$|n^2 q^n| \leq n^2 \frac{36}{n^3} \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)}$$

$$= \frac{36}{n} \cdot \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3 \geq \frac{n}{6} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdot (|q|^{-1} - 1)^3$$

$$\text{例6: } \lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1).$$

$$= \frac{n^3}{36} (|q|^{-1} - 1)^3 \quad (n > 3)$$

$$\text{例7: } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

所以

$$|n^2 q^n| \leq n^2 \frac{36}{n^3} \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)}$$

$$= \frac{36}{n} \cdot \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

据夹逼原理, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$

$$(|q|^{-1})^n \geq \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} (|q|^{-1} - 1)^3 \geq \frac{n}{6} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdot (|q|^{-1} - 1)^3$$

$$\text{例6: } \lim_{n \rightarrow \infty} nq^n = 0 \quad (0 < |q| < 1). \quad = \frac{n^3}{36} (|q|^{-1} - 1)^3 \quad (n > 3)$$

$$\text{例7: } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$$

$$|n^2 q^n| = n^2 |q|^n = n^2 \cdot \frac{1}{(|q|^{-1})^n}$$

所以

$$\begin{aligned} |n^2 q^n| &\leq n^2 \frac{36}{n^3} \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)} \\ &= \frac{36}{n} \cdot \frac{|q|^3}{(1 - |q|^3)} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

$$\text{据夹逼原理, } \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$$

推而广之,
 $\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^k q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$

当 $a > 1$ 时, $a^n = [1 + (a - 1)]^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (a - 1)^k$

$$= 1 + n(a - 1) + \frac{n(n - 1)}{2}(a - 1)^2 + \dots + (a - 1)^n$$

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n^k q^n = 0, \quad 0 < |q| < 1.$$

本段知识要点:

夹逼原理

二项式公式用于不等式放缩

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^k q^n = 0, \quad (k \in \mathbb{N}, |q| < 1).$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1^n + a_2^n + \cdots + a_k^n)^{\frac{1}{n}} = \max\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}.$$

