

条件极值

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法一：如果限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 可以写成 $y = g(x)$ 的形式,
则问题变为 $z = f(x, g(x))$ 的一元极值问题

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法一：如果限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 可以写成 $y = g(x)$ 的形式,
则问题变为 $z = f(x, g(x))$ 的一元极值问题

例 求 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极值.

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法一：如果限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 可以写成 $y = g(x)$ 的形式，
则问题变为 $z = f(x, g(x))$ 的一元极值问题

例 求 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极值.

解： $\because y = 1 - x, \therefore z = 4 - x^2 - (1 - x)^2 = 3 + 2x - 2x^2,$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法一：如果限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 可以写成 $y = g(x)$ 的形式，
则问题变为 $z = f(x, g(x))$ 的一元极值问题

例 求 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极值.

解： $\because y = 1 - x, \therefore z = 4 - x^2 - (1 - x)^2 = 3 + 2x - 2x^2,$

$$\frac{dz}{dx} = 2 - 4x, \text{ 令 } \frac{dz}{dx} = 0 \text{ 得 } x = \frac{1}{2}$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法一：如果限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 可以写成 $y = g(x)$ 的形式，
则问题变为 $z = f(x, g(x))$ 的一元极值问题

例 求 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极值.

解： $\because y = 1 - x, \therefore z = 4 - x^2 - (1 - x)^2 = 3 + 2x - 2x^2,$

$$\frac{dz}{dx} = 2 - 4x, \text{ 令 } \frac{dz}{dx} = 0 \text{ 得 } x = \frac{1}{2}, \text{ 且 } \frac{d^2z}{dx^2} = -4 < 0,$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法一：如果限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 可以写成 $y = g(x)$ 的形式，
则问题变为 $z = f(x, g(x))$ 的一元极值问题

例 求 $z = 4 - x^2 - y^2$ 在条件 $x + y = 1$ 下的极值.

解： $\because y = 1 - x, \therefore z = 4 - x^2 - (1 - x)^2 = 3 + 2x - 2x^2,$

$$\frac{dz}{dx} = 2 - 4x, \text{ 令 } \frac{dz}{dx} = 0 \text{ 得 } x = \frac{1}{2}, \text{ 且 } \frac{d^2z}{dx^2} = -4 < 0,$$

$\therefore z(\frac{1}{2})$ 为极大值. 即所求极值为极大值, 为 $z(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = 4 - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{2}.$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法二：当限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 不易写成 $y = g(x)$ 的形式时，

则考虑曲线 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的极值问题.

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法二：当限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 不易写成 $y = g(x)$ 的形式时，

则考虑曲线 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的极值问题.

$$\therefore \begin{cases} dz = f'_x dx + f'_y dy \\ \phi'_x dx + \phi'_y dy = 0 \end{cases} \quad \therefore dz = f'_x dx - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y} dx = (f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}) dx,$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法二：当限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 不易写成 $y = g(x)$ 的形式时，

则考虑曲线 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的极值问题.

$$\therefore \begin{cases} dz = f'_x dx + f'_y dy \\ \phi'_x dx + \phi'_y dy = 0 \end{cases} \quad \therefore dz = f'_x dx - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y} dx = (f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}) dx,$$
$$\text{即 } \frac{dz}{dx} = f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}$$

假设 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下于点 (x_0, y_0) 取到极值, 则

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx}|_{(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法二：当限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 不易写成 $y = g(x)$ 的形式时，

则考虑曲线 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的极值问题.

$$\therefore \begin{cases} dz = f'_x dx + f'_y dy \\ \phi'_x dx + \phi'_y dy = 0 \end{cases} \quad \therefore dz = f'_x dx - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y} dx = (f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}) dx,$$

$$\text{即 } \frac{dz}{dx} = f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}$$

假设 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下于点 (x_0, y_0) 取到极值, 则

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx}|_{(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f'_x(x_0, y_0) - f'_y(x_0, y_0) \frac{\phi'_x(x_0, y_0)}{\phi'_y(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法二：当限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 不易写成 $y = g(x)$ 的形式时，

则考虑曲线 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的极值问题.

$$\because \begin{cases} dz = f'_x dx + f'_y dy \\ \phi'_x dx + \phi'_y dy = 0 \end{cases} \quad \therefore dz = f'_x dx - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y} dx = (f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}) dx,$$

$$\text{即 } \frac{dz}{dx} = f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}$$

假设 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下于点 (x_0, y_0) 取到极值, 则

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx}|_{(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f'_x(x_0, y_0) - f'_y(x_0, y_0) \frac{\phi'_x(x_0, y_0)}{\phi'_y(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{f'_x(x_0, y_0)}{\phi'_x(x_0, y_0)} = \frac{f'_y(x_0, y_0)}{\phi'_y(x_0, y_0)} \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

方法二：当限制条件 $\phi(x, y) = 0$ 不易写成 $y = g(x)$ 的形式时，

则考虑曲线 $C : \begin{cases} z = f(x, y) \\ \phi(x, y) = 0 \end{cases}$ 的极值问题.

$$\because \begin{cases} dz = f'_x dx + f'_y dy \\ \phi'_x dx + \phi'_y dy = 0 \end{cases} \quad \therefore dz = f'_x dx - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y} dx = (f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}) dx,$$

$$\text{即 } \frac{dz}{dx} = f'_x - f'_y \frac{\phi'_x}{\phi'_y}$$

假设 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下于点 (x_0, y_0) 取到极值, 则

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx}|_{(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} f'_x(x_0, y_0) - f'_y(x_0, y_0) \frac{\phi'_x(x_0, y_0)}{\phi'_y(x_0, y_0)} = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \frac{f'_x(x_0, y_0)}{\phi'_x(x_0, y_0)} = \frac{f'_y(x_0, y_0)}{\phi'_y(x_0, y_0)} \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

若令第一式的比例为 $-\lambda$, 则有

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) + \lambda \phi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda \phi'_y(x_0, y_0) = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

即在条件极值点 (x_0, y_0) 处满足


$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) + \lambda \phi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda \phi'_y(x_0, y_0) = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

即在条件极值点 (x_0, y_0) 处满足

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) + \lambda \phi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda \phi'_y(x_0, y_0) = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

三元函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$ 的驻点条件式



问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

即在条件极值点 (x_0, y_0) 处满足

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) + \lambda \phi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda \phi'_y(x_0, y_0) = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

三元函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$ 的驻点条件式

作辅助函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$,

则 $F(x, y, \lambda)$ 的驻点 (x_0, y_0, λ_0) 满足

问题：求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\phi(x, y) = 0$ 下的极值.

即在条件极值点 (x_0, y_0) 处满足

$$\begin{cases} f'_x(x_0, y_0) + \lambda \phi'_x(x_0, y_0) = 0 \\ f'_y(x_0, y_0) + \lambda \phi'_y(x_0, y_0) = 0 \\ \phi(x_0, y_0) = 0 \end{cases}$$

三元函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$ 的驻点条件式

作辅助函数 $F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \phi(x, y)$,

则 $F(x, y, \lambda)$ 的驻点 (x_0, y_0, λ_0) 满足

然后讨论此驻点是否为极值点

(Lagrange乘子法)

例 求表面积为 S 的长方体的最大体积.

例 求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长, 宽, 高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

例 求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长,宽,高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

例 求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长, 宽, 高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

$$\text{令} \begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2xy + 2yz + 2xz - S = 0 \end{cases}$$

例

求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长, 宽, 高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

$$\text{令 } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x} \\ \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2xy + 2yz + 2xz - S = 0 \end{array} \right\}$$

例

求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长, 宽, 高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

$$\text{令 } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x} \\ \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2xy + 2yz + 2xz - S = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = z \quad (x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0 \Rightarrow \lambda \neq 0)$$

例

求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长, 宽, 高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

$$\text{令 } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x} \\ \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2xy + 2yz + 2xz - S = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = z \quad (x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0 \Rightarrow \lambda \neq 0)$$

$$6x^2 = S, x = \sqrt{\frac{S}{6}},$$

例

求表面积为 S 的长方体的最大体积.

解: 设长, 宽, 高为 x, y, z , 则求 $V = xyz$ 在条件 $2(xy + yz + xz) = S$ 下的极大值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

$$\text{令} \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x} \\ \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2xy + 2yz + 2xz - S = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = z \quad (x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0 \Rightarrow \lambda \neq 0)$$

$$6x^2 = S, x = \sqrt{\frac{S}{6}},$$

\therefore 取作立方体 (边长为 $\sqrt{\frac{S}{6}}$) 时体积最大为 $V = \left(\frac{S}{6}\right)^{\frac{3}{2}}$.

注 三元函数极值判别法要用到三元函数的Taylor公式:

注 三元函数极值判别法要用到三元函数的Taylor公式:

$$\begin{aligned} F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0) &= (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z}) F(x_0, y_0, z_0) \\ &+ \frac{1}{2!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^2 F(x_0, y_0, z_0) + \cdots + \frac{1}{n!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^n F(x_0, y_0, z_0) \\ &+ \frac{1}{(n+1)!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^{n+1} F(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y, z_0 + \theta \Delta z) \end{aligned}$$


注 三元函数极值判别法要用到三元函数的Taylor公式:

$$F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0) = (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z}) F(x_0, y_0, z_0) \\ + \frac{1}{2!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^2 F(x_0, y_0, z_0) + \cdots + \frac{1}{n!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^n F(x_0, y_0, z_0) \\ + \frac{1}{(n+1)!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^{n+1} F(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y, z_0 + \theta \Delta z)$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} \Delta x \Delta z + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} \Delta y \Delta z + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} (\Delta y)^2 + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} (\Delta z)^2$$

注 三元函数极值判别法要用到三元函数的Taylor公式:

$$\begin{aligned} F(x, y, z) - F(x_0, y_0, z_0) &= (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z}) F(x_0, y_0, z_0) \\ &+ \frac{1}{2!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^2 F(x_0, y_0, z_0) + \cdots + \frac{1}{n!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^n F(x_0, y_0, z_0) \\ &\quad + \frac{1}{(n+1)!} (\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} + \Delta z \frac{\partial}{\partial z})^{n+1} F(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y, z_0 + \theta \Delta z) \end{aligned}$$



$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial z} \Delta x \Delta z + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial z} \Delta y \Delta z + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} (\Delta y)^2 + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} (\Delta z)^2$$

要说明它对任意的 $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ (充分小) 保持定号,
需要讨论三阶对称矩阵的正定性.

我们只根据具体问题“推断”极值问题一定有解,
从而,我们找到唯一驻点就是极值点,也就是最值点.

注 在求解过程中,我们事实上不用解出 λ 的值,只要求出 x, y 的值.

注 在求解过程中,我们事实上不用解出 λ 的值,只要求出 x, y 的值.

作辅助函数: $F(x, y, z, \lambda) = xyz + \lambda(2xy + 2yz + 2xz - S)$

$$\text{令 } \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial F}{\partial x} = yz + \lambda(2y + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial y} = xz + \lambda(2x + 2z) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{z} + \frac{1}{x} \\ \frac{\partial F}{\partial z} = xy + \lambda(2x + 2y) = 0 \Rightarrow -\frac{1}{2\lambda} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = 2xy + 2yz + 2xz - S = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y = z \quad (x \neq 0, y \neq 0, z \neq 0 \Rightarrow \lambda \neq 0)$$

注 当附加条件为多个时,可以如法作带多个乘子的辅助函数.

注 当附加条件为多个时,可以如法作带多个乘子的辅助函数.

例 在点 $(0, 0, 0)$ 处放置一正单位电荷,
现让一负单位电荷于曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 上,

问此负电荷位于何处受力最大,何处受力最小?

注 当附加条件为多个时,可以如法作带多个乘子的辅助函数.

例 在点 $(0, 0, 0)$ 处放置一正单位电荷,

现让一负单位电荷于曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 上,

问此负电荷位于何处受力最大,何处受力最小?

解: 位置 (x, y, z) 处负单位点电荷所受作用力大小为 $F = \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2}$

注 当附加条件为多个时,可以如法作带多个乘子的辅助函数.

例 在点 $(0, 0, 0)$ 处放置一正单位电荷,

现让一负单位电荷于曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 上,

问此负电荷位于何处受力最大,何处受力最小?

解: 位置 (x, y, z) 处负单位点电荷所受作用力大小为 $F = \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2}$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

注 当附加条件为多个时,可以如法作带多个乘子的辅助函数.

例 在点 $(0, 0, 0)$ 处放置一正单位电荷,

现让一负单位电荷于曲线 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 上,

问此负电荷位于何处受力最大,何处受力最小?

解: 位置 (x, y, z) 处负单位点电荷所受作用力大小为 $F = \frac{k}{x^2 + y^2 + z^2}$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\begin{cases} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y \text{ (if, } \lambda \neq 1)$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y \text{ (if, } \lambda \neq 1) \\ z = 2x^2 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases}$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y \text{ (if, } \lambda \neq 1) \\ z = 2x^2 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow 2x^2 + 2x - 1 = 0$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow x = y \text{ (if, } \lambda \neq 1)$$

若 $\lambda = 1$, 则 $\mu = 0$, 此时 $z = -\frac{1}{2}$ 不在所考虑的范围.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial z} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial \lambda}{\partial G} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x^2 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow 2x^2 + 2x - 1 = 0$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y \text{ (if } \lambda \neq 1) \\ \text{若 } \lambda = 1, \text{ 则 } \mu = 0, \text{ 此时 } z = -\frac{1}{2} \text{ 不在所考虑的范围.} \\ \begin{aligned} & \begin{cases} z = 2x^2 & \Rightarrow 2x^2 + 2x - 1 = 0 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases} \\ & \downarrow \\ & \text{即 } x_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \end{aligned} \end{cases}$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y \text{ (if } \lambda \neq 1) \\ \text{若 } \lambda = 1, \text{ 则 } \mu = 0, \text{ 此时 } z = -\frac{1}{2} \text{ 不在所考虑的范围.} \end{cases}$$

$$\begin{cases} z = 2x^2 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x^2 \\ 2x + 2x^2 - 1 = 0 \end{cases}$$
$$\downarrow$$
$$\text{即 } x_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore (x_1, y_1, z_1) = \left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3} \right),$$

$$(x_2, y_2, z_2) = \left(\frac{\sqrt{3} - 1}{2}, \frac{\sqrt{3} - 1}{2}, 2 - \sqrt{3} \right) \text{ 为驻点,}$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y \text{ (if } \lambda \neq 1) \\ \text{若 } \lambda = 1, \text{ 则 } \mu = 0, \text{ 此时 } z = -\frac{1}{2} \text{ 不在所考虑的范围.} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z = 2x^2 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x^2 \\ 2x^2 + 2x - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } x_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}$$

$$\therefore (x_1, y_1, z_1) = \left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3} \right),$$

$$(x_2, y_2, z_2) = \left(\frac{\sqrt{3} - 1}{2}, \frac{\sqrt{3} - 1}{2}, 2 - \sqrt{3} \right) \text{ 为驻点,}$$

此时

$$x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 = \frac{z_1}{2} + \frac{z_1}{2} + z_1^2 = 2 + \sqrt{3} + 4 + 3 + 4\sqrt{3} = 9 + 5\sqrt{3},$$

$$x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 = \frac{z_2}{2} + \frac{z_2}{2} + z_2^2 = 2 - \sqrt{3} + 4 + 3 - 4\sqrt{3} = 9 - 5\sqrt{3}$$

考虑 $F = x^2 + y^2 + z^2$ 在附加条件 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$ 下的最大最小值

令 $G(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(z - x^2 - y^2) + \mu(x + y + z - 1)$,

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial G}{\partial x} = 2x - 2\lambda x + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial y} = 2y - 2\lambda y + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial z} = 2z + \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \lambda} = z - x^2 - y^2 = 0 \\ \frac{\partial G}{\partial \mu} = x + y + z - 1 = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} x = y \text{ (if } \lambda \neq 1) \\ \text{若 } \lambda = 1, \text{ 则 } \mu = 0, \text{ 此时 } z = -\frac{1}{2} \text{ 不在所考虑的范围.} \\ \left\{ \begin{array}{l} z = 2x^2 \\ 2x + z - 1 = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{array}{l} 2x^2 + 2x - 1 = 0 \\ \downarrow \\ \text{即 } x_1 = \frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, \quad x_2 = \frac{-1 - \sqrt{3}}{2} \end{array} \end{cases}$$

$\therefore (x_1, y_1, z_1) = \left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3} \right)$,

此时

$(x_2, y_2, z_2) = \left(\frac{\sqrt{3} - 1}{2}, \frac{\sqrt{3} - 1}{2}, 2 - \sqrt{3} \right)$ 为驻点,

$$\begin{aligned} x_1^2 + y_1^2 + z_1^2 &= \frac{z_1}{2} + \frac{z_1}{2} + z_1^2 = 2 + \sqrt{3} + 4 + 3 + 4\sqrt{3} = 9 + 5\sqrt{3}, \\ x_2^2 + y_2^2 + z_2^2 &= \frac{z_2}{2} + \frac{z_2}{2} + z_2^2 = 2 - \sqrt{3} + 4 + 3 - 4\sqrt{3} = 9 - 5\sqrt{3} \end{aligned}$$

\therefore 所以位于 (x_1, y_1, z_1) 时作用力最小, 位于 (x_2, y_2, z_2) 时作用力最大

例

点到面的距离公式

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases}$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$
$$-\left(\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{C^2}{2}\right)\lambda + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$
$$- \left(\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{C^2}{2} \right) \lambda + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$\lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$
$$- \left(\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{C^2}{2} \right) \lambda + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$\lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\text{此时, } \rho^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{\lambda^2 A^2 + \lambda^2 B^2 + \lambda^2 C^2}{4}$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$
$$-\left(\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{C^2}{2}\right)\lambda + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$\lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\text{此时, } \rho^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{\lambda^2 A^2 + \lambda^2 B^2 + \lambda^2 C^2}{4}$$

$$\rho^2 = \frac{A^2 + B^2 + C^2}{4} \frac{4(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2}{(A^2 + B^2 + C^2)^2}$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$
$$-\left(\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{C^2}{2}\right)\lambda + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$\lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\text{此时, } \rho^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{\lambda^2 A^2 + \lambda^2 B^2 + \lambda^2 C^2}{4}$$

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \frac{A^2 + B^2 + C^2}{4} \frac{4(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2}{(A^2 + B^2 + C^2)^2} \\ &= \frac{(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2}{A^2 + B^2 + C^2} \end{aligned}$$

例

点到面的距离公式

$\Sigma: Ax + By + Cz + D = 0$, 面外面一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$,

则点 P_0 到平面 Σ 上任一点 $P(x, y, z)$ 的距离 (平方) 为:

$$\rho^2(x, y, z) = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2$$

$$F = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 + \lambda(Ax + By + Cz + D)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = 2(x - x_0) + \lambda A = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = 2(y - y_0) + \lambda B = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = 2(z - z_0) + \lambda C = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = Ax + By + Cz + D = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{A}{2}\lambda + x_0 \\ y = -\frac{B}{2}\lambda + y_0 \\ z = -\frac{C}{2}\lambda + z_0 \end{cases}$$

$$-\left(\frac{A^2}{2} + \frac{B^2}{2} + \frac{C^2}{2}\right)\lambda + Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0$$

$$\lambda = \frac{2(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)}{A^2 + B^2 + C^2}$$

$$\text{此时, } \rho^2 = (x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{\lambda^2 A^2 + \lambda^2 B^2 + \lambda^2 C^2}{4}$$

$$\begin{aligned} \rho^2 &= \frac{A^2 + B^2 + C^2}{4} \frac{4(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2}{(A^2 + B^2 + C^2)^2} \\ &= \frac{(Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D)^2}{A^2 + B^2 + C^2} \end{aligned}$$

$$\therefore \rho = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

