

一般二次曲面

一般二次曲面的方程式为

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fxz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

其中 A, \dots, J 均为常数, 且 A, B, C, D, E, F 不全为零。

一般二次曲面的方程式为

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + 2Dxy + 2Eyz + 2Fzx + Gx + Hy + Iz + J = 0$$


其中 A, \dots, J 均为常数, 且 A, B, C, D, E, F 不全为零。

可以证明, 这样的一般方程在坐标平移和旋转之后,
可以变成十七种形式, 而且只有这十七种形式。

其中非平凡的九种


1. 椭球面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, (a > 0, b > 0, c > 0)$

1. 椭球面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, (a > 0, b > 0, c > 0)$



1. 椭球面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, (a > 0, b > 0, c > 0)$

① $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$




② 在各坐标平面的截痕分别为

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{array} \right.$$

1. 椭球面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, (a > 0, b > 0, c > 0)$

① $|x| \leq a, |y| \leq b, |z| \leq c$



② 在各坐标平面的截痕分别为

$$\begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \\ z = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{x^2}{a^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ y = 0 \end{cases}, \begin{cases} \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$


③ 用平面 $z = h (|h| \leq c)$ 截椭球面的截痕为椭圆:

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 - \frac{h^2}{c^2} \end{cases}, \text{ (用 } x = h, y = h \text{ 去截, 结果类似)}$$

④ $a = b = c$ 时, 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, (R = a)$

2. 椭圆抛物面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2cz, (a > 0, b > 0)$


2. 椭圆抛物面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2cz, (a > 0, b > 0)$



曲面在 oyz 和 oxz 上的截痕分别是

$$\left\{ \begin{array}{l} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} = 2cz \end{array} \right., \left\{ \begin{array}{l} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} = 2cz \end{array} \right.$$

2. 椭圆抛物面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2cz, (a > 0, b > 0)$





曲面于平面 $z = h (h \geq 0)$ 上的截痕是椭圆

$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2ch \end{cases}$$

2. 椭圆抛物面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2cz, (a > 0, b > 0)$

($c > 0$) 时



曲面于平面 $z = h (h \geq 0)$ 上的截痕是椭圆


$$\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2ch \end{cases}$$

3. 椭圆锥面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, (a, b, c > 0)$

(一直线过一定点, 转动而成的面称为锥面)

3. 椭圆锥面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, (a, b, c > 0)$


(一直线过一定点, 转动而成的面称为锥面)



在yoz面的截痕为 $\begin{cases} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} \end{cases}$ (两直线)

3. 椭圆锥面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, (a, b, c > 0)$


(一直线过一定点, 转动而成的面称为锥面)



在xoz面上的截痕为 $\begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} = \frac{z^2}{c^2} \end{cases}$ (两直线)

3. 椭圆锥面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}, (a, b, c > 0)$


(一直线过一定点, 转动而成的面称为锥面)




在平面 $z = \pm h$ 上的截痕为 $\begin{cases} z = \pm h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} \end{cases}$ (椭圆或点)

4. 椭圆柱面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

4. 椭圆柱面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$




4. 椭圆柱面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$




① xoy 面上的投影(截痕)为椭圆 $\begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$

② 母线方向为 \vec{k} , 准线之一为 xoy 面上的投影

5. 抛物柱面, $\frac{x^2}{a^2} - y = 0$




5. 抛物柱面, $\frac{x^2}{a^2} - y = 0$




在xoy面上的投影为抛物线 $\begin{cases} z = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} = y \end{cases}$

6. 双曲柱面, $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$




6. 双曲柱面, $-\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$



在xoy面上的投影为双曲线 $\begin{cases} z = 0 \\ -\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \end{cases}$


7.单叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, (a, b, c > 0)$

7. 单叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, (a, b, c > 0)$




在yoz面的截痕为双曲线 $\begin{cases} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$

7. 单叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, (a, b, c > 0)$



在xoz面的截痕为双曲线 $\begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$


7. 单叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1, (a, b, c > 0)$



在平面 $z = h$ 上的截痕为椭圆 $\begin{cases} z = h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 + \frac{h^2}{c^2} \end{cases}$


8. 双叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, (a, b, c > 0)$

8. 双叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, (a, b, c > 0)$




在yoz面的截痕为双曲线 $\begin{cases} x = 0 \\ \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \end{cases}$

8. 双叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, (a, b, c > 0)$



在xoz面的截痕为双曲线 $\begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \end{cases}$


8. 双叶双曲面, $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1, (a, b, c > 0)$



在 $z = \pm h (h > c)$ 上的截痕为椭圆 $\begin{cases} z = \pm h \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{h^2}{c^2} - 1 \end{cases}$


9. 双曲抛物面(马鞍面), $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = z, (p > 0, q > 0)$

9. 双曲抛物面(马鞍面), $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = z, (p > 0, q > 0)$




在yoz面的截痕为抛物线 $\begin{cases} x = 0 \\ -\frac{y^2}{q^2} = z \end{cases}$

9. 双曲抛物面(马鞍面), $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = z, (p > 0, q > 0)$




在xoz面的截痕为抛物线 $\begin{cases} y = 0 \\ \frac{x^2}{p^2} = z \end{cases}$

9. 双曲抛物面(马鞍面), $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = z, (p > 0, q > 0)$



在 $y = \pm h$ 面的截痕为抛物线 $\begin{cases} y = \pm h \\ \frac{x^2}{p^2} = z + \frac{h^2}{q^2} \end{cases}$

9. 双曲抛物面(马鞍面), $\frac{x^2}{p^2} - \frac{y^2}{q^2} = z, (p > 0, q > 0)$



在 $x = \pm h$ 面的截痕为抛物线 $\begin{cases} x = \pm h \\ -\frac{y^2}{q^2} = z - \frac{h^2}{p^2} \end{cases}$

