

隐函数的微分法

定义

如果在某平面区域内 $F(x, y) = 0$ 可以确定 y 为 x 的函数
(或者 x 为 y 的函数), 则称 $F(x, y) = 0$ 在该区域内为**隐函数**.

定义

如果在某平面区域内 $F(x, y) = 0$ 可以确定 y 为 x 的函数
(或者 x 为 y 的函数), 则称 $F(x, y) = 0$ 在该区域内为**隐函数**.

如果在某空间区域内 $F(x, y, z) = 0$ 可以确定 z 为 x, y 的函数
(或者 x 为 y, z 的函数或 y 为 x, z 的函数),

则称 $F(x, y, z) = 0$ 在该区域内为**隐函数**.

(一) 设 $F(x, y) = 0$ 在某平面区域确定 y 为 x 的函数,

(一) 设 $F(x, y) = 0$ 在某平面区域确定 y 为 x 的函数,

则 $\mathrm{d}F(x, y) = 0$,

(一) 设 $F(x, y) = 0$ 在某平面区域确定 y 为 x 的函数,

则 $\mathrm{d}F(x, y) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial F}{\partial y} \mathrm{d}y = 0$$

(一) 设 $F(x, y) = 0$ 在某平面区域确定 y 为 x 的函数,

则 $\mathrm{d}F(x, y) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial F}{\partial y} \mathrm{d}y = 0 \Rightarrow \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial y}$$

(一) 设 $F(x, y) = 0$ 在某平面区域确定 y 为 x 的函数,

则 $dF(x, y) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial y}$$

设 $F(x, y) = 0$ 在某平面区域确定 x 为 y 的函数,

$$\text{则 } \frac{dx}{dy} = -\frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial x}$$

(二) 设 $F(x, y, z) = 0$ 在某空间区域确定 z 为 x, y 的函数,

(二) 设 $F(x, y, z) = 0$ 在某空间区域确定 z 为 x, y 的函数,

则 $F(x, y, z) = 0$,

(二) 设 $F(x, y, z) = 0$ 在某空间区域确定 z 为 x, y 的函数,

则 $F(x, y, z) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} \mathrm{d}x + \frac{\partial F}{\partial y} \mathrm{d}y + \frac{\partial F}{\partial z} \mathrm{d}z = 0,$$

(二) 设 $F(x, y, z) = 0$ 在某空间区域确定 z 为 x, y 的函数,

则 $F(x, y, z) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz = 0,$$

$$dz = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z} dx - \frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z} dy,$$

(二) 设 $F(x, y, z) = 0$ 在某空间区域确定 z 为 x, y 的函数,

则 $F(x, y, z) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz = 0,$$

$$dz = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z} dx - \frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z} dy,$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z}.$$

(二) 设 $F(x, y, z) = 0$ 在某空间区域确定 z 为 x, y 的函数,

则 $F(x, y, z) = 0$,

$$\frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy + \frac{\partial F}{\partial z} dz = 0,$$

$$dz = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z} dx - \frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z} dy,$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial x} / \frac{\partial F}{\partial z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\partial F}{\partial y} / \frac{\partial F}{\partial z}.$$

同理可计算 $\frac{\partial x}{\partial y}$, $\frac{\partial x}{\partial z}$ 和 $\frac{\partial y}{\partial x}$, $\frac{\partial y}{\partial z}$

例

设 $e^{-xy} - 2z - e^z = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

例

设 $e^{-xy} - 2z - e^z = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$-e^{-xy} d(xy) - 2 dz + e^z dz = 0,$$

例

设 $e^{-xy} - 2z - e^z = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$-e^{-xy} \mathrm{d}(xy) - 2 \mathrm{d}z + e^z \mathrm{d}z = 0,$$

$$\mathrm{d}z = \frac{e^{-xy}(x \mathrm{d}y + y \mathrm{d}x)}{e^z - 2}$$

例

设 $e^{-xy} - 2z - e^z = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$-e^{-xy} d(xy) - 2 dz + e^z dz = 0,$$

$$dz = \frac{e^{-xy}(x dy + y dx)}{e^z - 2} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2} dy + \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2} dx$$

例

设 $e^{-xy} - 2z - e^z = 0$ 确定 z 为 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$-e^{-xy} d(xy) - 2 dz + e^z dz = 0,$$

$$dz = \frac{e^{-xy}(x dy + y dx)}{e^z - 2} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2} dy + \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2} dx$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{ye^{-xy}}{e^z - 2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{xe^{-xy}}{e^z - 2}.$$

(不用死记隐函数的导数公式!) 只要求全微分

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

$$\mathrm{d}F(x, y, z) = 0, \Rightarrow F'_x \mathrm{d}x + F'_y \mathrm{d}y + F'_z \mathrm{d}z = 0,$$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

$$dF(x, y, z) = 0, \Rightarrow F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0,$$

$$dx = -\frac{F'_y}{F'_x} dy - \frac{F'_z}{F'_x} dz$$

$$dy = -\frac{F'_x}{F'_y} dx - \frac{F'_z}{F'_y} dz$$

$$dz = -\frac{F'_x}{F'_z} dx - \frac{F'_y}{F'_z} dy$$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

$$dF(x, y, z) = 0, \Rightarrow F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0,$$

$$\begin{aligned} dx &= -\frac{F'_y}{F'_x} dy - \frac{F'_z}{F'_x} dz & \frac{\partial x}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_x}, & \frac{\partial x}{\partial z} &= -\frac{F'_z}{F'_x} \\ dy &= -\frac{F'_x}{F'_y} dx - \frac{F'_z}{F'_y} dz & \frac{\partial y}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_y}, & \frac{\partial y}{\partial z} &= -\frac{F'_z}{F'_y} \\ dz &= -\frac{F'_x}{F'_z} dx - \frac{F'_y}{F'_z} dy & \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} \end{aligned}$$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

$$dF(x, y, z) = 0, \Rightarrow F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0,$$

$$\begin{aligned} dx &= -\frac{F'_y}{F'_x} dy - \frac{F'_z}{F'_x} dz & \frac{\partial x}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_x}, & \frac{\partial x}{\partial z} &= -\frac{F'_z}{F'_x} \\ dy &= -\frac{F'_x}{F'_y} dx - \frac{F'_z}{F'_y} dz & \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_y}, & \frac{\partial y}{\partial z} &= -\frac{F'_z}{F'_y} \\ dz &= -\frac{F'_x}{F'_z} dx - \frac{F'_y}{F'_z} dy & \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{F'_x}{F'_z}, & \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{F'_y}{F'_z} \end{aligned}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

另法:

$$F(x, y, z) = 0 \Rightarrow \begin{aligned} F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} \\ F'_y + F'_z \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} \end{aligned}$$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

另法:

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = 0 \Rightarrow F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} \\ F'_y + F'_z \frac{\partial z}{\partial y} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} \\ F'_x + F'_y \frac{\partial y}{\partial x} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y} \\ \Rightarrow F'_z + F'_y \frac{\partial y}{\partial z} &= 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F'_z}{F'_y} \end{aligned}$$

例 设 $F(x, y, z) = 0$ 中,任一变量可以看作是另两个的函数,则有 $\frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} = -1$

另法:

$$\begin{aligned} F(x, y, z) = 0 &\Rightarrow F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z} \\ &F'_y + F'_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z} \\ &F'_x + F'_y \frac{\partial y}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_y} \\ \Rightarrow &F'_z + F'_y \frac{\partial y}{\partial z} = 0 \Rightarrow \frac{\partial y}{\partial z} = -\frac{F'_z}{F'_y} \\ \Rightarrow &F'_x \frac{\partial x}{\partial y} + F'_y = 0 \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_x} \\ &F'_x \frac{\partial x}{\partial z} + F'_z = 0 \Rightarrow \frac{\partial x}{\partial z} = -\frac{F'_z}{F'_x} \end{aligned}$$

推广： $F(x, y, z, t) = 0$, 若任一变量可以看作是另三个的函数,

$$\text{则 } \frac{\partial x}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial t} \frac{\partial t}{\partial x} = 1.$$

例 设 $F(x - y, y - z) = 0$ 决定 z 是 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

例 设 $F(x - y, y - z) = 0$ 决定 z 是 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$\underline{F_1'} \mathrm{d}(x - y) + \underline{F_2'} \mathrm{d}(y - z) = 0,$$

例 设 $F(x - y, y - z) = 0$ 决定 z 是 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$\underline{F_1'} \mathrm{d}(x - y) + \underline{F_2'} \mathrm{d}(y - z) = 0,$$

$$F_1' \mathrm{d}x - F_1' \mathrm{d}y + F_2' \mathrm{d}y - F_2' \mathrm{d}z = 0,$$

例 设 $F(x - y, y - z) = 0$ 决定 z 是 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$\underline{F'_1} \, \mathrm{d}(x - y) + \underline{F'_2} \, \mathrm{d}(y - z) = 0,$$

$$F'_1 \, \mathrm{d}x - F'_1 \, \mathrm{d}y + F'_2 \, \mathrm{d}y - F'_2 \, \mathrm{d}z = 0,$$

$$\mathrm{d}z = \frac{F'_1}{F'_2} \, \mathrm{d}x + \frac{F'_2 - F'_1}{F'_2} \, \mathrm{d}y,$$

例 设 $F(x-y, y-z) = 0$ 决定 z 是 x, y 的函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

解:

$$\underline{F'_1} \mathrm{d}(x-y) + \underline{F'_2} \mathrm{d}(y-z) = 0,$$

$$F'_1 \mathrm{d}x - F'_1 \mathrm{d}y + F'_2 \mathrm{d}y - F'_2 \mathrm{d}z = 0,$$

$$\mathrm{d}z = \frac{F'_1}{F'_2} \mathrm{d}x + \frac{F'_2 - F'_1}{F'_2} \mathrm{d}y,$$

$$\therefore \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{F'_1}{F'_2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{F'_2 - F'_1}{F'_2}.$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

(两面定一线), 空间曲线方程 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

(两面定一线), 空间曲线方程 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0 \\ G'_x dx + G'_y dy + G'_z dz = 0 \end{cases}$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

(两面定一线), 空间曲线方程 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0 \\ G'_x dx + G'_y dy + G'_z dz = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F'_y dy + F'_z dz = -F'_x dx \\ G'_y dy + G'_z dz = -G'_x dx \end{cases}$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

(两面定一线), 空间曲线方程 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0 \\ G'_x dx + G'_y dy + G'_z dz = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F'_y dy + F'_z dz = -F'_x dx \\ G'_y dy + G'_z dz = -G'_x dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow dy = \frac{\begin{vmatrix} -F'_x dx & F'_z \\ -G'_x dx & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx,$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

(两面定一线), 空间曲线方程 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0 \\ G'_x dx + G'_y dy + G'_z dz = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F'_y dy + F'_z dz = -F'_x dx \\ G'_y dy + G'_z dz = -G'_x dx \end{cases}$$

$$\Rightarrow dy = \frac{\begin{vmatrix} -F'_x dx & F'_z \\ -G'_x dx & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx, \quad dz = -\frac{\begin{vmatrix} F'_y & F'_x \\ G'_y & G'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

$$\text{引入记号: } \frac{D(F, G)}{D(x, z)} = \begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}, \text{ 则}$$

Jacobi 行列式

$$\Rightarrow dy = \frac{\begin{vmatrix} -F'_x dx & F'_z \\ -G'_x dx & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx, \quad dz = -\frac{\begin{vmatrix} F'_y & F'_x \\ G'_y & G'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

引入记号: $\frac{D(F, G)}{D(x, z)} = \begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}$, 则 Jacobi 行列式

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{D(F, G)}{D(x, z)} / \frac{D(F, G)}{D(y, z)}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{D(F, G)}{D(y, x)} / \frac{D(F, G)}{D(y, z)}.$$

$$\Rightarrow dy = \frac{\begin{vmatrix} -F'_x dx & F'_z \\ -G'_x dx & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx, \quad dz = -\frac{\begin{vmatrix} F'_y & F'_x \\ G'_y & G'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx$$

$$(三) \quad \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases} \quad \text{决定} \quad \begin{cases} y = y(x) \\ z = z(x) \end{cases}$$

引入记号: $\frac{D(F, G)}{D(x, z)} = \begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}$, 则 Jacobi 行列式

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{D(F, G)}{D(x, z)} \bigg/ \frac{D(F, G)}{D(y, z)}, \quad \frac{dz}{dx} = -\frac{D(F, G)}{D(y, x)} \bigg/ \frac{D(F, G)}{D(y, z)}.$$

$$\Rightarrow dy = \frac{\begin{vmatrix} -F'_x dx & F'_z \\ -G'_x dx & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx, \quad dz = -\frac{\begin{vmatrix} F'_y & F'_x \\ G'_y & G'_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix}} dx$$

根据实际情况可以灵活应用,不必记公式!

例 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ (一个大圆), 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

例 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ (一个大圆), 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} x \, dx + y \, dy + z \, dz = 0 \\ dx + dy + dz = 0 \end{cases}$$

例 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ (一个大圆), 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} x \, dx + y \, dy + z \, dz = 0 \\ dx + dy + dz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \, dx + y \, dy + z \, dz = 0 \\ z \, dx + z \, dy + z \, dz = 0 \end{cases}$$

例 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ (一个大圆), 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ dx + dy + dz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ z dx + z dy + z dz = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x - z) dx + (y - z) dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x - z}{z - y}.$$

例 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ (一个大圆), 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ dx + dy + dz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ z dx + z dy + z dz = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x - z) dx + (y - z) dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x - z}{z - y}.$$

$$\begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ y dx + y dy + y dz = 0 \end{cases}$$

例 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ (一个大圆), 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$.

$$\begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ dx + dy + dz = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ z dx + z dy + z dz = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x - z) dx + (y - z) dy = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x - z}{z - y}.$$

$$\begin{cases} x dx + y dy + z dz = 0 \\ y dx + y dy + y dz = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x - y) dx + (z - y) dz = 0 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{x - y}{y - z}.$$

