

Brasil bate recorde de amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes

Início (<https://web.archive.org/web/20250429153029/https://sbacv.org.br/>) →

Últimas Notícias

(<https://web.archive.org/web/20250429153029/https://sbacv.org.br/listagem/ultimas-noticias/>) →

Brasil bate recorde de amputações de pés e pernas em decorrência do diabetes

Últimas Notícias (<https://web.archive.org/web/20250429153029/https://sbacv.org.br/listagem/ultimas-noticias/>)

🕒 20 de setembro de 2023 (<https://web.archive.org/web/20250429153029/https://sbacv.org.br/brasil-bate-recorde-de-amputacoes-de-pes-e-pernas-em-decorrenca-do-diabetes/>)

Para os especialistas da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), a alta no número de amputações está relacionada à falta de cuidados com a diabetes, principal causa de perda de membros inferiores.

Mais de 282 mil cirurgias de amputação de membros inferiores (pernas ou pés) foram realizadas no Sistema Único de Saúde (SUS) entre janeiro de 2012 e maio de 2023. É o que mostra levantamento produzido pela Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV). Ao analisar a série histórica, percebe-se o aumento desses procedimentos por todo o País. Há estados onde o volume de amputações aumentou mais do que 200% entre 2012 e 2013. Só em 2022, no País, os registros alcançaram a marca de 31.190 procedimentos realizados, o que significa que – a cada dia – pelo menos 85 brasileiros tiveram seus pés ou pernas amputadas na rede pública de saúde.

Os dados sugerem uma alta progressiva no número de amputações e desarticulações de membros inferiores no Brasil. O levantamento revela que os dados acumulados em 2023 projetam esse ano como o pior da série histórica iniciada em 2012. Elaborado a partir de informações disponíveis na base de dados do Ministério da Saúde, o estudo também acende o alerta para os cuidados voltados às doenças vasculares, como a síndrome do pé diabético.

“Os dados revelam a importância de campanhas de conscientização como o Agosto Azul Vermelho, que visa conscientizar a população sobre as doenças vasculares, seus riscos, prevenção e tratamento. Essas doenças estão se tornando cada vez mais prevalentes, e é essencial que a população esteja informada sobre prevenção e tratamento”, destaca Julio Peclat, presidente da SBACV.

Ele acrescenta ainda que o aumento no número de amputações é indicativo de que é preciso fortalecer as ações de saúde pública, promovendo hábitos saudáveis e acesso a tratamentos adequados. De acordo com os especialistas da SBACV, mais da metade dos casos de amputações envolvem pessoas com diabetes. No entanto, essas cirurgias em membros inferiores podem também

estar relacionadas a muitos outros fatores de risco, como tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia, idade avançada, insuficiência renal crônica, estados de hipercoagulabilidade e histórico familiar.

Gravidade – Outro dado preocupante apontado pela SBACV é o desconhecimento dos indivíduos sobre seu estado de saúde. Os especialistas afirmam que milhares de brasileiros têm diabetes e não sabem. “No mundo, uma em cada cinco pessoas ignora ser portador dessa doença. Muitos pacientes que chegam ao consultório ou aos serviços de urgência com complicações do diabetes só descobrem que a têm após o atendimento”, comenta o cirurgião vascular Mateus Borges, diretor de Publicações da SBACV.

Na sua avaliação, esse cenário exige cuidados por parte dos serviços de saúde no acolhimento dessas pessoas. Pacientes com diabetes e úlceras nos pés apresentam taxa de mortalidade duas vezes maior em comparação com pacientes diabéticos sem úlceras nos pés. Os submetidos à amputação maior de um membro inferior apresentam baixas taxas de sobrevida.

Aproximadamente 10% dos pacientes que amputam o membro inferior morrem no período perioperatório; 30% no primeiro ano após amputação; 50% no terceiro ano; e 70%, no quinto. Esse percentual pode ser maior em países em desenvolvimento, já que a procura por assistência médica costuma ocorrer quando a infecção da úlcera está avançada.

Cenário nacional – Na série histórica sobre a qual a SBACV se debruçou, é possível observar, em todas as regiões do País, a predominância de uma progressão no número de cirurgias de amputação. No comparativo entre 2012, ano que marca o início da série, e 2022, último ano em que foi possível obter os dados consolidados, houve alta de 65% no número de procedimentos.

O ano de 2022 bateu recorde e registrou a maior soma de procedimentos, 31.190 casos, resultando em uma média diária que ultrapassa 85 amputações. No entanto, a probabilidade desses números serem superados em 2023 já é desenhada a partir dos dados dos cinco primeiros meses do ano. O levantamento aponta que pelo menos 12.753 cirurgias foram realizadas entre janeiro e maio deste ano, número superior aos 12.350 registros para o mesmo período de 2022. Confira na tabela abaixo o detalhamento desses números:

Procedimentos hospitalares do SUS - por local de internação - Brasil													
Região	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	Total
Norte	1.020	1.012	1.039	1.003	1.270	1.424	1.595	1.759	1.504	1.735	1.730	757	15.848
Nordeste	6.046	6.290	6.820	7.370	7.738	7.754	8.454	8.616	9.199	9.432	10.273	4.273	92.265
Sudeste	7.990	8.470	8.620	9.108	9.603	10.204	10.934	11.431	11.477	12.371	13.354	5.400	118.962
Sul	2.787	2.970	3.022	3.119	3.414	3.459	3.725	3.871	3.859	3.994	4.145	1.587	39.952
Centro-Oeste	1.065	1.045	1.129	1.243	1.140	1.359	1.481	1.479	1.568	1.613	1.688	736	15.546
Total	18.908	19.787	20.630	21.843	23.165	24.200	26.189	27.156	27.607	29.145	31.190	12.753	282.573
Média mensal	1.576	1.649	1.719	1.820	1.930	2.017	2.182	2.263	2.301	2.429	2.599	1.063	
Média diária	51,8	54,2	56,5	59,8	63,5	66,3	71,8	74,4	75,6	79,8	85,5		

*Até maio de 2023.

De acordo com os dados levantados, o acúmulo de procedimentos realizados até maio de 2023, em números absolutos, tem maior expressão nas regiões Sudeste e Nordeste. A primeira é responsável por mais de 42% de todas as cirurgias realizadas no Brasil, com um montante de 118.962 procedimentos. Já no Nordeste, 92.265 amputações ou desmobilizações de membros inferiores foram realizados no período. Na sequência, vem a região Sul, com 39.952 registros; o Norte, com 15.848; e o Centro-Oeste, com 15.546 registros.

Estados – Embora o crescimento no número de amputações realizadas entre 2012 e 2022 seja equilibrado em todas as regiões do País, a variação percentual nesse período chama atenção em alguns estados. Por exemplo, Alagoas foi a unidade federativa que mais sofreu alta no número de amputações, com crescimento de 214% na comparação entre o início e o fim da série histórica, um salto de 182 para 571 procedimentos.

Outros estados que registraram alterações expressivas no mesmo intervalo foram: Ceará, com variação de 175%; Amazonas, com alta de 120%; e Bahia e Rondônia, com crescimento de 83% na comparação entre 2012 e 2022. Em contrapartida, Roraima e Pernambuco foram os estados do País onde se observa a menor alta no mesmo método de análise, com crescimento de 12% e 18%, respectivamente. Confira mais detalhes sobre cada estado no quadro abaixo.

Procedimentos hospitalares do SUS - por local de internação - Brasil													
Unidade da Federação	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023*	Total
Região Norte	1.020	1.012	1.039	1.003	1.270	1.424	1.595	1.759	1.504	1.735	1.730	757	15.848
Rondônia	101	129	131	106	109	128	147	133	141	212	185	84	1.606
Acre	50	50	52	63	68	47	57	50	77	70	68	36	688
Amazonas	162	162	112	125	162	232	268	394	236	358	367	146	2.653
Roraima	25	15	29	16	35	36	44	36	45	68	28	21	398
Pará	547	514	604	603	746	822	939	1.015	836	862	895	388	8.771
Amapá	31	40	22	20	34	30	18	52	43	23	50	13	376
Tocantins	104	102	89	70	116	129	122	139	127	142	147	69	1.356
Região Nordeste	6.046	6.290	6.820	7.370	7.738	7.754	8.454	8.616	9.199	9.432	10.273	4.273	92.285
Maranhão	559	559	692	719	747	798	792	726	688	729	884	384	8.287
Piauí	423	405	437	451	471	446	470	590	530	572	633	223	5.651
Ceará	573	576	957	1.010	959	1.018	1.208	1.216	1.288	1.410	1.573	682	12.470
Rio Grande do Norte	297	374	362	464	462	408	492	591	586	472	519	174	5.201
Paraíba	491	590	553	557	627	650	646	722	744	727	786	442	7.525
Pernambuco	1.643	1.676	1.560	1.452	1.597	1.547	1.501	1.486	1.654	1.704	1.931	772	18.523
Alagoas	182	394	491	560	651	748	671	712	308	505	571	221	6.014
Sergipe	278	318	218	265	390	289	413	416	459	471	459	223	4.199
Bahia	1.590	1.408	1.550	1.892	1.834	1.850	2.261	2.157	2.942	2.842	2.917	1.152	24.395
Região Sudeste	7.990	8.470	8.620	9.108	9.603	10.204	10.934	11.431	11.477	12.371	13.354	5.400	118.962
Minas Gerais	2.094	2.166	2.224	2.252	2.342	2.620	2.947	2.913	3.002	2.999	3.095	1.197	29.851
Espírito Santo	373	287	363	483	465	508	501	520	581	587	563	271	5.502
Rio de Janeiro	1.498	1.561	1.838	1.861	2.118	2.174	2.299	2.523	2.354	2.387	2.706	1.146	24.465
São Paulo	4.025	4.456	4.195	4.512	4.678	4.902	5.187	5.475	5.540	6.398	6.990	2.786	59.144
Região Sul	2.787	2.970	3.022	3.119	3.414	3.459	3.725	3.871	3.859	3.994	4.145	1.587	39.952
Paraná	1.108	1.131	1.135	1.171	1.193	1.197	1.291	1.372	1.347	1.474	1.529	620	14.588
Santa Catarina	619	646	657	668	758	797	857	865	954	911	996	397	9.115
Rio Grande do Sul	1.060	1.193	1.230	1.280	1.463	1.465	1.577	1.644	1.558	1.609	1.620	570	16.269
Região Centro-Oeste	1.065	1.045	1.129	1.243	1.140	1.359	1.481	1.479	1.568	1.613	1.688	736	15.546
Mato Grosso do Sul	246	277	268	255	271	317	356	355	376	378	348	167	3.614
Mato Grosso	182	178	223	241	208	237	285	289	227	272	292	126	2.760
Goiás	416	376	421	513	423	490	498	528	558	652	736	315	5.926
Distrito Federal	221	214	217	234	238	315	342	307	407	311	312	128	3.246
Total	18.908	19.787	20.630	21.843	23.165	24.200	26.189	27.156	27.607	29.145	31.190	12.753	282.573
Média mensal	1.576	1.649	1.719	1.820	1.930	2.017	2.182	2.263	2.301	2.429	2.599		
Média diária	51,8	54,2	58,5	59,8	63,5	66,3	71,8	74,4	75,6	79,8	85,5		

*Até maio de 2023

Em números absolutos, os estados que mais executaram procedimentos de amputações de membros inferiores no SUS em 2022 foram: São Paulo (59.114), Minas Gerais (29.851), Rio de Janeiro (24.465), Bahia (24.395), Pernambuco (18.523) e Rio Grande do Sul (16.269). Por outro lado, os estados com o menor número de registros são Amapá (376), Roraima (398), Acre (688), Tocantins (1.356) e Rondônia (1.606).

Despesas – Além de representar um grave problema de saúde pública, o crescimento constante no número de amputações no País traz fortes impactos aos cofres públicos, consumindo parte das verbas em saúde destinadas aos estados. Apenas em 2022, foram despendidos R\$ 78,7 milhões em procedimentos realizados em todo o País. Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2022 foram gastos R\$ 799 milhões, o que representa uma média nacional de R\$ 2.962,28 por procedimento.

“Esse volume de gastos poderia ser evitado se os sistemas de saúde investissem mais em medidas preventivas, sobretudo no acompanhamento de pacientes diabéticos. Esse público carece de atenção permanente e multidisciplinar, para que medidas drásticas, como a amputação de membros, não sejam tomadas”, explica o presidente da SBACV, Julio Peclat.

Prevenção – No caso do diabetes, cujos pacientes são as maiores vítimas das amputações, descuido que para algumas pessoas são pequenos podem levar a grandes problemas. Um pequeno ferimento pode resultar em infecção que evolui para um caso grave de gangrena, levantando ao risco de amputação, alerta Peclat.

O diabetes impacta a circulação sanguínea e gera o estreitamento das artérias, causando redução dos índices de oxigenação e nutrição dos tecidos. Além disso, deformações nos pés e alterações de sensibilidade aumentam a chance do surgimento de pequenos ferimentos e potencializam sua evolução para casos mais graves. “Estudos apontam que 85% das amputações que possuem relação com o diabetes têm início com uma lesão nos pés, que poderiam ser prevenidas ou tratadas corretamente evitando complicações”, destaca o presidente da SBACV.

“Pessoas com diabetes, ao passar dos anos, desenvolvem neuropatia e/ou isquemia, o que as torna mais suscetíveis ao desenvolvimento de feridas de difícil cicatrização (úlceras) e infecções. A neuropatia acarreta a perda da sensibilidade ao toque, à temperatura e à dor. Com isso, o indivíduo não sente quando fere o pé. De modo geral, por não perceber, evolui para quadros de infecção que resultam em desbridamentos ou amputações”, pontua Julio Peclat.

Diagnóstico – Além desse contexto, a SBACV considera que o atraso no diagnóstico da síndrome do pé diabético faz com que o paciente seja encaminhado ao especialista apenas quando o problema já está em estágio avançado. Portadores da diabetes devem estar atentos aos cuidados relacionados ao controle do nível glicêmico no sangue e aos sintomas que podem ser observados em autoexames realizados diariamente.

Grande parte dessas amputações poderiam ter sido evitadas a partir de práticas de auto-observação. O paciente bem-informado, que se examina com frequência, pode reconhecer a necessidade de uma intervenção precoce já nos primeiros sintomas. Identificar sinais de alerta precoces é imprescindível para reduzir a incidência de complicações.

Complicações – Algumas medidas podem diminuir os riscos de complicações nos pés de pessoas diabéticas. Alimentar-se de forma equilibrada, praticar atividade física manter um controle da glicemia, contribui para uma melhora do sistema vascular como um todo. O paciente com esse fator de risco também deve estar atento aos perigos de acidentes e adotar mudanças de comportamento, como evitar andar de pés descalços ou, ainda, aderir ao uso de calçados apropriados.

Confira algumas medidas simples que podem ajudar na prevenção do pé diabético:

- Não faça compressas frias, mornas, quentes ou geladas nem esconda pés. Por causa da falta de sensibilidade acarretada pela neuropatia, você pode não perceber lesões nos pés;
- Use meias sem costuras ou com as costuras para fora. Assim você evita o atrito da parte áspera do tecido com a pele;
- Não remova cutículas das unhas dos pés. Qualquer machucado, por menor que seja, pode ser uma porta de entrada para infecções;
- Não use sandálias com tiras entre os dedos;
- Corte as unhas retas e acerte os cantos com lixa de unha, mas com muito cuidado;
- Hidrate os pés, pele ressecada favorece o surgimento de rachaduras e ferimentos;
- Nunca ande descalço. Você pode não sentir que o chão está quente ou que cortou/feriu o pé;
- Olhe sempre as plantas dos pés e trate logo qualquer arranhão, rachadura ou ferimento. Se não conseguir fazer isso sozinho, peça ajuda a um familiar ou amigo;
- Não use sapatos apertados ou de bico fino;
- Trate calosidades com profissionais de saúde;
- Olhe sempre o interior dos calçados antes de usá-los;
- Enxugue bem entre os dedos após o banho, a piscina ou praia.



(<https://web.archive.org/web/20250429153029/http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://sbacv.org.br/brasil-bate-recorde-de-amputacoes-de-pes-e-pernas-em-decorrencia-do-diabetes/>)



(<https://web.archive.org/web/20250429153029/https://twitter.com/intent/tweet?link=https://sbacv.org.br/brasil-bate-recorde-de-amputacoes-de-pes-e-pernas-em-decorrencia-do-diabetes/&text=Brasil%20bate%20recorde%20de%20amputacoes%20de%20pes%20e%20pernas%20em%20de>)