

慈濟大學
114 學年度學士後中醫學系入學招生考試
試題參考答案疑義釋疑公告

科目	題號	釋疑答覆	釋疑結果
國文科	11	選項(A)端午 (B)除夕 (C)七夕 (D)寒食 選項所歌的節日在夏季的是端午。	維持原答案 【A】
國文科	19	原文：「晨興疾趨必十里許，……頭足皆熱，宣通暢適，久久行之，當自知其妙矣。」所述為晨起快走的好處；是行走養生之功，而非晨起微妙之法。	維持原答案 【A】
國文科	37	原詩：「我已經是個殘廢的老人」係指身體殘廢，不是精神「頹廢」。「小蘭嶼的海浪不曾威脅／我前往潛水射魚的慾望／激流駭浪不曾消耗／我潛水射魚的體力／海底裡的怪物不會令我恐懼」，可見老人體力尚在，並不畏懼大海。詩中並沒有提到老人感到無人關心。	維持原答案 【C】
國文科	44	選項(C)「盤根錯節」比喻事情複雜，不是家族繁盛。二崙鄉是實有的，不是虛幻的「空中樓閣」。 選項(D)「瓜瓞綿延」比喻子孫繁盛、傳世久遠；適合描述大家族。「插枝盆栽」只插入「盆」中，沒有「落地生根」。	維持原答案 【D】
國文科	50	選項(B)「那位老婦人為了賣玉蘭花，穿梭於車陣中，令人捏把冷汗。」「中」表示老婦人身處車陣內；並非冗言贅字	維持原答案 【B】
化學科	8	題目條件所得答案應為(A)，但標準形式答案應為(C) (A)或(C)皆可	更正答案為 【A】或【C】
化學科	9	題目已告知「依據定域化電子鍵結模型」進行考量	維持原答案 【D】
化學科	12	選項 (A) (B)皆正確	更正答案為 【A】或【B】
化學科	21	$P_{\text{SO}_2} = 0.16 \text{ ppm} = 1.6 \times 10^{-7} \text{ atm}$ $K = x^2/P_{\text{SO}_2}$, $x = 4.56 \times 10^{-5}$, $\text{pH} = 4.34$ 原答案正確	維持原答案 【B】

慈濟大學
114 學年度學士後中醫學系入學招生考試
試題參考答案疑義釋疑公告

化學科	27	本題四個選項皆為錯誤 (A)(B)(C)(D)答案皆正確	本題送分
化學科	29	答案為 A 為最佳答案。Aldol 反應合成烯酮類時，鹼性條件通常優於酸性條件。在鹼性條件下，Aldol 反應能有效生成 enolateion，促使反應順利進行，產率較高。實驗數據顯示，酸性環境下 Aldol 反應幾乎不進行，而在鹼性條件下則有明顯的反應進行，且轉換率明顯提升。在有機合成實務上，鹼性條件（如 NaOH、KOH、NaOEt 等）是 Aldol 縮合的主流選擇。	維持原答案 【A】
化學科	34	答案為 B 為合適。固然丙酮 (CH ₃) ₂ CO 在某些特別條件下例如強酸或是特別的催化劑下氧原子會被質子化形成(CH ₃) ₂ C(OH) ⁺ 。在一般化學反應中，acetone 作為 Brønsted 鹼並不常見。至於引用資料中提到 enolization 中 acetone 可為 Brønsted 鹼，實屬誤解此反應。在 enolization 反應中，acetone 的 α-氫會被鹼移除，生成 enolate 離子，此過程可受一般酸或一般鹼催化。但這裡的 acetone 主要作為酸（提供氫），而不是鹼（接受氫）。	維持原答案 【B】
化學科	35	答案 B 無誤。雖然有少見反應之產物。此題主產物以符合 Zaitsev's rule 的解釋為主。	維持原答案 【B】
化學科	40	題目答案的確出現標示錯誤。無正確答案。	本題送分
化學科	41	答案 D 無誤。本題意要選出明顯錯誤答案。其它選項並無明顯錯誤。	維持原答案 【D】
化學科	43	答案 A 無誤。固然其它鹼性分子或許可以用於中和此反應產生的 HCl。但是 Pyridine 仍為最常用之中和試劑。其理由為：鹼性強以及極性強，廣泛用於水及有機溶劑中反應。其它試劑的限制為溶解度不如 pyridine 或是需要再前處理(例如磷酸化)等。	維持原答案 【A】
化學科	46	答案 A 無誤。典型共軛體系是指具有「單鍵-雙鍵交替」結構。而 C=C=C 則是屬於 cumulene system 而非共軛系統。至於所引用資料 1，也並未指出其共軛性。引用資料二則語焉不詳，並不符合共軛系統之定義。	維持原答案 【A】

慈濟大學
114 學年度學士後中醫學系入學招生考試
試題參考答案疑義釋疑公告

化學科	47	原答案為 D 應為誤植。正確答案修改為 A。	更正答案為 【A】
英文科	47	文章第三段：Strong belief in that view eroded when scientists discovered the link between <i>Varicella zoster</i>, the virus that causes chickenpox, and shingles, a far more serious, harmful, and longer-lasting disease in older adults that impacts the nervous system. They reached the conclusion that <i>Varicella zoster</i> remains dormant inside the body, making it significantly more likely for someone to develop shingles. 這裏說明水痘帶狀疱疹病毒（<i>Varicella zoster virus</i>）與好發於成人的帶狀皰疹（俗稱皮蛇）息息相關，此病毒會潛伏於體內多年，日後較易發展為帶狀皰疹，相較於水痘而言，是一個更為嚴重、持久的疾病。原文裡的「在成人身上發生更嚴重、傷害大、持久的疾病」都是在解釋「帶狀皰疹」（shingles）這個疾病，而不是在談病毒（水痘帶狀疱疹病毒 <i>Varicella zoster virus</i>），因此選項 (B) It is linked to shingles, a serious disease that occurs more commonly in adults. 此敘述正確，維持原答案。	維持原答案 【B】
英文科	48	文章第三段：They reached the conclusion that <i>Varicella zoster</i> remains dormant inside the body, making it significantly more likely for someone to develop shingles. As a result, the U.S. medical community encouraged the use of a vaccine against chickenpox to the public. Although the appearance of chickenpox and shingles within one person can be many years apart—generally many decades—the increased risk in developing shingles as a younger adult (30-40 years old) proved to be enough to convince the medical community that immunization should be preferred to the traditional alternative. 這裡提到醫學界認為免疫接種（immunization）比傳統方式（指不注射疫苗，而讓身體感染水痘的病毒後，自然產生免疫）更好，因為可以讓 30-40 歲的人降低帶狀皰疹發病的風險。 以及文章第五段：In light of such statistics, most doctors insist that the potential risks of developing shingles outweigh the benefits of avoiding rare complications associated with inoculations. 這裡再次強調，大部分醫生認為避免可能引發帶狀皰疹的風險遠比避免極為少數的接種併發症要更重要。綜上兩段原文可以推測，（兒童時期）注射水痘疫苗可以有效減少（成人時期）帶狀皰疹發病。選項(D) Vaccination against the chickenpox is recommended to help prevent the onset of shingles. 此敘述正確，維持原答案。	維持原答案 【A】

慈濟大學


114 學年度學士後中醫學系入學招生考試 試題參考答案疑義釋疑公告

英文科	50	文章第一段：Chickenpox is a highly contagious infectious disease caused by the <i>Varicella zoster</i> virus; sufferers develop a fleeting itchy rash that can spread throughout the body. The disease can last for up to 14 days and can occur in both children and adults, though the young are particularly vulnerable. Individuals infected with chickenpox can expect to experience a high but tolerable level of discomfort and a fever as the disease works its way through the system. The ailment was once considered to be a “rite of passage” by parents in the U.S. and thought to provide children with greater and improved immunity to other forms of sickness later in life. 這裡提到水痘帶狀疱疹病毒 (<i>Varicella zoster</i> virus) 傳染性強，只是美國家長起初認為小孩子得水痘是一種「人生儀式」，因為感染兒童約兩周就可痊癒，感染者通常會有發燒、疼痛紅疹等症狀，雖然不舒服，但是還可忍受，所以一些父母選擇自然療法，亦即讓孩子自然痊癒就可以產生免疫，這樣的觀念要到後來發現水痘帶狀疱疹病毒在兒童得到水痘痊癒後，仍會潛伏在體內，經過多年長大成人後，當他們免疫力下降時，病毒可能會再度活化，在皮膚上出現帶狀皰疹，因而醫生們極力鼓吹接種疫苗。選項 (A) They believed that the virus was weak and not highly infectious.不是正確選項，因為初期父母以為水痘（這個疾病）並不是嚴重疾病，但是選項 (A)是說「父母認為這個病毒很弱、且傳染力弱」，「病毒」（水痘帶狀疱疹病毒）與「水痘」（疾病）兩者不同；況且這個病毒的傳染性極強（第一段第一句），也與選項的說法（傳染力弱）不同。 綜上，本題正確答案為(C) They were unsure about the utility and effectiveness of the vaccine given its expected duration. 此敘述正確，維持原答案。	維持原答案 【C】
生物學科	3	此題主要考對 C₄ 植物固碳機制的理解，並測試其是否能正確區分 C₄植物與 CAM 植物的氣孔開閉時間與碳固定方式。題目中混用 C₄與 CAM 植物的特徵，屬於常見迷思概念，透過選項設計引導學生辨識錯誤敘述。學生需掌握 C₄ 植物在葉肉細胞與維管束鞘細胞間的空間分工機制，以及其如何減少光呼吸並提升光合作用效率。 選項(A)錯誤：此敘述混淆了 C₄ 植物與 CAM 植物的特徵。 C₄植物確實適應炎熱且乾燥的環境，但它們在白天打開氣孔以進行氣體交換，並利用空間上的細胞分工，包含 mesophyll 與 bundle-sheath cells 來減少光呼吸的發生。而「白天關閉氣孔、夜晚打開氣孔引入 CO₂」是 CAM 植物如仙人掌的策略，用以節水。 選項(B)正確：C₄ 植物會在葉肉細胞中利用 PEP carboxylase 將進入的 CO₂ 固定成四碳的 oxaloacetate (OAA)，這是 C₄ 固碳的第一步。 選項(C)正確：OAA 通常會被轉換成 malate，再運送至 bundle-sheath cells，	維持原答案 【A】

慈濟大學

114 學年度學士後中醫學系入學招生考試

試題參考答案疑義釋疑公告

		這些細胞負責進一步釋放 CO₂ 給 Calvin cycle 使用。 (D) 正確：現階段 C₄ 植物可區分為 dual-cell system C₄ species 和 single cell C₄ species 二系統，此選項敘述在 single cell C₄ species 二系統正確，在 dual-cell system C₄ species 呈現模糊。 因此，此題最佳答案為(A)。	
生物學科	12	STR 是常用於親子鑑定的分子標記，每一個 STR 位點由父母各傳一個等位基因給子代。因此，只要子代每個 STR 位點上的兩條帶能在父母身上各對應到一條，即可推論親子關係。C 的所有帶型都可由 A 和 B 解釋，因此最合理推論是 C 為 A 和 B 的子女。 根據圖譜圖片，可觀察以下重點： 若某人是他人之子代，則其每個位點的兩條帶必須來自父母的各一條，依據圖譜可知個體 A 與個體 C 共有 7 條條帶、個體 B 與個體 C 共有 7 條條帶。個體 A 與個體 B 共有 5 條條帶，顯示個體 C 的每一個 STR 位點，除二條條帶無法對應外，可推論在父本或母本減數分裂過程中發生重組而形成重組型外，均可由 A 和 B 各提供一條等位基因組成。因此由個體 A 與個體 B 對 C 個體的比例各佔 50% 可推論個體 C 最可能是個體 A 和個體 B 的小孩。相對地，個體 A 或個體 B 的條帶型不符合「由另外兩人各提供一條」的遺傳規律。 因此，此題最佳答案為(C)。 	維持原答案 【C】

慈濟大學

114 學年度學士後中醫學系入學招生考試 試題參考答案疑義釋疑公告

生物學科	17	已知轉譯起始碼為「AUG」，轉譯終止碼為「UAA」、「UAG」及「UGA」，現有需要分析的 DNA 序列 5'-ACTGCATGAGCGACCACCCATTCTGCCTCGGGGAATGAATCC-3'，因此 5'-ACTGC/ATG(起始)/AGC/GAC/CAC/CCA/TTC/TGC/CTC/GGG/GAA/TGA(終止)/ATCC-3'，經轉錄轉譯後的胺基酸序列，依序為：M S D H P F C L G E，共計胺基酸應該十個。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>DNA Codon</th><th>mRNA Codon</th><th>Amino Acid (1-letter)</th><th>Amino Acid (Full Name)</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>ATG</td><td>AUG</td><td>M</td><td>Methionine</td></tr> <tr><td>AGC</td><td>AGC</td><td>S</td><td>Serine</td></tr> <tr><td>GAC</td><td>GAC</td><td>D</td><td>Aspartic acid</td></tr> <tr><td>CAC</td><td>CAC</td><td>H</td><td>Histidine</td></tr> <tr><td>CCA</td><td>CCA</td><td>P</td><td>Proline</td></tr> <tr><td>TTC</td><td>UUC</td><td>F</td><td>Phenylalanine</td></tr> <tr><td>TGC</td><td>UGC</td><td>C</td><td>Cysteine</td></tr> <tr><td>CTC</td><td>CUC</td><td>L</td><td>Leucine</td></tr> <tr><td>GGG</td><td>GGG</td><td>G</td><td>Glycine</td></tr> <tr><td>GAA</td><td>GAA</td><td>E</td><td>Glutamic acid</td></tr> </tbody> </table> 因此，此題最佳答案為(B)。	DNA Codon	mRNA Codon	Amino Acid (1-letter)	Amino Acid (Full Name)	ATG	AUG	M	Methionine	AGC	AGC	S	Serine	GAC	GAC	D	Aspartic acid	CAC	CAC	H	Histidine	CCA	CCA	P	Proline	TTC	UUC	F	Phenylalanine	TGC	UGC	C	Cysteine	CTC	CUC	L	Leucine	GGG	GGG	G	Glycine	GAA	GAA	E	Glutamic acid	維持原答案 【B】
DNA Codon	mRNA Codon	Amino Acid (1-letter)	Amino Acid (Full Name)																																												
ATG	AUG	M	Methionine																																												
AGC	AGC	S	Serine																																												
GAC	GAC	D	Aspartic acid																																												
CAC	CAC	H	Histidine																																												
CCA	CCA	P	Proline																																												
TTC	UUC	F	Phenylalanine																																												
TGC	UGC	C	Cysteine																																												
CTC	CUC	L	Leucine																																												
GGG	GGG	G	Glycine																																												
GAA	GAA	E	Glutamic acid																																												
生物學科	29	此題目主要目標為考學生對腎元功能與尿液濃縮與稀釋機制的理解，尤其是對亨利氏環 (Henle's loop) 中升支與降支的功能差異、各段的滲透性與運輸蛋白的角色、尿素與水的重吸收影響尿液濃度的生理原理。 選項 (A)：打開集尿管中尿素通道的藥物，作用為促進尿素再吸收，增加腎髓質滲透壓，幫助水重吸收，濃縮尿液。此會使尿液變濃，非題意，選項錯誤。 選項(B)：打開亨利氏環降支的水通道蛋白，降支本身對水高度通透，若藥物加強這個功能，將有更多水從尿液中被再吸收，腎髓質滲透壓會下降，主因為被過多稀釋，會干擾整體尿液濃縮機制，導致尿液較稀。最可能導致稀釋尿液，此選項正確。 選項(C)：打開亨利氏環升支的鈉通道，升支是負責主動吸收 Na^+，加強此機制將增加髓質滲透壓，導致促進後段如集尿管水再吸收，會導致更濃的尿液，選項錯誤。 選項(D)：打開集尿管水通道蛋白如 AQP2，增加水通透性，導致更多水被再吸收而濃縮尿液，非題意，選項錯誤。 此題原答案誤植 C，應為 B。	更正答案為 【B】																																												

慈濟大學

114 學年度學士後中醫學系入學招生考試

試題參考答案疑義釋疑公告

生物學科	36	此題主要針對學生對人類配子形成 (gametogenesis) 兩大過程之精子生成 (spermatogenesis) 與卵子生成 (oogenesis) 的比較理解。考題重點包含下列關鍵概念： 1. 配子生成的部位與發育環境差異：例如精子在睪丸內的曲細精管進行，而卵子則在卵巢中發育。 2. 細胞分裂方式與產物數量的不同：精子由一個初級精母細胞經過兩次減數分裂形成四個精子，而卵子由一個初級卵母細胞僅產生一個功能性卵子與極體。 3. 減數分裂時間點與停滯階段的性別差異：女性的卵母細胞早在出生前就已進入減數分裂並停留在第一期，而男性則自青春期後持續產生精子。 4. 減數分裂與有絲分裂在過程中扮演的角色：精原細胞與卵原細胞先經由有絲分裂再進入減數分裂。 選項(A)：精子生成整體過程是在曲細精管中完成，卵子發生則在卵巢內完成。 敘述正確。因為精子生成確實發生在睪丸的曲細精管 (seminiferous tubules) 內。卵子發生 (oogenesis) 則從卵巢內的濾泡發育開始。 選項(B)：1 顆初級精母細胞可生成 4 個精子；1 顆初級卵母細胞可生成 1 顆卵子與 1 個極體。此敘述錯誤。因初級精母細胞 (primary spermatocyte) 經減數分裂 I 和 II，最終會形成 4 個等大的精子細胞，此部分正確。但初級卵母細胞 減數分裂後會產生 1 顆卵子+ 3 個極體 (polar bodies)，不是只有 1 個極體。即減數分裂 I 產生個次級卵母細胞+第一極體。減數分裂 II 生 1 個卵子+一個第二極體，且第一極體有時會再分裂成兩個極體。因此共會產生最多 3 個極體，而不是只有 1 個。此選項錯誤。 選項(C)：女性出生前，卵子停留在減數分裂第一期，為初級卵母細胞。此敘述正確。因人類女性在胎兒期卵原細胞進行變化成為初級卵母細胞，然後進入減數分裂 I 並停滯在前期 (prophase I)，直到青春期後才逐月有排卵。 選項(D)：精原細胞變成初級精母細胞是有絲分裂的過程。此敘述正確。因精原細胞經有絲分裂形成初級精母細胞 (primary spermatocyte)，之後才進入減數分裂。 此題幹清楚說明選取最不正確選項，答案為 B。	維持原答案 【B】
生物學科	46	此題目在題幹中已清楚說明「能把鐵氧化成鐵離子後獲取能量」和「僅能利用葡萄糖作為合成細胞壁原料來源」二大部分，若單純第一句話而言，通常會讓人直覺聯想到化學自營生物 (chemoautotroph)，因為這類生物常利用無機物 (如 Fe^{2+}、H_2S、NH_3) 氧化產能，例如 <i>Acidithiobacillus ferrooxidans</i> 標準的鐵氧化化學自營細菌。但是第二句透露關鍵的資訊即碳來源不是 CO_2 等無機碳。細胞壁原料建構必須依賴外來的葡萄糖等有機碳。此部分限制此生物不能是「自營」(autotroph)。也就是說雖然這個微	維持原答案 【B】

慈濟大學

114 學年度學士後中醫學系入學招生考試

試題參考答案疑義釋疑公告

	生物能從 Fe^{2+} 獲取能量，但不能從 CO_2 合成細胞物質，必須仰賴外來的葡萄糖作為建材來源，此部分就是「化學異營 (chemoheterotroph)」的定義。以微生物學可以發現如 <i>Gallionella ferruginea</i> 可提供支持例證，利用氧化 Fe^{2+} 為主要能量來源 (chemolithotrophic behavior)，但碳來源需要外來有機物如葡萄糖，而被分類為 chemoheterotroph，此類微生物雖然具有「類似自營」的氧化能量來源，但其碳代謝路徑卻不能合成胞材，因此在碳代謝層面上仍是異營性。此題正確答案為 (B) 化學異營 (chemoheterotroph)。 <table><tr><td>屬性</td><td>化學自營 (A)</td><td>化學異營 (B)</td></tr><tr><td>能量來源</td><td>無機物 (如 Fe^{2+})</td><td>無機物或有機物 (如 Fe^{2+})</td></tr><tr><td>碳來源</td><td>CO_2</td><td>葡萄糖等有機物</td></tr><tr><td>能否用 CO_2 合成胞材</td><td>可以</td><td>不行</td></tr><tr><td>整體判定</td><td>部分符合</td><td>完全符合</td></tr></table>	屬性	化學自營 (A)	化學異營 (B)	能量來源	無機物 (如 Fe^{2+})	無機物或有機物 (如 Fe^{2+})	碳來源	CO_2	葡萄糖等有機物	能否用 CO_2 合成胞材	可以	不行	整體判定	部分符合	完全符合	
屬性	化學自營 (A)	化學異營 (B)															
能量來源	無機物 (如 Fe^{2+})	無機物或有機物 (如 Fe^{2+})															
碳來源	CO_2	葡萄糖等有機物															
能否用 CO_2 合成胞材	可以	不行															
整體判定	部分符合	完全符合															
生物學科	47 依據題幹描述此題主要針對有關感染源誘發相連結之自體免疫疾病，挑出配對錯誤的選項： (A)選項中的 B 型克沙奇病毒(Coxsackie B virus)常被認為與第一型糖尿病發生連結，與破壞胰島 β 細胞有關；而後面的萊特氏症候群(Reiter's syndrome)屬於典型的反應性關節炎 (reactive arthritis)，是一種與微生物感染相關的非化膿性關節炎，通常發生在泌尿生殖系統感染或腸胃炎之後，而合併有結膜炎及骨骼肌肉的病變，在微生物感染這部分常涉及砂眼披衣菌(<i>Chlamydia trachomatis</i>)、沙門氏菌 (<i>Salmonella</i>)、志賀氏桿菌 (<i>Shigella flexneri</i>) 等細菌感染有關，而與原選項中的 B 型克沙奇病毒(Coxsackie B virus)無關。故挑出此配對錯誤的選項。 (B)選項中的 A 型鏈球菌：風濕熱 (Group A Streptococcus : Rheumatic fever) 是配對正確選項，風濕熱是由 A 型鏈球菌感染的鏈球菌性咽喉炎產生的併發症，屬於一種因為免疫系統誤認心臟、關節等為病原體的自體免疫反應。 (C)選項中的德國麻疹：第 1 型糖尿病 (Rubella : Type 1 diabetes) 是配對正確選項，第 1 型糖尿病的病因源自免疫系統異常，體內產生的抗體會攻擊胰臟中製造胰島素的「β細胞」，導致胰島素分泌不足。患有先天性德國麻疹(又名風疹)的病人，其糖尿病的發生率較高，在 1978 年的動物實驗中提出先天性感德國麻疹病毒會引起胰臟胰島中 β細胞的組織學變化，這些變化與遭受腦心肌炎病毒 M 變異株誘發糖尿病的小鼠所見類似，故當時推論先天性德國麻疹患者所出現的糖尿病，是由於病毒感染胰島β細胞所致。	維持原答案 【A】															

慈濟大學

114 學年度學士後中醫學系入學招生考試

試題參考答案疑義釋疑公告

後續一些研究已證實兒童第一型糖尿病 (Type 1 Diabetes Mellitus) 發病率逐年上升，與病毒感染診斷的增加趨勢相符，實驗數據亦支持腮腺炎與德國麻疹的病毒感染可能與第一型糖尿病的發生率有顯著統計相關性。而與第一型糖尿病發生在環境因子探討有關病毒介入這部分也包括腸病毒、輪狀病毒、EB 病毒等，仍不排除第 1 型糖尿病是一種病毒觸發的自體免疫反應，其中當免疫系統攻擊病毒感染的細胞亦同時攻擊胰腺β細胞，雖然至今沒有嚴格的證據支持這種假設，但目前仍有證據支持德國麻疹(風疹)與第 1 型糖尿病間存有關聯性。

(D) 選項中的伯氏疏螺旋體：萊姆病 (*Borrelia burgdorferi* : Lyme disease) 是配對正確的選項，萊姆病 (Lyme disease) 是經由病媒硬蜱叮咬而傳播的人畜共通性疾病 (tick-borne zoonosis)，其致病原為伯氏疏螺旋菌體(*Borrelia birgdorferi*)，由被感染的蜱叮咬後，將伯氏疏螺旋體(*Borrelia burgdorferi*)傳給人。可引起感冒症狀，出現遊走性紅斑(erythema migrans)，引發心臟或神經系統的症狀，慢性關節炎等。由於伯氏疏螺旋體物種擁有分段的基因組，賦予其高度的基因組可塑性(genomic plasticity)，也可改變它們的表面蛋白 (Osps)，此抗原變異性有助於逃避免疫系統辨識(immune evasion)，從而建立持久感染。因而此病會因被蜱叮咬而再次感染，且感染後不具終身免疫力。近期研究提出伯氏疏螺旋體感染與自體免疫疾病之間存在潛在關聯。在這些自體免疫機制中，最核心的是所謂的分子模仿 (molecular mimicry)：即螺旋體抗原與宿主抗原在結構上具有相似性，導致產生交叉反應性的免疫攻擊，這種現象可能促使自體免疫疾病的發生或惡化。進一步產生的自體抗體 (autoantibodies)，尤其是針對關節或神經組織等部位的抗體，更加劇了自體免疫反應的複雜性。此外，由伯氏疏螺旋體引發的持續性感染會導致慢性發炎，這是許多自體免疫疾病的共同特徵。該菌能夠逃過清除機制並躲藏於免疫系統難以攻擊的部位，不斷引發發炎反應，進而形成有利於自體免疫的環境。因此這些再次感染症狀與病原結構持續性免疫活化或自體免疫反應持續攻擊關節組織仍具關聯性。