

Notes on Szabo

by Shangjia Liu

2026

目录

1	Many-Electron Wave Functions and Operators	1
1.1	the Electronic Problem	1
1.1.1	Atomic Units	1
1.1.2	The Born–Oppenheimer Approximation	1
1.1.3	The Antisymmetry or Pauli Principle	2
1.2	Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions	2
1.2.1	Spin Orbitals and Spatial Orbitals	2
1.2.2	Hartree Product	3
1.2.3	Slater Determinant	4
1.2.4	The Hartree–Fock Approximation	4
1.2.5	The Minimal Basis H_2 Model	5
1.2.6	Excited Determinants	6
1.2.7	Form of the Exact Wave Function and Configuration Interaction	6
1.3	Operators and Matrix Elements	6
1.3.1	Minimal Basis H_2 Matrix Elements	7
1.3.2	Notations for One- and Two-Electron Integrals	8
1.3.3	General Rules for Matrix Elements	9
1.3.4	Derivation of the Rules for Matrix Elements	10
1.3.5	Transition from Spin Orbitals to Spatial Orbitals	10
1.3.6	Coulomb and Exchange Integrals	11
1.3.7	Pseudo-Classical Interpretation of Determinantal Energies	13
1.4	Second Quantization	13
1.5	Spin-Adapted Configuration	14
1.5.1	Spin Operators	14
1.5.2	Restricted Determinants and Spin-Adapted Configurations	15
2	The Hartree-Fock Approximation	15
2.1	the Hartree-Fock Equations	15
2.1.1	Coulomb and Exchange Operators	16
2.1.2	the Fock Operators	16
2.2	Derivation of the Hartree-Fock Equations	17
2.2.1	Functional Variation	17

1 Many-Electron Wave Functions and Operators

本章介绍量子化学的基本概念、技巧及必要的记号。具体有三方面：多电子算符（如哈密顿算符）的结构和多电子波函数的形式（即 Slater 行列式及其线性组合）；如何求算符在 Slater 行列式之间的矩阵元；Hartree-Fock 近似的基本思想。之后的章节就是 Hartree-Fock 近似和以 HF 为起点的高级方法，所以现在学的知识在以后的章节中极有好处。

1.1 the Electronic Problem

本书重点关注何近似求解非相对论不含时 Schrödinger 方程：

$$\hat{H}|\Phi\rangle = E|\Phi\rangle \quad (1.1)$$

若用原子单位制，则 N 个电子 M 个核的哈密顿量就是：

$$\hat{H} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \frac{1}{2M_A} \nabla_A^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.2)$$

式 (1.2) 中的第一项是全部电子的动能算符，第二项是核的动能算符，第三项是核与电子间的 Coulomb 吸引势能，第四项和第五项分别是电子间和核之间的排斥势。

1.1.1 Atomic Units

本书采用原子单位制，其中 $\hbar = m_e = e = 1$ （即普朗克常数、电子质量和电子电荷都取值为 1），因此能量单位是 Hartree (E_h)，长度单位是 Bohr (a_0)。原子单位制下的 Schrödinger 方程为：

$$\left(-\frac{1}{2} \nabla^2 - \frac{1}{r'} \right) \phi' = E \phi' \quad (1.3)$$

对于基态氢原子，该方程的解可以导出能量 $E = -0.5$ Hartree。

1.1.2 The Born–Oppenheimer Approximation

由于原子核远比电子重，所以它们运动得较慢。因此，很大程度上可将分子中的电子视作在位置固定的核产生的势场中运动。在这个近似下，式 (1.2) 中第二项，即核动能项，可以被忽略；式中最后一项，即核间排斥势可以视作常量。任意常数加到算符上产生的效果就是本征值加一常数，而本征函数不变。式 (1.2) 中的剩余项称作电子的哈密顿量，或描述在 M 个点电荷产生的势场中运动的 N 个电子的哈密顿量，

$$\hat{H}_{elec} = -\sum_{i=1}^N \frac{1}{2} \nabla_i^2 - \sum_{A=1}^M \sum_{i=1}^N \frac{Z_A}{r_{iA}} + \sum_{i=1}^N \sum_{j>i}^N \frac{1}{r_{ij}} \quad (1.4)$$

电子哈密顿量的 Schrödinger 方程为

$$\hat{H}_{elec}|\Phi\rangle = E_{elec}|\Phi\rangle \quad (1.5)$$

其解就是电子波函数

$$|\Phi_{elec}\rangle = \Phi_{elec}(\{\mathbf{r}_i\}; \{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.6)$$

它描述电子的运动, 并显式依赖于电子坐标, 而以参数的方式依赖于核坐标, 电子能量也参数地依赖于核坐标:

$$E_{elec} = E_{elec}(\{\mathbf{R}_A\}) \quad (1.7)$$

它以参数依赖核坐标是指: 对于每种不同的核构型, Φ_{elec} (作为电子坐标的函数) 的形式都不一样。核坐标并不显式地出现在 Φ_{elec} 中。核固定构型下的总能量还需包含核排斥能。

$$E_{total} = E_{elec} + \sum_{A=1}^M \sum_{B>A}^M \frac{Z_A Z_B}{R_{AB}} \quad (1.8)$$

1.1.3 The Antisymmetry or Pauli Principle

方程式(1.7)中的电子能量 E_{elec} 是核坐标的函数, 但它并不依赖于电子自旋. 因此, 我们引入两个自旋函数 $\alpha(\omega)$ 和 $\beta(\omega)$, 它们分别对应自旋向上和自旋向下的电子. 函数变量 ω 无明显意义, 只需要自旋函数正交完备

$$\langle\alpha|\alpha\rangle = \langle\beta|\beta\rangle = 1, \quad \langle\alpha|\beta\rangle = 0 \quad (1.9)$$

由于哈密顿算符中并无自旋, 仅仅在波函数中强加自旋无法产生任何后果. 但若对波函数加上一个额外的约束, 就能得到一个完善的理论: 多电子波函数在交换任意两个电子坐标的操作下, 必须是反对称的

$$\hat{P}_{ij}|\Phi\rangle = -|\Phi\rangle \quad (1.10)$$

这个额外的要求有时叫作反对称原理, 它是我们熟悉的 Pauli 不相容原理很常见的一种表述. 即波函数不仅要满足 Schrödinger 方程, 还要满足反对称原理(1.10). 满足反对称原理的波函数可以用 Slater 行列式来构造

1.2 Orbitals, Slater Determinants, and Basis Functions

1.2.1 Spin Orbitals and Spatial Orbitals

常认为空间分子轨道构成一组正交基

$$\langle\psi_p|\psi_q\rangle = \delta_{pq} \quad (1.11)$$

若空间轨道集合 $\{\psi_i\}$ 为正交归一的, 则用它可以精确地展开任意函数

$$f(\mathbf{r}) = \sum_i^{\infty} a_i \psi_i(\mathbf{r}) \quad (1.12)$$

实际运算不可能用到完备集，而取其中有限个空间轨道 $\{\psi_p\}$ 。

为完整描述一个电子，需要指定电子自旋。描述自旋和空间两部分的波函数叫作自旋轨道， $\chi(x)$ ，其中 x 代表自旋坐标与空间坐标。一个空间轨道可以构造两个自旋轨道

$$\chi(\mathbf{x}) = \begin{cases} \psi(\mathbf{r})\alpha(\omega) \\ \text{or} \\ \psi(\mathbf{r})\beta(\omega) \end{cases} \quad (1.13)$$

1.2.2 Hartree Product

无相互作用 N 电子的集合，其哈密顿量形式如下

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N \hat{h}(i) \quad (1.14)$$

其中 $\hat{h}(i)$ 是描述第 i 个电子的单电子算符。算符 $\hat{h}(i)$ 有自己的一组本征函数 $\{\chi_p(i)\}$ ，我们将其视作一组自旋轨道 $\{\chi_p(j)\}$

$$\hat{h}(i)\chi_j(i) = \epsilon_j\chi_j(i) \quad (1.15)$$

对于无相互作用的 N 电子系统，其波函数可以写成单电子波函数的乘积

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N) \quad (1.16)$$

这个波函数叫作 Hartree 积，是 $\hat{H}$ 的一个本征函数

$$\hat{H}\Psi^{HP} = E\Psi^{HP} = \left(\sum_{i=1}^N \epsilon_i \right) \Psi^{HP} \quad (1.17)$$

Hartree 积是无相互作用哈密顿量的本征函数，本征值为占据轨道能量之和。

证明： Hartree 积为

$$\Psi^{HP}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N)$$

其中 $i, j, \dots, k$ 为任意 N 个占据轨道指标。无相互作用哈密顿量 $\hat{H} = \sum_{p=1}^N \hat{h}(p)$ 作用其上：

$$\hat{H}\Psi^{HP} = \sum_{p=1}^N \hat{h}(p) [\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2) \cdots \chi_k(\mathbf{x}_N)]$$

$\hat{h}(p)$ 仅作用于第 p 个坐标，其余因子视为常数。由 $\hat{h}\chi_q = \epsilon_q\chi_q$ 得

$$\hat{h}(1)\Psi^{HP} = \epsilon_i\Psi^{HP}, \quad \hat{h}(2)\Psi^{HP} = \epsilon_j\Psi^{HP}, \quad \dots, \quad \hat{h}(N)\Psi^{HP} = \epsilon_k\Psi^{HP}$$

逐项相加:

$$\hat{H}\Psi^{HP} = (\epsilon_i + \epsilon_j + \cdots + \epsilon_k)\Psi^{HP}$$

故 Hartree 积是 $\hat{H}$ 的本征函数, 本征值为各占据轨道能量之和。

Hartree 积是无相关波函数, 因为在体积微元 $d\mathbf{x}_1$ 中找到电子 1 的概率与在体积微元 $d\mathbf{x}_2$ 中找到电子 2 的概率是独立的 (不相关的) 但实际上电子间每时每刻都在通过 Coulomb (库伦) 相互作用排斥, 所以两电子间是明显相互关联着的。

1.2.3 Slater Determinant

满足反对称原理(1.10)的波函数可以用 Slater 行列式来构造. 对于 N 个电子占据 N 个自旋轨道 $\chi_i, \chi_j, \dots, \chi_k$ 的情况, Slater 行列式定义为

$$\Psi^{SD}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \chi_i(\mathbf{x}_1) & \chi_j(\mathbf{x}_1) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_1) \\ \chi_i(\mathbf{x}_2) & \chi_j(\mathbf{x}_2) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \chi_i(\mathbf{x}_N) & \chi_j(\mathbf{x}_N) & \cdots & \chi_k(\mathbf{x}_N) \end{vmatrix} \quad (1.18)$$

注意 Slater 行列式行表示电子. 交换任意两行 (即交换两个电子坐标) 会改变行列式的符号, 因此满足反对称原理. 若两电子占据同一自旋轨道, 则行列式中两列相同, 行列式值为零, 满足 Pauli 不相容原理. 为简便, 引入归一化的 Slater 行列式的简写符号: 隐去归一化因子, 仅写出行列式的对角项

$$\Psi^{SD}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_N) = |\chi_i(\mathbf{x}_1)\chi_j(\mathbf{x}_2)\cdots\chi_k(\mathbf{x}_N)\rangle = |\chi_i\chi_j\cdots\chi_k\rangle \quad (1.19)$$

由于在 Slater 行列式中自旋反平行的电子的运动仍然缺失关联作用, 也习惯上称 Slater 行列式为无相关波函数。

1.2.4 The Hartree-Fock Approximation

描述 N 电子系统基态最简单的反对称波函数是单 Slater 行列式

$$|\Phi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_N\rangle \quad (1.20)$$

变分原理给出上形式的波函数, 最优的波函数应该给出最低的能量

$$E_0 = \min_{\{\chi_i\}} \langle \Phi_0 | \hat{H} | \Phi_0 \rangle \quad (1.21)$$

Hartree-Fock 近似的精髓在于将复杂的多电子问题转换为单电子问题, 而单电子问题是以平均的方式处理电子之间的排斥. 由于 Hartree-Fock 方程式是非线性方程, 只能迭代求解. 这种方法称为自洽场方法 (self-consistent field method).

1.2.5 The Minimal Basis H_2 Model

现在来介绍一个简单的模型体系, 此模型贯穿全书, 我们会用它来展示许多量子化学的思想和方法. 它就是我们熟悉的极小基 MO-LCAO 下 H_2 的分子.

氢原准确的 $1s$ 轨道为

$$\psi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \left(\frac{\zeta^3}{\pi}\right)^{1/2} e^{-\zeta|\mathbf{r}-\mathbf{R}|} \quad (1.22)$$

ζ 是轨道指数, 本式取 1.0. 但本书多数使用 Gaussian 轨道, 因为它在积分时更容易, 1 是 Gaussian 轨道形式如下

$$\psi_{1s}(\mathbf{r} - \mathbf{R}) = \left(\frac{2\alpha}{\pi}\right)^{3/4} e^{-\alpha|\mathbf{r}-\mathbf{R}|^2} \quad (1.23)$$

利用两个定域原子轨道 ϕ_1, ϕ_2 , 可以采取线性组合的方式构建两个离域分子轨道. 对称组合生成 gerade 对称的成键分子轨道

$$\psi_1 = \frac{1}{\sqrt{2(1+S_{12})}}(\phi_1 + \phi_2) \quad (1.24)$$

相反地也可以构建反对称组合, 生成具有 ungerade 对称性的反键分子轨道

$$\psi_2 = \frac{1}{\sqrt{2(1-S_{12})}}(\phi_1 - \phi_2) \quad (1.25)$$

分子轨道 ψ_1 和 ψ_2 组成一组正交基。

证明: 假设原子轨道 ϕ_1 和 ϕ_2 是正交归一的, 即 $\langle\phi_1|\phi_1\rangle = 1$, $\langle\phi_2|\phi_2\rangle = 1$, $\langle\phi_1|\phi_2\rangle = S_{12}$. 计算内积:

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2(1+S_{12})}} \frac{1}{\sqrt{2(1-S_{12})}} \langle\phi_1 + \phi_2|\phi_1 - \phi_2\rangle$$

展开:

$$\langle\phi_1 + \phi_2|\phi_1 - \phi_2\rangle = \langle\phi_1|\phi_1\rangle - \langle\phi_1|\phi_2\rangle + \langle\phi_2|\phi_1\rangle - \langle\phi_2|\phi_2\rangle = 1 - S_{12} + S_{12} - 1 = 0$$

因此,

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = \frac{1}{2\sqrt{(1+S_{12})(1-S_{12})}} \cdot 0 = 0$$

故 ψ_1 和 ψ_2 正交。

Hartree-Fock 基态可以简写为

$$|\Phi_0\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1\rangle \quad (1.26)$$

这种符号代表两个电子占据同一个空间轨道 ψ_1 , 一个自旋是 α , 一个是 β . 从上下文可以清楚地分辨出 ψ_1 是代表空间轨道还是由 ψ_1 和 α 自旋函数组成的自旋轨道.

1.2.6 Excited Determinants

单重激发态是指在 Hartree-Fock 基态中占据某轨道 χ_a 的电子被提升到了某虚轨道 χ_r 上

$$|\Phi_a^r\rangle = |\chi_1 \cdots \chi_{a-1} \chi_r \chi_{a+1} \cdots \chi_N\rangle \quad (1.27)$$

双重激发态是 χ_a 和 χ_b 上的电子激发到虚轨道 χ_r 和 χ_s 上

$$|\Phi_{ab}^{rs}\rangle = |\chi_1 \cdots \chi_{a-1} \chi_r \chi_{a+1} \cdots \chi_{b-1} \chi_s \chi_{b+1} \cdots \chi_N\rangle \quad (1.28)$$

以此类推, 可以定义三重激发态, 四重激发态等. 某种程度上, 行列式的重数越高, 在近似描述体系的真实态时, 其重要性就越低. 虽然激发态行列式描述的不是真实的激发态, 但重要的是, 它们可以作为 N 电子基函数来展开精确的 N 电子态.

1.2.7 Form of the Exact Wave Function and Configuration Interaction

N 电子问题中的基态和激发态精确波函数都可以写成由一组完全集 $\{\chi_i(\mathbf{x})\}$ 所生产的全部可能的 N 电子 Slater 行列式的线性组合

由于所有可能的行列式都可以借助基态 Hartree-Fock 行列式 (的激发) 来表示, 所以可将体系任意态对应的精确波函数写作:

$$|\Psi\rangle = c_0|\Phi_0\rangle + \sum_{a,r} c_a^r |\Phi_a^r\rangle + \sum_{a<b, r<s} c_{ab}^{rs} |\Phi_{ab}^{rs}\rangle + \cdots \quad (1.29)$$

所以无穷集合 $\{|\Psi_i\rangle\} = \{|\Psi_0\rangle, |\Psi_a^r\rangle, |\Psi_{ab}^{rs}\rangle, \dots\}$ 是 N 电子 Hilbert 空间的一组完备基函数, 并可用于展开 N 电子波函数. 由完备集 $\{|\Psi_i\rangle\}$ 产生的哈密顿算符矩阵其本征值就是基态和激发态的准确能量. 由于每个 $|\Psi_i\rangle$ 都对应一种自旋轨道的组态 (组态即生成 $|\Psi_i\rangle$ 的自旋轨道集合), 因此这种方法叫做组态相互作用 (configuration interaction, CI)

极小基 H_2 的精确波函数 $|\Phi_0\rangle$ 的对称性与 Hartree-Fock 近似下的基态一样, 都有 g 对称性. 因此, $|\Phi_0\rangle$ 只能由具有 g 对称性的行列式线性组合而成.

$$|\Phi_0\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_{11}^{2\bar{2}}|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle = c_0|\Psi_0\rangle + c_{12}^{34}|\Psi_{12}^{34}\rangle \quad (1.30)$$

确定了上述展开式中的系数, 也就确定了精确波函数 $|\Phi_0\rangle$ 和精确能量 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle$. 为此, 我们将 full CI 矩阵对角化, 也即将以 $|\Psi_0\rangle$ 和 $|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle$ 为基底的 2×2 哈密顿矩阵对角化

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle & \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle \\ \langle\Psi_{11}^{2\bar{2}}|\hat{H}|\Psi_0\rangle & \langle\Psi_{11}^{2\bar{2}}|\hat{H}|\Psi_{11}^{2\bar{2}}\rangle \end{pmatrix} \quad (1.31)$$

1.3 Operators and Matrix Elements

本节来讲如何求得某算符在正交归一轨道构成的行列式之间的矩阵元.

1.3.1 Minimal Basis H_2 Matrix Elements

我们先讨论极小基 H_2 模型的 full CI 矩阵元(1.31). 其精确基态是 Hartree-Fock 基态 $|\Phi_0\rangle = |1\bar{1}\rangle$ 和双重激发态 $|\Psi_{12}^{34}\rangle = |2\bar{2}\rangle$ 的线性组合. 我们要求对角元 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_0\rangle$ 和 $\langle\Phi_{11}^{22}|\hat{H}|\Phi_{11}^{22}\rangle$ 以及非对角元 $\langle\Phi_0|\hat{H}|\Phi_{11}^{22}\rangle$.

双电子体系的哈密顿量为

$$\hat{H} = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) + \frac{1}{r_{12}} \quad (1.32)$$

为了方便, 把总哈密顿量分为单电子和双电子部分

$$\hat{O}_1 = \hat{h}(1) + \hat{h}(2) \quad (1.33)$$

$$\hat{O}_2 = \frac{1}{r_{12}} \quad (1.34)$$

考虑矩阵元 $\langle\Phi_0|\hat{O}_1|\Phi_0\rangle$, 由式(1.33)可知它是两项之和, 不妨先计算

$$\begin{aligned} \langle\Phi_0|\hat{h}(1)|\Phi_0\rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \Phi_0^*(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \Phi_0(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 [\chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2)] \\ &\quad \times \hat{h}(1) [\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)] \\ &= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\ &\quad + \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \\ &\quad - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \\ &\quad \left. + \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) \hat{h}(1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \right\}. \end{aligned} \quad (1.35)$$

由自旋轨道正交归一性, 上式中交叉项积分为零, 化简得

$$\langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle = \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_1(\mathbf{x}_1) + \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \quad (1.36)$$

同样可以得到 $\langle\Psi_0|\hat{h}(2)|\Psi_0\rangle = \langle\Psi_0|\hat{h}(1)|\Psi_0\rangle$, 那么

$$\langle\Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_1(\mathbf{x}_1) + \int d\mathbf{x}_1 \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_2(\mathbf{x}_1) \quad (1.37)$$

上式中的积分叫做单电子积分, 我们引入如下记号表示包含自旋轨道的单电子积分

$$\langle i|\hat{h}|j\rangle = \langle\chi_i|\hat{h}|\chi_j\rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) \quad (1.38)$$

即有

$$\langle\Psi_0|\hat{O}_1|\Psi_0\rangle = \langle 1|\hat{h}|1\rangle + \langle 2|\hat{h}|2\rangle \quad (1.39)$$

现在来计算 $\hat{O}_2$ 的矩阵元

$$\begin{aligned}
\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left[2^{-1/2} (\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)) \right]^* \\
&\quad \times r_{12}^{-1} \left[2^{-1/2} (\chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) - \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2)) \right] \\
&= \frac{1}{2} \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\
&\quad + \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) - \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \\
&\quad \left. - \chi_2^*(\mathbf{x}_1) \chi_1^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right\}.
\end{aligned} \tag{1.40}$$

由于 $r_{12} = r_{21}$, 上式第二项积分变量可以交换, 所以该项与第一项相等. 类似的, 第三项与第四项也相等. 因此有

$$\begin{aligned}
\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle &= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \left\{ \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_1(\mathbf{x}_1) \chi_2(\mathbf{x}_2) \right. \\
&\quad \left. - \chi_1^*(\mathbf{x}_1) \chi_2^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_2(\mathbf{x}_1) \chi_1(\mathbf{x}_2) \right\}.
\end{aligned} \tag{1.41}$$

上面的积分就是双电子积分之一例, 得名来源于积分变量包括电子 1 与电子 2 的空间坐标以及两个自旋坐标. 习惯上常将所有双电子积分中的积分变量都写成电子 1 和 2 的坐标. 现引入记号来表示含自旋轨道的双电子积分

$$\langle ij | kl \rangle = \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) \tag{1.42}$$

那么就有

$$\langle \Psi_0 | \hat{O}_2 | \Psi_0 \rangle = \langle 12 | 12 \rangle - \langle 12 | 21 \rangle \tag{1.43}$$

Hartree-Fock 基态能量就成为

$$E_0 = (1|h|1) + (2|h|2) + \langle 12 | 12 \rangle - \langle 12 | 21 \rangle \tag{1.44}$$

1.3.2 Notations for One- and Two-Electron Integrals

由于双电子积分经常以如下的组合形式出现, 在此引入一个人特别多几号来表示反对称双电子积分

$$\begin{aligned}
\langle ij || kl \rangle &= \langle ij | kl \rangle - \langle ij | lk \rangle \\
&= \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} [\chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) - \chi_l(\mathbf{x}_1) \chi_k(\mathbf{x}_2)]
\end{aligned} \tag{1.45}$$

自旋轨道

$$[i|h|j] = \langle i|h|j \rangle = \int d\mathbf{x}_1 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \hat{h}(\mathbf{r}_1) \chi_j(\mathbf{x}_1) \tag{1.46}$$

$$\langle ij | kl \rangle = \langle \chi_i \chi_j | \chi_k \chi_l \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} \chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) \tag{1.47}$$

$$[ij||kl] = \langle ij||kl \rangle = \int d\mathbf{x}_1 d\mathbf{x}_2 \chi_i^*(\mathbf{x}_1) \chi_j^*(\mathbf{x}_2) r_{12}^{-1} [\chi_k(\mathbf{x}_1) \chi_l(\mathbf{x}_2) - \chi_l(\mathbf{x}_1) \chi_k(\mathbf{x}_2)] \quad (1.48)$$

空间轨道

$$(i|h|j) = h_{ij} = \int d\mathbf{r}_1 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) h(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) \quad (1.49)$$

$$(ij|kl) = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_i^*(\mathbf{r}_1) \psi_j(\mathbf{r}_1) r_{12}^{-1} \psi_k^*(\mathbf{r}_2) \psi_l(\mathbf{r}_2) \quad (1.50)$$

$$\text{库伦积分 } J_{ij} = (ii|jj) \quad (1.51)$$

$$\text{交换积分 } K_{ij} = (ij|ji) \quad (1.52)$$

1.3.3 General Rules for Matrix Elements

本节介绍一套求矩阵元的规则，下一节展示推导. 量子化学有两类算符. 第一类是单电子算符之和

$$\hat{O}_1 = \sum_{i=1}^N h(i) \quad (1.53)$$

第二类是两电子算符之和

$$\hat{O}_2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j>i} v(i, j) = \sum_{i<j} v(i, j) \quad (1.54)$$

(1) 单电子算符在行列式间的矩阵元有三种情况 case1: $|K\rangle = |\dots mn \dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_1|K\rangle = \sum_m^N \langle m|h|m\rangle \quad (1.55)$$

case2: $|K\rangle = |\dots mn \dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pn \dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_1|L\rangle = \sum_m^N \langle m|h|p\rangle \quad (1.56)$$

case3: $|K\rangle = |\dots mn \dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pq \dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_1|K\rangle = 0 \quad (1.57)$$

(2) 双电子算符在行列式间的矩阵元有三种情况 case1: $|K\rangle = |\dots mn \dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_2|K\rangle = \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^N \langle mn||mn\rangle \quad (1.58)$$

case2: $|K\rangle = |\dots mn \dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pn \dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_2|L\rangle = \sum_n^N \langle mn||mn\rangle \quad (1.59)$$

case3: $|K\rangle = |\dots mn \dots\rangle$ $|L\rangle = |\dots pq \dots\rangle$

$$\langle K|\hat{O}_2|K\rangle = \langle mn||pq\rangle \quad (1.60)$$

根据上列式子可以快速卸除单个行列式 $|K\rangle$ 的能量

$$\langle K|\hat{H}|K\rangle = \sum_m^N \langle m|h|m\rangle + \frac{1}{2} \sum_m^N \sum_n^m \langle mn||mn\rangle \quad (1.61)$$

其中

$$h(i) = -\frac{1}{2}\nabla_i^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{iA}} \quad (1.62)$$

对于 H_2 极小基下, $|\Phi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\rangle$

$$\begin{aligned} E_0 &= \langle 1|h|1\rangle + \langle 2|h|2\rangle + \langle 12||12\rangle \\ &= \langle 1|h|1\rangle + \langle 2|h|2\rangle + \langle 12|12\rangle - \langle 12|21\rangle \end{aligned} \quad (1.63)$$

1.3.4 Derivation of the Rules for Matrix Elements

略

1.3.5 Transition from Spin Orbitals to Spatial Orbitals

尽管在前面章节中使用自旋轨道可以简化量子化学理论设计的代数运算和各种记号,但是在运算中,自旋函数 α 和 β 必须被积分掉. 才能将自旋轨道约化为可数值运算的空间轨道及其积分

我们以 H_2 极小基的 Hartree-Fock 基态为例

$$|E_0\rangle = \langle \chi_1|h|\chi_1\rangle + \langle \chi_2|h|\chi_2\rangle + \langle 12||12\rangle \quad (1.64)$$

可以得到

$$E_0 = \langle \psi_1|h|\psi_1\rangle + \langle \bar{\psi}_1|h|\bar{\psi}_1\rangle + \langle \psi_1\bar{\psi}_1||\psi_1\bar{\psi}_1\rangle \quad (1.65)$$

对于单电子积分

$$\langle \bar{\psi}_1|h|\bar{\psi}_1\rangle = \int d\mathbf{r} d\omega_1 \psi_1^*(\mathbf{r}) \beta^*(\omega_1) h(\mathbf{r}) \psi_1(\mathbf{r}) \beta(\omega_1) \quad (1.66)$$

注意到 $\langle \beta|\beta\rangle$, 那么就有

$$\langle \bar{\psi}_1|h|\bar{\psi}_1\rangle = \int d\mathbf{r} \psi_1^*(\mathbf{r}) h(\mathbf{r}) \psi_1(\mathbf{r}) = \langle \psi_1|h|\psi_1\rangle \quad (1.67)$$

所以 E_0 中单电子部分的能量贡献是 $2\langle \psi_1|h|\psi_1\rangle$ 对于 $\langle \psi_1\bar{\psi}_1||\psi_1\bar{\psi}_1\rangle$ 有

$$\begin{aligned} \langle \psi_1\bar{\psi}_1||\psi_1\bar{\psi}_1\rangle &= \langle \psi_1\bar{\psi}_1|\psi_1\bar{\psi}_1\rangle - \langle \psi_1\bar{\psi}_1|\bar{\psi}_1\psi_1\rangle \\ &= \iint d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_1^*(\mathbf{r}_1) \beta^*(\omega_1) \psi_1^*(\mathbf{r}_2) \alpha^*(\omega_2) r_{12}^{-1} \\ &\quad \times [\psi_1(\mathbf{r}_1) \beta(\omega_1) \psi_1(\mathbf{r}_2) \alpha(\omega_2) - \psi_1(\mathbf{r}_1) \alpha(\omega_1) \psi_1(\mathbf{r}_2) \beta(\omega_2)] \end{aligned} \quad (1.68)$$

对于括号中的第一项, 由于 β 和 α 的正交性, 该矩阵元会因子化为空间积分与自旋内积的乘积

$$\beta(\omega_1)|\beta(\omega_1)\rangle = 1 \quad (1.69)$$

$$\alpha(\omega_2)|\alpha(\omega_2)\rangle = 1 \quad (1.70)$$

所以

$$\iint r_{12}^{-1} \psi_1(1) \psi_1(1) \psi_1(2) \psi_1(2) d\tau_1 d\tau_2 = \langle \psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1 \rangle \quad (1.71)$$

对于第二项, 自旋内积是 $\beta(\omega_1)|\alpha(\omega_1)\rangle = 0$, 所以整个项为 0 因此 $\langle \psi_1 \bar{\psi}_1 | \psi_1 \bar{\psi}_1 \rangle = \langle \psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1 \rangle$ 也就是

$$\begin{aligned} E_0 &= 2\langle \psi_1 | h | \psi_1 \rangle + \langle \psi_1 \psi_1 | \psi_1 \psi_1 \rangle \\ &= 2\langle 1 | h | 1 \rangle + \langle 11 | 11 \rangle \end{aligned} \quad (1.72)$$

把上面的结论推广到有偶数电子的 N 电子体系中, 可以写出 N 电子系统的闭壳层限制性 Hartree-Fock 波函数

$$\Psi_0 = |\psi_1 \bar{\psi}_1 \psi_2 \bar{\psi}_2 \cdots \psi_a \bar{\psi}_a \cdots \psi_N \bar{\psi}_N| \quad (1.73)$$

积分可得

$$E_0 = 2 \sum_i \langle i | h | i \rangle + \sum_{i,j} (2J_{ij} - K_{ij}) \quad (1.74)$$

1.3.6 Coulomb and Exchange Integrals

式(1.74)中单电子项

$$\langle a | h | a \rangle = h_{aa} = \int d\mathbf{r}_1 \psi_a^*(\mathbf{r}_1) \left(-\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \right) \psi_a(\mathbf{r}_1) \quad (1.75)$$

h_{aa} 就是波函数 $\psi_a(\mathbf{r}_1)$ 所对应电子的平均动能加上核对它的吸引能量

式(1.74)中双电子项

$$J_{ij} = \langle ij | ij \rangle = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 |\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2 r_{12}^{-1} |\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2 \quad (1.76)$$

就是函数 $|\psi_a(\mathbf{r}_1)|^2$ 电子云与 $|\psi_b(\mathbf{r}_2)|^2$ 电子云的库仑相互作用的静电能, 并称之为库伦积分. 而对于积分

$$K_{ij} = \langle ij | ji \rangle = \int d\mathbf{r}_1 d\mathbf{r}_2 \psi_a^*(\mathbf{r}_1) \psi_b^*(\mathbf{r}_2) r_{12}^{-1} \psi_b(\mathbf{r}_1) \psi_a(\mathbf{r}_2) \quad (1.77)$$

没有经典解释对应, 称为交换积分. 库伦积分和交换积分的值都是正的. 下面我们证明行列式对应的能量中的交换积分是由交换相关 (exchange correlation) 作用引起的, 也即在单行列式近似下, 同自旋电子的运动相互关联.

极小基 H_2 的 full CI 矩阵为

$$\hat{H} = \begin{bmatrix} 2h_{11} + J_{11} & K_{12} \\ K_{12} & 2h_{22} + J_{22} \end{bmatrix} \quad (1.78)$$

证明： full CI 基函数取 $|\Psi_0\rangle = |1\bar{1}\rangle$ 和 $|\Psi_{11}^{22}\rangle = |2\bar{2}\rangle$

(1) 对角元 $\langle 1\bar{1}|\hat{H}|1\bar{1}\rangle$

单电子部分：

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_1|1\bar{1}\rangle = \langle 1|h|1\rangle + \langle \bar{1}|h|\bar{1}\rangle = h_{11} + h_{11} = 2h_{11}$$

双电子部分

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_2|1\bar{1}\rangle = \frac{1}{2}(J_{11} + J_{11}) = J_{11}$$

因此

$$\langle 1\bar{1}|\hat{H}|1\bar{1}\rangle = 2h_{11} + J_{11}$$

同理

$$\langle 2\bar{2}|\hat{H}|2\bar{2}\rangle = 2h_{22} + J_{22}$$

(2) 非对角元 $\langle 1\bar{1}|\hat{H}|2\bar{2}\rangle$

两行列式相差两个自旋轨道 ($1 \rightarrow 2, \bar{1} \rightarrow \bar{2}$), 单电子部分为零：

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_1|2\bar{2}\rangle = 0$$

双电子部分：

$$\langle 1\bar{1}|\hat{O}_2|2\bar{2}\rangle = \langle 1\bar{1}||2\bar{2}\rangle = \langle 1\bar{1}|2\bar{2}\rangle - \langle 1\bar{1}|\bar{2}2\rangle$$

积分掉自旋：

$$\langle 1\bar{1}|2\bar{2}\rangle = (12|12) \langle \alpha|\alpha\rangle \langle \beta|\beta\rangle = (12|12)$$

$$\langle 1\bar{1}|\bar{2}2\rangle = (12|12) \langle \alpha|\beta\rangle \langle \beta|\alpha\rangle = 0$$

由于空间轨道为实函数, $(12|12) = (12|21) = K_{12}$ 。故

$$\langle 1\bar{1}|\hat{H}|2\bar{2}\rangle = K_{12}$$

同理 $\langle 2\bar{2}|\hat{H}|1\bar{1}\rangle = K_{12}$ (哈密顿矩阵为实对称矩阵)。

综上所述即得 (1.78)。

之前已经说到, 在一个两电子自旋平行的系统 $|\bar{\psi}_1\bar{\psi}_2\rangle$ 中, 在同一点同时找到这两个电子的概率为零. 但若这两个电子自旋相反, 即系统此时的波函数为 $|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle$, 则此概率不为

零. 那么一个合理的推测就是电子间的库伦排斥会使态 $|\bar{\psi}_1\bar{\psi}_2\rangle$ 对应的能量比 $|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle$ 的能量低. 利用式(1.61), $|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle$ (即为 $|\uparrow\downarrow\rangle$) 的能量就是

$$E_{\uparrow\downarrow} = \langle\psi_1\bar{\psi}_2|\hat{H}|\psi_1\bar{\psi}_2\rangle = h_{11} + h_{22} + J_{12} \quad (1.79)$$

而 $|\bar{\psi}_1\bar{\psi}_2\rangle$ (即为 $|\downarrow\downarrow\rangle$ 或 $|\uparrow\uparrow\rangle$) 的能量为

$$E_{\downarrow\downarrow} = E_{\uparrow\uparrow} = h_{11} + h_{22} + J_{12} - K_{12} \quad (1.80)$$

由于 K_{12} 是正值, 前者能量小于后者. 因此, Slater 行列式所对应的能量的表达式中交换积分的出现, 实际上反映了这样一个事实: 即使在单行列式近似下, 有相同自旋的两个电子的运动也是相互关联着的 (相关, correlated). 在1.2.2里提到, Hartree 乘积中没有交换积分出现. 也就不能满足费米子的要求. 所以电子之间并没有相互规避, 电子运动是无关的 (没有相关), 因此不能正确反映体系的性质.

1.3.7 Pseudo-Classical Interpretation of Determinantal Energies

先讨论能量中的单电子贡献. 有如下结论: 空间轨道 ψ_i 上的一个电子 (无论自旋如何) 会在总能量中贡献一项 h_{ii} . 双电子贡献里一对电子既可以平行自旋也可以相反. 若自旋相反

$$\langle ij||ij\rangle = J_{ij} \quad (1.81)$$

若自旋平行

$$\langle ij||ij\rangle = J_{ij} - K_{ij} \quad (1.82)$$

因此我们有如下论断: 空间轨道 ψ_i 、 ψ_j 中的每一对电子 (无论其自旋) 都对能量贡献一项 J_{ij} . 空间轨道 ψ_i 、 ψ_j 中的一对自旋平行电子对能量贡献一项 $-K_{ij}$. 行列式对应的总能量就是这些项之和.

按这种方式来表述能量时需记住, 自旋平行的电子之间的交换作用只不过是一种方便的表述方式, 是为了将由单行列式所描述的系统能量以简单的方式表达出来, 它本身并无真实物理意义. 若真的论及两电子间真实的物理相互作用, 我们只能说这种相互作用由哈密顿量中的库伦排斥项 (r_{ij}^{-1}) 所描述, 而与自旋无关.

1.4 Second Quantization

反对称原理是量子力学中的一个公理, 此前我们通过 Slater 行列式及其线性组合来保证波函数满足这个原理. 而是否能找到其他办法满足反对称原理呢? 二次量子化就是这样一种处理多电子体系的有效框架. 借助二次量子化, 我们可以把重心从 N-电子波函数本身上移开, 转而关注之前研究过的单双电子积分 $\langle i|h|j\rangle, \langle i||j\rangle$. 本书其余章节并未广泛地使用二次量子化, 因此本节可以选读.

略

1.5 Spin-Adapted Configuration

本节会更详细地讨论自旋, 并讨论多电子系统的自旋态.

1.5.1 Spin Operators

单个粒子的自旋角动量算符是矢量算符

$$\tilde{s} = \tilde{s}_x i + \tilde{s}_y j + \tilde{s}_z k \quad (1.83)$$

可以用 s^2 及其某个分量的共同本征函数集合作为单粒子自旋态的完备集, 一般将分量选为 s_z

$$s^2 |s, m_s\rangle = s(s+1) |s, m_s\rangle, \quad s_z |s, m_s\rangle = m_s |s, m_s\rangle \quad (1.84)$$

上式中 s 是描述总自旋的一个量子数, s 可以取 $0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}$, 并取相应值 $m_s = -s, -s+1, \dots, s$ 对于电子而言, s 总为 $1/2$, 因此不需在 s 做标记

$$s_z |\alpha\rangle = \frac{1}{2} |\alpha\rangle, \quad s_z |\beta\rangle = -\frac{1}{2} |\beta\rangle \quad (1.85)$$

有常用恒等式

$$\begin{aligned} s_x |\alpha\rangle &= \frac{1}{2} |\beta\rangle, s_x |\beta\rangle = \frac{1}{2} |\alpha\rangle, \\ s_y |\alpha\rangle &= \frac{i}{2} |\beta\rangle, s_y |\beta\rangle = -\frac{i}{2} |\alpha\rangle, \\ s_z |\alpha\rangle &= \frac{1}{2} |\alpha\rangle, s_z |\beta\rangle = -\frac{1}{2} |\beta\rangle. \end{aligned}$$

此外还有升/降算符, 常用来处理自旋

$$s_+ = s_x + i s_y, s_- = s_x - i s_y \quad (1.86)$$

这两个算符可以升降 s_z 的值一个单位:

$$s_+ |\beta\rangle = |\alpha\rangle, s_+ |\alpha\rangle = 0, s_- |\alpha\rangle = |\beta\rangle, s_- |\beta\rangle = 0 \quad (1.87)$$

也就是说, s_+ 作用于 β 自旋时产生 α 自旋.

多电子体系的总自旋算符就是每个电子自旋算符的矢量和

$$S = \sum_{i=1}^N s(i) \quad (1.88)$$

S^2 与 S_z 哈密顿量对易, 那么哈密顿量的精确本征函数也就是这两个自旋算字的本征函数

$$S^2 |\Psi\rangle = S(S+1) |\Psi\rangle, \quad S_z |\Psi\rangle = M_S |\Psi\rangle \quad (1.89)$$

式中 S, M_S 是 N 电子多重态 $|\Phi\rangle$ 总自旋量子数及其 z 方向上的分量. 总自旋磁量子数, 取值为 $-S, -S+1, \dots, S$ 一般而言, 多电子波函数的自旋多重度 (angular multiplicity) 是所对应的这个值 $2S+1$. 我们分别把这些态称作单重态、双重态、三重态等.

1.5.2 Restricted Determinants and Spin-Adapted Configurations

最简单的闭壳层行列式就是极小基 H_2 的 Hartree-Fock 基态波函数

$$|\Psi_0\rangle = |\psi_1\bar{\psi}_1| = [\psi_1(1)\psi_1(2)]2^{-\frac{1}{2}}(\alpha_1\beta_2 - \alpha_2\beta_1) \quad (1.90)$$

上式最后展开了行列式. 这个波函数的自旋部分就是一双电子系统的单重自旋函数. 同样, 双激发态 $|\psi_{11}^{22}\rangle$ 也是单重态.

现来看开壳层限制性行列式. 对于极小基 H_2 四个单激发行列式中的两个

$$|\bar{\Psi}_1^2\rangle = |\bar{2}1\rangle = -2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2)]\beta_1\beta_2 \quad (1.91)$$

$$|\Psi_1^2\rangle = |12\rangle = 2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) - \psi_2(1)\psi_1(2)]\alpha_1\alpha_2 \quad (1.92)$$

是 S^2 的本征函数且本征值为 2, 均为三重态. 但剩下的两个

$$|\bar{\Psi}_1^2\rangle = |\bar{2}1\rangle = -2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) + \psi_2(1)\psi_1(2)]\beta_1\alpha_2 \quad (1.93)$$

$$|\Psi_1^2\rangle = |12\rangle = 2^{-\frac{1}{2}}[\psi_1(1)\psi_2(2) + \psi_2(1)\psi_1(2)]\beta_1\alpha_2 \quad (1.94)$$

S^2 的本征函数, 而是一个单重态和三重态的线性组合. 很明显, 在很多情况下, 人们需要构建是 S^2 本征函数的组态. 对于双电子系统, 态很简单, S^2 归一化的本征函数为

$${}^3\Psi_1^2 = 2^{-\frac{1}{2}}(|\bar{2}1\rangle - |12\rangle) \quad (1.95)$$

2 The Hartree-Fock Approximation

本章中来详细介绍 Hartree-Fock 理论以及从头的 Hartree-Fock 计算. 此章篇幅较长, 这也反映了 Hartree-Fock 在量子化学中的重要地位. Hartree-Fock 不仅就其本身十分重要, 它也是其他考虑了电子相关效应的更精确近似的起点.

2.1 the Hartree-Fock Equations

本节是对方程推导结果的总结, 具体推导细节放在下一节讨论.

我们需要找到一组自旋轨道, 使其构成的单行列式

$$|\Psi_0\rangle = |\chi_1\chi_2\cdots\chi_N\rangle \quad (2.1)$$

成为该形式下 N 电子系统基态的最佳近似. 根据变分原理, 这种轨道就是使得下式能量最小的轨道

$$E_0 = \langle\Psi_0|\hat{H}|\Psi_0\rangle = \sum_a^N \langle a|h|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab}^N \langle ab||ab\rangle \quad (2.2)$$

在下一小节中可以推导唯一的限制就是要求他们相互正交

$$\langle a|b\rangle = \delta_{ab} \quad (2.3)$$

可以得到一个刻画最优自旋轨道的方程, Hartree-Fock 积分微分方程

$$\begin{aligned} h(1)\chi_a(1) + \sum_{b \neq a} \left[\int dx_2 |\chi_b(2)|^2 r_{12}^{-1} \right] \chi_a(1) - \sum_{b \neq a} \left[\int dx_2 \chi_b^*(2) \chi_a(2) r_{12}^{-1} \right] \chi_b(1) \\ = \epsilon_a \chi_a(1) \end{aligned} \quad (2.4)$$

其中

$$h(1) = -\frac{1}{2} \nabla_1^2 - \sum_A \frac{Z_A}{r_{1A}} \quad (2.5)$$

2.1.1 Coulomb and Exchange Operators

设想电子 2 占据 χ_b , Hartree-Fock 理论中, 电子 1 感受到电子 2 在空间瞬时位置产生的双电子势 r_{12}^{-1} 被替换为单电子势, 同时考虑占据 $d\mathbf{x}_2$ 的概率权重 $d\mathbf{x}_2 |\chi_b(2)|^2$. 由此可以定义库伦算符

$$\mathcal{J}_b(1) = \int dx_2 |\chi_b(2)|^2 r_{12}^{-1} \quad (2.6)$$

同时引入交换算符, 根据其对自旋轨道的作用定义

$$\mathcal{K}_b(1)\chi_a(1) = \left[\int dx_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} \chi_a(2) \right] \chi_b(1) \quad (2.7)$$

交换项来自单行列式的反对称性质, 它的形式比较特殊, 而且没有如库伦项那样简单的经典解释. 但仍可将 Hartree-Fock 方程(2.4)写为

$$\left[h(1) + \sum_{b \neq a} \mathcal{J}_b(1) - \sum_{b \neq a} \mathcal{K}_b(1) \right] \chi_a(1) = \epsilon_a \chi_a(1) \quad (2.8)$$

这里交换算符是非定域算符, 因为在空间一点 $\mathbf{x}_1$ 上并不存在一个简单的势能 $\mathcal{J}_b(\mathbf{x}_1)$. 实际上这个算符的作用结果以来于 χ_a 在空间上分布的情况. 因此, 交换算符的作用结果是一个函数, 而不是一个数值. 也无法画出交换势的等高线图, 但库伦势就可以.

对于在 χ_a 上的电子而言, 库伦算符和交换算符 $\mathcal{J}_b, \mathcal{K}_b$ 的期望值就是前一章提过的库伦和交换积分

$$\langle a|\mathcal{J}_b|a\rangle = J_{ab} \quad (2.9)$$

$$\langle a|\mathcal{K}_b|a\rangle = K_{ab} \quad (2.10)$$

2.1.2 the Fock Operators

对于式2.6与2.7, 有如下结论

$$[\mathcal{J}_a(1) - \mathcal{K}_a(1)]\chi_a(1) = 0 \quad (2.11)$$

将这一项加入方程(2.4)中, 有:

$$f(1)\chi_a(1) = \epsilon_a\chi_a(1) \quad (2.12)$$

也即

$$f|\chi_a\rangle = \epsilon_a|\chi_a\rangle \quad (2.13)$$

其中 Fock 算符定义为

$$f(1) = h(1) + \sum_b^N [\mathcal{J}_b(1) - \mathcal{K}_b(1)] \quad (2.14)$$

上式后两项称为有效单电子势算符, 亦称 Hartree-Fock 势

$$\nu^{HF}(1) = \sum_b (\mathcal{J}_b(1) - \mathcal{K}_b(1)) \quad (2.15)$$

与单个电子算符类似, 可以定义 Fock 算符在给定自旋轨道 χ_a 上的期望值. 且本征值 ϵ_a 恰为轨道能量. 并且, HF 算符显然是一组完整正交的轨道. 而电子总能量的表达式:

$$E_0 = \sum_a \langle a|h|a\rangle + \frac{1}{2} \sum_{ab} \langle ab||ab\rangle \quad (2.16)$$

Fock 算符的总和 = Fock 算符的本征值之和 - 双电子积分之和:

$$\sum_a \langle a|f|a\rangle = \sum_a \epsilon_a = \sum_a \langle a|h|a\rangle + \sum_{ab} \langle ab||ab\rangle \quad (2.17)$$

显然, Fock 算符的总和即总 Hamiltonian 在单行列式下的期望值.

为方便, Fock 算符可用 $\mathcal{P}_{12}$ 重新写为

$$f(1) = h(1) + \sum_b \int dx_2 \chi_b^*(2) r_{12}^{-1} (1 - \mathcal{P}_{12}) \chi_b(2) \quad (2.18)$$

2.2 Derivation of the Hartree-Fock Equations

本节来推导 Hartree-Fock 方程的一般自旋轨道形式, 也即, 将单 Slater 行列式的能量极小化以得到式2.13.

2.2.1 Functional Variation