



Theoretical Computer Science Cheat Sheet

Trigonometry	Matrices	More Trig.																								
<div></div> <p>Pythagorean theorem: $C^2 = A^2 + B^2$.</p> <p>Definitions:</p> $\sin a = A/C, \quad \cos a = B/C,$ $\csc a = C/A, \quad \sec a = C/B,$ $\tan a = \frac{\sin a}{\cos a} = \frac{A}{B}, \quad \cot a = \frac{\cos a}{\sin a} = \frac{B}{A}.$ <p>Area, radius of inscribed circle:</p> $\frac{1}{2}AB, \quad \frac{AB}{A+B+C}.$ <p>Identities:</p> $\sin x = \frac{1}{\csc x}, \quad \cos x = \frac{1}{\sec x},$ $\tan x = \frac{1}{\cot x}, \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1,$ $1 + \tan^2 x = \sec^2 x, \quad 1 + \cot^2 x = \csc^2 x,$ $\sin x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right), \quad \sin x = \sin(\pi - x),$ $\cos x = -\cos(\pi - x), \quad \tan x = \cot\left(\frac{\pi}{2} - x\right),$ $\cot x = -\cot(\pi - x), \quad \csc x = \cot \frac{x}{2} - \cot x,$ $\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y,$ $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y,$ $\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y},$ $\cot(x \pm y) = \frac{\cot x \cot y \mp 1}{\cot x \pm \cot y},$ $\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \quad \sin 2x = \frac{2 \tan x}{1 + \tan^2 x},$ $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x, \quad \cos 2x = 2 \cos^2 x - 1,$ $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x, \quad \cos 2x = \frac{1 - \tan^2 x}{1 + \tan^2 x},$ $\tan 2x = \frac{2 \tan x}{1 - \tan^2 x}, \quad \cot 2x = \frac{\cot^2 x - 1}{2 \cot x},$ $\sin(x + y) \sin(x - y) = \sin^2 x - \sin^2 y,$ $\cos(x + y) \cos(x - y) = \cos^2 x - \sin^2 y.$ <p>Euler's equation:</p> $e^{ix} = \cos x + i \sin x, \quad e^{i\pi} = -1.$	<p>Multiplication:</p> $C = A \cdot B, \quad c_{i,j} = \sum_{k=1}^n a_{i,k} b_{k,j}.$ <p>Determinants: $\det A \neq 0$ iff A is non-singular.</p> $\det A \cdot B = \det A \cdot \det B,$ $\det A = \sum_{\pi} \prod_{i=1}^n \text{sign}(\pi) a_{i,\pi(i)}.$ <p>2×2 and 3×3 determinant:</p> $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc,$ $\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = g \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix} - h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$ $= aei + bfg + cdh - ceg - fha - ibd.$ <p>Permanents:</p> $\text{perm } A = \sum_{\pi} \prod_{i=1}^n a_{i,\pi(i)}.$	<div></div> <p>Law of cosines: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$.</p> <p>Area:</p> $A = \frac{1}{2}hc,$ $= \frac{1}{2}ab \sin C,$ $= \frac{c^2 \sin A \sin B}{2 \sin C}.$ <p>Heron's formula:</p> $A = \sqrt{s \cdot s_a \cdot s_b \cdot s_c},$ $s = \frac{1}{2}(a + b + c),$ $s_a = s - a,$ $s_b = s - b,$ $s_c = s - c.$ <p>More identities:</p> $\sin \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{2}},$ $\cos \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{2}},$ $\tan \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}},$ $= \frac{1 - \cos x}{\sin x},$ $= \frac{\sin x}{1 + \cos x},$ $\cot \frac{x}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos x}{1 - \cos x}},$ $= \frac{1 + \cos x}{\sin x},$ $= \frac{\sin x}{1 - \cos x},$ $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i},$ $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2},$ $\tan x = -i \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}},$ $= -i \frac{e^{2ix} - 1}{e^{2ix} + 1},$ $\sin x = \frac{\sinh ix}{i},$ $\cos x = \cosh ix,$ $\tan x = \frac{\tanh ix}{i}.$																								
	<p>Hyperbolic Functions</p> <p>Definitions:</p> $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$ $\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, \quad \text{csch } x = \frac{1}{\sinh x},$ $\text{sech } x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \coth x = \frac{1}{\tanh x}.$ <p>Identities:</p> $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1, \quad \tanh^2 x + \text{sech}^2 x = 1,$ $\coth^2 x - \text{csch}^2 x = 1, \quad \sinh(-x) = -\sinh x,$ $\cosh(-x) = \cosh x, \quad \tanh(-x) = -\tanh x,$ $\sinh(x + y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y,$ $\cosh(x + y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y,$ $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x,$ $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x,$ $\cosh x + \sinh x = e^x, \quad \cosh x - \sinh x = e^{-x},$ $(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx, \quad n \in \mathbb{Z},$ $2 \sinh^2 \frac{x}{2} = \cosh x - 1, \quad 2 \cosh^2 \frac{x}{2} = \cosh x + 1.$																									
	<table><tr><th>θ</th><th>$\sin \theta$</th><th>$\cos \theta$</th><th>$\tan \theta$</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>$\frac{\pi}{6}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{3}$</td></tr><tr><td>$\frac{\pi}{4}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>$\frac{\sqrt{2}}{2}$</td><td>1</td></tr><tr><td>$\frac{\pi}{3}$</td><td>$\frac{\sqrt{3}}{2}$</td><td>$\frac{1}{2}$</td><td>$\sqrt{3}$</td></tr><tr><td>$\frac{\pi}{2}$</td><td>1</td><td>0</td><td>∞</td></tr></table>	θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$	0	0	1	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$	$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞	<p>... in mathematics you don't understand things, you just get used to them.</p> <p>– J. von Neumann</p>
θ	$\sin \theta$	$\cos \theta$	$\tan \theta$																							
0	0	1	0																							
$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$																							
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1																							
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$																							
$\frac{\pi}{2}$	1	0	∞																							
<p>v2.02 ©1994 by Steve Seiden</p> <p>sseiden@acm.org</p> <p>http://www.csc.lsu.edu/~seiden</p>																										