

1 Ableitungsregeln

Im Verlauf unseres kurzen mathematische Vergnügens werden wir des öfteren mit dem Begriff **ableiten** oder auch **Ableitung** konfrontiert.

Nachfolgend werden die verschiedenen Ableitungsregeln kurz erläutert und an einem Beispiel demonstriert.

Für die nachfolgenden Regeln betrachten wir die Funktionen g und h . Diese sind auf einem Intervall I definiert und an der Stelle $x \in I$ differenzierbar.

Konstanten bezeichnen wir im nachfolgenden mit $c \in \mathbb{R}$.

1.1 Potenzregelregel

$f(x) = c \cdot x^n$ mit $c \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{Z}$ ist in x differenzierbar, dann gilt:

$$f'(x) = c \cdot n \cdot x^{n-1}$$

Sonderfall: Steht unser x im Nenner eines Bruchs, so bietet sich folgendes Vorgehen an:

$$f(x) = \frac{1}{x^3} \xrightarrow{\text{umformen}} f(x) = x^{-3-1} \xrightarrow{\text{ableiten}} f'(x) = -3 \cdot \underbrace{x^{-4}}$$

$$\xrightarrow{\text{umformen}} f'(x) = \frac{-3}{x^4}$$

Beispiel:

$$f(x) = x^4$$

$$f'(x) = 4x^3$$

1.2 Summenregel

$f(x) = g(x) + h(x)$ ist in x differenzierbar, dann gilt:

$$f'(x) = g'(x) + h'(x)$$

Als kleine Merkregel führen wir an:

Summen werden gliedweise abgeleitet!
(Jeder Summand für sich!)

Beispiel:

$$f(x) = 3x^2 + 4x$$

$$f'(x) = 6x + 4$$

1.3 Faktorregel

$f(x) = c \cdot g(x)$ mit $c \in \mathbb{R}$ ist in x differenzierbar, dann gilt:

$$f'(x) = c \cdot g'(x)$$

Unsere Merkregel für die Faktorregel:

Ein konstanter Faktor bleibt beim Ableiten erhalten!

Beispiel:

$$f(x) = 4x^3$$

$$f'(x) = 4 \cdot 3 \cdot x^2$$

1.4 Kettenregel

Betrachten wir
 $f(x) = g(x) \circ h(x) = g(h(x))$ und
 sowohl $g(x)$ als auch $h(x)$ sind differenzierbar in x , so bezeichnet man $f(x)$ auch als Verkettung der beiden Funktionen g und h . Dann gilt die folgende Ableitungsregel:

$$f'(x) = g'(h(x)) \cdot h'(x)$$

Im Allgemeinen können wir diese Regel auch formulieren als *äußere Ableitung* mal *innere Ableitung*.

Beispiel:

$$f(x) = \underbrace{(x^2 - 3x)^4}_{g(x)}$$

$$f'(x) = \underbrace{4(x^2 - 3x)^3}_{g'(h(x))} \cdot \underbrace{(2x - 3)}_{h'(x)}$$

1.5 Produktregel

$f(x) = g(x) \cdot h(x)$ ist in x differenzierbar, dann gilt:

$$f'(x) = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x)$$

Prinzipiell können wir uns für diese Ableitung auch schnell merken: $(uv)' = u'v + uv'$

Beispiel:

$$f(x) = \underbrace{x}_{g(x)} \cdot \underbrace{(x^3 + x)}_{h(x)}$$

$$f'(x) = \underbrace{1}_{g'(x)} \cdot \underbrace{(x^3 + x)}_{h(x)} + \underbrace{x}_{g(x)} \cdot \underbrace{(3x^2 + 1)}_{h'(x)}$$

1.6 Quotientenregel

Sind $g(x)$ und $h(x)$ differenzierbar und $h(x) \neq 0$, so ist auch $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ differenzierbar. Die entsprechende Ableitungsregel lautet wie folgt:

$$f'(x) = \frac{g'(x) \cdot h(x) - g(x) \cdot h'(x)}{h^2(x)}$$

Prinzipiell können wir uns für diese Ableitung auch schnell merken: $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

Beispiel:

$$f(x) = \frac{\underbrace{(x^3 + 2x)}_{g(x)}}{\underbrace{x^2}_{h(x)}}$$

$$f'(x) = \frac{\underbrace{(3x^2 + 2)}_{g'(x)} \cdot \underbrace{x^2}_{h(x)} - \underbrace{(x^3 + 2x)}_{g(x)} \cdot \underbrace{2x}_{h'(x)}}{\underbrace{(x^2)^2}_{h^2(x)}}$$