

Fiche résumé électromagnétisme

8. Magnétostatique

Équations locales de la magnétostatique

$$\text{Maxwell-Ampère magnétostatique : } \vec{\text{rot}}(\vec{B}) = \mu_0 \vec{J} \Rightarrow \begin{cases} \vec{B} \text{ pas à circulation conservative} \\ \vec{B} \text{ pseudovecteur} \\ \text{théorème d'Ampère} \end{cases}$$

$$\text{Maxwell-Thomson : } \text{div}(\vec{B}) = 0 \Rightarrow \vec{B} \text{ à flux conservatif}$$

Théorème d'Ampère (magnétostatique)

Soit Γ un contour fermé (contour d'Ampère) et S une surface ouverte admettant Γ pour frontière, les deux étant orientés. En notant $I_{\text{enlacé}}$ le courant total traversant S (compté positivement dans le sens de S) :

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enlacé}}$$

Même méthodologie que le théorème de Gauss, mais attention \vec{B} est un pseudovecteur.

Solénoïde infini

- admettre que \vec{B} rayonné est nul hors du solénoïde (ajouter cette hypothèse si besoin)
- calculer \vec{B} rayonné à l'intérieur par théorème d'Ampère (contour : un rectangle à cheval entre l'intérieur et l'extérieur) $\Rightarrow \vec{B} = \mu_0 n I \vec{u}_z$
- inductance $L = \Phi / I > 0$ avec Φ le flux de \vec{B} à travers toutes les spires (flux propre) $\Rightarrow L = \mu_0 n^2 l \pi R^2$

Densité volumique d'énergie magnétique $w_m = \frac{\vec{B}^2}{2\mu_0}$, d'où l'énergie totale dans le solénoïde :

$$W_m = \iiint_{\text{solénoïde}} w_m dV \Rightarrow W_m = w_m \pi R^2 l \quad \text{car uniforme} \\ = \frac{1}{2} L I^2$$