

### Задание 1

$$\langle \varphi | \varphi \rangle = |c|^2 \int_{\mathbb{R}} dx \exp \left[ -\frac{(x-x_0)^2}{a^2} \right]$$

$$c^2 \int_{\mathbb{R}} \exp \left[ -\frac{(x-x_0)^2}{a^2} \right] dx = |c|^2 \sqrt{\pi} a = 1$$

$$|c| = (\pi a^2)^{-1/4}$$

$$a) \varphi_2(x) = \varphi_1(x+a)$$

$$1. \langle \psi_2 | \hat{x} | \psi_1 \rangle = \int \psi_2^*(x) x \psi_1(x) dx = \boxed{x = L+a} = \int \psi_2^*(L) L \psi_1(L) dL + a \int \psi_2^*(L) \psi_1(L) dL = \langle \psi_2 | \hat{L} | \psi_1 \rangle + a$$

$$\langle X_2 \rangle = \langle X_1 \rangle + a$$

$$2. \langle \psi_1 | \hat{p}_x | \psi_1 \rangle = -i\hbar \int \psi_1^*(x) \frac{\partial}{\partial x} \psi_1(x) dx = \boxed{x = i+a} = -i\hbar \int \psi_1^*(x) \frac{\partial}{\partial x} \psi_1(x) dx = \langle \psi_1 | \hat{p}_x | \psi_1 \rangle$$

$$\langle p_2 \rangle = \langle p_1 \rangle$$

$$d) \quad \psi_2 = \exp\left(\frac{ip_0 x}{\hbar}\right) \psi_1$$

$$1. \quad \langle \varphi_1 | \hat{x} | \varphi_1 \rangle = \int \varphi_1^*(x) x \varphi_1(x) dx = \int \exp(i a)^* \varphi_1^*(x) x \exp(i a) \varphi_1(x) dx = \int \varphi_1^*(x) x \varphi_1(x) dx \Rightarrow \langle x_1 \rangle = \langle x_2 \rangle$$

Заметим:  $\exp(ia) \cdot (\exp(ia))^* = 1$   
 $\quad \quad \quad a \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \text{e. } \langle \psi_1 | \hat{p} | \psi_1 \rangle &= -i\hbar \int \psi_1^*(x) \frac{\partial}{\partial x} \psi_1(x) dx = -i\hbar \int \psi_1^*(x) \exp(iax) \exp(iax) \frac{\partial}{\partial x} \psi_1(x) dx = -i\hbar \int \psi_1^*(x) \frac{\partial}{\partial x} \psi_1(x) dx = -i\hbar \int \psi_1^*(x) \exp^*(iax) \psi_1(x) \frac{\partial}{\partial x} \exp(iax) dx \Rightarrow \langle p_1 \rangle = \langle p_2 \rangle = p_0 \\ &\quad \parallel \qquad \qquad \qquad \parallel \qquad \qquad \qquad \parallel \\ &\quad \langle p_1 \rangle \qquad \qquad \qquad \langle p_2 \rangle \qquad \qquad \qquad + i\hbar a = p_0 \end{aligned}$$

Так же заметим что

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left[\frac{x^2}{2a^2}\right] \times \exp\left[-\frac{x^2}{2a^2}\right] dx = 0 = \langle x \rangle$$

т.к. функция нечетна

$$\int_{\mathbb{R}} \exp\left[\frac{x^2}{2a^2}\right] \frac{\partial}{\partial x} \exp\left[\frac{x^2}{2a^2}\right] dx = 0 = \langle p \rangle$$

чисто мнимое число

чисто мнимое число

$$|c|^2 \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) a^{3/2} = a^{3/2}$$

$$\chi^2_{\text{red}} = 11$$

Из всего этого следует что

$$\langle x \rangle = x_0$$

$$\langle x^2 \rangle = |c|^2 \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}\right] dx = |c|^2 \int_{-\infty}^{\infty} u^2 \exp\left(-\frac{u^2}{a^2}\right) du + 2|c|^2 x_0 \int_{-\infty}^{\infty} u \exp\left(-\frac{u^2}{a^2}\right) du + |c|^2 x_0^2 \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{u^2}{a^2}\right) du$$

$$\langle p \rangle = p_0$$

$$\begin{aligned} \langle p^2 \rangle &= |c|^2 \hbar^2 \int \exp \left[ \frac{i p_0 x}{\hbar} - \frac{(x-x_0)^2}{2a^2} \right] \frac{\partial}{\partial x} \exp \left[ \frac{i p_0 x}{\hbar} - \frac{(x-x_0)^2}{2a^2} \right] dx = \\ &= -|c|^2 \hbar^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \exp \left[ -\frac{i p_0 x}{\hbar} - \frac{x-x_0}{2a^2} \right] \left( \frac{i p_0}{\hbar} - \frac{x-x_0}{2a^2} \right) \exp \left[ \frac{i p_0 x}{\hbar} - \frac{x-x_0}{2a^2} \right] dx = \\ &= p_0^2 - c^2 \hbar^2 \int \frac{i p_0 (x-x_0)}{\hbar^2 a^2} \exp \left[ -\frac{(x-x_0)^2}{2a^2} \right] dx - c^2 \hbar^2 \int \frac{(x-x_0)^2}{4a^4} \exp \left[ -\frac{(x-x_0)^2}{2a^2} \right] dx = p_0^2 - \frac{\hbar^2}{2a^2} \\ &\quad \left( \frac{c^2 \hbar^2}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{a^4} \exp \left[ -\frac{1}{2a^2} u^2 \right] du = \frac{c^2 \hbar^2}{2} \right) \end{aligned}$$

$$I_a = \langle a^2 \rangle - \langle a \rangle^2$$

$$\mathcal{L}_x = \frac{a^2}{2} \quad \langle x \rangle = x_0$$

$$z_p = \frac{\hbar^2}{2a^2} \quad \langle p \rangle = p_0$$

Задача 2

$$[\hat{H}, \hat{p}] = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} H_f - i\hbar \frac{\partial}{\partial x} U(x) + i\hbar H_f \frac{\partial}{\partial x} + i\hbar U(x) \frac{\partial}{\partial x} \quad (1) \quad (2)$$

$H_f$  — гамильтониан свободной частицы  $(1) + (2) = [\hat{p}, \hat{H}_f] = 0$

$$\Leftrightarrow -i\hbar U(x) \frac{\partial}{\partial x} - i\hbar U'(x) + i\hbar U(x) \frac{\partial}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow -i\hbar U'(x) = 0 \Rightarrow U'(x) = 0 \Rightarrow U(x) \text{ — не зависит от } x$$

Задача 3

$$\psi_p = \mathcal{F}[\psi_x]\left(\frac{p}{\hbar}\right) = \frac{C}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left[\frac{ip_0 x}{\hbar}\right] \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2a^2}\right] \exp\left[-\frac{ip_x x}{\hbar}\right] dx =$$

$$= \frac{C}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} \exp\left[ix\left(\frac{p_0 - p_x}{\hbar}\right)\right] \exp\left[-\frac{(x-x_0)^2}{2a^2}\right] dx = \frac{|a|C}{\sqrt{\hbar}} \exp\left[-a^2 \frac{(p_0 - p_x)^2}{2\hbar^2} + \frac{i(p_0 - p_x)x_0}{\hbar}\right]$$

$$\frac{p_0 - p_x}{\hbar} = \xi$$

гауссиан  
переходит в себя

$$\langle a \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle = \langle \psi | \sum_{i=0}^{\infty} c_i a_i | \psi \rangle = \sum_{i=0}^{\infty} c_i a_i \langle \psi | \psi \rangle \quad \left| \begin{array}{l} \langle \psi | = \sum_{j=0}^{\infty} c_j^* \langle \psi_j | \end{array} \right. \Rightarrow \langle a \rangle = \sum_{i=0}^{\infty} c_i^* a_i$$