

Факт. 1.39 из учебника который я использую на самом деле воз никает раньше аксиоматики данной нам на лекциях, но из нее его можно вывести

Утв.  $\langle \varphi | \hat{L}^\dagger \hat{L} | \varphi \rangle$

◀  $\langle \varphi | \hat{L}^\dagger \hat{L} | \varphi \rangle = \int_R \varphi^* \hat{L}^\dagger \varphi dx = \int_R \varphi \hat{L}^* \varphi^* dx = \int_R \varphi (\hat{L} \varphi)^* dx = \langle \xi | \xi \rangle \Rightarrow \langle \varphi | \hat{L}^\dagger \hat{L} | \varphi \rangle = \langle \xi | \xi \rangle = \langle \xi | \xi \rangle = \langle \xi | \xi \rangle$

Если  $|\varphi\rangle = \hat{L}|\psi\rangle = |\xi\rangle \Rightarrow \langle \xi | \xi \rangle = \langle \varphi | \hat{L}^\dagger \hat{L} | \varphi \rangle$

Задание 1

а)  $\hat{L}^\dagger \hat{L} \Rightarrow \hat{L}^\dagger \hat{L}^\dagger = \hat{L}^\dagger \hat{L}$

б)  $\hat{L} + \hat{L}^\dagger \Rightarrow \hat{L}^\dagger + \hat{L}^\dagger = \hat{L}^\dagger + \hat{L} = \hat{L} + \hat{L}^\dagger$

в)  $i\hat{L} - i\hat{L}^\dagger = \boxed{\hat{\beta}^\dagger = \hat{\beta}, \hat{J}^\dagger = -\hat{J}, \hat{L} = \hat{\beta} + \hat{J}} = -i\hat{J} + i\hat{\beta} - i(\hat{\beta} + \hat{J})^\dagger = -i\hat{J} + i\hat{\beta} - i\hat{\beta}^\dagger - i\hat{J}^\dagger = -i\hat{J} - i\hat{\beta} + i\hat{\beta} + i\hat{J} = 0$

г)  $\{\hat{A}, \hat{B}\}$    
 кароче представил в виде эрмитова и антиэрмитова

$\{\hat{A}, \hat{B}\} = \hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A} \xrightarrow{+} \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = \hat{B}\hat{A} + \hat{A}\hat{B}$    
 т.к. эрмитов   
  $[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \xrightarrow{+} -\hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger + \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

д)  $[\hat{A}, \hat{B}]$    
 A, B - эрм.

◀  $\hat{A} \hat{B} | \varphi \rangle = \hat{A} (\hat{B} | \varphi \rangle) \xrightarrow{D.C.} \langle \varphi | \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger | \varphi \rangle = \langle \varphi | (\hat{A} \hat{B})^\dagger | \varphi \rangle \Rightarrow \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger = (\hat{A} \hat{B})^\dagger$

J.J. Sakurai  
"Modern Quantum Mechanics"  
1.39

◀ Докажем что  $\exists \hat{\beta}, \hat{J}, \forall \hat{L} : \hat{\beta}^\dagger = \hat{\beta}, \hat{J}^\dagger = -\hat{J}, \hat{L} = \hat{\beta} + \hat{J}$

Пример  $\hat{\beta} = \frac{1}{2}(\hat{L} + \hat{L}^\dagger) \quad \hat{J} = \frac{1}{2}(\hat{L} - \hat{L}^\dagger)$  ■

Задание 2

$\langle \varphi | \hat{L}^\dagger \hat{L} | \varphi \rangle =$    
 J.J. Sakurai  
"Modern Quantum Mechanics"  
1.39  $\langle \varphi | \hat{L}^\dagger \hat{L} | \varphi \rangle$   
 $|\xi\rangle = \hat{L}|\varphi\rangle$

$= (\langle \varphi | \hat{L}^\dagger) (\hat{L} | \varphi \rangle) = \langle \xi | \xi \rangle \in \mathbb{R}^+$  ■

з  
действительное  
оно также потому,  
что  $\hat{L}^\dagger \hat{L}$  - эрмитов  
что мы доказали в 1.а

Задание 3

$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}$

$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}$

$[\hat{A}, \hat{C}] = \hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}$

$\Rightarrow [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{A}\hat{C}$    
  $\hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] = \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}$    
  $[\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} - \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} = [\hat{A}, \hat{B}\hat{C}]$

# Задание 4

$$\hat{p}_i = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x_i} \quad \hat{r}_i = x_i \quad \partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial x_i}$$

$$a) [\hat{p}_i, \hat{p}_j] = (-i\hbar)^2 \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} - (-i\hbar)^2 \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} = -\hbar^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} \right) =$$

$$\begin{cases} 0 & \text{Если } \exists \partial_i \psi, \partial_j \psi \\ & \text{и } \partial_i \psi, \partial_j \psi - \text{непрерывны} \\ & \text{(Теорема Шварца)} \\ 0 & i=j \\ -\hbar^2 \left( \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} - \frac{\partial^2}{\partial x_j \partial x_i} \right) & \text{в остальных случаях} \end{cases}$$

$$b) [\hat{p}_i, \hat{x}_j] = -i\hbar x_j \partial_i - i\hbar \partial_i x_j + i\hbar x_j \partial_i = -i\hbar \delta_{ij}$$

$$b) [\hat{r}_i, \hat{r}_j] = x_i x_j - x_j x_i = 0$$

$$z) [\hat{p}_x, f(x)] = -i\hbar f'(x) - i\hbar f(x) \partial_x + i\hbar f(x) \partial_x = -i\hbar f'(x)$$

$$g) [\hat{p}_x^2, f(x)] = \hbar^2 f(x) \partial_x^2 - \hbar^2 f(x) \partial_x^2 - 2\hbar^2 f'(x) \partial_x - \hbar^2 f''(x) = -\hbar^2 (2f'(x) \partial_x + f''(x))$$

$$\partial_x^2 f(x) = \partial_x f'(x) + \partial_x f \partial_x = f'' + f' \partial_x + f' \partial_x + f'' \partial_x^2$$