

Лекция 1. Индексы

Необходимые знания: множество, отображение, декартово произведение множеств, числовая функция, определённый интеграл, последовательность, матрица и умножение матриц.

О чем лекция: индексные и многоиндексные функции как функции на конечном множестве; способы их задания, равенство и операции над ними. Суммы, свободные индексы и индексы суммирования, перестановочность сумм. Матричное умножение на языке индексов. Символы Кронекера и Леви-Чивиты.

Сегодня — вводная лекция. К линейной алгебре и тем более к тензорам она пока не относится: речь пойдёт о функциях и об индексах. Зачем это нужно? Тензоры данного типа образуют линейное пространство, в нём можно выбрать базис, и в базисе у тензора появляются компоненты — то, что часто называют «набором чисел». Компоненты записываются выражениями вроде

$$a_i, \quad b_{ij}, \quad \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad \delta_{ij}, \quad \varepsilon_{ijk},$$

и с ними приходится проделывать всевозможные суммирования (свёртки). Ничего сложного в этом нет. Однако такой материал принято считать очевидным, поэтому подробно его нигде не объясняют, а без твёрдого понимания того, что здесь можно писать и чего нельзя, в дальнейшем в голове возникает каша. Поэтому индексам отведена отдельная лекция.

Главная мысль лекции: всё, что мы знаем о привычных функциях на $\mathbb{R}$, более или менее дословно переносится на функции, заданные на конечном множестве, и там всё только проще. Непривычно лишь то, что место интегралов занимают суммы. Поэтому на каждом шаге мы будем сопоставлять новое с тем, что уже известно о функциях на $\mathbb{R}$.

1 Функции и отображения

Понятие функции знакомо со школы; в университете его обобщают до понятия отображения. Пусть X и Y — два множества. **Отображением** $f: X \rightarrow Y$ называется правило, которое каждому элементу $x \in X$ сопоставляет единственный элемент $f(x) \in Y$. Единственность существенна: элемент X не может переходить сразу в два разных элемента Y . При этом не требуется, чтобы каждый элемент Y был образом какого-нибудь x , и разные элементы X могут переходить в один и тот же элемент Y (рис. 1).




Рис. 1. Отображение $f: X \rightarrow Y$: из каждой точки X выходит ровно одна стрелка. Две стрелки могут прийти в одну точку Y , а некоторые точки Y могут остаться без стрелок.

Функции, операторы, функционалы — всё это отображения; разные названия отражают лишь то, между какими множествами отображение действует. **Числовой функцией**, или просто функцией, называют отображение из множества чисел в множество чисел, например $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Запись

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2$$

означает, что каждому действительному числу сопоставлен его квадрат. Следует чётко понимать: имя функции — f . Буква x — лишь обозначение аргумента, к самой функции она никакого отношения не имеет. Записи

$$f(x) = x^2 \quad \text{и} \quad f(y) = y^2$$

описывают одну и ту же функцию f : закон «возвести в квадрат то, что подано на вход» не зависит от того, как назвать вход. А вот запись $f(x) = y^2$ — бессмыслица. По той же причине пишут $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, указывая имя функции, но никогда не $f(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

Это действительно важно, хотя бы потому, что физика приучает к противоположному. В физике одну и ту же величину часто обозначают одной буквой, даже когда с математической точки зрения речь идёт о разных функциях: давление $p(T, V)$ как функцию температуры и объёма и давление $p(T, S)$ как функцию температуры и энтропии. Физически это одно и то же давление, математически — две разные функции, и обозначаться они должны разными буквами. Этим удобством мы злоупотреблять не будем.

Функцию можно задать формулой, графиком или таблицей значений. Таблица годится, только если аргумент принимает конечное число значений: бесконечную таблицу не выписать. Зато в этом случае она оказывается лучшим способом. Именно такими функциями мы и займёмся.

2 Индексные функции

Функции на всём множестве действительных чисел, с которыми мы привыкли работать со школы, на самом деле устроены сложнее, чем то, чем мы будем заниматься сегодня. Зафиксируем натуральное $n \in \mathbb{N}$ и рассмотрим множество первых n натуральных чисел

$$I = \{1, 2, 3, \dots, n\}.$$

Индексной функцией называется любое отображение $a: I \rightarrow \mathbb{R}$. Подчёркнём: значения такой функции — обычные действительные числа, дискретна лишь её область определения. На жаргоне такие функции называют просто индексами. По чисто визуальным причинам для них принята особая запись: вместо $a(i)$ пишут a_i . По определению

$$a_i \equiv a(i), \quad i \in I.$$

Здесь a — имя функции, i — имя её аргумента, а a_i — значение функции a на элементе i . Всё сказанное выше об именах функций и аргументов остаётся в силе.

Как задать индексную функцию? Можно построить её график, но он вырождается в n отдельных точек (рис. 2) и ничего не добавит. Можно задать её формулой, например $a_i = i^2$, но так везёт редко. Даже для функции на $\mathbb{R}$ подобрать формулу непросто: попробуйте найти формулу для кривой, нарисованной от руки, или для кривой с изломом, полученной в эксперименте. Самый естественный способ — просто перечислить значения функции во всех n точках, т. е. составить таблицу.




Рис. 2. Слева — график функции $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$: непрерывная кривая. Справа — график индексной функции $a: I \rightarrow \mathbb{R}$, $a_i = i^2$, при $n = 4$: всего четыре точки.

Пусть, например, $I = \{1, 2, 3, 4\}$ и $a_i = i + 1$. Таблица

i	a_i
1	2
2	3
3	4
4	5

задаёт эту функцию полностью. Обратите внимание, как мало здесь информации: чтобы полностью задать функцию $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, пришлось бы основательно потрудиться.

Близкий и хорошо знакомый объект — последовательность. В математическом анализе последовательность (a_i) по определению есть отображение $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ с той же записью $a_i \equiv a(i)$. Это та же индексная функция, только определённая на бесконечном множестве. Здесь тоже полезно помнить, что последовательность — это функция a , а i лишь пробегает значения $1, 2, 3, \dots$. Если одну и ту же последовательность в одном месте записали как a_i , а в другом как a_j , то ничего не изменилось.

Замечание. Вообще, полезно переформулировать знакомые понятия на строгом языке множеств и отображений. Что такое, например, уравнение, скажем $2 + x = 3$? Решение уравнения ищется среди элементов некоторого множества: для алгебраического уравнения — среди чисел, для дифференциального — среди функций. Уравнение можно понимать как отображение этого множества в множество из двух элементов {да, нет}: подставляем число — равенство выполняется или не выполняется. Множество, на котором ищется решение, — часть постановки задачи: уравнение $2 - x = 3$ не имеет решений среди натуральных чисел, но имеет решение среди целых. Сама по себе такая переформулировка ничего не даёт, но строгий язык помогает навести порядок в голове.

3 Равенство и операции

Как уже было сказано, в записи a_i буква a — имя функции, а i — имя аргумента. Нужно чётко понимать, что именно приравнивается: сами функции или их значения. Рассмотрим пример. Пусть $I = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ и

$$a_i = i, \quad b_j = j.$$

Записать вторую функцию как $b_j = j$ или как $b_i = i$ — всё равно: это одна и та же функция b , так же как $f(x) = x^2$ и $f(y) = y^2$ — одна функция.

Можно ли написать $a = b$? Да. Это равенство функций: a и b — одна и та же функция, которая возвращает поданный на вход аргумент без изменений (её непрерывный аналог — $f(x) = x$). Мы лишь назвали её двумя разными именами.

Можно ли написать $a_i = b_i$? Здесь приравниваются уже не функции, а их значения при каком-то конкретном i . В такой записи молчаливо подразумевается, что i — любой из допустимого диапазона. Аккуратно это нужно указать явно:

$$a_i = b_i, \quad i \in I.$$

Указание множества существенно, потому что значения функций могут совпадать не везде. Для $f(x) = x$ и $g(x) = |x|$ можно написать $f(x) = g(x)$ при $x \geq 0$, но не при всех x . Точно так же для индексных функций равенство значений может выполняться при одних i и не выполняться при других.

А вот запись $a_i = b_j$ — бессмыслица: слева значение функции a при одном аргументе, справа значение функции b при другом, и никакой связи между ними не указано. Это бессмыслица того же рода, что и $f(x) = y^2$.

Второй пример. Пусть $a_i = i$ и $b_i = i + 1$, $i \in I$. Какие из записей

$$b = a + 1 \quad \text{и} \quad b_i = a_i + 1, \quad i \in I,$$

корректны? Обратимся к аналогии с функциями на $\mathbb{R}$. Для $f(x) = x$ и $g(x) = x + 1$ мы без колебаний пишем $g(x) = f(x) + 1$. Ровно так же корректна вторая запись — с указанием, какому множеству принадлежит i . Первая запись тоже правильна, но только если понимать 1 не как число, а как функцию: складывать функцию с числом нельзя, это объекты разной природы. Понимающий читатель подразумевает здесь функцию $1: I \rightarrow \mathbb{R}$, которая всюду равна единице:

$$1_i \equiv 1(i) = 1 \in \mathbb{R}, \quad i \in I.$$

Слева в этой записи 1 — имя функции, справа — число.

Арифметические операции над индексными функциями определяются так же, как над обычными функциями. Если $a, b: I \rightarrow \mathbb{R}$, то

$$c_i = a_i b_i, \quad i \in I,$$

задаёт новую функцию $c: I \rightarrow \mathbb{R}$ — в полной аналогии с $h(x) = f(x)g(x)$. Точно так же функции можно складывать, вычитать, делить (там, где знаменатель не обращается в нуль), возводить одну в степень другой. Композиция, т. е. подстановка одной функции в другую, как в $g(f(x))$, для индексных функций почти не встречается: записывать её в индексных обозначениях неуклюже, но она нам и не понадобится. Индексные функции нужны нам для записи компонент тензоров в базисе, а все операции там линейные, так что ничего сложнее произведений и сумм не возникнет.

4 Многоиндексные функции

Для функций на $\mathbb{R}$ наряду с $h(x) = f(x)g(x)$ возможна и конструкция

$$h(x, y) = f(x)g(y).$$

Получается функция двух переменных $h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Здесь $\mathbb{R}^2 \equiv \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — декартово произведение, т. е. множество всех упорядоченных пар (x, y) действительных чисел. Слово «упорядоченных» означает, что важно, какой элемент пары стоит на каком месте: $(0, 1)$ и $(1, 0)$ — разные пары, и значение $h(0, 1)$ вовсе не обязано совпадать с $h(1, 0)$. Множество $\mathbb{R}$ мы привыкли изображать прямой, $\mathbb{R}^2$ — плоскостью, $\mathbb{R}^3$ — пространством. На плоскости точки (x, y) и (y, x) различны: они симметричны относительно биссектрисы. Часто под $\mathbb{R}^2$ понимают ещё и

плоскость с расстояниями и углами, но нам никакая дополнительная структура не нужна: $\mathbb{R}^2$ — просто множество упорядоченных пар.

То же самое можно проделать с индексными функциями. Если $a, b: I \rightarrow \mathbb{R}$, то

$$c_{ij} = a_i b_j$$

задаёт функцию $c: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$, где $I^2 \equiv I \times I$ — множество упорядоченных пар (i, j) с $i, j \in I$. В отличие от $\mathbb{R}^2$, в I^2 всего n^2 элементов (рис. 3). Ничто не мешает рассматривать функции и большего числа аргументов:

$$T: I^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad \dots, \quad d: I^{10} \rightarrow \mathbb{R},$$

где $I^k \equiv I \times I \times \dots \times I$ (k раз) — множество упорядоченных наборов из k элементов I . Такие функции мы будем называть **многоиндексными**. Их значения записывают, как и в случае одного индекса, индексами снизу:

$$c_{ij} \equiv c(i, j), \quad T_{ijk} \equiv T(i, j, k).$$

Всё сказанное об именах функций и аргументов сохраняется без изменений.




Рис. 3. Множество I^2 при $n = 4$ — шестнадцать упорядоченных пар (i, j) , расположенных так же, как клетки таблицы: i — номер строки, j — номер столбца. Пары $(1, 2)$ и $(2, 1)$ — разные элементы, симметричные относительно диагонали $i = j$. Функция $c: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$ сопоставляет число каждой из шестнадцати точек.

Предупреждение. Многоиндексные функции — это ещё не тензоры. Если вы уже встречали тензоры, то, скорее всего, в виде выражений вроде a_{ij} . Но a_{ij} — это компоненты тензора, а не сам тензор. Тензор — объект, который существует сам по себе, а в разных базисах у него разные компоненты, примерно как у вектора. Об этом речь пойдёт отдельно.

4.1 Таблицы значений

Многоиндексная функция, как и функция одного индекса, задаётся таблицей значений или формулой. Возьмём $I = \{1, 2, 3\}$ и функцию $T: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$, заданную формулой

$$T_{ij} = i^2 + 2ij.$$

Это функция, просто заданная не таблицей, а формулой (взятой с потолка: возможность задать функцию формулой — скорее редкая удача). Чтобы составить таблицу, нужно вычислить значения при всех аргументах; например, $T_{11} = 1^2 + 2 \cdot 1 \cdot 1 = 3$ и $T_{23} = 2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 3 = 16$.

Таблицу можно составить двумя способами:

i	j	T_{ij}			$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
1	1	3					
1	2	5					
1	3	7					
2	1	8					
2	2	12	$\longleftrightarrow$	$i = 1$	3	5	7
2	3	16		$i = 2$	8	12	16
3	1	15		$i = 3$	15	21	27
3	2	21					
3	3	27					

В обеих таблицах девять значений, и информации в них одинаково. Квадратная таблица (справа) привычна и удобна, когда индексов два, — так записывают матрицы. Таблица-список (слева) удобна другим: в каждой её строке стоит один элемент множества I^2 , т. е. пара (i, j) , и значение функции на нём. Она прямо показывает, как устроена многоиндексная функция — как отображение, — и одинаково годится для любого числа индексов: для функции на I^3 получится просто более длинный список. Именно так и полезно представлять себе многоиндексные функции.

Распространённое объяснение «вектор — это столбец, матрица — таблица, а тензор — трёхмерная или четырёхмерная таблица» никуда не годится. Трёхмерную таблицу построить можно, но представить её себе трудно, и понимания она не даёт. Понимание даёт взгляд на многоиндексную функцию как на отображение, который и выражает таблица-список.

4.2 Перенумерация пар

Можно ли написать $c_{ij} = d_k$? Выглядит как бессмыслица, но правильный ответ — можно, если правильно понимать, чему принадлежит k . Пара (i, j) принадлежит I^2 , а в I^2 ровно n^2 элементов, так что множества I для их нумерации не хватит. Нужно новое множество $\{1, 2, 3, \dots, n^2\}$. Все пары можно занумеровать одним индексом k из этого множества по какому-нибудь правилу (каким именно, не важно), и тогда

$$c_{ij} = d_k, \quad (i, j) \in I^2, \quad k \in \{1, 2, \dots, n^2\}.$$

Например, номер строки в таблице-списке выше — это и есть такой индекс k . С компонентами тензоров происходит ровно это, только в обратную сторону. У тензора может быть, скажем, n^2 компонент, и их вполне можно было бы занумеровать одним индексом: математика этого не запрещает. Но естественным образом оказывается удобнее нумеровать их двумя индексами, и так и делают. Сколько индексов использовать, решают из соображений удобства; смысл это имеет редко, но в принципе так делать можно.

Отдалённая аналогия есть и у функций на $\mathbb{R}$, и снова из физики. Распределение температуры записывают и как $T(x, y)$, и как $T(\vec{r})$, хотя первая функция принимает на вход два числа, а вторая — вектор, т. е. элемент векторного пространства, который вовсе не обязательно задан парой чисел. Это разные отображения разных множеств, и одной буквой их называют лишь потому, что значение в одной и той же точке одно и то же: это одна физическая величина. С точки зрения математики такая запись некорректна, но в физике так пишут постоянно. Ситуация похожа на перенумерацию пар, хотя и не совпадает с ней.

4.3 Симметрия

Функция двух переменных может обладать свойством $f(x, y) = f(y, x)$ — симметрией относительно перестановки аргументов. Точно так же функция $a: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$ называется **симметрич-**

ной, если

$$a_{ij} = a_{ji}, \quad i, j \in I.$$

На рис. 3 это означает, что в точках, симметричных относительно диагонали, функция принимает одинаковые значения. Если записать a квадратной таблицей, т. е. матрицей A , получится симметричная матрица: $A = A^T$.

5 Суммы

Для функций на $\mathbb{R}$ есть операция интегрирования. Интеграл

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) dx = \alpha \in \mathbb{R}$$

— это число. Зачем его вычислять, решает конкретная, например физическая, задача; нас сейчас интересует сама операция. Для индексных функций ту же роль играет сумма. Пусть $a: I \rightarrow \mathbb{R}$. По определению

$$\sum_{i=1}^n a_i \equiv a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \alpha \in \mathbb{R}.$$

Промежуточные значения индекса не пишут: подразумеваются все натуральные числа подряд от нижнего предела до верхнего. Нижний предел указывают потому, что суммы не всегда начинаются с единицы; ряд Тейлора, например, обычно записывают начиная с нуля. Сумма по всем $i \in I$ — аналог интеграла по всей прямой. Но суммировать можно и по части множества: по отрезку значений, только по чётным i , по $i \neq j$ и т. д., — смотря что нужно в задаче. Различия между определённым и неопределённым интегралом здесь нет: сумма всегда берётся по какому-то множеству значений индекса, т. е. всегда «определённая».

Рассмотрим теперь функцию двух индексов $a: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и выражение

$$\sum_{i=1}^n a_{ij}.$$

Что это за объект — не чему он равен, а хотя бы какого он рода? Зафиксируем j . При $j = 1$ получаем число $a_{11} + a_{21} + \cdots + a_{n1}$, при $j = 2$ — другое число, и т. д. Каждому $j \in I$ сопоставлено число, т. е. по своей структуре это отображение $I \rightarrow \mathbb{R}$ — новая функция индекса j :

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = b_j.$$

Это полная аналогия с интегралом по одной из переменных:

$$\int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx = g(y).$$

При каждом фиксированном y получается своё число, т. е. функция $g(y)$. Если интегрировать не по всей прямой, а по отрезку, получится другая функция, но объект той же структуры — функция от y .

Отсюда общий принцип. От индекса, по которому ведётся суммирование, результат уже не зависит — точно так же, как интеграл не зависит от переменной интегрирования. Такой индекс называют **индексом суммирования** (или немым); остальные индексы, от которых результат зависит и которые в нём «выживают», называют **свободными**. Индекс суммирования можно переименовать как угодно, ничего не изменится:

$$\sum_{i=1}^n a_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{kj} = b_j.$$

С интегралами это знакомо по физическим задачам. Когда верхний предел интеграла обозначен той же буквой, что и переменная интегрирования, приходится ставить штрихи:

$$\int_{\tau}^t \frac{dt'}{t'}.$$

Результат зависит от верхнего предела t , но не может зависеть от переменной интегрирования, поэтому запись с одной и той же буквой t и в пределе, и под интегралом была бы бессмыслицей. Пределу интегрирования соответствует диапазон суммирования; у нас он почти всегда — всё множество I , хотя и не обязательно.

5.1 Повторяющиеся индексы

Строить новые функции из нескольких данных можно вполне произвольно. Если $a: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$ и $b: I \rightarrow \mathbb{R}$, то

$$c_{ijk} = a_{ij}b_k$$

— функция $c: I^3 \rightarrow \mathbb{R}$, аналог $h(x, y, z) = f(x, y)g(z)$. Из функции трёх аргументов h можно построить функцию одного аргумента, подставив во все три места одно и то же: $p(x) = h(x, x, x)$. Ровно так же

$$d_i = c_{iii}$$

— функция $d: I \rightarrow \mathbb{R}$. Чтобы узнать её значение, например, при $i = 2$, нужно взять значение c на наборе $(2, 2, 2)$. Поэтому сумма

$$\sum_{i=1}^n c_{iii} = \sum_{i=1}^n d_i = \alpha \in \mathbb{R}$$

вполне осмысленна, хотя индекс суммирования встречается в ней трижды, и её значение — число.

Предупреждение. Позже, в тензорной алгебре, появится правило суммирования Эйнштейна, согласно которому один индекс не может встречаться в выражении больше двух раз. У этого правила будут свои причины, лежащие в природе тензорных операций. К индексным функциям самим по себе оно не относится: мы говорим об абстрактных функциях, и здесь таких ограничений нет. По той же причине все индексы пока пишутся снизу. Что такое верхние и нижние индексы и зачем их различать, будет объяснено позже, а сейчас такое различие было бы бессмысленным.

6 Перестановочность сумм

Главный результат этой части, который понадобится очень скоро: суммы по разным индексам можно переставлять. Пусть $a, b: I \rightarrow \mathbb{R}$. Утверждается, что

$$\sum_{j=1}^n \left[\sum_{i=1}^n a_i b_j \right] = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^n a_i b_j \right] = \left[\sum_{i=1}^n a_i \right] \cdot \left[\sum_{j=1}^n b_j \right].$$

Квадратные скобки показывают порядок действий; обычно их не пишут, как будто всё и так очевидно. Смысл левой части такой. Обозначим $c_{ij} \equiv a_i b_j$ — это функция на I^2 . Сначала вычисляем сумму по i и получаем функцию $d_j = \sum_{i=1}^n c_{ij}$, затем суммируем её по j и получаем число.

Доказательство. Запишем функцию c_{ij} квадратной таблицей $n \times n$ (рис. 4). Каждая из повторных сумм — это сумма всех n^2 клеток таблицы. В левой части мы сначала складываем каждый столбец (сумма по i), получаем строку и складываем её элементы; в средней — сначала

Почему матричное умножение устроено именно так, как его определяют, сейчас понять нельзя: это выяснится в линейной алгебре, где такие конструкции возникают в линейных пространствах сами собой. Пока примем на веру, что полезны суммы вида

$$c_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} b_j.$$

Функции не более чем двух аргументов удобно записывать на бумаге таблицами, а такие суммы — вычислять по правилу умножения матриц: оно ровно для этого и придумано. Пусть $n = 3$, функция a_{ij} задана квадратной таблицей, а b_j — столбцом:

	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$		b_j
$i = 1$	1	2	3	$j = 1$	3
$i = 2$	4	5	6	$j = 2$	4
$i = 3$	7	8	9	$j = 3$	5

Тогда функция c_i — это в точности произведение матрицы на столбец:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 26 \\ 62 \\ 98 \end{pmatrix}.$$

Например,

$$c_1 = a_{11}b_1 + a_{12}b_2 + a_{13}b_3 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 = 26,$$

и так для каждого i . Индекс суммирования j пробегает одновременно строку матрицы и столбец (рис. 5).




Рис. 5. Вычисление c_1 . Строка $i = 1$ таблицы a_{ij} и столбец b_j пробегаются одним и тем же индексом j . Если положить столбец под строку, элементы с одинаковым j окажутся друг под другом: их перемножают и произведения складывают.

В учебниках определение произведения матриц $C = AB$ записывают так:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Без объяснений оно выглядит сухо и непонятно. Теперь ясно, во-первых, что это за конструкция: сумма произведений двух функций двух индексов по общему индексу k , а правило «строка на столбец» — лишь удобный способ вычислять такие суммы вручную. Во-вторых, такие суммы действительно применимы и полезны, как мы увидим в линейной алгебре.

7.2 Символ Кронекера

Позже появится тензор, который тоже будет связан с именем Кронекера, но это другое дело; сегодня речь идёт о символе. Пусть $I = \{1, 2, \dots, n\}$. **Символом Кронекера** называется функция $\delta: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

У символа Кронекера всегда два индекса, при любом n ; у символа Леви-Чивиты, как мы увидим, индексов n . Записанный квадратной таблицей, символ δ — это единичная матрица: единицы на главной диагонали (на рис. 3 — на диагонали $i = j$) и нули на остальных местах. Известно, что умножение на единичную матрицу ничего не меняет:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}.$$

На языке индексов это свойство выглядит так: для любой функции $a: I \rightarrow \mathbb{R}$

$$\sum_{i=1}^n \delta_{ij} a_i = a_j.$$

Ответ, вероятно, знаком, но получим его так, как будто мы его не знаем. Сначала — что за объект в левой части? Индекс i — индекс суммирования, свободным остаётся j , значит, результат — функция индекса j . Вычислим её значения. При $j = 1$

$$\sum_{i=1}^n \delta_{i1} a_i = \delta_{11} a_1 + \delta_{21} a_2 + \dots + \delta_{n1} a_n = a_1,$$

поскольку $\delta_{11} = 1$, а все остальные слагаемые равны нулю. При $j = 2$

$$\sum_{i=1}^n \delta_{i2} a_i = \delta_{12} a_1 + \delta_{22} a_2 + \delta_{32} a_3 + \dots + \delta_{n2} a_n = a_2,$$

и вообще при каждом j из всех слагаемых выживает только одно — то, в котором $i = j$. Никакой магии здесь нет, всё проверяется руками.

Добавим функции ещё один индекс. Для $a: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\sum_{j=1}^n \delta_{ij} a_{jk} = a_{ik}.$$

Рассуждение то же: при фиксированных i и k выживает одно слагаемое, в котором $j = i$. Индекс суммирования, как всегда, можно было назвать как угодно. Важно лишь, какие индексы остаются свободными: здесь это i и k , и результат — функция $I^2 \rightarrow \mathbb{R}$.

А чему равна сумма

$$\sum_{i=1}^n \delta_{ij} a_{jk}?$$

Отличие от предыдущего случая в том, что у a теперь нет индекса, по которому идёт суммирование. Свободные индексы — j и k . Возьмём, например, $j = 1$ и любое k :

$$\sum_{i=1}^n \delta_{i1} a_{1k} = \delta_{11} a_{1k} + \delta_{21} a_{1k} + \dots + \delta_{n1} a_{1k} = a_{1k},$$

и снова выживает одно слагаемое. Ответ: a_{jk} .

Правило обобщается на функции с любым числом индексов. Пусть f — функция нескольких индексов, один из которых — i . Тогда

$$\sum_{i=1}^n \delta_{ij} f_{ijk\dots} = f_{jjk\dots}$$

Неформально: суммирование с δ_{ij} заменяет индекс i на j везде, где он стоит, и никак не затрагивает остальные индексы — даже если среди них уже есть j . Под f может скрываться сколь угодно сложное выражение, например $f_{ijk\ell} = a_i b_j c_{k\ell}$: его можно обозначить одной буквой, и правило применяется так же. Поняв правило один раз, им можно пользоваться как готовым фактом. Заметим, что сумму вроде $\sum_i \delta_{ij} f_{ijk\ell}$ уже не запишешь как умножение матриц.

7.3 Символ Леви-Чивиты

Есть тензор Леви-Чивиты и есть символ Леви-Чивиты. Это совершенно разные объекты, хотя и связанные между собой. О тензоре речь пойдёт значительно позже; сегодня — только о символе, т. е. просто о функции на I^3 .

Зафиксируем $n = 3$, т. е. $I = \{1, 2, 3\}$. **Символом Леви-Чивиты** называется функция $\varepsilon: I^3 \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & \text{если } (i, j, k) \text{ — чётная перестановка } (1, 2, 3), \\ -1, & \text{если } (i, j, k) \text{ — нечётная перестановка } (1, 2, 3), \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Его называют также полностью антисимметричным символом. Для общего n символ Леви-Чивиты определяется на I^n , т. е. имеет n индексов. В физике чаще всего встречаются $n = 3$ и $n = 4$, потому что интересующие нас линейные пространства обычно трёх- или четырёхмерны.

Перестановок тройки $(1, 2, 3)$ всего $3! = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. Из них три чётные и три нечётные:

$$\underbrace{(1, 2, 3), (2, 3, 1), (3, 1, 2)}_{\text{чётные}}, \quad \underbrace{(1, 3, 2), (3, 2, 1), (2, 1, 3)}_{\text{нечётные}}.$$

Чётные перестановки получаются из $(1, 2, 3)$ чётным числом транспозиций, т. е. обменов двух элементов местами, а нечётные — только нечётным. Например, как ни меняй местами пары элементов, получить $(1, 3, 2)$ чётным числом обменов нельзя: нужен один обмен, или три, и т. д. Это как в «пятнашках»: если в последнем ряду оказалось 13, 15, 14 вместо 13, 14, 15, то никакими ходами этого не исправить. Чётные перестановки тройки — это в точности её циклические сдвиги $(1, 2, 3) \rightarrow (3, 1, 2) \rightarrow (2, 3, 1)$ (рис. 6). Когда чисел всего три, всё это проверяется перебором; различие между чётными и нечётными перестановками становится по-настоящему важным, когда элементов много, скажем пятьдесят. С ним связан, в частности, определитель, о котором мы поговорим, когда будем обсуждать замену базиса и матрицы.




Рис. 6. Числа 1, 2, 3 на окружности. Читая их по красным стрелкам с любого места, получаем чётные перестановки, на которых $\varepsilon = +1$; против часовой стрелки (синие стрелки) — нечётные, на которых $\varepsilon = -1$.

Замечание редактора. Слово «антисимметричный» означает, что функция меняет знак при перестановке двух аргументов: функция $a: I^2 \rightarrow \mathbb{R}$ антисимметрична, если $a_{ij} = -a_{ji}$. Символ ε меняет знак при перестановке любых двух своих индексов, например $\varepsilon_{jik} = -\varepsilon_{ijk}$, — отсюда «полностью».

Как и любую функцию трёх индексов, ε естественно задать таблицей-списком. В ней $3 \cdot 3 \cdot 3 = 27$ строк — по одной на каждый элемент I^3 :

i	j	k	ε_{ijk}
1	1	1	0
1	1	2	0
1	1	3	0
1	2	1	0
1	2	2	0
1	2	3	1
1	3	1	0
1	3	2	-1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
3	3	3	0

Отличны от нуля лишь шесть значений — на перестановках тройки (1, 2, 3): три равны 1 и три равны -1. Остальные 21 значение — нули: если среди i, j, k есть повторяющиеся, то (i, j, k) — не перестановка. Таблица получается длинной и не слишком наглядной (для матриц удобнее квадратные таблицы), зато она явно показывает структуру объекта: ε — отображение $I^3 \rightarrow \mathbb{R}$, каждая строка — элемент I^3 и значение на нём. Выписать её целиком — полезное упражнение. Можно построить и трёхмерную таблицу $3 \times 3 \times 3$, но, как уже говорилось, понимания она не даёт.

7.4 Свёртка двух символов Леви-Чивиты

Рассмотрим выражение

$$\sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{k\ell m}.$$

Такие суммы постоянно встречаются в физике: через них вычисляются двойное векторное произведение, ротор векторного произведения и т. п. Обычно их вычисляют «хитрыми» способами, и тому, кто ни разу не проделал вычисление руками, бывает непонятно, что происходит. Между тем никакой магии здесь нет: посчитать это может любой.

Первый вопрос — что за объект получится? Индекс k — индекс суммирования, свободных индексов четыре: i, j, ℓ, m . Значит, результат — функция четырёх индексов:

$$\sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = a_{ij\ell m}, \quad a: I^4 \rightarrow \mathbb{R}.$$

Её можно представить себе как таблицу из $3^4 = 81$ значения. Таблица большая, но многие значения в ней — нули. При каждом фиксированном наборе (i, j, ℓ, m) значение — сумма всего трёх слагаемых, $k = 1, 2, 3$. Если $i = j$, то $\varepsilon_{ijk} = 0$ при любом k и все три слагаемых равны нулю; то же при $\ell = m$. Возьмём поэтому, например, $i = 1, j = 2$:

$$\sum_{k=1}^3 \varepsilon_{12k} \varepsilon_{klm} = \underbrace{\varepsilon_{121} \varepsilon_{1\ell m}}_0 + \underbrace{\varepsilon_{122} \varepsilon_{2\ell m}}_0 + \underbrace{\varepsilon_{123} \varepsilon_{3\ell m}}_1 = \varepsilon_{3\ell m}.$$

Чтобы $\varepsilon_{3\ell m}$ было отлично от нуля, остаётся два варианта: $\ell = 1, m = 2$, и тогда $a_{1212} = \varepsilon_{312} = 1$, либо $\ell = 2, m = 1$, и тогда $a_{1221} = \varepsilon_{321} = -1$. При остальных ℓ, m получаются нули.

Остальные значения вычисляются точно так же. Это муторно, но концептуально просто, и проделать это один раз необходимо: тогда всё становится понятно. Посчитав несколько значений, быстро замечаешь закономерности, вытекающие из антисимметрии ε , и они сильно сокращают работу. Результат муторный, но практически важный: свёртка двух антисимметричных символов по одному индексу используется очень часто.

Замечание редактора. Вычисление приводит к известной формуле

$$\sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \varepsilon_{klm} = \delta_{i\ell} \delta_{jm} - \delta_{im} \delta_{j\ell}.$$

Она согласуется с найденными значениями: при $i = 1, j = 2$ правая часть равна 1 при $(\ell, m) = (1, 2)$, -1 при $(\ell, m) = (2, 1)$ и нулю в остальных случаях. Никакой магии нет и в этой формуле: это просто компактная запись таблицы из 81 значения.

Конец лекции 1.