Otodectes sp.


· DIAGNOSE ·

- Arthropode •
- -appendices articulés
 - exosquelette
- -corps métamérisé
- -symétrie bilatérale
- Chelicérates •
- -1 paire de chélicères
 - Arachnides
- -4 paires de pattes-1 paire de pedipalpes
 - Acarien •
- -idiosoma : corps globuleux en une seule partie -contour ovalaire
 - Astigmatique •
- pas de stigmate visible
 certaines pattes avec
 ventouses
 - Psoroptidés •
 - -pattes longues
 -rostre pointu
- -Mâle : ventouses ventrales


lobes abdominaux avec soies

- Chorioptinés•
- rostre courtventouses subsessiles
 - Otodectes sp
- <u>-mâle</u> lobes abdominaux peu développés avec soies filiformes
- <u>-femelle</u> **P4** atrophiée, arrière du corps moins pointu que chez les Chorioptes

· IDENTIFICATION MORPHOLOGIQUE ·




à gauche adulte femelle d'Otodectes cynotis : vue ventrale, à droite mâle d'Otodectes cynotis : vue dorsale



Adulte mâle d'Otodectes cynotis: vue ventrale

Otodectes sp.



<u>Légende</u>

lieu de développement préférentiel de Otodectes cynotis