

Chorioptes sp.

• DIAGNOSE •

• Arthropodes •

- appendices articulés
- exosquelette
- corps métamérisé
- symétrie bilatérale

• Chelicerates •

- chélicères

• Arachnides •

- 4 paires de pattes
- 1 paire de pédipalpes

• Acariens •

- idiosoma : corps globuleux en une seule partie
- contour ovalaire

• Astigmatique •

- pas de stigmat visible
- certaines pattes avec ventouses

• Psoroptidés •

- pattes longues
- rostre pointu
- mâle ventouses ventrales, lobes abdominaux avec soies


• Chorioptinés •

- rostre court
- ventouses subsessiles

• Chorioptes sp. •


- mâle lobes abdominaux développés avec larges soies
- fémele P4 visibles, arrière du corps arrondi

• IDENTIFICATION MORPHOLOGIQUE •



adulte femelle *Chorioptes bovis*, vue dorsale à gauche et adulte mâle *Chorioptes bovis*, vue dorsale à droite


• DÉTAILS DE DIAGNOSE •



adulte mâle *Chorioptes bovis*, vue dorsale

Chorioptes sp.

• CYCLE ÉVOLUTIF •



Légende

■ lieu de développement préférentiel de *Chorioptes* sp.

gale formes les plus fréquemment rencontrées

Durée totale du cycle 3 semaines