

Dermacentor reticulatus

• TIQUE ORNÉE DU CHIEN •

• DIAGNOSE •

• Arthropode •

- appendices articulés
- exosquelette
- corps métamérisé
- symétrie bilatérale

• Chelicerates •

- chélicères

• Arachnides •

- 4 paires de pattes
- 1 paire de pedipalpes

• Acarien •

- rostre
- faible dimension
- Idiosoma** : corps globuleux en une seule partie

• Ixodida •

- Metastigmatique**
- 1 paire de stigmates en arrière de la 4ème paire de patte

• Ixodidés •


- rostre terminal** à chaque stade
- rostre avec hypostome**
- écusson/scutum dorsal**

• *Dermacentor reticulatus* •

Metastrata

- brévirostre (rostre court)
- hanche 1 bifide
- base du capitulum rectangulaire
- hanche 4 développée (mâle)


• IDENTIFICATION •



Adulte femelle de *Dermacentor reticulatus* : vue dorsale à gauche, ventrale à droite


• DÉTAILS DE DIAGNOSE •

région anale, vue ventrale



sillon anale contourne l'anús par l'arrière


patte I, vue ventrale



hanche 1 bifide

1 paire de chélicères


brévirostre



capitulum rectangulaire

rostre, vue dorsale

hanche 4 développée




hanche 4 développée chez le mâle, vue ventrale

Dermacentor reticulatus

• TIQUE ORNÉE DU CHIEN •

• CYCLE ÉVOLUTIF •



• PRINCIPAUX PATHOGÈNES VECTORISÉS •

PROTOZOAIRE	BACTÉRIE
<i>Babesia caballi</i>	<i>Francisella tularensis</i>
<i>Babesia canis</i>	<i>Rickettsia slovaca</i>
<i>Theileria equi</i>	