

Otodectes sp.

• DIAGNOSE •

• Arthropodes •

- appendices articulés
- exosquelette
- corps métamérisé
- symétrie bilatérale

• Chelicerates •

- chélicères

• Arachnides •

- 4 paires de pattes
- 1 paire de pédipalpes

• Acariens •

- idiosoma : corps globuleux en une seule partie
- contour ovalaire

• Astigmatique •

- pas de stigmat visible
- certaines pattes avec ventouses

• Psoroptidés •

- pattes longues
- rostre pointu
- mâle ventouses ventrales, lobes abdominaux avec soies


• Chorioptinés •

- rostre court
- ventouses subsessiles

• Otodectes sp •

- mâle lobes abdominaux peu développés avec soies filiformes
- femelle P4 atrophiée, arrière du corps moins pointu que chez les Chorioptes


• IDENTIFICATION MORPHOLOGIQUE •



Adulte femelle d'*Otodectes cynotis*, vue dorsale à gauche

Adulte mâle d'*Otodectes cynotis*, vue dorsale à droite


• DÉTAILS DE DIAGNOSE •



Adulte mâle d'*Otodectes cynotis*, vue dorsale

Otodectes sp.

• CYCLE ÉVOLUTIF •



Légende

■ lieu de développement préférentiel de *Otodectes cynotis*

Durée totale du cycle 3 semaines