

Dermacentor reticulatus

• TIQUE ORNÉE DU CHIEN •

• DIAGNOSE •

• Arthropodes •

- appendices articulés
- exosquelette
- corps métamérisé
- symétrie bilatérale

• Chelicerates •

- chélicères

• Arachnides •

- 4 paires de pattes
- 1 paire de pédipalpes

• Acariens •

- idiosoma : corps globuleux en une seule partie
- contour ovale

• Ixodida •

- grandes dimensions (2-10 mm)
- stigmates proches de la 4ème paire de pattes (metastigmatique)

• Ixodidés •

- rostre terminal à chaque stade avec hypostome
- écusson dorsal
- stigmates derrière P4


• Metastratiata •

- sillon anal contourne l'anus par l'arrière

• *Dermacentor reticulatus* •

- brévirostre (rostre court)
- hanche 1 bifide
- base du capitulum rectangulaire
- hanche 4 développée (mâle)

• IDENTIFICATION •




adulte femelle de *Dermacentor reticulatus*, vue dorsale à gauche, vue ventrale à droite

• DÉTAILS DE DIAGNOSE •


région anale, vue ventrale



patte 1, vue ventrale




1 paire de chélicères



rostre, vue dorsale

hanche 4 développée




hanche 4 développée chez le mâle, vue ventrale

Dermacentor reticulatus

• TIQUE ORNÉE DU CHIEN •

• CYCLE ÉVOLUTIF •



• PRINCIPAUX PATHOGÈNES VECTORISÉS •

PROTOZOAIRES	BACTÉRIES
<i>Babesia caballi</i>	<i>Francisella tularensis</i>
<i>Babesia canis</i>	<i>Rickettsia slovaca</i>
<i>Theileria equi</i>	