

《数学物理方法》第九章《拉普拉斯变换》

1. 求下列函数拉普拉斯变换的像函数:

(1) t^n , $n = 0, 1, 2, \dots$; (2) t^a , $\operatorname{Re} a > -1$;

(3) $e^{-\lambda t} \sin \omega t$; (4) $\frac{1 - \cos \omega t}{t^2}$; (5) $\int_t^\infty \frac{\cos \tau}{\tau} d\tau$;

(6)

$$f(t) = \begin{cases} e^t, & 0 < t < 1, \\ 0, & t > 1. \end{cases}$$

2. 求下列函数拉普拉斯变换的原函数:

(1) $\frac{a^3}{p(p+a)^3}$; (2) $\frac{\omega}{p(p^2+\omega^2)}$;

(3) $\frac{4p-1}{(p^2+p)(4p^2-1)}$; (4) $\frac{p^2-\omega^2}{(p^2+\omega^2)^2}$; (5) $\frac{e^{-p\tau}}{p^2}$, $\tau > 0$.

3. 利用拉普拉斯变换计算下列积分:

(1) $\int_0^\infty \frac{\sin xt}{t} dt$; (2) $\int_0^\infty \frac{\sin xt}{\sqrt{x}} dx$;

(3) $\int_0^\infty \frac{\cos xt}{x^2+a^2} dx$; (4) $\int_0^\infty \frac{\sin xt}{x(x^2+1)} dx$.

4. 求解变系数常微分方程初值问题:

$$\begin{cases} x'' + tx' + x = 0, \\ x(0) = 1, \quad x'(0) = 0. \end{cases}$$

5. 设有放射性衰变过程 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \dots$, 若其中三种元素的分子数 $N_1(t)$, $N_2(t)$ 及 $N_3(t)$ 满足方程及初始条件

$$\begin{cases} \frac{dN_1}{dt} = -\lambda_1 N_1, & N_1(0) = N, \\ \frac{dN_2}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2, & N_2(0) = 0, \\ \frac{dN_3}{dt} = \lambda_2 N_2 - \lambda_3 N_3, & N_3(0) = 0, \end{cases}$$

其中 λ_1 , λ_2 及 λ_3 为不相等的常数, 试求出 $N_1(t)$, $N_2(t)$ 及 $N_3(t)$.