

《数学物理方法(下)》第十章《柱函数》习题

1. 证明:

$$\int x J_{\nu}^2(x) dx = \frac{1}{2} x^2 [J_{\nu}^2(x) + J_{\nu+1}^2(x)] - \nu x J_{\nu}(x) J_{\nu+1}(x) + C,$$

其中 $\operatorname{Re} \nu > 0$, C 为积分常数。

如果把式中的贝赛尔函数换成其它类型的柱函数, 公式还成立吗?

2. 计算积分(选两题):

(a)

$$\int_0^x x^{-n} J_{n+1}(x) dx;$$

(b)

$$\int_0^a x^3 J_0(x) dx;$$

(c)

$$\int_0^{\infty} e^{-ax} J_0(\sqrt{bx}) dx, \quad a > 0, b \geq 0;$$

(d)

$$\int_0^t J_0(\sqrt{x(t-x)}) dx.$$

3. 证明诺伊曼函数的递推关系与贝赛尔函数相同。

4. 若 n 为一正整数, 证明

$$J_{n+1/2}(x) = i^{-n} \sqrt{\frac{x}{2\pi}} \int_{-1}^1 e^{i\mu x} P_n(\mu) d\mu,$$

并推出

$$i^n \sqrt{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} J_{n+1/2}(x) x^{-1/2} dx = \begin{cases} 2\pi P_n(t), & |t| < 1, \\ 0, & |t| > 1, \end{cases}$$

其中 $P_n(x)$ 是 n 次勒让德多项式。

5. 一导体球, 半径为 a , 初温为常温 u_0 , 球面温度为0, 求球内温度的变化和分布。