

Examen¹ GAL, an I, sem. II, Informatică, Seria 13
25.06.2021

Nume și prenume: _____

Grupa: _____

1. Decideți care dintre următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale reale ale lui \mathbb{R}^3 : (1 punct)

(a) $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 0\}$; (0.2p)

(b) $W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 - 3z^2 = 0\}$; (0.2p)

(c) $W_3 = \{\alpha(2, -1, 3) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$; (0.2p)

(d) $W_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\}$; (0.2p)

(e) $W_5 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 5y - 4z = 1\}$. (0.2p)

Justificați răspunsurile.

2. Fie aplicația $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, (2 puncte)

$$f(x, y, z) = (2x - 2y, -2x + y - 2z, -2y).$$

(a) Arătați că f este aplicație liniară și scrieți matricea lui f în baza canonică a lui \mathbb{R}^3 . (0.5p)

(b) Arătați că f este un endomorfism diagonalizabil. (1p)

(c) Determinați o bază în care f are forma diagonală. (0.5p)

3. În spațiul euclidian $\mathbb{E}^3 = (\mathbb{R}^3, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ (unde $\langle \cdot, \cdot \rangle$ este produsul scalar canonic) (2.5 puncte)
se consideră vectorii $f_1 = (1, -2, 1)$ și $f_2 = (1, 2, 2)$.

(a) Calculați $\|f_1\|$, $\|f_2\|$ și unghiul dintre f_1 și f_2 . (0.5p)

(b) Determinați un vector nenul $f_3 \in \mathbb{E}^3$ astfel încât f_3 să fie perpendicular pe f_1 și f_2 . (0.5p)

(c) Pentru f_3 obținut la punctul (b), ortonormați sistemul $\{f_1, f_2, f_3\}$ prin procedeul de ortonormalizare Gram-Schmidt. (1p)

(d) Determinați coordonatele vectorului $v = (1, 2, 3)$ în reperul ortonormat obținut la punctul (c). (0.5p)

4. Fie $\mathcal{C} \subset \mathbb{R}^2$ conica de ecuație (2 puncte)

$$\mathcal{C} : x^2 + y^2 - 6xy + 6x - 6y + 4 = 0.$$

(a) Să se precizeze natura și genul conicei date. (0.5p)

(b) Să se reducă \mathcal{C} la forma canonică, precizându-se schimbarea izometrică de reper efectuată. (1p)

(c) Să se calculeze excentricitatea conicei \mathcal{C} . (0.5p)

5. În spațiul \mathbb{R}^3 cu structura euclidiană canonică, fie planele (1.5 puncte)

$$(\pi_1) : x_1 + x_2 - x_3 - 1 = 0;$$

$$(\pi_2) : 2x_1 - x_2 - x_3 = 0.$$

(a) Decideți dacă punctul $A = (1, 1, 1) \in \pi_1 \cap \pi_2$; (0.5p)

(b) Fie $B = (1, 2, 1)$. Determinați planul π ce conține punctul B astfel încât $\pi \parallel \pi_1$. (1p)

¹Subiectele 1-5 sunt obligatorii. Se acordă 1 punct din oficiu.
Timp de lucru: 2 ore. Baftă!

POPESCU PAULLO ROBERTTO KARLOSS
GRUPA 134

EXAMEN GAL
VARIANTA 23

25.06.2021

2. $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (2x - 2y, -2x + y - 2z, -2y)$

a) Scriem
(f. matricială) $f(X) = AX$, unde $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix} \in M_{(3,3)}(\mathbb{R})$$

Fie $X_1, X_2 \in \mathbb{R}^3$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

să $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} f(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) &= A(\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2) = A(\alpha_1 X_1) + \\ &+ A(\alpha_2 X_2) = (A \alpha_1) X_1 + (A \alpha_2) X_2 = \alpha_1 (A X_1) + \alpha_2 (A X_2) \\ &= \alpha_1 f(X_1) + \alpha_2 f(X_2) \Rightarrow f. \text{ apl. liniară (morf. sp. vect)} \end{aligned}$$

b) Polinomul caracteristic

$$P(\lambda) = \det(A_f - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 6\lambda - 8 = -(\lambda-1) \cdot (\lambda^2 - 2\lambda - 8) =$$

$$= -(\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-4)$$

$$P(\lambda) = 0 \Leftrightarrow -(\lambda-1)(\lambda+2)(\lambda-4) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \\ \lambda_3 = 4 \end{cases} \in \mathbb{R} \text{ valorile proprii } \text{Spec}(f) = \{1, -2, 4\}$$

$$m_a(\lambda_1) = m_a(\lambda_2) = m_a(\lambda_3) = 1$$

Subspații proprii

$$S_\lambda : \begin{cases} (2-\lambda)x - 2y = 0 \\ -2x + (1-\lambda)y - 2z = 0 \\ -2y - \lambda z = 0 \end{cases}$$

Atunci:

$$S_{\lambda_1} : \begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x - 2z = 0 \\ -2y - z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{sistem liniar omogen cu 3 ec. și 3 nec.}$$

$$\text{rang}(A - \lambda_1 I_3) = 2$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 4 = -4 \neq 0 \Rightarrow x, y \text{ nec. princip}$$

$z = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \text{ nec. nec}$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - 4y = 0 \\ -2x - 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - 2y = 0 \\ -2x - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$-2x - 2z = 0$$

$$2x = -2z$$

$$\boxed{x = -z}$$

$$\boxed{z = \alpha, \alpha \in \mathbb{R}}$$

$$x - 2y = 0$$

$$x = 2y$$

$$2y = -z$$

$$\boxed{y = -\frac{z}{2}}$$

$$\text{Deci } V_{\lambda_1} = \left\{ \alpha \left(-1, -\frac{1}{2}, 1 \right) / \alpha \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{cases} \lambda_2 = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x - 2y = 0 \\ -2x + 3y - 2z = 0 \\ -2y + 2z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{sistem linear omogen cu 3 ec si 3 nec}$$

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{rg}(A - \lambda_2 I_3) = 2$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = 12 - 4 = 8 \neq 0 \Rightarrow x, y \text{ nec. princip.}$$

$$z = \beta, \beta \in \mathbb{R}$$

nec. sec.

$$\begin{cases} 4x - 2y = 0 \\ -2x + 3y = 2\beta \\ -2y = -2\beta \end{cases}$$

$$y = \beta$$

$$z = \beta, \beta \in \mathbb{R}$$

$$4x - 2\beta = 0$$

$$4x = 2\beta$$

$$x = \frac{1}{2} \beta$$

$$\text{Deci } V_{\lambda_2} = \left\{ \beta \left(\frac{1}{2}, 1, 1 \right) \mid \beta \in \mathbb{R} \right\}^2$$

"v₂"

$$S_{\lambda_3} : \begin{cases} -2x - 2y = 0 \\ -2x - 3y - 2z = 0 \\ -2y - 4z = 0 \end{cases} \rightarrow \text{sistem linear}$$

omogen cu 3 ec
si 3 nec.

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{rg}(A - \lambda_3 I_3) = 2$$

$$x, y \text{ nec. princip.}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -3 \end{vmatrix} = 6 - 4 = 2 \neq 0 \Rightarrow z = \mu, \mu \in \mathbb{R}$$

nec. sec.

$$\begin{cases} -2x - 2y = 0 \\ -2x - 3y = 2\mu \\ -2y = 4\mu \end{cases}$$

$$y = -2\mu$$

$$z = \mu, \mu \in \mathbb{R}$$

$$-2x + 4\mu = 0$$

$$2x = 4\mu$$

$$x = 2\mu$$

$$\text{Deci } V_{\lambda_3} = \{ \mu (2, -2, 1) / \mu \in \mathbb{R} \}$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = -2 \\ \lambda_3 = 4 \end{cases}, \text{ unde } m_a(\lambda_1) = m_a(\lambda_2) = m_a(\lambda_3) = 1$$

~~Avem~~ Avem 1) $m_a(\lambda_1) + m_a(\lambda_2) + m_a(\lambda_3) = 3$
 $= \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3$

$$2) m_a(\lambda_i) = m_g(\lambda_i), (\forall) i = \overline{1, 2}$$

$$\dim V_{\lambda_1} = 1$$

$$\dim V_{\lambda_2} = 1$$

$$\dim V_{\lambda_3} = 1$$

$$m_g(\lambda_1) = m_g(\lambda_2) = 1 \text{ multiplicitățile geometrice}$$

$\Rightarrow f$ este diagonalizabilă, deci $(\exists) B \in \mathbb{R}^3$
Baza formată din vectorii proprii $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$
(care sunt liniar indep. deoarece valorile
proprii sunt distincte)

$$c) B = \{v_1 = (-1, -\frac{1}{2}, 1), v_2 = (\frac{1}{2}, 1, 1), v_3 = (2, -2, 1)\}$$

În raport în care, matricea asociată lui f
are forma diagonală:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$5. a) \quad \tilde{\Pi}_1 \cap \tilde{\Pi}_2 : \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - 1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x_1 + 2x_2 - 1 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 - 1 \\ 4x_2 - 2 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 - 1 \\ x_3 = 3x_2 - 2 \end{cases}$$

$$x = (2x_2 - 1, x_2, 3x_2 - 2) \in \tilde{\Pi}_1 \cap \tilde{\Pi}_2$$

$$\begin{array}{l|l} A = (1, 1, 1) & \rightarrow A \in \tilde{\Pi}_1 \cap \tilde{\Pi}_2 \\ 1 = 2 \cdot 1 - 1 & \\ 1 = 1 & \\ 1 = 3 \cdot 1 - 2 & \end{array}$$

$$b) \quad B = (1, 2, 1) \\ B \in \tilde{\Pi}$$

$$\tilde{\Pi} \parallel \tilde{\Pi}_1 \Rightarrow \tilde{\Pi} : x_1 + x_2 - x_3 + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{neconoscute}}}{d} = 0$$

$$(1, 2, 1) \in \tilde{\Pi} \Rightarrow 1 + 2 - 1 + d = 0 \\ \Rightarrow d = -2$$

$$\tilde{\Pi} : x_1 + x_2 - x_3 - 2 = 0$$

$$4. C: x^2 + y^2 - 6xy + 6x - 6y + 4 = 0$$

$$a) A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow J = \det A = 1 - 9 = -8 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} A \\ J \end{matrix}} \right\} \Rightarrow$$

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ -3 & 1 & -3 \\ 3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \Delta = \det A' = 4 \neq 0$$

$$\boxed{\begin{matrix} J < 0 \\ \Delta \neq 0 \end{matrix}}$$

$\Rightarrow C$ HIPERBOLĂ

b) Centrul conicei C este $P_0(x^0, y^0)$, unde coord (x^0, y^0) se determină ca sol. unică a sist. de ec. liniare

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{array} \right. \Rightarrow \begin{cases} 2x - 6y + 6 = 0 & | : 2 \\ 2y - 6x + 6 = 0 & | : 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 3y + 3 = 0 \\ \cancel{x - 3y - 3 = 0} \\ y - 3x - 3 = 0 \end{cases}$$

def.

$$\left\{ \begin{array}{l} x - 3y + 3 = 0 \\ -3x + y - 3 = 0 \end{array} \right. \begin{matrix} | \cdot 3 \\ \end{matrix} \Rightarrow \begin{cases} 3x - 9y + 9 = 0 \\ -3x + y - 3 = 0 \end{cases}$$

$$-8y + 6 = 0$$

$$8y = 6$$

$$y = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$$

$$x = 3 \cdot \frac{3}{4} + 3 = 0$$

$$x = \frac{9}{4} + \frac{4}{3} = 0$$

$$x = \frac{9-12}{4} = -\frac{3}{4}$$

Deci: $P_0(-\frac{3}{4}, \frac{3}{4}) \rightarrow$ centrul conicei C

Efectuăm translația τ

$$\tau: \begin{cases} x' = x - x^0 \\ y' = y - y^0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = x + \frac{3}{4} \\ y' = y - \frac{3}{4} \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = x' - \frac{3}{4} \\ y = y' + \frac{3}{4} \end{cases}$$

$$-\frac{4}{8} = -\frac{x}{4} \\ = -\frac{1}{2}$$

$$\tau(C): (x')^2 - 6x'y' + (y')^2 - \frac{1}{2} = 0$$

$$f(x^0, y^0) = \frac{1}{8} \quad -9-$$

Avem $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$ Determinăm valorile proprii ale lui A

Procedăm $\boxed{\det(A - \lambda I_2) = 0}$, în \mathbb{R}
(ec. caracteristică)

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 \\ -3 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 - 2\lambda + 8 = (\lambda+2)(\lambda-4) = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = 4 \end{cases} \text{ valorile proprii}$$

Determinăm subsp. proprii corespunzătoare

$$S_{\lambda} : \begin{cases} (1-\lambda)x - 3y = 0 \\ -3x + (1-\lambda)y = 0 \end{cases}$$

$$m_a(\lambda_1) = m_a(\lambda_2) = 1 \text{ multiplic. algebrice}$$

Atunci:

$$S_{\lambda_1} : \begin{cases} 3x - 3y = 0 \\ -3x + 3y = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\{\lambda_1 = -2\} \quad \text{sg}(A - \lambda_1 I_2) = 1$$

$$\Delta_A = |3| = 3 \neq 0 \Rightarrow \begin{cases} x \text{ nec. princip.} \\ y = \alpha, \alpha \in \mathbb{R} \text{ nec. sec.} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 3x &= 3y \\ x &= y \\ x &= \alpha \end{aligned} \quad y = \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{Deci } V_{\lambda_1} = \{ \alpha(1, 1) / \alpha \in \mathbb{R} \}$$

$$S'_{\lambda_2} = \begin{cases} -3x - 3y = 0 \\ -3x - 3y = 0 \end{cases} \quad \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -3 & -3 \end{pmatrix}$$

$\{ \lambda_2 = -3 \}$

$$\Delta n = -3 \Rightarrow \begin{cases} x \text{ nec. princip} \\ y \text{ nec nec, } y = \beta, \beta \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$\text{rg}(A - \lambda_2 I_2) = 1$$

$$\begin{aligned} 3x &= -3y \\ x &= -y \\ x &= -\beta \end{aligned} \quad \text{Deci } V_{\lambda_2} = \{ \beta(-1, 1), \beta \in \mathbb{R} \}$$

v_2

Considerăm vectorii proprii

$$\begin{cases} f_1 = (1, 1) \\ f_2 = (-1, 1) \end{cases} \quad \langle f_1, f_2 \rangle = 0 \Leftrightarrow f_1 \perp f_2$$

Normăm vectorii f_1, f_2 și obținem un reper ortonormat:

$$\begin{cases} l_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} & \Rightarrow l_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1) \\ l_2 = \frac{f_2}{\|f_2\|} & l_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (-1, 1) \end{cases}$$

Effectuism rotatior

$$R = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

$$R^T R = I_2 \Rightarrow R \text{ m. ortogonale}$$

$$\rightarrow R^{-1} = R^T \Rightarrow \begin{cases} x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x'' - y'') \\ y' = \frac{1}{\sqrt{2}}(x'' + y'') \end{cases}$$

$$\text{rot}(C): -2(x'')^2 + 4(y'')^2 - \frac{1}{2} = 0 \quad | : \frac{1}{2}$$

$$\frac{-2(x'')^2}{\frac{1}{2}} + \frac{4(y'')^2}{\frac{1}{2}} - 1 = 0$$

$$-4(x'')^2 + (y'')^2 - 1 = 0$$

$$a + 2 \times \frac{1}{4} = 1$$

$1 = 0$ unde
forma canonică
este: $x^2 + y^2 = 1$

$$-\frac{\cancel{\frac{1}{4}}(x'')^2}{\frac{1}{4}} + \frac{(y'')^2}{\frac{1}{8}} = 1$$


unde

$$a = \sqrt{\frac{1}{4}}, \quad b = \sqrt{\frac{1}{8}}$$

forma canonică
obt. prin
izometrie

$$c) \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \frac{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{8}}}{\sqrt{\frac{1}{4}}} =$$

$$= \frac{\sqrt{\frac{3}{8}}}{\sqrt{\frac{1}{4}}} = \sqrt{\frac{3}{2} \cdot \cancel{\frac{4}{4}}} = \boxed{\sqrt{\frac{3}{2}}}$$

CONTINUARE  PAGINA 12

$$\frac{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{a^2+b^2}}}{a} = \frac{\sqrt{\frac{3}{8}}}{\sqrt{\frac{1}{8}}} = \sqrt{\frac{3}{8} \cdot 8} = \sqrt{3}$$

CONTINUARE PAG 12

$$3. a) \|f_1\| = \sqrt{\langle f_1, f_1 \rangle} = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$$

$$\|f_2\| = \sqrt{\langle f_2, f_2 \rangle} = \sqrt{1+4+4} = \sqrt{9} = 3$$

$$\cos \theta = \frac{f_1 \cdot f_2}{\|f_1\| \cdot \|f_2\|} = \frac{1 \cdot 1 - 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2}{3\sqrt{6}} =$$

$$= \frac{1-4+2}{3\sqrt{6}} = -\frac{1}{3\sqrt{6}}$$

$$\theta = \arccos \left(-\frac{1}{3\sqrt{6}} \right)$$

$$b) f_3 \perp f_1 (\Leftrightarrow) \langle f_3, f_1 \rangle = 0$$

$$f_3 \perp f_2 (\Leftrightarrow) \langle f_3, f_2 \rangle = 0$$

$$\langle f_1, (x_1, x_2, x_3) \rangle = \langle f_2, (x_1, x_2, x_3) \rangle = 0$$

$$(\Leftrightarrow) x_1 - 2x_2 + x_3 = x_1 + 2x_2 + 2x_3 = -x_1$$

$$-4x_2 = x_3$$

$$-2x_2 - 4x_2 = -x_1 (\Leftrightarrow) x_1 = 6x_2$$

$$x_3 = -4x_2$$

$$x_2 = 2 \Rightarrow x_1 = 12$$

$$x_3 = -8$$

$$f_3 = (12, 2, -8)$$

$$a) \{f_1, f_2, f_3\} \xrightarrow{\text{arbitrar}} \{l_1, l_2, l_3\} \xrightarrow{\text{ortogonal}} \left\{ \frac{l_1}{\|l_1\|}, \frac{l_2}{\|l_2\|}, \frac{l_3}{\|l_3\|} \right\} \xrightarrow{\text{ortonormat}}$$

$$l_1 = f_1 = (1, -2, 1)$$

$$l_2 = f_2 - \frac{\langle f_2, l_1 \rangle}{\langle l_1, l_1 \rangle} \cdot l_1 = (1, 2, 2) - \frac{1-4+2}{1+4+1} (1, -2, 1)$$

$$= (1, 2, 2) - \frac{1}{2} (1, -2, 1) = \left(\frac{1}{2}, 3, \frac{3}{2} \right)$$

↓
la fel orientat cu (1, 6, 3)

$$l_3 = f_3 - \frac{\langle f_3, l_1 \rangle}{\langle l_1, l_1 \rangle} \cdot l_1 - \frac{\langle f_3, l_2 \rangle}{\langle l_2, l_2 \rangle} \cdot l_2 =$$

$$= (12, 2, -8) - \frac{12-4-8}{\langle l_1, l_1 \rangle} \cdot l_1 - \frac{12+12-24}{\langle l_2, l_2 \rangle} \cdot l_2 =$$

$$= (12, 2, -8) \quad \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix}$$

$$\{(1, -2, 1), (1, 6, 3), (12, 2, -8)\} \text{ ortogonal}$$

$$\left\{ \frac{1}{\sqrt{6}} (1, -2, 1), \frac{1}{\sqrt{6}} (1, 6, 3), \frac{1}{\sqrt{212}} (12, 2, -8) \right\}$$

~~ortogonal~~ ortonormat

$$d) (1, 2, 3) = a(1, -2, 1) + b(1, 6, 3) + c(12, 2, -8)$$

$$\begin{cases} a + b + 12c = 1 & | \cdot 6 \\ -2a + 6b + 2c = 2 & | \cdot 3 \\ a + 3b - 8c = 3 & | \cdot 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 8a + 40c = 4 & | \cdot 3 \\ -3a + 18c = -4 & | \cdot 8 \\ a + 3b - 8c = 3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow 354c &= -20 \Rightarrow c = -\frac{10}{177} \\ a &= 146 \\ b &= -\frac{30701}{531} \end{aligned}$$

$$\left(146, -\frac{30701}{531}, -\frac{10}{177} \right)$$

1. Eie W_0 esp. vectorial
stunci

$$\begin{aligned} \forall x, y \in W_1 & \Rightarrow \alpha x + \beta y \in W_1 \\ \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Verificăm

$$W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 3y^2 + 5z^2 = 0\}$$

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta y &= (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \\ &+ \beta y_3) \end{aligned}$$

$$(\alpha x_1 + \beta y_1)^2 + 3(\alpha x_2 + \beta y_2)^2 +$$

$$\begin{aligned}
 + 5(\alpha x_3 + \beta y_3) &= \alpha^2 x_1^2 + 2\alpha\beta x_1 y_1 + \beta^2 y_1^2 + \\
 + 3\alpha^2 x_2^2 + 6\alpha\beta x_2 y_2 + 3\beta^2 y_2^2 + 5\alpha^2 x_3^2 + \\
 + 10\alpha\beta x_3 y_3 + 5\beta^2 y_3^2 &= \\
 &= \alpha^2 (x_1^2 + 3x_2^2 + 5x_3^2) + \beta^2 (y_1^2 + 3y_2^2 + 5y_3^2) \\
 + 2\alpha\beta x_1 y_1 + 6\alpha\beta x_2 y_2 + 10\alpha\beta x_3 y_3
 \end{aligned}$$

Prima 2 paranteze sunt 0, rămânând

$$2\alpha\beta x_1 y_1 + 6\alpha\beta x_2 y_2 + 10\alpha\beta x_3 y_3 \neq 0,$$

$$\forall x, y \in W_1$$

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

W_1 nu este s.p. vectorial

$$b) W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 0\}$$

Dim același motiv ca exercitiul mai sus,

W_2 nu e s.p. vectorial

ne rămânând nesimplificat

$$2\alpha\beta x_1 y_1 + 9\alpha\beta x_2 y_2 + 6\alpha\beta x_3 y_3 \neq 0$$

W_2 s.p. vectorial

$$c) W_3 = \{ \alpha(2, -1, 3) \mid \alpha \in \mathbb{R} \}$$

$$\text{Für } x = \alpha(2, -1, 3) \in W_3, \forall \alpha, b \in \mathbb{R}$$

$$y = b(2, -1, 3) \in W_3$$

$$\alpha x + \beta y \in W_3 \Leftrightarrow \alpha \cdot \alpha(2, -1, 3) + \beta b(2, -1, 3) \in W_3$$

$$\Leftrightarrow (\alpha a + \beta b)(2, -1, 3) \in W_3$$

Adäquat, für den $\alpha a + \beta b \in \mathbb{R}$

$$\forall \alpha, a, \beta, b \in \mathbb{R}$$

W_3 ssp. vektorial

$$\begin{aligned} d) \alpha x_1 + 2\alpha x_2 - \alpha x_3 + \beta y_1 + 2\beta y_2 - y_3 &= \\ = \alpha \underbrace{(x_1 + 2x_2 - x_3)}_0 + \beta \underbrace{(y_1 + 2y_2 - y_3)}_0 &= 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \alpha x + \beta y \in W_4 \Rightarrow W_4 \text{ ssp. vektorial}$$

$$\begin{aligned} e) \alpha x_1 + 5\alpha x_2 - 4\alpha x_3 + \beta y_1 + 5\beta y_2 - \\ - 4\beta y_3 &= \alpha \underbrace{(x_1 + 5x_2 - 4x_3)}_1 + \beta \underbrace{(y_1 + 5y_2 - 4y_3)}_1 \\ &= \alpha + \beta \end{aligned}$$

$$= \alpha + \beta \neq 1, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha x + \beta y \notin W_5$$

$\forall x, y \in W_5$

$\Rightarrow W_5$ nu este sp. vectorial