

国家精品课程/ 国家精品资源共享课程/ 国家级精品教材

国家级十一(二)五规划教材/ 教育部自动化专业教学指导委员会牵头规划系列教材

控制系统仿真与CAD

第三章 科学运算问题MATLAB求解

微分方程求解 (下)

Ordinary Differential Equation Solutions (II)



主讲：薛定宇教授



例3-15 Apollo方程数值解

➤ Apollo 轨迹

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= 2\dot{y} + x - \frac{\mu^*(x + \mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(x - \mu^*)}{r_2^3} \\ \ddot{y} &= -2\dot{x} + y - \frac{\mu^*y}{r_1^3} - \frac{\mu y}{r_2^3}\end{aligned}$$

➤参数 $\mu = 1/82.45, \mu^* = 1 - \mu,$

$$r_1 = \sqrt{(x + \mu)^2 + y^2}, r_2 = \sqrt{(x - \mu^*)^2 + y^2}$$

➤初值 $x(0) = 1.2, \dot{x}(0) = 0, y(0) = 0, \dot{y}(0) = -1.04935751$



微分方程数值解的验证

➤ 引入状态变量 $x_1 = x, x_2 = \dot{x}, x_3 = y, x_4 = \dot{y}$

$$\ddot{x} = 2\dot{y} + x - \frac{\mu^*(x + \mu)}{r_1^3} - \frac{\mu(x - \mu^*)}{r_2^3}$$

➤ 变换后结果

$$\ddot{y} = -2\dot{x} + y - \frac{\mu^*y}{r_1^3} - \frac{\mu y}{r_2^3}$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = 2x_4 + x_1 - \mu^*(x_1 + \mu)/r_1^3 - \mu(x_1 - \mu^*)/r_2^3 \\ \dot{x}_3 = x_4 \\ \dot{x}_4 = -2x_2 + x_3 - \mu^*x_3/r_1^3 - \mu x_3/r_2^3 \end{cases}$$

➤ 参数 $\mu = 1/82.45, \mu^* = 1 - \mu$

$$r_1 = \sqrt{(x_1 + \mu)^2 + x_3^2}, r_2 = \sqrt{(x_1 - \mu^*)^2 + x_3^2}$$

➤ 初值 $x(0) = [1.2, 0, 0, -1.04935751]^T$



数值求解方法

➤ 描述微分方程（不能用匿名函数）

```
function dx=apolloeq(t,x)
mu=1/82.45; mu1=1-mu; r1=sqrt((x(1)+mu)^2+x(3)^2);
r2=sqrt((x(1)-mu1)^2+x(3)^2);
dx=[x(2); 2*x(4)+x(1)-mu1*(x(1)+mu)/r1^3-mu*(x(1)-mu1)/r2^3;
    x(4); -2*x(2)+x(3)-mu1*x(3)/r1^3-mu*x(3)/r2^3];
```

➤ 求解



```
>> x0=[1.2; 0; 0; -1.04935751];
[t,y]=ode45(@apolloeq,[0,20],x0);
plot(y(:,1),y(:,3))
```

➤ 问题：结果正确与否？



数值解的检验方法

➤ 解的检验



```
>> options=odeset; options.RelTol=1e-7;  
[t,y]=ode45(@apolloeq,[0,20],x0,options);  
plot(y(:,1),y(:,3))
```

➤ 不能过分依赖MATLAB直接生成的结果

➤ 选择不同的控制变量

➤ RelTol, AbsTol

➤ 选择不同的求解算法

➤ ode45, ode15s, ode23s, ode23t, ode23tb, ode113

➤ 必须检验，否则结果没有可信度



微分方程的解析解

➤ MATLAB 函数 dsolve()

$$Y = \text{dsolve}(\text{eqn}_1, \text{eqn}_2, \dots)$$
$$Y = \text{dsolve}(\text{eqn}_1, \text{eqn}_2, \dots, x)$$

➤ 微分方程与初始条件的描述

➤ 微分方程可以由符号表达式和字符串描述

➤ 微分方程尽量用符号表达式描述

➤ 对初值问题字符串更方便，如果自变量不是 t 需指定



例3-16 微分方程的解析解

➤ 给定高阶线性微分方程

$$\frac{d^4 y(t)}{dt^4} + 11 \frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 41 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 61 \frac{dy(t)}{dt} + 30y(t) = e^{-6t} \cos 5t$$

➤ MATLAB直接求解



```
>> syms t y;  
Y=dsolve('D4y+11*D3y+41*D2y+61*Dy+30*y=exp(-6*t)*cos(5*t)');  
pretty(simplify(Y))
```



```
>> syms t y(t);  
Y=dsolve(diff(y,4)+11*diff(y,3)+41*diff(y,2)+61*diff(y)+...  
30*y==exp(-6*t)*cos(5*t));  
pretty(simplify(Y))
```



例3-17 已知初始条件的方程求解

➤ 如果已知初始条件

$$y(0) = 1, \dot{y}(0) = 1, \ddot{y}(0) = 0, y^{(3)}(0) = 0$$

➤ 可以由下面语句直接求解



```
>> Y=dsolve('D4y+11*D3y+41*D2y+61*Dy+30*y=cos(5*t)*exp(-6*t)',...  
            'y(0)=1','Dy(0)=1','D2y(0)=0','D3y(0)=0');
```

```
>> syms t y(t)
```



```
y1=diff(y); y2=diff(y,2); y3=diff(y,3);  
Y=dsolve(diff(y,4)+11*y3+41*y2+61*y1+...  
          30*y==cos(5*t)*exp(-6*t),...  
          y(0)==1,y1(0)==1,y2(0)==0,y3(0)==0)
```




微分方程求解小结

$$\dot{x} = f(t, x), x_0$$

- 一阶显式微分方程数值解法
 - 相关的函数：ode45()、ode23()、ode15s()等
- 其他微分方程如何转换
 - 状态变量的选择、转换结果不唯一性
- 微分方程的解析解 dsolve()
- 微分方程的其他解法
 - 第6章将介绍基于框图的求解方法
 - 用Simulink把微分方程画出来，用仿真方法求解
 - 这样的求解范围更广，比如延迟微分方程

