

Semaine du 21 au 25 septembre

Automatismes Série 3



Vecteurs Somme, relation de Chasles



A9 Développer, factoriser



A8 Calcul littéral élémentaire



Algo

Vecteurs Somme, relation de Chasles

À retenir

1. Somme bout à bout (rappel Série 2)

Pour construire $\vec{u} + \vec{v}$, on place $\vec{v}$ à la suite de $\vec{u}$: le vecteur somme va de l'origine de $\vec{u}$ à l'extrémité de $\vec{v}$.

2. Relation de Chasles (nouveau)

Pour tous points A, M, B :

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$$



Exemple

Simplifier $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB}$:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{AB} - (\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}) \\ &= \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AB} \\ &= \vec{0}\end{aligned}$$

On regroupe d'abord les deux derniers termes avec Chasles ($\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB}$), avant de soustraire.

A9 Développer, factoriser

À retenir

La double distributivité a été rappelée en Série 2 – cette semaine, on travaille surtout l'opération inverse.

Factoriser, c'est transformer une somme en produit. Pour tous réels k , a et b :

$$ka + kb = k(a + b) \quad ka - kb = k(a - b)$$

On repère le **facteur commun** k dans chaque terme de la somme.



Exemple

Factoriser $B = 7x - 21$:

$$\begin{aligned} B &= 7 \times x - 7 \times 3 \\ &= 7(x - 3) \end{aligned}$$

7 est le facteur commun à $7x$ et à $21 = 7 \times 3$.

A8 Calcul littéral élémentaire

À retenir

1. Fractions avec du littéral

On peut simplifier une écriture fractionnaire contenant une lettre exactement comme une fraction numérique : on cherche un facteur commun au numérateur et au dénominateur.

2. Une longueur en fonction de x

Sur une figure, une longueur totale peut se lire comme une somme de longueurs connues (dont certaines valent un même nombre de fois x).




Exemple

Simplifier $\frac{3x + 9}{3}$:

$$\frac{3x + 9}{3} = \frac{3 \times x + 3 \times 3}{3} = \frac{3(x + 3)}{3} = x + 3$$

Exprimer AB en fonction de x :




$$AB = x \times 2 + 7 \times 3 = 2x + 21$$

À retenir

Une fonction (Python) ou un bloc personnalisé (Scratch) peut recevoir **plusieurs paramètres** – rappel Série 2 : un seul paramètre. En Python, on les sépare par une virgule : `def nom(param1, param2):`. L'appel `nom(v1, v2)` remplace `param1` par `v1` et `param2` par `v2`.



Exemple



```
def aire(L, l):  
    return L * l
```

```
>>> aire(5, 3)  
15
```

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Chaque question a trois niveaux : ★☆☆ question de base, ★★☆☆ niveau 2, ★★★☆☆ niveau 3. Dans la case du niveau : ✓ juste · ✗ faux · vide : non tenté.

		Vecteurs Somme, norme, Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo Fonctions à évaluer
Jour 1 Date : _____	QCM			① ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐	
	Question			② ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐	
	Automatisme final		③ ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐		
Jour 2 Date : _____	QCM	① ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐			
	Question		② ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐		
	Automatisme final	③ ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐			

Nom : _____ Prénom : _____ Classe : _____

Chaque question a trois niveaux : ★☆☆ question de base, ★★☆☆ niveau 2, ★★★☆☆ niveau 3. Dans la case du niveau : ✓ juste · ✗ faux · vide : non tenté.

		Vecteurs Somme, norme, Chasles	A8 Calcul littéral élémentaire	A9 Développer, factoriser	Algo Fonctions à évaluer
Jour 3 Date : _____	QCM	① ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐			
	Question			② ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐	
	Automatisme final		③ ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐		
Jour 4 Date : _____	QCM	① ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐			
	Question				② ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐
	Automatisme final		③ ★☆☆ ★★☆☆ ★★★☆☆ ☐ ☐ ☐		