


Questions et corrigé

Question 1 · QCM

Vecteurs · Translations

Quelle est la translation qui transforme la figure originale en la Figure 3 ?



- ✓ A. La translation de vecteur $\overrightarrow{BA}$ (réponse correcte)
 B. La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$
 C. La translation de vecteur $\overrightarrow{CD}$
 D. La translation de vecteur $\overrightarrow{DC}$

Corrigé — Le vecteur $\overrightarrow{BA}$ va de B vers A : c'est le sens opposé de $\overrightarrow{AB}$. C'est ce déplacement qui transforme la figure originale en la **Figure 3**. La translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$ est le sens opposé de la bonne réponse : elle ramènerait la Figure 3 vers la figure originale. Les translations de vecteur $\overrightarrow{CD}$ ou $\overrightarrow{DC}$ sont d'autres déplacements, qui ne correspondent à aucune des figures représentées.

Question 3 · Question

A3 — Puissances

Simplifier $\frac{x^7}{x^2}$ (le résultat sera écrit sous la forme x^n).

Corrigé — Pour diviser deux puissances de même base, on soustrait les exposants : $\frac{x^7}{x^2} = x^{7-2} = x^5$.

Question 2 · QCM

Algo · Lire un programme

Voici un programme Python. Que renvoie la console si on saisit `prix_total(5, 4)` ?

```
def prix_total(prix, frais):
    return 2 * prix + frais
```

- ✓ A. 14
 B. 9
 C. 18
 D. 40

(réponse correcte)

Corrigé — On calcule $2 * \text{prix} + \text{frais}$ avec $\text{prix} = 5$ et $\text{frais} = 4$: $2 \times 5 + 4 = 10 + 4 = 14$.

Question 4 · Question

A4 — Écritures d'un nombre


Donner l'écriture décimale de $\frac{3}{8}$.

Corrigé — On connaît $\frac{3}{4} = 0,75$. Or $\frac{3}{8} = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$: c'est la moitié de $\frac{3}{4}$.
 Donc $\frac{3}{8} = 0,75 \div 2 = 0,375$.

Question 5 · Automatisme final

Vecteurs · Translations

Quelle est l'image du point I par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$?



Corrigé — Le vecteur $\overrightarrow{AB}$ correspond à un déplacement d'une colonne vers la droite, sur la même rangée (c'est le même déplacement qu'entre H et G, ou entre I et J). En appliquant ce déplacement au point I, on reste sur la rangée du bas et on avance d'une colonne : l'image de I est donc le point J.