



南京信息工程大学学报(自然科学版)

*Journal of Nanjing University of Information Science & Technology(Natural Science Edition)*

ISSN 1674-7070,CN 32-1801/N

## 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目: 藻型湖泊溶解有机碳特征及其对甲烷排放的影响  
作者: 肖启涛, 廖远珊, 刘臻婧, 胡正华  
收稿日期: 2021-12-08  
网络首发日期: 2021-12-14  
引用格式: 肖启涛, 廖远珊, 刘臻婧, 胡正华. 藻型湖泊溶解有机碳特征及其对甲烷排放的影响[J/OL]. 南京信息工程大学学报(自然科学版).  
<https://kns.cnki.net/kcms/detail/32.1801.N.20211213.1756.004.html>



**网络首发:** 在编辑部工作流程中, 稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定, 且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式(包括网络呈现版式)排版后的稿件, 可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定; 学术研究成果具有创新性、科学性和先进性, 符合编辑部对刊文的录用要求, 不存在学术不端行为及其他侵权行为; 稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准, 正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性, 录用定稿一经发布, 不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容, 只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

**出版确认:** 纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司签约, 在《中国学术期刊(网络版)》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版, 以单篇或整期出版形式, 在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊(网络版)》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物(ISSN 2096-4188, CN 11-6037/Z), 所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

# 藻型湖泊溶解有机碳特征及其对甲烷排放的影响

肖启涛<sup>1\*</sup>, 廖远珊<sup>2</sup>, 刘臻婧<sup>1,3</sup>, 胡正华<sup>3</sup>

1. 中国科学院南京地理与湖泊研究所/中国科学院流域地理学重点实验室, 南京 210008;
2. 西北大学城市与环境学院, 西安 710127;
3. 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心, 南京 210044

**摘要:** 湖泊碳通量研究已成为全球碳循环研究的前沿和热点问题。本研究以太湖藻型湖区（西北湖区、梅梁湾、贡湖湾、西南湖区和湖心）为研究对象，基于为期一年的连续野外观测，旨在揭示富营养化湖泊 DOC 变化特征及其对 CH<sub>4</sub> 排放的影响。结果表明，太湖藻型湖区 DOC 质量浓度均值为 4.15 mg/L，且具有显著的空间变化。受外源输送和内部蓝藻增殖影响，西北湖区和梅梁湾 DOC 质量浓度较高，且其 DOC 时间变化与流域降雨量紧密相关，尤以西北湖区最为明显 ( $R^2=0.67, P<0.01$ )。但在受外源输送影响较小的湖心区域，其 DOC 的时间变化主要受蓝藻生物量驱动 ( $R^2=0.60, P<0.01$ )。太湖藻型湖区 CH<sub>4</sub> 排放均值为 0.083 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>，不同湖区 CH<sub>4</sub> 排放量差异明显。藻型湖区较高的蓝藻生物量显著提高了 CH<sub>4</sub> 的排放量，且 DOC 含量是蓝藻影响 CH<sub>4</sub> 产生和排放的主要因子。总体上，太湖藻型湖区 DOC 的累积致使其是 CH<sub>4</sub> 排放的热点区域，但 DOC 对 CH<sub>4</sub> 产生和排放的影响受湖泊内部因子和外部因子的综合调控，其潜在的控制机制还需要进一步探讨。

**关键词:** 富营养化湖泊；溶解有机碳；CH<sub>4</sub> 排放；时空变化

中图分类号：X524

收稿日期：2021-12-08

基金项目：国家自然科学基金（41801093，41971309）

作者简介：肖启涛，男，博士，研究方向为内陆水体温室气体循环及其控制机制。qtxiao@niglas.ac.cn

## Characteristic of dissolved organic carbon in algal-dominated lake and its influence on methane emission

XIAO Qitao<sup>1</sup>, LIAO Yuanshan<sup>2</sup>, LIU Zhenjing<sup>1,3</sup>, HU Zhenghua<sup>3</sup>

1. Key Laboratory of Watershed Geographic Science, Nanjing Institute of Geography and Limnology, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008;
2. College of Urban and Environmental Sciences, Northwest University, Xi'an 710127;
3. Collaborative Innovation Center on Forecast and Evaluation of Meteorological Disasters, Nanjing University of Information Science and Technology, Nanjing 210044

**Abstract:** The carbon cycle from lakes has been receiving great concerns and has become the frontier and hot issue. This study aimed at investigate the characteristic of dissolved organic carbon (DOC) and its influence on methane emission based on continuous field sampling in a year cycle from algal-dominated zones of Lake Taihu. Results showed the DOC with mean value of 4.15 mg/L varied spatially due to external input and internal algal blooms. Overall, peak DOC occurred in Northwest Zone and Meiliang Bay, and temporal variation of DOC in the two zones were associated with basin precipitation, especially for Northwest Zone ( $R^2=0.67, P<0.01$ ). It should be noted that the temporal variation of DOC in Central Zone were highly positively correlated with algal biomass most due to the less external input. The CH<sub>4</sub> diffusion emission flux with mean value of 0.083 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup> varied greatly across

zones. Algal blooms significantly stimulated the CH<sub>4</sub> emissions via increasing DOC concentration. Overall, the algal-dominated lake was hot spot of CH<sub>4</sub> emission due to DOC enrichment. Considering the effects of DOC on lake CH<sub>4</sub> emission was regulated by multiple factors related to internal metabolic activities and external loading, further studies are needed to reveal the potential control mechanism.

**Key words:** eutrophic lakes; dissolved organic carbon; CH<sub>4</sub> emission; temporal-spatial variability

## 0 引言

湖泊作为内陆水体的重要组成部分,与陆地生态系统发生强烈的物质和能量交换,也是流域碳等主要汇集场所。因此,湖泊是全球碳循环的重要结构单元,其碳通量研究已成为全球碳循环研究的前沿和热点问题<sup>[1-3]</sup>。碳生物地球化学循环过程在湖泊生态系统异常活跃,大量内源或者外源型碳在湖泊中经历分解、固定、埋藏和输出等过程,致使湖泊呈现出极其显著的碳源和碳汇等功能,影响区域和全球碳收支<sup>[4-6]</sup>。

湖泊水体中碳的赋存形态主要有溶解有机碳(DOC)、溶解无机碳(DIC)、颗粒有机碳(POC)和颗粒无机碳(PIC),其中DOC是主要的有机碳。DOC是湖泊生态系统食物网的重要组成成分,也是湖泊生态系统结构和功能的重要调节器<sup>[7-8]</sup>。水体DOC按其来源可分为外源性和内源性DOC,外源性DOC主要来自于流域输入,内源DOC主要来自于浮游植物光合作用产物的释放等<sup>[8,9]</sup>。相关研究表明在贫营养湖泊中,DOC来源主要以外源输入为主<sup>[10]</sup>,但在富营养化湖泊中,蓝藻暴发可促使DOC浓度升高,DOC以内源性为主<sup>[11]</sup>。另外,研究发现因富营养湖泊中蓝藻大量增值,其DOC浓度要显著高于其他湖泊<sup>[12-13]</sup>。考虑到全球湖泊普遍面临着富营养化问题,且湖泊蓝藻暴发呈现增长趋势<sup>[14]</sup>,为深入掌握湖泊碳循环机理和准确估算湖泊碳收支,藻型湖泊DOC来源、生物地球化学过程及其对浮游植物水华过程的响应需要进一步探究。

湖泊水体DOC丰富程度对温室气体产生和排放具有重要影响<sup>[15-16]</sup>。水体甲烷(CH<sub>4</sub>)温室气体产生和排放与DOC紧密相关,众多研究表明CH<sub>4</sub>与DOC浓度呈显著的正相关关系<sup>[1, 17-18]</sup>。水体DOC既可作为底物为CH<sub>4</sub>产生提供碳源,同时高DOC水体中氧气消耗快,减少CH<sub>4</sub>的氧化消耗<sup>[15, 19-20]</sup>。富营养湖泊是全球CH<sub>4</sub>的热点排放区域,受到越来越多的关注<sup>[21]</sup>。在富营养化湖泊中,营养盐等生源要素累积可刺激CH<sub>4</sub>产生和排放<sup>[22-23]</sup>,但同时藻类增殖提高了新鲜DOC含量,大量新鲜DOC很易降解并产生大量CH<sub>4</sub>气体<sup>[20, 24]</sup>。富营养湖泊DOC积累及其营养负荷对CH<sub>4</sub>排放的影响模式需要进一步明晰。

太湖位于我国长江中下游区域,是我国第三大淡水湖泊,同时也是湖泊水体出现富营养化问题最早的湖泊之一。近些年太湖蓝藻暴发频次和暴发范围均有明显上升趋势<sup>[25-26]</sup>,其碳循环及其控制过程也受到了极大的关注<sup>[27-31]</sup>。本研究以太湖为研究对象,基于为期一年的逐月野外调查,探讨藻型湖泊DOC变化特征及其对CH<sub>4</sub>排放影响,以期深入掌握富营养化湖泊碳循环过程的控制机理及其CH<sub>4</sub>排放的调控过程提供科学依据。

## 1 材料与方法

### 1.1 研究区域

太湖水域面积为2400 km<sup>2</sup>,平均水深为2 m,是典型的亚热带大型浅水湖泊。太湖流域横跨三省一市(江苏省、浙江省、安徽省和上海市),整个流域面积高达36895 km<sup>2</sup>,流域内水系发达,河网密布,河道长度高达1.2×10<sup>5</sup> km。另外,太湖及其流域受季风气候影响,四季分明,光照充足,温热条件好,降雨充沛,年降水量约1154 mm,夏季降水多且频繁<sup>[32]</sup>。近几十年来,由于流域经济的快速发展以及湖泊资源的不合理利用,太湖水体富营养化严重,

蓝藻水华频繁暴发。太湖水体生态和环境空间分异极大，藻型湖区和草型湖区共存<sup>[27, 28]</sup>。草型湖区主要位于太湖的东部（图1），水生植被丰富，水质良好，部分水域清澈见底。根据污染负荷输入和富营养化程度等，太湖藻型湖区可划分为5个部分，即梅梁湾、西北湖区、贡湖湾、湖心区和西南湖区（图1）。其中，梅梁湾位于太湖北边，是一个半封闭的湖湾，入湖河流给该区带来了较大的外源负荷输入；西北湖区周边有大量的入湖河流，入湖水量最多，同时入湖河流携带大量外源污染物汇集在该湖区；贡湖湾位于太湖的东北角，连接太湖流域“引江济太”的重要调水通道；湖心区域面积较大，水域开阔，受人为活动影响相对较低；西南湖区连接太湖主要的入湖河道，换水周期快，是浮游植被和沉水植被的过渡区。




图1 研究区域及采样点位介绍

Fig. 1 Geographic locations of study sites

## 1.2 水样采集和分析

本研究在太湖梅梁湾、西北湖区、贡湖湾，湖心区域和西南湖区等藻型湖区均匀设置21个采样点位（图1），进行为期一年的连续采样。在梅梁湾、西北湖区、贡湖湾，湖心区域采样频次为每月一次，西南湖区采样频次为每季度一次。每次采样时，基于GPS精准定位，到达每个采样点位，采集水样，用于水体溶解有机碳（DOC）分析。每次采样前先用待采湖水冲洗采样瓶，样品采集完成后，放入带有冰块的冷藏箱里，运回实验室水样经GF/F膜过滤后，通过总有机碳分析仪测定DOC浓度。

另外，在每个点位采集水样用于溶解CH<sub>4</sub>浓度分析。采样时保证水面没有扰动，采集水表以下约20cm处水样，装入已用待采水样冲洗的玻璃瓶中（体积为300 mL），待玻璃瓶装满水样后立即用丁基胶塞密封，确保瓶内无气泡。同时为保证气密性，用封口膜密封瓶塞和玻璃瓶的接口。采集水样在野外保存在冷藏箱中，带回实验室后立即进行预处理，处理流程如下：每个水样先用100mL的高纯氮气(摩尔分数≥99.999%)顶空，然后剧烈摇晃5min,摇晃完成后将玻璃瓶静置，使CH<sub>4</sub>气体在玻璃瓶顶空部分（气相）和剩余水样（液相）之间达到动态平衡，最后用带有三通阀的针筒抽取顶空中的CH<sub>4</sub>气样，通过气相色谱仪



测量其浓度。基于气相色谱仪测量的浓度，利用物料守恒原理计算水样溶解 CH<sub>4</sub> 的原始浓度<sup>[33]</sup>。基于野外采样获取的水体溶存 CH<sub>4</sub> 浓度，本研究利用水-气界面扩散模型计算 CH<sub>4</sub> 扩散通量( $F_m$ , mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>):

$$F_m = 0.001 \times k \times (C_w - C_{eq}), \quad (1)$$

式中: 0.001 是单位转换系数;  $C_w$  为水体 CH<sub>4</sub> 溶存浓度 (nmol·L<sup>-1</sup>), 由顶空平衡法计算得到;  $C_{eq}$  为特定温度下大气 CH<sub>4</sub> 浓度与水体表面 CH<sub>4</sub> 气体达到平衡时的浓度(nmol·L<sup>-1</sup>);  $k$  是水-气界面 CH<sub>4</sub> 气体的交换系数。已有研究表明在大型湖泊中, 水-气界面气体交换系数  $k$  值主要受风力驱动<sup>[34]</sup>, 因此本研究基于观测的风速计算水-气界面 CH<sub>4</sub> 气体交换速率, 计算公式<sup>[35]</sup>为

$$k = 0.24 \times (2.07 + 0.215 U_{10}^{1.7}) \times (S_c / 600)^{-n}, \quad (2)$$

式中: 0.24 是单位转换系数;  $S_c$  是无限纲 CH<sub>4</sub> 气体施密特数, 与水温相关;  $n$  是与风速相关的系数;  $U_{10}$  是 10 m 高度的风速 (m·s<sup>-1</sup>), 根据粗糙度和仪器的观测高度计算得到<sup>[32]</sup>, 同步风速数据由太湖中尺度通量观测网络提供<sup>[28]</sup>。计算得到 CH<sub>4</sub> 扩散通量为 ( $F_m$ ) 正值时表征水体是向大气 CH<sub>4</sub> 的排放源。

### 1.3 辅助观测

野外调查期间用 YSI 6600 多参数水质分析仪原位监测采样点位的水温、溶解氧 (DO) 和电导率 (Spc) 等指标, 同时测量每个点位的水深。另外, 采集水样用于营养盐和叶绿素 a (Chl-a) 的测定。本研究测定的水体营养盐主要包括总氮 (TN)、铵态氮 (NH<sub>3</sub>-N)、硝态氮 (NO<sub>3</sub>-N) 和总磷 (TP)。TN 测定采用过硫酸钾消解紫外分光光度法, TP 测定采用过硫酸钾消解钼酸铵分光光度法。水样经 GF/F 膜过滤后用于 NH<sub>3</sub>-N 和 NO<sub>3</sub>-N 测定, 其中, NH<sub>3</sub>-N 浓度测定采用纳氏试剂光度法, NO<sub>3</sub>-N 浓度采用流动分析仪 (荷兰 Skalar SAN<sup>++</sup> 型流动分析仪) 测定。Chl-a 采用 90% (体积分数) 热乙醇萃取分光光度法测量。本研究中的营养盐和 Chl-a 等数据由中国科学院太湖湖泊生态系统研究站提供。此外, 通过中国气象数据共享网 (<http://cdc.nmic.cn>) 收集和整理太湖上游区域两个气象站 (图 1) 的降雨等气象数据。

### 1.4 数据分析

分湖区 (梅梁湾、西北湖区、贡湖湾, 湖心区域和西南湖区) 统计分析观测数据以及计算得到的数据, 采用相关分析 (Person correlations) 方法分析不同指标在空间尺度和时间尺度上的相关性。基于观测的数据以及计算得到的数据, 采用 One-way ANOVA 分析比较不同数据组间的差异, 使用 LSD (Least-significant difference) 方法检验其差异是否显著 ( $P = 0.05$ )。

## 2 结果

### 2.1 DOC 空间变化及其影响因子

图 2 表征太湖藻型湖区 DOC 的空间变化特征。由图可知, DOC 浓度具有强烈的空间变化特征, 不同点位年均 DOC 质量浓度介于 3.19 mg/L 与 5.08 mg/L 之间, 均值为 4.15 mg/L。在湖区尺度上, 西北湖区 DOC 质量浓度最高 (4.85 mg/L), 其次为梅梁湾湖区 (4.50 mg/L) 和湖心区域 (4.27 mg/L), 贡湖湾和西南湖区 DOC 浓度则相对较低, 其质量浓度分别为 3.60 mg/L 和 3.50 mg/L。统计分析表明, 贡湖湾和西南湖区 DOC 显著 ( $P < 0.01$ ) 低于其他湖区

的 DOC 质量浓度。值得注意的是，西北湖区在河流入湖口处具有 DOC 质量浓度较高，但是贡湖湾和西南湖区河流入湖口的 DOC 质量浓度较低，其中年均 DOC 质量浓度最低值（3.19 mg/L）出现贡湖湾河流入湖口处。




图 2 观测期间 DOC 空间变化

Fig. 2 Spatial variation of DOC during sampling period

因藻类大量增殖和蓝藻水华暴发导致太湖藻型湖区具有较高的初级生产力，Chl-a 质量浓度高且具有显著的空间异质性。结果分析表明，太湖藻型湖区 DOC 的空间变化与 Chl-a 质量浓度呈显著正相关关系（图 3a），Chl-a 控制 57%的 DOC 质量浓度空间变化（ $R^2=0.57$ ， $P<0.01$ ）。太湖藻型湖区另一特点就是营养盐富集，氮磷负荷高，相关性分析表明 DOC 的空间变化也和总氮（TN）紧密相关（ $R^2=0.43$ ， $P<0.01$ ；图 3b）。逐步多元统计分析发现，Chl-a 和电导率（Spc）共同控制 77%的 DOC 空间变化（ $R^2=0.77$ ， $P<0.01$ ）。相关性分析是判断因果关系和驱动力的前提，以上分析结果表明 Chl-a 和 TN 等是驱动 DOC 空间变化的主要环境变量。




图 3 年均 DOC 质量浓度与 Chl-a(a)和 TN(b)的空间相关性

Fig. 3 Spatial correlation of annual mean DOC concentration against Chl-a (a) and TN (b)

## 2.2 DOC 的时间变化及其影响因素

连续采样表明在月尺度上 DOC 质量浓度波动明显。其中，西北湖区 DOC 质量浓度介于 3.22 mg/L 与 6.47 mg/L 之间，梅梁湾 DOC 质量浓度介于 3.28 mg/L 与 5.96 mg/L 之间，贡湖湾 DOC 质量浓度介于 1.50 mg/L 与 5.02 mg/L 之间，湖心区域 DOC 质量浓度介于 3.06 mg/L 与 5.52 mg/L 之间。富营养湖泊蓝藻生消过程可产生大量 DOC，影响水体 DOC 质量浓度变化<sup>[8]</sup>。本研究表明太湖西北湖区、梅梁湾和贡湖湾的 DOC 的季节波动与表征蓝藻生物量的 Chl-a 质量浓度无直接关联（图 4）。但是，在受外源负荷输入影响较小湖心区域，其 DOC 质量浓度月变化与 Chl-a 呈显著正相关关系（ $R^2=0.69$ ,  $P<0.01$ ；图 4d），表明蓝藻暴发是其 DOC 时间变化的主要驱动因子。




图4 月尺度西北湖区 (a)、梅梁湾 (b)、贡湖湾 (c) 和湖心区域 (d) DOC 与 Chl-a 的相关性

Fig. 4 Correlations between monthly DOC and Chl-a in Northwest Zone (a), Meiliang Bay (b), Gonghu Bay (c), and Central Zone (d)

太湖流域降雨充沛，大量降雨不仅补充了太湖水资源，同时也携带了大量外源负荷入湖<sup>[36]</sup>。西北湖区和梅梁湾是太湖上游地区的主要汇水区，其 DOC 质量浓度的季节波动与降雨量紧密相连(图 5)，尤其是在西北湖区，降雨量可解释其 67%的 DOC 变化( $R^2=0.67$ ,  $P<0.01$ )。但是在贡湖湾和湖心区域，DOC 的季节波动与降雨量无直接联系 (图 5)。值得注意的是，在半封闭的富营养化梅梁湾，降雨量与 TN、TP 和 Chl-a 共同控制 95%的 DOC 月际变化( $R^2=0.95$ ,  $P<0.05$ )。






图 5 月尺度西北湖区 (a)、梅梁湾 (b)、贡湖湾 (c) 和湖心区域 (d) DOC 浓度与降雨的相关性 (降雨量为采样前 5 日的雨量总和)

Fig. 5 Correlations between monthly DOC and precipitation in Northwest Zone (a), Meiliang Bay (b), Gonghu Bay (c), and Central Zone (d)

### 2.3 CH<sub>4</sub> 通量空间变化影响因子

湖泊水-气界面 CH<sub>4</sub> 扩散通量作为碳在水体流动转移的结果, 其变化特征受多种环境变量驱动。前期研究研究表明太湖 CH<sub>4</sub> 扩散通量具有极为显著的空间变化特征, 且藻型湖区是太湖 CH<sub>4</sub> 的“热点”排放区域。本研究表明太湖藻型湖区 CH<sub>4</sub> 扩散通量在空间尺度上介于 0.006 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup> 与 0.254 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup> 之间, 均值为 0.083 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>。结果分析表明 CH<sub>4</sub> 扩散通量的空间变化与 DOC 和 Chl-a 具有显著正相关关系 (图 5), 表明藻型湖区蓝藻暴发和 DOC 富集对 CH<sub>4</sub> 产生和排放有显著影响。逐步多元统计分析发现 DOC 与水深共同控制 59% 的 CH<sub>4</sub> 扩散通量的空间变化 ( $R^2=0.59$ ,  $P<0.01$ )。




图 6 CH<sub>4</sub> 排放通量与 DOC 和 Chl-a 的空间相关性

Fig. 6 Spatial correlation of DOC concentration against DOC (a) and Chl-a (b)

#### 2.4 CH<sub>4</sub> 通量时间变化及其影响因素

湖泊等水体 CH<sub>4</sub> 扩散通量往往具有极为显著的时间变化特征，明晰 CH<sub>4</sub> 通量时间变化的影响因素对深入掌握 CH<sub>4</sub> 循环过程及预测其未来变化尤为重要。逐月观测数据表明西北湖区、梅梁湾、贡湖湾和湖心区域 CH<sub>4</sub> 扩散通量变化明显（图 6）。其中，西北湖区 CH<sub>4</sub> 扩散通量最高为 0.506 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>，出现在 11 月，但最低值仅为 0.050 mmol·m<sup>-2</sup>·d<sup>-1</sup>，出现在 12 月；贡湖湾 CH<sub>4</sub> 通量表现出双峰特点，在 6 月和 9 月分别出现峰值 CH<sub>4</sub> 排放通量；梅梁湾和湖心两个湖区 CH<sub>4</sub> 扩散通量表现出显著的季节变化特征，即夏季 CH<sub>4</sub> 扩散排放通量最高，冬季最低。




图 7 不同湖区 CH<sub>4</sub> 扩散通量时间变化

Fig. 7 The temporal variation of CH<sub>4</sub> diffusion flux at Northwest Zone, Meiliang Bay, Gonghu By, and Central Zone

相关性分析表明，水温和溶解氧是梅梁湾和湖心区域 CH<sub>4</sub> 通量时间变化的重要影响因素（表 1）。此外，梅梁湾 CH<sub>4</sub> 通量时间变化与 TP 和 Chl-a 呈显著正相关关系，与 NO<sub>3</sub>-N 呈显著负相关关系。贡湖湾 CH<sub>4</sub> 通量在时间尺度上与水温呈显著正相关关系，与 TN 呈显著负相关关系。在湖心区域，CH<sub>4</sub> 通量与 NH<sub>3</sub>-N 和 TN 呈显著负相关关系。值得注意的是，未发现环境因子与西北湖区 CH<sub>4</sub> 通量具有显著的相关性，且四个湖区 CH<sub>4</sub> 通量的时间变化均与 DOC 无直接关联性。

表 1 不同湖区 CH<sub>4</sub> 通量与环境变量的时间相关性Table 1 Temporal correlations between CH<sub>4</sub> flux and environmental variables at the four zones

湖区	水温	DO	硝态氮	铵态氮	总磷	总氮	DOC	Chl-a	水深
西北湖区	0.05	-0.32	0.27	-0.04	-0.15	-0.11	-0.04	-0.12	-0.27
梅梁湾	0.78**	-0.54*	-0.65*	-0.46	0.77**	-0.45	0.34	0.70**	0.49
贡湖湾	0.53*	-0.48	-0.53	-0.49	-0.33	-0.54*	0.42	0.19	0.35
湖心区	0.77**	-0.61*	-0.71**	-0.55*	-0.30	-0.66*	0.34	0.30	-0.12

注: \*\*表示相关性在 0.01 水平上显著; \*表示相关性在 0.05 水平上显著。

### 3 讨论

#### 3.1 DOC 来源解析

DOC 是维持湖泊生态系统正常运转的关键物质, 调节和影响湖泊生态系统的结构和功能<sup>[7]</sup>。湖泊水体 DOC 时空异质性强, 且富营养化湖泊一般具有较高的 DOC 浓度<sup>[12-13]</sup>, 且湖泊 DOC 时空变化在很大程度上受其来源的影响, 因此辨识其 DOC 来源对全面理解湖泊碳循环和探究湖泊碳的生物地球化学过程具有重要意义。湖泊等水体 DOC 来源主要包括外源源输入和内源产生, 其中外源输入受流域初级生产力和分解速率的共同控制, 且与流域来水量密切相关<sup>[13, 37-39]</sup>。流域降雨是太湖水量主要补给方式, 本研究发现西北湖区和梅梁湾 DOC 季节变化与降雨量呈现显著正相关关系 (图 5), 表明外源输入驱动着这两个湖区 DOC 的时间变化。另外在空间尺度上, DOC 与 TN 也具有显著的正相关关系 (图 2), 考虑到太湖氮负荷主要来自于外源输送<sup>[40-41]</sup>, 且流域碳氮输入具有共变特征<sup>[29, 42]</sup>, 这也从另一方面说明外源输送是太湖藻型湖区 DOC 的主要来源方式。

富营养化湖泊蓝藻暴发也与 DOC 浓度变化密切相关, 是 DOC 的主要内源产生途径<sup>[8]</sup>。相关研究发现湖泊 DOC 来源存在季节性变化规律, 蓝藻暴发期间 DOC 产生速率高, 且主要来源是内源性碳<sup>[8, 43-44]</sup>。本研究发现 DOC 的空间变化与 Chl-a 呈显著正相关关系, 表明蓝藻暴发可显著增加 DOC 浓度。但是, 在严重富营养化的西北湖区和富营养化的梅梁湾湖区, DOC 浓度的季节变化与 Chl-a 无直接关联性, 这与之前相关研究有所不同<sup>[8-9]</sup>。考虑到西北湖区和梅梁湾接收了大量的流域外源负荷, 高强度的外源输入可能显著增加水体 DOC 的外源比例<sup>[38]</sup>, 致使内源性碳对 DOC 季节变化的影响相对较低。值得注意的是, 在受外源输入影响较低的湖心区域, 其 DOC 的季节变化主要受 Chl-a 驱动 (图 4 和图 5), 表明内源性碳是其 DOC 主要来源途径。因此, 太湖水体不同来源 DOC 的贡献比例在不同湖区之间有所不同。

湖泊等水体 DOC 含量受到多重因素的综合影响, 不同水体不同因素的影响程度不同。早期研究表明贫营养化湖泊因其生产力较低, DOC 来源以外源性为主<sup>[10]</sup>, 本研究表明在富营养化湖区, 尤其是在西北湖区, DOC 季节波动受流域降雨量驱动 (图 5), 表明外源输入对 DOC 含量变化影响显著, 即在藻型高生产力湖泊中, 外源性 DOC 的贡献也可能较显著。值得注意的是, 尽管西南湖区和贡湖湾也连通太湖的主要入湖河道 (图 1), 但其 DOC 浓度受外源输入影响相对较低 (图 5), 其主要原因可能源于流域特征<sup>[38-39]</sup>。与西北湖区和梅梁湾相比, 西南湖区和贡湖湾上游区域受人为干扰强度相对较低, 其入湖河流 DOC 和污染物浓度较低<sup>[45]</sup>, 致使外源性碳贡献不显著。此外, 西南湖区和贡湖湾蓝藻生物量相对较低<sup>[29]</sup>, 进一步致使其内 DOC 含量显著 ( $P<0.01$ ) 低于其他湖区 DOC 含量 (图 2)。因此, 在开展湖泊等水体 DOC 来源辨识研究中应考虑自然和人为等多种因素的综合影响。

### 3.2 不同湖区 CH<sub>4</sub> 通量的驱动因子

湖泊等水-气界面 CH<sub>4</sub> 扩散排放构成了全球碳循环的重要环节<sup>[2]</sup>, 明确其 CH<sub>4</sub> 排放变化特征及其控制因素对完善湖泊碳循环过程的基本理论有着重要作用。基于为期一年的观测表明, 太湖藻型湖区 CH<sub>4</sub> 扩散通量时间变化特征极为显著 (图 6)。湖泊等水体 CH<sub>4</sub> 产生和排放有很强的温度依赖性<sup>[16, 46]</sup>, 受季风气候影响, 太湖水温具有强烈的季节变化特征, 高水温出现在夏季, 低水温出现在冬季, 且不同湖区间水温无显著差异<sup>[27, 47]</sup>。统计分析表明水温与梅梁湾、湖心和贡湖湾 CH<sub>4</sub> 通量呈显著正相关关系 (表 1), 表明水温是其 CH<sub>4</sub> 通量变化的关键影响因子。此外, 这三个湖区 CH<sub>4</sub> 通量与 N 负荷呈显著负相关关系, 考虑到不同生境下 N 负荷与 CH<sub>4</sub> 通量的关系较为复杂<sup>[15]</sup>, 本研究中的负相关关系可能源于在暖季 CH<sub>4</sub> 通量较高时, 因较强的硝化和反硝化作用, 水体 N 负荷出现低值<sup>[48]</sup>。

富营养化湖泊较高的蓝藻生物量被认为可显著提高 CH<sub>4</sub> 的排放水平<sup>[21]</sup>。本研究发现仅梅梁湾的 CH<sub>4</sub> 扩散时间变化与 Chl-a 呈显著正相关关系 (表 1)。梅梁湾是半封闭的港湾, 且在蓝藻暴发的夏季因盛行风向的影响, 蓝藻很容易在梅梁湾聚集, 藻类繁殖和聚集为 CH<sub>4</sub> 产生提供有利条件, 致使 Chl-a 和 CH<sub>4</sub> 通量呈显著正相关关系<sup>[49]</sup>。尽管西北湖区 Chl-a 浓度很高, 但其连接众多入湖河道 (图 1), 入湖水量大, 已有研究表明水体 CH<sub>4</sub> 水平与流量呈负相关关系<sup>[15, 50]</sup>, 流量稀释效应可能“掩盖掉”Chl-a 对 CH<sub>4</sub> 通量的直接影响作用。此外, 与之前研究相同<sup>[16]</sup>, 本研究也发现 CH<sub>4</sub> 通量与 DO 呈显著的负相关关系 (表 1)。值得注意的是, 蓝藻暴发可提高湖泊水体 DO 含量<sup>[51]</sup>, 进而增加水体 CH<sub>4</sub> 的氧化消耗量, 降低 CH<sub>4</sub> 排放量。鉴于湖泊 CH<sub>4</sub> 的产生和排放是一个复杂动态过程, 为明晰蓝藻暴发对 CH<sub>4</sub> 排放的影响及其驱动机制, 需考虑水体自身特性、理化性质、水动力因素和生物因素等多种因素的综合作用。

### 3.3 DOC 与 CH<sub>4</sub> 排放的关联性

水体 DOC 为 CH<sub>4</sub> 产生提供碳源, 因此与 CH<sub>4</sub> 排放关系密切<sup>[17, 52]</sup>。本研究结果表明, 藻型湖泊 CH<sub>4</sub> 排放通量的空间变化主要受水体 DOC 质量浓度控制 (图 5), 富营养化湖区 DOC 质量浓度较高, 其 CH<sub>4</sub> 排放量也明显较高, 这与其他研究结果相一致<sup>[22, 49]</sup>。例如在湖区尺度上, 西北湖区 DOC 质量浓度最高 (图 2), 其 CH<sub>4</sub> 排放量 (均值  $0.185 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ ) 远高于低 DOC 含量的湖心 (均值  $0.028 \text{ mmol} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{d}^{-1}$ ) 等区域 CH<sub>4</sub> 排放量。富营养化湖泊藻类繁殖提高新鲜 DOC 供给, 这部分新鲜 DOC 不稳定, 转化周期短, 可很快被微生物分解利用<sup>[8]</sup>, 为 CH<sub>4</sub> 原位产生提供基质, 导致富营养化藻型湖区是 CH<sub>4</sub> 热点排放区域<sup>[24, 53]</sup>。DOC 可能是蓝藻生消过程影响 CH<sub>4</sub> 产生和排放的主要因子, 即藻类通过释放 DOC 促进 CH<sub>4</sub> 排放。同时, CH<sub>4</sub> 排放往往出现在藻类衰亡释放 DOC 之后, 而此时 Chl-a 已降到较低水平<sup>[24]</sup>, 很可能致使 CH<sub>4</sub> 通量与 Chl-a 在大部分湖区没有显著相关性 (表 1)。此外, 相关研究表明 DOC 的分解可进一步消耗水体中氧气, 减少 CH<sub>4</sub> 的氧化消耗<sup>[15, 23]</sup>。综上所述, 藻型湖泊 DOC 的累积有利于形成 CH<sub>4</sub> 排放热点。

DOC 等有机质影响湖泊等水体 CH<sub>4</sub> 排放的主要作用机制是为 CH<sub>4</sub> 产生提供直接碳源, 但这种影响可能因湖泊所处流域 DOC 来源途径、丰富程度和地理位置不同而呈现差异。尽管研究表明 DOC 增加能显著刺激水体 CH<sub>4</sub> 产生和排放<sup>[15, 52]</sup>, 但本研究结果表明不同湖区 CH<sub>4</sub> 的时间变化均与 DOC 无直接关联。这可能主要是因为水体有机质的生物有效性和腐殖质组成等影响 CH<sub>4</sub> 产生, 已有研究表明藻型湖泊溶解有机质中微生物代谢类腐殖质和类蛋白是 CH<sub>4</sub> 通量变化的最佳解释变量<sup>[54]</sup>。由于内陆湖泊等水体有机质的组成及其生物有效性极易受到人类活动 (城市化、生活排污和农业面源污染等) 影响, 因此研究 DOC 等有机质与 CH<sub>4</sub> 排放的关系时, 不仅需要关注 DOC 等有机质含量与 CH<sub>4</sub> 产生的关系, 更应该开展有机



质组成与 CH<sub>4</sub> 产生和排放的影响<sup>[15]</sup>。此外, DOC 降解是藻型湖泊 CH<sub>4</sub> 产生的主要途径,但相关研究表明磷素有效性是控制水体 DOC 降解的关键因素<sup>[55]</sup>。本研究也发现在富含 DOC 的梅梁湾,其 CH<sub>4</sub> 通量与 TP 呈现显著正相关关系,进一步表明 DOC 对 CH<sub>4</sub> 排放的影响可能受磷素等其他因子的调控。综上,DOC 对湖泊 CH<sub>4</sub> 产生和排放的影响受到一系列外部和内部因子直接和间接的综合调控,后续研究需要考虑多因素的综合控制效应,以明晰 DOC 与 CH<sub>4</sub> 排放通量之间的关联性。

## 4 结论

太湖藻型湖区 DOC 质量浓度均值为 4.15 mg/L,但具有显著的时空变化特征。受外源输送和内部蓝藻类增殖的影响,西北湖区和梅梁湾 DOC 浓度较高,且其 DOC 时间变化与流域降雨量紧密相关,但在受外源输送影响较小的湖心区域,其 DOC 的时间变化主要受蓝藻生物量驱动。太湖藻型湖区较高的蓝藻生物量显著提高了 CH<sub>4</sub> 的排放通量,且 DOC 含量是蓝藻影响 CH<sub>4</sub> 产生和排放的主要因子。总体上,太湖藻型湖区 DOC 的累积致使其是 CH<sub>4</sub> 排放的热点,但 DOC 对 CH<sub>4</sub> 产生和排放的影响受湖泊内部因子和外部因子的综合调控,其潜在的控制机制和具体的关联性还需要进一步探讨。

## 参考文献

### References

- [1] Tranvik L J, Downing J A, Cotner J B, et al. Lakes and reservoirs as regulators of carbon cycling and climate[J]. *Limnology and Oceanography*, 2009, 54(6): 2298-2314
- [2] Bastviken D, Tranvik L J, Downing J A, et al. Freshwater methane emissions offset the continental carbon sink[J]. *Science*, 2011, 331(6013): 50-50
- [3] Raymond P A, Hartmann J, Lauerwald R, et al. Global carbon dioxide emissions from inland waters[J]. *Nature*, 2013, 503(7476): 355-359
- [4] Lapierre J-F, Guillemette F, Berggren M, et al. Increases in terrestrially derived carbon stimulate organic carbon processing and CO<sub>2</sub> emissions in boreal aquatic ecosystems[J]. *Nature Communications*, 2013, 4(1): 171-184
- [5] Borges A V, Darchambeau F, Teodoru C R. Globally significant greenhouse-gas emissions from African inland waters[J]. *Nature Geoscience*, 2015, 8(8): 637-642
- [6] Holgersson M, Raymond P. Large contribution to inland water CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> emissions from very small ponds[J]. *Nature Geoscience*, 2016, 9(3): 222-229
- [7] Sobek S, Tranvik L J, Prairie Y T, et al. Patterns and regulation of dissolved organic carbon: an analysis of 7,500 widely distributed lakes[J]. *Limnology and Oceanography*, 2007, 52(3): 1208-1219
- [8] 叶琳琳,孔繁翔,史小丽,等.富营养化湖泊溶解性有机碳生物可利用性研究进展[J].*生态学报*,2014,34(4):779-788
- YE Linlin, KONG Fanxiang, SHI Xiaoli, et al. The bioavailability of dissolved organic carbon in the eutrophic lakes[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2014, 34(4): 779-788
- [9] 杨平,唐晨,陆苗慧,等.亚热带河口区水库 DOC 和 DIC 浓度时空变化特征[J].*湖泊科学*,2021,33(4): 1123-1137
- YANG Ping, TANG Chen, LU Miaohui, et al. Spatialtemporal variations in water dissolved organic carbon and dissolved inorganic carbon concentrations in Wenwusha Reservoir in subtropical estuary, Southwest China[J]. *Journal of Lake Sciences*, 2021, 33(4): 1123-1137
- [10] Carpenter S R, Cole J J, Pace M L, et al. Ecosystem subsidies: terrestrial support of aquatic food webs from <sup>13</sup>C addition to contrasting lakes[J]. *Ecology*, 2005. 86(10): 2737-2750



- [11] Baines S B, Pace M L. The production of dissolved organic matter by phytoplankton and its importance to bacteria: Patterns across marine and freshwater systems[J]. *Limnology and Oceanography*, 1991, 36(6): 1078-1090
- [12] Pacheco F S, Roland F, Downing J A. Eutrophication reverses whole-lake carbon budgets[J]. *Inland Waters*, 2014, 4(1): 41-48
- [13] Song K, Wen Z, Shang Y, et al. Quantification of dissolved organic carbon (DOC) storage in lakes and reservoirs of mainland China.[J]. *Journal of environmental management*, 2018, 217: 391-402
- [14] Ho J C, Michalak A M, Pahlevan N, et al. Widespread global increase in intense lake phytoplankton blooms since the 1980s[J]. *Nature*, 2019, 574(7780): 667-670
- [15] 王晓锋,袁兴中,陈槐,等. 河流 CO<sub>2</sub> 与 CH<sub>4</sub> 排放研究进展[J].*环境科学*,2017,38(12):5352-5366  
WANG Xiaofeng, YUAN Xingzhong, CHEN Huai, et al. Review of CO<sub>2</sub> and CH<sub>4</sub> emissions from rivers[J]. *Environmental Science*, 2017,38(12):5352-5366
- [16] 杨平,全川.淡水水生生态系统温室气体排放的主要途径及影响因素研究进展[J].*生态学报*,2015,35(20):6868-6880  
YANG Ping, TONG Chuan.. Emission paths and measurement methods for greenhouse gas fluxes from freshwater ecosystems: a review[J]. *Acta Ecologica Sinica*, 2015,35(20):6868-6880
- [17] Stanley E H, Casson N J, Christel S T, et al. The ecology of methane in streams and rivers: patterns, controls, and global significance[J]. *Ecological Monographs*, 2016, 86(2): 146-171
- [18] Zhang L, Xia X, Liu S, et al. Significant methane ebullition from alpine permafrost rivers on the East Qinghai-Tibet Plateau[J]. *Nature Geoscience*, 2020. 13(5): 349-354
- [19] 商东耀,肖启涛,胡正华,等.富营养化湖区 CH<sub>4</sub> 排放特征及其影响因素[J].*环境科学*,2018,39(11):5227-5236  
SHANG Dongyao, XIAO Qitao, HU Zhenghua, et al. CH<sub>4</sub> emissions characteristics and its influencing factors in an eutrophic lake[J]. *Environmental Science*, 2018,39(11):5227-5236
- [20] 吴庆龙,邢鹏,李化炳,等.草藻型稳态转换对湖泊微生物结构及其碳循环功能的影响[J].*微生物学通报*,2013,40(1):87-97  
WU Qinglong, XING Peng, LI Huabing, et al. Impacts of regime shift between phytoplankton and macrophyte on the microbial community structure and its carbon cycling in lakes[J]. *Microbiology China*, 2013,40(1):87-97
- [21] Beaulieu J J, DelSontro T, Downing J A. Eutrophication will increase methane emissions from lakes and impoundments during the 21st century[J]. *Nature Communications*, 2019, 10(1): 171-184
- [22] 张佩,王晓锋,袁兴中.中国淡水生态系统甲烷排放基本特征及研究进展[J].*中国环境科学*,2020,40(8):3567-3579  
ZHANG Pei, WANG Xiaofeng, YUAN Xingzhong. General characteristics and research progress of methane emissions from freshwater ecosystems in China[J]. *China Environmental Science*, 2020,40(8):3567-3579
- [23] Huttunen J T, Alm J, Liikanen A, et al. Fluxes of methane, carbon dioxide and nitrous oxide in boreal lakes and potential anthropogenic effects on the aquatic greenhouse gas emissions[J]. *Chemosphere*, 2003, 52(3): 609-621
- [24] 刘艺,许浩康,毛羽丰,等.铜绿微囊藻衰亡过程中产甲烷动态及关键影响因子[J].*土木与环境工程学报*,2019,41(5):132-140  
LIU Yi, XU Haolian, MAO Yufeng, et al. Methane-producing dynamics and key influencing factors during the decay of *Microcystis aeruginosa*[J]. *Journal of Civil and Environmental Engineering*, 2019,41(5):132-140
- [25] 朱广伟,秦伯强,张运林,等.2005–2017 年北部太湖水体叶绿素 a 和营养盐变化及影响因素[J].*湖泊科学*,2018,30(2):279-295  
ZHU Guangwei, QIN Boqiang, ZHANG Yunlin, et al. Variations and driving factors of nutrients and chlorophyll-a concentrations in northern region of Lake Taihu, China, 2005–2017[J]. *Journal of Lake Sciences*, 2018,30(2):279-29.
- [26] Shi K, Zhang Y, Zhang Y, et al. Phenology of phytoplankton blooms in a trophic lake observed from long-term MODIS data[J]. *Environmental Science & Technology*, 2019, 53(5): 2324-2331
- [27] Xiao Q, Zhang M, Hu Z, et al. Spatial variations of methane emission in a large shallow eutrophic lake in subtropical climate[J]. *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*, 2017, 122(7): 1597-1614
- [28] Lee X, Liu S, Xiao W, et al.. The Taihu eddy flux network: an observational program on energy, water, and greenhouse gas fluxes of a large freshwater lake[J]. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2014, 95(10): 1583-1594
- [29] Xiao Q, Xu X, Duan H, et al. Eutrophic Lake Taihu as a significant CO<sub>2</sub> source during 2000–2015[J]. *Water Research*, 2020, 170: 115331.

- [30] 肖启涛. 太湖 CH<sub>4</sub> 通量的空间格局及影响因子分析[D].南京:南京信息工程大学,2017
- XIAO Qitao. Spatial pattern of CH<sub>4</sub> flux and its impact factors analysis in Lake Taihu [D]. Nanjing: Nanjing University of Information Science and Technology, 2017
- [31] Qi T, Xiao Q, Cao Z, et al. Satellite estimation of dissolved carbon dioxide concentrations in China's Lake Taihu[J]. Environmental Science & Technology, 2020, 54(21): 13709-13718
- [32] 肖启涛. 太湖水-气界面温室气体 (CO<sub>2</sub>、CH<sub>4</sub>、N<sub>2</sub>O) 通量研究[D].南京:南京信息工程大学,2014
- XIAO Qitao. Study on greenhouse gases (CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, and N<sub>2</sub>O) fluxes of water-air interface in Lake Taihu [D]. Nanjing: Nanjing University of Information Science and Technology, 2014
- [33] 肖启涛,胡正华,James Deng,等.杀菌剂对湖泊水体温室气体浓度分析的影响[J].环境科学,2014,35(1):356-364
- XIAO Qitao, HU Zhenghua, DENG J, et al. Effects of antiseptic on the analysis of greenhouse gases concentrations in lake water[J]. Environmental Science, 2014, 35(1) : 356-364
- [34] 肖启涛,张弥,胡正华,等.基于不同模型的大型湖泊水-气界面气体传输速率估算[J].湖泊科学,2018,30(3):790-801
- XIAO Qitao, ZHANG Mi, HU Zhenghua, et al. Estimate of gas transfer velocity between water-air interface in a large lake based on different models: a case study of Lake Taihu [J]. Journal of Lake Sciences, 2018, 30(3): 790-801
- [35] Cole J J, Caraco N F. Atmospheric exchange of carbon dioxide in a low-wind oligotrophic lake measured by the addition of SF<sub>6</sub>[J]. Limnology and Oceanography, 1998, 43(4): 647-656
- [36] 秦伯强.浅水湖泊湖沼学与太湖富营养化控制研究[J].湖泊科学,2020,32(5):1229-1243
- QIN Boqiang. Shallow lake limnology and control of eutrophication in Lake Taihu[J]. Journal of Lake Sciences, 2020,32(5):1229-1243
- [37] 开金磊,王君波,黄磊,等.西藏纳木错及其入湖河流溶解有机碳和总氮浓度的季节变化[J].湖泊科学,2019,31(4):1099-1108
- KAI Jinlei, WANG Junbo, HUANG Lei, et al. Seasonal variations of dissolved organic carbon and total nitrogen concentrations in Nam Co and inflowing rivers, Tibet Plateau[J]. Journal of Lake Sciences, 2019,31(4):1099-1108
- [38] 周苗,李思亮,丁虎,等.地表流域有机碳地球化学研究进展[J].生态学杂志,2018,37(1):255-264
- ZHOU Miao, LI Siliang, DING Hu, et al. Advances in study on organic carbon characteristics in the riverine systems[J]. Chinese Journal of Ecology, 2018,37(1):255-264
- [39] 赖曼婷,钟君,王万发,等.白龙江溶解有机碳的空间分布、来源及其控制因素探究[J].地球与环境,2021,49(3):227-237
- LAI Manting, ZHONG Jun, WANG Wanfa, et al. Spatial distribution, sources and controlling factors of dissolved organic carbon of Bailong River[J]. Earth and Environment, 2021,49(3):227-237
- [40] Qin B, Xu P, Wu Q, et al. Environmental issues of Lake Taihu, China[J]. Hydrobiologia, 2007, 581(1): 3-14
- [41] Xiao Q, Xu X, Zhang M, et al. Coregulation of nitrous oxide emissions by nitrogen and temperature in China's third largest freshwater lake (Lake Taihu)[J]. Limnology and Oceanography, 2019, 64(3): 1070-1086
- [42] Perga M-E, Maberly S C, Jenny J-P, et al. A century of human-driven changes in the carbon dioxide concentration of lakes[J]. Global Biogeochemical Cycles, 2016, 30(2): 93-104
- [43] Sugiyama Y, Anegawa A, Kumagai T, et al. Distribution of dissolved organic carbon in lakes of different trophic types[J]. Limnology, 2004, 5(3) : 165-176
- [44] Xiao Q, Duan H, Qi T, et al. Environmental investments decreased partial pressure of CO<sub>2</sub> in a small eutrophic urban lake: Evidence from long-term measurements[J]. Environmental Pollution, 2020, 263: 114433
- [45] 燕姝雯,余辉,张璐璐,等.2009 年环太湖入出湖河流量及污染负荷通量[J].湖泊科学,2011,23(6):855-862
- YAN Shuwen, YU Hui, ZHANG Lulu, et al. Water quantity and pollutant fluxes of inflow and outflow rivers of Lake Taihu, 2009[J]. Journal of Lake Sciences, 2011,23(6): 855-862
- [46] Yvon-Durocher G, Allen A P, Bastviken D, et al. Methane fluxes show consistent temperature dependence across microbial to ecosystem scales[J]. Nature, 2014, 507(7493): 488-491
- [47] 肖启涛,胡正华,张弥,等.水力调控对湖泊甲烷扩散通量的影响[J].湖泊科学,2021,33(2):561-570
- XIAO Qitao, HU Zhenghua, ZHANG Mi, et al. Effects of water diversion on methane diffusion flux across the water-air interface in lakes[J]. Journal of Lake Sciences, 2021,33(2):561-570

- [48] Xu H, Paerl H W, Qin B, et al. Nitrogen and phosphorus inputs control phytoplankton growth in eutrophic Lake Taihu, China[J]. *Limnology and Oceanography*, 2010, 55(1): 420-432
- [49] Wen Z, Song K, Zhao Y, et al. Carbon dioxide and methane supersaturation in lakes of semi-humid/semi-arid region, Northeastern China[J]. *Atmospheric Environment*, 2016, 138: 65-73
- [50] Kone Y J M, Abril G, Delille B, et al. Seasonal variability of methane in the rivers and lagoons of Ivory Coast (West Africa)[J]. *Biogeochemistry*, 2010, 100(1/2/3): 21-37
- [51] Jane S F, Hansen G J A, Kraemer B M, et al. Widespread deoxygenation of temperate lakes[J]. *Nature*, 2021, 594(7861): 66-70
- [52] Crawford J T, Stanley E H. Controls on methane concentrations and fluxes in streams draining human-dominated landscapes[J]. *Ecological Applications*, 2016, 26(5): 1581-1591
- [53] West W E, Coloso J J, Jones S E. Effects of algal and terrestrial carbon on methane production rates and methanogen community structure in a temperate lake sediment[J]. *Freshwater Biology*, 2012, 57(5): 949-955
- [54] 荀凡,杜先,陈新芳,等.秋季连续打捞蓝藻对水-气界面温室气体通量的影响[J].*湖泊科学*,2020,32(6):1707-1722
- XU Fan, DU Xian, CHEN Xinfang, et al. Effects of continuous cyanobacterial salvaging on greenhouse gas flux on water-air interface in autumn[J]. *Journal of Lake Sciences*, 2020,32(6):1707-1722
- [55] Mao R, Chen H, Li S. Phosphorus availability as a primary control of dissolved organic carbon biodegradation in the tributaries of the Yangtze River in the Three Gorges Reservoir Region[J]. *Science of the Total Environment*, 2017, 574: 1472-1476