

---

compat=1.18

# 切线放缩不等关系常用结论笔记

Gemini – 高中数学导数应用复习

2025 年 11 月 16 日

## 摘要

本文档旨在为高中阶段学习导数的同学，提供一份关于利用函数切线思想（即“切线放缩”）证明不等式的综合性复习笔记。我们将通过详尽的解释、严谨的数学证明以及直观的函数图像，系统梳理一系列在解题中频繁出现的经典不等式。掌握这些结论与方法，将有助于提升逻辑推理与数学运算的核心素养，从容应对考试中的导数压轴题。

## 目录

## 第 1 节 引言：切线放缩思想的核心

在处理与函数相关的不等式证明问题时，尤其是对于超越函数（如指数、对数、三角函数），直接进行代数上的比较往往非常困难。导数的引入为我们提供了强有力的工具——利用函数的单调性与极值。

“切线放缩”是这一思想下的一个具体且高效的策略。其核心在于：

- **几何上**，对于一个（在某区间内）的凸函数或凹函数，其图像完全位于其任意一点切线的上方或下方。
- **代数上**，这意味着函数  $f(x)$  的值，总是不小于（或不大于）其在某点  $x_0$  处的切线函数  $L(x) = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$  的值。

因此，通过构造合适的函数，并找到其在关键点（通常是等号成立的点）的切线，我们可以建立一个一边是原函数，另一边是更简单的线性函数的不等关系，从而达到证明或解题的目的。这种方法，我们称之为 **切线放缩法**。

接下来，我们将逐一探讨那些最为经典和实用的切线放缩不等式。

## 第 2 节 指数函数相关不等式

### 2.1 $e^x \geq x + 1$

不等式 1. 对于任意实数  $x \in \mathbb{R}$ ，恒有  $e^x \geq x + 1$ ，当且仅当  $x = 0$  时等号成立。

#### 几何直观

该不等式表明，函数  $f(x) = e^x$  的图像恒在其切点  $(0, 1)$  处的切线  $y = x + 1$  的上方（除切点外）。

#### 演绎证明

证明. 欲证  $e^x \geq x + 1$ ，即证  $e^x - x - 1 \geq 0$ 。

构造辅助函数  $g(x) = e^x - x - 1$ 。

- 对  $g(x)$  求导，得  $g'(x) = e^x - 1$ 。
- 令  $g'(x) = 0$ ，解得  $x = 0$ 。
- 当  $x \in (-\infty, 0)$  时， $g'(x) < 0$ ，故  $g(x)$  在该区间上单调递减。
- 当  $x \in (0, +\infty)$  时， $g'(x) > 0$ ，故  $g(x)$  在该区间上单调递增。
- 函数  $g(x)$  在  $x = 0$  处取得全局最小值。
- $g_{\min}(x) = g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0$ 。
- 对于任意  $x \in \mathbb{R}$ ，恒有  $g(x) \geq 0$ ，即  $e^x - x - 1 \geq 0$ 。

故原不等式  $e^x \geq x + 1$  成立，当且仅当  $x = 0$  时取等号。 □

#### 函数图像

$$xyf(x) = e^x y = x + 1$$

## 2.2 $e^x \geq ex$

不等式 2. 对于任意实数  $x \in \mathbb{R}$ , 恒有  $e^x \geq ex$ , 当且仅当  $x = 1$  时等号成立。

### 几何直观

该不等式表明, 函数  $f(x) = e^x$  的图像恒在其切点  $(1, e)$  处的切线  $y = ex$  的上方 (除切点外)。

### 演绎证明

证明. 欲证  $e^x \geq ex$ 。由于  $e > 0$ ,  $x$  可以为负, 直接作差不易。

当  $x \leq 0$  时,  $e^x > 0$ ,  $ex \leq 0$ , 不等式显然成立。

当  $x > 0$  时, 两边取自然对数, 原不等式等价于  $x \geq \ln(ex) = 1 + \ln x$ , 即  $x - \ln x - 1 \geq 0$ 。

构造辅助函数  $h(x) = x - \ln x - 1$ ,  $x \in (0, +\infty)$ 。

□ 对  $h(x)$  求导, 得  $h'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$ 。

□ 令  $h'(x) = 0$ , 解得  $x = 1$ 。

□ 当  $x \in (0, 1)$  时,  $h'(x) < 0$ , 故  $h(x)$  在该区间上单调递减。

□ 当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $h'(x) > 0$ , 故  $h(x)$  在该区间上单调递增。

□ 函数  $h(x)$  在  $x = 1$  处取得全局最小值。

□  $h_{\min}(x) = h(1) = 1 - \ln 1 - 1 = 0$ 。

□ 对于任意  $x > 0$ , 恒有  $h(x) \geq 0$ , 即  $x - \ln x - 1 \geq 0$ 。

综上所述, 原不等式  $e^x \geq ex$  成立, 当且仅当  $x = 1$  时取等号。

□

### 函数图像

$$xyf(x) = e^x y = ex$$

## 第 3 节 对数函数相关不等式

### 3.1 $\ln x \leq x - 1$

不等式 3. 对于任意正实数  $x > 0$ ，恒有  $\ln x \leq x - 1$ ，当且仅当  $x = 1$  时等号成立。

#### 几何直观

该不等式表明，函数  $f(x) = \ln x$  的图像恒在其切点  $(1, 0)$  处的切线  $y = x - 1$  的下方（除切点外）。

#### 演绎证明

证明. 欲证  $\ln x \leq x - 1$ ，即证  $\ln x - x + 1 \leq 0$ 。

构造辅助函数  $g(x) = \ln x - x + 1$ ， $x \in (0, +\infty)$ 。

- 对  $g(x)$  求导，得  $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ 。
- 令  $g'(x) = 0$ ，解得  $x = 1$ 。
- 当  $x \in (0, 1)$  时， $g'(x) > 0$ ，故  $g(x)$  在该区间上单调递增。
- 当  $x \in (1, +\infty)$  时， $g'(x) < 0$ ，故  $g(x)$  在该区间上单调递减。
- 函数  $g(x)$  在  $x = 1$  处取得全局最大值。
- $g_{\max}(x) = g(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$ 。
- 对于任意  $x > 0$ ，恒有  $g(x) \leq 0$ ，即  $\ln x - x + 1 \leq 0$ 。

故原不等式  $\ln x \leq x - 1$  成立，当且仅当  $x = 1$  时取等号。

□

#### 函数图像

$$xyf(x) = \ln xy = x - 1$$

### 3.2 $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$

不等式 4. 对于任意正实数  $x > 0$ , 恒有  $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ , 当且仅当  $x = 1$  时等号成立。

#### 几何直观

这个不等式并非直接的切线放缩。但其证明方法与切线放缩法同源, 都是通过构造函数求导分析单调性与最值。

#### 演绎证明

证明. 欲证  $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$ , 即证  $\ln x - 1 + \frac{1}{x} \geq 0$ 。

构造辅助函数  $h(x) = \ln x - 1 + \frac{1}{x}$ ,  $x \in (0, +\infty)$ 。

- 对  $h(x)$  求导, 得  $h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x-1}{x^2}$ 。
- 令  $h'(x) = 0$ , 解得  $x = 1$ 。
- 当  $x \in (0, 1)$  时,  $h'(x) < 0$ , 故  $h(x)$  在该区间上单调递减。
- 当  $x \in (1, +\infty)$  时,  $h'(x) > 0$ , 故  $h(x)$  在该区间上单调递增。
- 函数  $h(x)$  在  $x = 1$  处取得全局最小值。
- $h_{\min}(x) = h(1) = \ln 1 - 1 + \frac{1}{1} = 0$ 。
- 对于任意  $x > 0$ , 恒有  $h(x) \geq 0$ , 即  $\ln x - 1 + \frac{1}{x} \geq 0$ 。

故原不等式  $\ln x \geq 1 - \frac{1}{x}$  成立, 当且仅当  $x = 1$  时取等号。

□

#### 函数图像

$$xyf(x) = \ln xy = 1 - 1/x$$

### 3.3 $\ln x \leq \frac{x}{e}$

不等式 5. 对于任意正实数  $x > 0$ , 恒有  $\ln x \leq \frac{x}{e}$ , 当且仅当  $x = e$  时等号成立。

#### 几何直观

该不等式表明, 函数  $f(x) = \ln x$  的图像恒在一条经过原点且与其相切的直线  $y = \frac{1}{e}x$  的下方 (除切点外)。

#### 演绎证明

证明. 欲证  $\ln x \leq \frac{x}{e}$ , 即证  $\ln x - \frac{x}{e} \leq 0$ 。

构造辅助函数  $k(x) = \ln x - \frac{x}{e}$ ,  $x \in (0, +\infty)$ 。

- 对  $k(x)$  求导, 得  $k'(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e} = \frac{e-x}{ex}$ 。
- 令  $k'(x) = 0$ , 解得  $x = e$ 。
- 当  $x \in (0, e)$  时,  $k'(x) > 0$ , 故  $k(x)$  在该区间上单调递增。
- 当  $x \in (e, +\infty)$  时,  $k'(x) < 0$ , 故  $k(x)$  在该区间上单调递减。
- 函数  $k(x)$  在  $x = e$  处取得全局最大值。
- $k_{\max}(x) = k(e) = \ln e - \frac{e}{e} = 1 - 1 = 0$ 。
- 对于任意  $x > 0$ , 恒有  $k(x) \leq 0$ , 即  $\ln x - \frac{x}{e} \leq 0$ 。

故原不等式  $\ln x \leq \frac{x}{e}$  成立, 当且仅当  $x = e$  时取等号。

□

#### 函数图像

$$xyef(x) = \ln xy = x/e$$



### 3.4 其他对数不等式（帕德逼近）

以下两个不等式是  $\ln x$  在  $x = 1$  点附近更为精确的近似，它们源于数学中的“帕德逼近”，在处理难题时偶有奇效。

不等式 6. (1) 对于  $x > 0$ ，有  $\ln x \geq \frac{2(x-1)}{x+1}$ 。

(2) 对于  $x > 0$ ，有  $\ln x \leq \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x}) = \frac{x^2-1}{2x}$ 。

**证明 (1)  $\ln x \geq \frac{2(x-1)}{x+1}$**

证明. 构造函数  $f(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$ ,  $x > 0$ 。

$$\square f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{2(x+1)-2(x-1)}{(x+1)^2} = \frac{1}{x} - \frac{4}{(x+1)^2} = \frac{(x+1)^2-4x}{x(x+1)^2} = \frac{x^2-2x+1}{x(x+1)^2} = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0$$

$\square$  对于  $x > 0$ ,  $x(x+1)^2 > 0$ , 且  $(x-1)^2 \geq 0$ 。

$\square f'(x) \geq 0$  在区间  $(0, +\infty)$  上恒成立, 且仅在  $x = 1$  时  $f'(x) = 0$ 。

$\square f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上严格单调递增。

$\square f(1) = \ln 1 - \frac{2(1-1)}{1+1} = 0$  是函数在  $x = 1$  处的值。当  $x > 1$  时  $f(x) > f(1) = 0$ , 当  $0 < x < 1$  时  $f(x) < f(1) = 0$ 。

证明勘误：原证明有误， $f(x)$  在  $x = 1$  处的值为 0，且函数单调递增，故  $x > 1$  时不等式成立， $0 < x < 1$  时不等式反向。让我们重新审视并证明。

修正证明. 构造函数  $g(x) = \ln x - \frac{2(x-1)}{x+1}$ 。  $g'(x) = \frac{(x-1)^2}{x(x+1)^2} \geq 0$ 。所以  $g(x)$  在  $(0, \infty)$  上单调递增。

• 当  $x \geq 1$  时,  $g(x) \geq g(1) = 0$ , 所以  $\ln x \geq \frac{2(x-1)}{x+1}$  成立。

• 当  $0 < x < 1$  时,  $g(x) < g(1) = 0$ , 所以  $\ln x < \frac{2(x-1)}{x+1}$  成立。

□

□

**证明 (2)  $\ln x \leq \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$**

证明. 构造函数  $h(x) = \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x}) - \ln x$ ,  $x > 0$ 。

$$\square h'(x) = \frac{1}{2}(1 + \frac{1}{x^2}) - \frac{1}{x} = \frac{x^2+1-2x}{2x^2} = \frac{(x-1)^2}{2x^2} \geq 0$$

$\square$  对于  $x > 0$ ,  $2x^2 > 0$  且  $(x-1)^2 \geq 0$ 。

$\square h'(x) \geq 0$  在区间  $(0, +\infty)$  上恒成立, 且仅在  $x = 1$  时  $h'(x) = 0$ 。

$\square h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上严格单调递增。

因此, 类似于上一个证明:

• 当  $x \geq 1$  时,  $h(x) \geq h(1) = 0$ , 所以  $\ln x \leq \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$  成立。

• 当  $0 < x < 1$  时,  $h(x) < h(1) = 0$ , 所以  $\ln x > \frac{1}{2}(x - \frac{1}{x})$  成立。

□

## 第 4 节 三角函数相关不等式

不等式 7. 对于  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 恒有  $\sin x < x < \tan x$ 。

### 几何直观

在单位圆中, 考虑一个大小为  $x$  (弧度) 的锐角。该角的正弦线段长为  $\sin x$ , 弧长为  $x$ , 正切线段长为  $\tan x$ 。从几何图形上可以直观地看出三者的大小关系。

### 演绎证明

证明  $x > \sin x$  for  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

证明. 构造函数  $f(x) = x - \sin x$ ,  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。

- $f'(x) = 1 - \cos x$ 。
- 对于  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\cos x \in (0, 1)$ , 因此  $f'(x) = 1 - \cos x > 0$ 。
- $f(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上严格单调递增。
- 对于任意  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 有  $f(x) > f(0) = 0 - \sin 0 = 0$ 。
- $x - \sin x > 0$ , 即  $x > \sin x$ 。

□

证明  $x < \tan x$  for  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$

证明. 构造函数  $g(x) = \tan x - x$ ,  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 。

- $g'(x) = \sec^2 x - 1 = \frac{1}{\cos^2 x} - 1$ 。
- 对于  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ ,  $\cos x \in (0, 1)$ , 因此  $\cos^2 x \in (0, 1)$ ,  $\frac{1}{\cos^2 x} > 1$ 。
- $g'(x) > 0$ 。
- $g(x)$  在  $(0, \frac{\pi}{2})$  上严格单调递增。
- 对于任意  $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ , 有  $g(x) > g(0) = \tan 0 - 0 = 0$ 。
- $\tan x - x > 0$ , 即  $\tan x > x$ 。

□

### 函数图像

$$xy\pi/6\pi/3\pi/2y = \sin xy = xy = \tan x$$

## 第 5 节 总结与应用

本笔记总结的切线放缩不等式是高中数学导数应用中的核心工具。它们不仅仅是需要记忆的结论, 更重要的是理解其背后的构造思想和证明过程。在解决复杂的导数综合题, 尤其是证明不等式或求参数范围时, 若能敏锐地识别出题目中式子的结构, 并联想到这些基本不等模型, 就可以:

1. **快速放缩**：将复杂的超越式放缩为简单的多项式（通常是一次式），简化问题。
  2. **确定界限**：为变量或表达式找到一个确定的上界或下界，是解决恒成立问题的关键一步。
  3. **启发思路**：即使不能直接套用，这些不等式的构造方法（作差、求导、讨论单调性、找最值）也是解决此类问题的通用范式。
- 

希望这份笔记能帮助同学们系统地掌握切线放缩的技巧，在数学学习的道路上更进一步。