

ZHONG YI GAO FANG

中医膏方

沈庆法 沈峥嵘 编著

上海科学技术文献出版社

简 介

中医滋补膏方是中华民族灿烂文化之珠玑。本书从中医膏方最基本的知识入手,先后介绍了中医膏方组成的方药、部分古今医案膏方以及膏方调治法和案选。作者更是以多年丰富的临床实践为深厚基础,向读者奉献了针对 28 种常见病,循序渐进、卓有成效的中医膏方滋补与调养方法。无论是专业人士还是广大读者都会从中获益非浅。

目录

中 医 膏 方

第一章 中医膏方基本知识十问十答 / 1

- 一、什么叫膏方? / 1
- 二、膏方的起源? / 2
- 三、膏方的适用对象? / 3
- 四、膏方服用季节? / 5
- 五、非冬令季节,可否服用膏方? / 6
- 六、膏方的制作? / 7
- 七、膏方的存放? / 8
- 八、膏方的服用方法? / 9
- 九、膏方服用期间的忌口? / 10
- 十、膏方服用不良反应防治方法? / 12

第二章 中医膏方组成的方药 / 13

- 第一节 组方的原则 / 13
- 第二节 组方的特点 / 14
- 第三节 组方的内容 / 16
 - 一、君药——补益药物 / 16

- 二、臣药——辅助和治疗药物 / 29
- 三、佐药——辅佐药物 / 34
- 四、使药——引经药物和调和药物 / 36
- 五、收膏和矫味药物 / 37
- 六、注意事项 / 37

第三章 古今医案膏方选 / 39

第一节 成品方 / 40

- 一、清宁膏 / 40
- 二、二冬膏 / 40
- 三、夏枯草膏 / 40
- 四、琼玉膏 / 40
- 五、八仙膏 / 41
- 六、滋荣养液膏 / 41
- 七、伏龙肝膏 / 41
- 八、十全大补膏 / 42
- 九、人参大补膏 / 42
- 十、稚儿膏 / 42
- 十一、双龙补膏 / 43
- 十二、健身长春膏 / 43
- 十三、葆春膏 / 43
- 十四、蛤蚧党参膏 / 43
- 十五、桑葚子膏 / 44
- 十六、杞圆膏 / 44
- 十七、参枫膏 / 44
- 十八、枇杷叶膏 / 44

- 十九、益母草膏 / 45
- 二十、噎膈膏 / 45
- 二十一、敛肺止血膏 / 45
- 二十二、复方甲亢膏 / 46
- 第二节 医案方 / 46
 - 一、王旭高(1798~1862)膏方医案 / 46
 - 二、张聿青(1844~1905)膏方医案 / 47
 - 三、丁甘仁(1865~1926)膏方医案 / 49
 - 四、陈筱宝(1872~1973)膏方医案 / 51
 - 五、祝味菊(1884~1951)膏方医案 / 52
 - 六、秦伯未(1901~1970)膏方医案 / 52
 - 七、程门雪(1902~1972)膏方医案 / 55
 - 八、李聪甫膏方医案 / 56
 - 九、胡建华膏方医案 / 57

第四章 膏方调治法和案选 / 64

第一节 调治前先服开路药 / 64

第二节 调补膏方法选 / 67

- 一、补气养血法 / 67
- 二、温补肾阳法 / 69
- 三、滋养肝肾法 / 72
- 四、益气补阴法 / 75
- 五、补益心脾法 / 77
- 六、调理冲任法 / 78

第三节 治疗膏方案选 / 81

- 一、慢性支气管炎 / 81

- 二、慢性咽炎 / 82
- 三、胃及十二指肠球部溃疡 / 84
- 四、胃肠道功能紊乱 / 85
- 五、胃病术后 / 87
- 六、慢性结肠炎 / 88
- 七、慢性肝炎 / 90
- 八、慢性乙型肝炎 / 92
- 九、早期肝硬化 / 93
- 十、室性早搏 / 95
- 十一、高血压 / 96
- 十二、冠心病 / 100
- 十三、高脂血症 / 101
- 十四、神经衰弱 / 103
- 十五、血管性头痛 / 106
- 十六、缺铁性贫血 / 108
- 十七、性功能障碍 / 109
- 十八、糖尿病 / 112
- 十九、甲状腺功能亢进症 / 114
- 二十、尿路感染 / 115
- 二十一、隐匿性肾炎 / 117
- 二十二、肾病综合征 / 118
- 二十三、肾功能不全 / 120
- 二十四、慢性前列腺炎 / 121
- 二十五、月经前期紧张症 / 123
- 二十六、更年期综合征 / 124
- 二十七、颈椎病 / 126
- 二十八、类风湿关节炎 / 127

第一章

中医膏方基本知识十问十答

一、什么叫膏方？

膏方,又叫膏剂,以其剂型为名,属于中医里丸、散、膏、丹、酒、露、汤、锭八种剂型之一。膏的含义较广:如指物,以油脂为膏;如指形态,以凝而不固称膏;如指口味,以甘姜滑腴为膏。在《山海经》中说:言味好皆滑为膏,如指内容,以为物之精粹,如指作用,以滋养膏润为长。膏方之膏,综合上述诸义。膏剂有外敷和内服两种,外敷膏剂是中医外治法中常用药物剂型,除用于皮肤、疮疡等疾患以外,还在内科和妇科等病症中使用。内服膏剂,后来又称为膏方,因其起到滋补作用,也有人称其为滋补药,广泛地使用于内、外、妇、儿、伤骨、眼耳口鼻等科疾患及大病后体虚者。

由于使用方便,疗效显著,现在膏方已越来越受患者欢迎。在中医理论里,从传统的认知和临床经验角度来看,膏方是一种具有高级营养滋补和治疗预防综合作用的成药。它是在大型复方汤剂的基础上,根据人的不同体质、不同临床表现而确立不同处方,选用君臣佐使药物

进行配伍,经浓煎后掺入某些辅料而制成的一种稠厚状半流质或冻状剂型。其中,处方中药物选用尽可能是道地药材,全部制作过程必须经过精细加工,严格操作而最终为质量上等者。

二、膏方的起源?

最早记录膏方的中医书是《黄帝内经》,书中所载 13 方中有两张膏方即豕膏和马膏(即由猪、马的脂肪制成)。豕膏是用于治疗咽喉、病势凶猛之猛疽,也可治疗腋下之米疽。对于由筋脉拘挛引起的口角歪斜症,则以马膏涂敷于拘紧一侧。另外,后来在伤骨科常用的外敷软膏和硬膏药,均为外用所设。在汉唐时期,除了外用之膏方外,内服之膏方逐渐产生。如张仲景的鳖甲煎丸、猪膏发煎(古时膏和煎常混称),《中藏经》的左慈真人千金地黄煎,《肘后方》的黑膏,《千金要方》、《千金翼方》中记载的陆抗膏、紫丹参膏、通声膏等。在宋以后,内服膏方已经受到普遍重视,如《洪氏集验方》中所记琼玉膏,由人参、生地、茯苓煎熬制成,此时已开始不用动物脂肪了。在明清时代则更多,如《本草纲目》的人参膏,《外科正宗》的天门冬膏、参术膏,《景岳全书》的两仪膏,《证治准绳》的黑桑葚膏,《万病回春》的玄霜雪梨膏,清代的《张氏医通》记载的二冬膏、集灵膏为后世医家常用。而叶天士在《临证指南医案》所载膏方案更可见其丰富经验,如治“阴虚督损”,用六味加麋角胶、秋石、川石斛膏;治“神伤精散”、“上下交损”用参术

膏,劳力伤脾用霞天膏。清末名医张聿青及近代名医丁甘仁、程门雪均撰有膏方专述,反映其丰富经验,且比较规范地运用收膏的药物,如阿胶、龟板胶、鳖甲胶、鹿角胶以及桑葚膏、金樱子膏等。并且强调在开列膏方之前要用“开路方”。其目的有二:一是通过汤剂的清理,调理脾胃功能,祛除湿浊余邪;二是观察服用汤剂反应,以便在膏方中可以选择针对性更强的药物,而取得更为理想的疗效。

三、膏方的适用对象?

在冬令进补中,内服膏方适用对象主要有三种人:一是处于“亚健康状态者”,平时无慢性疾病,而容易感冒,长期劳累或压力负担过重而致身体虚弱的人,中老年人,体力不支,精力不够,难以胜任紧张而烦劳的工作;二是慢性疾病已经稳定或病久而全身虚弱的人,或为增强体质而巩固疗效的人。这些慢性疾病如慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘、高血压、冠心病、高血脂症、糖尿病、慢性胃炎、慢性结肠炎、慢性肝炎、早期肝硬化、慢性肾炎、慢性泌尿系统感染、贫血、类风湿、夜尿多症、腰腿痛症、男子性功能障碍、精液病、女子月经不调、不孕症。三是康复患者,如手术后、出血后、大病重病后,产后身体极度虚弱的人。

从服用膏方而发挥的作用来看,在中医的辨证施治原则指导下,合理服用,可以使少年儿童助长发育、增强智力;可以使中青年增强体质,美容健身,可以使老年人延缓衰老,精力旺盛。当然,膏方是因人而异,男女老少均有不

同。切忌立一成方而各种人都服,必须进行辨证施治,严格遵照膏方的组成原则,配方并进行精制加工,才能起到理想的作用。

另外要注意的是膏方主要用于慢性疾患而身体虚弱者,如见有急性病灶和感染者,必须先进行抗感染治疗;对于慢性疾病急性发作或活动期,如胃痛、结肠炎、胆囊炎、胆结石、肾结石发作者,均不适宜用膏方。

患者服膏方前或服膏方过程中,遇伤风感冒、食滞者,应暂停使用 3~5 日。伤风感冒后,常会影响胃肠功能,而食滞则更易导致消化不良。此时,再服膏方,无疑是雪上加霜,中医称恋邪不去。否则伤风感冒、食滞不会好,还可见到严重的消化功能紊乱的表现。

如果见到患者有腹胀、胃纳减少、舌苔白腻,或者口苦、大便秘结、舌苔黄腻的表现,都是因湿浊内阻,或者湿邪化热,湿热内蕴,气机升降失常所致。假如出现在服膏方前,这可以在服用开路方时附加以芳香化浊,理气和胃或者清化湿热、调气畅中的药物,而在服用膏方过程中,则必须停用膏方,直至这些症状得到改善才可服用。

还有些患者在服用膏方过程中,因体检或进行其他检查时一旦发现有新的疾患,也宜暂停使用,到明确诊断,知道疾患的性质后才可考虑是否继续服用。

对于平时热毒较盛,又无其他不适的精力旺盛者,或者青少年体质健壮者,一般都不主张服用膏方。

四、膏方服用季节？

膏方，又有人习惯称其为冬令膏方。顾名思义是在冬令季节里服用。为什么要在冬令时节服用膏方呢？这要从人的生命活动和自然气候环境息息相关说起。

自然界气候环境的运动变化，无时无刻不对人体产生影响。著名的文学家、汉代的司马迁曾说：春生、夏长、秋收、冬藏，此天地之大经也，弗顺则无以为纲纪。可见，如何调节一年四季的气候变化即春温、夏热、秋凉、冬寒，以此谨慎地起居饮食、衣着行走是十分重要的。从健身营养的角度来看，根据一年四季气候变化，其中，秋冬季节是收获的重要季节，此时人们为适应外界渐冷的气候，人体的生理作出相应的调整，血液在消化道为多，中医称脾胃为气血生化之源，阳明为多气多血之乡。此时，消化腺、消化酶分泌增多，消化机能增强，食欲旺盛，体内高热量食品需求增多，容易吸收，并把营养藏于体内，同时代谢降低，消耗减少。在《黄帝内经素问·四气调神大论篇》指出：冬三月，此谓闭藏，冰冻地坼，无扰乎阳，早卧晚起，必待日光，使志若伏若匿，若有私意，若己有得，去寒就温，无泄皮肤，使气亟夺，此冬气之应，养藏之道也。逆之则伤肾，春为痿厥，奉生者少。这就是说，冬季三个月，是万物生机潜伏的季节。水因寒而结冰，地因寒而坼裂，大地显示了阳气潜藏的景象。这时候人们晚上要早些睡，早晨一定要等出太阳后才起身。使意志伏匿而不显露，如同心有所得，

避寒取暖,但不能使皮肤肌腠开泄,以免潜藏的阳气,因出汗而遭到损耗。这就是适应冬天气候环境,是一种养藏的方法。如果违反了这种冬令的养生方法,到了春天便要发生痿厥一类疾患,使人们对春生之气的适应能力减弱。

由此可见,冬季是一年四季中进补的最好季节。长期以来,人们就讲究“冬令进补”,在冬天,内服滋补膏方,强壮身体,到了来年春天,精神抖擞,步行矫捷,思维灵敏,在民间也有“冬令一进补,春天可打虎”的说法,是很有道理的。

五、非冬令季节,可否服用膏方?

有的中药房在一年四季均为患者加工膏方,这是不是说一年四季均可服用膏方呢?实际上,运用膏方进行冬令滋补是其使用的一个方面,另一方面,由于膏方既有滋补身体的作用,又有治疗预防的功效,因此,不在冬季,如处在慢性损耗性疾病的过程中或大病后,手术后,患者身体非常虚弱时,可以采用膏方调治。根据虚弱情况,进行中医辨证,在滋补的同时,配合理气、和血、调中、化浊、通腑、安神、固涩、通络等药物一起使用。

中医的调补有很多方面选择,有药酒、药粥,还有药膳等,但在应用中药汤剂进行辨证施治后,继用膏方又是一个很重要的方面。一是它可以继续配伍其他治疗的药物,二是服用方便,三是符合虚弱身体进行缓慢康复的原则,其补益是王道缓缓收工,决不能采用霸道蛮补,否则孟浪

用事,不能达到目的。

临床上也有边用膏方调补,边用理气化浊和中药物交替使用。笔者曾治一胃癌术后患者,时届秋冬之交,身体非常虚弱,动则气短,纳少便干,舌淡脉象弦缓而无力。故先用健脾养胃理气和中方药,二周后,即改用膏方滋补。在用一周膏方后,另用一周和胃理气方药,交替进行,两个月后,病情明显改善,身体逐渐康复。

这些情况说明,根据患者病情需要,并严格掌握膏方的使用方法,不在冬令季节,同样可以服用膏方。

六、膏方的制作?

膏方的制作比较复杂,有一定的程序,自制者必须依其程序进行,否则不能达到预期效果。

自制者要严格操作和掌握好浸泡、煎煮、浓缩、收膏、存放等几道工序。

1. 浸泡:先将配齐的药料检查一遍,把胶类药拣出另放。然后把其他药物统统放入容量相当的洁净砂锅内,加适量的水浸润药料,令其充分吸收膨胀,稍后再加水以高出药面 10 厘米左右,浸泡 24 小时。

2. 煎煮:把浸泡后的药料上火煎煮。先用大火煮沸,再用小火煮 1 小时左右,转为微火以沸为度,约 3 小时左右,此时药汁渐浓,即可用纱布过滤出头道药汁,再加清水浸润原来的药渣后即可上火煎煮,煎法同前,此为二煎,待至第三煎时,气味已淡薄,滤净药汁后即将药渣倒弃(如药

汁尚浓时,还可再煎1次)。将前三煎所得药汁混合一处,静置后再沉淀过滤,以药渣愈少愈佳。

3. 浓缩:过滤净的药汁倒入锅中,进行浓缩,可以先用大火煎熬,加速水分蒸发,并随时撇去浮沫,让药汁慢慢变成稠厚,再改用小火进一步浓缩,此时应不断搅拌,因为药汁转厚时极易粘底烧焦,在搅拌到药汁滴在纸上不散开来为度,此时方可暂停煎熬,这就是经过浓缩而成的清膏。

4. 收膏:把蒸烱化开的胶类药与糖(以冰糖和蜂蜜为佳),倒入清膏中,放在小火上慢慢熬炼,不断用铲搅拌,直至能扯拉成旗或在滴水成珠(将膏汁滴入清水中凝结成珠而不散)即可。

5. 存放:待收好的膏冷却后,装入清洁干净的瓷质容器内,先不加盖,用干净纱布将容器口遮盖上,放置一夜,待完全冷却后,再加盖,放入阴凉处。

另外,要注意在收膏的同时,可以放入准备好的药末(如鹿茸粉、人参粉、珍珠粉、琥珀粉、胎盘粉),要求药末极细,在膏中充分抹匀。还有,可根据需要放入胡桃肉、桂圆肉、红枣肉等一起煎煮时取汁,在收膏时一起放入可充分发挥其作用。

七、膏方的存放?

为了使膏方能在服用期间,保质而充分发挥药力以达到调补的目的,其存放方法,至关重要。首先在膏方制作后,让其充分冷却,才可加盖。可以让它存放在瓷罐(锅、

钵)中,亦可以用搪瓷烧锅存放,但不宜用铝、铁锅作为盛器。

由于膏方用药时间较长,尽管时值冬季为多,但遇暖冬时就要小心发生霉变了。一般情况下,多放在阴凉处,若放在冰箱冷藏更佳。若放在阴凉处而遇暖冬气温连日回升,应让其隔水高温蒸烊,但是忌直接将膏锅放在火上烧烊,这样就会造成锅裂和底焦。在膏药蒸烊后,一定要把盖打开,直至完全冷却,方可盖好。切不可让锅盖的水落在膏面上,否则过几天就会出现霉点。在每天服用膏方时,应该放一个固定的汤匙,以免把水分带进锅罐里而造成发霉变质。

一旦气候潮湿,或者天气变暖,在膏方上出现一些霉点,此时宜即用清洁水果刀刮去表面有霉点的一层,再用隔水高温蒸烊。当然,如果霉点很多且在膏面的深处也见有霉点,这样就不能服用了。

八、膏方的服用方法?

膏方的服用有一定要求。一般是每天早晚各一次或每日 2~3 次均可。应该是空腹服用,此时胃肠空虚,吸收力强,且不受食物干扰,药物易发挥作用,如脾胃功能正常更佳。这样可以较理想地达到补益的目的。如空腹时服用肠胃有不适感,可以改在半饥半饱时服用,每次 1~2 调羹,用温开水化服。如果方中用熟地、山萸肉、巴戟肉等滋腻药较多,且配药中胶类剂量又较大,则膏药黏稠较难烊

化,应该用开水炖烩后再服。

九、膏方服用期间的忌口?

在服用膏方期间,应该要注意忌口,忌食萝卜、绿豆等一类食品,也要忌服油腻膳食。特别是服用人参时,常习惯称萝卜、绿豆(包括绿豆制品,如粉丝等)是“解药”,意思是含破坏人参中的有效成分。传统的中医理论认为萝卜的消食导滞作用和绿豆的寒凉解毒功能造成人参的作用不能发挥,人参的甘味补气生津的疗效将大大减弱。应该说,两者同时服用是不适宜的。从药理上讲,萝卜会加快人参有效成分的排泄,在人参作用尚未得到充分发挥,其营养成分未被人体吸收时,已经被排泄出体外了。由于膏方中有不少补益壅滞之品,对于消化不良者,服用食物以易消化为上,否则容易阻碍消化、吸收,从而不能起到理想的补益作用。

针对患者的体质,在膏方服用时,忌口更为重要。如:

1. 阴虚体质 在临床上可见头晕眼花、口干咽燥、心烦、易于激动、失眠心悸、舌红少苔、脉象细数,在服膏方进行滋阴的同时,在饮食上有这样几点忌口:

(1) 忌食辛热的食品,如狗肉、牛肉等;在烹调作料中不放或少放姜、蒜、葱等一类调味品;至于甜味食品如巧克力及其制品更应少吃,甚至不吃。否则,轻则引起口干咽燥严重,大便燥结,重则可见出血症状。

(2) 忌食海鲜一类发物,如黄鱼、带鱼等。甲状腺机

能亢进患者中不少表现为阴虚火旺的症状,在应用滋阴降火药物治疗时,食用海鲜则犹为火上浇油。这些病人以食淡水鱼为好。

(3) 忌食不易消化的药食。因为患者消化功能虚弱,不易吸收,又因为阴虚之人常出现大便燥结,此时若在帮助消化的药食中加入润肠之品,可以使膏方中滋阴药发挥更好作用。

2. 阳虚体质 在临床上可见全身怕冷、面色晄白或者淡白无华、少气倦怠乏力、大便溏薄、小便清长、舌质淡胖、苔润滑、脉象微细迟无力,对这类病人常用补阳、温阳、壮阳等药食进行调补,应该在饮食上注意以下忌口:

(1) 切忌滥用温补肾阳的食品。如果在服鹿鞭、牛鞭、羊肉等药食时,应注意观察有无虚火的病理现象。否则容易助火动血,产生变症。另外,还应注意不少阳虚体质的人,脾胃虚弱,运化失常,故饮食上尚要忌用黏腻之品。

(2) 忌用寒性食品,如柿子、黄瓜等。阳虚体质者易生内寒,可见脘腹时感冷痛,大便稀溏,四肢欠温等。若用寒性食品,则寒象更甚,在炎热夏天,尤其应慎冷饮瓜果之品。不能图一时之快,而使阳虚体质日见虚弱,变症丛生。

(3) 阳虚体质的人气血流行不畅,切忌服用或过多服用厚味腻滞之品,如食肉类制品,也尽可能除去油脂部分。

注意了忌口,目的使膏方的服用起到应有的作用。

十、膏方服用不良反应防治方法？

尽管膏方服用的对象不同,体质、病情不同,但总的要求是以平和为准,在辨证论治的原则指导下,切合个体,不应该会出现不良反应。但是,也有少数人服用膏方后,会出现这样几种不适:

1. 滋腻呆胃,纳食减少。有的不思纳食,腹部胀满。
2. 齿浮口苦、鼻衄、面部升火、大便秘结。
3. 第二年春夏时感到不适、厌食、困倦,入夏怕热,也有出现低热、皮疹、齿浮、便秘等。

这些不良反应,可以在刚开始服用几天时出现,也可能在第二年春夏才出现。防治这些不良反应,首先在服用开路方时要注意,尽可能祛除湿浊,调整好胃肠功能。在服用几天后就出现不思饮食、腹胀时,应该暂停服用,改服1~2周理气和胃消导药后,再少量服用膏方,慢慢增加。如见齿浮口苦、鼻衄升火时,把清热泻火解毒通腑药煎好后放入膏方中,一起服用以纠偏差。

第二章

中医膏方组成的方药

第一节 组方的原则

组成膏方的原则是在中医辨证基础上,对疾病的寒热虚实进行病机变化的叙述。结合体质及以往服药情况进行分析,夹叙夹议,提出治疗原则,确定具体的治疗方法。整个过程既有精要的理论阐述,又有对具体方药运用的发挥。这就是在中医里常称的“脉案”或“医案”。这里举一则《张聿青医案》中膏方案例以说明。

薛某 平素痰多,渐起眩晕,始清痰热,未能速效。继进育阴以潜阳气,眩晕才得退轻。盖脾为生痰之源,胃为贮痰之器。升降之机,肝合脾,主左升;胆合胃,主右降。惟胃有蕴聚之痰,斯胆失下行之路,于是甲木生火,火即化风,久之而水源亦耗,所以育阴之剂,获效于后也。宜循经验法调理。

炙生地 150 克 奎党参 90 克 粉丹皮 60 克

滁菊花 30 克 黑玄参 60 克 生于术 30 克

杭白芍 45 克 广橘红 30 克 竹沥半夏 45 克
 生甘草 15 克 萸肉炭 30 克 川石斛 30 克
 生牡蛎 120 克 茯苓块 60 克 南花粉 45 克
 川贝母 45 克 海蛤粉^包 90 克 大天冬 60 克
 石决明 120 克 煨天麻 45 克 肥玉竹 60 克
 白蒺藜 90 克 福泽泻 45 克。

上方宽水煎三次，去渣，再煎极浓，用清阿胶、龟板胶融化冲入收膏。每晨服一调羹，开水冲挑。

简析 本案的发病以痰热为标，阴亏为本。此从始清痰热，未能速效而获知。由于阴亏而肝木生火，火即化风，风火上扰而见眩晕。因此，用药即以养阴平肝，健脾和胃化痰，取龟板、生地、萸肉、肥玉竹、玄参、石斛从本治疗。这种缓缓图治是慢性虚损疾病治本的重要手段，也是在膏方运用中最能取效且可巩固的用药方法。文字简洁，主症突出，即有过去治疗的回顾，又有中医理论的分析，用药切合病机，配伍得当，思路非常清晰。

第二节 组方的特点

膏方组成与一般中药组成不一样，有其以下特点：

一、表现在中医的鲜明特色。膏方中，传统中医的理论方药和辨证论治特色非常鲜明，它不像一般门诊中，听患者诉说一些症状，进行一些简单分析，就写一个处方，很

快了事。我们既反对泛泛而谈的空头理论,更不提倡不重视医理的描述。否则,怎么能写出一张严谨而周密的处方呢?从某种角度来看,膏方脉案的撰写,可以反映出一定的中医学学术水平。

膏方里中医的鲜明特色还反映在医德、文学、书法诸方面。在开膏方之前,一定要详细询问患者病史,认真辨证处方以及交代医嘱。因此,要求做到对患者体贴关心、耐心、和蔼可亲。有些患者求医心切、药石乱投;也有想保健强身、盲目进补;更有消极悲观、信心不足。对于情怀抑郁,所欲不遂必须耐心细致地关心、鼓励、解释和帮助,以使患者高高兴兴接受膏方调治。与此同时,从传统中医来讲,膏方字迹是一幅艺术品。其医理的分析,有诗意,又似有画意。字迹工整清晰,排列有序,赏心悦目。

二、膏方组成药物的数量和剂量与一般处方不一样,在君臣佐使的要求上更严格。组成药物的数量一般在23~33味,相当于汤剂的2~3倍以上。而每味药的计量是30~300克,各种药物是不一样的。为金石介壳类的,用量大一些,多在150~300克;而常用的党参、黄芪、紫丹参、白术、淮山药、茯苓等多在120~180克;缩砂仁、白叩仁、广木香等多在30~50克。故一料膏方药物用量为平时处方的10~20倍以上。

第三节 组方的内容

一、君药——补益药物

膏方中最主要的组成部分是补益药,也就是方中的君药。根据各人的体质差异进行整体调整,针对脏腑之虚和阴阳气血不足进行补益平衡,最终达到阴平阳秘,气血调和,脏腑健旺的目的。在膏方中选用补益方药为以下几种:

1. 补气药

(1) 人参:性平味甘,属滋补品,大补元气,治男女一切虚症。因采集来源不同可分野山参、园参;因加工炮制不同,又有生晒参、红参、石柱参、皮尾参、糖参等。从产地来分,则有吉林参、高丽参、东洋参、西洋参等。

人参的服用方法,一般采取这样几种:磨粉吞服、切片后隔水蒸服,还有煎汤冲入药汁内。膏方制作时就采用这种方法。磨粉和隔水蒸服(可放少量冰糖)属保健调理者常用,每日 3~5 克。

(2) 西洋参:性凉味苦,微甘;属清补品,具有益气养阴、清热生津功效。以加拿大、美国出产的为佳。又名花旗参。

西洋参的服用方法有磨粉、切片、冲泡、口含、蒸服、煎服及泡酒等。在膏方中常采用另外煎汤冲入药汁中。平

时,服西洋参还是以切片冲泡或隔水蒸服为佳。属保健调理者常用,每日 3~5 克。

(3) 党参:性平味甘,属益气平和品,具有补气健脾功效。作用和人参相似,但功效差。

党参在膏方中配合其他药,作为益气一类药物使用。

(4) 太子参:性平味甘,微苦,属补气平和品,老少均宜适用,具有补气健脾、养胃生津功效。

太子参在膏方中配合其他药物,作为益气一类药物使用。在平时,可以用红枣一起煎汤调服。也有用太子参 15 克、地骨皮 12 克、糯稻根 10 克、浮小麦 10 克、甘草 3 克煎汤制成冲剂口服。治疗体虚盗汗,功能性低热,眩晕乏力,纳少。小儿用量减半。

(5) 黄芪:性微温味甘,属补气常用品。根据中医“气能生血”的机理,常用量很大与一般用量的全当归配伍以达到补血的目的。有一张名方叫当归补血汤就是这两味药。黄芪具有益气升阳、固表、利水的功能。

黄芪和党参一样在膏方中作为主要补气药,与其他补气药一起使用。在平时,作为一味补气药,很多人都知道它能提高免疫力,能与白术、防风一起煎汤或制成冲剂,用量比例是 5 : 3 : 1,可以预防感冒,对平时体虚而易感冒者很合适。黄芪用法很多,若煎汤也可以进行食补。如煲汤,与茯苓、枸杞子及鸡等一起,可以起到益气健脾、补中的作用。

白术在膏方中,多和黄芪、党参相配,作为补气一类药

物使用。若脾胃功能虚弱,常可配合其他一些药,如木香、广陈皮等一起使用。可以用白术、枳实等分制成汤剂或丸药治疗消化不良,脘腹胀满,食欲不振。

(6) 淮山药:性平味甘,属益气平和中正药,具有健脾养胃、益肺固肾的功能。

淮山药药性平和,在膏方中多与黄芪、党参、白术、北沙参、石斛、元参等一类药物使用。淮山药又是一味食疗中常用的食物,可以制成淮山药粥,又可以作炒菜用,如淮山药炒肉片等。此外,淮山药有固涩作用,小儿遗尿、遗精、夜尿多,常配益智仁和乌药一起使用。有一张处方叫缩泉丸就是由这三味药组成。

(7) 黄精:性平味甘,属益气强壮滋养药,具有补气润肺、养心滋肾的功能。

黄精在膏方中多与补气、补肾药一起使用。现在治疗神经衰弱、神情疲劳的一张经方即脑灵素片,就是由黄精配合杞子、茯苓、远志、仙灵脾、麦冬、龟板、鹿茸、鹿角胶、熟地、人参、白糖等制成片剂。有一张很出名的食疗方叫黄精鸡,就是由黄精和鸡一起制成,具有很好的滋补作用,对气血亏或肝肾亏者较适用。

2. 补血药

(1) 全当归:性温味甘辛,属补血调经的上等要药,具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功能。

全当归在膏方中作为补血要药与其他补血一类药物一起使用。根据中医辨证,血虚常有气虚表现,称气血两

虚,故使用时常与黄芪、党参一起配伍。全当归的临床应用很普遍,如用于贫血畏冷、肢冷腹痛,可取全当归、羊肉、生姜,此方叫当归生姜羊肉汤。在妇科中,调经离不开全当归。如合白芍、益母草、香附、黄芪、党参、茯苓、淮山药、白术、小茴香、肉桂、甘草、仙灵脾等适用于月经不调,腰酸背痛,腹中隐隐冷痛。

(2) 熟地黄:性微温味甘,属补血滋阴之上品,具有补血滋阴、益肾生精的功能。

熟地黄在膏方中为补血滋阴首选之佳品,与其他补血一类药一起使用。古代名方四物汤和六味地黄丸均以熟地为补血养血的君药。

(3) 何首乌:性微温味苦涩,属补精血,乌须发的要药,具有滋补肝肾,生养精血,乌须发,通大便的功能。

何首乌的服用方法很多,除了治疗血虚或肝肾亏外,近年来用于降血脂、降血糖以及动脉硬化症较多。可与山楂加水煎汤,每日各 30 克为一剂。

(4) 龙眼肉:性温味甘,属药食兼用之补血佳品,具有养血安神,补气健脾,益智敛汗的功能。

龙眼肉在膏方中不与其他药一起煎。而作血虚药使用时,将其煮汤后连同肉一起倒入药汁中拌和。龙眼肉的服法很多,可蒸服,也可浸酒、煮粥。如煎服作点心用,则取龙眼肉 20 克加水适量煎煮后,再放入 2 只鸡蛋、少量红糖即成。龙眼肉与枸杞子、西洋参一起可制膏用。如用于男性肾气虚则加党参、白术、茯苓、杜仲、山萸肉等,以龟板

胶、鹿角胶烔化收膏。用于女性血虚另加全当归、熟地、白芍、制首乌等,以阿胶烔化收膏。

(5) 桑葚子:性寒味甘,属平补肝肾阴血之品,具有养血滋阴,补益肝肾,润肠通便的功能。

桑葚子在膏方中作为一味补血药物使用。桑葚子使用方法很多,常用有泡酒,以起色紫红,作为药膳围边很好看,如与海参、甲鱼一起用。也有用于治疗眩晕,与首乌、女贞子煎服,各取 30 克为一日剂量。

3. 补阴药

(1) 麦门冬:性凉味甘微苦,属清补之佳品,具有养阴清热、润肺止咳功能。

麦门冬常与天门冬同用,在膏方中,为养阴的主要药物,与其他药物一起煎用。临床使用方法很多,因其略带甜味,煮熟后即可食用。也可制作药膳,如与鲜贝、大虾仁、海参等同用。也可与西洋参、五味子一起煎服应用于气阴两虚者。

(2) 北沙参:性凉味甘,属养肺阴之佳品,具有养阴清肺、生津清热的功能。

北沙参在膏方中作为一味养肺阴、清肺热的药物与其他一起煎用。

南沙参的功能与北沙参多相同,其力较逊,常一起同用。也有治发热后口干舌燥、津液亏损,取鲜沙参与鲜麦冬、鲜石斛、芦根各 15 克煎服。

(3) 肥玉竹:性凉味甘,属滋阴平和之品,具有滋阴润

肺、养胃生津的功能。

肥玉竹在膏方中常用于肺胃阴虚之平时多干咳少痰，胃中津伤之平时口咽干燥及阴虚燥热之平时口渴多饮的患者。现在的糖尿病和冠心病属阴虚者多用。肥玉竹与山楂配合煎服或制成冲剂，用于高脂血症有效。

(4) 石斛：性凉味甘微苦，属清补之上品，具有滋阴养胃、清热生津，明目益精的功能。

石斛在膏方中常用于肺胃阴虚患者，与其他养阴药一起煎服。因其具有降血压、降血糖、升高白细胞、增强免疫的作用，故应用也越来越多。如取霍山石斛即枫斗，每日取6~9克泡茶代饮。为使其药效充分溢出，也有先煎后泡茶。以石斛为名的石斛夜光丸是眼科中治疗因肝肾阴虚所致眼疾常用中成药。

(5) 枸杞子：性平味甘，属平和肝肾之佳品，具有滋阴养血、益精明目的功能。

枸杞子在膏方中常用于阴血亏虚、肝肾不足之患者，多与补肝肾一类药物一起煎服。临床运用方法很多，常用煎服，但宜复方。也可合五味子或菊花或肥玉竹等品取沸水冲饮代茶。枸杞子煮粥和浸酒也是食疗中常用。民间用枸杞子煮鸡蛋，取枸杞子30克，鸡蛋2个，加清水同煮，鸡蛋熟后取出去壳再煮，饮汤食蛋，用于体虚贫血患者有效。

(6) 女贞子：性平味甘苦，属滋补肝肾阴液之常用药，具有滋阴养肝补肾强身的功能。

在膏方中，女贞子常配旱莲草(名为二至丸)作为补肝

肾之阴与其他药物一起煎用,在临床上应用范围很广。特别是对各种类型肝炎,可以改善肝功能。与枸杞子、旱莲草一起煎服,治疗白细胞减少症有效。

4. 补阳药

(1) 淫羊藿:一名仙灵脾,性温味甘,属壮阳之上品,具有补肾壮阳、祛风通络的功能。

淫羊藿在膏方中常与仙茅、锁阳、苁蓉等一起煎用,临床应用方法很多。如与党参制成片剂,用于冠心病之胸闷胸痛症。又可泡酒,有一方称为种子药酒,取仙灵脾、生地、枸杞子、胡桃肉、五加皮,用于肾阳不足之不孕不育症有效。由仙灵脾配仙茅、巴戟天、黄柏、知母、全当归煎服的二仙汤,用于更年期综合征与高血压有效。

(2) 巴戟天:性温味辛甘,属温肾阳之常用品,具有补肾壮阳、祛风湿、强筋骨的功能。

巴戟天在膏方中常与仙灵脾、锁阳、覆盆子、菟丝子一起煎用,临床应用范围甚广。除补肾强身外,与川断、菟丝子一起煎服治疗小腹冷痛子宫虚冷不孕。与补骨脂、藏川红花一起泡酒治疗颈椎或腰椎增生患者。

(3) 锁阳:性温味甘,属补肾生精之上品,具有补肾壮阳、益精润肠的功能。

锁阳在膏方中用于肾阳虚的患者,与仙灵脾、巴戟肉、枸杞子、菟丝子一起煎服。另外,老人肾虚肠燥便秘,可以取苁蓉等量同用,取蜜调服有效。

(4) 肉苁蓉:性温味甘咸,属温肾壮阳之佳品,具有补

肾助阳、强筋健骨、润肠通便的功能。

肉苁蓉在膏方中,是既温肾阳又能润肠燥的一味补肾药,与其他温肾阳药物一起煎服。肉苁蓉的使用方法很多,不少用于食疗,如用肉苁蓉、黄精红烧鳝丝,以补肾强筋健髓。用肉苁蓉、黑芝麻、火麻仁研末、蜜调,治疗老年虚弱便秘。

(5) 菟丝子:性平味甘辛,属平和补肝肾之上品,具有补肾固精、养肝明目、健腰安胎的功能。

菟丝子在膏方中与其他补养肝肾之品如潼蒺藜、女贞子、枸杞子等一起煎服,使用范围广,方法多。如与五味子、枸杞子、覆盆子、车前子合制成蜜丸,称五子衍宗丸,治疗男子精少不育。与五味子一起浸酒服治疗肝肾虚而眩晕心悸不寐有效。在妇科中,菟丝子与川断、桑寄生配伍治疗先兆流产、胎动不安有效。

(6) 冬虫夏草:性温味甘,属温补肺肾之上等佳品,具有温补肺肾、壮阳气、定喘咳、强筋增精的功能。

冬虫夏草在膏方中多研末,或另煎汤冲入药汁中,临床使用方法很多。如作健身调补则虫草研末1克冲入人参3克煎汤。如作食疗调补有虫草枸杞老鸭汤,或与人参、枸杞子、龙眼肉一起泡酒。

(7) 杜仲:性温味甘,属益肾健身之常用药,具有补肝肾、健腰膝、强筋骨、安胎之功能。

杜仲在膏方中多与补肝肾之品如川断、补骨脂、桑寄生等一起煎用。杜仲可以与其他祛风湿药一起泡酒服,也

可以与养血安胎药一起煎服,以治疗胎动不安。在食疗中,取其与腰花同炒以治肾虚腰痛。

5. 常用补益古方

以上是中医膏方组成中部分君药即补益药。在具体的膏方里,除了这部分君药列出外,在配伍这些补益药为君药中,临床上多采用常用的补益古方。兹录之以供参考:

(1) 四君子汤

来源:《和剂局方》。

组成:人参 3 克(或党参 9 克),白术 9 克,茯苓 12 克,炙甘草 3 克。

功能:益气健脾。

(2) 参苓白术散

来源:《和剂局方》。

组成:扁豆 12 克,党参 9 克,白术 9 克,茯苓 12 克,炙甘草 3 克,广陈皮 6 克,淮山药 12 克,莲子肉 9 克,桔梗 3 克,苡仁 12 克,缩砂仁^{后下} 3 克。

功能:健脾补气,和胃除湿。

(3) 补中益气汤

来源:《脾胃论》。

组成:黄芪 15 克,党参 12 克,白术 12 克,炙甘草 3 克,全当归 9 克,广陈皮 6 克,升麻 3 克,软柴胡 3 克。

功能:益气升阳,调理脾胃。

(4) 玉屏风散

来源:《世医得效方》。

组成：黄芪 18 克，白术 6 克，防风 6 克。

功能：补气固表止汗。

(5) 四物汤

来源：《和剂局方》。

组成：全当归 9 克，熟地 12 克，白芍 9 克，川芎 6 克。

功能：补血调血。

(6) 八珍汤

来源：《女科准绳》。

组成：党参 9 克，白术 9 克，茯苓 12 克，炙甘草 3 克，
全当归 9 克，熟地 12 克，白芍 9 克，川芎 6 克。

功能：补益气血。

(7) 当归补血汤

来源：《内外伤辨惑论》。

组成：黄芪 30 克，全当归 6 克。

功能：补气生血。

(8) 归脾丸

来源：《济生方》。

组成：党参 9 克，黄芪 9 克，白术 9 克，茯苓 9 克，炒枣
仁 9 克，龙眼肉 6 克，木香 1.5 克，全当归 6 克，远志 3 克，
炙甘草 1.5 克，生姜 2 片，红枣 3 只。

功能：补益心脾，养血安神。

(9) 炙甘草汤

来源：《伤寒论》。

组成：炙甘草 15 克，党参 9 克，桂枝 9 克，生姜三片，

阿胶 9 克,生地 15 克,麦冬 9 克,麻仁 12 克,大红枣 10 只。

功能:益心气,补心血,养心阴,通心阳。

(10) 六味地黄丸

来源:《小儿药证直诀》。

组成:熟地 12 克,山茱萸 9 克,淮山药 12 克,丹皮 6 克,茯苓 12 克,泽泻 9 克。

功能:滋阴补肾。

(11) 左归丸

来源:《景岳全书》。

组成:熟地 112 克,淮山药 12 克,山茱萸 9 克,菟丝子 12 克,枸杞子 12 克,牛膝 9 克,鹿角胶^{烔冲} 12 克,龟板胶^{烔冲} 12 克。

功能:补肝肾,益精血。

(12) 大补阴丸

来源:《丹溪心法》。

组成:黄柏 12 克,知母 12 克,熟地 18 克,龟板 18 克,猪脊髓 1 条(和蜜为丸)。

功能:滋阴泻火。

(13) 增液汤

来源:《温病条辨》。

组成:玄参 30 克,生地 24 克,麦冬 24 克。

功能:养阴润燥,增液润肠。

(14) 养阴清肺汤

来源:《重楼玉钥》。

组成：生地 9 克，麦冬 9 克，玄参 12 克，丹皮 6 克，赤芍 6 克，川贝母 9 克，薄荷 3 克，甘草 3 克。

功能：养阴清肺，清咽解毒。

(15) 生脉散

来源：《内外伤辨惑论》。

组成：党参 9 克，麦冬 12 克，五味子 9 克。

功能：益气养阴，敛汗生脉。

(16) 麦门冬汤

来源：《金匱要略》。

组成：麦门冬 15 克，制半夏 4.5 克，甘草 3 克，孩儿参 9 克，粳米 15 克，大枣 5 只。

功能：滋养胃津，降逆下气。

(17) 沙参麦冬汤

来源：《温病条辨》。

组成：北沙参 9 克，肥玉竹 6 克，生甘草 3 克，麦冬 9 克，生扁豆 4.5 克，花粉 4.5 克，桑叶 4.5 克。

功能：甘寒生津，清养肺胃。

(18) 一贯煎

来源：《柳洲医话》。

组成：北沙参 9 克，麦冬 9 克，全当归 9 克，生地 24 克，枸杞子 9 克，川楝子 12 克。

功能：养肝阴，疏肝气。

(19) 肾气丸

来源：《金匱要略》。

组成：熟地 12 克，淮山药 12 克，山茱萸 12 克，茯苓 9 克，丹皮 6 克，泽泻 12 克，桂枝 6 克，附子 6 克。

功能：补肾助阳。

(20) 右归丸

来源：《景岳全书》。

组成：熟地 12 克，淮山药 12 克，山茱萸 9 克，枸杞子 12 克，杜仲 12 克，附子 6 克，菟丝子 12 克，肉桂 6 克，全当归 9 克，鹿角胶^{烔冲} 12 克。

功能：温肾阳，补精血。

(21) 二仙汤

来源：上海曙光医院方。

组成：仙茅 12 克，仙灵脾 12 克，全当归 9 克，巴戟肉 9 克，黄柏 9 克，知母 9 克。

功能：温肾阳，补肾精，调冲任。

(22) 天王补心丹

来源：《摄生秘剖》。

组成：党参 9 克，玄参 12 克，紫丹参 9 克，天冬 9 克，麦冬 9 克，生地 12 克，炒枣仁 12 克，柏子仁 9 克，全当归 9 克，五味子 3 克，茯苓 12 克，桔梗 3 克，远志 3 克。

功能：补心阴，养心神，安心神。

(23) 五子衍宗丸

来源：《丹溪心法》。

组成：枸杞子 12 克，覆盆子 12 克，菟丝子 24 克，五味子 3 克，车前子^包 30 克。

功能：补肾涩精。

(24) 河车大造丸

来源：《扶寿精方》。

组成：河车片 12 克，熟地 12 克，杜仲 9 克，天冬 9 克，麦冬 9 克，龟板 12 克，黄柏 9 克，牛膝 12 克。

功能：补肾填精，滋阴泻火。

(25) 百合固金汤

来源：《医方集解》。

组成：百合 12 克，生地 15 克，熟地 12 克，麦冬 12 克，白芍 9 克，全当归 9 克，川贝母 9 克，玄参 12 克，桔梗 3 克。

功能：养阴润肺，化痰止咳。

二、臣药——辅助和治疗药物

在确定君药的基础上，一方面投入辅助和加强君药的药物，另一方面结合慢性疾病和症状选用相应药物进行调理，辨证施治，以祛除病邪，改善症状，达到充分发挥君药的补益目的。兹选择常用臣药进行简述，以供在膏方中配伍之用。

1. 止咳化痰药

(1) 杏仁：性温味甘苦，属止咳化痰平喘之要药，具有润肺下气、润肠通便的功能。

杏仁在膏方中常与制半夏、广陈皮、百部、苏叶、桑白皮、贝母等药一起煎用。儿科使用杏仁方法很多，与麻黄、甘草配伍水煎，治疗风寒入肺、咳嗽不止有效。

(2) 制半夏：性温味辛，属化痰降逆之上品，具有燥湿化痰、降逆止呕、散结消痰的功能。

制半夏在膏方中可以与治疗各种性质痰浊的药物配伍一起煎服(如与黄芩配伍治热痰，与白芥子配伍治寒痰，与苍术配伍治湿痰，与天南星配伍治风痰等)。临床上，制半夏的作用很多，如以姜汁制配苏叶起到止呕宽胸下气作用，在感冒呕吐时有效。

在膏方中，选用止咳药有杏仁、百部、桑白皮、枇杷叶、款冬花、紫菀、天竺子、江剪刀草等；化痰药有制半夏、苏子、佛耳草、旋覆花、桔梗、贝母、前胡、瓜蒌、葶苈子、瓦楞子。

2. 清热解毒药

(1) 知母：性寒味苦，属清实热又清虚火要药，具有清热泻火、滋肾润燥的功能。

在膏方中，知母用于清虚火为多，如与黄柏相配伍则泻肾火；与沙参、麦冬、川贝母相配伍则治肺虚燥咳；与麦冬、花粉、葛根配伍治消渴；也有配黄芩清肺热，配石膏则清肺胃实热。除知母外，在泻火药中，还可以选用山栀、夏枯草、花粉、竹叶等药。

(2) 玄参：性寒味苦咸，属凉血兼养阴之上品，具有清热滋阴、泻火解毒的功能。

在膏方中，玄参常与鲜生地、麦冬配伍以滋阴、增液而治虚火上炎、咽喉肿痛；与花粉、麦冬、石斛配伍以治消渴；与生地、石决明、夏枯草、菊花、青箱子配伍以清肝明目。

与玄参一样的凉血药还有赤芍、大青叶、茅根等以供选用。但像牛蒡子一类药在膏方中很少使用了。像玄参一类凉血药还与银花、蒲公英、鱼腥草、红藤、田基黄、七叶一枝花、白花蛇舌草等解毒药一起,针对慢性疾病患者中有热毒表现者选用。

3. 清热燥湿药

川黄连:性寒味苦,属治中焦湿热之要药,与黄芩治上焦湿热、黄柏治下焦湿热一起,常称“三黄”,具有燥湿清热、泻火解毒的功能。

在膏方中,选用川黄连治疗病症较多。如配制半夏、竹茹治呕吐;配吴茱萸治胃痛泛酸;配花粉、知母、生地清胃火,治消渴。川黄连和石斛相配伍是治疗慢性活动性肝炎之主要药物。川黄连、黄芩和木香、炮姜炭相配伍是治慢性结肠炎的有效之品。而川黄连与生地、元参、龟板、麦冬一起能治阴虚火旺之神经官能症。在膏方中,除川黄连、黄芩、黄柏为常用的清热燥湿药外,还有胡黄连、龙胆草、苦参、秦皮等可以选用。

4. 芳香化湿药

白豆蔻:性温味辛,属调气化湿之要药,具有化湿和胃、行气宽中的功能。

在膏方中,因其气味芳香,易于挥发,故与其他药一起共煎。针对服用膏方患者,如胃纳不佳,口淡乏味,舌苔腻,脉弦或滑,先用开路方时,常把白豆蔻与佩兰、广陈皮、制半夏、炒枳壳、茯苓、太子参等相配。而平时湿重者,在

膏方中,也把白豆蔻与其他化湿药一起运用。如湿阻脾胃、消化不良者配制半夏、广陈皮、苍术;胃寒纳少呕恶者配制半夏、生姜、藿香。在芳香药中与白豆蔻性味相似的缩砂仁,在膏方中也常用,缩砂仁与熟地同用以去其阴柔,黏腻之性。其他还有藿香、佩兰、苍术、厚朴也为常用之芳香化湿药。

5. 淡渗利水药

茯苓:性平味甘,属导渗下焦湿浊之要药,具有利水渗湿、健脾宁心的功能。

在膏方中茯苓配桂枝、白术、甘草治寒湿;配猪苓、滑石、泽泻治湿热;配黄芪、白术、党参治脾虚水湿逗留;配党参、白术、淮山药、扁豆、甘草治脾虚食少遍便溏;配远志、枣仁治心惊失眠。茯苓与猪苓、薏苡仁、赤小豆一类药配伍,有健脾助运通利水道的作用;与车前子、泽泻、扁蓄草、冬瓜皮一起分利水湿功能较强。另外,淡渗利水药中金钱草、海金沙、滑石、冬葵子的利水排石功能突出。

6. 祛风湿药

秦艽:性平味苦辛,属“风药中之润剂”,具有祛风湿、除虚热、退黄疸的功能。

在膏方中,秦艽配伍药物很多,治疗病症较广。如属风湿偏热的关节胀痛,配木瓜、晚蚕沙、赤小豆、防己、生苡仁、泽泻;属风湿偏寒的关节疼痛配防风、羌活、独活、海风藤、络石藤、青风藤。治虚热则配鳖甲、知母、地骨皮、银柴胡、白薇、炙乌梅、石斛;治黄疸配茵陈、茯苓、薏苡仁、

泽泻。

对于慢性关节疼痛属风湿患者服用膏方可以从病痛不同部位来选择。如风湿在肌肉多见风寒湿痹则选用秦艽、独活、细辛、防风、全当归、川芎、牛膝、杜仲、晚蚕沙等；风湿在经络多见周身痹痛则选秦艽、寻骨风、海桐皮、五加皮、络石藤、海风藤、威灵仙等；若见肢体侧不能自主活动，麻木，伸屈不利则选用秦艽、豨莶草、桑枝、全当归、地黄、川红花、牛膝、地龙；风湿入筋骨多见肢体屈伸不利，关节疼痛，腰酸膝痛，则选石楠叶、徐长卿、落得打、扞扞活、寻骨风、透骨草、泽兰叶、桑寄生、川断、全当归等。

7. 温里散寒药

附子：性大热味大辛，属温十二经之阳上品，具有回阳救逆、散寒止痛、温暖脾肾的功能。

在膏方中，附子运用很广，治肾阳虚者配肉桂、熟地、山萸肉、巴戟肉、菟丝子；治阳虚而见肢厥、乏力者配人参、龙骨、牡蛎；治腹痛下利者配干姜、党参、白术、甘草；治风寒湿痹、周身关节疼痛者配桂枝、羌活、独活。在膏方中用温里散寒药除附子外，还有川乌、草乌、肉桂、干姜、吴茱萸、川椒、高良姜、小茴香、丁香等，可以根据不同病症选用。

8. 安神药

牡蛎：性微寒，味咸涩，属镇惊安神之要药，具有重镇安神、平肝潜阳、收敛固涩、软坚的功能。

在膏方中，起镇惊安神的作用，主要与龙骨、琥珀、磁

石、珍珠母等药一起应用。此外,牡蛎配伍珍珠母、勾藤可平肝阳;配龟板、鳖甲可以熄虚风;配象贝、乌贼骨、广陈皮可和胃止痛;配黄芪、浮小麦又可治自汗;配玄参、贝母又可散结治癭瘤、瘰疬。

除牡蛎、龙骨等为重镇安神药外,还有养血安神药,如酸枣仁、柏子仁、夜交藤、合欢皮、远志、北秫米等在膏方中经常选用。

9. 平肝熄风药

天麻:性平味甘,属治眩晕之要药,具有平肝熄风、通络止痛的功能。

在膏方中,天麻用于熄风很多。“诸风掉眩,皆属于肝”,故眩晕因肝风内动者,熄风也常选用天麻;对于肝阳上亢者,天麻多与石决明、勾藤、菊花、白蒺藜、荷叶相配伍;对风痰所致者,天麻常与制半夏、白术、茯苓相配伍;对于血虚所致者,常与全当归、白芍、杞子配伍。此外,天麻还用于通络止痛,如止头痛配川芎、白芷、细辛等;肢节疼痛,配全蝎、乳香、紫丹参、千年健、豨莶草。

平肝熄风药用于膏方中,还有白蒺藜、紫贝齿、玳瑁、紫石英、石决明、山羊角等可以选择。

三、佐药——辅佐药物

佐药是辅助的意思。选择与主药作用相近的药物,以协助治疗一些次要症状,这叫“正佐”。为了减少药物的偏性,或为了减少某些药物的毒性,防止其不良反应,或者性

味相反而作用相成的都叫“反佐”。

在膏方中,佐药常起到保护胃气作用。由于补药较多,不易消化,时而影响食欲,故方中加入调理脾胃和理气消导的药物非常多。

兹选择常用调理脾胃和理气消导的药物作简述,以供在膏方中配伍使用。

(1) 木香:性温味辛苦,属于理气和胃常选药,具有理气止痛的作用。

在膏方中,常配伍其他一些药物治疗消化功能障碍的患者。如胃脘痛配香附、高良姜、缩砂仁、丁香、藿香等;胁肋痛配青皮、炒枳壳、川楝子等;湿浊较重配制半夏、茯苓、藿香、佩兰、川黄连、薏苡仁等。木香在膏方中运用时,尚可选择广陈皮、青皮、炒枳壳、枳实、乌药、川楝子、大腹皮、甘松、佛手、香橼、绿萼梅、荔枝核、沉香等药运用。

(2) 苏子:性温味辛,属通降肺气常选药,具有温降肺气、消痰定喘的功能。

在膏方中,常配伍其他一些宣肺化痰、降气平逆、定喘的药治疗以肺气不降、痰浊内壅的患者。如化寒痰配制半夏、广陈皮等;化脓痰配桔梗、薏苡仁、冬瓜仁、桃仁泥等;化顽痰配礞石、黄芩、蛤壳等;化热痰配瓜蒌、桑皮、贝母等;化痰结配瓦楞子、三棱、莪术等。中医认为“痰生百病”,故有慢性病,如甲状腺肿大等病患,常用化痰法治疗。这些患者用膏方时;可以配伍辨证选用化痰药物。

(3) 软柴胡:性平味苦,属疏肝气之要药,具有发表退

热、解郁升提的功能。

在膏方中,软柴胡以其疏肝作用而配伍一些解郁理气的药物治疗情怀抑郁、肝气不舒的患者。如治疗气郁胸闷配广郁金、木香、青皮等;胁痛腹泻配枳实、白芍等;胁痛肝郁血虚配白芍、白术、全当归、茯苓、薄荷等。在膏方中选用软柴胡时,尚可有川楝子、炒枳壳、玄胡、白芍、木香、青皮、广陈皮、佛手等药物选择运用。

(4) 鸡内金:性平味甘,属消食之上品,具有消食积、排结石、止遗尿的功能。

在膏方中,鸡内金以其消积作用而配伍其他一些药物治疗消化不良患者,尤其是脾胃虚弱者。如平时纳少而服用膏方者,应用鸡内金配茯苓、淮山药、白术、广陈皮等;平时食后而易腹胀者,应用鸡内金配木香、炒枳壳、谷芽、麦芽、山楂等。鸡内金也可以炒后研末,开水调服以治疗胃纳较差。如患者有胆结石则用鸡内金配广郁金、制大黄、枳实、白芍;有尿路结石则用鸡内金配广郁金、海金沙、冬葵子。

四、使药——引经药物和调和药物

使药为引经药,即引导诸药直达病所或专起到调和诸药的作用。

在膏方中,使药多为调和诸药,也有引经的药。如用软柴胡、桔梗、升麻等上行药,或用牛膝等下行药。有的用入五脏药以治疗相应的脏腑疾病,并用化湿、祛风、利尿、

通便的药物排除其废物于体外。

五、收膏和矫味药物

在药物浓煎三次后,去渣取汁,用文火浓缩,再加入膏类配料和糖以慢火收膏。

收膏药有两类,一类是荤膏,如龟板胶、鹿角胶、鳖甲胶、驴皮胶、龟鹿二仙胶、牛鞭胶、霞天胶。烊化荤胶多用黄酒,以除其腥膻之气,又可助其运化,以防其黏腻胶固难化。素胶有桑葚膏、二冬膏、金樱子膏、夏枯草膏、枇杷叶膏等。

矫味药多用白冰糖(亦可用砂糖)、饴糖(麦芽糖)。糖不仅起到矫味作用,还可以起到防腐和收敛的作用。

六、注意事项

在膏方组成内容上还有几个方面值得注意:

(1) 处方饮片中使用的根、茎、实、子、花类的中药,要完整干净,尽量少用叶、全草或是质轻体松灰沙多的中药。

(2) 膏方中不宜使用药性猛烈、峻下、毒副作用明显、苦涩味大、有臭味的药物,否则影响服用,刺激胃肠,引起恶心反应。

(3) 贵重药应另煎冲入。如人参、西洋参、冬虫夏草,另煎取汁冲入浓汁中一起收膏。也有研末,如野山参、珍珠粉、胎盘粉等倒入一起拌匀。

(4) 桂圆肉、红枣肉、胡桃肉可入补药一起煎,也可在

收膏时把这些原物一起放入,但红枣、胡桃均要去皮和核。

(5) 膏方制作过程中,收膏一环很重要。火头要小,既要保持煮沸状态,又要不停搅拌,不能粘得锅底烧焦,最后成黏稠状,冷却后结冻成膏。

第三章

古今医案膏方选

由近代名医朱良春教授等学者整理的《章次公医案》一书中记录了著名中医学家章次公先生对膏方的一段论述,甚为精辟。他说:膏方之制,不见仲景、思邈之书,即金元四家亦未尝有焉。溯其所自,实始于明代注重血肉有情之品,为虚羸不足者辟一新途径。今考《韩氏医通》,实为用膏方之镐矢者,然亦因病施药,毫不驳杂。降及近代膏方,遂为富有者之“安慰品”,寒热温凉,龙潜动植,聚于一方,只求昂贵,中病与否不计也。本医室力矫此弊,辨证用药,不求药味众多,而取精用宏,更参以远西之荷尔蒙、维生素等学说,组织本方。世有知音,相视而笑。其门人对此还有按语:先生此案专论膏方,对解放前部分医者乱用膏方,用药庞杂、昂贵,以取媚病家,提出了批评,而先生开列膏方,则辨证用药,从实效出发。这充分体现了他的革新求实精神以及不附和顺俗的高尚品德。

认识、学习膏方,了解古今医家的膏方很有帮助。这里选录两部分内容:一是成品方,即已配成的膏方,大多在药房有售;二是书写成病案即病案方,经过辨证开列的膏方,要求制作后服用。

第一节 成 品 方

一、清宁膏（《医宗必读》）

组成：麦冬、生地、广陈皮、桔梗、甘草、龙眼肉、薏苡仁、川贝、薄荷净叶，研末，拌匀煎膏。

适应证：劳嗽吐血，干咳痰少，口干舌燥，神疲乏力，食少气短。

服法：每服1食匙，约10克，早晚各一次，开水冲服。

二、二冬膏（《张氏医通》）

组成：麦冬、天冬、冰糖。

适应证：肺阴不足，干咳少津，咽喉燥痛，声哑或者痰中带血者。

服法：每服1食匙，约10克，早晚各一次，开水冲服。

三、夏枯草膏（《医宗金鉴》）

组成：夏枯草、甘草、桔梗、全当归、白芍、川红花、广陈皮、川芎、昆布、玄参、香附、象贝母、僵蚕、乌药、蜂蜜。

适应证：瘰疬、瘰疬痰核。

服法：每服1食匙，约10克，早晚各一次，开水冲服。

四、琼玉膏（《洪氏集验方》）

组成：人参、茯苓、生地、白蜜。

适应证：脾胃虚弱，面色少华，食少，腹胀，下肢萎软无力。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

五、八仙膏（《万病回春》）

组成：藕汁、姜汁、梨汁、萝卜汁、甘蔗汁、白果汁、竹沥、蜂蜜。

适应证：津亏液干，吞咽困难，口干舌燥。

服法：每服 2 食匙，约 20 克，慢慢咽下，每日 2~3 次，开水冲烱。

六、滋荣养液膏（《薛生白医案》）

组成：女贞子、广皮、桑叶、熟地、白芍、黑芝麻、旱莲草、枸杞子、归身、菊花、黑豆、南竹叶、肥玉竹、白茯苓、沙苑蒺藜、炙甘草。

适应证：肝肾不足，头目眩晕，腰膝酸软，肢体麻木，失眠多梦，健忘，时见耳鸣，呆傻，舌体偏瘦。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

七、伏龙肝膏（《济生方》）

组成：伏龙肝末、生地黄汁、麦门冬汁、刺蒺藜汁、白蜜。

适应证：气阴不足，阴虚内热，吐血反复发作，头晕心悸，口咽干燥。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

八、十全大补膏（《中成药手册》）

组成：党参、甘草、熟地、肉桂、茯苓、白术、白芍、全当归、川芎、黄芪。

适应证：男女体弱，气血两虚，面色萎黄，头目眩晕，肢体疲乏无力者。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

九、人参大补膏（《实用中医养生全书》）

组成：白人参、党参、太子参、黄芪、茯苓、生地、熟地、阿胶、全当归、杞子、黄精、肥玉竹、首乌、女贞子、麦芽、谷芽、五味子。

适应证：气虚血少、呼吸短促、面色萎黄、四肢乏力、失眠健忘、心悸纳少者。

服法：每服 1 食匙半，约 15 克，早晚各一次，开水冲服。

十、稚儿膏（《中成药手册》）

组成：孩儿参、党参、南沙参、生地、制首乌、白术、全当归、白芍、槽豆、扁豆、淮山药、仙鹤草、五味子、浮小麦、广陈皮、红枣、甘草。

适应证：小儿厌食，面黄体弱，夜寐不宁，睡中盗汗者。

服法：每服半食匙，约 5 克，早晚各一次，开水冲服。

十一、双龙补膏（《中成药手册》）

组成：龙眼肉、龙芽草、仙鹤草、生晒人参、枸杞子、黄芪、麦冬、党参、石斛、白术、菟丝子、黄精、锁阳、淫羊藿、桑枝、熟地、刘寄奴、首乌、山楂、紫丹参、茯苓、白芍、广陈皮。

适应证：眩晕，神疲乏力，腰膝酸软。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十二、健身长春膏（《实用中国养生全书》）

组成：红参、黄芪、白术、茯苓、甘草、熟地、全当归、川芎、杞子、首乌、女贞子、桑葚子、广陈皮、制半夏。

适应证：气血不足，肝肾阴亏，头晕眼花，神疲乏力，耳鸣心悸，失眠健忘。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十三、葆春膏（《中成药手册》）

组成：生晒人参、生黄芪、地黄、鸡血藤、全当归、桑葚子、灵芝、淫羊藿、珍珠粉、枇杷叶。

适应证：气血亏虚，头晕眼花，心悸失眠，肺虚咳嗽。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十四、蛤蚧党参膏（《中成药手册》）

组成：蛤蚧、党参。

适应证：脾胃虚弱，肺气不足，体倦乏力，虚劳咳喘。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十五、桑葚子膏（《实用中国养生全书》）

组成：桑葚子、冰糖。

适应证：肝肾两亏，头昏眼花，须发早白，年老肠燥，大便秘结。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十六、杞圆膏（《虚弱的药补和食补》）

组成：枸杞子、桂圆肉、阿胶。

适应证：阴血不足，肾精亏损而致头晕眼花，腰膝酸软，面色萎黄，心悸不宁，夜寐不安，大便干结。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十七、参枫膏（《虚弱的药补和食补》）

组成：枫斗、西洋参、鳖甲胶、蜂蜜、冰糖。

适应证：气阴不足，肾阴亏损之眩晕，夜寐不安，时盗汗，口咽燥，纳食减少。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十八、枇杷叶膏（《实用中国养生全书》）

组成：鲜枇杷叶（刷去毛）、麦芽糖。

适应证：新久咳嗽。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

十九、益母草膏（《实用中国养生全书》）

组成：益母草、赤砂糖。

适应证：月经不调，产后瘀阻腹痛。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

二十、噎膈膏（《实用中医内科学》）

组成：人参、牛乳、蔗汁、梨汁、芦根汁、桂圆肉汁、姜汁、人乳。

适应证：热结津伤，阴液枯干，口干咽燥，胸背灼痛，食物难咽，肌肤枯燥。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，慢慢咽下，每日 3~5 次，温水调服。

二十一、敛肺止血膏（《实用中医内科学》）

组成：党参、百合、生地、诃子肉、黛蛤散、花蕊石、旋覆花、竹沥、制半夏、麦冬、五味子、巴戟天、广陈皮、炙甘草。

适应证：反复咳血不止，头晕目眩，心悸，口干咽燥，心悸，夜寐不安。

服法：每服 1 食匙，约 10 克，早晚各一次，开水冲服。

二十二、复方甲亢膏（《实用中医内科学》）

组成：黄芪、党参、麦冬、白芍、夏枯草、生地、紫丹参、牡蛎、苏子、五味子、制香附、白芥子。

适应证：气阴两虚的甲状腺功能亢进症，心烦，急躁易怒，眼球突出，手指颤抖，多食易饥。

服法：每服1食匙，约10克，早晚各一次，温水冲服。

第二节 医 案 方

从清末开始，膏方常由医家把理法方药书写在一张处方上，而且有独特的格式，形成其特色。从这种特色中，可以看出中医理、法、方、药的一致性和完整性，可以看出医家的文字和书法水平。有的膏方医案，以其书写工整、规范，常为一些人作艺术品收藏。当然，更重要的是，一张完整的膏方医案中还包括服法及注意点等医嘱，可以反映医家高尚的品德。这里选录清代、民国和现代医家的膏方医案，以见其特色（笔者不作评析修删，以窥原貌）。

一、王旭高(1798~1862)膏方医案

徐 昔立斋治病，每定一方，令人服数十剂，非精心治果，乌能若此！然非病家信之真，任之专，亦乌能若此！林之不才，何敢妄希前哲，然审病既的，药当不谬，从此加鞭，

以图进益。

天冬	麦冬	生地	熟地	怀山药
沙参	茯神	枣仁	牡蛎	白芍
洋参	阿胶	红枣	浮麦	

此妇年三十四五,从未生育,因惊恐患怔忡头昏,耳鸣火升,发热汗出,食少便坚,将及百日,服此 30 帖见效,即将此方加重,煎膏常服,几及一年,痊愈,后生一子。

二、张聿青(1844~1905)膏方医案

案一 林右 阴分久亏,木失涵养,肝强木燥,生火生风,阴血为热所迫,不能固藏,经水反多,甚至一月再至,营血由此更亏,阳气化风,上旋为头晕,撼扰神舍为心悸,为火升轰热。诸虚象杂陈,脉形弦细,左部涩弱,且有数意。阴弱阳强,急宜养血益阴,以配合阳气,庶不致阴虚致损,因损不复耳。

大生地	西洋参	炒枣仁	厚杜仲
茯神	大熟地	奎党参	潼沙苑
椿白皮	制首乌	生于术	大天冬
川石斛	生山药	柏子仁	乌贼骨
当归炭	粉丹皮	炒萸肉	大麦冬
旱莲草	池菊花	地骨皮	杭白芍
细子芩	香附	黑豆衣	橘白
女贞子	生熟甘草		

上药宽水煎三次,去渣再煎极浓,加清阿胶、龟板胶熔

化冲入收膏，以滴水成珠为度。每晨服 1 调羹，开水冲挑。

案二 任左 上则眼目昏花，下则阳道不通，有时火升面热，稠厚之痰，从喉中咯出，或谓真阳式微，阳道闭塞，则眼目昏花，火升面热，又系阴虚阳升明证。如以阴道不通，与火升目花分为两途。则欲养其阴，必制阳光，欲助阳光，必消阴翳，未利于此，先弊于彼矣。或者阴阳并虚，水火皆乏，庸有是理，然果水火皆乏，安能形气皆盛，起居无恙乎？细察阳道不通，断非阳衰不振，实缘肾水不足，虚阳尽越于上，阳不下降，所以阳道不通，与阳气衰乏者，判如霄壤也。脉象弦大，尤为阳气有余之征，拟每晨进育阴以潜伏阳气，每晚进咸化痰热，备方如下。

大生地	制首乌	生甘草	大熟地
黑豆衣	大天冬	生牡蛎	煅磁石
大麦冬	海蛤粉	川石斛	奎党参
生山药	浙茯苓	川贝母	西洋参
甘杞子	大元参	生于术	粉丹皮
女贞子	石决明	池菊花	橘红
酒炒白芍	潼沙苑	牛膝	泽泻

右上药煎 3 次，去渣，用清阿胶三两，龟板胶三两，鱼鳔胶二两熔化冲入收膏。每晨服一调羹。再另加陈关蛰三斤，洗极淡，用清水煎烊，渐渐收浓，加荸荠汁六两冲入，更加白冰糖二两收膏，每晚将卧时服半调羹，俱用开水冲挑。

三、丁甘仁(1865~1926)膏方医案

案一 罗右 始患痔漏,继则不寐,痔漏伤阴,阴伤及气,气阴不足,气不能配阳,阴虚及阳,故为不寐。不寐之因甚多,而大要不外乎心肾。离中一阴,是为阴根,阴根下降,是生水精。坎中一阳,是为阳根,阳根上升,则为火母。坎离交济,水火协和,阳入于阴则为寐,阳出于阴则为寤也。肾阴不足,水不济火,心火不能下通于肾,肾阴不能上济于心,阳精不升,水精不降,阴阳不交,则为不寐,此不寐之本也。肝为乙木,内寄阳魂,胆为甲木,内含相火。平人夜寐,魂归于肝,阳藏于阴也。肾阴亏耗,水不涵木,肝不能藏其阳魂,胆不能秘其相火,神惊火浮,亦为不寐,此不寐之兼见也。离处中宫,坎居下极,位乎中而司升降者脾胃也。胃以通为补,脾以健为运,胃失流通,中宫阻塞,不能职司升降,上下之路隔绝,欲求心肾之交,不亦难乎。故《经》云:胃不和则卧不安,胃不和者,不寐之标也。道书云:离为中女,坎为中男,而为之媒介者坤士也,是为黄婆,其斯之谓乎。错综各说,奇偶制方,益气以吸阳根,育阴以滋水母,升戊降己,取坎填离,益气即所以安神,育阴亦兼能涵木,标本同治,以希弋获,是否有当,即正高明。

清炙黄芪 120 克	上潞党参 90 克	半夏 60 克
大生地 120 克	抱茯神 90 克	大熟地 120 克
制远志 30 克	炙甘草 60 克	酸枣仁 90 克
北秫米 ^① 90 克	天冬 45 克	麦冬 45 克

炒怀山药 60 克	杞子 60 克	生牡蛎 120 克
橘白 30 克	当归身 90 克	大白芍 90 克
花龙骨 60 克	龙齿 30 克	紫石英 90 克
炙鳖甲 90 克	川石斛 90 克	马料豆 90 克
潼蒺藜 90 克	紫丹参 60 克	川贝母 60 克
制首乌 60 克	合欢皮 45 克	莲子 60 克
红枣 180 克	鸡子黄 10 枚	

上药煎四次，取浓汁，加龟板胶 120 克、清阿胶 120 克，均用陈酒炖化，白冰糖 250 克融化。再将川贝、鸡子黄依次加入，搅和收膏。每早晚各服二匙，均用白开水冲服。如遇伤风停滞等症，暂缓再服可也。

案二 张左 肝为将军之官，肾司封藏之本，肾水不足，肝木失于条达，气滞中州，脾胃运化失常，胸闷暖气虽减，屡屡吞酸，职是故也。君相火动，精关不固，精不充其力，阳事不振，以致遗泄而阳痿也。当宜益肾柔肝，固摄精关。

别直参(另煎汁收膏)30 克	潞党参 120 克	
清炙草 15 克	清炙黄芪 90 克	抱茯神 90 克
怀山药 90 克	炒于术 45 克	明天冬 90 克
山萸肉 90 克	当归身 60 克	大白芍 60 克
甘杞子 90 克	厚杜仲 90 克	川断肉 90 克
杜狗脊 90 克	左牡蛎 120 克	芡实 90 克
大生熟地 ^各 90 克	制黄精 90 克	复盆子 90 克
菟丝子 60 克	肥玉竹 90 克	半夏 45 克

砂壳 24 克 橘白 30 克 红枣 120 克
 莲子(去心)120 克

上药煎四次,取极浓汁。加清阿胶 45 克,鹿角胶 45 克,龟板胶 45 克,均用陈酒炖烊。白冰糖 250 克,烊化收膏。每早晚各服两匙,均用开水冲服。如遇伤风停滞等症,暂缓再服可也。

四、陈筱宝(1872~1973)膏方医案

陈右 冲任虚弱、血海不足,平素将息失宜,久则血枯营少。今已有半年,经水不临伴肌肉瘦削,皮肤枯索,爪甲泛青,口干舌燥,脉象沉细,医者诊为瘀停于内,取桃仁泥、川红花、全当归等活血药,服 6 剂后,经水 3 月仍不通,反成胸腹胀满,再加三棱、莪术破血祛瘀,遂见潮热,掌心灼热,大补营血之品缓缓图治,2 月后诸恙渐瘥,3 月后经行正常。其服膏药如左下:

人参 ^{另煎} 3 克	茯苓 10 克	白芍 10 克
川芎 10 克	生地 9 克	熟地 9 克
知母 6 克	川红花 3 克	山药 10 克
玄参 6 克	丹皮 6 克	陈阿胶 6 克
龟板胶 ^{烊化} 3 克	柿霜 6 克	天门冬 9 克
银柴胡 9 克	鳖甲胶 ^{烊化} 3 克	
牛乳、羊乳、人乳各 10 匙 梨汁 1 匙		
八制香附丸 9 克依法制膏。		

此方以归、芎、芍、地之四物为君,配天门冬、知母补益

肺金以培生化之源,龟板、鳖甲、驴皮胶之滋养阴血,人、牛、羊之乳能润泽血脉,充其营养,丹皮、银柴胡、柿霜既滋营阴,又除内热,茯苓、淮山药健脾和胃,以助运化,全方配制以滋养补血为旨,以达调养、滋荣冲任之脉,待至“太冲脉盛,月事以时下”。

五、祝味菊(1884~1951)膏方医案

陈左 失血家,精气亏,肾失潜藏,夏令病咳逆失血,与益阴固肾而瘥。现当蛰藏之际,应慎下之,以栽培生气,宗元气有伤,当与甘药之例。

潞党参 90 克	熟地 240 克	朱茯神 90 克
生龙齿 90 克	生白术 120 克	生黄芪 90 克
淮山药 120 克	炒枣仁 60 克	炙远志 24 克
巴戟天 90 克	沙苑子 60 克	金樱子 60 克
菟丝子 60 克	枸杞子 60 克	白莲须 30 克
白莲心 30 克		

上药浸渍 1 宿,浓煎取汁,加重阿胶 120 克、白蜜 250 克收膏,每服 1 汤匙,开水冲服。

六、秦伯未(1901~1970)膏方医案

案一 秦某 经某医院确诊为“肺癌”,形体消瘦,精神萎靡,懒于言语,面色青黑,眼睑、颊部、颈项部皆肿胀,肿处皮肤不变色,胸部常有压迫感,动则气喘、咳嗽,痰量不多,鼻涕及痰液中常有血丝,口干舌燥,纳食无味,心慌

心悸,夜寐多梦,大便无论干稀均感排出困难。脉沉细弱,舌光绛无苔。经化疗后,白细胞下降。治当扶正祛邪,处方:

西洋参、别直参^各 30 克(均另炖汁,冲入收膏)
 冬虫夏草(另煎冲入)60 克 紫河车 60 克
 清炙黄芪 90 克 川百合 90 克 白茯苓 90 克
 淮山药 90 克 生苡米 90 克 南北沙参^各 60 克
 天麦冬^各 60 克 五味子 60 克 川浙贝^各 60 克
 大熟地 90 克(用缩砂仁 24 克拌) 仙鹤草 60 克
 橘白络^各 30 克 旱莲草 60 克 炙僵蚕 30 克
 生牡蛎 60 克 京玄参 60 克

上药浸透,浓煎两次,滤汁去渣,再加驴皮胶 60 克、鹿角胶 60 克、鳖甲胶 60 克、冰糖 240 克,文火收膏。每日早晚空腹时用开水冲服 1 食匙。经服用一个冬季后,诸症明显好转,精神振作,稍动而不喘,咳嗽大减,痰中已去血丝,纳增眠安,白细胞也有回升。

案二 某女 患胸膜炎,经用小陷胸汤加减治愈。入冬以来,又作咳嗽,痰多黏腻色白,气喘,精神困顿,纳食不佳,睡眠梦扰,大便较干,隔日 1 行,脉象沉滑,舌质淡,舌苔白腻。治拟调补肺肾,佐以健脾助运。处方:

西洋参、生晒参^各 30 克(均另炖汁,冲入收膏)
 炙蛤蚧 2 对、冬虫夏草 30 克(另煎冲入)
 核桃肉 90 克 绵黄芪 90 克 云茯苓 90 克
 蒸于术 90 克 全当归 90 克 全瓜蒌 90 克

甜杏仁(去皮尖)90克	川朴 60克	炙苏子 60克
炙远志 45克	干菖蒲 45克	炙百合 90克
陈皮 90克	半夏 60克	沉香 15克
山药 90克	川浙贝 ^各 90克	炙鸡内金 90克
大红枣 60克		

上药浸透,浓煎两次,滤汁去渣,再加龟板胶 120 克、鹿角胶 120 克、冰糖 240 克,文火收膏。每日早晚空腹服时用开水冲服 1 食匙。药后,老人竟霍然而愈,依旧能操持家务。

案三 郭女 当地医院诊为“急性粒细胞性白血病”,经中西医合作抢救脱险,回家疗养。患者面色眇白无华,口唇淡白,疲乏短气,语音低微,头晕目眩,饮食无味,夜寐多梦,心悸不安,腰肢酸软无力,大便不调,或干或稀,经期正常,血量较多,每逢经期周身倍感不适,舌质淡,舌体胖嫩边有齿痕,苔薄白,脉象沉细弱,治拟益肾,阴阳兼顾。处方:

别直参 30 克(另炖汁,冲入收膏)

潞党参 90 克	清炙黄芪 90 克	大海参 30 克
仙灵脾 90 克	巴戟天 60 克	补骨脂 90 克
骨碎补 90 克	菟丝子 90 克	山萸肉 90 克
淮山药 120 克	云茯苓 90 克	鸡血藤 90 克
制黄精 90 克	桂枝尖(与杭白芍 50 克同炒)	
甘杞子 90 克	潼蒺藜 90 克	黑芝麻 45 克
广陈皮 60 克	旱莲草 90 克	肉苁蓉 90 克

炒白术 90 克 制首乌 90 克

上药浸透，浓煎两次，滤汁去渣，再加鱼鳔胶 120 克、鹿角胶 120 克、冰糖 240 克，文火收膏。每日早晚空腹用开水冲服 1 食匙。药后病情明显好转。此膏方连续服用三个冬季，病情稳定，20 年后随访仍健在。

七、程门雪(1902~1972)膏方医案

某左 脉右小左弦大，尺弱寸关弦，头晕，俯后更甚，用脑过度，遂见后脑痛，右手振颤，右臂酸软无力，眼花，寐久酣，梦多，肝肾亏，内风扰，络道不和，心神不安，拟滋养肝肾而安心神，调和气血，宣通络道，膏滋服用，缓图功效。

大生熟地^各 120 克 缩砂仁末 12 克同打

山萸肉 120 克 淮山药 120 克 甘杞子 120 克

细石斛 120 克 潼白蒺藜^各 90 克 制首乌 120 克

菟丝子 90 克 抱茯神 90 克 炙远志 30 克

炒枣仁 90 克 夜交藤 30 克 五味子 15 克

炒麦冬 60 克 炒杭菊 60 克 大白芍 60 克

稽豆衣 120 克 大红枣 120 克 炙黄芪 90 克

全当归 60 克 巴戟肉 90 克 稀荃草 120 克

晚蚕砂^包 120 克 丝瓜络 90 克

上药依法炮制，煎 3 次，取浓汁，另加入桑枝膏 180 克、龟板胶 120 克、冰糖 240 克，融化收膏，每日早晚各服 1 匙，如遇伤风伤湿，胃口不好暂停。忌菜菔、蟹腥、腥辣等味。

八、李聪甫膏方医案

男 35 岁 咳嗽吐血，骨蒸潮热，盗汗失眠，背冷喜曝，饮食纳呆，肌肉瘦脱，面色枯索。

诊视脉虚弦数，舌质淡红，病因肺气虚损，卫阳不足。“阳气者，若天与日”，“背为阳”，肺卫之阳不健，赖天日之阳以助，故喜曝背；吐血系阳络之伤，阳络伤，则血不营其肺，痰浓盗汗，阴血日损。法当固卫温肺，即“劳者温之，损者益之”之意。

炙黄芪 10 克	潞党参 10 克	于术 7 克
云茯苓 7 克	玉竹 10 克	苡仁 10 克
枇杷叶 10 克	炙紫苑 5 克	款冬花 5 克
川贝母 5 克	百部 5 克	苏子 3 克
橘络 3 克	炙甘草 3 克	

复诊：咳减眠安，肺气颇得温养，精血渐滋，原方去苡仁、冬花，加当归参 10 克。

三诊：背寒大减，盗汗亦收，卫固则营和。前方续服，诸症俱解，乃定膏方，益脾保肺，巩固疗效。

炙黄芪 100 克	蒸玉竹 100 克	蒸苡仁 100 克
枇杷叶 70 克	潞党参 70 克	蒸于术 70 克
云茯神 70 克	当归身 70 克	酸枣仁 70 克
炙紫苑 50 克	炙冬花 50 克	川贝母 50 克
玉苏子 30 克	蒸百部 30 克	炙远志 30 克
广橘络 30 克	北五味 30 克	炙甘草 15 克

以上药味,熬取浓汁,过滤,冰糖 500 克,收膏。每日早中晚按时按量开水冲服。

九、胡建华膏方医案

案一 男 营业员 诊断:糖尿病。

初诊日期:1984 年 11 月 21 日

开路方:患消渴症四年余。初起多尿、多饮、多食,空腹血糖曾高达 16.46 毫摩尔/升(294 毫克%),长期服用降糖西药及中药治疗。现“三多”症状并不明显,但见精神困倦、形体消瘦、视力减退、腰酸、阳痿、畏寒、头晕、口干,臀部有散在小疖疼痛,不能平坐。舌质淡尖红,苔薄腻,脉细弱略数。半月前复查空腹血糖 9.74 毫摩尔/升(174 毫克%),外院诊断为糖尿病。现服 D860 0.5 克,日服 2 次,降糖灵 25 毫克,日服 2 次。治拟滋肾温阳,活血化瘀。处方:

生熟地 ^各 15 克	山萸肉 12 克	制黄精 15 克
菟丝子 12 克	制首乌 15 克	肥玉竹 15 克
天花粉 30 克	炙黄芪 15 克	益母草 12 克
赤白芍 ^各 15 克	金银花 15 克	生山楂 12 克

服上方 7 剂后,精神略振,腰酸、畏寒、头晕、口干等症均见减轻,臀部小疖消退。原方去黄精,加淮山药 15 克,续服 7 剂。

膏滋方:消渴初期,不越阴亏阳亢,津涸热淫。患者年近花甲,恣食甘肥,嗜酒成瘾,以致灼伤津液而生消渴。

病已四载,“三多”之症不著。症见行瘦色萎、神疲乏力、视力模糊、头晕、腰酸、阳痿、畏寒、口干,臀部常患疮疖。舌质淡胖、尖红、苔薄腻,脉细略数。良由燥热之症,迁延日久,阴损及阳,以致阴阳俱虚,血瘀阻络。治拟培益肝肾,平补阴阳,活血化瘀。处方:

生晒人参 50 克	炙黄芪 200 克	生熟地 ^各 150 克
山萸肉 150 克	淮山药 150 克	天花粉 200 克
制黄精 150 克	菟丝子 150 克	锁阳 150 克
制首乌 200 克	肥玉竹 200 克	仙灵脾 150 克
枸杞子 150 克	旱莲草 150 克	楮实子 150 克
潼蒺藜 150 克	全当归 120 克	紫丹参 120 克
杜红花 100 克	赤白芍 ^各 150 克	益母草 150 克
粉丹皮 150 克	金银花 150 克	生山楂 150 克
陈广皮 120 克	春砂仁 80 克	

上药除生晒人参外,余药均用清水隔宿浸泡,煎 3 汁,过滤去渣取汁。文火缓缓浓缩,加陈阿胶 120 克、鹿角胶 60 克,陈绍酒 100 克,兑少量清水,炖烊。于收膏时将生晒人参另煎浓汁冲入。每早晚各服一汤匙,隔水蒸化。如遇感冒发热,伤食停滞,请暂停服用。服膏方期间,忌菜菔、饮茶、咖啡。戒酒、烟、甘肥辛辣食物。节制房事,避免恼怒。

复诊:1985 年 3 月 4 日。

经服膏方调补后,面色转华,精神渐振。去冬畏寒、腰酸等症,明显减轻,疮疖敛后未发。口干,早晚怕冷。苔薄

腻,脉小滑。已停服降糖灵,单服原剂量 D860。空腹血糖 7.56 毫摩尔/升(135 毫克%)。再拟益气补肾,活血化瘀。

处方:

炙黄芪 15 克	太子参 15 克	生熟地 15 克
山萸肉 12 克	制首乌 15 克	肥玉竹 15 克
天花粉 30 克	益母草 12 克	赤白芍 15 克
全当归 15 克	杜红花 6 克	陈皮 6 克

上方加减,服用 3 个月,西药全停,病情稳定。又服 4 个月,于同年 10 月 8 日复诊时,除略有口干,腰酸及视力较差外,其余症状均已消失,空腹血糖降至 6.27 毫摩尔/升(112 毫克%)。

本案外院已确诊糖尿病,中医属消渴范畴。四年多来,服用各种西药以及近千帖中药,症状未见明显改善,空腹血糖未能降至正常范围。以往服中药之所以效果不显,主要过分偏于养阴润燥,而忽于益气温阳,同时没有抓住血瘀这一关键问题。糖尿病初起,多偏肺胃燥热,此时用药或可偏于滋阴清热。但缠绵日久,多见阴损及阳,故必须兼顾阳气。盖燥热灼伤津血,或阴虚及阳,阳气虚衰,均可致瘀。故消渴之症,必夹瘀血。即使未见肌肤甲错、面晦、舌紫等症,亦必须施用活血化瘀法,长期临床经验证明,此法确实可以提高治疗效果。因此,本例治疗原则,以培益肝肾、平补阴阳、活血化瘀为主。根据现代药理研究,方中生晒人参、黄芪、生地、天花粉、制首乌、肥玉竹等益气补肾养阴药,均有较好的降低血糖作用。在临

床中,如能做到既从中医辨证施治原则处方,又从现代药理角度选药,常能取得比较满意的疗效。患者阴阳两虚,故温阳药中,尽量避免附子、肉桂、桂枝、干姜等刚燥之品,而选用菟丝子、锁阳、仙灵脾等温柔之剂为宜。糖尿病常见多发性疮疖,非单用清热解毒药或抗生素所能解决。在滋肾温阳治本的基础上,稍佐银花配赤芍、丹皮、生山楂等清热凉血化瘀之品,以后疮疖未见复发。由于患者嗜酒,贪食甘肥致病,故膏方中浸泡胶剂的绍酒仅用100克,并避免用甘草、大红枣等含糖较高的药物。至于膏方中常用的冰糖、蜂蜜之类的配料,亦非糖尿病人所宜,故以不用为妥。

案二 女 31岁 教师 诊断:血管性头痛。

初诊日期:1986年11月8日

开路方:头痛反复发作已达七年,逐步加重,近年来发作尤为频繁。半月来头痛几乎每天发作,以巅顶及眉棱为甚,经期则痛势加剧,伴恶心呕吐,长期服用麦角胺咖啡因等以止痛。两目畏光,耳鸣、腰酸,神倦面萎,梦扰纷纭,肢麻,颈项板滞。血压18.62/10.91千帕(140/82毫米汞柱)。体检:颅神经正常,脑电图正常。脉弦细,苔薄腻,舌质淡胖青。治拟平肝熄风,活血化瘀。处方:

旱莲草 12克	枸杞子 12克	嫩钩藤 15克
炙地龙 9克	炙僵蚕 9克	川芎 9克
赤白芍 ^各 15克	红花 6克	丹参 15克
仙灵脾 12克	生铁落 60克(先煎)	生南星 12克

七剂。星蜈片 100 片,每次吞服 5 片,日服 2 次。

服上方 7 剂后,头痛减轻,近两天头痛消失。续服 7 剂,适逢经临,头痛又作,但程度较以往经期为轻。

膏滋方:辛勤育苗,复因操持家务,导致气血不足,肝肾亏虚,风阳上扰,累及清空,久则气血瘀阻,以致头痛反复发作,恶心呕吐,腰酸耳鸣,肢麻,颈项板滞等症作矣。经期头痛尤甚,乃冲任不调之故。脉弦细,苔薄腻,舌质淡胖青。治拟益肾养肝,熄风豁痰,活血化瘀,调和冲任。处方:

生熟地 ^各 150 克	山萸肉 120 克	淮山药 150 克
枸杞子 150 克	旱莲草 120 克	楮实子 150 克
潼白蒺藜 ^各 150 克	桑寄生 150 克	川断肉 150 克
仙灵脾 200 克	淡苁蓉 200 克	炙地龙 150 克
炙僵蚕 150 克	川芎 150 克	赤白芍 ^各 150 克
杜红花 80 克	丹参 150 克	嫩钩藤 150 克
明天麻 100 克	粉葛根 150 克	生石决明 300 克
生铁落 300 克	生南星 200 克	菖蒲 100 克

全蝎 40 克、蜈蚣 40 克,微火烘脆,勿使焦,研极细粉。

上药除全蝎、蜈蚣外,用清水隔夜浸泡,煎三汁,去渣取汁,文火缓缓浓缩,加陈阿胶 140 克,打碎,用陈绍酒 250 克炖烊,加冰糖 500 克,连同全蝎粉、蜈蚣粉乘热冲入收膏。每早晚各一匙,开水冲服。如遇感冒发热,伤食停滞,请暂停服用。服膏方期间,应忌菜菔、饮茶以及咖啡、烟、

酒、辛辣刺激性食物。避免过于劳累,注意适当休息。

复诊:1986年12月11日

膏滋方:以上膏方即将用罄。近一月来头痛发作周期延迟,程度明显减轻,经期亦未大发。近旬头痛消失,腰酸耳鸣等症均见好转,面色转华,但仍有疲乏之感,苔脉如前。

处方:仍用原方加入生晒人参50克,另煎浓汁于收膏时冲入。

本案系血管性头痛。本病的特点是:首次发作大多在青春期,以女性为多,病程漫长,间歇性反复发作,每次发作相似,可伴恶心呕吐,畏光,或视觉先兆,常因失眠、情绪、劳累等因素而诱发。根据长期临床经验总结,治疗本病以化瘀通络、平肝熄风、祛痰化浊为主。自制安颅镇痛煎(川芎、红花、赤芍、桃仁、丹参、生铁落、炙地龙、僵蚕、生南星、石菖蒲)为基本方,用于本病,颇有效验。本例病史已达七年之久,日渐加重。初诊时正值发作阶段,故以平肝熄风、活血化瘀法为先导。患者是一位小学教师,教学授课繁忙,家务负担沉重,肝肾亏耗,气血不足是本虚,风阳上扰,血瘀阻络是标实。故膏滋方必须标本兼顾。方中地黄、萸肉、杞子、旱莲草、桑寄生等益肾养肝;钩藤、炙僵蚕、天麻、生铁落、石决明、生南星、石菖蒲等平肝熄风豁痰;川芎、赤芍、红花、丹参等活血化瘀;淡苡蓉、仙灵脾既可益肾,又能调和冲任,患者经期必发头痛,用之最宜;颈项板滞,故用葛根缓解肌肉痉挛,同时本品具有扩张脑血

管作用,与活血化瘀药相配,有利于控制头痛的发作。开路方中用星蜈片,是根据长期临床经验研制而成,由生南星、蜈蚣,以 1:3 组成,每片含生药 0.3 克。生南星有毒,故临床一般常用制南星或陈胆星,但生南星具镇痉、止痛、化痰、消痞作用,大大优于制南星、陈胆星,经长期临床实践以及动物实验证明,无明显不良反应。蜈蚣(或全蝎)熄风、解痉、镇痛作用甚强,为治疗血管性头痛要药,一般入煎较差,故在开路方中,用片剂吞服,膏滋方采用蜈蚣、全蝎,微火烘脆,便于研粉,但不宜烘焦,将粉剂于收膏时冲入。蜈蚣、全蝎每日 2 克,即为有效剂量,一料膏滋药估计服 40 天左右,故二药各用 40 克,即可达到合理的剂量。

总之,血管性头痛,病程长,缠绵难愈。在治本方面,采用益肾养肝、补气养血、补心安神等法,治本重点在于肝肾;在治标方面,采用活血化瘀、平肝熄风、豁痰通络等法,治标重点在于瘀血。根据实验室指标,血小板凝集及血液流变学等检测,反映出血管性头痛患者血液凝聚状态增高,亦支持了瘀血之论。临床运用活血化瘀法——安颅镇痛煎治疗后,各项指标均有下降,其中全血还原黏度的降低,有非常显著的差异。而在处方用药中,全蝎、蜈蚣、地龙、僵蚕四味虫类药物,既能活血通络,又能搜痰剔邪,治疗血管性头痛,尤为适宜。但蝎、蜈二药,不易溶解于水,故以片剂或粉剂吞服为妥。

第四章

膏方调治法和案选

第一节 调治前先服开路药

俗话说“用药如用兵”，也就是说用药治病，如同用兵打仗一样，有一定的规矩和策略，服用膏方药进补也同样如此。一般医生在给病人开膏药方剂之前，都会让病人先服用一些具有调理作用的药物，这些药也就是民间常说的“开路药”。

那么，开路药是一些什么药物，它又有什么作用呢？开路药，就好比是大军打仗的先行官，先锋将，起到扫除障碍，保证大军顺利到达目的地的作用。我们服用膏方药的目的就在于进补，起到强壮身体，调整体内阴阳平衡的作用。但并不是每一个人都能一下子就适应膏方药的，而开路药就可以起到调整机体的内环境，为膏方药补益作用的发挥，创造良好的机体条件，使服用的膏方药能被充分地消化吸收。例如，有一个病人根据他的症状来看需要服用具有温阳作用的膏方药，但同时这个病人又有胸闷，食欲

不振,大便溏薄,舌苔白腻等症状。从中医理论来讲,该病人除了阳气虚弱,还有湿困脾胃的情况。在这种情况下,就不适合马上服用膏方药,因为病人食欲不佳,服用膏方药不容易消化吸收,况且大便溏薄泄泻也不能接受补益药物,更有可能因为服用滋腻的膏方药后,使湿困脾胃的情况更加严重,反而加重了病情,症状更加明显。这样就必须用开路药,先解决这些问题,像这种湿困脾胃的情况,我们所用的开路药就以理气化湿,健脾胃,助运化的药物为主,如广陈皮、制半夏、厚朴、炒枳壳、苍术、茯苓、山楂、六曲等药,等症状改善以后再给病人开处膏方药进行调补。

又如另一个病人,经常有腰酸乏力,头晕耳鸣,睡眠不好,心律不齐,心慌等现象,同时又有高血压病史多年,头痛,脾气急躁,便秘,口渴,胁痛,舌质红苔微黄,脉弦细。这个病人经中医辨证以后,考虑其不仅有肝肾心阴不足,还有肝火偏旺,肝阳上亢的情况,故不宜马上服用膏方药进补,以免补益药物更助长了肝火,使肝阳更亢。于是医生就给病人开具了以龙胆草、石决明、野菊花、夏枯草、泽泻、梗通草、制大黄、黄芩、车前子、炒山栀等为主的开路方药,以平肝泻火,待肝火偏亢的情况缓解之后,再给予膏方药进补。

还有一种情况,就是病人的身体状况极度虚弱,气血阴阳各方面都受到损伤,此时,切不可求功心切,立即给予大剂的补益药。从中医学角度来看,极度虚弱的人可能“虚不受补”,一下子进入大量的补药,可能会适得其反,影响机体内部的运转功能,加重病情。此时医生也应开一些

药物以开路试探,这些药物一般是补益力较轻的方药,如党参、白术、麦冬、玄参、花粉、全当归、茯苓、薏苡仁、甘草等,如病人服用这些药物后无明显不适,并情况略有好转,就说明病人机体状况可以接受进补,然后再用大剂量补益膏方药。如服用开路方后病人情况反而更差,说明病人尚不能接受膏方补药,则不能盲然进服膏方。

开路药一般需服用1至3周,有的病人可能需要更长的时间。服用开路药以后,经医生再次仔细的望、闻、问、切诊察以后,确定病人的机体状况已经适应于服用膏方药了,然后再给病人开具一张具有全面调理功能的补益方剂,正式开始服用膏方药。当然,也有一些病人的身体状况对服用膏方药没有多大的障碍,服用后也不会引起任何不良反应,就不需要服用开路方,可以直接进服膏方药,及时进补。比如有些病人,直接从医院或者药房中,买取“十全大补膏”,“洞天长春膏”,“益母草膏”,“桂圆膏”自己服用,并不会有什么不良的反应,当然能经医生指点,选择适合自己身体的膏方服用,效果就更理想。

从现在的角度来看,利用中药进补,一年四季都可以进行,而服用膏方药进补则以冬季为最佳。其道理前面已经分析过。一般来说膏方药的药物选择都是一些比较滋腻的药物,而且经煎煮熬制后的膏方药也比较滋腻,而在其他季节因气温较高,尤其是天气炎热的夏天,不容易消化吸收。根据一般规律,天气较凉,进入冬天以后人的胃口食欲变得好起来,此期服用膏方药有利于药物的吸收。

另外,一料膏方药通常要服用好几个星期,如果天气较热,熬好的膏方药稍有保藏不慎,便会变霉变质,而在冬天就不会有此顾虑。况且,根据中医的理论,认为人和自然界是相沟通的,人体状况变化也随着自然界的规律发生变化,按四季的变化“春生,夏长,秋收,冬藏”的规律,到了冬天应该是封藏,孕育,也就是储备精微物质,为来年的“春生”,“夏长”做好准备。因此在冬季服用膏方药是最佳时期。在民间流传着这样一句话,叫做“冬天进补,春天打虎”,说的也就是这个意思。中医古书《黄帝内经》中也说“冬不藏精,春必病瘟”,说明了冬令季节注重对精微的闭藏。在病因和发病学上都是很有意义的。那么,整个冬令季节究竟以什么时候服用膏方药为最好呢?一般来说从冬至日起,大约 50 天时间,也就是冬至以后的“头九”到“六九”之间为最佳。所以民间有每到冬至时节,人们纷纷购买补品进补的现象,这是有一定道理的。假如,个别病人准备在一个冬季服用两料膏方药,那么时间也不必一定要放在冬至以后,可以适当提前一些日子。

第二节 调补膏方法选

一、补气养血法

【组成】

绵黄芪 150 克 潞党参 150 克 炒白术 150 克

云茯苓 ^{辰砂拌} 180 克	熟地黄 150 克	赤芍药 150 克
全当归 150 克	大川芎 80 克	蜜炙甘草 150 克
大红枣 200 克	龙眼肉 150 克	制首乌 150 克
白扁豆 150 克	淮山药 150 克	莲子肉 150 克
薏苡仁 200 克	淮小麦 250 克	枸杞子 150 克
女贞子 150 克	旱莲草 200 克	桑葚子 150 克
黑料豆 200 克	胡桃肉 150 克	酸枣仁 150 克
柏子仁 150 克	炙远志 50 克	鸡血藤 200 克
夜交藤 200 克	苦桔梗 80 克	广陈皮 90 克
广木香 90 克	佛手皮 90 克	合欢皮 90 克
川牛膝 150 克	仙灵脾 150 克	谷麦芽 ^各 200 克

【适应证】 神疲乏力,面色苍白,头晕目眩,夜寐不安,平时气短,运动后更甚,食欲减退,大便干燥,心悸心慌,平素容易感冒,在妇女可见到月经延期,经量减少,颜色淡红,舌苔薄白,舌质淡红,舌质边缘有明显齿痕,脉象细软无力。

【制剂】 将以上 36 味药粉碎以后用清水浸泡一昼夜,放快火上连煎三汁然后过滤,去渣取汁,并用文火将药汁慢慢煎熬浓缩。另准备阿胶 150 克,用 250 克黄酒浸泡炖烊,冰糖或砂糖 400 克,蜂蜜 400 克,趁热一同冲入药汁之中收膏,待冷却收藏后便可按时服用。

【方论】 本方所描述的适应证,属于中医理论中的气血两虚性质。因此,拟定了具有补气养血作用的药物。纵观方中药物,可以分为几个方面:一组为专门补益元气的

药物,如黄芪、党参、白术、茯苓、甘草、淮山药、白扁豆、莲子肉、薏苡仁等,这些药物合在一起,具有较强的健脾益气的作用。一组为养血的药物,如熟地黄、赤芍药、制首乌、枸杞子、淮小麦、大红枣、女贞子、旱莲草、桑葚子、黑料豆、鸡血藤、胡桃肉、全当归、川芎等,这些药物相互配伍,具有活血、养血、和血的作用。一组为对症治疗的药物,如夜寐不安的用酸枣仁、柏子仁、远志、夜交藤、合欢皮等,以安定神志促使睡眠;如大便干燥则用全当归、柏子仁、酸枣仁、制首乌、蜂蜜等含有油脂具有滋润作用的药物;食欲减退则用谷麦芽、扁豆、莲子肉等具有健脾开胃助运化的药物。另一组药物则在方中起到理气作用,如广陈皮、木香、佛手皮、合欢皮等,使膏方滋补而不腻滞,又用桔梗、牛膝两味药,可引导其他药物上行下走,使药物能遍布全身各个脏腑器官,充分发挥其作用。更选用具有滋补阴血的阿胶以收膏,目的也在于加强补血养血的作用。

一般来说,经过一个冬季的膏方调补,都会有较好的效果。而有些病人服用后并无十分明显的效果,天气转热又不宜再服膏方,根据病情可以选用中成药补中益气丸,归脾丸,六味地黄丸作进一步的调治。

二、温补肾阳法

【组成】

绵黄芪 200 克	潞党参 200 克	仙茅 150 克
仙灵脾 150 克	甘锁阳 150 克	阳起石 200 克

肉苁蓉 150 克	巴戟天 150 克	补骨脂 150 克
桑寄生 150 克	淮牛膝 150 克	熟附块 90 克
上肉桂 90 克	大杜仲 150 克	鹿茸 50 克
金毛狗脊 150 克	胡桃肉 150 克	覆盆子 150 克
菟丝子 150 克	五味子 90 克	蛇床子 120 克
韭菜子 120 克	川断肉 150 克	桑螵蛸 150 克
制香附 150 克	沉香片 60 克	全当归 150 克
广陈皮 150 克	女贞子 150 克	枸杞子 150 克
败龟板 200 克	谷麦芽 ^各 200 克	
六曲 200 克	川芎 150 克	川桂枝 120 克
吴茱萸 150 克	金樱子 150 克	芡实 150 克

【适应证】 精神萎靡,面色皎白,怕冷,四肢不温,头晕,心慌,食欲不佳,腰酸背痛,大便溏薄,甚至泄泻呈不消化食物,小便清长,夜尿尤多,男子有阳痿、遗精,女子月经不调,舌苔白腻,舌质淡红,舌体胖大,舌边有齿痕,脉象沉迟无力。

【制剂】 将以上 39 味药切碎后,用清水浸泡一昼夜。其中附子一味药略有毒性,可在快火上先煎 20 分钟;沉香一味具有挥发性,需要后入药。将其他药在快火上连煎三汁,然后过滤,去渣取汁,再在文火上慢慢熬煎浓缩,另用鹿角胶 250 克,浸于 500 克黄酒中烊化以备用,用冰糖或蔗糖 400 克,趁热一同冲入药汁之中收膏,待其冷却后便可服用。

【方论】 本方所描述的症状,以中医理论来分析,属

于肾阳虚为主兼有脾和心两个脏腑阳气不足。因此,拟定了具有较强的温补肾阳,并兼顾心脾阳虚的方剂。分析其中药物组成,主要从以下几个方面着手:一组为温补全身各脏腑阳气的药物,如附子、肉桂、桂枝、黄芪、党参等,这些药物配伍后,对全身各脏腑器官的阳虚现象都有较好的温补作用,因为肾阳为人身中阳气之根本,肾阳虚必定会影响到其他脏腑,因此,安排了兼顾他脏和全身阳气的这一组药。一组为专司温补肾中阳气,填补肾中精髓的药物,如仙茅、仙灵脾、锁阳、阳起石、肉苁蓉、巴戟天、补骨脂、鹿茸、胡桃肉、覆盆子、菟丝子、山萸肉等,这组药物构成了本方的主体,针对肾阳虚而设立。一组为对症而设的药物,如腰酸背痛用桑寄生、川断、狗脊、杜仲、牛膝;阳痿遗精用蛇床子、韭菜子、五味子、覆盆子、桑螵蛸;夜尿频多用桑螵蛸、金樱子、芡实等;食欲减退,消化不良用谷芽、麦芽、六曲等。一组具有滋补肾阴作用的药物,如女贞子、枸杞子、龟板、五味子等,主要为根据中医理论“善补阳者,于阴中求阳”的原则而设立,以增强全方中补阳的作用。另一组为全方的调理药,如沉香、香附、广陈皮可以行气理气,使膏滋方补而不腻滞;而全当归、川芎、桂枝具有活血作用,一方面针对部分症状而用,另一方面活血作用的药物可以帮助行气药推动药力迅速到达全身各个脏腑器官。

经服用膏方后,如果症状仍未完全消失,而又不宜再继续服用膏方药的情况,可以用中成药金匱肾气丸、右归丸、全鹿丸、大菟丝子丸、龟龄集、青娥丸作进一步的调治。

当然,本方所描述的适应证中有食欲不振、大便溏薄等症状,必须先经医生用开路药调理以后,待症状有所好转再开始用膏方。如在服膏方期间有所反复,可暂缓服用,再作调理后继续服用。

三、滋养肝肾法

【组成】

熟地黄 200 克	淮山药 200 克	山萸肉 150 克
枸杞子 200 克	炙龟板 250 克	炙鳖甲 250 克
大麦冬 200 克	菟丝子 200 克	川牛膝 200 克
川杜仲 200 克	北沙参 200 克	女贞子 200 克
旱莲草 200 克	川石斛 200 克	何首乌 200 克
白芍药 200 克	五味子 120 克	酸枣仁 150 克
全当归 200 克	桑葚子 200 克	骨碎补 200 克
金毛狗脊 200 克	紫河车 120 克	金樱子 200 克
南芡实 200 克	广陈皮 200 克	佛手片 150 克
合欢花 90 克	桃仁泥 200 克	龙眼肉 200 克
云茯苓 200 克	夜交藤 200 克	甘菊花 120 克
福泽泻 200 克	肥知母 200 克	川黄柏 200 克
灵磁石 400 克	石菖蒲 200 克	

【适应证】 精神萎软,形体消瘦,腰膝酸软,遗精滑精,健忘,心烦,手足心发热,夜寐不安,盗汗,潮热,颧红升火,口干,干咳,头目眩晕,眼花耳聋,女子月经不调,经水少,经色红,周期短,质地稠,舌质红而干,舌苔

薄白或少苔,甚或舌质中有裂纹,舌体萎缩,脉象沉细带弦或数。

【制剂】 将以上 38 味药切碎,用清水浸泡一昼夜,其中灵磁石一味为矿石类药物,应先上火煎 30 分钟左右,然后将其他药物放入同煎。以快火连煎三汁后,用细纱布过滤,去渣取汁,再放到文火上慢慢煎煮浓缩。另外用阿胶 300 克,浸于 500 克黄酒中烊化以备用,用冰糖或蔗糖 400 克,趁热一同冲入药汁之中收膏,待冷却后便可服用。

【方论】 本方所适应的症状属于中医理论中肝肾之阴精亏虚的类型,同时中医学认为人体内的精与血是同出一源的。因此,在肝肾之阴精亏虚的同时,必然会影响到体内的阴血,用药组方时既要考虑到肝肾之精亏虚,又兼顾到阴血,以加强全方的作用效果。分析具体的组方原则,全部药物可分成下面几个方面:一组针对肝肾阴亏而设,以滋养阴精为主的药物,如熟地黄、淮山药、山萸肉、枸杞子、龟板、鳖甲、菟丝子、女贞子、旱莲草、何首乌、桑葚子等,这一组药物,具有较强的滋补肝肾之阴的作用,互相配伍后效果更佳,因肝肾之阴为全身阴液精津之根本,及时补益以足够的肝肾阴精,是服用本方的重要环节。一组为考虑肝肾之阴一亏,必然影响到全身其他各脏腑器官的阴液,见到全身阴精俱亏的症状,因而设立了对其他脏腑具有补养阴液作用的药物,如麦冬、石斛、沙参等,起到标本同治,双管齐下的作用。一组为补精血的药物,如首乌、女贞子、桑葚子、龙眼肉、全当归等,主要协

同补肝肾药物,以提高补肝肾之精的效果。一组为补阳药物,其用意取自于中医理论所说“善补阴者,于阳中求阴”的道理,如杜仲、狗脊、骨碎补、紫河车等。一组为对症而下的药物,如腰膝酸软用牛膝、狗脊、骨碎补;遗精滑精用金樱子、芡实;心烦,手足心发热用知母、黄柏;夜寐不安用酸枣仁、夜交藤、合欢花;眼花耳聋用甘菊花、枸杞子、灵磁石、石菖蒲;月经不调用桃仁泥、全当归、阿胶。此外全方中还设立了一组药性比较轻灵,具有理气作用,走而不守以防止滋阴药物过于黏腻的药物,如广陈皮、佛手片、合欢花、茯苓、泽泻等。值得指出的是方中还用了五味子、白芍药两味药,看似这两味药并不直接对肝肾起作用,但五味子酸,白芍药甘,根据中医理论“甘酸化阴”的道理,这两味药相互配伍,具有不断生成阴液的作用,因此,方中用这两味药寓意颇深。

一般来说,服用膏方以后均能获得一定的效果,但滋补肝肾之阴较难,单纯一料膏方恐怕难以完全解决问题。因此,一般补阴作用的膏方,一个冬季宜服用两料。服药期间如出现腹泻、发热等情况,暂停服用膏方,经调治后再继续服用。两料药后不能马上停药,还须用一段时间成药以巩固疗效。如六味地黄丸、左归丸、大补阴丸、杞菊地黄丸、二至丸、石斛夜光丸等成药,都可以选择其中一二种长期服用。在服用滋补膏方时,除一般的忌口注意外,尤其不能进食过分辛燥香辣的食物,以免影响疗效。

四、益气补阴法

【组成】

太子参 300 克	大麦冬 120 克	五味子 60 克
北沙参 120 克	京玄参 120 克	肥玉竹 120 克
天花粉 120 克	炒扁豆 120 克	淮山药 150 克
女贞子 150 克	旱莲草 150 克	川石斛 150 克
潞党参 120 克	炒白术 120 克	云茯苓 150 克
广陈皮 60 克	制半夏 60 克	广木香 30 克
缩砂仁 ^{后下} 30 克	炙甘草 30 克	炒枣仁 200 克
夜交藤 150 克	合欢皮 150 克	柏子仁 120 克
炙远志 30 克	炒枳壳 120 克	菟丝子 240 克
制首乌 120 克	料豆衣 240 克	糯稻根 120 克
浮小麦 120 克	生熟谷芽 ^各 120 克	淡竹茹 60 克
福泽泻 120 克		

【适应证】 面色淡白,少气懒言,神疲乏力,不耐劳力,咽干口燥,盗汗自汗,平素时见眩晕,时见食少,时见胸闷,时见寐差,胃纳不馨,小便短少,大便秘结,舌质淡,体瘦弱,苔少有裂纹,脉细软无力。

【制剂】 将以上 35 味药切碎,用清水浸泡一昼夜,除缩砂仁、木香外,其余药物用猛火熬煎,在过滤前放入缩砂仁、木香,连煎三汁,用细纱布过滤,去渣取汁,合而调匀,即用文火浓煎,另用阿胶 500 克入 500 克黄酒内浸泡烊化。冰糖 250 克连同西洋参粉 50 克,趁热一同冲入药中

收膏,待冷却以后存放三天即可服用。

【方论】 本方适用于中医辨证属气阴两虚证的患者。这里反映出来的气阴两虚证有这样的特点:一是气虚而无水湿停滞之象,二是阴虚没有火旺的表现。故在治疗时重点是放在益气补阴方面,再根据其伴有的症状配合理气和中、养心安神、增液通腑等药物。因此,从具体的组方分析有以下几组药物:一组是以生脉散为主,即养阴生津类药物,如北沙参、京玄参、肥玉竹、花粉、石斛、女贞子、旱莲草、炒扁豆、淮山药,以补养五脏阴津亏损为用药着眼点,由于肾阴为五脏阴津之根本,故又配合菟丝子、制首乌。一组是以香砂六君子汤为主,即益气健脾类药物,如党参、太子参、白术、茯苓、广陈皮、制半夏、木香、缩砂仁、淮山药、扁豆、炙甘草,以健运脾气为用药着眼点。由于脾胃为气血生化之源,因患者时见食少胸闷,胃纳不馨,故在健运脾气的同时,配用炒枳壳以使气机舒畅;配用生熟谷芽,而让胃气可苏。与此同时,又有一组治疗虚证的药物,如见治盗汗自汗,以五味子酸敛配料豆衣养阴止汗,糯稻根、淮小麦固表止汗;治夜寐不安,以炒枣仁配合欢皮、夜交藤、远志;考虑到患者久病,脾胃虚弱,易生痰浊,郁而痰热内扰,故用温胆汤方(即制半夏、茯苓、广陈皮、炙甘草、枳实、竹茹)以清痰热,从而达到上清下通,气顺液充的目的。

一般来说,由外感所致气阴两虚较易治,其中补阴多以生津养阴之品。由内伤所致的气阴两虚较难治,而多见于慢性病患中。其中补阴常与补肝肾之品联用。

五、补益心脾法

【组成】

全当归 120 克	炒白芍 150 克	熟地黄 120 克
缩砂仁 ^{后下} 30 克	紫丹参 120 克	桑葚子 120 克
制首乌 120 克	仙鹤草 120 克	炒党参 120 克
生炙黄芪 ^各 150 克	云茯苓 150 克	炒白术 120 克
淮山药 150 克	制半夏 60 克	广陈皮 60 克
炙甘草 30 克	淮小麦 30 克	炒枣仁 120 克
合欢皮 120 克	夜交藤 150 克	煅龙齿 240 克
珍珠母 30 克	炙远志 50 克	制香附 120 克
佛手片 60 克	广木香 30 克	旱莲草 300 克
侧柏叶 120 克	茜草根 150 克	八月扎 120 克
路路通 120 克	大红枣 100 克	生姜 10 克

【适应证】 面色不华,眩晕,健忘,心悸,失眠,多梦,情绪抑郁或不宁,神疲乏力,脘腹不适,纳食减少,时见皮下出血,时见齿衄,血色较淡,大便时溏,月经或迟或早,经量或多或少,舌质偏淡,苔薄,脉象濡细无力。

【制剂】 将上药 33 味,用清水浸泡一昼夜,龙齿、珍珠母、缩砂仁除外。先用快火熬煎,龙齿、珍珠母 20 分钟,再放入其他药浓煎三次,过滤前 10 分钟放入缩砂仁,去渣取汁,调匀,再取文火浓煎。另用阿胶 500 克于黄酒 500 克中浸软烊化,冰糖 250 克,连同吉林白参粉 50 克,趁热一同冲入药中收膏,待冷却以后,存放三天即可服用。

【方论】 本方适用于中医辨证属心脾两虚患者。中医理论认为,心主血,脾统血,脾胃相为表里,又为气血生化之源,故表现多见血虚较突出,气为血帅,故养血须与益气相配合。具体来说,补心血与补心气相结合,两者还须与健脾益气相结合。故其方中有这样几组药物:一组以八珍汤为主,如全当归、黄芪、白术、党参、茯苓、白芍、甘草、熟地黄;一组以养血安神药为主,如首乌、仙鹤草、桑葚子、紫丹参、合欢皮、夜交藤、炒枣仁、淮小麦、珍珠母、煅龙齿;一组以理气和血止血为主,如木香、香附、佛手片、旱莲草、侧柏叶、茜草根、八月扎、路路通,以姜、枣为使药,由于时见皮下出血,时见齿衄,血色较淡,月经不调,故取香附、全当归、白芍、紫丹参等调经药,又用理气解郁养血,和血止血通络药物结合起来,以期缓缓调治而可获效。

六、调理冲任法

【组成】

益母草 200 克	艾叶炭 100 克	炮姜炭 100 克
地榆炭 100 克	侧柏叶炭 100 克	仙鹤草 200 克
桑寄生 150 克	川断肉 200 克	炙黄芪 200 克
潞党参 200 克	云茯苓 200 克	焦白术 200 克
炙甘草 200 克	炒当归 200 克	白芍药 200 克
生地黄 200 克	熟地黄 200 克	龙眼肉 150 克
枸杞子 200 克	女贞子 200 克	茅根炭 80 克

槐花炭 80 克	血余炭 80 克	菟丝子 200 克
仙灵脾 200 克	大红枣 150 克	广木香 150 克
广陈皮 200 克	缩砂仁 ^{后下} 50 克	参三七粉 50 克
酸枣仁 150 克	紫丹参 200 克	料豆衣 200 克
制首乌 200 克	桑葚子 200 克	

【适应证】 月经不调,每逢经来淋漓不尽,量多,严重时如血崩,经色淡,质地稀,面目浮肿,精神疲惫,少腹隐痛,腰酸膝软,夜间不能安眠,白天嗜睡,运动后气促,自觉有内脏下坠的感觉,舌质淡,舌体略胖,苔薄白,脉象细而无力。

【制剂】 将以上 35 味药物中除参三七粉外,其他药物切碎后放入清水中浸泡一昼夜,然后用快火连煎三汁,用细纱布过滤,去渣取汁,再放上文火慢慢煎煮浓缩。另用阿胶 200 克,用黄酒 400 克浸泡烊化,冰糖或蔗糖 500 克,连同 50 克参三七粉,趁热一同冲入药中收膏,待冷却以后便可以服用。

【方论】 本方适用于月经不调中月经过多一类病人,属于中医气血两亏的辨证类型。月经过多从中医学理论看来,也属于出血一类病证,因此,本方的主要意图就在于止血,减少月经的量。中医理论还认为月经过多也就是出血过多,必然导致血虚,因为气与血的关系十分密切,因而也就产生了气虚的现象,从标本兼顾治疗的角度出发,止血固然重要,补养气血也不能忽视。从整个方剂的药物组成来看,主要有三个部分组成:一组为专门止血的药物,

主要起到收敛固涩,以减少月经的量,为对症而治,从标着手,如艾叶炭、炮姜炭、地榆炭、侧柏叶炭、仙鹤草、茅根炭、槐花炭、血余炭等,这些药物本身就具有较强的止血作用,在炮制时再进行焙烤烘炒成炭,更加强了止血的效果;一组为养血补血调血的药物,如益母草、生地黄、熟地黄、龙眼肉、枸杞子、女贞子、紫丹参、全当归、料豆衣、制首乌、桑葚子、仙鹤草等,这些药物配伍,主要为补充失去过多的精血,为从本而治的方法,目的在于增加精血的来源;一组为补气的药物,如黄芪、党参、白术、茯苓、甘草等,这类药物配伍,一则可补气以养血,二则可补气以摄血,从中医理论来看,气对血具有固摄作用,补气也能起到止血的效果。方中还有一些对症而下的药物,如腰膝酸软用桑寄生、川断;夜寐不安用酸枣仁等。木香、广陈皮、缩砂仁三味药主要起到理气作用,增强药物的流通性,以防止药性过于黏腻而影响脾胃的功能。

整个方剂中所用的阿胶、龙眼肉、地黄质地较黏,配伍在一起更甚。因此,每次在服饮时需要隔水炖热烊化后再服比较好。方中阿胶、地黄、仙鹤草三味药相配伍,在补血止血方面疗效较好,临床应用多有灵验,在方中亦起主要作用。一般经服用本方后都有一定疗效,各种症状都有改善,但服完之后,还需用益母草膏、归脾膏、地黄膏等成药作进一步调治。

第三节 治疗膏方案选

一、慢性支气管炎

男 50 岁 就诊日期：1988 年 10 月 8 日

诊断：慢性支气管炎。

初诊：15 年前因感冒后咳嗽，经治疗未愈，时轻时重，逐年加剧，秋冬为甚。今遇气候变化而风寒外袭则咳嗽发作，咳色稠黏痰，胸闷不舒，呼吸气急，精神疲惫。时见腰痛腿软，纳食减少，舌质红，苔薄白腻，脉象小弦。右寸滑，症属风寒之邪袭肺，肺气失宣，先拟解表散寒，宣肺止咳化痰为主。处方：

水炙麻黄 9 克	杏仁 12 克	炙甘草 3 克
制半夏 6 克	嫩前胡 9 克	淡子芩 12 克
苏叶梗 ^各 6 克	广陈皮 6 克	象贝母 9 克
云茯苓 12 克	焦谷麦芽 ^各 12 克	

二诊：先方服用 7 剂后，咳嗽已减，痰已转稀少，然纳食仍少而苔脉同前。再拟宣肺止咳化痰外，以健脾和胃，当从源治。处方：

上方去	水炙麻黄	苏叶梗	嫩前胡
加	太子参 15 克	焦白术 9 克	木香 3 克
	缩砂仁 ^{后下} 3 克		

三诊：此方服 14 剂，咳痰渐止，纳食亦增，尚见精神疲

乏、腰痛。为防表虚而邪犯，当从根本治疗。肺病日久，累及肾气。盖肺为贮痰之器，脾为生痰之源。平素痰浊郁久易于化痰，故从肺、肾、脾治本，而清化痰浊治标，标本兼治。议从王道施以膏方缓缓图治。处方：

太子参 300 克	焦白术 120 克	云茯苓 150 克
制半夏 60 克	炙远志 50 克	广陈皮 60 克
炙甘草 30 克	生熟苡仁 ^各 150 克	炙白前 120 克
川贝母 120 克	天竺黄 120 克	山海螺 300 克
炙紫苑 120 克	炙款冬 120 克	炙苏子 120 克
光杏仁 120 克	炒黄芩 120 克	炙桑皮 120 克
鱼腥草 150 克	菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克
川断肉 120 克	厚杜仲 120 克	紫丹参 120 克
川红花 60 克	补骨脂 120 克	广木香 30 克
缩砂仁 ^{后下} 30 克	沉香片 ^{后下} 30 克	车前子 ^包 300 克
焦谷麦芽 ^各 150 克		

上药浓煎三次取汁入紫河车粉 120 克、蛤蚧粉 100 克调匀，再入阿胶 180 克、鳖甲胶 300 克、枇杷叶膏 200 克、冰糖 150 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

二、慢性咽炎

女 36 岁 就诊日期：1997 年 11 月 12 日

诊断：慢性咽炎（患者主动要求膏方调治）。

初诊：

开路方：病从劳累起，延今已 6 年。平素易感冒。每

逢气候变化,或遇劳累之余,即见咽痛。检查见咽喉壁红,时而有畏寒发热,口咽干燥,全身疲乏,形神萎顿,纳食减少,二便尚属正常,舌质红,苔薄白腻,脉细小弦,症属肺脾气虚,阴分亦亏。咽喉为肺胃之上口,故邪热上灼,而多咽痛之症。先拟益气阴,健脾胃,生津清咽为治。处方:

太子参 15 克	北沙参 12 克	京玄参 9 克
云茯苓 12 克	女贞子 15 克	旱莲草 15 克
生熟苡仁 ^各 15 克	淮山药 15 克	广木香 3 克
广陈皮 6 克	藏青果 10 克	玉桔梗 3 克
炙甘草 3 克	福泽泻 12 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

二诊:药后纳食渐馨,亦未感冒,自觉精神较为振奋。古言道:咽喉红痛一症,总不外乎温热之邪外受,厥少之火上升,观此患者,每感外邪之时,又是疲乏劳累而致气阴亏损之际虚火。气机流通不畅上炎。病情日久,肺脾气虚,纳食欠馨,脾胃亏损,营血生化之源失司,故气阴两虚之象渐见显露。求其治本,挟正已达邪;勿使药壅,调气而和中,用膏方来缓缓调治。处方:

太子参 300 克	炒白术 120 克	云茯苓 300 克
淮山药 150 克	制半夏 60 克	广陈皮 60 克
炙黄芪 150 克	生熟苡仁 ^各 150 克	北沙参 120 克
大麦冬 120 克	黑玄参 120 克	肥玉竹 120 克
蒸黄精 120 克	女贞子 150 克	旱莲草 120 克
广木香 30 克	佛手片 60 克	炒枳壳 120 克
苏叶梗 ^各 60 克	夏枯草 120 克	川黄连 60 克

佩兰叶 120 克	白叩仁 ^{后下} 30 克	制香附 120 克
京赤芍 60 克	藏青果 120 克	川贝母 120 克
炒枣仁 120 克	生谷芽 150 克	福泽泻 120 克

上药浓煎三次取汁,入西洋参 60 克(煎汁),再加阿胶 250 克、鳖甲胶 150 克烱化收膏。每日早晚各一匙,开水冲服。遇伤风食滞则暂停服用。

三、胃及十二指肠球部溃疡

女 62 岁 就诊日期:1996 年 10 月 7 日

诊断:胃及十二指肠球部溃疡。

初诊:中上腹隐隐作痛,反复发作 10 年。伴泛酸嗳气,加重半年。每于食后腹胀,时有烧灼感,嗳气泛酸,晨起口苦,纳食减少,大便干结,两日一次。舌质红,苔薄腻微黄。脉象小弦细。经钡餐摄片检查,诊断为十二指肠球部溃疡。原有高血脂病史。平时易于感冒,体质素弱,气阴不足,湿热中阻,气机升降失常。浊邪内壅,先拟补益气阴,化湿浊,理气机为主。处方:

太子参 15 克	云茯苓 15 克	北沙参 12 克
炒白术 9 克	炒枳实 12 克	瓜蒌皮 12 克
姜汁黄连 3 克	姜制半夏 9 克	煅海螵蛸 30 克
川贝母 9 克	煅牡蛎 30 克	广陈皮 6 克
生谷芽 15 克	姜竹茹 10 克	

二诊:服用上方 14 剂,嗳气泛酸减少,脘腹亦舒,纳食渐馨,尚有食后脘腹烧灼感。口苦,大便已见一日一次,尚

不通畅。舌脉同前,前方已经见效,当击鼓再进。处方:

上方去川贝母,加制大黄 6 克、木香 3 克,改姜汁川黄连 6 克。

三诊:上方又服 14 剂,病症已经明显减轻。腹胀时有,而暖气泛酸,脘腹烧灼感已见轻微。口苦已去,纳食亦增舌质红,苔薄微腻,脉象弦细,元气尚未得充,阴液未见来复,湿浊余邪未清,气机升降未畅,时届冬令,要求膏方以图本治。处方:

太子参 300 克	炒白术 120 克	云茯苓 150 克
广陈皮 60 克	制半夏 90 克	炙甘草 30 克
北沙参 120 克	麦门冬 120 克	天花粉 120 克
川石斛 150 克	广郁金 120 克	炒枳实 120 克
制大黄 100 克	瓜蒌皮 120 克	川黄连 50 克
全当归 120 克	炒白芍 150 克	紫丹参 120 克
桃仁泥 90 克	川红花 60 克	广木香 30 克
生熟苡仁 ^各 120 克	姜竹茹 60 克	川象贝 ^各 100 克
煅海螵蛸 300 克	生谷芽 150 克	

上方浓煎三次取汁,另加吉林白参 30 克、西洋参 100 克另煎浓汁冲入调匀,取阿胶 150 克、蜂蜜 150 克、麦芽糖 250 克烱化收膏,每日早晚各取 1 匙开水冲服。

四、胃肠道功能紊乱

女 38 岁 就诊日期:1999 年 11 月 2 日

诊断:胃肠道功能紊乱。

初诊：腹部膨隆伴暖气 10 年，每于情怀抑郁之时即作。且见腹泻，腹泻前偶见有腹痛。先后住院三次，排除了器质性疾病。近来时见恶心，两肋作胀，大便有不消化食物。纳食减少，舌质红，苔薄腻，脉象小弦。症属肝失条达之性，气机不畅，拟疏肝，扶脾，佐以理血和中。处方：

软柴胡 12 克	制半夏 12 克	云茯苓 15 克
炒枳实 12 克	广郁金 12 克	焦白术 12 克
制香附 12 克	炒白芍 15 克	广陈皮 6 克
防风炭 5 克	紫丹参 10 克	广木香 3 克
白叩仁 ^{后下} 3 克	焦谷麦芽 ^各 15 克	

二诊：前方服用 14 剂，腹部膨隆减轻，暖气恶心渐去，纳食亦增，苔脉同前。木乘土之象稍减轻。气机升降亦畅。趁势嘱服 14 剂以求肝脾和而神情安。处方：

上方加 八月扎 12 克 远志 5 克

三诊：草木之性难解七情之病。近日肝气舒，脾气得运，气机升降正常。更须嘱咐病人调和心情，安心静养，勿为不快之事干扰。平时则可膏方调服。缓缓图治根本。处方：

潞党参 120 克	焦白术 120 克	云茯苓 150 克
广陈皮 60 克	淮山药 150 克	生熟苡仁 ^各 150 克
全当归 120 克	炒白芍 150 克	紫丹参 90 克
仙鹤草 120 克	女贞子 50 克	旱莲草 300 克
软柴胡 120 克	制半夏 120 克	炒枳壳 120 克
广郁金 120 克	制香附 120 克	炒防风 150 克

广木香 30 克	八月扎 120 克	夜交藤 150 克
合欢皮 120 克	淮小麦 300 克	柏子仁 90 克
肥玉竹 120 克	蒸黄精 120 克	菟丝子 240 克
潼蒺藜 120 克	枸杞子 20 克	焦谷麦芽 ^各 250 克

上药浓煎四次,取汁且以皮尾参 150 克、西洋参 100 克另煎冲入调匀,再用阿胶 200 克、鳖甲胶 100 克、冰糖 150 克烱化收膏。每日早晚各服 1 食匙,开水冲服。

五、胃病术后

男 50 岁 就诊日期:1998 年 10 月 12 日

诊断:十二指肠球部溃疡、慢性胃炎伴有胃小弯溃疡形成,术后。

初诊:患者于三个月前因诊断“十二指肠球部溃疡、慢性胃炎伴有胃小弯溃疡”而进行手术。手术顺利,术后康复很慢,身体极度衰弱,面白无华,全身时常畏寒,动辄气短,少气懒言,精神萎顿,眩晕,腰背痛楚,下肢乏力,心悸不宁,夜寐不安,纳食不馨,舌偏淡,苔少湿润,脉细弱。症属脾胃之气大亏,生化乏源,且损及肾气,阴精渐亏,奇经失养,阳维刚护失司;元气亏而不能生血,心失所养,神明无以清静,病延已久,当拟健脾养胃为先。处方:

太子参 12 克	炒白术 10 克	云茯苓 15 克
广木香 3 克	缩砂仁 ^{后下} 3 克	广陈皮 6 克
制半夏 12 克	全当归 9 克	炒白芍 12 克
枸杞子 12 克	炒枣仁 12 克	炙远志 5 克

炙甘草 3 克 焦谷麦芽^各 12 克 大红枣 10 枚

二诊：前方服用 14 剂，精神稍振，夜寐渐安，纳食亦增，气乱神疲依然。舌脉同前。原方更进一等。处方：

上方去炙远志、缩砂仁，加炙黄芪 15 克，另服用河车胶囊，一日三次，每次五粒。

三诊：上方又服用 14 剂，病情明显改善。而腰膝酸软，不耐劳累依然。舌偏淡，苔薄，脉小弦，气血渐见来复。肾气阴精难充，再拟膏方从根本治。处方：

炙黄芪 120 克	炒党参 120 克	焦白术 120 克
云茯苓 150 克	炒白芍 150 克	大川芎 50 克
生熟地 ^各 120 克	缩砂仁末 30 克	山萸肉 90 克
淮山药 150 克	巴戟肉 120 克	仙灵脾 120 克
川断肉 120 克	金毛狗脊 150 克	菟丝子 240 克
潼蒺藜 120 克	枸杞子 120 克	炒枣仁 120 克
煅龙齿 300 克	合欢皮 150 克	制半夏 120 克
广陈皮 60 克	广木香 30 克	紫丹参 120 克
制首乌 150 克	明天麻 120 克	炒枳壳 120 克
焦谷麦芽 ^各 120 克		

上药浓煎三次，取汁，再用紫河车粉 100 克、石柱参 100 克另煎冲入调匀，入鳖甲胶 150 克、阿胶 100 克、鹿角胶 150 克、冰糖 250 克烱化收膏，每日两次，每次一食匙，开水冲服。

六、慢性结肠炎

男 39 岁 就诊日期：1998 年 10 月 15 日

诊断：慢性结肠炎。

初诊：腹痛腹泻夹有黏冻，反复发作6年，久治未愈，年前进行住院检查，拟诊为慢性结肠炎。近半月来，每日大便4~5次，腹痛即泻，大便稀薄，夹有黏冻。口苦，纳少，舌红苔薄黄腻，脉小弦带滑，症属肝脾气滞，健运失司，湿热蕴于肠中，治当健脾和中，清肠化湿，温清并用，标本兼治。处方：

太子参 15 克	炒白术 12 克	云茯苓 15 克
炒白芍 15 克	广陈皮 6 克	炮姜炭 6 克
北秦皮 12 克	姜汁川连 5 克	煨木香 3 克
焦山楂 12 克	焦神曲 12 克	车前子 ^包 30 克

二诊：上方加减服用21剂，腹痛已轻，每日腹泻两次，黏冻亦少，口苦尚有，纳食稍增。舌红，苔薄，脉小弦。湿热非一清而去，脾土待湿化始健。再拟前法。处方：

上方加	炒子芩 12 克	防风炭 6 克
	地锦草 15 克	肉桂心 ^{后下} 1.5 克

三诊：服用上方14剂后，腹痛腹泻已明显减轻，每日大便一次，已经基本成形。口苦去而纳食增。舌红苔薄，脉象小弦。从本治，防反复。脾土宜健，肠道宜清，拟与膏方同治。处方：

潞党参 120 克	焦白术 120 克	淮山药 150 克
云茯苓 150 克	生熟苡仁 ^各 150 克	炒扁豆 120 克
莲子肉 90 克	炙黄芪 120 克	制黄精 120 克
炒白芍 150 克	紫丹参 120 克	广陈皮 60 克

制半夏 120 克	煨木香 60 克	姜汁川连 60 克
炮姜炭 30 克	北秦皮 120 克	条芩炭 90 克
佩兰叶 120 克	豆叩仁 ^{后下} 30 克	玉桔梗 30 克
广郁金 120 克	川楝子 90 克	台乌药 60 克
地锦草 120 克	凤尾草 120 克	肉桂心 ^{后下} 15 克
防风炭 60 克	焦山楂 120 克	焦神曲 120 克
车前子 ^包 300 克	竹茹 100 克	焦谷麦芽 ^各 120 克

上方浓煎三次,取汁,取吉林白参 100 克另煎,紫河车粉 60 克冲入调匀,再用阿胶 250 克、鳖甲胶 100 克、麦芽糖 250 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

七、慢性肝炎

女 36 岁 就诊日期:1988 年 9 月 12 日

诊断:慢性肝炎。

初诊:慢性肝炎史 10 年,反复发作。近半个月,肝区疼痛,头晕失眠,腰膝酸软,时有耳鸣。心悸胸闷,口苦而干,小便色黄,大便黏而不爽,舌尖边红,苔根腻厚浮黄,脉沉弦带数。症属湿热之邪久留不去,气机郁结不畅,脉络瘀滞。肝肾心阴均见累及。先拟调气化湿,以和血通络,久病之体,难以一时复原,补肝肾心之阴乃善后清也。

处方:

瓜蒌皮 12 克	姜汁黄连 10 克	炒枳实 10 克
制香附 12 克	川楝子 12 克	广郁金 12 克
平地木 30 克	铁扁担 30 克	生苡仁 15 克

白叩仁 ^{后下} 3 克	制半夏 12 克	猪茯苓 ^各 15 克
老虎杖 12 克	煅龙齿 15 克	紫丹参 12 克
佩兰草 12 克	福泽泻 12 克	

二诊：上方服用 14 剂，湿热稍化，口苦苔腻已减，肝区疼痛亦轻。余症依然，脉象沉弦，再拟上方出入。处方：

上方去	远志	川楝子
加	远志 5 克	合欢皮 15 克

三诊：湿性黏腻，非若邪热之一清就退，亦非若腑实之一泻可通。久病之体，邪既实，正又虚，前方已见初效，切勿更改，再以原方出入续服，时届冬令，并拟膏方同治，邪正兼顾，标本同治，重在调养。处方：

北沙参 120 克	大麦冬 120 克	天花粉 120 克
女贞子 150 克	旱莲草 150 克	菟丝子 240 克
太子参 150 克	云茯苓 150 克	炒白术 100 克
制半夏 120 克	广陈皮 60 克	炙甘草 30 克
小川连 100 克	瓜蒌皮 120 克	广郁金 120 克
制香附 120 克	广木香 60 克	白叩仁 ^{后下} 30 克
平地木 300 克	铁扁担 300 克	小蓟草 300 克
老虎杖 150 克	夏枯草 120 克	佩兰叶 120 克
炙远志 60 克	合欢皮 150 克	夜交藤 300 克
川断肉 120 克	川杜仲 120 克	大生地 150 克
生苡仁 300 克	福泽泻 120 克	金毛狗脊 120 克

上药浓煎三次，取汁，入西洋参另煎 50 克、琥珀粉 30 克冲入调匀，再用鳖甲胶 150 克、桑葚子膏 150 克、麦芽糖

200 克烱化收膏。

八、慢性乙型肝炎

男 38 岁 就诊日期：1997 年 8 月 12 日

诊断：慢性乙型肝炎。

初诊：患者有慢性乙型肝炎史 8 年。平时肝区隐隐作痛，腹中胀满，口干而苦，夜寐盗汗，腰痛，神疲乏力，纳食不馨，大便秘结，舌红苔薄黄腻，脉象弦细。症属肝胆湿热，气机不畅，热毒内蕴，久则邪热伤阴，阴液亏损，先拟清利湿热，滋养肝肾。当须防其滋阴恋湿，化湿伤阴。处方：

大生地 12 克	大麦冬 12 克	北沙参 12 克
全当归 9 克	川楝子 9 克	广郁金 12 克
小川连 10 克	川石斛 15 克	炒白芍 12 克
料豆衣 24 克	广陈皮 6 克	糯稻根 12 克
焦查曲 ^各 12 克	焦谷麦芽 ^各 15 克	

二诊：上方服 14 剂，腰痛减而盗汗去，纳食也增，而仍见肝区隐痛，腹中胀满，口苦而干，舌脉同前，仍守上法。处方：

上方去 糯稻根

加 软柴胡 10 克 茵陈蒿 15 克 大青叶 15 克
白叩仁^{后下} 3 克

三诊：患者在前方基础上加减治疗近三个月，期间曾用田基黄、八月扎、佛手片、唆萝卜子、赤勺、马兰根、铁扁担、紫丹参、岗捻根、龙葵、虎杖等药。症状已明显减轻，为巩

固疗效,要求进一步加用膏方。处方:

生熟地 ^各 150 克	山萸肉 150 克	淮山药 150 克
云茯苓 150 克	生熟苡仁 ^各 150 克	北沙参 120 克
大麦冬 120 克	川石斛 150 克	女贞子 120 克
旱莲草 150 克	制首乌 150 克	蒸黄精 120 克
料豆衣 120 克	肥玉竹 120 克	全当归 120 克
炒白芍 150 克	紫丹参 120 克	广郁金 120 克
制香附 120 克	佛手片 60 克	川楝子 90 克
小蓟草 120 克	平地木 300 克	铁扁担 300 克
老虎杖 150 克	岗捻根 300 克	制半夏 120 克
广陈皮 60 克	夏枯草 120 克	福泽泻 120 克
焦谷麦芽 ^各 150 克		

上方浓煎三次,取汁,用枫斗 50 克、西洋参 100 克另煎冲入调匀,再以鳖甲胶 150 克、桑葚子膏 150 克、冰糖 200 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

九、早期肝硬化

男 52 岁 就诊日期:1998 年 9 月 12 日

初诊:患者有慢性肝炎史 12 年,3 年前因肝区经常胀痛,神疲乏力,下肢轻度浮肿而作肝功能、B 超、食管钡餐等检查,拟诊为早期肝硬化。根据临床表现及询问病情,中医认为,患者平时饮酒过度,复加情绪急躁,郁怒不解,肝脾损伤,酒湿化火,湿热伤阴,下汲肾水,故见面色较暗,胁肋胀痛,口苦口干,腰膝酸软,神疲乏力,纳食减少,时而

夜寐不安,下肢轻度浮肿,小便黄,大便时溏时结,舌红苔薄黄腻,中剥,脉象细弦。症属肝郁气滞,脾湿内蕴,久则化痰化热,痰热交阻,阴液亏损,肾水不足。拟调理肝脾,养阴清利为先。处方:

制香附 12 克	川楝子 12 克	玄柴胡 ^各 9 克
平地木 30 克	广郁金 9 克	青广陈皮 ^各 10 克
京赤芍 10 克	紫丹参 12 克	炒白术 12 克
姜制半夏 12 克	川雅连 6 克	川石斛 15 克
炙鳖甲 ^{先下} 15 克	炙甲片 6 克	焦谷麦芽 ^各 12 克

二诊:前方服 14 剂,胁肋胀痛稍减,口苦口干亦轻,苔脉同前。再拟上方加减。处方:

上方去 赤芍 白术 紫丹参

加 赤小豆^打 30 克 猪茯苓各 15 克 泽泻 12 克

三诊:前方加减又服 2 个月,期间曾用三棱,莪术、全当归、白芍、生地、王不留行、木香、桃仁泥、焦楂曲、铁扁担、生熟苡仁、小蓟草、合欢皮、炒枣仁等药。病情已明显减轻。拟与柔肝益肾、健脾理气、养血通络、清化湿浊的膏方图治。处方:

生熟地 ^各 120 克	山萸肉 120 克	制首乌 120 克
炒白术 150 克	肥玉竹 120 克	女贞子 50 克
旱莲草 300 克	太子参 150 克	炒白芍 150 克
云茯苓 150 克	制半夏 120 克	广陈皮 60 克
炙甘草 60 克	炒枳壳 120 克	广郁金 120 克
制香附 120 克	川楝子 90 克	广木香 30 克

铁扁担 150 克	平地木 300 克	夏枯草 150 克
虎杖 150 克	左牡蛎 300 克	炙甲片 60 克
川黄连 100 克	川石斛 150 克	京三棱 90 克
蓬莪术 90 克	赤小豆 ^打 300 克	淮小麦 120 克
莲子肉 90 克	生熟苡仁 ^各 150 克	福泽泻 120 克

上药浓煎三次,去渣取汁,取西洋参 100 克、铁皮枫斗 100 克另煎,冲入调匀,再用鳖甲胶 300 克、益母草膏 100 克、冰糖 150 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

十、室性早搏

女 55 岁 就诊日期:2001 年 10 月 12 日

诊断:室性早搏。

初诊:患者有病毒性心肌炎后遗症史已 8 年。心悸胸闷反复发作。近一周见加重,且见左胸隐痛,面白少华,神疲,气短,夜寐不安,纳食减少,小便少,下肢轻度浮肿,舌暗边紫,脉细偏沉。检查心率 82 次/分,早搏 8~9 次。心电图检查为室性早搏,心肌轻度损害。先拟益气健脾,化痰通络。处方:

生炙黄芪 ^各 15 克	太子参 15 克	焦白术 12 克
带皮茯苓 ^各 15 克	广陈皮 6 克	炙甘草 3 克
紫丹参 12 克	生姜皮 3 克	赤小豆 30 克
河白草 30 克	炙远志 5 克	合欢皮 15 克
泽兰叶 12 克	焦谷麦芽 ^各 15 克	广郁金 20 克

二诊：上方服用 14 剂后，又加煅龙齿先 30 克、柏子仁 12 克、炒枣仁 15 克、续服一月。病症明显减轻，时已入冬，要求用膏方调补，故在上方基础上拟与膏方缓治。处方：

生炙黄芪 ^各 300 克	全当归 120 克	太子参 150 克
北沙参 120 克	炒白术 120 克	云茯苓 150 克
炒白芍 150 克	制首乌 150 克	川石斛 150 克
煅龙齿 300 克	左牡蛎 300 克	合欢皮 150 克
夜交藤 300 克	炙远志 60 克	五味子 30 克
紫丹参 120 克	广郁金 120 克	瓜蒌皮 120 克
路路通 120 克	广木香 30 克	泽兰叶 120 克
京三棱 120 克	蓬莪术 120 克	制香附 120 克
苏叶梗 ^各 100 克	佛手片 60 克	炒枳壳 120 克
淮小麦 300 克	炒枣仁 120 克	炙甘草 30 克
潼蒺藜 120 克	生谷芽 300 克	

上药浓煎三次，去渣取汁，另用吉林白参 100 克煎取浓汁，田七粉 60 克冲入调匀，再取阿胶 200 克、鳖甲胶 150 克、益母草 100 克、冰糖 200 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

患者在第二年又来要求服用膏方，且告及室性早搏已经很少出现，病情显著改善。

十一、高血压

(案一)男 48 岁 就诊日期：2000 年 11 月 12 日

诊断：原发性高血压。

初诊：有高血压史 12 年。平时血压在 180/100 毫米汞柱左右，服用降压药片。症见眩晕，视物模糊，时见耳鸣，烦劳甚则见后颈项板紧不舒，手指麻木，夜寐不安，大便干结。心情急躁，烦躁易怒，激动时可见面红耳赤，口干，腰膝酸软无力。舌质红，苔薄腻，脉象细弦。治当滋水涵木，平肝潜阳。处方：

大生地 15 克	山萸肉 12 克	粉丹皮 6 克
炒黄芩 12 克	桑寄生 24 克	石决明 ^{先下} 30 克
夏枯草 12 克	左牡蛎 30 克	淮牛膝 9 克
净地龙 12 克	明天麻 12 克	嫩勾藤 ^{后下} 12 克
潼蒺藜 12 克	福泽泻 12 克	

二诊：服用上方 14 剂，眩晕，视物模糊，腰痛减轻，尚见口干，大便干结，腰膝酸软无力。故在上方基础上加菊花、杞子、女贞子、旱莲草、玄参、麦冬、柏子仁、炒枣仁、瓜蒌仁、杜仲等滋阴平肝润肠之品，又服用一月，病情渐见减轻。时值冬令，再拟膏方缓缓图治。处方：

生熟地 ^各 120 克	山萸肉 120 克	淮山药 150 克
女贞子 150 克	旱莲草 150 克	制首乌 120 克
川杜仲 120 克	炒黄芩 120 克	桑寄生 240 克
生槐米 ^包 90 克	淮牛膝 120 克	枸杞子 100 克
潼蒺藜 120 克	菟丝子 240 克	煅牡蛎 300 克
煅龙骨 300 克	夏枯草 120 克	明天麻 120 克
夜交藤 300 克	合欢皮 120 克	炒枣仁 120 克
柏子仁 120 克	瓜蒌仁 120 克	大川芎 30 克

京赤芍 90 克 川断肉 120 克 金毛狗脊 150 克
 广陈皮 60 克 炒枳壳 120 克 广木香 30 克
 生山楂 100 克 茶树根 300 克 福泽泻 120 克

上药浓煎三次，去渣取汁，用西洋参粉 60 克调匀，再取鳖甲胶 300 克、阿胶 100 克、麦芽糖 250 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，温水冲服。

患者服用膏方以后，又来就诊。自诉病情稳定，血压也没有波动。尚感腰膝酸软，神疲乏力，夜寐不安。后在初诊处方基础上加入滋肾、安神之品，一直调理一年。到冬至前又配一料膏方，继续服用以巩固疗效。

(案二)女 54 岁 就诊日期：2000 年 10 月 22 日

诊断：原发性高血压病。

初诊：有高血压史 30 年，生育后发现高血压至今。平时血压在 21.28～18.62/11.97～13.3 千帕(160～140/90～100 毫米汞柱)。主要感到眩晕，腰膝酸软，左侧肢麻，神疲乏力，动则气短，纳食减少，夜寐不安，口干少津，大便干结不畅，舌质光红，有瘀斑，苔少，脉象细。病属气阴不足，肾水亏损，脉络凝滞，先拟益气阴，和中焦，养心神为先。处方：

大生地 15 克 山萸肉 12 克 太子参 15 克
 云茯苓 15 克 大麦冬 12 克 川石斛 15 克
 北沙参 15 克 炙远志 5 克 潼蒺藜 112 克
 广陈皮 6 克 生槐米^包 15 克 川牛膝 12 克
 广地龙 12 克 炒枣仁 15 克 焦谷麦芽^各 15 克

二诊：服用上方 14 剂，眩晕已减，夜寐稍安，大便渐畅，纳食也可，肢麻依然，苔脉同前。前方加减，当加入通络化瘀之品。处方：

大生地 15 克	山萸肉 12 克	太子参 15 克
云茯苓 15 克	北沙参 12 克	大麦冬 12 克
桃仁泥 9 克	炙甲片 6 克	淮牛膝 12 克
广地龙 12 克	生黄芪 15 克	全当归 12 克
京赤芍 6 克	广陈皮 6 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

三诊：上方服用 14 剂后，病情已见明显改善，又加减服用 14 剂，要求用膏方调理巩固，治法同前，取六味地黄丸、补阳还五汤、六君子汤基础上拟一膏方服用。处方：

炒党参 120 克	焦白术 100 克	云茯苓 150 克
广陈皮 60 克	制半夏 120 克	炙甘草 30 克
北沙参 120 克	大麦冬 120 克	川石斛 120 克
天花粉 120 克	京玄参 120 克	制首乌 120 克
炒黄芩 120 克	桑寄生 240 克	生槐米 ^包 120 克
全当归 100 克	生黄芪 150 克	京赤芍 60 克
炒白芍 120 克	桃仁泥 120 克	川红花 60 克
广地龙 120 克	泽兰叶 90 克	川牛膝 120 克
紫丹参 120 克	柏子仁 120 克	炒枣仁 120 克
合欢皮 120 克	夜交藤 150 克	炙远志 50 克
女贞子 150 克	旱莲草 180 克	焦谷麦芽 ^各 150 克
广郁金 120 克	炒枳壳 120 克	福泽泻 120 克

上方浓煎三次，去渣取汁，另取西洋参 100 克、枫斗

100 克浓煎后取汁冲入调匀,入鳖甲胶 250 克、阿胶 100 克、益母草膏 150 克、冰糖 250 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,温水冲服。

十二、冠心病

女 76 岁 就诊日期:1996 年 11 月 2 日

诊断:冠心病。

初诊:8 年前因胸闷、气短而去医院就诊,作心电图检查,提示:心肌损害。今年五月起胸闷加重,且致胸胁部疼痛,发作时则又抓紧状,向左肩部放射。含硝酸甘油片可以缓解。目前则见胸闷、胸痛、心慌气短、叹息频作,夜半则欲临窗呼吸方快,畏寒怕冷,四肢不温,大便溏薄,舌质暗淡,苔薄白,脉象沉细。复查心电图提示:心肌损害,三酰甘油(甘油三脂)和胆固醇均升高。临床诊断:冠心病。病属心阳不振,阴寒内盛,胸中气机不畅,脉络凝滞,急当温阳散寒,理气化痰通络。处方:

川桂枝 10 克	赤白芍 ^各 12 克	熟附块 9 克
炙甘草 6 克	紫丹参 12 克	广郁金 12 克
川红花 6 克	全瓜蒌 12 克	薤白头 9 克
王不留行 12 克	泽兰叶 12 克	失笑散 ^包 12 克
云茯苓 15 克	广陈皮 6 克	福泽泻 12 克

二诊:服药 14 剂,病情已见减轻,在上方基础上又加健脾和胃之品,又服用月余以后,要求用膏方调理,即在原方进行加减。处方:

米炒党参 120 克	炒白术 120 克	云茯苓 150 克
炙甘草 60 克	熟附块 120 克	川桂枝 100 克
京赤芍 100 克	炒白芍 150 克	紫丹参 120 克
大川芎 50 克	川红花 100 克	泽兰叶 100 克
王不留行 120 克	广郁金 100 克	片姜黄 90 克
白芥子 90 克	全瓜蒌 120 克	薤白头 120 克
老苏梗 120 克	炒枳壳 120 克	佛手片 60 克
制香附 120 克	失笑散 ^包 120 克	软柴胡 100 克
广陈皮 60 克	制半夏 60 克	香甘松 60 克
鹿角片 ^{先煎} 120 克	参三七 90 克	淮山药 150 克
焦谷麦芽 ^各 150 克		

上方浓煎三次,取汁去渣,另用紫河车粉 100 克、红参 100 克煎取浓汁一起冲入调匀,取鹿角胶 250 克、龟板胶 100 克、鸡血藤膏 200 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

十三、高脂血症

男 67 岁 就诊日期:1999 年 11 月 15 日

诊断:高脂血症。

初诊:11 年前,体检发现血清总胆固醇和甘油三脂含量均高,因原有冠心病史,故一直用扩张血管,降胆固醇,降血脂药治疗。患者体形肥胖,脘腹痞满,纳食减少,时有泛恶,口干苦而不欲饮,肢体困重,面部稍浮,眼睑有黄色结节。小便黄且量少,舌苔黄腻,脉象滑数,病属痰浊内蕴

化热，气机不畅，高年体衰，治当兼顾，清化痰浊，和胃理气。处方：

制半夏 12 克	云茯苓 15 克	广陈皮 6 克
川黄连 6 克	炒枳壳 12 克	生苡仁 15 克
决明子 15 克	干荷叶 12 克	广木香 3 克
佩兰叶 12 克	白叩仁 ^{后下} 3 克	冬瓜皮 12 克
生谷芽 30 克	焦查曲 ^各 12 克	

二诊：服用上方 14 剂，舌黄腻稍化，肢体困重亦减，纳渐馨，苔脉同前，再拟前方加虎杖 15 克、泽泻 15 克再服 14 剂，症情又得到改善，时届冬令，要求用膏方调治。处方：

太子参 300 克	炒党参 100 克	生白术 100 克
云茯苓 150 克	生苡仁 300 克	淮山药 120 克
赤小豆 300 克	广郁金 120 克	炙远志 50 克
干泽漆 150 克	福泽泻 150 克	制首乌 150 克
肥玉竹 120 克	仙鹤草 150 克	十大功劳叶 150 克
炒黄芩 120 克	桑寄生 240 克	夏枯草 120 克
制半夏 120 克	川黄连 90 克	决明子 150 克
干荷叶 300 克	冬瓜皮 300 克	佩兰叶 150 克
炒枳壳 120 克	制香附 120 克	茶树根 300 克
大腹皮 120 克	佛手片 120 克	生山楂 150 克
象贝母 120 克	滑石块 300 克	茵陈蒿 150 克
生谷芽 300 克	老苏梗 120 克	姜竹茹 60 克

上方浓煎三次，取汁去渣，另用皮尾参 100 克、藏红花 10 克、铁皮枫斗 100 克、田七 100 克浓煎取汁冲入调匀，并

以此药汁分三次,开水冲饮代茶。取鹿角胶 50 克、鳖甲胶 100 克、桑葚子膏 100 克、肥玉竹膏 100 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

患者连续三年服用上述膏方,平时还服用和胃理气、化痰泄浊之品,病情一直稳定。

十四、神经衰弱

(案一)男 52 岁 就诊日期:2001 年 9 月 15 日

诊断:神经衰弱。

初诊:患者因失眠十余年,长期服用安眠药,近来夜寐不能入睡,大约 1~2 时入睡即梦扰纷纷,头颈和后脑作胀微痛,头晕时不能左右顾盼,心悸不宁,泛泛欲吐,不能起身。腹中胀气,腰臀部有寒冷感觉,遇天阴则更甚。纳食减少,大便一日两次,质稀,面部较暗,形神萎顿,舌质略淡,苔薄白而腻,脉右弦左细。症属肾气亏损,脾胃运化失司,湿浊内滞,中焦湿阻化热,上扰心神。治拟健脾温肾,理气化浊,和胃安神。处方:

制半夏 12 克	北秫米 ^包 12 克	菟丝子 24 克
仙灵脾 12 克	甘杞子 12 克	炒白术 12 克
云茯苓 15 克	广陈皮 6 克	炙远志 5 克
合欢皮 15 克	夜交藤 15 克	煅龙齿 ^{先下} 15 克
淮山药 15 克	姜竹茹 6 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

二诊:上方服用 14 剂,夜寐稍安,入夜已有睡意,腹中胀气也减,大便日行一次,纳稍增,苔脉同上。再拟上方出

入。处方：

上方去 淮山药

甘杞子

加 珍珠母^{先下} 30 克 明天麻 10 克

三诊：上方又服用 14 剂，病症已有改善，要求膏方继续调治，故在原方基础上，从理阳气着手，和中焦，安心神用药。处方：

菟丝子 240 克	仙灵脾 120 克	覆盆子 120 克
甘杞子 120 克	潼蒺藜 120 克	补骨脂 120 克
炒杜仲 120 克	太子参 150 克	炒白术 120 克
云茯苓 150 克	炒扁豆 120 克	坎炁 10 条
制半夏 120 克	北秫米 ^包 120 克	广陈皮 60 克
炙远志 50 克	合欢皮 120 克	夜交藤 150 克
明天麻 120 克	煅龙齿 150 克	珍珠母 ^{先煎} 300 克
川断肉 120 克	川牛膝 120 克	金毛狗脊 150 克
淮小麦 300 克	蒸黄精 120 克	炙甘草 60 克
大红枣 100 克	福泽泻 120 克	姜竹茹 60 克
焦谷麦芽 ^各 120 克		

上方浓煎三次，取汁去渣，再加入吉林白参粉 50 克、琥珀粉 30 克调匀，取鹿角胶 50 克、鳖甲胶 150 克、麦芽糖 150 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

（案二）女 38 岁 就诊日期：2000 年 10 月 22 日

诊断：神经衰弱。

初诊：失眠两年，逐渐加重。每晚入睡约 2~3 小时，有时更少。夜寐时常汗出，心悸头晕耳鸣，纳食一般，健

忘,经常腰痛,平时容易感冒。作体检时未发现其他病症,舌质红,苔少,脉象细弦,症属心脾气血不足。心主血藏神,脾统血主运,脾胃为气血生化之源,气血不足,上不能养心而神明欠安,外不能固表而寒热易作,拟益心脾,养心神。处方:

蜜炙黄芪 15 克	炒党参 12 克	炒白术 12 克
全当归 12 克	炒白芍 15 克	云茯苓 12 克
炒枣仁 15 克	料豆衣 24 克	广木香 3 克
菟丝子 24 克	广陈皮 6 克	青防风 3 克
合欢皮 15 克	夜交藤 30 克	大红枣 10 枚

二诊:服用上方 14 剂,精神转好,夜寐亦可多睡,头晕心悸亦减,苔脉同前,再拟上方加减。处方:

上方去 防风 广陈皮
加 柏子仁 12 克 炙远志 5 克

三诊:服用上方加减约一月,病情明显改善,夜寐已能睡五小时左右,舌红,苔薄,脉象细弦。用膏方调治。处方:

蜜炙黄芪 300 克	米炒党参 120 克	焦白术 120 克
云茯苓 150 克	淮山药 150 克	炒扁豆 120 克
莲子肉 120 克	全当归 120 克	炒白芍 120 克
大川芎 30 克	熟地黄 120 克	紫丹参 120 克
炒枣仁 120 克	合欢皮 150 克	炙远志 50 克
夜交藤 300 克	煅龙齿 300 克	柏子仁 120 克
菟丝子 240 克	甘杞子 120 克	潼蒺藜 120 克

覆盆子 120 克	制首乌 150 克	肥玉竹 120 克
广陈皮 60 克	广木香 30 克	淮小麦 300 克
糯稻根 100 克	料豆衣 240 克	炙甘草 30 克
青防风 30 克	大红枣 100 克	

上方浓煎三次,取汁去渣,另取吉林白参 100 克、西洋参 100 克煎汁冲入,用阿胶 100 克、鳖甲胶 150 克、冰糖 250 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

十五、血管性头痛

女 28 岁 就诊日期:1999 年 10 月 30 日

诊断:血管性头痛。

初诊:头痛 8 年,逐步加重,以眉棱骨处及颠顶为甚,到及面侧。每逢月经来潮则痛甚。疼痛剧烈时伴有恶心呕吐,怕光,常因劳累、情绪波动而诱发。长期服用止痛片。近一周来,每每发作,夜寐不安,面萎神疲,面目怕光。耳鸣腰痛,颈项板滞,纳食减少,大便二~三日一次,舌质红,边有瘀点,苔薄腻,脉象弦细。患者曾在外院神经内科作检查,最后临床诊断为血管性头痛。病属气血不足,脉络瘀滞,久病及肾,肾水不涵肝木,治拟益气养血通络,柔肝补肾。处方:

炒白芍 15 克	京赤芍 10 克	女贞子 15 克
旱莲草 30 克	紫丹参 12 克	太子参 30 克
云茯苓 15 克	净地龙 12 克	淡全蝎 3 克
炙僵蚕 12 克	大川芎 3 克	香白芷 3 克

仙灵脾 12 克 珍珠母^{先煎} 30 克 炙远志 3 克

姜竹茹 6 克

二诊：服用上方 14 剂，头痛发作已见减少，且病情也减轻，苔脉同前。再拟前方加减。处方：

上方去 京赤芍 女贞子 白芷 仙灵脾

加 大蜈蚣 2 条 淡苁蓉 10 克 枳实 12 克

制大黄 10 克

三诊：又服用上方 14 剂，适逢经行，头痛已不如前严重，精神渐振，腑气已见，日行一次，余症均安，舌脉同上。用膏方调治。处方：

大生熟地^各 120 克 山萸肉 120 克 淮山药 150 克

女贞子 120 克 旱莲草 300 克 仙灵脾 120 克

淡苁蓉 100 克 甘杞子 120 克 紫丹参 120 克

川断肉 120 克 桑寄生 240 克 补骨脂 120 克

明天麻 120 克 杜红花 60 克 全当归 120 克

大白芍 150 克 京赤芍 100 克 大川芎 30 克

粉葛根 150 克 珍珠母 300 克 左牡蛎 300 克

姜半夏 120 克 云茯苓 150 克 炒枳实 120 克

广陈皮 60 克 制大黄 100 克 姜竹茹 60 克

炙甘草 30 克 广地龙 120 克 炙僵蚕 120 克

焦查曲^各 120 克 福泽泻 120 克

上方浓煎三次，取汁去渣，另用全蝎粉 30 克、蜈蚣粉 30 克、田七粉 40 克冲入调匀，取阿胶 150 克、鳖甲胶 150 克、冰糖 150 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水

冲服。

十六、缺铁性贫血

女 35 岁 就诊日期：2001 年 8 月 10 日

诊断：缺铁性贫血。

初诊：眩晕伴有食后腹胀三年，加重两周。进食后腹部胀闷，形体消瘦，在外院作胃镜检查，未见异常。近一周来，眩晕加重，又作生化血液检查，血常规示血色素、红细胞均下降。临床诊断：缺铁性贫血。曾先后服用硫酸亚铁及其他药物，均因出现胃脘不适、恶心而终止服用。患者面色㿔白，头晕头痛，心悸，夜寐不安，纳食减少，食后腹胀，有下坠感，大便溏薄，唇舌色淡，苔薄，脉象细弱，病属脾胃虚弱，中气下陷，运化失司，生化乏力，已见损及心肾，恐日久致虚损，所幸胃气未败，先养中土，俟气血之源渐充，再予调养。切忌蛮补。处方：

炒党参 12 克	焦白术 9 克	云茯苓 15 克
制半夏 9 克	广陈皮 6 克	广木香 3 克
缩砂仁 ^{后下} 3 克	全当归 12 克	炙黄芪 12 克
软柴胡 6 克	炙升麻 3 克	炙甘草 3 克
焦谷麦芽 ^各 15 克		

二诊：服用上方 14 剂，胃纳增而精神渐振。又在此方基础上加減，再服用近 2 月后化验血常规，血色素和红血球已稍上升，而病情已减轻，眩晕明显减轻，纳食也增，舌脉如前，再拟上方加減。处方：

上方去 广陈皮 缩砂仁

加 炒枳壳 12 克 紫河车胶囊一日三次,每次 4 粒。

三诊:又服上方 14 剂,眩晕已见大减,腹部胀闷亦去,纳食已入常。经血常规化验,血色素和红血球已接近正常,夜寐安而精神振作,舌质红,苔薄,脉细小弦。要求服用膏方巩固。处方:

清炙黄芪 150 克	炒党参 120 克	炒白术 120 克
全当归 120 克	炒白芍 120 克	云茯苓 150 克
淮山药 150 克	桑葚子 120 克	枸杞子 120 克
生熟地 ^各 120 克	山萸肉 120 克	仙灵脾 120 克
菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克	制首乌 120 克
仙鹤草 120 克	旱莲草 150 克	合欢皮 150 克
夜交藤 150 克	炒枳壳 120 克	广陈皮 60 克
绿升麻 60 克	莲子肉 120 克	炙远志 5 克
炒枣仁 120 克	制黄精 120 克	十大功劳叶 120 克
焦谷麦芽 ^各 150 克	大枣 100 克	

上方浓煎三次,取汁去渣,入河车粉 100 克、皮尾参粉 100 克冲入调匀,再用阿胶 250 克、鳖甲胶 150 克、鹿角胶 50 克、冰糖 200 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

十七、性功能障碍

(案一)男 45 岁 就诊日期:1999 年 9 月 22 日

诊断:性功能障碍。

初诊：阳痿不举 2 年，已不能过性生活。自青年起小便频数而清长，腰膝酸软，不耐久立行走。语音低微，神疲嗜睡，平时易感冒，时见烦热，咽干，目涩，牙齿松动，舌体胖，边有齿痕，苔白腻而润，脉弦重按无力，屡服附桂温热药及补肾之品无效，病属肾精亏损，阴阳两虚，当拟调补阴阳，宗右归意。处方：

黑附块 9 克	生熟地 ^各 15 克	山萸肉 12 克
枸杞子 12 克	败龟板 12 克	菟丝子 24 克
覆盆子 15 克	巴戟肉 9 克	淮山药 15 克
煅龙骨 15 克	五味子 6 克	阳起石 15 克
木馒头 15 克	福泽泻 12 克	

二诊：服用上方 14 剂，小便频数较减，阳事能举而时间短，精神较前振作，苔脉同上，仍拟上方加减，续服。处方：

上方去 枸杞子 菟丝子
加 鹿角片 6 克 大蜈蚣 2 条

三诊：服用上方一月余后，精神已振，阳事渐挺，已能过性生活，尚不满意，神疲腰痛等肾虚之象已见改善，舌脉同上，要求另用膏方调治，以提高疗效并巩固。处方：

生熟地 ^各 150 克	山萸肉 100 克	巴戟肉 120 克
云茯苓 150 克	淮山药 150 克	覆盆子 120 克
菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克	枸杞子 120 克
甘锁阳 120 克	川杜仲 120 克	川断肉 120 克
补骨脂 120 克	金毛狗脊 150 克	褚实子 120 克

熟附块 120 克	炙鳖甲 150 克	败龟板 150 克
木馒头 300 克	阳起石 150 克	韭菜子 100 克
大蜈蚣 30 克	焙蜂房 120 克	煨益智 120 克
台乌药 60 克	广陈皮 60 克	炙甲片 60 克
煨龙骨 300 克	五味子 30 克	福泽泻 120 克

上方浓煎三次,取汁去渣,另用红参 50 克、西洋参 100 克煎取浓汁冲入调匀,再取鹿角胶 150 克、鳖甲胶 150 克、龟板胶、冰糖 250 克烊化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

(案二)男 37 岁 就诊日期:2001 年 11 月 10 日

诊断:性功能障碍。

初诊:结婚 7 年未育。始则因避孕而抑制接触,后来发现阳事渐萎,由举而不坚到不能勃起,腰痛,耳鸣,下肢乏力,不能劳累,劳则疲惫至极,几天不能复原,舌红,苔薄根腻,脉细弦。属肝肾亏损,精失充养,筋失润涵,由脾胃虚弱所至。治当健脾胃,补肝肾为主。处方:

粉葛根 12 克	淮山药 15 克	生熟地 ^各 12 克
巴戟肉 12 克	川断肉 12 克	金毛狗脊 15 克
覆盆子 12 克	桑螵蛸 12 克	阳起石 15 克
蛇麻子 12 克	菟丝子 24 克	伸筋草 15 克
肥知母 9 克	炙远志 5 克	

二诊:服用上方 14 剂后,自感病情好转,阳事渐兴,苔脉同前。又以上方加减服用一个月,已能正常交合,纳便均佳,要求服用膏方以巩固疗效。处方:

生熟地 ^各 120 克	山萸肉 120 克	巴戟肉 120 克
仙灵脾 240 克	菟丝子 240 克	甘锁阳 120 克
覆盆子 120 克	潼蒺藜 120 克	枸杞子 120 克
炒党参 120 克	云茯苓 150 克	淮山药 150 克
粉葛根 120 克	伸筋草 150 克	蛇床子 120 克
褚实子 120 克	补骨脂 120 克	韭菜子 90 克
阳起石 150 克	肥玉竹 120 克	制首乌 150 克
女贞子 150 克	旱莲草 150 克	生白芍 150 克
炙远志 50 克	合欢皮 150 克	炒枣仁 120 克
败龟板 150 克	太子参 120 克	石菖蒲 100 克
蔓荆子 100 克	淮小麦 300 克	炙甘草 30 克
广陈皮 60 克	生谷芽 150 克	

上方浓煎三次,取汁去渣,另用冬虫夏草 20 克、石柱参 50 克煎取浓汁冲入,再取鹿角胶 100 克、鳖甲胶 150 克、阿胶 150 克、冰糖 200 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

十八、糖尿病

男 65 岁 就诊日期:2001 年 11 月 1 日

诊断:糖尿病。

初诊:有糖尿病史 6 年。平时服用拜糖平等降糖药控制。口干咽燥,渴饮,眩晕,腰痛,乏力一周,心悸,夜寐不安,大便燥结,二~三日一行,舌质光红,苔少,脉象细弦,症属肝肾阴虚,心阴不足,心火上炎,治拟益肝肾,清心火

为主。处方：

大生地 15 克	生白芍 12 克	京玄参 12 克
败龟板 15 克	天花粉 15 克	川石斛 30 克
肥玉竹 12 克	肥知母 12 克	炒枣仁 12 克
柏子仁 12 克	淮山药 15 克	女贞子 15 克
旱莲草 30 克	生谷芽 30 克	

二诊：服用上方 14 剂，口咽干燥已减，大便日行 1 次，已见通畅，夜寐稍安，苔脉同前，要求加用膏方调治。

处方：

大生地 150 克	山萸肉 120 克	淮山药 300 克
云茯苓 150 克	粉丹皮 60 克	福泽泻 120 克
川黄柏 100 克	肥知母 100 克	女贞子 120 克
旱莲草 150 克	川断肉 120 克	金毛狗脊 120 克
北沙参 120 克	大麦冬 100 克	川石斛 300 克
肥玉竹 100 克	制首乌 120 克	黑玄参 120 克
炙鳖甲 150 克	地骨皮 100 克	天花粉 300 克
生黄芪 150 克	京赤芍 100 克	炒枣仁 150 克
夜交藤 150 克	柏子仁 120 克	煅龙齿 150 克
广郁金 100 克	广陈皮 60 克	白茅根 150 克

上方浓煎三次，取汁去渣，另用西洋参 100 克、上等枫斗 100 克浓煎取汁冲入，再用鳖甲胶 150 克、龟板胶 150 克、麦芽糖 150 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

十九、甲状腺功能亢进症

女 38 岁 就诊日期：2000 年 7 月 2 日

诊断：甲状腺机能亢进症。

初诊：三年前因两眼外突伴两手震颤，汗出，心悸而就诊，诊断为甲状腺机能亢进。一直用他巴唑等药治疗。现见颈项肿胀，两目明显外突，两手震颤，烘热汗多，神疲嗜卧，舌质淡红，苔薄白，脉象弦滑，病属阴虚肝旺，且挟痰热阻络，治宜补益气阴，平肝潜阳，化痰和络。处方：

北沙参 12 克	太子参 15 克	京玄参 12 克
夏枯草 15 克	左牡蛎 ^{先下} 30 克	海浮石 12 克
黄药子 12 克	海藻 12 克	昆布 9 克
象贝母 12 克	地骨皮 15 克	旱莲草 30 克
石菖蒲 10 克	淮小麦 30 克	生甘草 3 克

二诊：服用上方 14 剂，病情已有改善，汗出已少，精神亦可。月经提前来临，量少色稍淡，舌苔薄白，脉象弦滑。再拟处方：

上方去 旱莲草 淮小麦 石菖蒲
加 香附 12 克 贯仲炭 12 克 茜草炭 12 克

三诊：服用上方 7 剂后，经事已去，病情得到进一步改善。仍用上方加重平肝、化痰、和络之品，又服用 3 月，时值冬令，要求用膏方继续调补。处方：

北沙参 120 克	大麦冬 120 克	川石斛 150 克
京玄参 120 克	天花粉 120 克	炙鳖甲 ^{先下} 150 克

女贞子 150 克	旱莲草 150 克	太子参 150 克
炒白术 90 克	云茯苓 150 克	广陈皮 60 克
炒枳壳 120 克	广郁金 120 克	左牡蛎 300 克
夏枯草 150 克	黄药子 120 克	昆布 90 克
海藻 120 克	象贝母 120 克	紫丹参 120 克
料豆衣 240 克	浮小麦 120 克	糯稻根 120 克
炙远志 50 克	海浮石 120 克	海蛤壳 150 克
地骨皮 120 克	生白芍 150 克	淮小麦 300 克
炙甘草 30 克	连翘壳 100 克	竹叶卷心 100 克

上方浓煎三次,取汁去渣,另用西洋参 100 克浓煎冲入,再取鳖甲胶 250 克、阿胶 100 克、冰糖 150 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

二十、尿路感染

女 57 岁 就诊日期:2001 年 10 月 26 日

诊断:尿路感染。

初诊:尿频,尿急,尿时疼痛,反复发作七年。伴腰痛乏力,加重二周。小便常规:镜检:白细胞++++,红细胞+,蛋白质-,曾用多种抗生素,开始时能控制症状,一遇劳累或感冒后又发作,也用過三金片、尿感康等中成药治疗,疗效不显。现在小便频数、急迫,尿时疼痛,偶见小便失禁,时而畏寒肢冷,时而面部烘热,口干口苦,腰痛膝软,大便较干,舌红,苔薄黄腻,脉象弦细滑数,治拟清热通淋,化湿。处方:

大生地 12 克	粉丹皮 6 克	篇蓄草 15 克
瞿麦穗 12 克	忍冬藤 15 克	川黄柏 10 克
肥知母 10 克	冬葵子 10 克	乌菰莓 15 克
酢浆草 15 克	旱莲草 15 克	生甘草 3 克
飞滑石 30 克	福泽泻 12 克	姜竹茹 6 克

二诊：服上方 14 剂，湿热蕴结之象渐化，尿路刺激症状减轻，小便还是失禁，脉象同上，再拟上方加减。处方：

上方去 滑石 旱莲草 竹茹
 加 煨益智 9 克 淮山药 12 克 乌药 6 克
 生大黄^{后下} 6 克

三诊：又服用上方 14 剂，未见小便失禁，大便通而口苦减，舌红苔薄，脉象小弦带数。再加减用药一月余。要求配膏方以调经。处方：

大生地 150 克	山萸肉 120 克	淮山药 150 克
粉丹皮 60 克	云茯苓 150 克	太子参 300 克
生白术 120 克	广陈皮 60 克	制半夏 60 克
炙甘草 30 克	女贞子 150 克	旱莲草 150 克
川断肉 120 克	金毛狗脊 120 克	川杜仲 120 克
川黄柏 120 克	肥知母 120 克	炙鳖甲 ^{先下} 150 克
仙灵脾 150 克	煨益智 100 克	台首乌 60 克
菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克	覆盆子 90 克
冬葵子 120 克	乌菰莓 150 克、	瞿麦穗 150 克
篇蓄草 150 克	生苡仁 150 克	京赤芍 60 克
焦谷麦芽 ^各 150 克		

上方浓煎三次,取汁去渣,另用西洋参 100 克、上等枫斗 100 克煎取浓汁冲入。取鳖甲胶 150 克、阿胶 100 克、麦芽糖 250 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

二十一、隐匿性肾炎

男 35 岁 就诊日期:2000 年 8 月 12 日

诊断:① 隐匿性肾炎;② 不完全性右束枝传导阻滞。

初诊:面浮肿腰痛伴心悸气短三年。加重一周。经小便常规、血生化化验及心电图检查提示:① 隐匿性肾炎;② 不完全性右束枝传导阻滞。近一周面目虚浮、神疲乏力,心悸气短、口干,腰背酸软,纳食减少,傍晚面部容易升火,夜寐汗出较多。小便泡沫较多,舌质红,苔少,脉象细软。病属脾肾气虚,阴分亦亏。患者平时容易感冒。当先健脾肾,固卫气,养阴液,和血络。处方:

生炙黄芪 ^各 15 克	炒白术 12 克	青防风 3 克
太子参 15 克	猪茯苓 ^各 12 克	赤小豆 30 克
淮山药 15 克	南芡实 15 克	白莲须 12 克
广郁金 12 克	紫丹参 12 克	料豆衣 24 克
地骨皮 12 克	河白草 15 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

二诊:服用上方 14 剂,病情已见减轻,后加重益气固卫之品,约服用三个月,小便常规的尿蛋白是一直在一 ~ ~ 十之间。用药至今也未见感冒。舌红,脉细。拟用膏方巩固疗效。处方:

菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克	覆盆子 120 克
-----------	-----------	-----------

女贞子 150 克	旱莲草 300 克	枸杞子 100 克
大生地 120 克	山萸肉 90 克	淮山药 150 克
南芡实 150 克	白莲须 120 克	云茯苓 150 克
炒党参 120 克	生炙黄芪 ^各 120 克	炒白术 90 克
赤小豆 30 克	生苡仁 30 克	金樱子 120 克
川断肉 120 克	金毛狗脊 150 克	川杜仲 120 克
制首乌 120 克	女贞子 150 克	旱莲草 150 克
炙远志 50 克	广郁金 120 克	紫丹参 120 克
广陈皮 60 克	合欢皮 150 克	五味子 30 克
地骨皮 120 克	料豆衣 120 克	福泽泻 120 克
焦谷麦芽 ^各 150 克		

上方浓煎三次，取汁去渣，另用紫河车粉 100 克冲入调匀，取阿胶 150 克、鳖甲胶 150 克、冰糖 250 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

二十二、肾病综合征

男 26 岁 就诊日期：1997 年 9 月 15 日

诊断：肾病综合征。

初诊：1996 年 8 月因浮肿、腰痛、小便量少，小便常规化验尿蛋白十十十十。血生化检查血浆白蛋白低，胆固醇高，符合“三高一低”的表现，经外院诊断为肾病综合征。经用强的松治疗，2 个月后，症状减轻。但小便常规尿蛋白一直在十十～十，来中医门诊治疗，现见眼面及四肢轻度浮肿，小便亦少，眩晕腰痛，面红升火，口干不欲多饮，血

压偏高,舌红苔薄腻,脉弦细。症属脾肾不足,脾虚则运化失司而水湿内聚,肾虚则水不涵木而肝阳偏亢。先拟健运化湿,平肝益肾。处方:

大生地 12 克	山萸肉 9 克	淮山药 15 克
云茯苓 15 克	粉丹皮 6 克	福泽泻 12 克
太子参 15 克	生黄芪 15 克	小石苇 12 克
赤小豆 30 克	左牡蛎 ^{先下} 30 克	炒杜仲 12 克
淮牛膝 12 克	南芡实 15 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

二诊:服用上方 14 剂,症状减轻。浮肿、尿蛋白反复不消,乃肾虚精失固所致,小便少,眩晕乏力。因脾土薄弱,水湿内聚而成。用西药降压片已能控制血压。舌红苔薄腻,脉弦细,再拟上方出入。处方:

大生地 15 克	山萸肉 9 克	淮山药 15 克
云茯苓 15 克	粉丹皮 6 克	福泽泻 12 克
生黄芪 15 克	南芡实 15 克	白莲须 12 克
米仁根 30 克	炙鳖甲 ^{先下} 15 克	广陈皮 6 克
制半夏 10 克	焦谷麦芽 ^各 15 克	

三诊:又服用上方 14 剂,感冒已少,小便常规尿蛋白[±]~⁺,浮肿已见减轻,血压得到控制,嘱其减少激素用量,并继续服用上方加减一年后,激素停用。化验正常,病情已见基本消失,要求用膏方调治。处方:

生熟地 ^各 150 克	山萸肉 120 克	淮山药 150 克
云茯苓 150 克	粉丹皮 60 克	福泽泻 120 克
生炙黄芪 ^各 150 克	炒党参 60 克	炒白术 120 克

生熟苡仁 ^各 120 克	制半夏 60 克	广陈皮 60 克
菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克	覆盆子 120 克
川杜仲 20 克	川断肉 120 克	炒黄芩 120 克
桑寄生 240 克	淮牛膝 120 克	生槐米 ^包 120 克
左牡蛎 ^{先下} 300 克	女贞子 150 克	旱莲草 150 克
南芡实 120 克	金樱子 120 克	制首乌 120 克
明天麻 120 克	小石苇 120 克	制黄精 120 克
焦谷麦芽 ^各 150 克		

二十三、肾功能不全

男 52 岁 就诊日期：2000 年 10 月 28 日

诊断：肾功能不全(失代偿期)。

初诊：患者因腰痛腰酸伴恶心呕吐，一周加重，两天来医院就诊。询其有慢性肾炎病史 20 年。查肾功能，血肌酐和尿素氮均升高，二氧化碳结合力低，小便量少。下肢轻度浮肿，血压偏高，经用纠正酸中毒、利尿、降压，病情已见减轻。目前尚见轻度恶心，面色萎黄虚浮，倦怠乏力，眩晕腰痛，有时下肢抽搐，大便秘结，舌质红，苔黄腻，脉象弦滑，病属脾肾虚衰，气化不利，湿浊蕴结下焦，浊气上逆，胃失和降。治拟健脾温肾，和中降逆，通腑泄浊。处方：

熟附块 9 克	猪茯苓 ^各 12 克	制大黄 12 克
炒枳实 12 克	炒白术 12 克	苏叶梗 ^各 12 克
小川连 6 克	姜半夏 12 克	广陈皮 6 克
生牡蛎 ^{先下} 30 克	晚蚕砂 ^包 12 克	黑大豆 30 克

陈木瓜 3 克 淮牛膝 12 克 姜竹茹 6 克
福泽泻 12 克

二诊：叠进上方加减 2 个月，症状已见明显减轻，化验指标亦趋稳定。形神萎顿，乏力，舌偏淡，苔腻，脉弦细滑。要求用膏方调治。予西药对症外，遂以标本兼顾，扶正祛邪，温而不燥，补而不腻，泻而不猛，利而不峻，于正虚邪盛之体，尤须斟酌用药。处方：

太子参 300 克	炒白术 150 克	猪茯苓 ^各 150 克
姜半夏 120 克	广陈皮 60 克	熟附块 60 克
制大黄 150 克	炒枳实 150 克	淮山药 300 克
晚蚕砂 ^包 300 克	六月雪 300 克	生熟苡仁 ^各 300 克
黑大豆 300 克	菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克
仙灵脾 240 克	覆盆子 120 克	甘杞子 120 克
炒白芍 150 克	肥玉竹 120 克	粉萆薢 300 克
苏叶梗 ^各 120 克	草果仁 100 克	炙远志 50 克
炙升麻 100 克	泽兰叶 100 克	紫丹参 120 克
川红花 30 克	福泽泻 120 克	姜竹茹 60 克
淮牛膝 120 克	陈木瓜 30 克	

上方浓煎三次，取汁去渣，另用吉林白参 100 克、西洋参浓煎取汁冲入调匀，取鳖甲胶 150 克、阿胶 100 克、麦芽糖 250 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

二十四、慢性前列腺炎

男 61 岁 就诊日期：1999 年 9 月 22 日

诊断：慢性前列腺炎。

初诊：小便困难伴腰脊酸楚 6 年，加重 2 周。去年 3 月，因突然尿血（肉眼血尿），去医院泌尿内外科进行一系列检查，最后诊断：慢性前列腺炎。经对症处理，病情减轻。现仍见小便不利，淋漓不尽，睾丸坠胀不适，午后为甚，腰脊酸楚，心悸时作，口干不欲饮，纳食欠佳。舌红，苔腻根厚，脉细数，病属肾气亏损，膀胱气化失司，湿浊下注。治拟益肾清利为主。处方：

大生地 12 克	京赤芍 10 克	女贞子 15 克
旱莲草 30 克	老红藤 30 克	败酱草 15 克
川黄柏 12 克	王不留行 12 克	炒小茴香 3 克
苦参片 12 克	肥知母 12 克	软柴胡 12 克
上肉桂 ^{后下} 3 克	福泽泻 12 克	

二诊：服用上方 14 剂，小便不利已有改善，但仍然淋漓不尽，腰脊酸软好转，苔脉同上，又在原方基础上进行加减，曾用粉萆薢、苍术、生苡仁、炙甲片、桃仁泥、覆盆子、菟丝子、川断、金毛狗脊以后，病情明显好转，苔根腻亦化。拟用膏方巩固。处方：

大生地 150 克	京赤芍 100 克	紫丹参 120 克
女贞子 150 克	旱莲草 300 克	菟丝子 240 克
潼蒺藜 120 克	覆盆子 120 克	仙灵脾 120 克
炒党参 120 克	炒白术 120 克	云茯苓 150 克
川断肉 120 克	金毛狗脊 150 克	川杜仲 120 克
川黄柏 120 克	肥知母 120 克	苦参片 120 克

老红藤 150 克	败酱草 150 克	王不留行 12 克
炒小茴香 30 克	软柴胡 120 克	炒枳壳 120 克
广郁金 120 克	生苡仁 300 克	淮山药 150 克
炙甲片 60 克	老虎杖 150 克	京三棱 90 克
蓬莪术 90 克	制香附 120 克	益母草 90 克
广陈皮 60 克	焦谷麦芽 ^各 150 克	

上方浓煎三次,取汁去渣,另用吉林白参 100 克、西洋参 50 克、上等枫斗 50 克浓煎取汁冲入调匀,取鳖甲胶 150 克、鹿角胶 50 克、阿胶 50 克、冰糖 200 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

二十五、月经前期紧张症

女 36 岁 就诊日期:2000 年 10 月 10 日

诊断:月经前期紧张症。

初诊:上月因不完全流产,行刮宫术,10 月 1 日行经,量多有块,历 8 天而干净。现见患者面色萎黄,时有畏寒,眩晕腰酸,四肢乏力,纳食不馨,大便溏薄,舌苔薄白,脉象细小,素体虚弱,平时有鼻炎反复发作史。此次又经流产,雪上加霜,气血更为亏虚,累及脾肾,复损奇经八脉,阳维维护失调,先予益气健脾,治其后天之本,脾弱肝旺,女子以肝为先天,故勿忘投以解郁理气之品。处方:

炒党参 9 克	炙黄芪 12 克	炒白术芍 ^各 12 克
云茯苓 15 克	淮山药 15 克	炮姜炭 3 克
制香附 12 克	软柴胡 9 克	广木香 ^{后下} 3 克

炒苡仁 12 克 川断肉 12 克 炒小茴香 3 克
菟丝子 24 克 牛角腮 5 克 焦谷麦芽^各 15 克

二诊：服用上方 7 剂，病症减轻，便溏亦好，纳食渐馨，又以上方加减，继续服用 14 剂，后又逢行经，原有胁肋、乳房胀痛已去。大便已趋正常。面色也已好转，要求用膏方调治，以求巩固。处方：

炒党参 120 克	炒白术 120 克	云茯苓 150 克
全当归 120 克	炒白芍 150 克	大熟地 120 克
大川芎 30 克	紫丹参 120 克	炙黄芪 150 克
炙甘草 30 克	淮山药 150 克	莲子肉 120 克
菟丝子 240 克	潼蒺藜 120 克	枸杞子 120 克
女贞子 150 克	旱莲草 150 克	川断肉 120 克
金毛狗脊 150 克	川杜仲 120 克	制香附 120 克
软柴胡 100 克	广郁金 120 克	炒小茴香 30 克
炮姜炭 30 克	炒防风 30 克	广陈皮 60 克
制首乌 150 克	焦谷麦芽 ^各 150 克	

上方浓煎三次，取汁去渣，另用吉林白参 100 克浓煎冲入，龙眼肉 100 克、红枣肉 100 克（去皮核）调匀，取阿胶 250 克、冰糖 250 克烱化收膏，每日早晚各服一食匙，开水冲服。

二十六、更年期综合征

女 51 岁 就诊日期：2000 年 11 月 3 日

诊断：更年期综合征。

初诊：去年1月起月经已乱，至10月以后即完全停经。情绪不稳定，入夜兴奋，难以入睡，时有烘热汗出，腰酸乏力，大便干结，舌质红，苔少，脉象弦细。病属肝肾不足，气阴亏损，阴虚内热，心神不得安宁。肝失条达，气机不得舒畅。治拟益肝肾，安心神，补气阴，清虚热。处方：

川断肉 12 克	金毛狗脊 15 克	菟丝子 24 克
淮小麦 30 克	炒枣仁 15 克	炙甘草 6 克
柏子仁 12 克	太子参 15 克	大麦冬 12 克
料豆衣 24 克	五味子 3 克	炒白芍 15 克
制香附 12 克	广陈皮 6 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

二诊：服用上方14剂，夜能稍寐，汗出亦少，情绪稳定，要求继续服用上方14剂，时届冬令，再用膏方缓缓图治。处方：

生熟地 ^各 120 克	山萸肉 120 克	淮山药 150 克
云茯苓 150 克	菟丝子 240 克	枸杞子 120 克
潼白蒺藜 ^各 120 克	太子参 150 克	炒白术 120 克
炒枳壳 120 克	制首乌 120 克	制黄精 120 克
旱莲草 150 克	莲子肉 120 克	广陈皮 60 克
炒枣仁 120 克	柏子仁 120 克	合欢皮 150 克
夜交藤 150 克	明天麻 120 克	坎炁 20 条
川断肉 120 克	川杜仲 120 克	补骨脂 120 克
淮小麦 300 克	广郁金 120 克	软柴胡 120 克
炒白芍 120 克	料豆衣 240 克	五味子 30 克
制香附 120 克	焦谷麦芽 ^各 15 克	

上方浓煎三次,取汁去渣,另用西洋参 100 克、上等枫斗 100 克煎取浓汁冲入调匀,取鳖甲胶 150 克、阿胶 150 克、冰糖 250 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

二十七、颈椎病

女 56 岁 就诊日期:2001 年 11 月 7 日

诊断:颈椎病。

初诊:病已 2 年,先则轻度头晕,后因颈椎板紧不舒,两手麻木,且活动不利。即去医院检查摄片提示:颈椎肥大。经用牵引等法治疗,两手麻木减轻,但眩晕较前为甚。夜寐不安,时有出汗。舌光红,少苔,脉细。病属肾水亏、脉络滞。先拟滋肾益精,从任督脉治疗。处方:

败龟板 ^{先下} 20 克	鹿角片 60 克	潼蒺藜 12 克
北沙参 15 克	紫丹参 12 克	枸杞子 12 克
补骨脂 12 克	泽兰叶 12 克	制首乌 12 克
炒枣仁 12 克	合欢皮 15 克	川断肉 12 克
料豆衣 24 克	浮小麦 12 克	五味子 3 克
炙甘草 3 克	焦谷麦芽 ^各 15 克	

二诊:头晕稍减,夜寐亦安,汗出已少,舌脉如前,又以上方加减服用 14 剂,要求膏方一起治疗。为使病情尽快好转,则用上方以安心神,和血脉,化瘀通络为主。用膏方则从滋肾益精,通补任督,理气通络为主。处方:

败龟板 300 克	鹿角片 100 克	北沙参 120 克
-----------	-----------	-----------

肥玉竹 120 克	天麦冬 ^各 120 克	枸杞子 120 克
合欢皮 150 克	夜交藤 300 克	煅龙齿 300 克
桑葚子 300 克	淮小麦 300 克	炙甘草 30 克
菟丝子 240 克	覆盆子 120 克	炒枣仁 120 克
大生地 150 克	炒白芍 150 克	制首乌 120 克
仙灵脾 240 克	珍珠母 ^{先下} 300 克	炙远志 50 克
川红花 60 克	大川芎 30 克	五味子 30 克
紫丹参 100 克	炙甲片 60 克	福泽泻 120 克
广陈皮 60 克	焦谷麦芽 ^各 120 克	

上方浓煎三次,取汁去渣,另用藏川红花^各 10 克、吉林白参 100 克煎浓汁冲入调匀。取鳖甲胶 150 克、龟板胶 150 克、鹿角胶 60 克、冰糖 200 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

二十八、类风湿关节炎

女 47 岁 就诊日期:1999 年 10 月 16 日

诊断:类风湿性关节炎。

初诊:四肢关节疼痛 2 年,手甚于足,以末端为主。两手麻木疼痛,而以手指肿胀肥大更为明显,难以握拳持物。经化验检查,诊断为类风湿性关节炎。近一周手指关节肿胀疼痛明显,下肢不耐久立,夜寐不安,纳食减少,且有胃脘不适,大便干燥,舌质瘀紫,脉象细弦。病属风寒湿邪袭于经络,气血痹阻,脉络凝滞,正气衰而邪恋不去。治拟祛风散寒化湿,活血化瘀通络。处方:

川桂枝 6 克	京赤芍 15 克	肥知母 12 克
延胡索 9 克	全当归 12 克	川红花 6 克
桃仁泥 12 克	制草乌 ^{先下} 9 克	威灵仙 18 克
伸筋草 15 克	生苡仁 15 克	制大黄 10 克
炒枳实 12 克	广陈皮 6 克	焦谷麦芽 ^各 15 克

二诊：服用上方 14 剂，肢节疼痛稍减，而纳食稍馨，舌脉同前，初病在经在气，久病入络入血，气血痹阻，瘀滞脉络之病。非虫蚁搜剔邪不能从深处自拔。当在上方基础上加减。处方：

上方加 全蝎 3 克 地龙 12 克 大蜈蚣 2 条

焙蜂房 12 克 去延胡索 伸筋草 生苡仁

三诊：又服用上方 14 剂，肢节酸痛明显减轻，余症亦减。要求用膏方进行调治。因虑其脾胃薄弱，故再用上方加健脾和胃之品进行准备，后服膏方。处方：

川桂枝 90 克	炒白芍 120 克	紫丹参 120 克
肥知母 120 克	京赤芍 60 克	粉丹皮 60 克
川断肉 120 克	桑寄生 240 克	金毛狗脊 120 克
补骨脂 120 克	川杜仲 120 克	川红花 60 克
广郁金 120 克	太子参 150 克	炙黄芪 150 克
炒当归 120 克	桑葚子 120 克	淮牛膝 120 克
片姜黄 90 克	大蜈蚣 20 条	焙蜂房 120 克
净地龙 120 克	淡全蝎 30 克	泽兰叶 120 克
炙甲片 90 克	老虎杖 120 克	夏枯草 120 克
广陈皮 60 克	广木香 ^{后下} 30 克	石楠叶 120 克

左秦艽 120 克 青防风 60 克 福泽泻 120 克

上方浓煎三次,取汁去渣,另入紫河车粉 100 克、田七粉 100 克调匀,取鳖甲胶 150 克、阿胶 250 克、鹿角胶 100 克、冰糖 250 克烱化收膏,每日早晚各服一食匙,开水冲服。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=中医膏方

作者=

页数= 1 2 9

S S 号=

D X 号=

出版日期=

出版社=

第一章	中医膏方基本知识十问十答
	一、什么叫膏方？
	二、膏方的起源？
	三、膏方的适用对象？
	四、膏方服用季节？
	五、非冬令季节，可否服用膏方？
	六、膏方的制作？
	七、膏方的存放？
	八、膏方的服用方法？
	九、膏方服用期间的忌口？
	十、膏方服用不良反应防治方法？
第二章	中医膏方组成的方药
	第一节组方的原则
	第二节组方的特点
	第三节组方的内容
	一、君药——补益药物
	二、臣药——辅助和治疗药物
	三、佐药——辅佐药物
	四、使药——引经药物和调和药物
	五、收膏和矫味药物
	六、注意事项
第三章	古今医案膏方选
	第一节成品方
	一、清宁膏
	二、二冬膏
	三、夏枯草膏
	四、琼玉膏
	五、八仙膏
	六、滋荣养液膏
	七、伏龙肝膏
	八、十全大补膏
	九、人参大补膏
	十、稚儿膏
	十一、双龙补膏
	十二、健身长春膏
	十三、葆春膏
	十四、蛤蚧党参膏
	十五、桑葚子膏
	十六、杞圆膏
	十七、参枫膏

	十八、枇杷叶膏	
	十九、益母草膏	
	二十、噎膈膏	
	二十一、敛肺止血膏	
	二十二、复方甲亢膏	
第二节	医案方	
	一、王旭高（1 7 9 8～1 8 6 2）膏方医案	
	二、张聿青（1 8 4 4～1 9 0 5）膏方医案	
	三、丁甘仁（1 8 6 5～1 9 2 6）膏方医案	
	四、陈筱宝（1 8 7 2～1 9 7 3）膏方医案	
	五、祝味菊（1 8 8 4～1 9 5 1）膏方医案	
	六、秦伯未（1 9 0 1～1 9 7 0）膏方医案	
	七、程门雪（1 9 0 2～1 9 7 2）膏方医案	
	八、李聪甫膏方医案	
	九、胡建华膏方医案	
第四章	膏方调治法和案选	
第一节	调治前先服开路药	
第二节	调补膏方法选	
	一、补气养血法	
	二、温补肾阳法	
	三、滋养肝肾法	
	四、益气补阴法	
	五、补益心脾法	
	六、调理冲任法	
第三节	治疗膏方案选	
	一、慢性支气管炎	
	二、慢性咽炎	
	三、胃及十二指肠球部溃疡	
	四、胃肠道功能紊乱	
	五、胃病术后	
	六、慢性结肠炎	
	七、慢性肝炎	
	八、慢性乙型肝炎	
	九、早期肝硬化	
	十、室性早搏	
	十一、高血压	
	十二、冠心病	
	十三、高脂血症	
	十四、神经衰弱	
	十五、血管性头痛	
	十六、缺铁性贫血	
	十七、性功能障碍	
	十八、糖尿病	
	十九、甲状腺功能亢进症	

- 二十、尿路感染
- 二十一、隐匿性肾炎
- 二十二、肾病综合征
- 二十三、肾功能不全
- 二十四、慢性前列腺炎
- 二十五、月经前期紧张症
- 二十六、更年期综合征
- 二十七、颈椎病
- 二十八、类风湿关节炎