



# 中医膏方指南

汪文娟 庄燕鸿 陈保华 主编



第二军医大学出版社



上海市著名商标

# 雷氏有方 名医名药



ISBN 7-81060-348-5



9 787810 603485 >

ISBN 7-81060-348-5/R·262

定价：18.00 元

# 中医膏方指南

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 主 审 | 杨炳初 |     |     |     |
| 主 编 | 汪文娟 | 庄燕鸿 | 陈保华 |     |
| 副主编 | 董志颖 | 胡昌明 |     |     |
| 撰稿者 | 汪文娟 | 庄燕鸿 | 董志颖 | 钱尚统 |
|     | 沈 伟 | 孙 帆 | 胡昌明 | 谢金龙 |
|     | 施 毅 | 王海颖 | 陈 立 |     |

第二军医大学出版社



## 内容简介

膏方调补是具有中国传统特色、备受中老年人欢迎的养生保健方法之一。本书分为四个篇章:上篇为膏方服用问答;中篇为常见病证的辨证选方;下篇为市售膏方的产品介绍;附篇为膏方导航。本书适合广大中老年人阅读。

## 图书在版编目(CIP)数据

中医膏方指南/汪文娟,庄燕鸿,陈保华主编. —上海:第二军医大学出版社,2003.11

ISBN 7-81060-348-5

I.中... II.①汪...②庄...③陈... III.膏剂-方书-中国 IV.R289.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 095156 号

## 中医膏方指南

主编 汪文娟 庄燕鸿 陈保华

责任编辑 源泉

第二军医大学出版社出版发行

(上海翔殷路 818 号 邮政编码:200433)

全国各地新华书店经销

上海锦佳装璜印刷发展公司印刷

开本:850×1168 1/32 印张:10.75 字数:263千字

2003年11月第1版 2004年1月第2次印刷

印数:8 001~11 000

ISBN 7-81060-348-5/R·262

定价:18.00元



弘揚祖國醫藥

膏方助君健康

施杞



癸未年秋

# 前 言

中医学是我国劳动人民创造的历史最悠久、业绩最辉煌、对人类健康贡献最大的宝库。中医学在几千年的实践过程中创造了许多行之有效的养生保健、防病治病的方法,中医膏方就是其中之一。

为了弘扬中医药文化,发扬光大传统的中医膏方疗法,上海雷允上药业有限公司曾成功举办过两届“中医膏方节”,受到了广大老百姓的欢迎。但是有关中医膏方的知识老百姓还不甚了解,为此,以上海中医药大学为主体的中医学专家编写了《中医膏方指南》一书,以通俗的文字、科学的内容,向广大读者介绍有关膏方的知识。

本书分四个篇章:上篇为膏方服用问答,主要介绍膏方的一般知识与常识,包括适用人群、加工配制、合理保存、服用方法以及服用膏滋药后出现不良反应的处理方法等;中篇为常见病证的实用膏方,重点介绍八十余种病证的合理选方、辨证加减以及膏方的自行加工方法;下篇为市售膏方产品介绍,详细介绍五十余种市售膏方的药物组成、功效说明、应用指南、现代研究、用法用量以及使用注意,特别对这些膏方的正确选用作了具体介绍;附篇为膏方导航,介绍膏方加工配制的主要药房以及膏方门诊的主要医院。

本书不仅适合对中医膏方有进补需求的普通老百姓阅读,对从事医药行业的人员,尤其成品膏方的销售、膏方加工生产的人员的业务活动也具有一定的指导作用;对于从事中医临床的青年医生来说也是一本比较实用的参考书。

本书在编写过程中得到了上海市中医学会会长、上海市名老中医施杞教授和上海市第六人民医院杨炳初教授的指教,在此深表感谢。

由于作者编写时间十分仓促,水平有限,本书难免存在遗漏、缺点,甚至错误之处,敬请广大读者批评指正。

汪文娟

2003年10月于上海

# 目 录

## 上篇 膏方服用问答

|                        |      |
|------------------------|------|
| 何谓膏方.....              | (3)  |
| 膏方有何独特之处.....          | (3)  |
| 内服膏方有哪些类型.....         | (6)  |
| 膏方的由来.....             | (7)  |
| 膏方是由哪些部分所组成.....       | (7)  |
| 膏方中常用的胶有哪些 .....       | (10) |
| 制膏用胶时应该注意什么 .....      | (11) |
| 膏方中常用的糖有哪些 .....       | (13) |
| 糖尿病患者的膏方有哪些替代糖 .....   | (15) |
| 制膏用的糖为什么要进行炼制 .....    | (17) |
| 膏滋药是如何制作的 .....        | (19) |
| 膏滋药的质量检验标准是什么 .....    | (21) |
| 膏滋药出现“返砂”还能继续服用吗 ..... | (22) |
| 膏方加工的行业标准 .....        | (24) |
| 如何保存膏方 .....           | (25) |
| 服膏滋药为什么要先服“开路药” .....  | (27) |
| 怎样服膏方 .....            | (28) |
| 遇到哪些情况应暂时停服膏滋药 .....   | (28) |
| 服膏方期间能吃萝卜吗 .....       | (29) |
| 服膏方期间能喝咖啡吗 .....       | (30) |
| 服膏方期间能饮茶吗 .....        | (30) |
| 何谓忌口? 服膏方应注意哪些忌口 ..... | (30) |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 膏方是否最宜于冬季服 .....              | (31) |
| 膏方是否一年四季都可服 .....             | (32) |
| 服膏方是否“多多益善” .....             | (32) |
| 怎样区别膏方与药膳 .....               | (33) |
| 怎样区别膏方与保健食品 .....             | (35) |
| 怎样区别膏方与“补药” .....             | (37) |
| 怎样认识膏方与养生 .....               | (39) |
| 何谓辨证论治 .....                  | (40) |
| 服膏方为何要辨证施治 .....              | (40) |
| 何谓阳虚？阳虚患者服膏方可选用什么中药 .....     | (41) |
| 何谓阴虚？阴虚患者服膏方可选用什么中药 .....     | (41) |
| 何谓阴阳两虚？阴阳两虚患者服膏方可选用什么中药 ..... | (42) |
| 何谓阴虚阳亢？阴虚阳亢患者服膏方可选用什么中药 ..... | (43) |
| 何谓气虚？气虚患者服膏方可选用什么中药 .....     | (43) |
| 何谓气阴两虚？气阴两虚患者服膏方可选用什么中药 ..... | (44) |
| 何谓血虚？血虚患者服膏方可选用什么中药 .....     | (44) |
| 何谓气血两虚？气血两虚患者服膏方可选用什么中药 ..... | (45) |
| 何谓气滞？气滞患者服膏方可选用什么中药 .....     | (45) |
| 何谓血瘀？血瘀患者服膏方可选用什么中药 .....     | (46) |
| 何谓气逆？气逆患者服膏方可选用什么中药 .....     | (47) |
| 何谓气陷？气陷患者服膏方可选用什么中药 .....     | (47) |
| 何谓阳盛？阳盛患者服膏方可选用什么中药 .....     | (48) |
| 何谓阴盛？阴盛患者服膏方可选用什么中药 .....     | (48) |
| 何谓痰湿？痰湿患者服膏方可选用什么中药 .....     | (48) |
| 何谓“亚健康” .....                 | (49) |
| 亚健康状态者服膏方可以选用什么中药 .....       | (50) |
| 手术后能服膏方吗 .....                | (51) |
| 体力劳动者能服膏方吗 .....              | (51) |



|                     |      |
|---------------------|------|
| 脑力劳动者能服膏方吗 .....    | (52) |
| 更年期能服膏方吗 .....      | (53) |
| 产妇能服膏方吗 .....       | (53) |
| 孕妇能服膏方吗 .....       | (54) |
| 老年人能服膏方吗 .....      | (55) |
| 中年人能服膏方吗 .....      | (55) |
| 青少年能服膏方吗 .....      | (56) |
| 儿童能服膏方吗 .....       | (57) |
| 服膏方时出现便秘怎么办 .....   | (57) |
| 服膏方时出现食欲不振怎么办 ..... | (58) |
| 服膏方时出现胸闷腹胀怎么办 ..... | (59) |
| 服膏方时出现新病怎么办 .....   | (59) |
| 服膏方时出现咳嗽痰多怎么办 ..... | (60) |
| 服膏方时出现腹泻怎么办 .....   | (60) |
| 服膏方时出现感冒发热怎么办 ..... | (61) |
| 服膏方时出现皮肤瘙痒怎么办 ..... | (61) |

## 中篇 常见病证的辨证选方

|                       |      |
|-----------------------|------|
| <b>内科</b> .....       | (65) |
| <b>心脑血管系统疾病</b> ..... | (65) |
| 高血压病 .....            | (65) |
| 中风后遗症 .....           | (67) |
| 冠心病 .....             | (68) |
| 心肌炎后遗症 .....          | (71) |
| <b>呼吸系统疾病</b> .....   | (74) |
| 反复感冒 .....            | (74) |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 慢性支气管炎 .....          | (75)         |
| 哮喘(缓解期) .....         | (79)         |
| <b>消化系统疾病 .....</b>   | <b>(82)</b>  |
| 慢性胃痛 .....            | (82)         |
| 反流性食管炎 .....          | (85)         |
| 胃下垂 .....             | (87)         |
| 慢性腹泻 .....            | (88)         |
| 习惯性便秘 .....           | (90)         |
| 脂肪肝 .....             | (93)         |
| 慢性肝炎 .....            | (96)         |
| 肝硬化 .....             | (99)         |
| <b>泌尿系统疾病.....</b>    | <b>(102)</b> |
| 尿路结石.....             | (102)        |
| 尿路感染.....             | (104)        |
| 慢性肾炎.....             | (106)        |
| 肾病综合征.....            | (108)        |
| 老年性夜尿多.....           | (110)        |
| 老年性尿失禁.....           | (111)        |
| <b>内分泌代谢系统疾病.....</b> | <b>(113)</b> |
| 糖尿病.....              | (113)        |
| 肥胖症.....              | (115)        |
| 高脂血症.....             | (118)        |
| 痛风.....               | (121)        |
| 甲状腺功能亢进症.....         | (124)        |
| 甲状腺功能减退症.....         | (127)        |
| <b>血液系统疾病 .....</b>   | <b>(131)</b> |
| 贫血.....               | (131)        |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 血小板减少症·····         | (133) |
| <b>神经系统疾病</b> ····· | (136) |
| 头痛·····             | (136) |
| 失眠·····             | (138) |
| 梅核气·····            | (141) |
| 郁证·····             | (142) |
| 眩晕·····             | (145) |
| 记忆力减退·····          | (147) |
| 老年痴呆症·····          | (149) |
| 震颤症·····            | (153) |
| <b>其他内科疾病</b> ····· | (155) |
| 肿瘤放、化疗后 ·····       | (155) |
| 虚汗·····             | (157) |
| 早衰·····             | (159) |
| 体虚低热·····           | (160) |
| 干燥综合征·····          | (163) |
| <b>妇科</b> ·····     | (166) |
| 月经过多·····           | (166) |
| 闭经·····             | (168) |
| 痛经·····             | (170) |
| 习惯性流产·····          | (172) |
| 不孕症·····            | (174) |
| 白带·····             | (176) |
| 慢性盆腔炎·····          | (178) |
| 子宫肌瘤·····           | (181) |
| 产后体虚·····           | (183) |
| 更年期综合征·····         | (185) |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 乳腺小叶增生症·····       | (187) |
| <b>儿科</b> ·····    | (190) |
| 小儿食欲不佳·····        | (190) |
| 小儿久泻·····          | (192) |
| 小儿夏季热·····         | (195) |
| 小儿哮喘·····          | (197) |
| 小儿汗症·····          | (199) |
| 小儿遗尿·····          | (202) |
| 小儿多动症·····         | (204) |
| 儿童性早熟·····         | (206) |
| <b>男科</b> ·····    | (210) |
| 阳痿·····            | (210) |
| 遗精·····            | (215) |
| 男子不育症·····         | (219) |
| 男子更年期综合征·····      | (223) |
| 前列腺增生症·····        | (226) |
| <b>外科皮肤科</b> ····· | (231) |
| 痤疮·····            | (231) |
| 黄褐斑·····           | (233) |
| 脂溢性脱发·····         | (234) |
| 须发早白·····          | (236) |
| 老年性皮肤瘙痒·····       | (238) |
| 湿疹·····            | (239) |
| <b>伤骨科</b> ·····   | (242) |
| 骨折·····            | (242) |
| 骨质疏松症·····         | (244) |
| 足跟痛·····           | (246) |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 慢性腰痛·····       | (248)        |
| 慢性关节痛·····      | (249)        |
| <b>五官科·····</b> | <b>(252)</b> |
| □疮·····         | (252)        |
| □臭·····         | (253)        |
| 声音嘶哑·····       | (255)        |
| 牙齿松动·····       | (256)        |
| 过敏性鼻炎·····      | (258)        |
| 老年性耳鸣耳聋·····    | (260)        |
| 老年性视力减退·····    | (262)        |
| 眼底出血·····       | (264)        |

## 下篇 市售膏方产品介绍

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| <b>补气血阴阳类膏方·····</b> | <b>(269)</b> |
| 雷氏十全大补膏·····         | (269)        |
| 雷氏十八味人参补气膏·····      | (269)        |
| 八珍膏·····             | (270)        |
| 党参膏·····             | (271)        |
| 代参膏·····             | (272)        |
| 阿胶补血膏·····           | (272)        |
| 参龙养血膏·····           | (273)        |
| 两仪膏·····             | (274)        |
| 参鹿补膏·····            | (274)        |
| 龟鹿二仙膏·····           | (275)        |
| 葆春膏·····             | (276)        |
| 六味地黄膏·····           | (277)        |

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 右归膏.....            | (278)        |
| 滋润琼玉膏.....          | (279)        |
| 桑椹子膏.....           | (279)        |
| <b>补脏腑类膏方.....</b>  | <b>(280)</b> |
| 雷氏洞天长春膏.....        | (280)        |
| 健身长春膏.....          | (281)        |
| 虫草参芪膏.....          | (281)        |
| 归脾膏.....            | (282)        |
| 复脉膏.....            | (283)        |
| 黄芪膏.....            | (283)        |
| 参苓白术膏.....          | (284)        |
| 补中益气膏.....          | (284)        |
| 黄芪建中膏.....          | (285)        |
| 人参滋补膏.....          | (286)        |
| <b>安神类膏方.....</b>   | <b>(288)</b> |
| 益肾安神膏.....          | (288)        |
| 人参养荣膏.....          | (288)        |
| 杞圆膏.....            | (289)        |
| <b>乌发类膏方.....</b>   | <b>(291)</b> |
| 乌发膏.....            | (291)        |
| <b>清热类膏方.....</b>   | <b>(292)</b> |
| 夏枯草膏.....           | (292)        |
| 小败毒膏.....           | (292)        |
| <b>止咳化痰类膏方.....</b> | <b>(294)</b> |
| 宁嗽膏.....            | (294)        |
| 枇杷叶膏.....           | (294)        |
| 蛇胆川贝枇杷膏.....        | (295)        |

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 蜜炼川贝枇杷膏·····           | (295) |
| 养阴清肺膏·····             | (296) |
| 止嗽定喘膏·····             | (296) |
| 固本咳喘膏·····             | (297) |
| 虫草川贝止咳膏·····           | (297) |
| 参贝北瓜膏·····             | (298) |
| 贝母梨膏·····              | (299) |
| 二冬膏·····               | (299) |
| 雪梨膏·····               | (300) |
| <b>利咽类膏方</b> ·····     | (301) |
| 橄榄膏·····               | (301) |
| <b>消食类膏方</b> ·····     | (302) |
| 山楂膏·····               | (302) |
| <b>祛风湿类膏方</b> ·····    | (303) |
| 桑枝膏·····               | (303) |
| <b>固涩类膏方</b> ·····     | (304) |
| 金锁固精膏·····             | (304) |
| 金樱子膏·····              | (304) |
| 四神膏·····               | (305) |
| <b>调经类膏方</b> ·····     | (306) |
| 益母草膏·····              | (306) |
| 复方鸡血藤膏·····            | (306) |
| 肝郁调经膏·····             | (307) |
| <b>名医名药,雷氏有方</b> ····· | (309) |
| 扶正益肺膏·····             | (309) |
| 消斑悦容膏·····             | (309) |
| 减肥降脂通便膏·····           | (310) |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 养颜壮健膏·····      | (310) |
| 养心安神膏·····      | (311) |
| 补肾强身膏·····      | (312) |
| 养肝明目膏·····      | (312) |
| 补气养血膏·····      | (313) |
| 健脾开胃膏(小儿方)····· | (313) |
| 健脑益智膏(小儿方)····· | (314) |

## 附篇 膏方导航

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 上海市相关医院、药店简介 ····· | (317) |
|--------------------|-------|



上篇

膏方服用问答





## 何谓膏方

膏方,是指一类经特殊加工制作成膏状的中药制剂。膏剂是中医药中汤、丸、散、膏、丹五大剂型之一。通常情况下,医生根据患者的体质因素、疾病性质,按照君臣佐使原则,选择单味药或多味药配合组成方剂,并将方中的中药饮片经多次煎煮,滤汁去渣,加热浓缩,再加入某些辅料,如红糖、冰糖、蜂蜜等收膏而制成的一种比较稠厚的半流质或半固体的制剂,此类剂型容易贮藏,保存,而且便于长期服用。由于膏方具有药物浓度高,体积小,药性稳定,服用时无需煎煮,口味也好,便于携带等特点,因此历来颇受病家的青睐。

根据膏方加工中所用辅料的不同,膏方又有素膏和荤膏的区别。所谓素膏是指用砂糖或蜂蜜所收的膏剂;所谓荤膏则在素膏中再加入阿胶或龟版胶等动物胶而制成的膏剂。通常认为,膏方主要用于强身健体,延年益寿。其实,膏方自古以来也用于祛除病邪,消除疾病。因此,只要我们能正确地辨证选用膏方,就能达到防病治病,强身健体的目的。

膏方有内服和外用之别,但是本书主要介绍内服的膏方,外用膏方本书不作讨论。

## 膏方有何独特之处

膏方是中药传统剂型丸、散、膏、丹形式中的一类,虽然是药,但口味易被人们接受,疗效确切。而且膏方配方用料讲究,加工工艺独特,具有多方面的特点。

**整体观念,全面调理** 服用膏方与一般的药物治疗不同,膏方更注重全面的、整体的调理。有经验的中医师必定会对患者详细



询问、诊察，将望、闻、问、切四诊合参，综合既往病史和身体现状，辨证论治。在此基础上，立方遣药，少则二十余味，多则四十余味，君臣佐使，合理配伍，构成一剂全面考虑体内气血阴阳变化的调理处方，充分体现了中医整体调整的用药特色。

**辨病施治，针对性强** 疾病的发生、发展呈多种变化，而导致其转化的因素是多方面的，如气候转换、温度变化、环境变迁以及调理是否得当等。根据患者的体质和病情，医生通过诊断辨证，确立用药思路，开出能够充分考虑每一位患者个体特征的膏方。因此，临方膏滋药更适合患者的个性特点，针对性强。

**单料加工，便于吸收** 膏方的加工制作是采用传统的加工工艺，对不同的药料采用不同的处理方法和火候条件。

中药饮片是膏方中的药物部分，采用水煎煮提取的方法，煎出药汁后再进行浓缩。对一些特殊饮片有先煎、后下、包煎等不同处理要求，如利水通淋的车前子、补肾固精的菟丝子，入汤煎煮时都会有黏液质渗出，容易粘锅；活血祛瘀的生蒲黄、收涩止血的蒲黄炭，同为花粉类药蒲黄的不同炮制品，质地细腻轻浮，入糖煎煮时会分散而漂浮于水面。因此，像车前子、菟丝子、蒲黄之类的药物煎煮时就需要包煎。

此外，对于膏方中配伍的人参、西洋参、西红花、冬虫夏草等贵重药，不与群药同汤共煎，而是进行单独处理，用小锅另行煎取药汁。阿胶、鹿角胶等胶类药先用黄酒浸泡使其软化、再隔水加热炖至烊化，临收膏时再和入。河车粉、贝母粉、羚羊角粉、珍珠粉、琥珀粉等贵重细粉中药，无须额外加工，收膏时直接掺入，混合均匀。

因此，根据配伍组方中各种药料的特性，科学合理地加以提取和处理，可以达到充分表达药效的制剂效果，使得制成的膏滋与片剂、丸剂等中成药相比，具有药效浓度高、饮服后易于吸收的特点。

**无须煎煮，易存易携** 提取浓缩制成的膏滋，免去了一般中药汤剂的煎煮过程，服用时只需按时取出适量，用温开水冲服，因而



有即冲即饮、方便快捷的特点。同时,由于中药经提取浓缩后,大大缩小了药物的体积,膏滋能够盛放入有盖的器皿中,这样不仅可以方便取用,而且可以根据气候和环境温度的不同,适时冷藏,以免受到污染或发霉变质。

随着人们生活节奏的加快和生活、工作条件的改善,人们出差开会、休闲旅游或外出工作、居住等异地往返的现象会越来越频繁。更有不少港澳台同胞、外国友人对膏滋这一传统的中药剂型会情有独钟,慕名而来,为自己求得中医专家的一剂膏方。膏滋具有体积小、不易变形外溢的特点,所以不会受到出门在外的限制,而且便于保存、便于携带。

如有位日本前首相就很相信中国的膏方,曾慕名请当时正应邀出访日本的上海中医专家出诊号脉,为他度身定制的膏滋很快在上海加工制成……远渡重洋的膏滋被视若珍品,药效也得到了验证。凝聚着中医药的神奇,中国膏方在异国他乡扬名。

**药补兼顾,口味怡人** 一人一方的膏滋药具有扶羸补虚、治病祛邪的作用,既能“疗疾”,又能“补虚”。膏滋药的服用对象包括现代意义上的亚健康人群;大病后、或产后、手术后引起的气血不足、气血尚未复元之人;以及慢性疾病如老慢支、肺气肿、哮喘、脾胃不适等病症,妇女冲任不调、更年期综合征;老年人退行性病变所引起的各种病痛,以及儿童消化不良等等。以上情况无论出现于男、女、老、幼,都可以经过医生的诊治,服用特制的膏滋,往往会收到满意的效果。

此外,一般膏滋都辅以冰糖、饴糖、蜂蜜调制收膏,不加糖的膏滋药也适量地加入了矫味用的甜味剂,掩盖了中药的苦味,使得膏滋药在口感上,甘甜中有药香,易于被服用者所接受。

**药力缓和,稳定持久,四季咸宜** 膏方配伍中除了中药饮片外,参类、冬虫夏草等补益性中药,阿胶等胶类、糖等在配伍中占有相当的比例,使得膏滋药的药性较缓和,但药力更持久。一般情况



下,膏滋药每天服用 1~2 次,一料膏滋药往往能服用 30~50 天。有的患者一个冬季服两料膏滋,服用的时间更长。因此,亦疗亦补的膏方具有药力缓和、作用又比较稳定持久的特点。尤其一些慢性病患者、年老体虚之人,只要在医生的正确指导下,可以不受“冬令进补”的局限,四季皆宜,坚持数年,必然起到恢复元气、祛病延年的作用。

## 内服膏方有哪些类型

根据加工途径的不同,内服膏方分为“成方膏滋药”和“临方膏滋药”两类。

**“成方膏滋”药** 是选用一些疗效确切的膏方方剂,由药厂成批生产加工成膏滋,作为中成药商品在药店进行销售。这些膏方的组成内容比较简单,制成膏滋药后,提供大家对症选用,如益母草膏、二仙膏。

**“临方膏滋”药** 是医生针对患者身体状况进行辨证处方,做到一人一方,由药店或医院药房定制加工制成膏滋,每一剂膏方只适合该方患者本人服用。临方膏滋又称“定制膏方”。

加工定制膏方是中药房、中药店遵照《中药炮制规范》按方配药的工作内容之一,按照“一人一方”的加工原则,与中药丸、散等制剂加工相同,称为“临方制剂”。

由于临方膏滋药具有因人而异、随证处方的特点,就更加具有针对性。此外,所制成的膏滋药还可以列出“糖膏”、“蜜膏”、“荤膏”、“素膏”等不同品种的分类。其中加入糖收膏的称为“糖膏”,加入蜂蜜而不用糖的称为“蜜膏”;“荤膏”则是膏方配伍中选用了阿胶、龟版胶、鳖甲胶、鹿角胶等动物类来源的胶;不用阿胶等上述动物类胶制成的膏滋称为“素膏”。

## 膏方的由来

翻开浩如烟海的古医籍中,膏方的运用可谓源远流长。我国现存最早的医方书——长沙马王堆西汉古墓考古发现的帛书《五十二病方》中就有膏方的记载。

东汉时代的《神农本草经》为我国第一部药学专著,书中强调中药加工要根据药物性质和治疗需要选择合适的剂型,“药性有宜丸者,宜散者,宜水煎者,宜酒渍者,宜煎膏者,亦有一物兼宜者,亦有不可入汤酒者,并随药性,不得违越”,其中有“煎膏”的论述;《黄帝内经·灵枢篇》中,对痈疽有这样的描述:“发于腋下,赤坚者曰米疽……不砭者,涂以互膏”。可见在汉代,甚至汉代以前,我国古代医药家已经有外用膏剂和内服煎膏的不同应用范例。

## 膏方是由哪些部分所组成

膏方一般有中药饮片、细料药、胶类、糖类、及辅料五部分内容组成。

**中药饮片** 中药饮片是膏方的主体部分,是医生通过望、闻、问、切的详细辨证分析后,根据患者体质的不同与病情的需要,所给出处方中的药物部分。

体质有阴虚、阳虚、气虚、血虚以及五脏六腑的虚损,医生按照君臣佐使的配伍原则,合理选用配伍所需的中药炮制品组成方剂,以此有针对性地体现膏方调补身体,防治疾病的效力所在。如脉弱无力、神疲倦怠、动则气喘、饮食无味者,多为气虚体质,宜选用黄芪、党参、太子参、茯苓、白术等组成的方药;脉细无力、面色㿔白、头晕健忘、失眠少神者,多为血虚体质,宜选用熟地黄、当归、白芍药等组成的方药;形体瘦削、口干咽燥、渴欲饮水、潮热盗汗者,



多为阴虚体质,宜选用麦门冬、沙参、枸杞子等组成的方药;畏寒肢冷、自汗盗汗、尿频遗尿、腹中冷痛现象者,多为阳虚体质,宜选用杜仲、蛤蚧、核桃仁等组成的方药。

膏方中的中药配伍组成是一个大方剂,由于要综合考虑到处方既“疗疾”又“补虚”的双重性,因此膏方的中药药味要比通常的处方药味品种多,且药物剂量要能够满足一料膏滋药服用时间(30~50天)的剂量。通常情况下,一剂膏方的中药部分其总量应控制在3kg左右,至多不超过5kg。配伍时应避免药味不足,使功效难求;或盲目追求处方大而全,使品种过多、药味超量,造成矢不中的、浪费中药等现象。

**细料药** “细料药”是一些参茸类和其他贵重药物的统称,又称“细贵药材”,是处方中体现膏方补益虚损功效的重要组成部分。细料药的品种来源主要有以下几个方面:

人参类:如生晒参、西洋参、红参、朝鲜参等。

贵重的动物药:如羚羊角粉、鹿茸片、海马、海龙、紫河车粉、坎炆、蛤蚧粉、珍珠粉、猴枣散等。

贵重的矿物药:飞琥珀(琥珀细粉,是古代松科松属植物埋藏地下经年久转化而成或从煤中选出的化石状物质,归属矿物类)等。

贵重的植物药:如西红花、川贝粉、三七粉、枫斗等。

贵重的菌藻类药:如冬虫夏草、灵芝、灵芝孢子粉等。

药食两用的补益药:如黑芝麻、胡桃仁、枣泥、龙眼肉等。

此外,其他一些特殊来源的中药如鲜竹沥、青黛等也可单列处理。

在加工时,大部分细料药可以在收膏时直接加入。一些需要煎煮的细料药不能与一般饮片入汤共煎,否则用量较少的细料药所煎出的有效成分极易被数量众多的饮片药渣吸去,而有损补益之效;应该采用另炖、另煎、烊冲、兑入等方式单独处理,以达到物





尽其用、充分表达功效的目的。膏方中细料药的配伍并非多多益善,而是随需而择,切勿多用滥用。

**胶类** 阿胶、龟版胶、鳖甲胶、鹿角胶等胶类中药是膏滋加工中常用的药胶,在膏方配伍中这些胶不仅是补益虚损的重要组成部分,而且有助于膏滋制剂的固定成形。

各种胶在膏方中的配伍和应用,应掌握各自不同的功效特点,按照体质条件,辨证选用。一剂膏方胶的配伍量一般为 200~400 g,可以一胶单用,也可以视需要按一定比例数胶合用。一些低糖或不加糖的膏方,可适当增加胶的配伍量,总量增至 400~600 g,以保证中药收膏成形的效果。

**糖类** 冰糖、白糖、红糖、饴糖、蜂蜜是膏滋加工中常用的各种糖,膏方中配伍糖不仅能掩盖药物的苦味,使膏滋便于服用,而且糖也有一定的补益作用。同时,糖与药胶同样能够有助于膏滋制剂的固定成形。

上述各种糖在品质和功效上略有差异,应根据辨证需要,在膏方配伍时单用糖或者单用蜂蜜,或视需要糖与蜂蜜并用。一剂膏方中,糖的用量一般为 0.5 kg。

各种糖在膏方制作前,应按照糖的种类和质量加适量的水炼制。炼糖的目的在于使糖的晶粒熔融,去除水分,净化杂质,并杀死微生物;同时,炼糖时使糖出现部分转化,适宜的糖转化率可防止膏滋久贮易出现的“返砂”现象。

对于一些低糖摄入的特殊人群,主要是糖尿病患者,处方时可选择一些低热量的甜味剂。市售常见的有元贞糖等糖尿病用糖,以及在辅料试剂商店中销售的甜菊糖、木糖醇、阿斯巴甜等天然物提取制剂或人工合成的甜味剂。甜味剂的加入,可以增加膏滋的甜味,但不会提高血糖水平。在膏滋加工时适量加入甜味剂替代部分蔗糖,或替代全部蔗糖,以达到矫味的效果。但是,此类甜味剂的添加,必须严格按照产品使用说明,按量取用,不得随意超量,



以免产生副作用。

**其他辅料** 黄酒是膏滋加工中必备的辅料,用于浸泡阿胶等动物类药胶。黄酒是中药炮制加工中常用的一种辅料,黄酒的性味甘、辛、大热,具有活血通络、散寒、矫味、矫臭的功效,而且黄酒又是良好的有机溶剂,因此,用黄酒浸泡药胶不仅可以解除各种药胶的腥膻气味,而且可以加强药物在体内的运化吸收作用。在收膏之前,可以预先将加工所需的药胶用黄酒浸泡一定时间使胶软化,再隔水加热将胶炖烊,然后趁热和入药汁中共同收膏。

制作膏滋药所用的黄酒应是质量上乘的绍兴酒,俗称“老酒”。黄酒的一般用量为:每 0.5 kg 胶剂用 250~500 g 黄酒浸泡。

## 膏方中常用的胶有哪些

传统的膏方在配伍和加工时加入阿胶、龟版胶、鳖甲胶、鹿角胶等胶类中药,是膏方的用药特色,也是膏滋药有别于其他中成药制剂的一大特点。这些胶类中药不仅在制剂加工时有助于收膏成形,使药汁变稠,而且具有很好的药物功效。除了一些特殊处方外,胶是膏方配伍中必不可少的一个组成部分。

**阿胶** 为马科动物驴的皮去毛后经过熬制而成的胶块,因主产于山东阿县(今山东东平县),且以当地阿井之水煮胶而得名。阿胶性味甘、平。具有补血、止血、滋阴、润燥的功效,主要用于血虚、阴虚和慢性出血等症。

研究表明,阿胶水解可产生多种氨基酸,并含有钾、钠、钙、镁等常量元素和铁、锌等多种微量元素。阿胶有促进造血功能的作用和抗辐射损伤的作用;能提高机体的免疫功能;有耐缺氧、耐寒冷、抗疲劳的作用,并有明显的止血作用。

脾胃虚弱、消化不良者要慎用。

**龟版胶** 是龟科动物乌龟的甲壳(即中药龟版)熬煮成的固体



胶块。龟版胶性味甘咸、平。具有滋阴养血,益肾健骨的功效,主要用于阴虚血亏,骨蒸潮热,吐血,鼻出血,烦热惊悸,肾虚腰痛,崩漏,带下等症。

研究表明,龟版胶含有谷氨酸、胱氨酸等 18 种氨基酸,另含钾、钙、镁、锌等十多种常量元素和微量元素。龟版胶能提高人体细胞免疫和体液免疫的功能,明显延缓细胞的衰老;实验研究还表明,龟版胶能有效降低甲亢型动物的甲状腺功能。

脾胃虚寒、食少便溏者忌用。

**鳖甲胶** 是鳖科动物中华鳖的背甲煎熬取汁、浓缩冷凝而成的胶块。鳖甲性味咸、平。具有滋阴潜阳,软坚散结的功效,主要用于阴虚潮热,癥瘕积聚等症。

研究表明,鳖甲胶含有苏氨酸、丙氨酸等 17 种氨基酸,另含钠、钙、锰、锌等十多种微量元素。鳖甲胶有补血作用,能明显增加血红蛋白的含量;能抑制肿瘤细胞的生长,副作用很小。

脾胃虚寒,食少便溏者忌用。

**鹿角胶** 是鹿科动物梅花鹿或马鹿的角煎熬所得胶液经浓缩、冷凝后制成的胶块。鹿角胶性味咸、温。具有温补肝肾,益精养血的功效,主要用于肾气不足,虚劳羸瘦,腰痛,阳痿,滑精以及妇女子宫虚冷、崩漏、带下等症。

研究表明,鹿角胶含有多种氨基酸。药理实验研究表明,鹿角胶有强心作用,能明显增加心脏的搏出量。

阴虚火旺、潮热盗汗者忌用;阴虚阳亢,颧红烘热,头痛头胀者忌用。

### 制膏用胶时应该注意什么

膏方中常配伍一些胶类中药,除了阿胶外,还常用龟版胶、鳖甲胶、鹿角胶等种类。在膏方配伍时要根据不同品种的功效特点,



合理选用。而在制剂加工时,要熟悉各种胶的原料特性,掌握火候,正确加工。

**掌握性状特性** 膏方中常用的这些胶都具有热融冷凝的特点,与这些胶本身的材料来源和制备工艺有关。阿胶是取材于动物驴的皮,龟版胶、鳖甲胶分别是取材于动物龟的腹甲和鳖的背甲,鹿角胶则是取材于动物鹿骨化的角。这些来源于动物的特殊原料,经过传统工艺的加工,都能提取得到浓稠的胶质,营养极其丰富,主要成分均为动物胶原蛋白及其水解产物,且含有多种常量和微量元素。

加工膏滋时,受热烱化的胶与药汁、糖液相溶,冷却后胶和药汁、糖等物料已浑然一体、不分彼此,凝结成半固体状态,因此有助于膏滋制剂的固定成形。由于这些胶具有热融冷凝的性状特性,在加工时要把握好时间,预先将配伍所用的胶类用黄酒浸泡软化、隔水炖烱,备用。在和入药汁之前,所用的胶应处于热融状态,而且充分烱化、不使其出现未融的胶块。

 **掌握功效特性** 由于各类胶的原料取材不同,因此功效也不尽相同。各类胶在膏方中的配伍和应用,应根据其不同的功效特点,合理选用。选用得当,所用胶的功效能与处方中的方剂配伍功效一致,起协同作用;反之,则适得其反,直接影响到膏方的临床疗效,有的甚至服用后不能起到应有的调理作用。特别是临方膏滋,并非各种胶用得越多越好,不必面面俱到,应该严格按照体质条件,辨证选胶。

对于有些患者,根据辨证的结果,宜清淡少补,不能服用黏腻滋补的胶类中药,因此,在膏方配伍中就没有必要使用上述各种胶,以免妨碍整个膏方的服用效果。

**掌握配伍用量** 胶类中药药性黏腻,容易呆胃,所以在配伍时用量要适中,切莫将数种药胶任意叠加多用,否则不仅会喧宾夺主、削弱药力,甚至因过于滋腻碍脾而影响服膏者的正常饮食。特

别对于脾胃虚弱、消化不良的患者来说更不能随意滥用。

一料膏方中上述药胶的配伍总量一般为 200~400 g,临床以阿胶单用最为多见,也可以根据配伍需要,分别选用龟版胶、鳖甲胶、鹿角胶;或者在使用阿胶的同时,按一定比例酌量合用龟版胶、鳖甲胶、鹿角胶中的一种或两种,以求功效互补,协同奏效。

对于糖尿病患者或低糖服用者来说,由于膏方中不加糖,为了保证中药收膏成形的效果,这类膏方中可适当增加药胶的配伍量,药胶总量可增至 400~600 g。

**慎用桃胶** 桃胶是蔷薇科植物桃树或山桃树等树皮中分泌出来的树脂,性味甘苦、平、无毒。临床多用于石淋、血淋、痢疾等症的治疗。

以往有的医生因不谙熟桃胶特性,以为桃胶可以像阿胶等药胶一样,也能用于收膏;或者以为桃胶可以作为糖尿病膏方中糖的替代品,而误将桃胶开列在膏方中。

从桃胶的来源和临床应用可以知道,桃胶不具有阿胶等动物类药胶制剂所特有的胶原蛋白的特性,中医临床一般根据其功效用于汤剂配伍,或入丸、散剂中。因此,桃胶除了中药组方配伍需要而入药外,膏方配伍中不能用桃胶替代动物类药胶,也不能用桃胶替代糖用于收膏。



### 膏方中常用的糖有哪些

膏滋药中糖类或蜂蜜的添加,不仅能掩盖药物中的苦味等不适气味,使膏滋便于服用,而且还因为加糖后的膏体稠厚、药物浓度高,使膏滋药在冬季或适宜的温度环境下稳定性好,不易变质。

适用于膏滋药加工的糖有多种类型,不同类型的糖因品质不同,所制得的膏滋药在质量和功效上略有差别。

**冰糖** 冰糖是用白砂糖加工而成的结晶,形状似冰块而得名,

质量要优于白砂糖。冰糖性味甘、平,无毒。具有补中益气,和胃润肺的功效。

**白糖** 白糖可以分白砂糖和绵白糖两种,其中绵白糖含有部分果糖成分,味比白砂糖要甜些,但有一定的吸湿性。白糖性味甘、平。具有润肺生津,养胃和中,舒缓肝气的功效。

**红糖** 红糖是一种没有经过提纯处理的糖,又称红砂糖或黄糖。红糖中钙、铁等元素的含量是白糖的 3 倍,尚含有维生素 A、维生素 B<sub>1</sub>、维生素 B<sub>2</sub> 等多种维生素和锰、锌等一些微量元素。因此,红糖的营养价值相对白糖要高。红糖具有补血、破瘀、疏肝、驱寒等功效,民间多用于产妇、儿童及贫血患者食用,作为营养补充和辅助治疗。

**饴糖** 饴糖是一种呈稠厚液体状态的糖,又称“麦芽糖”。是由米、大麦、小麦、粟米等粮食经麦芽作为催化剂使得淀粉产生水解、转化、浓缩后而制得的糖。饴糖性味甘、温。具有缓中,补虚,生津,润燥的功效。

**蜂蜜** 蜂蜜是蜜蜂采集花粉酿制而成,其质量会因蜜蜂的品种、花源、地理环境等的不同而有差异。蜂蜜中占 70% 比例的成分是果糖和葡萄糖,另含有少量的蔗糖、麦芽糖、有机酸、多种维生素、酶类、多种矿物质等丰富的营养成分。蜂蜜生则性凉,熟则性温,生蜜一般需要经过加热炼制成熟蜜方可使用。熟蜜又称“炼蜜”,是将生蜜加适量水煮沸,滤过,去沫及杂质,经适当加热浓缩而成。炼蜜药性甘而平和,气味香甜,具有补中润燥的功效。

由于各种糖在有水分存在时都会出现不同程度的发酵变质的特性,其中尤其以饴糖最为明显。因此,用于收膏的糖除了蜂蜜以外,其他的糖在制备膏方前都应加以炼制。

膏方中糖的配伍用量是有一定比例的,一般不超过中药提取浓缩所获得清膏量的 3 倍。通常情况下,一料膏滋药可用 0.5 kg 的红糖或者用 0.5 kg 的冰糖收膏,若单用蜂蜜或饴糖收膏其用量



也分别控制在 0.5 kg 左右。实际使用中,医生处方用红糖或冰糖收膏的同时,往往根据患者的个体情况,再选用 200~300 g 饴糖或蜂蜜与其合用,以期与中药功效相得益彰。

### 糖尿病患者的膏方有哪些替代糖

遇到糖尿病患者或一些不愿多摄入糖分的膏滋药服用者,医生处方时可选择一些低热量的甜味剂。这些甜味剂能够提供甜味,但不会提高血糖水平。适量添加可以增加膏滋药的甜味,改善服用时的口感。

从增加甜味的意义上来说,糖尿病患者服用的膏滋药,一般不能使用冰糖、饴糖或蜂蜜等糖类进行浓缩收膏。但是为了改善服用时的苦味,可以用元贞糖、甜菊糖、木糖醇、阿斯巴甜等甜味剂替代蔗糖,以达到矫味的效果。

**甜菊糖** 甜菊糖的主要成分是甜菊糖苷,外观为白色粉末或结晶体,甜度为蔗糖的 200~300 倍,热量为蔗糖的 1/300。作为一种新型糖源,经研究表明甜菊糖无毒副作用,是一种稳定性好、易溶于水,且成本低廉的代糖品,目前已广泛应用于各类食品、饮料、药品等产品的生产加工。由于中药本身多数有不同程度的苦味,甜菊糖苷的甘草味容易溶入药汁中,与药物的苦味融合在一起,起到矫味的作用。

**木糖醇** 外观呈白色结晶粉末状,味甜,无臭,易溶于水。目前工业生产的木糖醇是利用农业植物废料玉米芯、稻壳、甘蔗渣等物质经提取加工而成。在自然界中木糖醇也广泛存在于一些植物中,尤其在蔬菜、水果、天然蘑菇等食用菌中含量丰富。经研究表明,木糖醇具有特殊的生化性能,是人体糖类代谢的中间体,即使在人体缺少胰岛素影响糖代谢的情况下,无须胰岛素的促进,木糖醇也能直接透过细胞膜参与糖代谢而不增加血糖浓度,并能促进



肝糖原合成,改善肝功能。临床尚作为营养药,能补充热量,改善糖代谢,可用作糖尿病患者糖的代用品。

**阿斯巴甜** 俗称“甜味素”。外观呈白色结晶粉末状,是由 L-天门冬氨酸和 L-苯丙氨酸组合成的二肽化合物,这两种氨基酸和我们日常食物如肉类、蔬菜、乳类食品中所含的蛋白质成分一样。阿斯巴甜的甜味与蔗糖相似,无臭,并有清凉感,且无苦味。其甜度是蔗糖的 160~200 倍,热量为蔗糖的 1/200。

**元贞糖** 元贞糖是以麦芽糊精、阿斯巴甜、甜菊糖、罗汉果糖、甘草提取物等配制成的食用糖,其甜度相当于蔗糖的 10 倍,而热量仅为蔗糖的 8%。由于元贞糖在一般食品商店都有销售,故是一种为广大消费者所熟知的低热量代糖品。

**甜蜜素** 为白色针状结晶,性质稳定、易溶于水。经研究表明其无毒性,甜度为蔗糖的 40~50 倍。在添加使用中,如果甜蜜素与蔗糖一起配合使用,甜度可达到蔗糖的 80 倍以上;若甜蜜素与蔗糖以及 0.3% 重量的柠檬酸配合使用,甜度可达蔗糖的 100 倍以上。

**糖精** 糖精是最古老的甜味剂,甜度是蔗糖的 500 倍,但是稍有多食便会产生苦味。临床研究表明,糖精对人体致癌的可能性尚未完全排除,应避免一次大量使用或长期应用。发达国家已经禁用糖精,婴儿、孕妇食品中也已禁止使用糖精。

随着人们对科学、健康饮食的重视,饮食的低热量、低糖化越来越成为普遍的要求。特别是我国目前糖尿病、肥胖、心血管病的发病人数增加较快,人们也愈加意识到饮食用药中要注意忌糖或少食糖。

值得注意的是,我国对食品中甜味剂的添加有严格的标准和要求,如国家标准《食品添加剂使用卫生标准》规定腌酱菜中甜蜜素不得超过 0.65 g/kg。

有专家经研究指出,人类长期食用的蔗糖是人类不可缺少的





营养素,任何人工合成的甜味剂并不能取代蔗糖的作用。过多食用木糖醇有升高血中三酰甘油的可能性,同时可能引起腹泻,所以应该慎用。由此可见,膏滋药加工过程中各类甜味剂要慎用,用什么样的甜味剂,添加的比例大小、多少为宜,应当严格按照产品使用说明,由药师严格把关,正确适度使用,不得随意滥用。

### 制膏用的糖为什么要进行炼制

糖的炼制就是按照糖的不同种类加适量水或不加水加热熬炼的过程,炼制过的糖称炼糖或转化糖。

冰糖、饴糖、蜂蜜,这些膏方配伍中常用的糖都是营养物质,各种糖在有水分存在时,往往有不同程度的发酵、变质的特性。同时,如果糖在膏滋药加工过程中处理不当,会使膏滋药在存放一定时间后,析出糖的晶体,出现“返砂”现象。因此,在进行膏滋药加工中,必须对糖进行炼制。

炼糖可以使冰糖、砂糖、红糖等固体糖加热融化成均匀的糖浆,便于在收膏时,使糖、药汁、胶等物料稍加搅拌就能很快混合均匀。

炼糖还可以使糖适度转化,使膏滋药避免出现“返砂”的现象。“糖转化”就是蔗糖在加热、特别是在有酸的情况下加热,容易水解转化为葡萄糖和果糖的过程;葡萄糖和果糖的混合物称为“转化糖”。一定浓度的转化糖能防止蔗糖在低温状态下析出结晶,而且,转化糖具有还原性,可以延缓某些药物成分发生氧化而变质。

为了促使糖的适度转化,可以加入适量的枸橼酸或酒石酸(加入量为糖量的0.1%~0.3%),待糖转化率达40%~50%时,放冷至70℃左右,加适量碳酸氢钠中和酸,炼糖备用。实际加工时,糖加热熔化后,根据糖的用量,参照上述比例,酌量加入枸橼酸或酒石酸,并掌握加热炼制的时间,要避免加热时间过久造成糖烧焦。



糖经过加热炼制,还能控制糖的水分含量,有效除去杂质并杀死微生物。

炼糖的方法一般是按照糖的种类不同加适量的水加热熬炼。其中,冰糖本身含水分较少,应在开始炼制时加适量水,以免熬焦,且炼制时间要短;饴糖含水量较多,炼制时可不必加水,但炼制时间稍长;白砂糖可加水近 50%,加热熬炼或用高压蒸汽加热。各种糖在加热炼制时,均应不断搅拌至糖液开始显金黄色,所泛泡发亮光,糖液微有青烟产生时即停止加热。此外,由于红糖含杂质较多,炼制后的红糖应静置适当时间,除去容器底部的沉淀。

蜂蜜使用前也要进行炼制,炼蜜就是对蜂蜜进行加热熬炼的加工过程。蜜蜂采花所酿之蜜称为“生蜜”,生蜜含有较多的水分,并且混有死蜂、蜡质、树叶等杂质,蜂蜜炼制时加入适量沸水,或蜂蜜加水煮沸,煮至微沸后,用 3~4 号筛网滤除杂质,滤液继续加热,并不断捞去浮沫、搅拌,至需要的程度。

炼蜜根据水分含量和炼制程度不同分为嫩蜜、中蜜、老蜜三种规格。用于膏滋制作的蜂蜜,一般取中蜜。当过滤后的蜂蜜继续加热至出现浅黄色有光泽的均匀气泡状,实际生产中把这种沸腾泛泡的现象又俗称“泛鱼眼泡”,用手捻蜜时有黏性,两手分开时无白丝出现,炼蜜即成。经测定,炼蜜(中蜜)的含水量在 14%~16%,密度为  $1.37 \text{ kg/m}^3$  左右。

经过炼制的蜂蜜,不仅可除去杂质,破坏酶类,避免发酵,而且控制水分含量,增加黏合力,并能杀死微生物。

市售的成品蜂蜜一般可直接和入药汁中用于收膏,但在选用时应注意,有些出售的蜂蜜已经出现“返砂”现象,装蜜的玻璃瓶底部有砂糖状结晶析出,遇到这样的情况,应对此蜂蜜在临用前重新加热炼制。



## 膏滋药是如何制作的

一经医生开具处方后,患者即可将其及时地交付有代客加工膏方资质的医院药房或社会药房进行加工。经过审方、核价、付费等程序后,顾客只要按照登记预约的时间,按期取货。而膏滋药的加工制作从排单、配料、物料校对、直至制作,则必须严格按照规定的程序进行。在对物料做好必要的准备工作以后,膏滋药的制作有煎煮、浓缩、收膏、盛装等过程。

**物料的准备** 在药物煎煮之前,必须对该剂膏方的配料按照一般饮片、细料药、胶、糖的不同逐一分类,根据各物料的不同加工要求,分类处理。

除一般饮片外,配方中出现的细料药应根据药物的特性,单独处理,或另煎、另炖,或直接和入收膏的药汁中。

人参类、枫斗、海马、海龙、鹿茸片、冬虫夏草、西红花等应单用小锅另炖、另煎3次,最后压榨取汁,合并煎汁、过滤,适当浓缩,备用,待收膏时直接兑入浓缩的药液中。

琥珀粉、羚羊角粉、紫河车粉、坎炆、蛤蚧粉、珍珠粉、猴枣散、川贝粉、三七粉、灵芝孢子粉、青黛等细粉状药料,以及呈液体状态的鲜竹沥,应在收膏接近完成前,随搅随加,徐徐倾入药汁中,与药汁充分混匀。

黑芝麻、胡桃仁、枣泥、龙眼肉是药食两用的补益药:可分别将黑芝麻、胡桃仁炒香碾碎;红枣煮熟后去皮、去核碾成泥状;龙眼肉略洗、去除杂质。上述物料均在收膏行将完成时,加入药汁中,搅拌均匀,直至成膏。

阿胶等应事先用黄酒浸泡至软,而后隔水炖烊,备用;同样,糖或蜂蜜应根据不同种类的特点,事先进行炼制,备用。

**煎煮** 将方中中药饮片用清水隔夜浸泡、或浸泡1小时以上;



每料药煎煮 2~3 次,第一煎水沸后 2 小时左右滤取煎液,第二煎水沸后 1 小时以上滤取煎液,第三煎半小时以上滤取煎液,最后对药渣还须压榨取出余汁。对每次煎液都用 24~40 目筛网过滤,并静置使沉淀,合并上清液,再用 80~100 目筛网过滤。

这个加工过程是对膏方配伍中体积最大的一个部分——中药饮片提取药效的过程,所加的水量要根据中药体积来定,干的饮片经过一段时间浸泡后会吸收较多的水分,体积也有所膨胀。煎煮前要再次检查一下煎药锅中水的余量,添加适量的水,使药材中的水经过一个多小时的煎煮仍容易滤出,水不至于煮干,保证药效充分煎出。如果水量少,虽然煎煮后滤出的药汁会很浓,但大部分已经溶出的药效成分仍被药渣吸附,不能随水溶出,影响煎药效果。但水量也不能太多,否则滤出的药汁淡且体积大,给下一步浓缩带来困难。

**浓缩** 将上述滤液倾入干净的锅内煎煮浓缩,水沸后,用勺不断捞去浮沫;药汁经浓缩去除大部分水分后,兑入细料药(如人参等)的煎液,继续加热浓缩至稠厚状,即得“清膏”。

在浓缩过程中随着水分的减少,药汁也越来越浓稠,越是浓的药汁越容易溢出,溢出部分就无法收回,药汁损失,势必影响膏方的药效。因此,当药汁渐浓时就要注意调整火力,火不能太旺,避免药汁溢至锅外。

**收膏** 于上述清膏中加入配方中规定的糖和胶类,糖和胶类都经事先加热炼制或烊化,临用时,趁热和入,同时,要适当调节火力,并继续加热,充分搅拌,以免粘底起焦。在收膏行将完成时,兑入细粉药(如川贝粉等)以及其他已加工备用的物料(如芝麻、核桃仁等),边加边搅,混合均匀,直至成膏。

即将成膏时,除了以药汁在棒(铲)上挂旗或“滴水成珠”等现象作为判断依据外,又常将正在加热的膏体呈“蜂窝状”沸腾的状态描述为“翻云头”,此时可熄火停止加热,膏滋药即制成。



药店或药房加工膏滋药的传统工具是很有特色的,熬膏的锅是采用铜质特制的圆底敞口锅,传热快,水分易于蒸发,且所煎煮、熬炼的药味中的成分不易与铜质锅身发生化学反应。收膏过程中不断用平头木棒(铲)加以搅拌,加速水分挥发,避免药汁熬焦、粘锅。

**盛装** 煎成的膏滋应趁热转入容器中盛装。盛器可选用大口容器,以利于服时取用方便;容器以大小适中的搪瓷锅、陶瓷罐、大口瓶等为宜,并经事先清洗、烘干消毒灭菌后放凉备用,以免日后膏滋生霉、变质。

需要提醒的是,刚放入膏滋药的盛器不可以马上加盖。应贴上标识后,转至凉膏间;凉膏间的温度应保持在 20℃ 以下,并有紫外线消毒装置。已经装膏的盛器应充分放凉后再加盖,切莫心急,过早给还热着的盛器盖上盖。否则,热的膏中继续蒸发出的水蒸气在锅盖上冷凝后又回入膏中,时间久后,不能在短时间服完的膏滋药极易产生霉变现象。

如果可能的话,请医生根据自己的体质和病情辨证处方后,到药店将膏方的药料配齐,并且在自身身体状况允许的条件下,也可以参照上述制备方法,在家中自己制作膏滋药。



## 膏滋药的质量检验标准是什么

膏滋药的外观质量是很直观的,通过目测、鼻闻就能作出直接的判断。加工道地、质量上乘的膏滋药应该膏体细腻,黑润而有光泽,有药物的清香味,而且膏体稠厚适中、呈半固体状。因而,传统加工后常以“色黑如漆”、“光亮如镜”等形象化术语加以描述。只要存放得当,膏滋药不会出现表面长霉和产生异味的现象。

《上海市中药行业定制膏方加工管理办法》对加工完成的膏滋药规定了“外观质量”和“不溶物检查”两项质量检验要求。

**外观质量检验** 要求成品膏滋药应无糖的结晶析出现象,也就是通常所说的“返砂”现象,且膏滋药的气味应无焦臭味、异味。

**内在质量检验** 要求对成品膏滋药进行“不溶物检查”。此项检查的操作方法是:取成品 5 ml 至容器内,加入热水 200 ml,搅拌使膏体溶解,放置 3 分钟后观察,容器内不得有焦块、药渣等异物。对于制作中添加粉状药料的膏滋药,此项检查应在药粉加入前进行,经检验符合上述规定后方可加入药粉,加入药粉后的膏滋药不再检查不溶物。

在膏滋药的加工制作过程中,药物煎煮所得的每一次汤水都应经过 24~40 目筛网过滤;混合后的汤水在浓缩前需经沉淀、取上清液用 80~100 目筛网过滤后,方可煎煮浓缩;另煎的细料药的汁水和加入的各种辅料、胶料等加热搅拌至充分烊化后,也必须用 80~100 目筛网过滤再行煎煮收膏。经过上述操作,正常情况下是不会出现“不溶物”的。

收膏时判断膏体是否达到浓缩的要求,一般可以通过下列方法观察:用搅棒撩起药汁,当药汁变得浓稠起丝、直至稠厚的膏体在搅棒上“挂旗”,呈片状缓慢滑下;或者用搅棒趁热蘸取少量药汁滴入冷水中,入水的浓稠药汁没有迅速分散、溶化,在水中仍保持圆珠状,即呈现所谓“滴水成珠”的现象;也可用搅棒趁热蘸取少量药汁滴于桑皮纸上,以液滴的周围无水迹渗出时为度。以上 3 种简便易行的操作方法较为常用,提示药汁浓缩成膏滋药成品的火候已到,即可熄火停止加热。

### 膏滋药出现“返砂”还能继续服用吗

有些膏滋药在存放一段时间后,会有糖的结晶析出,这种现象俗称“返砂”。如果膏滋药中已经析出了大量糖的结晶,出现了“返砂”现象,不要误认为这是一种变质现象,不敢继续服用,经过适当

的加工,这种现象是可以纠正的,大可不必将剩下的膏滋药丢弃。

造成“返砂”这一现象的原因主要有两个方面:首先,与膏滋药中糖的加入总量有关;第二,与糖是否经过炼制转化有关。

蔗糖加热熔化为糖浆时,糖浆是有饱和度的,高浓度的糖浆可以因贮存温度降低而逐渐析出蔗糖结晶。实验研究表明,糖浆中总糖含量在 85% 以下就不会有结晶析出。如果膏滋药中加入过多的糖,虽然加工时糖已经混溶在热的膏滋药中,但糖的饱和度过大,放冷后的膏滋药放置一段时间后,同样会逐渐析出蔗糖晶体。

因此,膏方配伍中,不能一味追求改善药味、增加甜度,而使用过量的糖。膏方中糖的加入量要适度。一般情况下,一料膏滋药加入的糖总量为 0.5 kg,就足以达到矫味和服用时的甜度需要。如果在成方膏滋药批量加工时,炼蜜或炼糖的加入量可以参照清膏(中药提取浓缩物)的量,糖的用量不超过清膏的 3 倍。

此外,蔗糖加热熔化会部分转化成葡萄糖和果糖。实验研究表明,当熔化的蔗糖加热至一定程度,使糖浆中葡萄糖和果糖的转化量达到 40%~50%,就不容易析出蔗糖晶体;如果葡萄糖和果糖的转化量过低(10%~35%)或者过高(60%~90%),都会有糖晶体析出。因此,加入膏滋药中的糖如果没有预先加热炼制,就无法使糖产生一定的转化量,也容易析出糖晶体。

可见,熔化在膏滋药中的糖,经过一段时间,又从膏滋中以晶体状态析出,是由于糖的配料用量不当或糖预处理加工不当引起的,与膏滋药是否变质无关。出现“返砂”的膏滋药经过适当返工,仍可以放心继续服用。家庭自行加工时,可以将容器底部析出的糖分离出来,重新加适量水加热溶解后再与膏滋药混匀,并适当加热收膏;或者直接将可加热容器置于水浴上,隔水加热,使膏滋药中析出的糖溶解,与膏滋药搅拌均匀。



## 膏方加工的行业标准

上海地区加工销售膏滋药的医院药房、社会药店为数不少。由于过去没有统一的质量标准,加工单位一般是在有经验的老药工的指导下进行加工制作,往往造成药店或企业各行其道,各自定制加工生产的膏滋药质量存在着良莠不齐的现象。

为了规范上海地区“定制膏方”的市场,提高“定制膏方”的质量和业务管理水平,上海中药行业协会在历年进行膏滋质量评比活动的基础上,于2003年9月修订完成并公布了《上海市中药行业定制膏方加工管理办法》(以下简称《定制膏方管理办法》),要求中药行业有关企业遵照执行。

上海中药行业协会修订并公布执行《定制膏方管理办法》,起到了规范“定制膏方”这一特殊商品的生产加工市场,进一步提高了“定制膏方”加工行业的整体管理水平,促使“定制膏方”的加工和生产有规范可依,有标准可以参照执行,也使备受消费者欢迎的“膏滋”这一传统中药制剂能够有质量和信誉的保证。

新颁布的《定制膏方管理办法》具有以下几方面的特点:

**对相关从业人员提出要求** 《定制膏方管理办法》要求加工膏滋药的经营企业必须指定1名执业中药师(或中药师)负责“定制膏方”的质量和服务管理、业务指导;要求各岗位操作人员应有相应的资质和经过相应的岗位培训;进入煎膏场所的工作人员所穿戴的工作服、鞋、帽、口罩必须是清洁的,同时必须做好自身的指甲、饰品等个人清洁卫生工作。为保证膏滋药制作的卫生质量,经营企业必须按照有关规定,对相关工作人员每年进行健康检查,对不符合健康要求的人员及时调离。

**收方有严格的审核制度** 《定制膏方管理办法》对膏方的审方、核价、登记有严格的规定,处方需经执业(从业)中药师或中药





师审核并签名后,再核价、登记、排单加工;计价也必须严格执行有关物价规定,合理收费。对有配伍禁忌或超剂量的处方将拒绝调配,必要时需经原处方医生更正或重新签字后方可调配。细料药则凭单另配,校对复核无误并签名。

**对加工场地有明确规定** 《定制膏方管理办法》对膏方加工中涉及的场地面积和空间,煎药间、凉膏间的加工制作场所的设施和卫生要求都有明确的规定;待发货的成品应存放于符合规定温度和环境要求的场所。

**对加工流程有质量、安全、卫生等多重管理措施** 《膏方管理办法》对膏方加工的排单、配料及校对的人员和程序进行了规定;对加工流程中的工艺、设备、器具、物品堆放、废弃物处理,以及对整个流程的质量、安全、卫生有严格的管理和记录要求;对成品还规定了紫外线消毒的办法和要求。

**加工记录标识完整** 为避免加工过程中物料和成品的混淆和污染,《定制膏方管理办法》规定整个加工工程中,各种容器、煎锅应有明显的并与记录相符的识别标记;制作完成的膏滋药,在盛器外要贴上完整的记录,内容包括该料药客户的姓名、加工编号、煎膏员编号、取货日期等所有加工记录。

**有质量检验程序** 《定制膏方管理办法》对加工完成的膏滋药规定了外观质量要求,对膏滋药的内在质量规定了“不溶物检查”的要求。《定制膏方管理办法》还要求质量管理员对所有加工记录做好复核并签名。在发放膏滋药时,当班药师将对顾客进行膏滋药服用和保存方法的用药指导,并按照企业的“质量信息反馈制度”做好相关记录。

## 如何保存膏方

一料膏方,通常能服用较长的时间,如果保存不当,很容易发



生霉变,霉变后就不能再服用了,这样一来,一方面中断调治而影响疗效,另一方面也造成不必要的浪费,所以,要注意膏滋药的保存。

**盛膏滋药的容器** 一定要清洁、干燥,不能留有水分,如果容器是陶瓷、玻璃类的,可以采取洗净后小火烘干,也可以在洗净后用微波炉烘干消毒的方法;如果容器属有机材料类的,可以在洗净后沥干,然后放在消毒柜中消毒,或用微波炉稍稍加热烘干水分即可;如果容器属于金属材料,可以在洗净后沥干用红外线消毒或用小火烘去水分。

**膏滋药应分装** 不要将一料膏滋药全放在一个容器里,近期要服用的部分应该另外分装,暂时不吃的部分要密封,并放在阴凉通风处。南方天气比较暖和,膏滋药容易变质,最好放在冰箱里冷藏。近期要服用的部分,也要放在阴凉通风干燥处,要避免受热受潮,且要避光,因为受热受潮很容易变质,暴晒之下某些有效成分也会丧失而影响质量。最近有些厂家制作膏滋药已经注意到膏滋药的保存问题,对传统的膏滋药采用真空小包装法,如上海的雷氏药业用小包装工艺包装膏滋药,携带方便,使外出的人吃膏滋药不再成为难事,而且也利于膏滋药的保存。

**用匙取膏滋药** 先要将匙洗净、干燥、消毒。取膏药的匙没有洗干净,或者匙上有水,水分渗入膏滋药中,或者边吃边取,不注意清洁卫生,细菌就会因此而带入膏药,膏滋药很容易发生霉变。

**膏滋药的保存** 如果膏滋药存放时间较久,膏滋药的表层出现小霉点,而除了表层外,其余部分还是可取的。这时,可以将有小霉点的部分除去,剩下来的部分重新入锅煎熬,同时准备好干净的容器,装入熬透后的膏液,冷却后加盖保存。

## 服膏滋药为什么要先服“开路药”

大多膏方是以补益作用为主,所以在服用膏滋药之前,有经验的医生会因人而异地要求患者先服用一些开路药,目的在于为患者对膏方的消化吸收创造有利的条件。特别要注意保护胃气,不使胃气挫伤,因此患者不必急于求成,盲目地直接服用膏方。需要服用膏方时一定要考虑脾胃的承受能力,先服用“开路药”,调理好脾胃,方可进补。

临床常常看到一些患者舌苔厚腻,没有食欲,同时感觉胸胁痞闷,说明该患者有湿困中焦、脾胃运化功能减退的征象。如果不改善这些症状就急于服用膏方,势必影响对膏方的消化吸收,非但达不到进补的目的,反而会产生不适的症状,适得其反。遇到这样的情况,应该认真听取医生的建议,先服用运脾健胃、理气化湿的中药,以达到改善运化的目的。处方中可以选用陈皮、半夏、川朴、枳壳、神曲、山楂、白术、砂仁、山楂等健脾理气、化湿助运的药。除了需要改善脾胃功能以外,有的患者也可以先服用一些汤剂,进行试探性的调补,通过观察服药后的反应,为开好调补对路的膏方作好准备。

开路药一般以医生根据患者的症状辨证后开出的汤剂最有针对性,通常提前2~3周服用。也可在医生的指导下服用一些中成药,如藿香正气片、香砂六君丸、参苓白术片、健脾丸等用作“开路”药。

对于脾胃功能正常的人来说,不强调必须服用开路药,可以直接服用膏方,做到及时进补。



## 怎样服膏方

膏方,是中药的一种剂型。专业医生通过望、闻、问、切,详细辨证分析后,给予拟方施药。将药反复浓煎、去渣取汁,视病情的需要加入冰糖、饴糖或蜂蜜,或配以阿胶、或龟版胶、或鹿角胶或浓缩收膏。选料道地,工艺讲究,一次成品,服用方便,可以免除每日煎药的烦恼。膏方的服法可分为冲服、调服、噙化 3 种:冲服,即取适量药膏,放在杯中,将白开水冲入,搅匀使之溶化后服下,如服益母草膏等,一般是每次取 1 匙,用开水冲烊饮服;调服,即把胶质稠黏难化的膏方加黄酒或水,用碗、杯隔水炖热,调匀后服下;噙化,也称“含化”,即将药膏含在口中溶化,慢慢下咽,以发挥药效,如治疗慢性咽喉炎可用此法。服用膏方的时间有空腹服、饭前服、饭后服、睡前服等几种。滋腻补益药宜空腹服;胃肠道疾病药宜在饭前 1 小时左右服;心、肺等病的药物一般在饭后半小时服;养心安神的膏滋药,宜睡前服。服膏剂量要根据病情或身体情况及药物的性质决定。一般每日 2 次,每次服 1 匙。病情较重、体质较强的人,剂量可稍大一些;病轻者或老年人、妇女、小孩等用量稍小些;有滋补作用、药性较平和的药物,用量可大些;有毒性、药性剧烈的药物,用量宜小,应从小剂量开始,逐步增加。服膏滋药期间,如遇伤风感冒、伤食、腹泻等情况,应暂时停服,俟上述急性疾病治愈后再服用膏滋药。服膏方进补阶段,应注意忌口,如膏方中有人参时,忌食萝卜、莱菔子、红绿茶等;阳虚便溏畏寒者忌吃生冷食物;阴虚便秘、潮热者忌辛辣刺激性食物,遵照医嘱配合执行。

### 遇到哪些情况应暂时停服膏滋药

在服用膏方的过程中如遇到以下几种情况应暂时停服膏

滋药：

- (1)遇到寒热不当、外邪袭表的感冒发热之证。
- (2)遇到咳嗽痰多、胸闷气急等痰液壅盛之证。
- (3)遇到受寒、伤暑、食物中毒，出现急性腹痛时。
- (4)遇到情志不遂、悲伤恼怒，出现情志抑郁、头胀头痛等肝气郁结、气郁化火时。
- (5)遇到神志昏迷、不省人事等危急重证时。
- (6)遇到食欲减退、脘腹胀满、便溏腹泻等消化不良、胃肠功能紊乱时。
- (7)遇到大便不通、小便不利、热性疮疡、红肿热痛等邪气壅实、闭阻不通、实热内盛时。

### 服膏方期间能吃萝卜吗

一般说来，服用膏方期间不宜吃萝卜。因为服用膏方绝大多数是为了补养身体，这些膏方是针对人体的虚证而设，大多含有人参。人参大补元气，是补气药中的佼佼者，而萝卜却能破气耗血，两者作用相反，所以同时服用就会减弱或抵消人参的补气功效。文献上记载服何首乌、生地黄亦要忌萝卜，这是因为萝卜多食会下气耗血，从而削弱了何首乌、生地黄的滋阴养血作用。但是如果服用人参过量，出现不思饮食、胸闷、便秘、腹胀等副作用，却可以用萝卜或萝卜子来化解。有些补膏味厚滋腻，特别是一些动物性滋养药，对脾胃功能比较差的人来说，不易被消化吸收，容易呆胃，萝卜不但能下气，还能消食、化痰、降脂，这时两者同用反有利而无害。所以服用膏方期间能不能吃萝卜要视具体情况而言。



## 服膏方期间能喝咖啡吗

服用膏方期间不宜喝咖啡。其理由是咖啡、可乐等饮料含有黄嘌呤类的生物碱(即咖啡因),能兴奋中枢神经,具有提神作用。补益药当中,如人参一类的补益元气的中药也具有兴奋大脑皮质的提神醒脑的作用,服用膏方期间饮用咖啡,兴奋太过,会使人产生头晕胀痛、不能入睡的副作用。中医认为,“气有余,便是火”,火太盛阳亢消耗阴津,导致阴阳失衡,而使脏腑的功能得不到调整,机体得不到静养。所以,服用膏方期间,咖啡当在忌口之列。

## 服膏方期间能饮茶吗

服用膏方期间不宜饮茶。因为茶叶中含有大量鞣酸,遇到补膏中的蛋白质、生物碱或重金属盐等会起化学反应,生成不溶解的沉淀物,影响人体对营养物质及其他有效成分的吸收,降低疗效。补血药物含有铁离子,茶叶中的鞣酸与铁反应,就会生成不溶性沉淀物鞣酸铁,它不仅会影响药物的吸收,使药物失去疗效,还会刺激胃肠道,引起不适。有些滋补膏如洞天长春膏、人参大补膏等,均可加强大脑皮质的兴奋作用,有显著的抗疲劳作用,茶叶所含有的咖啡碱、茶碱等成分,也具有兴奋高级神经中枢的作用,若服膏药同时饮茶,往往可使人过于兴奋,影响大脑休息,会出现头痛、头胀、不能入睡的副作用,不利于调养。

## 何谓忌口? 服膏方应注意哪些忌口

忌口,又称“食忌”,是指根据病情及治疗需要,要求患者在服药期间,忌食某种食物。忌口涉及到食物与药物的相互作用会不

会降低药效或产生不良反应的问题。每种食物和药物都具有不同的性味和功能,如果所食的食物与所服的药物功能相近,便可起到协同作用,加强疗效;功用相克,则相互牵制,使药性和治疗作用减弱或完全失效;功用相反,还会发生危害人体的不良反应,造成中毒。根据前人的经验与文献记载,如鳖甲忌苋菜;荆芥忌鱼蟹;天门冬忌鲤鱼;白术忌桃、李、大蒜;蜂蜜忌葱;铁屑忌茶叶;人参忌莱菔子等可供借鉴。因此,服用膏方也同样要注意忌口问题。具体怎么忌口,不能笼统地说膏方忌某某药物,而要看组成膏方的药物与食物间的相互作用。膏滋药由人参等补益药组成,茶叶、萝卜、咖啡、可乐、生冷滑腻之品一般都在忌口之列。

### 膏方是否最宜于冬季服

中医进补,四季皆宜。但服用膏滋药。则以冬季为佳。为什么呢?因为膏方是用来增强体质、防病治病的,尤其是补膏的补养作用强,根据“天人相应”的观点,按四季的“春生、夏长、秋收、冬藏”的特点,冬季是封藏的季节,天气寒冷,食欲旺盛,无论进食的数量和质量的需求方面,也较其他季节为多。《黄帝内经》说:“冬三月,此谓闭藏。”因此,冬令是人们及时进补的大好时机。冬令时节万物闭藏的季节,服用补膏最容易“补得进”,不但补充了不足,而且可以为来年做储备,使来年不生病、少生病,而精力充沛。再者,膏滋药比较滋腻。热天服用,不易消化。同时,一料膏滋药,要服好几个星期,在气温较高时,岂不要变质吗?什么时候是服用膏滋药的最佳时间呢?一般以冬至日起 50 天,即“头九”到“六九”(冬至后 9 天为头九,18 天为二九……)左右,为最佳时间。如果准备一冬服两料膏滋药,则可以适当提前。



## 膏方是否一年四季都可服

民谚说：“冬令进补，上山打虎”，冬季万物潜藏，对人体来说，的确是进补的最好季节。所以每到冬至前，人们就会想到吃补膏，喝补酒。但进补只能限于冬季吗？这倒未必。一年四季，阴阳之气在变化，一日之间阴阳之气也在变化，阴阳运动的消长平衡过程始终在进行当中。中医认为，生命的诞生与生命活动均是阴阳两气运动变化的结果，可见在生命活动中新陈代谢是无时无刻不在进行着的，这就意味着每时每刻都有消耗支出，需要得到及时的补充，否则没有新陈代谢，也就没有了生命活动。有支出，就要有补充，除了一日三餐，一年四季服用膏方其实是保养人体精气神的一种很有效的方法，而不必拘泥于冬季。每个季节都有自己的特点，《黄帝内经》有“春夏养阳，秋冬养阴”的古训，意思是说春夏季节阳气生发，天气越来越暖，以阳气的运动为主，人在养生上就要注意不能克伐阳气，要侧重养阳，这样才能顺应季节的变化，如阳虚患者在春夏季节进补养阳之补膏或用冬病夏治的方法进行治疗，就较冬季进补更容易奏效；秋冬天气转寒，阴气的运动为主，进补适宜养阴之品，可以收到事半功倍的效果，如阴虚患者，在冬季养阴，更利于吸收。所以四季都可以进补。有些人病情较久，如肾虚阳痿，冬天用膏方尚未起效，可以在其他的季节继续服用。所以，只要能做到补而不腻、补而不滞，适合身体所需，就可以在一年四季都吃膏方。

## 服膏方是否“多多益善”

目前的膏方有两大类：一类属于滋补品，适合于虚证或亚健康状态者，可以作为儿童生长发育或妇女、老年养生保健需要的调补



品；另一类作为治疗药，针对不同的病证，根据辨证论治的原则而设。作为治疗用的膏剂，如枇杷叶膏、益母草膏之类不可以滥用，这样的常识一般都能了解、理解，对于滋补类的膏方。一般总认为，没有毒副作用，可以多服点。好像多服点才能显示药力，服得太少难以奏效，这种认识有失偏颇。诚然，服得太少难以奏效，但是并不见得服多了就可以增加补益的力度，因为脾胃的消化吸收功能是有一定限度的，服多了不但造成浪费，还会影响脾胃功能；还有，凡药都有偏性，补阳的膏方性多温热，多服以后会致阴液耗损，补阴的膏方性多寒凉，服得太多又会损及阳气。所以认为多多益善而蛮补、滥补，那么矫枉过正，往往事与愿违，非但补不进去，而且还会重新导致阴阳失衡、气血壅滞，于身体无益，对脾胃不利。所以在服用膏方时，除了对症服用，还要注意一个剂量问题，要保证脾胃能够运化，身体能够吸收，并且要时刻注意阴阳的平衡问题。这一点对于处于生长发育期的儿童、病后初愈、脾胃虚弱者来说尤为重要。所以服用膏方，一定要在医生的指导下，根据自己的身体状况、脾胃功能掌握好剂量，特别要注意的是开始服用膏方时，最好先从小剂量开始，逐渐加大至常规剂量，而并非多多益善。



## 怎样区别膏方与药膳

膏方与药膳是绝然不同的两个概念，但两者均与中医药有着数千年渊源流长的“药食同源”、“祛病延年”之精髓一脉相承，在防病健身、治病康复、益寿延年方面，两者具有同样重要的意义。但两者在组方与配伍、功效和适应证、剂型和形式、原料和取材、剂量与口味、加工工艺、服用方式、贮藏保管以及地域和文化等各方面存在着更多的不同。

**组方与配伍** 膏方突出整体观念，在中医整体调整观念的指导下，全面考虑人体内气血阴阳之变化，立方所遣之药，仅饮片就

达数十味,组成了配伍严谨的方剂,为患者度身定制。药膳则以食物原料为主,药味少则一味,多也只简单数味,不构成一般的方剂。然而药膳又有别于普通食物,强调中药和食物的合理调配。

**功效和适应证** 由于中药复方是膏方配伍中的主体,因此绝大部分膏方以治病为目的,亦可攻补兼施,兼能滋养脏腑、培补正气,体现其治病补虚的功效特点。药膳是通过有目的地选择性质相适宜的药物与食物为伍,取药物之性,用食物之味,食借药力,药助食威。因此,药膳在功效上更多地体现了食补的特性,注重饮食调养,通过调整平常饮食种类和方式等,满足人们“厌于药,喜于食”的天性,使更多的人达到以保健、强身为目的,并有助于疾病康复。

**剂型和形式** 膏方剂型单一,仅有膏剂一种形式,呈半固体状,适合于较长时间的存放,临服时即冲即饮,取用方便,并易于携带。药膳形式多样,按工艺特点分类,可分为鲜汁、茶饮、药酒、药露、药膏、药粥、药羹、菜肴等不同形式。如李时珍在《本草纲目》中收录的许多药膳方中仅药粥、药酒就各有数十则。

**原料和取材** 膏方原料的配伍是严格按照中药调剂处方应付的要求,根据处方用量调配而成。药膳则取材方便,操作简单,常用的单味调理药如当归、山药、贝母、苦杏仁可在中药店购得,大部分药食两用的中药,如大枣、龙眼肉在食品商店也能买到,其他功能性食物诸如米面果菜、禽畜虫鱼等以及酒、醋、姜、蒜等作料更是取用方便。

**剂量与口味** 膏方有一定的服用时间,要求早晚各一次,一料膏滋持续服用 30~50 天不等;用温开水烔冲后服用,口味甘甜中略带药味。药膳可以按照饮食习惯、个人喜好,根据菜肴、糕点、汤羹等不同品种加工成美味的各种膳食,但药膳的摄入量要根据自身身体状况而有所节制,所加入的药物有严格的数量和剂量限制,不要贪多求大,以免适得其反。

**加工工艺** 膏方是按照中药制剂工艺的要求在固定场所加工定制的,有严格的工艺流程,制成的膏方可存放较长的时间,以利于患者持续服用1~2个月。家庭或饭店加工的药膳一般随做随吃,也能满足消费者居家旅游的养生需要。根据取材的不同,药膳的加工工艺极其丰富,以蒸、煮、炖、炒、熘、卤等传统的烹调艺术为手段,使食物、药物和调料有机结合在一起,使人们在享用美味佳肴的同时,不经意中获得保健、强身、益寿的好处。“食不厌精,脍不厌细”这一孔子名言就描述出了儒家孔府药膳不仅原料精良、造型精美、烹饪精湛,而且味美、色美、形美、盛器美的特点。

**地域和文化** 膏方和药膳之所以历史悠久,广为人们接受和喜爱,是与中国广袤的地域和悠久丰富的文化背景密不可分的。如渊源流长的中国药膳就有宫廷贵族药膳、平民家庭药膳、民族药膳、宗教类药膳等不少流派。如佛家膳食以素食为主,一些有地方特色的药膳,如北京的茯苓饼中外闻名,中华药膳在中国菜中独具特色。而“食补”等长期积淀而成的理念作为药膳的精华,也多为中医学思想所汲取。

“药补不如食补”,膏方与药膳各有所长。在中医基础理论的指导下,讲寒热虚实,辨体质强弱,藉此疗病调养、补虚益损,实施健康投资,膏方和药膳在人们祛病延年的需求中必然能相得益彰。



## 怎样区别膏方与保健食品

**保健品是食品** 保健食品在国际上通常称为“health food”、“functional food”或“dietary supplement”。《辞海》中对“保健”一词的解释是:“对个人和集体所采取的医疗预防与卫生防疫相结合的综合性措施。”

在我国新颁布的《保健食品管理办法》中规定,保健食品系指表明具有特定保健功能的食品。即适宜于特定人群食用,具有调

节机体功能,不以治疗疾病为目的食品。

我国《食品卫生法》中规定,食品是指供人食用或饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品,但是不包括以治疗为目的的物品;食品应当无毒、无害,符合应当有的营养要求,具有相应的色、香、味等感官性状。

**药品和保健食品的区别** 药品用于治病,保健食品有一定的食补作用,但不以治病为目的。这一明确的概念有助于市民正确认识保健食品的作用和功能,逐步纠正消费者误认为保健品有治疗、甚至有治愈疾病作用的观点,澄清“保健”与“治疗”的概念。

目前,我国对中药保健品的整顿工作正在加紧进行,市售保健食品的标识尚有卫生部的批准文号“卫食健字”(国产保健食品)、“卫进食健字”(进口保健食品)以及“保健食品”三种标识;市场上还存在的“药健字”(中药保健药品)已成为暂时的现象,通过评审,除了能上升为国家药品标准的品种外,不符合要求的将撤销其批准文号,并规定自2004年1月1日起,所有中药保健药品将不得在市场上流通。

**膏方是药品** 膏方是辨证施治的结果,组方配伍之间,充分体现了医生的用药思想,这是任何一种食品所无法替代的用药效果。

膏方以中药复方为配伍基础,又辅以有滋养之性的胶、糖或蜜相溶合,功效可见一斑。膏方以治病、调养五脏为出发点,强调疾病治疗效果。

可以认为,保健食品与膏方等药物形式相比,保健食品功能单一,只适合处于“亚健康”状态的人的机体调节或一些特定人群适当补充微量元素,以有利于身体健康。虽然保健食品不能直接用于疾病治疗,但可以作为治疗疾病的一种辅助方法,起到对人体代谢“助一臂之力”的作用。而膏方是中药的一种剂型,具有治疗疾病的药物特性,兼能补虚扶正,治病养身。因此,有病应该在医生的指导下合理用药,否则将延误时间,加重病情。

## 怎样区别膏方与“补药”

**膏方是一种滋补药** 按照一般的常识,“补药”是一个宽泛的概念,是指具有补益作用的药物和其他滋补品的总称。“补药”在中医药学中是一个术语,是指能补益正气,扶助虚弱,治疗虚证的药物,也可称为“补益药”或“补养药”;补药包括中药材和中成药两个部分。

膏方是指一类膏状制剂,无论是药厂成批生产的成方膏滋药,还是药店定制加工的临方膏滋药,由于一般的膏方中都有参茸等补益中药,阿胶、糖、蜂蜜等滋补营养物料配伍应用,使膏滋药具有一定的补养作用。因此,膏滋药也是众多补药形式中的一种。

**膏方不等同于进补** 进补就是通过服用具有补益作用的食物、药物增强体质,达到防病治病、延年益寿的目的。随着社会的进步,人们的生活起居发生了极大的变化,人们对进补的需求和形式也随之产生的许多新的变化。从传统的服用补品、补药、补膏以治病补虚,到注重追求精力充沛、降脂减肥、养颜美容,如何因人、因病、因时,科学有效地加以进补,值得医生和患者共同关注。

但是,中医用膏方,并不是“惟膏方是补”。临床应用,从辨病用膏方到辨证用膏方,无不首先以“论治”为前提,膏方往往治病之中求滋养,攻邪之中求补虚,攻补兼施,有的放矢,把握分寸,不盲目“骤补”、“滥补”。

**膏滋是补药的制剂形式之一** 中药进补有多种用药形式。补药可以单味独用、汤剂复方配伍、与食物相配制成药膳或制成各种剂型的中成药。

汤剂复方配伍时,除人参类需另炖或切片、研粉外,一般植物来源的补药均与其他中药饮片同汤共煎;动物药加工服用时以另炖、熬胶、研粉吞服为主。补药制成中成药,剂型就极为丰富,既有



传统的丸、散、膏、酒等剂型，又有片剂、胶囊剂、口服液、冲剂、糖浆剂、注射液等各种成药剂型。

常见的各种剂型的成药补药有六味地黄丸、健步虎潜丸、灵芝片、右归丸、香砂六君丸、参苓白术散、人参补酒、八珍丸、归脾丸、复方胎盘片、七宝美髯丹、雪蛤参精等。

膏滋就是如上所说的中成药制剂中的一类形式。常见的成方膏滋有二冬膏、琼玉膏、参鹿补膏、十全大补膏、桑椹膏等品种。由于膏滋经过传统道地的制剂加工和特殊的配料，膏滋并无一般汤剂之苦味，甘甜易服，容易吸收，与其他滋补制剂相比，颇具优点。

**膏方有中成药补药的复方优势** 补药可以按类分为补气药、补血药、补阳药、补阴药，临床根据气、血、阴、阳的不同虚证选择配伍相应的补药。如人参、党参、西洋参、太子参、黄芪、白术、山药等均有补气作用；熟地黄、制首乌、当归、白芍药、阿胶等均有补血作用；鹿茸、蛤蚧、紫河车、冬虫夏草、山茱萸、淫羊藿、肉苁蓉、杜仲等均有补阳作用；沙参、天门冬、石斛、玉竹、百合、枸杞子、女贞子、龟版等均有补阴作用。

由于人体生命活动过程中气、血、阴、阳互相资生、互相依存，在发生虚损时，也常是互相影响，因此实际临床上并不是各类型虚证都是单独出现，而会气血两亏、阴阳俱损等相兼出现，治疗上就需要气血双补、滋阴补血、阴阳兼顾，数药并用。

相形之下，对于众多剂型的补药，各种制剂组方既定，不能修改；而膏方能临证处方，可随证加减，能够做到一人一方，配伍严谨，针对性强，制剂稳定，体现出辨证施治、复方配伍、药力共出的优势，或治病补虚、或攻补兼施，以治病为主，兼能补益。

**服用宜忌** “是药三分毒”，所以不论膏方，还是补药，服用适当，身体受益，服用不当，反受其害。如体壮邪实的患者就不能滥用补膏和补药，否则实邪不易外达或消除，使病情加重或缠绵难愈；在服补药和补膏期间，如遇感冒发热等急症，即应停服补药，待

急症治愈后方可继续服用,必要时可配以健脾胃药,以免苔厚胃呆,影响饮食。

因此无论膏滋还是以其他形式服用补药,在选用和服用时,都应注意掌控自身身体状况和药物功效特点,正确服用。

## 怎样认识膏方与养生

“养生”是我国人民几千年来注重生命健康、延缓衰老的一个术语,养生学是中医学中的一个重要组成部分,养生的方法和理论也是我国几千年优秀文化的一部分。“不治已病治未病”是早在汉代就出版的《黄帝内经》一书中提出的防病养生理论,包括未病先防、已病防变、已变防渐等多个方面的内容,是中医学的“上工之术”。

“养生”源于上古,兴于秦汉,几千年来经久不衰,人们把很多养生的方法和理论已植根于自己的行为和思维中,在民间有着广泛的基础。现代养生学涵盖了从饮食起居到宗教、政治的方方面面,几乎无所不及,尤其在人们日常生活中有着举足轻重的作用。

如果说膏方是一类有形的中药制剂,具有疗疾补虚的作用;那么养生则是无形的、有着丰富内涵的经验、方法和理论,指导人们强身健体,掌握控制疾病的主动权。

**膏方——治病不忘养生** 自古至今“养生之道”与中医思想如出一辙,以膏方治病补虚亦为养生之法。膏方——药与滋补之物相伍,疗疾中不忘补虚,康复中注意调养,乃养生也。但是切莫为了追求养生的效果,把膏方当成万能的“十全十美方”。

**膏方有限,养生无限** 服用膏方具有暂时性,以治疗疾病,调整人体阴阳之偏为目的,虽然膏方四季咸宜,但服用也有阶段性,治病调养毕竟要适可而止。

养生则不同,从有形的药物、饮食,到无形的情志、精神,从各



种拳操的运动保健到起居睡眠、推拿针灸，四时皆谈养生，男女老幼因人而异皆宜养生，以致于人的一生离不开养生。如清代画家高桐轩提出以耕耘、把帚、教子、知足、安居、畅谈、漫步、沐浴、高卧、曝背作为养生“十乐”。

## 何谓辨证论治

辨证论治是中医学术的基本特点，是中医治疗疾病的主要方法。证，是中医学的一个特有概念，是对疾病过程中所处一定阶段的病位、病因、病性以及病势等所做的病理概括，能够反映疾病当前的本质。辨证即分析、辨认疾病的证候，辨证的过程，就是对所收集的病情资料加以综合、分析、归纳而得出疾病证候的过程。论治即根据辨证的结果，确定相应的治疗方法。可见准确的辨证是治疗的前提，只有在准确辨证的基础上才能做到恰当治疗并达到预期的疗效。中医在长期的医疗实践中建立了不少能反映疾病发生、发展、变化规律，能揭示疾病本质的辨证方法，常用的有八纲辨证、气血津液辨证、脏腑辨证、病因辨证、六经辨证、卫气营血辨证、三焦辨证等辨证方法，在临床实践中面对复杂的病情，都可以依据病情资料（包括症状、体征、病史等），合理选择辨证方法去归纳、分析，以得出不同的证的结论，然后立法处方，进行治疗。如慢性胃炎，按中医辨证有寒、热、虚、实等不同，在治疗上就要相应采取热之、寒之、补之、泻之等治则。

## 服膏方为何要辨证施治

治病求本是中医治疗疾病的一贯原则，证是疾病当前本质的体现，所以要正确治疗，首先要辨证准确。膏方调治疾病或提高体质，要依据每一个人的情况而设，不能千篇一律。人分老幼、男女、





有病无病、大病小病、有邪无邪,具体落实到某个人,均有其十分独特之处。人体的体质表现出寒热、阴阳、虚实的多样性,疾病的证型有气虚、血虚、阴虚、阳虚、气滞、血瘀等不同,如果不加区别,一律给予同一种膏方,即使有人十分有益,恐怕不少人会适得其反。所以重要的是仔细区分每个人的具体特点,准确地了解患者是阳虚还是阴虚,寒体还是热体,确定是补心、补肺,还是补肝、补脾、补肾,如果不进行辨证论治,这一切都无从谈起。药不对证,阴虚用阳药,阳虚用阴药,不但不能纠偏以平衡阴阳,反而雪上加霜、火上加油,虽然人参、熟地黄是补药,但是也会变成毒药,所以,服用膏方一定要辨证施治。

### 何谓阳虚? 阳虚患者服膏方可选用什么中药

阳虚就是机体阳气虚衰、功能减退或衰弱、热量不足的病理状态。多表现为机体阳气不足,阳不制阴,阴相对亢盛的虚寒证。常见的症状有面色㿔白、畏寒肢冷、喜静倦卧、小便清长、下利清谷、舌淡、脉迟等。进一步结合脏腑的功能状态,又有肾阳虚、脾阳虚、心阳虚等类型。肾阳虚,可见神疲肢冷、腰膝酸软、尿频遗尿、阳痿、遗精、舌淡脉沉等症状;心阳虚,可见心悸怔忡、心胸作痛、畏寒肢冷、面色㿔白、脉沉细等症状;脾阳虚,可见畏寒肢冷、腹部冷痛、大便溏薄,甚至完谷不化、面浮肢肿等症状。

阳虚证宜用温补法,患者服用膏方可以选用巴戟天、淫羊藿、杜仲、续断、补骨脂、肉苁蓉、益智仁、仙茅、菟丝子、附子、肉桂、鹿茸等药物。

### 何谓阴虚? 阴虚患者服膏方可选用什么中药

阴虚是指机体精血、津液等物质亏耗,以致阴不制阳,导致阳



相对亢盛,功能虚性亢奋的病理状态。其病理特点表现为阴液不足而致的营养、滋润功能减退以及阳气相对偏盛的虚热证。阴虚证的患者常表现为心烦不眠、手足心热、骨蒸潮热、盗汗、颧红、消瘦、口干咽燥、舌红少苔、脉细数。临床有心阴虚、肺阴虚、肝阴虚、肾阴虚、胃阴虚等类型。肺阴虚,可见干咳无痰或痰少难咯,声音嘶哑,咯血,午后潮热,五心烦热,盗汗,口燥咽干,形体消瘦,舌红少苔或无苔,脉细数;胃阴虚主要是津液不足,可见口渴咽干,胃脘隐痛,干呕呃逆,舌红少苔等;心阴虚,可见心烦、心悸,失眠、多梦,五心烦热,午后潮热,盗汗,两颧潮红,舌红、少苔,脉细数;肝阴虚,可见头晕眼花,两目干涩,视力减退,面部烘热或潮红,口咽干燥,五心烦热,潮热盗汗,或见手足蠕动,或胁肋隐隐灼痛,舌红少津,脉弦细数;肾阴虚,可见腰、膝酸痛,头晕,耳鸣,男子遗精、早泄,女子经少、经闭或崩漏,口燥咽干,形体消瘦,午后潮热或骨蒸发热,五心烦热,夜间盗汗,舌红、少苔,脉细数。

阴虚证宜养阴,可选用熟地黄、生地黄、山茱萸、白芍药、沙参、枸杞子、麦门冬、天门冬、北沙参、百合、石斛、鳖甲胶、龟版胶等药物制成膏方。



## 何谓阴阳两虚? 阴阳两虚患者

### 服膏方可选用什么中药

阴阳两虚是指阴虚和阳虚同时存在的病理状态。中医学认为,阴阳互根,相互为用,当阴虚或阳虚到一定程度,病变就会发展影响及另一方面,也就是阴损及阳、阳损及阴,最终导致阴阳两虚。病人表现为既怕冷又怕热,可见烘热汗出、心烦失眠、口干,又可见手足冷、大便溏薄等症状。阴阳两虚,治疗宜阴阳两顾,以补益精气为主,补阴与补阳药物搭配使用。

阴阳两虚患者服用膏方可选用熟地黄、鹿角胶、山药、山茱萸、菟丝子、枸杞子、龟版胶等。

### 何谓阴虚阳亢？阴虚阳亢患者 服膏方可选用什么中药

阴虚阳亢是指阴液不足，机体的精血津液等物质亏耗，以致阴不制阳，导致阳相对亢盛的病理状态。临床表现为眩晕耳鸣，头目胀痛，面红目赤，急躁易怒，失眠多梦，腰酸，手足心热、盗汗、舌红少苔、脉细数等。治宜滋阴以敛阳，也即通过补阴，抑制阳气偏亢，以恢复阴阳平衡。阴虚阳亢患者服用膏方可以选择具有滋阴以及有潜阳作用的药物，如龟版、鳖甲、生地黄、枸杞子、白芍药、石决明、牡蛎、菊花、天麻、钩藤、白蒺藜等。

### 何谓气虚？气虚患者服膏方 可选用什么中药



气虚是指元气(真气)不足，气的推动、温煦、固摄、防御、气化等功能减退，或脏腑组织的功能活动减退所表现的虚弱状态。多由年老体弱，元气自衰；久病、重病、劳累过度，元气耗散；先天不足、后天失调，元气生成匮乏所致。由于元气亏虚，推动无力，脏腑组织功能活动减退，卫外功能不足，或元气亏虚，不能上荣于头目，而出现一系列气虚表现：神疲乏力、少气懒言、头晕目眩、自汗、动则更甚、恶风，感冒劳累后诸症易加重，舌淡、脉虚无力。气虚证既可表现为全身性的元气不足之证，又可表现为某一脏腑或两个以上脏腑的功能减弱，临床常见的证型有肺气虚、心气虚、脾气虚、肾气虚、心肺气虚、肝胆气虚、胃气虚、卫气虚等证型。治宜补益元

气。气虚患者服用膏方可选用人参、党参、黄芪、白术、山药、茯苓、五味子、炙甘草等。

### 何谓气阴两虚？气阴两虚患者 服膏方可选用什么中药

气阴两虚即既有气虚，又有阴虚的病理状态。气阴两虚常见于热性病后期和慢性消耗性疾病。临床可见神疲乏力、少气懒言、口干咽燥、低热或潮热、五心烦热、自汗、盗汗、舌红苔少、脉虚大或虚数。兼有气虚证和阴虚证的表现。治疗应补阴药与补气药同用。因此气阴两虚患者服用膏方可以选择西洋参、太子参、麦门冬、五味子、黄芪、白术、山药、生地黄等中药。

### 何谓血虚？血虚患者服膏方 可选用什么中药

血虚是血液不足或血的濡养功能减退的病理状态。失血过多、新血不及生成或补充，或脾胃虚弱、饮食营养不足、化生血液的功能减弱或化源不足、而致血液化生障碍，或因久病不愈、慢性消耗等因素致营血暗耗，均可导致血虚。血虚可引起全身和局部的病理变化，出现头昏目花，两目干涩、耳鸣、面色不华或萎黄、唇甲苍白、毛发干枯、肌肤干燥、心悸失眠健忘、肢体或肢端麻木、关节屈伸不利等症状，女性还可出现月经过少、月经后期、闭经、不孕等病证。临床有心血虚、肝血虚等类型。

血虚一般多选择补血药，根据气能生血、精血互化的中医理论，还可以选用补气药、养阴药等。血虚患者服用膏方可选用熟地黄、当归、川芎、白芍药、黄芪、枸杞子、何首乌、阿胶等中药。



## 何谓气血两虚？气血两虚患者服膏方 可选用什么中药

气血两虚是指气虚和血虚同时存在的病理状态。多由于久病不愈，气血两伤，或先有血虚，无以化气，或先有气虚，无力生血所致。临床表现为少气懒言、神疲乏力、头晕目眩、自汗、心悸、失眠、面色㿔白或萎黄，舌质淡嫩，脉细无力。可见于贫血、神经衰弱、慢性消耗性疾病。治疗应采用气血双补法。气血两虚患者服用膏方可选用黄芪、党参、人参、茯苓、白术、当归、白芍药、龙眼肉、酸枣仁、熟地黄等。

## 何谓气滞？气滞患者服膏方 可选用什么中药

气的升降出入运动受到阻碍，气机郁滞不畅称作“气滞”；中医学理论认为气是构成人体的基本物质，又是脏腑的功能活动，周流全身，无处不到。气运行于全身，贵在流通舒畅，如果某些脏腑、经络发生病变，或饮食不节、冷热失调，或痰湿瘀阻，或精神抑郁，使气的流通发生障碍，则出现气滞。

气滞的临床表现为胀闷、疼痛为主。由于气机阻滞部位的不同，又可表现出不同证候。脾胃气滞可致脘腹胀痛、嗳气、呃逆、大小便失常；肝郁气滞常表现为胸闷胁痛、食欲不振以及乳房胀痛、月经不调；肺气壅滞出现咳喘、胸闷等。气滞的症状在慢性胃炎、溃疡病、胆道疾病、慢性肝炎等许多消化系统疾病以及支气管哮喘、妇女痛经等疾病中皆可见到。气滞的治疗原则是理气或行气。理气药舒畅气机、消除气滞，实际是调整脏腑的功能，因此又被称为



为行气药。

气滞患者服用膏方可选用陈皮、青皮、厚朴、枳实、枳壳、木香、乌药、香附、大腹皮等。

## 何谓血瘀？血瘀患者服膏方 可选用什么中药

血瘀是血液的循行迟缓和不通畅的病理状态。体内有血液停滞，包括离经之血积存体内，或血运不畅，阻滞于经脉及脏腑内的血液，均称为“血瘀”。血瘀是疾病过程中形成的病理产物，又是某些疾病的致病因素。

血瘀的原因，主要有两个方面：一是因气虚、气滞、血寒、血热等原因，使血行不畅而凝滞。气为血帅，气虚或气滞，则不能推动血液正常运行；或寒邪客入血脉，使经脉挛缩拘急，血液凝滞不畅；或热入营血，血热搏结等，均可形成瘀血。二是由于内外伤、气虚失摄或血热妄行等原因造成血离经脉，积存于体内而形成血瘀。

血瘀的病证虽然繁多，但其临床表现归纳起来则有如下几个共同的特点：①周身疼痛或局部刺痛，痛处固定不移，拒按，夜间痛甚。②肢体麻木不仁。③身体内部或外部发现肿块：外伤肌肤局部，见青紫肿胀，瘀积于体内，久聚不散，则可形成积，按之有痞块，固定不移。④内出血，出血时夹有黯紫色血块，其血色多呈黯紫色，并伴有血块。⑤皮肤、黏膜或舌体出现瘀斑在望诊方面，久瘀则面色黧黑，肌肤甲错，唇、甲青紫，舌质暗紫，或有瘀点、瘀斑，舌下静脉曲张等征象。脉象多见细涩、沉弦或结代等。

治疗瘀血证宜活血化瘀，根据气行则血行、血得热则行等中医理论，也可以适当选用温通、益气、行气药。血瘀患者服用膏方可选用的中药有当归、川芎、延胡索、郁金、益母草、牛膝、桃仁、红花、

丹参、鸡血藤、乳香、没药、血竭、蒲黄、赤芍药、延胡索等。

### 何谓气逆？气逆患者服膏方 可选用什么中药

气逆是指气的升降失常，脏腑之气逆上的病理状态。多与情志、饮食寒温不适、痰浊壅塞有关。气逆最常见于肺、胃、肝等脏腑。肺气上逆表现为咳逆上气、咳嗽哮喘、痰多气急、胃失和降、胃气上逆表现为恶心、呕吐、嗳气、胸中不舒、呃逆不止；肝气上逆则头痛头胀、面红目赤，甚至可吐血、昏厥。气机上逆宜降逆下气，如肺气上逆可用苏子、杏仁、桑白皮；胃气上逆可用丁香、柿蒂、旋复花等；肝气上逆可用代赭石、灵磁石等。气逆患者服用膏方可根据病情酌情选用。

### 何谓气陷？气陷患者服膏方 可选用什么中药



气陷是指气虚升举无力，清阳之气不升而反下陷所表现的虚弱状态。气陷一般是气虚的发展或是气虚的特殊表现形式。由各种原因导致气虚升举无力，清阳之气不升而反下陷所致。临床表现既有气虚的一般表现，如神疲乏力、气短懒言、舌淡苔白、脉虚，又有清气不升、头目失养、托举无力、清气下陷的见症，如头晕眼花、耳鸣、内脏（胃、肾）下垂、阴挺、脱肛、自觉气下坠感、久泻久痢、便意频数等。治疗气陷证应选用升阳举陷、补中益气的药物。如人参、甘草、黄芪、白术、升麻、柴胡、枳壳、陈皮等。气陷患者服用膏方可以选用这些中药。

## 何谓阳盛？阳盛患者服膏方可选用什么中药

阳盛是机体在疾病过程中，出现的一种阳气偏盛、功能亢奋、热量过剩的病理状态。其常由感受热邪、阴邪从阳化热、情志过极化火引起。阳盛则热，表现为实热征象，症见发热、烦躁、口渴、小便短赤、舌质红、或绛、脉数，或虽不发热，但出现一系列热象，如口渴、尿赤、苔黄、舌红等。

治疗阳热亢盛的实热证，应损其有余之阳，用药性寒凉的清热泻火药，如黄芩、黄连、黄柏、山栀、大黄、石膏、知母、夏枯草等。阳盛病人服用膏方可以选用之。

## 何谓阴盛？阴盛患者服膏方可选用什么中药



阴盛是指机体在疾病过程中所表现出的一种阴气偏盛、功能障碍或减退、产热不足、以及病理性代谢产物积聚的病理状态。多由于感受寒湿阴邪、或过食生冷，寒邪直中脾胃，脾阳受损，便可见脘腹冷痛、呕吐、腹泻等症。寒为阴气盛的表现，里寒证的四大特征：寒为畏寒怕冷、脘腹冷痛；白为苔白、面晄白、小便清长；稀为痰稀薄、便溏、带稀；迟为脉迟、月经延期。治疗应采用“寒者热之”的方法，则用温热药物以祛其阴寒过盛。常用的中药有附子、肉桂、桂枝、吴茱萸、细辛、干姜等。阴盛患者服用膏方可以选用。

## 何谓痰湿？痰湿患者服膏方可选用什么中药

痰湿是津液代谢障碍所形成的病理产物。这些病理产物形成



之后,又能直接或间接作用于人体某一脏腑组织,发生多种病证,故又属致病因素之一。痰湿多因体质肥盛、恣食厚味,导致脾失健运,精气不能输布于全身,而痰湿内生、聚湿生痰。脾为生痰之源,痰湿上蒙可见头部沉重、疼痛如裹、胸胁满闷、呕恶痰多、舌苔白腻,脉滑;湿阻中焦可见不思饮食、脘腹作胀、口黏乏味、胸脘痞满、身重倦怠、呕吐、恶心、大便稀溏、脘腹冷痛、泻下等症;痰湿壅阻于肺,可见咳嗽、痰多易咯、胸膈满闷、舌苔白腻,脉濡缓。

治疗痰湿宜健脾、燥湿、化痰,常选用半夏、苍术、白术、茯苓、陈皮、香附等中药。痰湿患者服用膏方可选用之。

### 何谓“亚健康”

“亚健康”是一个新的医学概念。20世纪70年代末,医学界依据疾病谱的改变,将过去单纯的生物医学模式,发展为生物-心理-社会医学模式。1977年,世界卫生组织(WHO)将健康概念确定为“不仅仅是没有疾病和身体虚弱,而是身体、心理和社会适应的完满状态”。20世纪80年代以来,我国医学界对健康与疾病也展开了一系列的研究,其结果表明,当今社会有一庞大的人群,身体有种种不适,如情绪低落、心情烦躁、忧郁焦虑、胸闷心悸、失眠健忘、精神不振、疲乏无力、腰背酸痛、易感疾病等,而上医院检查又未能发现器质性病变,这种状态称为“亚健康状态”(又称“次健康”、“第三状态”)。也就是说“亚健康”是介于“第一态”健康与“第二态”疾病之间的身体状态,是一种潜病状态,处于这种状态下,机体虽无明确疾病,却呈现出活力降低、反应能力减退、适应能力下降,存在程度不同的各种患病的危险因素,具有发生某种疾病的高危倾向。随着生活节奏的加快和社会压力的增大,在发达国家和城市中,除了确诊的患者外,常人眼中的健康者有一半左右处于“亚健康”状态。从“2002年中国国际亚健康学术成果研讨会”



上获悉,我国目前有 70% 的成人处于亚健康状态,15% 处于疾病状态,只有 15% 处于健康状态。白领阶层是亚健康的主要人群,而企业管理者有 85% 以上处于亚健康状态。通过调研发现,造成亚健康的原因是多方面的,例如过度疲劳造成的精力、体力透支,不良生活方式、紧张焦虑等各种心理问题,人体自然衰老,心脑血管及其他慢性病的前期、恢复期和手术后康复期出现的种种不适,人体生物周期中的低潮时期等。

### 亚健康状态者服膏方可以选用什么中药

亚健康人介于“第一态”健康与“第二态”疾病之间的潜病状态,如果不加以重视,就会发展成疾病,因此,必须采取对策,尽快走出亚健康状态,回到健康者的队伍中来。摆脱亚健康状态最主要的是靠积极主动的自我保健措施,除了建立起良好的生活节奏、健康习惯、均衡营养、体育锻炼和心理卫生之外,采用中医膏方调治是一种非常有效的办法。

中医膏方以辨证论治为原则,亚健康状态者根据中医辨证有气虚、血虚、阴虚、阳虚、气阴两虚、气血两虚、阴阳两虚等不同类型,分别要采取益气、养血、滋阴、补阳、益气养阴、益气养血、调补阴阳等治疗法则,然后选择相应的膏方进行调补。气虚者可以选择黄芪、党参、白术、茯苓、山药等中药做成膏滋药;血虚者可以选择熟地黄、阿胶、白芍药、川芎、当归、黄芪、大枣等做成膏滋药;阴虚者可以选择沙参、麦门冬、天门冬、五味子、生地黄、石斛等做成膏滋;阳虚者可以选择淫羊藿、仙茅、补骨脂、肉苁蓉、锁阳、杜仲、狗脊等中药做成膏滋药;气阴两虚可以选择太子参、西洋参、五味子、麦门冬、天门冬等中药;气血两虚可以选择黄芪、当归、党参、白术、川芎、熟地黄、白芍药、茯苓、炙甘草等中药;阴阳两虚者可以选择枸杞子、熟地黄、山茱萸、菟丝子、杜仲、天门冬、沙参、玉竹、黄精

等中药。兼有血瘀者,加桃仁、红花、鸡血藤等,兼有肝郁者,加合欢皮、柴胡、香附、川楝子等,兼有痰湿者,加陈皮、半夏、薏苡仁等。总之,亚健康状态者服用膏方的选药原则是以中医辨证论治为原则的,辨证施补、辨证选药是原则的体现。

## 手术后能服膏方吗

手术后可以服用膏方吗?回答是肯定的。手术以后的患者,由于手术创伤耗伤气血,身体十分虚弱,如果没有进行合理的调补,身体恢复较慢。如适当应用一些具有补益作用的膏方,将促进术后早日康复。

术后患者,一方面是原有疾病造成的人体某部分虚损,另一方面是由于手术时失血,“气随血行”,故易致气血两虚,还有手术时的消耗或术后禁食,患者又常会有津液亏损的表现。因此,术后患者常有气血亏虚、津液不足的现象。手术中出血较多,手术后患者经常会有面色苍白、神疲乏力、心悸头晕等现象,可用人参、黄芪、党参、当归、大枣、蜂蜜等中药做成膏滋药,如脾胃功能较好者,可在上述药物的基础上加用阿胶溶化后一同熬膏;若胃纳欠佳、食后腹胀者,可加用山药、陈皮、木香、鸡内金、山楂等;出虚汗较多者可加糯稻根、浮小麦;有低热者,可加地骨皮;口渴津伤者,可加百合、北沙参、芦根等。手术后的患者因气血亏虚、津液不足,常用人参(或党参)、白术、茯苓、炙甘草、熟地黄、白芍药、当归、川芎、黄芪等具有补气生血、生津的功效中药做成膏方进行调补。



## 体力劳动者能服膏方吗

体力劳动者可以服用膏方。我国杰出的古代医家、养生家孙思邈说过,人应该常欲“小劳”,劳动是谋生的手段,在劳动中锻炼

能强壮筋骨、强壮体魄,使人体内的气流畅通,所以适当的劳动于身体有益,不会影响健康。但凡事都有度,若过于辛劳,长期处于体力透支的状态而得不到及时的休整以恢复体力,或者素体较弱,不能胜任过重的体力劳动而勉强为之,将会“积劳成疾”、过劳而病。中医对过劳致病有精辟的论述,认为劳则气耗,过度的体力劳动会消耗人的元气,会出现神疲乏力,少气懒言,声音低怯,动则汗出,胸闷气短,头晕心悸,肢体倦怠,腰酸背痛,不耐劳累,容易感冒等症状,进一步发展,还会引起血虚、阴亏、阳虚、水停、血瘀等证,所以,体力劳动者为保持健康的体魄,可以在医生的指导下在平时或冬季用膏方进行调补。

### 脑力劳动者能服膏方吗

脑力劳动者可以服用膏方。当今社会,随着科学生产力的不断发展,从事脑力劳动的人越来越多,除了科学家、医生、教师、律师、新闻工作者外,还有企业的管理人员、白领一族等,几乎每天都面临着新的挑战,精神压力很大,面对日益激烈的竞争局面、城市生活的快节奏,许多人付出了长期的超负荷的脑力劳动,这种脑力透支,妨碍了大脑细胞对氧和营养的及时补充,使内分泌功能紊乱,交感神经系统兴奋过度,自主神经系统失调,导致脑疲劳,使人体处于“亚健康”状态。有些人已经表现出头晕头胀、失眠、多梦、四肢无力、精神难以集中、感觉迟钝、记忆力减退;或出现心惊肉跳、恐惧、情绪低落、犹豫不决、烦躁易怒等情志变化,以及淋巴结肿大、性功能减退、上火便秘、没有食欲、经常性感冒、无名低热等症状。中医认为,思虑太过,用脑过度,劳神太甚,最容易耗伤精血。因此,脑力劳动者为保持旺盛的精力,远离亚健康状态,应该适当进行调补,服用补养精血的膏方。

## 更年期能服膏方吗

更年期是一个医学名词。更年期是妇女生理上的一大转折点,可以早在 40 岁跨入,也可迟至 50 岁才启步。惟一的标准,指的是卵巢功能从旺盛状态逐渐衰退到完全消失的一个过渡时期,包括绝经和绝经前后的一段时间。女性在更年期,随着卵巢功能的退化,雌激素的分泌逐渐减少直至消逝,皮肤、黏膜、骨骼、内脏、肌肉、血管、神经等 400 多个部位的组织或器官发生退行性变化,会出现种种不同程度的临床表现,称“更年期综合征”常见的症状,如烘热汗出、心慌气短、胸闷不适、心律不齐、血压波动、头痛、情绪波动、烦躁不安、焦虑、恐惧、失眠、多疑、记忆力减退、注意力不集中、月经紊乱、皮肤干燥、骨质疏松、肌肉酸胀痛、乏力、便秘等,是生命过程中的多事之秋。

中医认为妇女在绝经前后,肾气由盛渐衰,天癸由少渐至衰竭,冲任两脉也随之而衰少,在此生理转折时期,受内、外环境的影响,如素体阴阳有所偏胜偏衰,素性抑郁,宿有痼疾,或家庭、社会等环境改变,易导致肾阴阳失调而发病。“肾为先天之本”,又“五脏相移,穷必及肾”,故肾阴阳失调,易波及其他脏腑,而其他脏腑病变,久则必然累及于肾,故本病之本在肾,常累及心、肝、脾等多脏、多经,致使本病证候复杂。针对肾气由盛渐衰,阴阳失调这一特点,更年期的调补应注重补肾。可以用仙茅、淫羊藿、巴戟天、熟地黄、白芍药、黄柏、知母、当归等中药做成膏滋药进行调补,并根据阴阳的偏胜偏衰进行加减配方。



## 产妇能服膏方吗

产妇由于分娩时屏气、失血,消耗较多的体力和气血,常出现

头晕乏力,腰酸腿软,四肢无力,心悸心慌,苔薄、舌淡,脉细弱等气血虚弱、肾气不足的症状,故有“产后百节空虚”的说法,加上母乳喂养,产妇气血更虚,这是虚的一面。但是另一方面产后胞宫余血浊液(恶露)容易瘀滞,有瘀血内阻的一面,因此,构成产后“多虚多瘀”的特点。总之,产后脏腑虚损,百节空虚,腠理不实,卫表不固,摄生稍有不慎更可发生各种产后疾病。因此,产后的调养和护理十分重要。根据亡血伤津、瘀血内阻、多虚多瘀的特点,本着“勿拘于产后,亦勿忘于产后”的原则,结合病情用膏方进行调补,将有助于产妇恢复元气。所以,产妇可以服用膏方。在选配膏方时,原则上以大补气血为主,但其用药须防滞邪、助邪之弊。产后多瘀,当以活血行瘀之法,然产后之活血化瘀,又须佐以养血,使祛邪而不伤正,化瘀而不伤血。选用膏方,必须照顾气血。针对产妇全身情况,分辨虚实,虚则宜补,实则宜攻,不能一概使用大补,导致助邪留瘀。

产后常见腰骶酸痛、足跟痛、头晕乏力、胃纳减少等症,可用熟地黄、怀山药、当归、杜仲、怀牛膝、枸杞子、菟丝子、茯苓、狗脊等药做成膏方服用。如产后失血过多,出现头晕眼花,心悸心慌,失眠多梦,乏力倦怠,纳少便溏,舌质淡,脉细无力,可用当归、白芍药、党参、黄芪、肉桂、熟地黄、五味子、茯苓、酸枣仁、广木香、龙眼肉等做成膏方服用。

### 孕妇能服膏方吗

孕妇在妊娠期间,由于聚血养胎,会出现相对不足的现象,如果不能保证营养物质的需求,会使不足的情况更加明显,如出现小腿抽筋等。有些妇女在妊娠早期反应较重,影响进食,更影响到气血的化生,这样一来,就会出现虚证。这时,进行及时的调补,不仅是孕妇本身的需要,也是胎儿健康生长的需要,也可以为分娩作些

储备。膏方作为补剂的常用剂型,同样可以在妇女妊娠期间发挥作用,所以说孕妇是可以服用膏方的。孕妇的恶阻现象大多由脾胃虚弱、胃气不和或肝血不足所致,宜用健脾和胃、养血柔肝的补益药物配合和胃止呕的药物,如党参、白术、茯苓、半夏、陈皮、生姜、大枣、白芍药、熟地黄、竹茹等做成膏方服用;妊娠期间有胎动不安者,可用有益气养血、固肾安胎作用的中药,如党参、菟丝子、杜仲、续断、白芍药、熟地黄、白术、黄芪等做成膏方服用;孕妇出现小腿抽筋等现象,可以用养血柔筋的白芍药、熟地黄、枸杞子、木瓜、当归、炙甘草等做成膏方服用。有人担心孕妇进补会使生育困难,这是没有道理的。值得一提的是,孕妇服用膏方,应在医生的指导下进行,从少量开始,不宜过多,否则会影响脾胃功能;还应注意避免服用某些具有滑胎、坠胎性质的膏方,以免造成流产。

### 老年人能服膏方吗



人上了一定的年纪,元气日见衰惫:50岁肝气始衰,60岁心气始衰,70岁脾气虚,80岁肺气衰,90岁肾气焦。可见,老年人各方面的功能都不如从前了,脏腑功能衰退、阴阳气血不足、抗病能力下降……出现头晕眼花、耳鸣耳聋、齿摇发落、腰酸肢楚、失眠健忘、气短懒言、神疲乏力等虚弱症状,这些都是老年虚证的表现。用膏方进补调理,有助于恢复脏腑功能,调补阴阳气血的不足,延缓衰老,减少老年病的发生,改善心脑血管功能,提高生活质量,所以老年人服用膏方非常合适。

### 中年人能服膏方吗

人到中年,肩上的担子最重,上有老,下有小,家庭、事业都要求中年人付出更多的精力,而这一时期体内各器官、系统却逐渐出

现了衰退现象,许多人处于亚健康状态,最容易罹患各种疾病。这时,应该为身体充电,服用膏方是一种很好的补益精气的方法,值得选用。中年人服用膏方也应该在医生的指导下进行,根据每个人的情况辨证选方。

中年肺气虚衰,体表不固,经常自汗、容易感冒的,应注意补益肺气。可以选用人参、黄芪、白术、党参、防风、五味子、麦门冬等做成膏方;白发增多、腰酸耳鸣等早衰情况比较明显的,应以补益肾气为主,可以选用山药、山茱萸、熟地黄、枸杞子、菟丝子、覆盆子、杜仲、胡桃肉、黄精等做成膏方;用脑过度,有时会出现头晕目眩、心悸失眠、记忆力下降的,应着重补血养心,可以选择当归、酸枣仁、丹参、柏子仁、枸杞子、何首乌、麦门冬等做成膏方。中年人服用膏方要注意方法,少量开始,坚持进补,随时调整剂量,切忌盲目追求速效而乱用滥补。

### 青少年能服膏方吗



青少年可不可以服用膏方要看具体情况。青少年处在生长发育的旺盛时期,朝气蓬勃、精力充沛,即使患病恢复也较快,所以一般可以不服用膏方。如果平时体质较为虚弱,常易患病,或大病后体质亏耗,一时未曾恢复;或手淫频繁,身体渐虚;或学习紧张,用脑过度、耗伤心血等,都可以通过服用膏方来调养身体。

但是青少年服用膏方,应在医生的指导下合理选择,不应任意购服。一般来说,青少年体质有虚大多比较单一,程度也较轻,进补后较易见效。因而在选择补品时以性质较为平和之品为宜,缺什么,补什么,并掌握好用量,不能盲目地滥补、乱补,否则,选择不当,不但达不到疗效,反而会产生口干、便秘、流鼻血、遗精等副作用。



## 儿童能服膏方吗

儿童正在生长发育阶段,无论在解剖、生理、病理、免疫等方面,都和成年人有显著的差别。儿童的机体既有发育未成熟而较柔弱的一面,又有生机蓬勃、发育迅速的一面。中医学把儿童的这种生理特点称为“稚阴稚阳”和“纯阳之体”。基于儿童生理上有上述特点,所以儿童对疾病的抵抗力较差。气候变化时,衣服穿着稍有不慎,就容易外感咳嗽;饮食稍有不当,就会伤及脾胃;治疗稍有出入,疾病就会迅速转化,而经过适当治疗,又容易好转,很快恢复健康。对小儿的这些特点,宋代儿科专家钱乙曾总结为“脏腑柔弱,易虚易实,易寒易热”。小儿既然有虚有实,就应该进行调治,膏方作为中药剂型之一,口感好,容易被儿童接受,所以需要进行调治的儿童是可以服用膏方的。如用益气健脾的膏方以调理脾胃,增进食欲,帮助消化;用补益肺气的膏方增强体质,提高抗病能力,也可以用一些补肾的膏方来弥补先天的不足。但是儿童脏气清灵,绝对不能盲目滥补,用药要轻灵,药之性味平和而不滋腻,如用太子参、参须、蜂蜜、蜂乳、山药、大枣、莲子、黄芪等。药性猛烈或滋腻之品,反而会伤及胃气、克伐生机。此外,儿童也不宜长期进补,病证基本恢复,没有什么明显症状时,就应停用膏方,以防止体内出现阴阳偏胜,反而影响生长发育。



## 服膏方时出现便秘怎么办

服用膏方后出现便秘,首先应暂时停服膏方,待便秘问题解决后,再继续服用膏方。为什么要这样做呢?中医认为病有标本、先后,一般来说,本是指先发的、主要的病证,标是指后继出现的较为次要的病证,“急则治其标,缓则治其本”是中医治疗疾病的基本原则。

则之一,服用膏方虽然是针对原先主要病证的治本方法,但当标病比较急、比较严重的情况下,应当先治疗标病。《素问·标本病传论》曰:“小大不利治其标,小大利治其本”,就是说,在大小便不通的情况下,应该首先考虑解决大小便问题,在大小便通利的情况下才考虑治本问题。所以服用膏方后出现便秘应当首先解决便秘。

常用的方法是,先停用膏方,若停用膏方后大便通畅,说明便秘与膏方有关,多数是膏方中药性太热、太燥的关系,继续服用膏方时应适当减少膏方的剂量,同时注意饮食中适当增加膳食纤维,多喝水,多吃一些水果、蔬菜,或早晨起来喝一杯淡盐水或喝一些蜂蜜水,一般都能解决便秘问题,也不会耽误服用膏方。如果停用膏方几天后,仍然出现比较严重的便秘,那么,应该请医生分析一下便秘的原因,然后进行对症处理。

### 服膏方时出现食欲不振怎么办



有些人服用膏方后出现了食欲不振的情况,为什么会出现这种情况呢?因为膏方用药一般是以补药为主,如阿胶、熟地黄、人参等易于呆胃,如果一个人的消化功能不怎么样,吃了这些补药就更容易倒胃口,这与吃大鱼大肉、蹄膀鸡鸭太多,来不及消化是一样的道理。为了解决这个问题,在补膏中除了阿胶等补药外,医生常常会根据每一个人的脾胃状况适当加入陈皮、木香之类的理气健脾药,使补而不腻,补而不壅,作为患者在服用膏方时也要注意服用的方法。俗话说,一口气吃不了一个胖子,要掌握剂量,做到少量、持久地服用,切忌操之过急而“蛮补”(指用量过大),这样,服适量膏方既能进补,又不至于倒胃口。一旦发生食欲不振或伤食腹胀等情况,就应减少服用剂量,或者加服一些助消化的药茶,如陈皮茶、山楂茶等。一般经过如此调整,呆胃现象即可改善,可以继续服用。但如果胃部胀满不适或出现消化不良时,应暂停服用

数天,待症状消失后,减少用量再服。另外,在服用膏滋药时不要过多地吃油腻食物,以免胃肠负担过重,影响补益药物的吸收。总之,进补要讲究方法,除在病危或病重情况下,应采用较大剂量的补益药(如大剂量人参)抢救外,平时进补务必须注意日积月累、细水长流。

### 服膏方时出现胸闷腹胀怎么办

服用膏方必须通过脾胃的受纳、运化功能,始能起作用。膏方能否达到治疗、补养的目的,关键在于脾胃功能的强弱。若脾胃功能旺盛时,就可以根据疾病的需要,用胶类等血肉有情之品以补养之;若脾运不健,服用膏方,就会出现胸闷腹胀,食欲不振,大便溏薄,舌苔厚腻等现象。这时,就不能仅仅强调“虚者补之”的原则进补,应该首先停服膏方,用一些调畅气机、促进运化的药物,使气机调畅,脾胃功能健旺,这样才能继续服用膏方。要是不管何种情况,一味地蛮补、滥补,必然会进一步使气机不利,加重胸闷腹胀的症状,并损伤脾胃,非但胸闷腹胀的症状难以解除,脾胃损伤后,造成饮食不化精微,气血难以化生,导致虚更虚、实更实的尴尬局面。所以服用膏方期间出现胸闷腹胀,应该暂时停服膏方,以调理气机为先,待气机条畅、脾胃功能恢复后,再服用膏方。



### 服膏方时出现新病怎么办

弄清疾病的标本先后、轻重缓急,是辨证论治的前提,否则,治疗就会陷于盲目。服用膏方期间突然患了其他疾病,如感冒发热、伤食腹泻、胸闷腹胀、咳嗽、咯痰等,说明现在的情况已经发生了改变,治疗就不能一成不变地仍然用原先的方法,应立刻请医生诊治,暂时停服膏方。先对新近所患的疾病,进行彻底治疗,如患者

患有感冒、咳嗽、咯痰，则应先将感冒咳嗽治愈，所谓“祛邪务尽”，否则，如同“关门留寇”，不但膏方吃进去令人难受，反而使感冒咳嗽经久难愈。只有当新病痊愈，才可以继续服用膏方，真正体现“急则治其标，缓则治其本”的治疗原则。

### 服膏方时出现咳嗽痰多怎么办

中医认为，脾为生痰之源，肺为贮痰之器。服用膏方期间出现咳嗽痰多的现象，多为脾胃虚弱、运化无力，膏方补剂不能被很好地吸收利用，反而助湿生痰，进一步上乘于肺所致。所以此时，应暂时停服膏方。或者请医生诊治，适当用一些健脾理气化痰药，以促进脾的运化，从根本上解决痰多问题，待咳嗽痰多好转，再服用膏方，同时加服陈皮茶之类的健脾化痰之品。

### 服膏方时出现腹泻怎么办



服用膏方期间如果出现腹泻，首先，应该暂时停止服用膏方，因为组成膏方的大多是一些补药，其他还有性质比较滋腻的胶类、蜂蜜、冰糖等，腹泻期间脾胃功能处于紊乱状态，如果继续服用膏方，将会进一步加重脾胃的负担，不但不能吸收这些补益之品，造成浪费，而且将使腹泻进一步加重，连饮食都难以化为气血，病情变得更为缠绵，更加不易好转。第二，应该尽快找出导致腹泻的原因。导致腹泻的原因很多、很复杂，冷热不当、感受寒湿或湿热之邪，饮食失宜，进食不洁食物、油腻之品，情志因素等等均可以导致腹泻。就服用膏方而言，对有些脾胃虚弱者来说，如果一次服用太多，大大超过了脾胃的消化吸收功能，也会导致腹泻。不同的情况应区别对待，根据中医辨证论治的原则进行处理，若系服用膏方太多引起的，暂时停止服用，大便便会成形，如果大便仍比较溏薄，则

可以用一些理气健脾的药物,再配合清淡易于消化的饮食,待脾胃功能恢复后,再根据自己的消化吸收能力,减量服用,补得恰到好处,既不影响脾胃功能,又补养了身体。如果系饮食、情志引起,则又另当别论,根据不同情况进行针对性治疗。总之,腹泻应尽快治愈,不然脾胃这一“后天之本”受损,虚不受补,琼浆玉液都无济于事。

### 服膏方时出现感冒发热怎么办

服用膏方期间感冒发热是经常会遇到的事,因为伤风感冒是常见病,一年四季都会发生,尤其是冬春季节更为多见。体虚的人,由于卫气不足,抗病能力差,更容易染病。中医认为,感冒是外感六淫之邪,由皮毛、口鼻而入,邪在肌表,证属表证。常见的感冒症状有头痛、鼻塞、流涕、发热等。中医治疗疾病讲究标本、缓急,感冒属于新病,且邪在浅表,所以应当先治疗新病,所以当服用膏方期间出现感冒发热时,应暂时停服膏方,先治疗感冒。这一方面是为了尽快驱邪外出,以防“关门留寇”;另一方面,由于感冒时,人体的正常阴阳平衡被打破,脏腑的功能出现了一些变化,脾胃功能受到了一定的影响,服用的膏方不容易消化吸收,甚至会加重胃部的不适,所以暂时停服为妥。例如,某些滋阴补肾的药物,在脾胃功能正常的情况下服用后可以被吸收而起作用,但在感冒兼有消化道症状时就难以被吸收,甚至会加重胃部的不适。此时宜暂时停药,待身体恢复时再继续服用。



### 服膏方时出现皮肤瘙痒怎么办

有些老年患者常常有皮肤瘙痒症。这是由于老年人角质层水分减少,尤其在秋冬季气候比较干燥,所以皮肤瘙痒症状更突显

出。这些患者对外界刺激特别敏感,如出汗、局部摩擦、药物过敏或者接触羽毛、染料、肥皂等物均可引起瘙痒。还有一些慢性病患者,如肝胆疾病、糖尿病、肾功能不全、痛风、肠寄生虫感染、神经衰弱、甲状腺病、恶性肿瘤等病患者都可出现皮肤瘙痒症。中医认为瘙痒症与湿热、血虚、风邪等因素有关。这类患者在冬令进补时,忘了与医生谈及皮肤瘙痒症状,而且又同时患有头痛等症,在膏方中服用了全蝎、蜈蚣、蜂蜜等虫类中药,以致对虫类中药过敏引发了皮肤瘙痒加剧。

如果出现这种情况,应当暂时停服膏方,并用以下中药口服,处方为:葫芦壳 15 g,黑白丑 9 g,茯苓皮 15 g,白鲜皮 30 g,地肤子 30 g,紫花地丁 9 g,蒲公英 9 g,苍术 9 g,金银花 9 g,泽泻 15 g,蛇床子 15 g,茵陈 30 g,蚕沙(包)9 g,浮萍 9 g。水煎 20 分钟,每日 1 剂,每服 2 次,连服 2 周。

此外,还可用外洗中药,处方为:苦参 30 g,樟木 30 g,土荆皮 30 g,明矾 30 g,蛇床子 30 g,地肤子 30 g。煎水洗患处,每日 1 次,2 周为一个疗程。



# 中篇

## 常见病证的辨证选方







## 内 科

### 心脑血管系统疾病

#### 高血压病

高血压病是一种常见的慢性疾病,它以持续性动脉血压增高为主要表现,可伴有不同程度的脑、心和肾等器官的病变。凡能找到血压升高原因的高血压病称为“继发性高血压病”;找不到血压升高原因的称为“原发性高血压病”,临床上有 96%~99% 的高血压病为“原发性高血压病”,因此,本篇主要介绍“原发性高血压病”。尽管现在对高血压病的病因仍未阐明,但发现与遗传、肥胖、饮酒、摄取过多的氯化钠以及长期处于有害心身的社会环境(过度紧张、精神刺激、过度抑郁、睡眠不足)等有关。本病发病率很高,与年龄、职业、家族史有一定关系。



高血压病归属于中医学的“头痛”、“眩晕”、“中风”等范畴。按照中医辨证有虚实之分,病变部位主要在肝、肾两脏,病机为阴阳平衡失调。实证多因郁怒伤肝、肝郁化火、肝阳亢盛所致,表现为高血压伴有头痛较剧、目红面赤、急躁易怒、口苦等。虚症多因久病劳损、肝肾阴虚、虚火上扰所致,表现为高血压伴有眩晕耳鸣、腰膝酸软、精神萎靡、烦躁失眠等。

#### 一、膏方选用

##### 1. 肝阳上亢型

##### 【方药】

罗布麻 100 g 天麻 100 g 黄芩 150 g 山梔 150 g 生地黄 200 g 玄参 150 g 夏枯草 150 g 杭白菊 150 g 钩藤 200 g 草决明 150 g 生龙骨 300 g 酸枣仁 200 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有头痛眩晕重者,加石决明 300 g,珍珠母 300 g。

如口干热盛,大便燥干者,加生石膏 300 g,生大黄 90 g。

## 2. 肝肾阴虚型

### 【方药】

生龙骨 300 g 生牡蛎 300 g 怀牛膝 200 g 玄参 150 g 枸杞子 100 g 白菊花 60 g 桑椹 150 g 白芍药 150 g 生地黄 200 g 女贞子 200 g 桑寄生 200 g 龟版胶 200 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有心慌失眠者,加珍珠母 300 g,炒枣仁 200 g。

如有四肢麻木者,加天麻 150 g,僵蚕 200 g。

## 二、自我调摄

- (1) 劳逸适度,情绪稳定,保持有规律的生活、愉快的心情。
- (2) 饮食有节,多吃新鲜蔬菜、水果,少饮酒和低盐饮食。
- (3) 忌烟。
- (4) 坚持长期服药调整血压。



## 中风后遗症

中风是危害人类健康的重大疾病,其发病率、病死率、致残率均很高,且随着年龄的增加而增加。本病与冠心病、肿瘤同为老年人的三个高病死率病种。中风可分为出血性中风和缺血性中风:脑出血和蛛网膜下隙出血属于出血性中风;脑血栓形成和脑梗死属于缺血性中风。中风发病半年以上者,即为中风后遗症期。常见的症状有偏瘫,口舌喎斜,失语或不语,感觉减退或消失。

中风后遗症按照中医辨证属本虚标实,本虚则以气虚、阴虚为主,标实则以血瘀、痰浊为主。临床分型为气虚血瘀型和阴虚风动型。气虚血瘀型,表现为半身不遂,口舌歪斜,言语謇涩或不语、偏身麻木、面色㿔白、气短乏力、口角流涎、自汗出、手足肿胀等。阴虚风动型,表现为半身不遂、口舌喎斜、言语謇涩或不语、偏身麻木、眩晕耳鸣、烦躁失眠、手足心热等。

### 一、膏方选用

#### 1. 气虚血瘀型

##### 【方药】

炙黄芪 500 g 红花 100 g 川芎 150 g 桃仁 150 g 当归 150 g 赤芍药 150 g 地龙 150 g 丹参 200 g 郁金 150 g 川断 150 g 牛膝 150 g 阿胶 200 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

##### 【加减变化】

如有气虚症状明显者,加党参 200 g,太子参 200 g。



如有言语不利者,加远志 100 g,石菖蒲 150 g。

如有肢体麻木者,加木瓜 150 g,伸筋草 200 g。

如有小便失禁者,加桑螵蛸 150 g,益智仁 150 g

## 2. 阴虚风动型

### 【方药】

生白芍 200 g 玄参 150 g 天门冬 150 g 生龙骨 300 g 生牡蛎 300 g 代赭石 200 g 天麻 150 g 钩藤 150 g 杭白菊 150 g 龟版胶 150 g 鳖甲胶 150 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有心烦失眠者,加黄芩 150 g,山栀 150 g,夜交藤 300 g。

如有头痛明显者,加石决明 200 g,夏枯草 150 g。

如有肢体强痉者,加全蝎粉 20 g,僵蚕 150 g。

## 二、自我调摄

- (1) 平时善于调节情绪,性格开朗,知足常乐。
- (2) 顺应四时规律,不可过劳或则过逸。
- (3) 调节饮食,避免膏粱厚味。
- (4) 过度饮酒可致体内湿热蕴积,所以应该避免酗酒。

## 冠心病

冠心病全称“冠状动脉粥样硬化性心脏病”,是指冠状动脉粥样硬化导致的心肌缺血、缺氧而引起的心脏病。临床上可以表现典型的突发性胸痛,疼痛呈缩窄性、窒息性或严重压迫感;也可以



无心肌缺血症状,但体格检查发现心电图有 ST 段压低或 T 波倒置变化。现代西医认为冠心病除了为动脉硬化所致外,其他,如主动脉关闭不全、主动脉炎、肥厚性心肌病、冠状动脉畸形等也可引起。激动、劳累、饱食、受寒等为常见的诱因。

冠心病属于中医“胸痹心痛”范畴。其病位在心,病性为本虚标实。本虚为心气、心阳、阴血亏虚;标实为血瘀、痰浊、寒凝气滞。病机为心脉不通。按照中医辨证可分为三型:气虚血瘀型,表现为心痛时轻时重,劳累后易发,乏力气短,心悸,自汗等;阴虚血阻型,表现为心痛时轻时重,劳累后易发,心悸烦闷,失眠多梦,腰酸耳鸣,口干便秘等;胸阳痹阻型,表现为心痛彻背,遇寒加剧,得温痛减,形寒肢冷,面色㿔白,甚则喘而不得卧等。

## 一、膏方选用

### 1. 气虚血瘀型

#### 【方药】

人参 100 g 党参 150 g 黄芪 300 g 茯苓 150 g 五味子 100 g 桂枝 100 g 炙甘草 100 g 当归 150 g 川芎 150 g 赤芍药 150 g 桃仁 100 g 三七粉 50 g 葛根 200 g 丹参 200 g 阿胶 200 g



上药中除阿胶、三七粉外,其余药物加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,调入三七粉,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如心悸甚者,加生龙骨 300 g,生牡蛎 300 g。

如胸闷不畅者,加枳壳 300 g,栝楼皮 150 g。

### 2. 阴虚血阻型

#### 【方药】

生地黄 200 g 熟地黄 200 g 当归 150 g 川芎 150 g 赤芍药 150 g 桃仁 100 g 三七粉 50 g 丹参 300 g 女贞子 200 g 枸杞子 200 g 旱莲草 200 g 五味子 100 g 阿胶 200 g 龟版胶 100 g

上药中除龟版胶、阿胶、三七粉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，调入三七粉，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如失眠心悸甚者，可加炒枣仁 300 g，柏子仁 100 g。

如头昏眼花明显者，加天麻 150 g，黄精 150 g，何首乌 200 g。

### 3. 胸阳痹阻型

#### 【方药】

肉桂 30 g 枳实 150 g 薤白 200 g 桂枝 150 g 细辛 50 g 干姜 50 g 川芎 150 g 赤芍药 150 g 黄芪 300 g 当归 150 g 丹参 200 g 党参 200 g 附子 60 g 鹿角胶 150 g 阿胶 100 g

上药中除鹿角胶、阿胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将鹿角胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有心痛欲死，眼前发黑者，急服苏合香丸或麝香保心丸。

如心悸气短者，加生晒参 50 g，红参 15 g。

## 二、自我调摄

(1) 注意保持心情舒畅，避免不良的情绪刺激而诱发本病。

(2) 生活有规律，起居有常，寒温适宜，饮食宜清淡，避免膏粱厚味，尤其晚餐不宜过饱。



## 心肌炎后遗症

心肌炎后遗症是以心律失常为主要症状的病证。多因病毒侵犯心肌后,引起的变态反应持续不断地损伤心肌,使心肌组织形成瘢痕而成为后遗症。心肌炎后遗症患者中,有的可能有明显的心悸、心慌,有的则没有明显症状,凡遇劳累或情绪波动则易发作,但是,都可能遗留稳定的异常心电图。当其发展为严重心律失常时,会危害人体的健康。

心肌炎后遗症属中医学中“心悸”、“怔忡”的范畴,按照中医辨证以虚证为主,或虚实夹杂。多因心血心阳不足,心失所养,或阴虚火旺,扰动心神,或痰瘀交杂,痹阻心脉所致。如心血不足型,多有心悸、头晕、面色少华、倦怠乏力等;心阳不振型,心悸症状较重者,常有面白少气、形寒肢冷等;阴虚火旺型,常有心悸而烦、夜寐不安、手足心热;痰瘀痹阻型,常有心悸、胸闷、气憋、心痛、大便溏薄、纳差等症状。



### 一、膏方选用

#### 1. 心血不足型

##### 【方药】

黄芪 100 g 党参 150 g 白术 100 g 茯苓 150 g 炙甘草 90 g 当归 100 g 龙眼肉 90 g 酸枣仁 150 g 炙远志 100 g 鸡血藤 200 g 灵芝 120 g 生地黄 100 g 红枣 150 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如心悸心慌明显者，加五味子 100 g，丹参 150 g，百合 150 g。

如头晕眼花明显者，加首乌 200 g，枸杞子 150 g。

### 2. 心阳不振型

#### 【方药】

制附子 60 g 桂枝 90 g 生龙骨 300 g 生牡蛎 300 g 黄芪 150 g 党参 150 g 淫羊藿 150 g 丹参 150 g 五味子 100 g 苦参 100 g 麦门冬 150 g 炙甘草 100 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如形寒气短明显者，加生晒人参粉 30 g。

如体虚，反复感冒者，加白术 100 g，防风 60 g，白芍药 150 g。

### 3. 痰瘀痹阻型

#### 【方药】

当归 100 g 丹参 150 g 川芎 90 g 赤芍药 150 g 桃仁 100 g 红花 60 g 延胡索 100 g 玫瑰花 60 g 檀香 60 g 琥珀 60 g 郁金 100 g 石菖蒲 150 g 陈皮 60 g 茯苓 100 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如心悸、心痛症重者，加三七粉 50 g。

如食欲不振、大便溏薄、腹胀明显者，加苍白术各 100 g，炒枳实 100 g，厚朴 60 g。

## 二、自我调摄

(1) 增强体质，预防感冒，能有效地减轻心肌炎后遗症的发病。





(2)心悸发作严重时,应卧床休息,以减轻心脏负担,有助于疾病的治疗和恢复。

(3)保持良好的情绪、平静的心态,有助于早日康复。



## 呼吸系统疾病

### 反复感冒

感冒是因风邪侵犯人体所引起的以头痛、鼻塞、喷嚏、恶寒、发热等为主要临床表现的常见疾病。反复感冒是指具有反复发作特点的感冒,现代西医认为本病是因机体免疫功能低下所致的一种病症。

反复感冒在中医学中归属于“体虚感冒”的范畴,多因素体正气亏虚,或大病、久病后正气未复,肺卫不固,外邪入侵所致。按照中医辨证可分为气阳两亏型和阴血不足型。气阳两亏型,平时多有倦怠乏力、气短懒言、四肢不温等;阴血不足型,平时多见面色苍白、唇甲色淡、心悸头晕、口干咽燥等,本篇主要介绍反复感冒的防治膏方。



#### 一、膏方选用

##### 1. 气阳两亏型

##### 【方药】

人参 30 g 党参 150 g 黄芪 300 g 白术 150 g 茯苓 150 g 桂枝 100 g 防风 100 g 紫苏 100 g 荆芥 100 g 细辛 60 g 桔梗 60 g 前胡 100 g 生甘草 50 g 蛤蚧一对 阿胶 150 g

上药除阿胶、人参、蛤蚧外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,人参另煎兑入,蛤蚧研粉调入,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

##### 【加减变化】

如怕冷重且有头身痛明显者,加附子 60 g,麻黄 100 g,羌活 30 g,白芷 100 g。

如平时身体倦怠明显者,去桔梗、前胡,加生晒参粉 50 g,紫河车粉 50 g。

## 2. 阴血不足型

### 【方药】

玉竹 300 g 生地黄 150 g 麦门冬 250 g 山药 150 g 沙参 200 g 川芎 60 g 白薇 150 g 葛根 100 g 桔梗 60 g 薄荷 100 g 荆芥 100 g 防风 100 g 甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有咽喉干涩不利者,加牛蒡子 100 g,金银花 100 g,射干 100 g。

如平时心悸头昏、唇甲苍白者,去桔梗、薄荷、葛根,加白芍药 150 g,当归 100 g,枸杞子 150 g,女贞子 150 g。

## 二、自我调摄

(1)加强身体锻炼,补充食物营养,以增强体质,预防感冒。

(2)注意起居有节,同时应加强防寒保暖。

(3)生活和工作的场所要保持空气流通、清新,特别是在感冒流行期间,经常消毒室内空气,预防传染。(食醋熏蒸法:每立方米空间用食醋 5~10 ml,加水 1~2 倍稀释后加热,每日或隔日熏蒸 1 次。)

## 慢性支气管炎

慢性支气管炎是由多种因素引起的气管、支气管黏膜及其周



围组织的慢性非特异性炎症,临床表现为反复发作咳嗽、咳痰或伴有喘息。多见于中、老年患者,患病率随年龄增加而增加。西医认为慢性支气管炎的病因主要是:理化刺激,如吸烟使支气管结构破坏、功能障碍、抵抗力下降而致病,化学毒物、粉尘等也能促使发病;内在因素,呼吸道免疫功能低下及自主神经功能失调而易受感染;感染因素,呼吸道细菌或病毒感染是本病发生的一个重要因素;过敏因素,慢性支气管炎特别是哮喘型与过敏造成的变态反应有关。

慢性支气管炎归属中医的“咳嗽”,“痰饮”等范畴。由于邪客于肺,肺气郁闭,发而为咳;痰湿渍肺,肺失肃降,肺气上逆,则喘不得卧。按照中医辨证可分为六型:外寒内饮型,常有恶寒、周身酸楚、咳嗽痰多、色白黏腻、气短喘息、舌苔白滑。痰热郁肺型,常有咳嗽喘急、胸满气粗、痰黄黏稠、烦躁口渴、溲黄便干、舌红苔黄。肺肾阴虚型,常有气短动则甚、腰膝酸软、夜尿频数、咳甚遗尿、咯痰量少、舌红少苔。肺脾两虚、痰浊内阻型,常有痰多咳喘、少气懒言、困倦乏力、胃胀纳差、大便溏薄、反复感冒、舌苔白厚。气虚血瘀型,常有自汗恶风、反复感冒、气短难续、动则益甚、口唇紫绀、舌质淡有瘀斑。肺肾气虚型,常有咳嗽气喘、动则加重、乏力、腰膝酸软、夜尿频数等。



## 二、膏方选用

### 1. 外寒内饮型

#### 【方药】

炙麻黄 100 g 杏仁 150 g 桂枝 100 g 细辛 60 g 干姜 50 g 半夏 150 g 五味子 50 g 白芍药 150 g 炙甘草 50 g 苏子 150 g 莱菔子 150 g 白芥子 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如怕冷明显者,加附子 50 g。

如痰白而多者,加茯苓 150 g,苍术 100 g,薤白 100 g。

### 2. 痰热郁肺型

#### 【方药】

炙麻黄 100 g 制半夏 150 g 生石膏 300 g 生姜 15 g 大枣 100 g 甘草 50 g 桑白皮 300 g 黄芩 200 g 杏仁 150 g 苏子 150 g 山梔 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如痰稠咯出不易者,加栝楼皮 150 g,鱼腥草 300 g。

如痰鸣喘息者,加射干 150 g,葶苈子 150 g。

### 3. 肺肾阴虚型

#### 【方药】

五味子 100 g 生地黄 200 g 山茱萸 150 g 山药 200 g 牡丹皮 150 g 泽泻 150 g 茯苓 150 g 桑白皮 150 g 龟版胶 200 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如气喘明显者,加生白果(打碎)150 g,代赭石 200 g。

如咯痰不爽者,加川贝母 100 g,栝楼皮 150 g。

### 4. 肺脾两虚、痰浊内阻型

#### 【方药】

熟地黄 200 g 当归 150 g 黄芩 150 g 白术 150 g 半夏 150 g 陈皮 100 g 生姜 30 g 大枣 100 g 苏子 150 g 莱菔子 150 g



上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是喘咳气短,动则甚者,加沉香 100 g。

如是痰色转黄者,加鱼腥草 300 g,黄芩 200 g。

## 5. 气虚血瘀型

### 【方药】

人参 50 g 黄芪 300 g 白术 150 g 山药 300 g 山茱萸 150 g 熟地黄 200 g 党参 150 g 桃仁 150 g 红花 100 g 赤芍药 150 g 茜草 150 g 阿胶 150 g

上药除阿胶、人参外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,人参另煎兑入,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是喘咳气短者,加胡桃肉 150 g,淫羊藿 200 g。

如是咯痰量多者,加茯苓 150 g,陈皮 100 g,桔梗 200 g。

## 6. 肺肾气虚型

### 【方药】

人参 100 g 冬虫夏草 30 g 茯苓 150 g 杞子 150 g 女贞子 150 g 淫羊藿 150 g 山茱萸 150 g 五味子 100 g 丹参 150 g 蛤蚧一对 阿胶 100 g 鹿角胶 150 g

上药除人参、冬虫夏草、蛤蚧、阿胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,将冬虫夏草、蛤蚧烘干研粉,人参另煎兑入,冲入清膏和匀,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如面色暗,唇舌紫者,加桃仁 150 g,红花 100 g。



如气短明显者,加蛤蚧一对(烘干研粉)胡桃肉 150 g。

## 二、自我调摄

- (1)慎起居,适寒温,感冒流行季节,少去或不去公共场所。
- (2)饮食宜清淡,富有营养。
- (3)根据自己的体力和爱好,选择体育项目,坚持锻炼。

### 哮喘(缓解期)

哮喘是一种常见的反复发作的肺系疾患。临床以发作性喉中哮鸣有声,呼吸困难,甚则喘息不能平卧为主要表现。相当于西医的支气管哮喘病。多因过敏因素,如花粉、尘螨、毛屑等,使支气管过敏,充血、水肿、痉挛所致;或细菌、病毒感染所致;或遗传因素等,都可能造成哮喘反复发作。

中医认为哮喘是由宿痰伏肺,复因外邪、饮食、情志、劳倦等因素,导致气滞痰阻、气道挛急、狭窄而发病。哮喘的缓解期正是中医辨证施治的良好时机。一般认为,病程长者,正气耗伤,病机转为正虚邪实,正虚为五脏气虚、阴虚、阳虚;邪实为痰瘀互阻。按照中医辨证可分为三型。肺气亏虚型,表现为平素自汗,怕风,常易感冒,每因气候变化而诱发。脾气亏虚型,表现为平素痰多,倦怠乏力,食少便溏,每因饮食失当而诱发。肾气亏虚型,表现为平素气息短促,动则为甚,腰酸腿软,眩晕耳鸣,不耐劳累,下肢欠温,小便清长。



## 一、膏方选用

### 1. 肺气亏虚型

#### 【方药】

人参 30 g 党参 150 g 黄芪 300 g 白术 150 g 防风 150 g

桂枝 100 g 茯苓 150 g 紫菀 150 g 款冬花 150 g 大枣 100 g  
阿胶 100 g

上药除阿胶、人参外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，人参另煎兑入，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是自汗较重者，加浮小麦 300 g，煅牡蛎 300 g。

如是痰多质稀者，加细辛 50 g，干姜 100 g。

## 2. 脾气亏虚型

### 【方药】

党参 300 g 白术 150 g 茯苓 150 g 炙甘草 50 g 陈皮 100 g 半夏 100 g 杏仁 150 g 黄芪 300 g 焦山楂 150 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是形寒怕冷，肢冷便溏者，加桂枝 100 g，干姜 100 g。

如是纳食不香者，加鸡内金 150 g，炒麦芽 150 g。

## 3. 肾气亏虚型

### 【方药】

人参 50 g 蛤蚧一对 熟地黄 300 g 山药 300 g 山茱萸 150 g 党参 300 g 黄芪 300 g 五味子 50 g 胡桃肉 150 g 紫河车 1 具 茯苓 150 g 肉桂 50 g 阿胶 100 g 鹿角胶 150 g

上药除人参、蛤蚧、紫河车、胡桃肉、阿胶、鹿角胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，将人参、蛤蚧、紫河车等研粉，胡桃肉炒熟研碎，调入清膏，再将阿胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。





### 【加减变化】

如是畏寒肢冷者,加补骨脂 150 g,淫羊藿 150 g。

如自汗甚者,加制附子 100 g,煅龙骨 300 g,煅牡蛎 300 g。

## 二、自我调摄

(1)哮喘病的发生,多有其诱因,要积极预防,避免其发作。

(2)保持良好的情绪,树立战胜疾病的信心,具有重要意义。

(3)在缓解期加强体育锻炼和耐寒、耐力训练,以增强体质,加强对气候变化的适应能力。

(4)饮食宜清淡而富有营养,忌食生冷肥甘厚味、海腥发物、辛辣等食物,并戒除烟酒。



## 消化系统疾病

### 慢性胃痛

慢性胃痛是指以胃脘部疼痛为主要症状,起病缓慢、疼痛渐进、病程较长,并伴有嘈杂、嗳气、泛酸、脘腹胀满等症的一类病症。主要包括慢性萎缩性胃炎,慢性浅表性胃炎,胃、十二指肠溃疡等病。

中医认为慢性胃痛起病较缓,病程较长,多因素体脾胃虚弱,或久病体虚,中气不足,稍受寒热,或饮食不节,或情志刺激等因素,逐渐发展成为慢性胃脘痛。按照中医辨证可分五型。脾胃虚寒型,表现为胃冷隐痛,喜按喜热,纳少便溏,得食痛减,遇冷加重,餐后饱胀,舌淡苔白;胃阴亏虚型,表现为胃热隐痛,口干舌燥,纳呆干呕,大便干结,舌红少津;瘀血停胃型,表现为胃痛如割,痛久拒按,痛处不移,入夜尤甚,食后痛重,舌质紫暗;痰饮停胃型,表现为胃脘疼痛,胸腹满闷、呕吐痰涎,口黏不爽,口淡不饥,舌苔白厚腻;湿热阻胃型,表现为胃脘热痛,胸脘痞满,口苦口黏,纳呆嘈杂,肛门灼热,大便不爽,小便不利,舌苔黄腻。



#### 一、方方选用

##### 1. 脾胃虚寒型

##### 【方药】

黄芪 300 g 党参 300 g 桂枝 100 g 白芍药 150 g 干姜 100 g 吴茱萸 50 g 白术 150 g 茯苓 150 g 炙甘草 50 g 延胡索 200 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再

加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如是泛吐痰涎者, 加陈皮 100 g, 半夏 150 g。

如是大便清稀者, 加肉豆蔻 100 g, 白豆蔻 60 g, 砂仁 60 g。

## 2. 胃阴亏虚型

### 【方药】

北沙参 150 g 麦门冬 150 g 生地黄 200 g 玉竹 150 g 白芍药 150 g 淡竹叶 100 g 石斛 150 g 枸杞子 150 g 天门冬 150 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如是灼痛嘈杂泛酸者, 加黄连 50 g, 吴茱萸 30 g。

如是口干口苦, 大便干结者, 加生石膏 300 g, 知母 100 g, 生大黄 100 g。

## 3. 瘀血停胃型

### 【方药】

党参 100 g 丹参 200 g 生蒲黄 150 g 五灵脂 150 g 生大黄 100 g 木香 30 g 檀香 60 g 三七粉 40 g 陈皮 60 g 神曲 150 g

上药除三七粉外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 将三七粉冲入清膏和匀, 再加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如是面色萎黄, 四肢不温者, 加人参 50 g, 黄芪 200 g, 附子



60 g。

如是胃脘刺痛明显者，加乳香、没药各 100 g。

如是食欲不振者，加白术 150 g，茯苓 150 g，砂仁 50 g。

#### 4. 痰饮停胃型

##### 【方药】

茯苓 150 g 桂枝 100 g 白术 150 g 苍术 100 g 厚朴 100 g 制半夏 150 g 陈皮 100 g 枳实 150 g 葶苈 100 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜、饴糖 200 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

##### 【加减变化】

如是面色㿔白，神疲乏力，泛吐痰涎者，加党参 200 g，山药 300 g，黄芪 200 g。

如是胃脘冷痛，遇寒而发，呕吐冷涎者，加吴茱萸 50 g，生姜 60 g。

如是胃痛口苦，心烦不寐，小便短赤者，加黄连 50 g，竹茹 150 g。

#### 5. 湿热阻胃型

##### 【方药】

黄连 100 g 厚朴 100 g 山栀 150 g 制半夏 150 g 吴茱萸 40 g 藿香 150 g 六一散(包)200 g 黄芩 150 g 佩兰 150 g 川楝子 150 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

##### 【加减变化】

如是口中黏腻，脘痞、苔腻者，加薏苡仁 300 g，荷叶 150 g。



## 二、自我调摄

(1)注意一年四季气候变化,适时调摄,春夏养阳,秋冬养阴,以养其生。

(2)注意饮食有节,忌食辛辣肥腻;起居有时,劳逸结合,防止过劳。

### 反流性食管炎

反流性食管炎是因胃内容物反流入食管,引起食管黏膜充血、水肿、糜烂等炎性改变,以及食管功能障碍的一种常见病,临床以烧心痛(即胸骨后烧灼感或烧灼样痛)、反酸和(或)吞咽困难等为主要症状。正常人食管下端的括约肌在不进行吞咽活动时是紧闭的,可以防止胃内容物向食管反流。当精神紧张,或过多进食酸性食物、高脂肪饮食、辛辣饮食,或长期吸烟嗜酒,或经常服用阿托品、阿司匹林等药物等,都可诱发或加重本病。

反流性食管炎属于中医学“反酸”、“胸痛”、“噎膈”等范畴,中医认为情志不畅、饮食不节、脾胃虚弱都可使胃气上逆而致本病,按照中医辨证有虚实之别。如脾胃虚弱型,多为偶尔有咽下困难、泛吐清水、疲乏无力、食欲不振;肝胃郁热型,多为急躁易怒、胸骨后有烧灼样疼痛,可连及两胁肋,食后症状加重,口苦口干,泛吐酸苦水;痰气互阻型,多有吞咽时有顿阻感、嗝气呃逆、呕吐痰涎、胸腹部胀闷。



## 一、方方选用

### 1. 脾胃虚弱型

#### 【方药】

炙黄芪 200 g 党参 200 g 白术 150 g 白芍药 300 g 半夏

100 g 茯苓 150 g 黄芩 60 g 川连 30 g 干姜 60 g 陈皮 60 g 山药 150 g 炙甘草 90 g 柿蒂 60 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是形寒明显者,加制附子 60 g,肉桂 15 g。

如形体渐见消瘦,口干渴思饮者,去川连、干姜,加枸杞子 100 g,石斛 100 g,麦门冬 100 g。

## 2. 肝胃郁热型

### 【方药】

半夏 100 g 陈皮 60 g 竹茹 100 g 茯苓 150 g 川连 50 g 枇杷叶 150 g 郁金 100 g 牡丹皮 100 g 焦山栀 100 g 夏枯草 150 g 白芍药 150 g 川楝子 150 g 炙甘草 60 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是口苦、口干,大便干结者,加生地黄 150 g,麦门冬 150 g。

如是胸骨后烧灼痛明显者,加蒲公英 300 g,生地榆 150 g,白及 100 g,丹参 150 g。

## 3. 痰气互阻型

### 【方药】

丹参 100 g 郁金 100 g 栝楼皮 150 g 枳实 100 g 半夏 100 g 陈皮 60 g 厚朴 100 g 茯苓 150 g 苍白术各 100 g 旋复花 150 g 紫苏 100 g 沙参 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水



调服。

### 【加减变化】

如吞咽时梗阻感明显者,加穿山甲 100 g,川贝母 100 g,夏枯草 150 g。

如是食后脘腹胀满明显者,加莱菔子 100 g,麦芽 150 g,山楂 100 g。

如是经常泛吐痰涎者,加旋复花 200 g,公丁香 60 g。

## 二、自我调摄

(1)餐后不宜马上活动,严禁餐后头低位仰卧或侧卧,以避免胃内容物反流。

(2)戒烟酒,禁辛辣、热烫,少食咖啡、巧克力,以减少发病机会。

(3)保持心情舒畅,自我调整工作压力,有助于疾病的早日治愈。

## 胃下垂



胃下垂是指站立时,胃的下缘降达盆腔,胃的上缘最低沉降至髂嵴连线以下。轻度胃下垂患者可无症状,中度、重度胃下垂者有上腹饱胀,恶心、嗝气、厌食等,有时腹部有深部隐痛感,餐后、久站及劳累后症状明显加重。长期胃下垂者,常有消瘦、乏力、站立性昏厥等。西医认为胃下垂多因膈肌悬吊力不足,肝胃、膈胃韧带松弛,腹内压力下降及腹肌松弛等引起。

轻、中度胃下垂患者按照中医辨证以虚证为主,多因脾胃虚弱、中气不足、升举乏力所致,临床表现为脘腹饱胀,食后加重,不思饮食,疲乏无力,形体消瘦等。重度胃下垂患者宜手术治疗。

## 一、膏方选用

### 脾胃虚弱型

#### 【方药】

人参 50 g 生黄芪 200 g 党参 200 g 白术 100 g 白芍药 150 g 枳实 150 g 茯苓 100 g 柴胡 60 g 升麻 60 g 陈皮 50 g 木香 30 g 当归 100 g 炙甘草 50 g 砂仁 50 g 麦芽 150 g 大枣 150 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁后隔水炖烊,冲入清膏和匀,再加蜂蜜、饴糖各 200 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如食欲不振、大便溏薄者,加甘松 90 g,薏苡仁 100 g,山药 150 g,莲子 100 g。

如频频泛吐清水,时而恶心者,加旋复花 150 g,半夏 100 g,柿蒂 60 g。

如形寒肢冷,脘腹喜温暖者,加干姜 60 g,制附子 30 g,补骨脂 100 g,益智仁 100 g。

## 二、自我调摄

(1) 宜少食多餐,以保证营养。

(2) 餐后不宜马上运动,宜坐卧休息,以减轻症状。

## 慢性腹泻

腹泻是胃肠道疾病中一种常见的症状,指排便次数多于平时,粪便稀薄,带有不消化物,或混有脓血黏液。腹泻分急性和慢性两种,一般认为病程在 2 个月以上者,或间歇期在 24 周内复发性腹





泻称为“慢性腹泻”。本病症常见于西医临床上的慢性非特异性溃疡性结肠炎、肠易激综合征、慢性结肠炎、肠结核、克罗恩病、小肠吸收不良和假膜性肠炎等。

慢性腹泻，中医称为慢性泄泻，多因脾胃虚弱，或肝气犯脾，或脾肾阳虚，使脾失健运，又复感外邪，或饮食所伤，导致大肠传导失司，清浊相混而下。按中医辨证可分为三型。肝脾失调型，表现为腹痛、肠鸣、泄泻，每因情志不畅而发，泻后痛缓，舌红苔薄白；脾气亏虚型，表现为大便溏薄，夹有不消化食物，稍进油腻则大便次数增多，舌淡苔薄白；脾肾阳虚型，表现为晨起泄泻，大便中夹有不消化食物，脐腹冷痛，喜暖，形寒肢冷，舌淡胖苔白。

## 一、膏方选用

### 1. 肝脾失调型

#### 【方药】

白术 200 g 白芍药 300 g 陈皮 100 g 党参 100 g 柴胡 100 g 枳壳 300 g 乌药 60 g 山药 300 g 扁豆 150 g 芡实 200 g 石榴皮 150 g 甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

#### 【加减变化】

如便秘与腹泻交替出现者，加木香 150 g，砂仁 100 g。

如腹痛即泻，泻后痛不减者，加青皮 100 g，香附 100 g。

如胃中吞酸嘈杂者，加黄连 50 g，吴茱萸 50 g。

### 2. 脾气亏虚型

党参 200 g 黄芪 300 g 茯苓 200 g 白术 200 g 山药 200 g 扁豆 150 g 莲肉 150 g 砂仁 50 g 薏苡仁 300 g 陈皮 100 g 桔梗 100 g 人参 50 g 阿胶 150 g

上药除莲肉、阿胶、人参外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合



并滤液,加热浓缩为清膏,人参另煎兑入,莲肉炖至酥烂捣成泥状后调入,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是食欲不振者,加焦山楂 150 g,神曲 150 g,炒麦芽 150 g。

如是腹胀痛、暖气者,加木香 100 g,沉香 30 g。

### 3. 脾肾阳虚型

#### 【方药】

补骨脂 150 g 肉豆蔻 150 g 吴茱萸 50 g 五味子 100 g  
党参 200 g 干姜 100 g 白术 200 g 鹿角胶 150 g

上药除鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是年老体虚,久泻不止者,加黄芪 200 g,赤石脂 200 g。

如是畏寒肢冷者,加制附子 100 g,炮姜 100 g。

## 二、自我调摄

(1) 注意饮食清淡,勿食油腻或不易消化食物,或生冷瓜果等,减轻肠胃负担。

(2) 注意保暖,勿受湿受凉,以免病情反复或加重。

## 习惯性便秘

习惯性便秘是指经常性的排便困难,或排便间隔时间延长。虽然便秘是临床常见的症状,可独立存在,但是也可发生在肠道病变、全身性病变和神经系统病变中。引起便秘的原因很多,其



中肠易激综合征导致的肠功能紊乱是最常见的便秘原因。习惯性便秘在临床上的发病率较高,尤其在老年人中发病率更高。

中医认为习惯性便秘的病位在大肠,因大肠传导功能失常所致,但是与肺、脾、肝、肾关系密切。肺热移于大肠,使大肠传导失职;脾虚失运,糟粕内停;肝气郁结,大肠不畅;肾精亏耗,肠津涩少;肾阳虚衰,阴寒结肠。按照中医辨证可分五型。气机郁滞型,表现为大便干结或不干,排便费力,艰涩不畅,排便之后犹感便意未尽,妇女可随情绪变化病情有所增减,舌淡红苔白;气虚失运型,表现为大便燥结不甚或并不干燥,但便秘难解,临厕努责,努责则汗出气短,便后疲惫,平素神疲气怯,四肢无力,纳差食少,舌淡苔白;血虚肠燥型,表现为大便干燥,秘结不通,头晕目眩,心悸失眠,多梦健忘,面色萎黄,舌淡苔白;肝肾阴虚型,表现为大便干结,或如羊屎,形体消瘦,五心烦热,颧红咽干,头晕耳鸣,腰膝酸软,舌红少津;脾肾阳虚型,表现为大便涩滞,排出困难,腹中冷痛,肢冷畏寒,腰膝酸软,面色㿔白,舌淡苔白。

## 一、膏方选用

### 1. 气机郁滞型

#### 【方药】

沉香 100 g 木香 150 g 槟榔 150 g 乌药 150 g 枳实 150 g 大黄 100 g 莱菔子 150 g 栝楼仁 150 g 当归 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~20 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如月经不调,乳胀者,加柴胡 100 g,香附 100 g。

如饮食失节,食滞者,加莱菔子 150 g,厚朴 150 g。

### 2. 气虚失运型

#### 【方药】



黄芪 300 g 白术 500 g 党参 200 g 茯苓 150 g 火麻仁 300 g 槟榔 100 g 枳实 150 g 陈皮 100 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是虚坐努责而无排便者,甚至脱肛者,加升麻 150 g,柴胡 100 g,枳壳 150 g。

### 3. 血虚肠燥型

#### 【方药】

当归 150 g 生地黄 200 g 麻仁 200 g 桃仁 150 g 生首乌 200 g 白芍药 150 g 黄芪 200 g 炙甘草 50 g 麦门冬 150 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是疲乏气短者,加党参 200 g,白术 200 g。

如是大便秘结如栗,五心烦热者,加玄参 150 g,石斛 150 g。

### 4. 肝肾阴虚型

#### 【方药】

生地黄 200 g 熟地黄 200 g 山药 200 g 枸杞子 150 g 川牛膝 150 g 肉苁蓉 250 g 生制首乌(各)200 g 当归 200 g 草决明 200 g 枳壳 150 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏



和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是精神疲惫、头晕者,加黄精 150 g,党参 150 g。

如是口干者,加天门冬 150 g,麦门冬 150 g,玉竹 150 g。

## 5. 脾肾阳虚型

### 【方药】

肉苁蓉 150 g 怀牛膝 150 g 火麻仁 150 g 当归 150 g 肉桂 50 g 菟丝子 150 g 熟地黄 200 g 枳壳 150 g 鹿角胶 150 g

上药除鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是食欲不振者,加白术 100 g,茯苓 150 g,陈皮 50 g。

如是腹冷痛者,加乌药 100 g,木香 50 g。

## 二、自我调摄

- (1) 少食辛辣、煎炸、肥甘厚味和酒类等食品,多食蔬菜、水果。
- (2) 充分认识定时排便的重要性,建立起正常的排便习惯。
- (3) 适当增加运动,如跑步、散步、体操、太极拳等,改善血液循环,促进胃肠蠕动。

## 脂肪肝

脂肪肝是因过量脂肪在肝内堆积的病症。正常人肝内脂质的总量占肝脏重量的 3%~5%,当肝内脂质,特别是三酰甘油过多堆积,超过肝重的 10%,即称为“脂肪肝”,严重者脂肪堆积可达



40%~50%。一般认为产生脂肪肝的基本原因是长期过量地饮酒及蛋白质缺乏,或食物中缺乏维生素 B<sub>2</sub>、泛酸、烟酸,使肝功能损害;亦可因脂肪摄入太多,超过了肝脏所能代谢的负担,使肝脏对脂肪酸的代谢发生障碍,导致脂肪肝。脂肪肝在临床上分为酒精性和非酒精性两种:酒精性脂肪肝可向酒精性肝硬化发展;大多非酒精性脂肪肝的预后良好,去除病因,如加强营养、减肥等,脂肪肝大多可消除。脂肪肝在临床上大多无明显症状,有的仅表现为消化功能障碍,如食欲不振、腹胀、嗝气、乏力等,有的可有肝区不适、隐隐作痛等。

脂肪肝按照中医辨证有虚实之分。实证多因饮食失节,喜食油腻肥甘或酒酪,以致肥脂湿浊内停,积于肝内;或肝郁气滞,瘀血内阻,以致肥脂与瘀血阻于肝内。虚证多因久病体虚、房室不节、损伤正气,致肝肾亏虚、肝失所养、脂肪内停。湿热蕴积型,多表现为形体肥胖、胸闷腹胀、肝区胀闷不适、口苦口干或有恶心泛泛;气滞血瘀型,多表现为面色晦暗、情绪不畅、肝区胀痛或刺痛、口苦;肝肾亏虚型,多表现为肝区隐痛、头晕眼花、腰膝酸软等。



## 一、膏方选用

### 1. 湿热蕴积型

#### 【方药】

黄连 30 g 胡黄连 100 g 黄芩 90 g 半夏 100 g 枳实 100 g 制大黄 90 g 茵陈 200 g 焦山栀 100 g 鸡内金 100 g 生山楂 150 g 槟榔 100 g 柴胡 60 g 神曲 100 g 生甘草 50 g 赤芍药 150 g 杭白芍 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如是口苦口腻、时而泛恶者,加佩兰 150 g,旋复花 150 g,姜竹

茹 100 g。

如是重度高脂血症患者,加泽泻 100 g,生首乌 150 g,桃仁 100 g,丹参 150 g。

## 2. 气滞血瘀型

### 【方药】

桃仁 100 g 红花 60 g 当归 100 g 炒川芎 60 g 青皮 100 g 柴胡 60 g 香附 100 g 延胡索 100 g 炒枳壳 150 g 赤芍药 100 g 白芍药 150 g 五灵脂 100 g 制大黄 100 g 神曲 100 g 香谷芽 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如肝区刺痛明显,甚至有包块者,加廬虫 100 g,丹参 150 g,鳖甲胶 100 g。

## 3. 肝肾亏虚型

### 【方药】

生地黄 150 g 熟地黄 150 g 白芍药 150 g 山茱萸 150 g 怀山药 150 g 茯苓 150 g 当归 100 g 黄精 150 g 枸杞子 150 g 女贞子 150 g 枣仁 150 g 牡丹皮 90 g 泽泻 60 g 龟版胶 100 g 鳖甲胶 100 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是高脂血症患者,加丹参 150 g,生蒲黄 100 g,桃仁 100 g。

如为腰酸腿软者,加杜仲 100 g,续断 150 g。



## 二、自我调摄

(1)坚持运动锻炼,以消耗多余的热能,以减肥降脂,有助于脂肪肝的治疗。

(2)坚持吃低脂肪、低糖和高蛋白的饮食,从根本上减少脂肪的摄入和积聚。

(3)禁止酗酒,以防止肝损伤进一步发展而导致肝硬化。

## 慢性肝炎

慢性肝炎是指肝炎急性期过后,病程超过6个月而肝脏炎症仍持续存在的病症。其临床表现轻重不一,或有不适,甚至肝功能衰竭,或毫无症状。不同肝炎病毒引起的肝炎转变为慢性肝炎的情况是不同的,一般认为甲型和戊型肝炎,在急性期过后,疾病自限、预后良好,转变为慢性肝炎或肝硬化的可能性很小。乙、丙、丁型肝炎容易转变为慢性肝炎,其中乙型肝炎引起的慢性肝炎,在各种原因所致的慢性肝炎中占80%~90%。此外,机体自身免疫功能紊乱,或长期应用有损肝脏的药物,或酗酒,或代谢紊乱等,都可导致本病的发生。

临床上将慢性肝炎分为轻度慢性肝炎(慢性迁延性肝炎)和中度慢性肝炎(慢性活动性肝炎)两类。前者大多无明显症状,仅在体检时才发现肝脏轻度肿大或肝功能轻度或中度异常,一般预后良好;后者虽无明显的急性肝炎史,但可能明显乏力,肝区胀痛,面色晦暗,肝功能明显异常,清球蛋白比值倒置,免疫球蛋白增高,预后差,极易发展为肝硬化甚至肝癌。

慢性肝炎按照中医辨证多属虚实夹杂或虚证。正气不足,抗病能力低下是病毒入侵的条件,又因正虚不足以驱邪外出,以致邪客体内,迁延难愈,扰乱气血阴阳,导致气血瘀滞,阴阳失调。如肝





郁脾虚型,多见肝区胀痛、情绪抑郁、胃口不好、大便溏薄等;肝肾两亏型,多见肝区隐痛、头晕耳鸣、眼目干涩、腰膝酸软等;脾肾阳虚型,多见肝区隐痛、形寒肢冷、腰膝冷痛、食谷不化、大便溏薄或夹有不消化食物;瘀血阻滞型,多见肝硬化、肝区隐隐刺痛、面色晦暗、形体消瘦。

## 一、膏方选用

### 1. 肝郁脾虚型

#### 【方药】

柴胡 90 g 制香附 100 g 枳壳 200 g 青皮 60 g 白芍药 150 g 陈皮 100 g 白术 100 g 川芎 60 g 当归 100 g 茯苓 200 g 党参 100 g 生地黄 100 g 炙甘草 60 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

#### 【加减变化】

如是大便溏薄、食欲不佳者,加砂仁60 g,白豆蔻60 g,怀山药150 g,扁豆150 g。

### 2. 肝肾两亏型

#### 【方药】

生熟地黄(各)150 g 麦门冬 150 g 枸杞子 150 g 女贞子 150 g 桑椹子 150 g 白芍药 150 g 黄精 150 g 丹参 150 g 当归 100 g 茯苓 150 g 怀山药 150 g 山茱萸 100 g 牡丹皮 100 g 泽泻 100 g 龟版胶 150 g 阿胶 100 g

上药除龟版胶、阿胶外,其余药物加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~



30 g, 每日 2 次, 开水调服。一料服完。

### 【加减变化】

如是腰膝酸软者, 加杜仲 100 g, 续断 150 g。

如是五心烦热、潮热盗汗者, 加知母 90 g, 炒黄柏 100 g, 稽豆衣 150 g。

### 3. 脾肾阳虚型

#### 【方药】

黄芪 100 g 党参 100 g 白术 100 g 附子 60 g 干姜 60 g 茯苓 150 g 菟丝子 150 g 沙苑子 150 g 山茱萸 100 g 补骨脂 100 g 淫羊藿 100 g 丹参 100 g 鹿角胶 100 g 阿胶 100 g

上药除鹿角胶、阿胶外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将鹿角胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

#### 【加减变化】

如是腰膝冷痛明显者, 加杜仲 100 g, 续断 100 g, 桑寄生 100 g。

如是消化不良明显者, 加鸡内金 100 g, 焦楂曲(各)100 g。

### 4. 瘀血阻滞型

#### 【方药】

桃仁 100 g 红花 60 g 当归 100 g 川芎 60 g 丹参 150 g 牡丹皮 100 g 赤芍药 100 g 制大黄 100 g 五灵脂 100 g 延胡索 100 g 柴胡 60 g 枳壳 300 g 郁金 100 g 白芍药 150 g 炙甘草 60 g 鳖甲胶 150 g

上药除鳖甲胶外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。



### 【加减变化】

如有轻度腹水者,加益母草 300 g,川牛膝 100 g。

如是食欲不振者,加党参 100 g,茯苓 100 g,白术 60 g。

## 二、自我调摄

(1)克服消极悲观的心态,积极配合医生的合理治疗。

(2)多吃新鲜蔬菜、水果、瘦肉及鸡蛋等,尽量少吃高脂肪的食物。

(3)注意劳逸结合,适当参加体育锻炼,以增强体质。

## 肝硬化

肝硬化是指肝组织变形、变硬的一种慢性疾病。临床上以20~50岁男性为多见,其发病与病毒性肝炎、嗜酒、酗酒、某些寄生虫感染等有关,其中病毒性肝炎是形成肝硬化的主要原因。肝硬化的起病原因和过程非常缓慢,可能潜伏数年。根据肝功能及其并发症情况可分为肝功能代偿期和肝功能失代偿期。当病情发展至失代偿期时,常见腹水、尿少、呕血、便血,甚至出现神志昏迷,治疗相当困难,故中西医都强调早期诊断、早期治疗。



早期肝硬化按照中医辨证有虚实之分,虽然临床多虚实夹杂。多因嗜酒过度、肝脾受损,或情志郁结、气滞血停,或久病失调、脏腑失和、正虚瘀积所致。偏于气滞血瘀型,多表现为肝区胀痛或刺痛,按之硬而不坚,面色晦暗,体倦乏力等。偏于正虚瘀结型,多表现为肝区疼痛逐渐加重,按之坚硬,面色黧黑,形体消瘦,食欲不振,头晕眼花。

## 一、膏方选用

### 1. 气滞血瘀型

### 【方药】

柴胡 60 g 青皮 90 g 陈皮 100 g 郁金 100 g 制香附 100 g 当归 100 g 桃仁 150 g 丹参 300 g 三棱 150 g 莪术 150 g 鸡血藤 300 g 莱菔子 100 g 山楂 100 g 生甘草 30 g 鳖甲胶 150 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是肝区刺痛明显者,加川楝子 150 g,白芍药 150 g,延胡索 100 g。

如是便秘者,加生大黄 30 g,枳实 100 g,厚朴 100 g,槟榔 150 g。

## 2. 体虚瘀结型

### 【方药】

生地黄 100 g 当归 100 g 川芎 60 g 白芍药 150 g 黄芪 150 g 党参 100 g 茯苓 150 g 白术 100 g 山药 150 g 黄精 150 g 首乌 150 g 丹参 300 g 制大黄 100 g 廔虫 90 g 穿山甲 100 g 三棱 150 g 莪术 150 g 鳖甲胶 150 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如出现腹水者,加益母草 200 g,泽兰 100 g,川牛膝 100 g。

如是头晕眼花、眼目干涩者,加枸杞子 150 g,女贞子 150 g,菟丝子 150 g。



## 二、自我调摄

- (1) 禁止酗酒,增加营养,多食水果蔬菜,有助于养肝、护肝。
- (2) 积极防治传染性肝炎,以预防肝硬化的产生。
- (3) 增强体质,提高机体的抗病能力,以避免肝炎的发生。



## 泌尿系统疾病

### 尿路结石

尿路结石是指一些晶体物质和有机基质异常地聚集在尿路系统的疾病。根据结石所在部位不同,有肾结石、输尿管结石、膀胱结石、尿道结石之别,统称“尿路结石”。临床主要表现为血尿、腰痛、脐腹左侧或右侧胀痛、小腹痛向大腿内侧放射等。西医认为结石的形成与长期卧床使骨质脱钙,以及甲状腺功能亢进使血钙浓度升高有关;反复细菌感染使尿液钙化,尿中磷酸钙结晶体增加;排尿不畅,尿中晶体容易沉淀等,都有利于尿路结石的形成。本病属于中医的“石淋、砂淋”范围。

尿路结石按照中医辨证有虚实之分。虚证多因肾虚阴亏或命门火衰、气化失司所致;病史较长,结石长期停留在体内,常伴有腰酸腿重,头昏耳鸣。实证多因湿热下注或肝郁气滞化火,热移下焦,煎熬尿液而结成砂石;结石频繁发作阶段,伴有明显腰痛、痛引少腹,小便混赤,甚至血尿。

#### 一、膏方选用

##### 1. 虚证

##### 【方药】

熟地黄 200 g 山茱萸 150 g 杜仲 100 g 续断 150 g 桑寄生 150 g 金钱草 300 g 海金沙 300 g 茯苓 200 g 泽泻 100 g 怀山药 200 g 鸡内金 100 g 王不留行 100 g 当归 100 g 制香附 60 g 胡桃肉 150 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并



滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。一料服完,可再制一料,直到见效为止。

### 【加减变化】

如是消瘦、面红,五心烦热者,加炒黄柏 100 g,知母 100 g。

如是四肢欠温,形寒怕冷者,去龟版胶,加鹿角胶 200 g,淫羊藿 150 g。

如是小便艰涩者,加瞿麦 150 g,木通 60 g,车前子 300 g。

## 2. 实证

### 【方药】

金钱草 300 g 石韦 150 g 海金沙 150 g 冬葵子 150 g 鸡内金 100 g 车前子 300 g 滑石 150 g 马兰花 150 g 白韦根 150 g 川牛膝 150 g 乌药 100 g 木香 30 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是腰腹疼痛剧烈者,加川楝子 150 g,延胡索 150 g,琥珀 60 g,三七 90 g。

如小便中出现大量红细胞者,加草薢 150 g,茜草 150 g,旱莲草 300 g,小蓟 300 g。

## 二、自我调摄

(1)大量饮用含矿物质少的磁化水,既能避免聚成结石,又有利于充分的排尿,去除尿中的杂物、异物。

(2)加强运动,多做跳跃、打球运动,以促使结石下移排出。

(3)如是含钙类结石患者,应少吃牛奶及钙类食物;草酸钙结石患者,应少吃菠菜、芹菜、红茶等;尿酸结石患者,应少吃动物类、



豆类和咖啡、可可等,多吃水果蔬菜。

(4) 结石直径大于 0.8 cm 的患者,或尿路结石引起反复感染、肾积水者,应尽快手术取石或震波碎石。

## 尿路感染

尿路感染是指细菌侵犯了尿路系统引起的炎症,根据病理不同可分为急性期和慢性期两种。尿路感染的急性期有明显的尿频、尿急、尿痛(称尿路刺激症状),伴有发热、寒战,尿常规检查中有大量红、白细胞,甚或脓细胞;慢性期指感染已超过 6 个月,尿路刺激症状或有或无,但有间隙发热或长期低热,伴有明显腰酸乏力、消瘦等。根据部位不同,又可分为下尿路感染,即指膀胱炎、尿道炎、前列腺炎;和上尿路感染,即输尿管炎、肾盂肾炎。本病无论有无明显症状,通过尿常规检查和尿细菌培养,可以得到确诊。

尿路感染属于中医的“淋证”范畴。按照中医辨证可分虚实两类:实证多因湿热结于膀胱,膀胱气化不利所致,临床表现中尿频、尿急、尿痛症状明显,常伴有发热,相当于急性尿路感染;虚证多因脾肾亏虚,膀胱气化失职所致,临床上尿路刺激症状并不明显,但有明显腰酸乏力,平时劳累后很容易复发,相当于慢性尿路感染。

### 一、方方选用

#### 1. 实证

##### 【方药】

车前子 150 g 篇蓄 150 g 瞿麦 150 g 滑石 200 g 制大黄 50 g 焦山栀 100 g 石韦 150 g 蒲公英 200 g 升麻 30 g 川牛膝 150 g 炒黄柏 100 g 生甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。





### 【加减变化】

如小便中红细胞较多者,加小蓟草 150 g,生蒲黄 100 g,生藕节 150 g。

如是少腹急痛明显者,加沉香 30 g,乌药 90 g,川楝子 150 g。

### 2. 虚证

#### 【方药】

党参 150 g 熟地黄 150 g 山药 300 g 白术 150 g 茯苓 300 g 山茱萸 150 g 泽泻 150 g 菟丝子 150 g 杜仲 100 g 川怀牛膝各 150 g 丹参 150 g 川芎 30 g 生地黄 150 g 石苇 150 g 滑石 150 g 瞿麦 150 g 生甘草 50 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是排尿不畅,但少腹坠胀而喜按压者,加黄芪 150 g,升麻 30 g,枳壳 150 g。

如是形体消瘦,头晕眼花,疲乏无力者,加鹿角胶 100 g,龟版胶 100 g。



## 二、自我调摄

(1) 保证充足的饮水量,有利于排尿去邪。

(2) 尿路感染期间饮食宜清淡,多吃水果蔬菜,如冬瓜、丝瓜、西瓜等;避免吃辛辣和温热性食物。

(3) 尿路感染控制后,尿检阴性后,仍宜继续服用 1~2 周中药膏方,以巩固疗效。

## 慢性肾炎

慢性肾炎是指发生于肾小球的一组疾病。临床表现为蛋白尿、血尿、水肿、高血压等；一般认为急性肾炎病情迁延不愈超过1年以上，便可确诊为慢性肾炎。但大多数患者没有急性肾炎病史，如果以往无急性肾炎病史，或虽有急性肾炎病史，但临床症状已消失多年的患者，当临床出现水肿、蛋白尿、血尿、高血压时，则可通过实验室检查予以确诊。慢性肾炎虽然起病缓慢，但呈进行性发展，患病后2~3年或10~20年便进入肾功能不全阶段。到目前为止，现代西医对慢性肾炎的病因尚未完全阐明，一般都认为与变态反应有关。

慢性肾炎属于中医“水肿”、“尿血”等病证的范畴。根据中医理论的观点，慢性肾炎的病因可以归纳为素因、主因和诱因。脾肾虚损为本病的素因；风寒湿邪为本病的主因；饮食不节、劳累多度、嗜好酒色为本病的诱因。临床上按照中医辨证，以脾肾虚损和脾虚湿困为多见。脾肾虚损型表现为水肿明显、四肢发冷、腰酸腿软、胃口不好、大便溏薄等。脾虚湿困型表现为水肿明显、脘腹闷胀、神疲乏力、少气懒言等。

### 一、方药选用

#### 1. 脾肾虚损型

##### 【方药】

生熟地黄(各)150 g 茯苓 300 g 泽泻 150 g 怀山药 300 g  
山茱萸 300 g 菟丝子 150 g 党参 150 g 川怀牛膝(各)150 g  
车前子 300 g 生黄芪 300 g 炒白术 150 g 益母草 300 g 丹参  
150 g 炙甘草 30 g 阿胶 100 g 龟版胶 200 g

上药除阿胶、龟版胶外，余药加水煎煮3次，滤汁去渣，合并滤



液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如四肢怕冷明显者,加附子 30 g,肉桂 15 g。

如是反复感冒者,加防风 150 g,荆芥 100 g。

如是顽固性血尿者,加旱莲草 300 g,仙鹤草 300 g,三七 90 g,山稔根 150 g。

如严重蛋白尿者,加莲子 100 g,芡实 300 g,白果 150 g,鹿含草 150 g。

## 2. 脾虚湿困型

### 【方药】

防己 100 g 黄芪 300 g 白术 150 g 苍术 100 g 茯苓 150 g 党参 100 g 猪苓 150 g 泽泻 100 g 桂枝 30 g 川牛膝 100 g 冬瓜皮 200 g 川芎 30 g 延胡索 60 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏后,最加蜂蜜 300 g,收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



### 【加减变化】

如是脘腹胀满,食欲不振者,加陈皮 300 g,枳壳 300 g,砂仁 300 g,白豆蔻 300 g。

如是大便溏薄者,加薏苡仁 300 g,扁豆 300 g,山药 300 g。

## 二、自我调摄

(1)慢性肾炎的发病率较高,当出现严重腰酸乏力、头晕及反复水肿时,应及时去医院确诊,以免贻误病情,使病情复杂难治。

(2)强调休息,避免剧烈运动。

(3)克服消极、悲观情绪,树立与疾病作斗争的信心,有利于疾病的早日康复。

(4)做到合理饮食。首先应该严格限制食盐的摄入(每日氯化钠摄入量为1~3g);水肿明显者可以多吃冬瓜、赤豆、鲤鱼;小便中常有红细胞者,可吃莲藕、茄子、荠菜等;高血压者,多吃芹菜、番茄、木耳等。

## 肾病综合征

肾病综合征是以大量蛋白尿、低蛋白血症、高脂血症及不同程度水肿为特征的疾病。其中大量蛋白尿是诊断本病的必备条件,低蛋白血症、高脂血症和水肿都是因大量蛋白质流失所致。西医认为凡能引起肾小球病变的,都可引发肾病综合征,而且大多数专家认为此病与免疫学关系很密切。

肾病综合征属中医的“水肿”范畴,当水肿消退后多属“虚劳”、“腰痛”等范畴。中医认为本病的内因主要为肺、脾、肾功能减退;外因为风寒湿邪侵袭而诱发。按照中医辨证可分为脾肾两亏型、阴虚湿热型和瘀水交阻型三型。脾肾两亏型,多表现为反复的全身浮肿、压之有明显的凹陷、面色㿔白、形寒肢冷、胃口不好、大便溏薄、腰酸腿软等;阴虚湿热型,多表现为肢体水肿、怕热、汗出、小便短赤、大便干;瘀水交阻型,多表现为面色黧黑、唇舌紫暗、尿少浮肿。

### 一、方方选用

#### 1. 脾肾两亏型

##### 【方药】

党参 200 g 黄芪 200 g 白术 150 g 茯苓 150 g 山药 150 g 黄精 150 g 泽泻 100 g 防己 150 g 生熟地黄(各)150 g 山茱萸 100 g 猪苓 150 g 龟版胶 200 g。

上药除龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加



热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如形寒肢冷明显者,去生地黄、泽泻,加附子 60 g,肉桂 30 g,鹿角胶 100 g。

如水肿伴有明显的肌肤胀满者,加大腹皮 150 g,槟榔 100 g。

如大便溏薄者,加薏苡仁 300 g,莲子 100 g,芡实 100 g,扁豆 150 g。

如血清清蛋白较低时,加阿胶 100 g,鳖甲胶 100 g。

## 2. 阴虚湿热型

### 【方药】

生熟地各 150 g 山药 200 g 女贞子 200 g 旱莲草 300 g  
知母 100 g 黄柏 60 g 茯苓 200 g 猪苓 150 g 泽泻 100 g 牡丹皮 100 g 滑石 150 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶外,余药均加水煎煮 3 次,滤汁去渣合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



### 【加减变化】

如烦热汗出明显者,加川牛膝 150 g,青蒿 100 g,地骨皮 150 g。

如是小便短赤者,加石韦 150 g,车前子 300 g。

## 3. 瘀水交阻型

### 【方药】

丹参 150 g 川芎 10 g 泽兰 60 g 红花 60 g 桃仁 100 g  
赤芍药 150 g 益母草 300 g 防己 150 g 川牛膝 150 g 五加皮 150 g 郁金 60 g 黄芪 150 g

### 【加减变化】

如是血尿不止者,加蒲黄炭 100 g,地榆炭 100 g,三七粉 50 g。  
如是低蛋白血症者,加龟版胶 100 g,鹿角胶 100 g。

## 二、自我调摄

(1)禁食辛辣食品及烟酒之类。水肿明显者,应吃无盐饮食;肿胀减轻后,可改为低盐饮食。

(2)每天进食适量的蛋白质,如牛奶等,以补充机体大量流失的蛋白质。但不能而大量进食蛋白质类食物,否则会加重肾脏负担,甚至加重病情。

## 老年性夜尿多

老年性夜尿多是特指老年人群中的某些人,尤其是老年妇女在晚上睡眠期间,小便次数明显增加,每天晚上至少要起床小便 3~4 次以上。老年妇女夜尿多不一定是病,一般是生理功能衰退的表现,因而不必过分忧虑。可以去医院检查一下尿液,以排除器质性病变。

中医认为老年人夜尿频多因年事已高,元气渐衰,肾气亏损,导致肾脏固摄功能减退,膀胱气化功能失常而发生夜尿明显增加。按照中医辨证多属肾虚不固,临床大多表现为夜尿多而伴有腰酸腿软,头晕耳鸣,肢体倦怠等。

## 一、方药选用

### 【方药】

金樱子 300 g 覆盆子 300 g 熟地黄 300 g 怀山药 300 g  
补骨脂 150 g 益智仁 150 g 白果 150 g 桑螵蛸 200 g 菟丝子  
150 g 芡实 150 g 川芎 20 g 丹参 100 g 鹿角胶 200 g  
上药除鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,再



将鹿角胶炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 10~15 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有四肢不温,加肉桂 30 g,附子 15 g,乌药 60 g。

如是盗汗,烦热,去加鹿角胶、补骨脂,加龟版胶 200 g,山茱萸 150 g,知母 100 g,黄柏 100 g。

如是头昏眼花者,加枸杞子 150 g,女贞子 150 g,菊花 60 g,天麻 100 g。

如是气短乏力,食欲不振者,加人参 50 g,黄芪 100 g,茯苓 150 g,白术 100 g。

## 二、自我调摄

(1)夜尿多如果确属功能性的,一般通过服用膏方大多可以减轻症状。如能同时注意在睡前尽量少饮水,则效果更加明显。

(2)注意营养,适当锻炼,以增强体质,减缓衰老的进程。

## 老年性尿失禁



老年性尿失禁是指某些老年人不能有意识地控制排解小便的病症。现代医学认为老年人的器官生理功能逐渐减退或丧失,使膀胱括约肌收缩无力和(或)大脑皮质对膀胱神经的控制能力降低,从而造成老年人的尿失禁。由于膀胱功能减退,使尿液不能在膀胱里贮存,而是有一点就漏一点,就会出现不分昼夜地不断漏尿。由于控制膀胱的神经失灵,所以情绪稍一紧张或咳嗽、打喷嚏等腹内压力增加时,尿液便不由自主地从尿道流出。这种病在中老年妇女中特别多见。对于轻症或刚出现尿失禁端倪的老年人来讲可用中药膏方调治,但是对于严重的尿失禁则必须采用手术治疗才能见效。

老年性尿失禁按照中医辨证虽有虚实之分,但是以虚为主,多因年老体衰,肾虚精亏,膀胱失约所致。临床表现在尿失禁的同时,常常伴有腰膝酸软、形寒肢冷、头晕眼花等。

## 一、膏方选用

### 【方药】

金樱子 300 g 芡实 300 g 莲子 200 g 白果 100 g 山茱萸 200 g 怀山药 300 g 黄精 200 g 菟丝子 200 g 潼蒺藜 150 g 何首乌 300 g 当归 50 g 熟地黄 200 g 白芍药 300 g 覆盆子 300 g 鹿角胶 150 g 龟版胶 150 g

上药除鹿角胶、龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶和龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有腰脊冷痛,加补骨脂 10 g,益智仁 150 g,巴戟天 150 g。

如有明显疲乏无力,加人参 30 g,黄芪 300 g,茯苓 300 g。

如是潮热盗汗,虚烦不宁者,去鹿角胶,加黄柏 150 g,知母 150 g,川牛膝 150 g。

如是夜眠不安,容易惊醒者,加生龙骨 150 g,生牡蛎 150 g。

## 二、自我调摄

(1) 坚持劳逸适度的体育锻炼,能有效的防治疾病,增强体质,延缓衰老。

(2) 加强营养,提高机体的免疫力。

(3) 适当服用一些抗衰老的中成药,如龟鹿二仙膏、首乌片等,以延年益寿,强身健体。





## 内分泌代谢系统疾病

### 糖尿病

糖尿病是一种常见的内分泌代谢紊乱性疾病,其主要特点是高血糖和糖尿,临床表现早期可以无症状,发展到症状期,可出现多饮、多食、多尿、疲乏、消瘦等症候。其基本病理是胰岛素分泌绝对或相对不足而引起机体糖、蛋白质和脂肪代谢异常。现代西医认为造成胰岛素分泌不足的原因与多基因遗传缺陷、病毒感染造成胰岛炎,或自身免疫产生胰岛素抗体等有关。

糖尿病可归属于中医学“消渴”范畴。中医认为其病因与禀赋不足,五脏虚弱,精神刺激,情志失调,过食肥甘,形体肥胖有关。按照中医辨证,并结合近代对糖尿病的中西医结合研究,可分为三型,大致包含了糖尿病早期、中期、晚期的三个阶段。阴亏燥热型(早期),临床为体质尚壮,食欲旺盛,急躁易怒,耐力减退,头晕目眩,舌红。气阴两虚血瘀型(中期),临床为多尿、多饮、多食、消瘦、疲乏、口舌咽干,尿黄便干,舌红苔黄。阴阳两虚痰瘀互结型(晚期),临床为神疲乏力、胸闷心悸、头晕、气短、下肢水肿等。



#### 一、膏方选用

##### 1. 阴亏燥热型

##### 【方药】

黄芪 300 g 山药 300 g 知母 150 g 天花粉 150 g 葛根 200 g 五味子 100 g 黄连 100 g 玄参 150 g 鳖甲胶 200 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏

和匀,再加元贞糖 80 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。可连服数料,直至症状的改善。

### 【加减变化】

如是怕热、自汗、盗汗、烦热者,加沙参 150 g,黄精 150 g。

如是急躁易怒,怕热喜凉,头晕目眩者,加黄芩 200 g,生石决明 200 g。

## 2. 气阴两虚血瘀型

### 【方药】

太子参 300 g 麦门冬 150 g 玉竹 150 g 五味子 100 g 桃仁 150 g 红花 100 g 赤芍药 150 g 当归 150 g 地骨皮 200 g 龟版胶 200 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,再加元贞糖 80 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有头痛者,加川芎 200 g,草决明 150 g。

如有胸部闷痛者,加三七粉 50 g,丹参 300 g。

如有肢体麻木者,加鸡血藤 150 g,威灵仙 150 g。

## 3. 阴阳两虚型

### 【方药】

生地黄 300 g 茯苓 150 g 怀山药 300 g 泽泻 150 g 牡丹皮 150 g 山茱萸 150 g 制附子 100 g 黄精 150 g 地骨皮 150 g 肉桂 50 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加元贞糖 80 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



### 【加减变化】

如腰膝酸软甚者,加续断 150 g,杜仲 150 g。

如有畏寒怕冷者,加鹿茸 5 g(研粉和匀),紫河车 1 具(烘干研粉和匀)。

如遗尿者,加芡实 200 g,金樱子 200 g。

## 二、自我调摄

(1)避免过食肥甘、醇酒炙烤饮食。

(2)起居有常、睡眠充足、动静结合、劳逸适度很重要。

(3)情志因素与本病的发生发展有着密切的关系,因此保持平和的心态,使精神安宁,切忌恼怒、郁闷、忧思,避免惊恐也很重要。

## 肥胖症

关于肥胖症,“世界卫生组织肥胖咨询会”发布的咨询报告将其定义为“一种脂肪在脂肪组织中异常或过多堆积的疾病”,也就是说肥胖即是指“体内脂肪组织过多,而不包括肌肉组织的增重”。目前在全球范围中,无论是发达国家还是发展中国家,肥胖症发病率都正以惊人的速度不断地增长。由于肥胖不仅直接影响形体美,还对人体健康带来很多的危害,如引起众多的慢性病,如冠心病、高血压、高脂血症、脑中风、糖尿病、脂肪肝、胆管病等;引起男女性功能减退、不孕不育等,所以减肥的意义不仅在美容方面,更重要的是防治其他疾病。现代西医认为肥胖发生主要的原因是过多地食入高蛋白、高脂肪、高糖食物,从而产生大量热量;同时体力活动太少,不能平行地消耗热能,使多余的热能以脂肪的形式贮存在体内而形成肥胖。此外,肥胖具有一定的家庭遗传倾向,父母肥胖者其子女及兄弟姐妹中肥胖者也较多;与性别也有一定的相关性,女性更容易肥胖;或内分泌紊乱,或长期服用皮质激素、抗精神



病类药物等,都可能引起肥胖。

测定肥胖最常用、最简便的方法有两种:

第一种是体质指数测定法: $BMI = \text{体重(kg)} / \text{身高(m)}^2$

$BMI < 18.5$  体重过轻

$BMI = 18.5 \sim 24.9$  正常体重

$BMI \geq 25$  体重超重

$BMI = 25 \sim 29.9$  肥胖前期

$BMI = 30 \sim 34.9$  I 级肥胖

$BMI = 35 \sim 39.9$  II 级肥胖

$BMI > 40$  g III 级肥胖

第二种是标准体重测定法:

标准体重 我国北方人的标准体重(kg) = [身高(cm) - 150]  $\times$  0.6 + 50

我国南方人的标准体重(kg) = [身高(cm) - 150]  $\times$  0.6 + 48

肥胖度(%) =  $\frac{\text{实际体重} - \text{标准体重}}{\text{标准体重}} \times 100\%$

肥胖度在  $\pm 10\%$  为正常,从 20% 起,每增加 10% 则增加 I 度肥胖

体重增加 20% ~ 30% 为 I 度肥胖

体重增加 31% ~ 40% 为 II 度肥胖

体重增加 41% ~ 50% 为 III 度肥胖

体重增加 51% 以上 为 IV 度肥胖

肥胖症按中医辨证可分虚实两大类,虚实相兼是肥胖症的病理特点。虚证中脾肾气虚型,多因脾虚水谷不化,变成膏脂痰湿,蓄于肌肤,发为肥胖;肾亏不能行水,溢于肌肤,加重肥胖。临床上表现为肥胖、颜面虚浮、神疲乏力、胃口如常、大便溏薄、尿少肢肿、腰酸腿软等。肝虚失疏型,多因肝脏功能减退,一方面影响脾胃运



化水谷及水湿,导致膏脂痰浊内蓄,另一方面影响胆汁分泌和排泄,不能净浊化脂,从而内聚成肥胖。临床上表现为肥胖、急躁宜怒、胸肋胀满、妇女月经不调或经少经闭。实证中脾胃实热型,多因过多食用肥腻、甘甜的食品,而成膏脂痰浊内蓄导致肥胖;或胃热炽盛,食欲增强,多饮多食,致气血有余,化为膏脂内蓄发为肥胖。临床上表现为肥胖、面色红润、多食易饥、胸腹胀满、大便秘结、小便短赤。

## 一、膏方选用

### 1. 脾肾两亏型

#### 【方药】

党参 150 g 炒白术 100 g 茯苓 150 g 黄芪 150 g 何首乌 200 g 枸杞子 150 g 女贞子 200 g 山茱萸 150 g 菟丝子 150 g 制半夏 100 g 泽泻 100 g 薏苡仁 300 g 山楂 150 g 荷叶 100 g

上药物加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



#### 【加减变化】

1. 如肢冷形寒、腰酸腿软明显者,加补骨脂 150 g,仙茅 150 g,淫羊藿 150 g。

2. 如尿少水肿明显者,加车前子 300 g,川牛膝 150 g,益母草 150 g,冬瓜皮 150 g。

### 2. 肝虚失疏型

#### 【方药】

当归 100 g 生地黄 150 g 川芎 60 g 苍术 100 g 焦山栀 60 g 柴胡 60 g 香附 60 g 枸杞子 100 g 女贞子 150 g 郁金 100 g 茯苓 150 g 白术 100 g 赤芍药 150 g 青陈皮(各)60 g 夏枯草 200 g 灵芝 100 g 甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如妇女月经不调、闭经者，加桃仁 100 g，红花 60 g，益母草 200 g。

### 3. 脾胃实热

#### 【方药】

焦山栀 100 g 小川连 50 g 黄芩 100 g 杏仁 100 g 薏苡仁 200 g 川朴 150 g 白术 150 g 泽泻 100 g 大黄 60 g 夏枯草 300 g 虎杖 150 g 草决明 150 g 荷叶 150 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如为面色红润、口臭口干者，加生石膏 300 g，知母 100 g，生地黄 100 g，升麻 60 g。

如是小便短赤者，加茵陈 200 g，瞿麦 150 g，滑石 200 g，生甘草 50 g。



## 二、自我调摄

(1) 体重未超标准，不要盲目减肥。

(2) 加强运动，是减肥的有效方法，故应做到坚持每天参加中等强度的运动，要求达到运动时的脉搏数为 110~130 次/分

(3) 吃饭时要细嚼慢咽，调整饮食结构，提倡低脂、低蛋白、低糖类、高粗纤维的食物及大量鲜果蔬菜的膳食。

## 高脂血症

随着我国人民生活水平的逐渐提高，饮食结构的改变，血脂水

平也有所提高,因此高脂血症已构成威胁我国中老年人健康的疾病之一。对于高脂血症最简单、最普通的理解是指血中总胆固醇(TC)、三酰甘油(TG)、低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-C)水平单项或多项超过正常范围,和(或)包括高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-C)水平低下的病症。当血脂轻度增高时,患者可以没有任何不适的表现,只有当血脂增高到一定的水平才可能出现一些临床症状。根据临床表现可以分为两大类,一类是脂质沉积在真皮所引起的黄色瘤,常在上下眼睑和四肢关节、足跟和臀部等部位出现。眼睑周围的黄色瘤一般先在眼内眦,渐渐地可扩大,包围整个眼部。另一类是脂质在血管内皮沉积所引起的动脉粥样硬化,产生冠心病和周围血管病变。现代西医认为绝大多数高脂血症患者往往是因遗传缺陷,加上饮食不当,如经常进食高脂肪、高胆固醇食物、大量饮酒、缺乏运动等引发。此外,肥胖、绝经、老年以及使用某些药物,如激素、利尿剂等,也可能产生高脂血症。其中,饮食不当是最普遍的原因。大家可能发现,同样的饮食在不同的个体会产生不同的结果,这说明遗传因素内在的差异造成胆固醇吸收和代谢变化,对饮食等环境因素造成的高脂血症有重要的影响。



尽管中医学中并无“高脂血症”病名,但是现代中医将其归属“血浊”、“浊脂”等范畴。按照中医辨证多属本虚标实的病证,尤其是高脂血症已有并发症者。多因脾肝肾功能减退,饮食无节制,偏食肥腻甘甜,好坐懒动,情志不畅而致痰、致湿、致瘀。脾虚浊痰型,常伴有腹胀纳呆、肢体沉重、大便溏薄、水肿尿少等;脾肾两虚型,常伴有肢体困倦乏力、腰酸腿软、腹胀便溏、耳鸣眼花等;肝郁化火型,常伴有烦躁易怒、头晕头痛、口苦咽燥、小便黄赤、大便干结。单纯实证一般仅限于病症的初期,而且大多数是体质较壮的年轻人,大多属于胃热炽盛型,临床多见形体丰腴、口干喜饮、食欲旺盛、喜食浓味。

## 一、膏方选用

### 1. 脾虚浊痰型

#### 【方药】

制半夏 100 g 陈皮 100 g 茯苓 200 g 郁金 100 g 白矾 25 g 猪苓 150 g 炒白术 150 g 苍术 100 g 桂枝 30 g 泽泻 100 g 生蒲黄 100 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

#### 【加减变化】

如是大便溏薄者，加炒扁豆 300 g，薏苡仁 300 g，砂仁 30 g。

如是脘腹胀满者，加槟榔 100 g，大腹皮 150 g。

如是腰酸腿软、头晕眼花者，加生首乌 200 g，仙灵脾 150 g，菟丝子 150 g。

### 2. 肝郁化火型

#### 【方药】

柴胡 100 g 焦山栀 100 g 虎杖 150 g 茵陈 150 g 郁金 100 g 炒黄芩 100 g 车前子 300 g 生大黄 60 g 生山楂 150 g 泽泻 150 g 生甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

#### 【加减变化】

如急躁易怒、口苦口干明显者，加生地黄 150 g，赤芍药 100 g。

如时有胸闷作痛者，加丹参 150 g，三七 60 g，檀香 60 g。

### 3. 胃热炽盛型

#### 【方药】

生大黄 90 g 川连 30 g 枳实 100 g 川朴 100 g 生地黄 200 g 石膏 300 g 炒升麻 100 g 知母 100 g 泽泻 150 g 茵





陈 150 g 茺蔚子 150 g 决明子 200 g

上药物加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。一料服完,可再制一料,直到见效为止。

### 【加减变化】

如口干思饮明显者,加麦门冬 200 g,北沙参 200 g,玉竹 150 g。

## 二、自我调摄

(1)积极参加各种体育运动和体力劳动,有助于调节血脂。当然运动强度应以心律达到 110~130 次/分为宜,运动时间持续 20 分钟左右,但是运动量的增加应循序渐进,以免身体产生不良反应。

(2)禁止吸烟和被动吸烟,能有效地达到协助降脂的目的。

(3)饮食方面主张多吃蔬菜水果,严格限制高热量的食品,如脂肪、甜食等,可适当增加蛋白质和谷类食品,同时还应限制食盐的摄入,少饮酒,这些都有助于减肥降脂。



## 痛 风

近二十年来,痛风如同肥胖症、高脂血症、糖尿病等内分泌代谢性疾病一样,其发病率呈逐年上升的趋势。尤其在我国,随着经济的迅速发展、生活方式的逐渐西化、社会的老龄化,其发病率正在迅猛上升而引起大家的关注。

痛风是一组嘌呤代谢紊乱和尿酸排泄障碍所致的疾病,临床以血尿酸增高( $>0.42 \text{ mmol/L}$ )为特点,以及由此而引起痛风性关节炎(好发于拇指、跖趾、踝、膝、腕、指和肘处关节,局部红肿热痛),尿酸性肾结石和慢性痛风性肾病。显然,高尿酸血症是引起

痛风的主要原因,也是诊断痛风和判断痛风疗效的重要指标。但是只有 10%~20% 的高尿酸血症患者会出现痛风。

痛风按照中医辨证属正气不足、虚实夹杂病症。正气不足多因脾肾两亏、功能失调而致尿酸积聚于体内;邪实多指湿热、痰浊或瘀血久滞体内,凝聚为痛风。脾肾阳虚型,多见痛风反复发作,伴有腰痛、形寒、夜尿清长、大便溏薄、胃口不好,甚至肾功能减退,出现蛋白尿。痰瘀互结型,多见痛风反复发作,伴有皮下结节、皮色晦滞;瘀血阻络型,多见关节疼痛、经久不愈、疼痛剧烈、关节僵硬、活动不利;湿热壅盛型,多见痛风急性发作期,骨关节红肿热痛,伴有便秘、尿赤。本篇主要介绍痛风反复发作的内服膏方。

## 一、膏方选用

### 1. 脾肾阳虚型

#### 【方药】

制附子 60 g 肉桂 30 g 杜仲 150 g 桑寄生 150 g 熟地黄 200 g 怀山药 200 g 山茱萸 150 g 党参 150 g 黄芪 150 g 当归 100 g 白芍药 150 g 茯苓 200 g 泽泻 100 g 羌活 100 g 独活 100 g 淫羊藿 150 g 炙甘草 50 g 木香 15 g 鹿角胶 150 g

上药除鹿角胶外,余药均加水煎煮 3 次,滤汁去渣合并滤液,加热浓度为清膏,再将鹿角胶炖烊,冲入清膏和匀,最后调入蜂蜜 300 g 收膏。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如是蛋白尿、水肿明显者,党参、黄芪加至 200 g,再加益母草 300 g,芡实 150 g。

如是关节冷痛明显者,加骨碎补 100 g,威灵仙 150 g。

如是尿路结石患者,加金钱草 300 g,石韦 150 g,海金沙 150 g。

### 2. 痰瘀互阻型



### 【方药】

胆星 100 g 半夏 100 g 玄参 150 g 山慈姑 100 g 僵蚕 150 g 昆布 150 g 海藻 150 g 白芥子 50 g 浙贝母 100 g 茯苓 150 g 陈皮 50 g 丹参 150 g 鸡血藤 300 g 穿山甲 100 g 生甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,再加热浓缩为清膏,最后调入蜂蜜 300 g 收膏。每日 1~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是痰核破溃不收口者,加黄芪 150 g,肉桂 60 g,白及 100 g。

如尿路结石常伴腰腹痛者,加石韦 150 g,金钱草 300 g,乌药 60 g,延胡索 150 g。

如是尿酸难以下降者,加土茯苓 300 g,车前子 300 g,薏苡仁 300 g。

## 3. 瘀血阻络型

### 【方药】

当归 150 g 赤芍药 150 g 白芍药 100 g 红花 100 g 川芎 60 g 牡丹皮 100 g 鸡血藤 300 g 威灵仙 150 g 路路通 150 g 三七 90 g 秦艽 100 g 甘草 30 g



### 【加减变化】

如有疼痛剧烈,难以忍受者,加延胡索 150 g,乳香 60 g,没药 60 g,蜈蚣 30 g。

如是尿酸一直不降者,加白茯苓 300 g,土茯苓 300 g,薏苡仁 300 g,草薢 300 g。

## 二、自我调摄

- (1)多饮水,适量服用小苏打,有助于尿酸的排泄。
- (2)戒烟酒,尤其是啤酒,不喝浓茶和咖啡,以减少痛风发作。
- (3)不吃高嘌呤类食物,如海产品、动物内脏等,宜吃牛奶、鸡

蛋、蔬菜、水果等,以减轻痛风症状和避免诱发痛风发作。

## 甲状腺功能亢进症

甲状腺功能亢进症是由多种因素引起甲状腺素分泌过多所致的一组常见内分泌疾病,其中弥漫性甲状腺肿伴甲状腺功能亢进症是该病最常见的一种病因。其临床症状主要表现为紧张、激动、急躁、手抖等精神神经症状;怕热、多汗等高代谢证候;纳多、消瘦等消化系统症状;甲状腺肿大、眼突、疲乏无力等其他症状。现代西医认为甲状腺功能亢进症的发病原理与人体长期遭受精神刺激、自身免疫性疾病、感染性疾病以及发育期、月经期、妊娠期等多种因素有关,在这些因素影响下,引起大脑皮质功能紊乱,通过下丘脑刺激垂体,使甲状腺功能亢进,同时通过交感神经兴奋,刺激甲状腺,促使增生肥大、功能亢进。甲状腺素分泌增加,使细胞组织氧化加速,新陈代谢加快而引起甲状腺功能亢进症的许多症状。

甲状腺功能亢进症归属于中医“瘰瘤”的范畴。中医学认为,其发病主要与情志及体质因素有关,病初起多见气郁、肝火、痰凝、血瘀等实证;中期出现虚实夹杂之象;病久多累及肝、肾、心、脾诸脏。中医辨证可分为六种类型。气郁痰凝型,表现为颈部甲状腺肿大,抑郁或急躁易怒,胸闷气短,烦躁失眠等。痰结血瘀型,表现为颈部甲状腺肿大明显,声音嘶哑,呼吸不畅,纳差等。肝火犯胃型,表现为甲状腺肿大,眼突,目光炯炯,形体消瘦,急躁易怒,消谷善饥,面红,怕热多汗,心悸烦躁,口干欲饮,舌红苔黄。阴虚阳亢型,表现为甲状腺肿大或不肿大,头昏眼花,心悸失眠,性情急躁,虚烦多梦,纳多而消瘦,汗多,突眼,舌质红或绛红。气阴两虚型,表现为甲状腺肿大,心悸心慌,气短,倦怠乏力,汗多纳差,腹泻便溏,脉细数无力。脾肾阳虚型,表现为甲状腺肿质地较软,表情淡漠或神情呆滞,神疲乏力,畏寒肢冷,纳差,腹胀便溏,头晕目眩,腰



膝酸软,面浮足肿,舌淡胖,脉沉细弱。

## 一、膏方选用

### 1. 气郁痰凝型

#### 【方药】

木香 100 g 陈皮 150 g 夏枯草 300 g 浙贝母 200 g 半夏 150 g 胆星 150 g 茯苓 150 g 郁金 150 g 香附 100 g 生牡蛎 200 g 鳖甲胶 200 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有腹胀便溏者,加白术 150 g,怀山药 200 g,扁豆 150 g。

如有甲状腺肿大质地较硬者,加露蜂房 150 g。

### 2. 痰结血瘀型

#### 【方药】

浙贝母 200 g 青皮 150 g 陈皮 150 g 川芎 150 g 当归 150 g 半夏 150 g 连翘 150 g 桃仁 150 g 穿山甲 150 g 生牡蛎 200 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~20 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有甲状腺肿大,质地较硬者,加露蜂房 150 g,红花 60 g。

如有声音嘶哑者,加木蝴蝶 100 g,射干 150 g。

如有吞咽不利者,加三棱 150 g,旋复花 150 g。

### 3. 肝火犯胃型

#### 【方药】



山梔 150 g 柴胡 150 g 牡丹皮 150 g 茯苓 150 g 川芎 150 g 白芍药 150 g 当归 150 g 牛蒡子 150 g 生牡蛎 200 g 夏枯草 300 g 生甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~20 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如口苦目干,舌红少津者,加生地黄 150 g 玄参 150 g,天花粉 150 g,麦门冬 150 g。

如有大便干结者,加生大黄 100 g,全栝楼 300 g。

如有心烦失眠者,加酸枣仁 200 g,夜交藤 300 g。

## 4. 阴虚阳亢型

### 【方药】

生晒参 50 g 玄参 200 g 丹参 150 g 茯苓 150 g 五味子 100 g 远志 100 g 当归 150 g 天门冬 250 g 麦门冬 300 g 酸枣仁 200 g 生地黄 200 g 生牡蛎 200 g 鳖甲胶 200 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有手抖明显者,加钩藤 200 g 僵蚕 200 g 白蒺藜 150 g 白芍药 150 g。

如是甲状腺肿大不散者,加川贝母 100 g 夏枯草 300 g。

## 5. 气阴两虚型

### 【方药】

生晒参 100 g 太子参 300 g 麦门冬 150 g 五味子 100 g 白芍药 200 g 黄芪 200 g 生龙骨 300 g 生牡蛎 200 g 鳖甲胶 200 g。



上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如是腹泻便溏者,加怀山药200g,扁豆300g。

如出汗较多者,加浮小麦300g,糯稻根300g。

## 6. 脾肾阳虚型

### 【方药】

制附子100g 熟地黄200g 山茱萸150g 茯苓150g 牡丹皮150g 菟丝子150g 泽泻150g 肉桂150g 白术150g 生牡蛎200g。

上药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜300g收膏即成。每次15~20g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如为水肿明显者,加车前子200g,猪苓150g。

如是大便软溏者,加益智仁150g,补骨脂150g。



## 二、自我调摄

(1)保持心情舒畅,解除精神或心理上的各种压力,对治疗与康复相当重要。

(2)注意营养,尤其是热量和蛋白质的需要高于正常人,注意维生素和钙的补充。

(3)起居有常,寒温调摄,防止病毒感染,预防病情的反复。

## 甲状腺功能减退症

甲状腺功能减退症,简称“甲减”,指甲状腺素合成,分泌缺乏

或生理效应不足,机体代谢活动下降所引起的临床综合征。主要表现为面色苍白或萎黄、神疲乏力、表情淡漠、形寒肢冷、毛发枯焦、水肿、头晕、纳差、腹胀等症状。其病因可分为原发性和继发性两种:原发性与地方性缺碘、遗传基因缺陷、甲状腺自身免疫病损等有关;继发性与甲状腺手术切除、慢性淋巴细胞性甲状腺炎、甲状腺肿瘤、抗甲状腺药物过量、垂体性或下丘脑病变等有关。

甲状腺功能减退症归属于中医学“虚劳”、“水肿”等范畴。中医学认为其先天不足,后天失调,脾肾素虚,肾虚水泛,水气凌心。心脾肾阳虚是本病的主要病因病机。按照中医辨证认为可分三型。脾肾阳虚型,多见神疲乏力,畏寒肢冷,面色苍白或萎黄,皮肤干燥,男子阳痿,女子月经不调,懒言嗜卧,记忆力减退,头晕腰酸,纳少腹胀,全身水肿,舌淡胖。心肾阳虚型,多见于合并心包积液或心功能不全者,气促,心悸心慌,胸闷胸痛,形寒肢冷,周身水肿,舌体淡胖。心肾阳衰型,常见于黏液性水肿,神志低迷者,四肢厥冷,全身水肿,少尿或尿闭,舌淡胖,脉微欲绝。



## 一、膏方选用

### 1. 脾肾阳虚型

#### 【方药】

人参 100 g 黄芪 300 g 制附子 60 g 熟地黄 300 g 白术 150 g 肉桂 50 g 杜仲 150 g 补骨脂 100 g 菟丝子 150 g 肉苁蓉 150 g 枸杞子 150 g 当归 150 g 龟版胶 100 g 鹿角胶 150 g

上药除龟版胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】



如是腰膝酸软甚者,加桑寄生 200 g,淫羊藿 200 g。

如是全身水肿甚者,加泽泻 150 g,车前子 150 g。

## 2. 心肾阳虚型

### 【方药】

制熟子 150 g 生姜 60 g 茯苓 300 g 白术 150 g 白芍药 150 g 熟地黄 300 g 人参 60 g 黄芪 300 g 鹿角胶 150 g

上药除鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是胸闷胸痛者,加苏梗 150 g,薤白 150 g,栝楼 300 g,川芎 150 g。

## 3. 心肾阳衰型

### 【方药】

人参 100 g 熟附子 100 g 干姜 100 g 炙甘草 150 g 茯苓 200 g 桂枝 100 g 白芍药 150 g 山茱萸 150 g 煅龙骨 300 g 煅牡蛎 300 g 鹿角胶 150 g



上药除鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是少尿或尿闭者,加黄芪 300 g,泽泻 300 g。

## 二、自我调摄

(1)本病的预防极为重要,在缺碘地区应坚持食用碘化盐,对孕妇尤其需要供应碘化物。

(2)对甲状腺功能亢进症治疗必须掌握剂量和疗程,以免药物过量。

(3)起居有常,注意寒温变化,预防感冒或创伤感染。

(4)注意保护脾胃阳气,避免生冷寒凉饮食。

(5)调节情志,保持心情舒畅。



## 血液系统疾病

### 贫 血

贫血是指循环血液中的红细胞数或血红蛋白量低于正常时的一种病症,临床上常常表现为唇甲苍白、面色萎黄或苍白、疲倦乏力、气短心悸、头晕耳鸣、食欲不振、记忆力衰退和思想不集中等。现代西医认为,贫血的原因虽然很多,但是从发病机制来说,不外乎造血不良、红细胞过度破坏以及急慢性失血等3种。因此,贫血包括了再生障碍性贫血、骨髓病性贫血、巨幼红细胞性贫血、缺铁性贫血、自身免疫性贫血、溶血性贫血、脾功能亢进性贫血等。

贫血属于中医虚劳的范畴,根据中医辨证大多属虚证,多因先天不足、体质虚弱;或劳作过度、脾肾亏虚;或大病久病、失于调养所致。临床上可分为肾精亏损型多表现为面色萎黄少华、头晕眼花、耳鸣脑响、腰酸腿软、疲惫乏力等;肝血虚损型多表现为面黄唇白、头晕耳鸣、视力昏糊、四肢麻木、肢体震颤,妇女则月经不调甚至经闭等;心血不足型多表现为面色苍白、心悸怔忡、失眠多梦、健忘等。



#### 一、膏方选用

##### 1. 肾精亏损型

##### 【方药】

熟地黄 200 g 枸杞子 200 g 山茱萸 150 g 怀山药 200 g  
菟丝子 200 g 牛膝 150 g 何首乌 200 g 黄精 150 g 肉苁蓉  
200 g 当归 100 g 白芍药 150 g 杜仲 100 g 川芎 50 g 龟版  
胶 100 g 鹿角胶 100 g 阿胶 100 g 砂仁 60 g

上药除阿胶、鹿角胶、龟版胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶、鹿角胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是耳鸣脑响严重者，加磁石 200 g，石菖蒲 150 g，柴胡 50 g。

如是形体消瘦、食欲不振者，加党参 150 g，茯苓 150 g，白术 100 g，炙甘草 50 g。

## 2. 肝血虚损型

### 【方药】

当归 150 g 熟地黄 250 g 白芍药 200 g 酸枣仁 150 g 川芎 60 g 何首乌 200 g 牛膝 150 g 杜仲 150 g 狗脊 150 g 枸杞子 200 g 女贞子 200 g 黄芪 100 g 茯苓 150 g 龟版胶 150 g 鳖甲胶 150 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是肢体麻木、肌肉跳动者，加鸡血藤 300 g，僵蚕 150 g，全蝎 50 g。

如妇女经少色淡者，加丹参 200 g，鹿角胶 100 g，香附 100 g。

## 3. 心血不足型

### 【方药】

人参 50 g 黄芪 200 g 茯苓 150 g 炙甘草 60 g 当归 150 g 白芍药 200 g 生熟地黄各 200 g 酸枣仁 150 g 柏子仁 150 g 炙远志 100 g 龙眼肉 50 g 阿胶 200 g 陈皮 50 g

上药除阿胶、龙眼肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤



液,加热浓缩为清膏,放入龙眼肉调匀,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是健忘、思想不集中者,加五味子 100 g,石菖蒲 200 g。

如是心悸早搏频繁者,加麦门冬 300 g,五味子 100 g,党参 150 g,苦参 100 g。

## 二、自我调摄

(1)补充营养,保证足够的蛋白质,添加适当的辅助食品,特别是缺铁性贫血患者,可多吃一些含铁质丰富的蔬菜,如菠菜和猪肝等。

(2)注意休息,避免过度的脑力和体力的消耗,同时参加适当的活动,有利于人体各组织器官的功能恢复。

## 血小板减少症



血小板减少症,在中医称“紫癜”,又称“肌衄”,因血液不循常道,溢于肌肤,以皮肤出现青紫斑点或斑块,压之不褪色为主要临床特征的病症。临床常伴有鼻出血、齿龈出血、尿血、便血、崩漏等症。实验室检查以血小板减少为特征。到目前为止关于本病的病因以及发病机制尚未完全阐明,但普遍认为这是一种自身免疫性的疾病,使患者体内存在抗血小板抗体,致血小板寿命缩短、破坏过多、数量减少,从而引起各种出血表现。

中医认为外感时邪、入里化热或内伤肝脾肾三脏,功能失调,均能导致本病的发生。按照中医的辨证有虚实之分,临床分为四型。血热妄行型,表现为肌肤斑色鲜红,起病急骤,伴发热、烦渴、溺赤便秘、舌红苔黄。阴虚血热型,表现为肌肤斑色鲜红或紫黯,

起病较慢,时发时愈,伴五心烦热、舌干红少苔。气虚不摄型,表现为肌肤斑色淡红,病程较长,时发时愈,伴神疲乏力、面色不华、食少便溏、舌淡苔白。瘀血内阻型,表现为肌肤斑色紫黑,面色晦暗,唇甲青紫,舌质紫黯或有瘀斑。

## 一、方剂选用

### 1. 血热妄行型

#### 【方药】

水牛角 500 g 生地黄 300 g 赤芍药 150 g 牡丹皮 150 g  
生石膏 500 g 知母 150 g 玄参 150 g 黄连 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g,收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有发热烦躁者,加金银花 300 g,连翘 200 g。

如有鼻血者,加白茅根 300 g,侧柏叶 300 g。

如有尿血者,加小蓟 200 g,旱莲草 300 g。

如有大便出血鲜红者,加生地黄榆 200 g,槐花 150 g。

### 2. 阴虚血热型

#### 【方药】

生地黄 200 g 鳖甲 150 g 牡丹皮 150 g 知母 150 g 黄柏 100 g 茜草根 200 g 黄芩 200 g 侧柏叶 200 g 旱莲草 200 g 阿胶 150 g 龟版胶 100 g

上药除阿胶、龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,将阿胶、龟版胶加黄酒蒸化后,冲入清膏和匀,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。可连服数料,直至见效为止。

#### 【加减变化】

如有潮热、手足心热者,加地骨皮 200 g,银柴胡 150 g。



如有齿出血、口臭者,加生石膏 300 g,玄参 150 g。

如有盗汗者,加煅龙骨 300 g,煅牡蛎 300 g。

### 3. 气虚不摄型

#### 【方药】

党参 300 g 黄芪 300 g 炒白术 150 g 当归 150 g 大枣 150 g 酸枣仁 200 g 炙甘草 100 g 仙鹤草 200 g 花生衣 300 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,将阿胶加适量黄酒蒸烊化后,冲入清膏和匀,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有紫斑出血较多者,加紫草根 300 g,茜草根 300 g。

如有月经过多者,加棕榈炭 150 g,炮姜炭 100 g,艾叶炭 150 g。

### 4. 瘀血内阻型

#### 【方药】

生地黄 200 g 川芎 150 g 当归 150 g 赤芍药 150 g 红花 100 g 桃仁 150 g 丹参 200 g 鸡血藤 200 g 三七粉 50 g

上药除三七粉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,将三七粉冲入清膏和匀,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如是气短、乏力者,加黄芪 300 g,党参 300 g。

如有咯血者,加白芍药 150 g,侧柏叶 200 g。

## 二、自我调摄

(1) 出血多的患者,应绝对卧床休息,避免外伤,预防感冒。

(2) 饮食宜清淡而富营养,忌食辛辣以免动火诱发出血。



## 神经系统疾病

### 头 痛

头痛是临床上常见的一个症状,可以单独出现,亦可见于多种急慢性 and 内外伤疾病之中,如因血管舒缩功能障碍引起的血管性头痛;因长期焦虑紧张或疲劳引起的紧张性头痛;颅内压力过高或过低引起的头痛;颅脑外伤引起的外伤性头痛;眼、耳、鼻、牙病引起的头痛;以及感冒头痛等。

中医将头痛分为外感头痛和内伤头痛两类。外感头痛多因外感风寒、风湿、风热所致,其发病较急,疼痛较剧,多属实证;内伤头痛多因肝阳上亢,或痰浊上扰,或瘀血阻滞,或精血亏虚,其发病较缓,疼痛亦稍和缓,大多属虚实夹杂证或虚证。本篇主要介绍内伤头痛的膏方选用。

内伤头痛根据中医辨证可分为肾虚头痛:多表现为头痛脑空,常兼有头晕、耳鸣、腰酸、神疲等;肝阳头痛:多表现为头痛而眩,烦躁易怒,或兼面红目赤、口苦等;痰浊头痛:多表现为头痛昏蒙、头重如裹、呕恶痰涎、胸脘满闷等;瘀血头痛:多表现为头痛日久不愈,痛处固定不移,痛若针刺,或有头部外伤史。

#### 一、膏方选用

##### 1. 肾虚头痛

##### 【方药】

熟地黄 300 g 山茱萸 150 g 怀山药 200 g 枸杞子 150 g  
杜仲 150 g 当归 100 g 川芎 60 g 党参 100 g 白芍药 150 g  
茯苓 150 g 川怀牛膝(各)150 g 延胡索 100 g 徐长卿 150 g





炙甘草 60 g 龟版胶 200 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有耳鸣如蝉鸣,连绵不断者,加磁石200 g,石菖蒲150 g,葛根150 g,银杏叶150 g。

如是盗汗烘热者,加炒黄柏100 g,知母100 g,鳖甲胶150 g。

## 2. 肝阳头痛

### 【方药】

天麻150 g 钩藤300 g 川牛膝150 g 白芍药300 g 生地黄200 g 熟地黄150 g 女贞子150 g 山栀100 g 黄芩100 g 石决明300 g 珍珠母300 g 桑寄生150 g 茯苓150 g 枣仁150 g 鳖甲胶200 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如是面红目赤、口苦甚者,加夏枯草300 g,龙胆草60 g。

如是胁痛较甚者,加郁金100 g,川楝子150 g,柴胡100 g。

## 3. 痰浊头痛

### 【方药】

半夏100 g 白术150 g 天麻150 g 茯苓150 g 陈皮60 g 泽泻150 g 蔓荆子100 g 白蒺藜150 g 莱菔子100 g 制天南星100 g 川芎60 g 炙细辛60 g

上药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再



加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如泛恶胸闷者, 加枳实 100 g, 厚朴 100 g, 紫苏 100 g。

如口苦口腻者, 加黄芩 100 g, 全栝楼 200 g。

### 4. 瘀血头痛

### 【方药】

桃仁 150 g 红花 100 g 川芎 100 g 当归 150 g 赤芍药 150 g 白芍药 200 g 郁金 150 g 虻虫 100 g 细辛 60 g 白芷 150 g 王不留行 100 g 穿山甲 100 g 天麻 100 g 银杏叶 150 g 炙甘草 60 g

上药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有头痛日久不愈, 且症状较剧者, 加全蝎 30 g, 蜈蚣 30 g。

如为病久体虚、疲乏无力者, 加黄芪 100 g, 党参 150 g, 茯苓 150 g。

## 二、自我调摄

- (1) 保持情绪安定, 避免精神过度紧张。
- (2) 保持足够的睡眠时间, 以免耗伤心神精血。
- (3) 忌食烟酒、辛辣、肥甘之品。

## 失 眠

失眠是指经常不能获得正常睡眠的病症。轻者入寐不酣、多梦早醒, 醒后难以再入睡; 重者彻夜不眠、辗转反侧, 常试图默背数字等以诱导入睡, 然而越紧张就越兴奋, 使入睡更加困难。一般认为造成失眠的主要原因是神经系统兴奋与抑制过程的失调。可分



为精神性失眠,即常见于神经衰弱,除了失眠外,常有头晕心慌、记忆力减退、思想不集中等;环境性失眠,即变换了生活和工作环境后引起,但大多属于暂时性的;身体疾病性失眠,即由于身体有病,如消化不良、疼痛不止、更年期综合征等原因造成;习惯性失眠,在上述各种条件的基础上逐步形成新的条件反射,尽管原有条件已改变或消失,但是睡眠依然不好。

失眠属于中医学“不寐”的范畴。按照中医辨证有虚实之分,但临床以虚证为主。心脾两虚型,多因思虑太过伤及心脾或久病体虚、气血不足、心失所养致心神不安;临床表现为多梦易醒、心慌健忘、头晕眼花、食欲不振、面色少华等。阴虚火旺型,因素体阴虚或大病久病后肾阴亏耗、心肾不交、扰乱心神所致;临床表现为心烦失眠、心悸不安、头晕耳鸣、五心烦热、口干津少等。心胆气虚型,多因情绪紧张或受惊恐,渐至心胆气虚,致心神不安、易恐善惊;临床表现为失眠多梦、入睡后易惊醒、遇事善惊、胆怯心悸、气短疲乏等。

## 一、膏方选用

### 1. 心脾两虚型

#### 【方药】

黄芪 300 g 党参 250 g 白术 200 g 白芍药 250 g 远志 200 g 枣仁 300 g 茯苓 250 g 当归 100 g 熟地黄 250 g 龙眼肉 100 g 炙甘草 50 g 五味子 150 g 柏子仁 150 g 红枣(去核)150 g 丹参 250 g 陈皮 50 g 木香 15 g 阿胶 200 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】



如失眠较重者,加生龙牡(各)200 g。

如食欲不振、腹闷不舒者,去熟地黄,加砂仁 60 g,白豆蔻 60 g,半夏 100 g。

## 2. 阴虚火旺型

### 【方药】

生地黄 300 g 麦门冬 150 g 当归 100 g 党参 150 g 丹参 300 g 茯苓 150 g 五味子 150 g 酸枣仁 250 g 远志 100 g 夜交藤 300 g 磁石 300 g 川牛膝 100 g 川黄连 30 g 阿胶 250 g

上药除阿胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为烦躁不安、小便短赤者,加木通 50 g,连翘 100 g,山栀 90 g。

如为五心烦热、潮热盗汗者,加黄柏 100 g,知母 60 g,龟版胶 100 g。

## 3. 心胆气虚型

### 【方药】

党参 100 g 茯苓 150 g 石菖蒲 150 g 炙远志 100 g 生龙骨 200 g 生龙齿 200 g 酸枣仁 150 g 知母 60 g 川芎 60 g 竹茹 100 g 合欢花 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。一料服完,可再制一料,直到见效为止。

### 【加减变化】

如遇事善惊、心悸不安者,加磁石 200 g,珍珠母 200 g。



## 二、自我调摄

- (1)适当参加体力劳动和体育锻炼,以增强体质,改善睡眠。
- (2)睡前不饮用烟酒、浓茶,逐步养成良好的生活习惯。
- (3)保持心胸开朗豁达,避免紧张和烦恼对睡眠质量的影响。

### 梅核气

梅核气是指某些患者自觉咽喉中似有异物堵塞,吞之不下,吐之不出,检查时并无实物发现的病症。因异物似梅核,故称为“梅核气”。梅核气常常可以随着情绪变化而时轻时重,时有时无。情绪好的时候,咽部的梗塞感减轻或消失,情绪不好时则症状明显加重。现代医学中的慢性咽炎、慢性扁桃体炎、慢性喉炎、食管肿瘤等都有可能产生梅核气症状。

中医认为梅核气属情志病,多因情志抑郁、多思善虑导致肝气郁结、痰气交阻于咽喉而得。按照中医辨证属痰气郁结,但在证型上有偏寒偏热的不同。偏热者,除咽中似有梅核堵塞的自我感觉外,尚有内热口燥、心烦不安、脾气急躁等症状;偏寒者,可兼见胸闷腹胀、食欲不振、大便溏薄、口淡不渴等症状。



#### 一、膏方选用

##### 1. 痰气郁结偏热型

##### 【方药】

柴胡 100 g 郁金 100 g 合欢皮 150 g 香附 60 g 苍术 60 g 川芎 30 g 神曲 60 g 山栀 150 g 藏青果 150 g 连翘 100 g 甘草 30 g

上药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如为胸闷痰多,加贝母 60 g,苏子 90 g,栝楼 150 g,旋复花 150 g。

如为小便黄赤,去苍术,加车前子 150 g,木通 50 g。

### 2. 痰气郁结偏寒型

#### 【方药】

半夏 100 g 厚朴 100 g 茯苓 150 g 苏叶 100 g 苍术 100 g 佛手 90 g 八月札 90 g 陈皮 100 g 枳壳 150 g 桔梗 60 g 甘草 60 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是胁肋胀痛,加郁金 90 g,延胡索 100 g。

如有失眠多梦,加合欢皮 200 g,远志 100 g。

## 二、自我调摄

(1)解除顾虑,积极配合医生的治疗,将会提高治疗的效果。

(2)参加娱乐活动,有助于转移对咽喉部的过分注意,有利于减轻临床症状。

## 郁 证

郁证主要表现为心情抑郁、情绪不宁、失眠或易怒善哭,或咽中、食道等处有异物梗阻等各种复杂的症状,老、中、青年人都可发病。西医认为郁证的发病多因各种精神因素引起神经过度紧张,使大脑功能活动暂时性失调所致,个人的性格特点与原有的各种疾病也都和郁证发病密切相关。郁证患者通常神志清楚,情感反应鲜明,与周围环境相处良好,对自身疾病的治疗有迫切的要求。



虽有多种多样的自觉症状,但无相应的客观阳性体征,因此,郁证主要见于西医的神经官能症。此外也可见于一些心身疾病,如更年期综合征、痛风、高血压、胃肠道功能紊乱等疾病。

中医认为郁证是因情志不舒、气机郁滞所致。按照中医辨证初病多属实证,肝郁气结痰凝型,临床表现为精神抑郁、情绪不宁、胸胁胀痛、嗝气腹胀,或心躁易怒、头痛目赤、口干而苦,或咽喉、食管处似有异物梗阻,咯之不出、咽之不下等;久病多属虚证,郁伤心脾型,临床表现为精神恍惚、多思善虑、心神不宁、失眠健忘、头晕神疲、食欲不振;阴虚火旺型,临床表现为情绪不宁、头晕眼花、心烦易怒、失眠健忘、腰酸遗精等。

## 一、膏方选用

### 1. 肝郁气结痰凝型

#### 【方药】

柴胡 100 g 香附 100 g 枳壳 150 g 陈皮 60 g 郁金 100 g  
青皮 60 g 川芎 60 g 生地黄 100 g 白芍药 150 g 佛手 150 g  
香橼皮 150 g 酸枣仁 150 g 丹参 150 g 合欢皮 100 g 夜交藤  
150 g 甘草 60 g



上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有头痛目赤、口苦而干明显者,加焦山栀 100 g,川黄连 50 g,夏枯草 200 g。

如有异物梗阻者,加厚朴 100 g,茯苓 150 g,紫苏 150 g,半夏 100 g。

### 2. 郁伤心脾型

#### 【方药】

淮小麦 300 g 大枣 150 g 炙甘草 100 g 酸枣仁 200 g 柏

子仁 150 g 当归 100 g 白芍药 150 g 生地黄 150 g 川芎 60 g  
黄芪 150 g 党参 150 g 茯苓 150 g 白术 100 g 郁金 100 g  
香附 100 g 合欢皮 100 g 龙眼肉 100 g 炙远志 100 g 阿胶  
100 g 龟版胶 150 g

上药除阿胶、龟版胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是食欲不振、大便溏薄者，加怀山药 150 g，扁豆 150 g，石菖蒲 150 g，鸡内金 100 g。

如有心悸失眠严重者，加丹参 150 g，五味子 100 g。

### 3. 阴虚火旺

#### 【方药】

生熟地黄各 150 g 山茱萸 100 g 怀山药 150 g 茯苓 150 g  
泽泻 100 g 牡丹皮 100 g 柴胡 60 g 郁金 100 g 山梔 100 g  
川牛膝 150 g 珍珠母 300 g 磁石 200 g 龟版胶 100 g 鳖甲胶  
150 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外，其余药物加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是胸胁胀闷不畅明显者，加枳壳 150 g，佛手 150 g，香橡皮 150 g。

如有腰膝酸软、遗精者，加杜仲 100 g，菟丝子 150 g，煅牡蛎 100 g，五味子 100 g。





## 二、自我调摄

(1) 正确对待客观事物,解除思想顾虑,树立乐观主义精神,积极配合和相信医生的治疗,有助于提高疗效。

(2) 经常参加一些社会交际活动,主动与人沟通,加强自我心理调摄,是控制减轻发病的有效方法。

(3) 配合气功、太极拳等体育疗法,往往可收到事半功倍的效果。

## 眩 晕

眩是眼花,晕是头晕,两者常同时并见,故统称为眩晕。轻者仅有头晕、头重脚轻感而无旋转感,而且闭目即止;重者感到周围的景物向同一方向转动,或自身的天旋地转。现代西医认为有很多病变可以引起眩晕,如梅尼埃病、脑血管硬化、颅脑外伤、脑肿瘤、神经官能症、高血压、颈椎病等等。

眩晕按照中医辨证有虚实之分,但以虚证为多。实证多因肝阳上亢,扰动清窍;或痰湿中阻,清阳不升所致。肝阳上亢型,多表现为眩晕、头痛且胀、易恼怒、性急躁、口苦面红;痰湿中阻型,多表现为眩晕、头重如蒙、胸闷恶心、不思饮食。虚证多因气血亏虚、肾精不足、脑失所养所致。气血亏虚型,多表现为眩晕、遇劳即发、面色㿔白、唇甲色白、心悸失眠、神疲懒言等;肾精不足型,多表现为眩晕、神萎、耳鸣眼花、腰酸腿软、遗精等。本篇主要介绍虚证眩晕的膏方。



### 一、膏方选用

#### 1. 气血亏虚型

##### 【方药】

党参 150 g 黄芪 150 g 天麻 150 g 白术 100 g 茯苓 150 g 白芍药 150 g 当归 100 g 酸枣仁 150 g 生熟地黄各 150 g 龙眼肉 100 g 大枣 100 g 怀山药 150 g 黄精 150 g 升麻 60 g 柴胡 60 g 木香 30 g 阿胶 200 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是形寒肢冷者,加桂枝 100 g,制附子 60 g。

如是恶心思吐者,加姜竹茹 100 g,制半夏 100 g,陈皮 60 g,生姜 100 g。

如是心悸不安者,加丹参 300 g,炙远志 100 g。

## 2. 肾精不足型

### 【方药】

熟地黄 200 g 山茱萸 150 g 菟丝子 150 g 牛膝 150 g 何首乌 200 g 怀山药 100 g 黄精 150 g 天麻 150 g 茯苓 150 g 泽泻 100 g 白术 100 g 枸杞子 150 g 女贞子 150 g 龟版胶 150 g 鹿角胶 100 g

上药除龟版胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是腰膝腿软、遗精尿清者,加杜仲 150 g,补骨脂 100 g。

如是潮热盗汗、五心烦热者,加黄柏 100 g,知母 100 g,川牛膝 150 g。

如是四肢不温、形寒怕冷者,加鹿茸 3 g,肉苁蓉 150 g,淫羊藿



150 g。

## 二、自我调摄

- (1)平时要免食高脂肪、高糖食品,忌辛辣、烟酒。
- (2)修身养性,房事有节,并适当参加体力活动和锻炼。

### 记忆力减退

记忆是一种心理活动,是人脑对客观世界反映的一种功能。也就是说外界形形色色的事物通过种种神经道路传到大脑,大脑经过一系列活动把认识的事物记录下来,再通过种种神经道路把需要做出的各种反应传到全身各系统以支配人的整体协调活动,这就称为“认知”功能。一旦脑的功能下降,会出现认识、了解、支配事物的功能退化。脑功能减退的一开始表现就是典型的记忆力下降,反映为对近期情景事物的忘却,以后慢慢发展到早期事件的忘却。因此,记忆力减退被称为轻度认知功能障碍。传统观念上认为年龄老化是记忆的杀手,只有老年人才会记忆力减退。其实,现在有不少的中青年人也会出现记忆力减退,引起的原因可能是:

- ①社会发展造成的信息量骤然猛增,使正常人的记忆力受到挑战。
- ②长期处在紧张、压力的环境中工作。
- ③年龄老化,脑细胞的减少。
- ④脑动脉逐渐硬化,脑部血液供氧逐渐减少,导致脑功能减退。

记忆逐渐减退是人类老化过程之中不可避免的一种生理变化,称为“良性健忘症”。除了记忆力减退,其他如情感、思维、反应、活动等都基本正常,因此不能与老年痴呆症划等号。



记忆力减退按照中医辨证多属虚证,或虚实夹杂。多因思虑过度,耗伤精血,使脑窍失养而空虚;或长期饮酒、抑郁、紧张,致脾虚生痰而扰乱脑窍。精血亏虚型,多表现为记忆力减退,伴有明显的头晕耳鸣、失眠多梦、腰酸腿软等症;脾虚痰阻型,多表现为记忆

力减退,伴有精神抑郁、烦躁不安、头晕头重、胸闷困倦,或瞌睡、或失眠。

## 一、膏方选用

### 1. 精血亏虚型

#### 【方药】

熟地黄 150 g 怀山药 150 g 山茱萸 100 g 枸杞子 150 g  
桑椹子 250 g 何首乌 150 g 龙眼肉 50 g 杜仲 100 g 丹参  
150 g 白芍药 200 g 茯苓 150 g 川芎 30 g 鹿角胶 100 g 龟  
版胶 150 g

上药除鹿角胶、龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有失眠多梦明显者,加枣仁 100 g,炙远志 100 g,石菖蒲 150 g。

如有形寒肢冷,小便清长者,加补骨脂 100 g,益智仁 100 g,淫羊藿 150 g。

### 2. 脾虚痰阻型

#### 【方药】

半夏 100 g 胆星 60 g 天麻 100 g 白术 100 g 枳实 100 g  
茯苓 150 g 陈皮 60 g 泽泻 100 g 川芎 30 g 生山楂 100 g  
神曲 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有困倦、嗜睡明显者,加石菖蒲 150 g,郁金 90 g,炙远志



60 g。

如有烦躁不安、情绪不畅者，加柴胡 60 g，紫苏 100 g，合欢花 60 g，白蒺藜 100 g。

如有胸闷恶心重者，加竹茹 100 g，旋复花 100 g。

## 二、自我调摄

(1) 在保证充足的睡眠同时，要适当参加一些体育锻炼和文娱活动，做到劳逸结合，身心健康。

(2) 保持精神愉快，心情舒畅，摆脱不必要的烦恼对大脑功能的影响。

(3) 忌烟酒，少食脂肪，宜吃鸡蛋、瘦肉、牛奶以保证营养。

## 老年痴呆症

老年痴呆症是指老年期出现的已获得的智能在本质上出现持续的损害，也就是由器质性脑损害导致的基本上不可逆的智能缺失和社会适应能力降低。主要表现为：在智能方面出现抽象思维能力丧失、推理判断与计划不足、注意力缺失；在人格方面出现兴趣与始动性丧失、迟钝或难以抑制、社会行为不端、不拘小节；在记忆力方面出现遗忘，地形、视觉与空间定向力差；在言语认知方面出现说话不流利，综合能力缺失。随着社会老龄化的到来，患病率呈现递增的趋势。虽然现代医学对老年性痴呆症的病因及发病机制的研究已经达到一定的水平，然而在治疗上仍没有理想的办法。近年来国内外学者也将治疗老年性痴呆症的希望转向了中国传统医学。



老年痴呆症属中医学“痴呆”范畴，中医认为本病机理是脏腑虚衰，痰浊瘀血内生，化毒为害，脑络结滞，神机失统而致。在轻、中度的痴呆中，一般以本虚为主，出现髓海不足、肝肾亏虚、脾肾两

虚证类。发展达到重度的阶段,则出现痰瘀阻脑络的证类,则病势顽缠,反复难治。髓海不足型,多伴有头晕耳鸣,怠惰思卧,骨软痿弱等。肝肾亏虚型,多伴有颧红盗汗,筋惕肉瞤,舌红少苔。脾肾两虚型,多伴有倦怠流涎,纳呆乏力,腹胀便溏,舌淡体胖。心肝火盛型,多伴有眩晕头痛,心烦不寐,咽干舌燥,尿赤便干,舌红苔黄。痰浊阻窍型,多伴有头重如裹,腹胀痞满,倦怠乏力,舌淡苔腻。血瘀脑窍型,多伴有头痛如刺,肢体麻木不遂等。

## 一、方剂选用

### 1. 髓海不足型

#### 【方药】

紫河车 1 具 人参 100 g 熟地黄 300 g 杜仲 150 g 怀牛膝 150 g 天门冬 150 g 远志 100 g 当归 150 g 黄柏 60 g 石菖蒲 150 g 龟版胶 200 g 阿胶 100 g

上药除龟版胶、阿胶、紫河车外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,紫河车须烘干研细末,再加入膏中调和,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有遗精、遗尿者,加莲子 150 g,益智仁 150 g。

如有夜寐不安者,加夜交藤 300 g,酸枣仁 200 g。

如有大便秘结者,加肉苁蓉 200 g,何首乌 300 g。

### 2. 肝肾亏虚型

#### 【方药】

龟甲胶 200 g 鹿角胶 150 g 枸杞子 150 g 紫河车 1 具 熟地黄 300 g 龙骨 500 g 远志 100 g 石菖蒲 100 g

上药中紫河车须烘干研细末,龟甲胶和鹿角胶用水蒸烊化备



用,余药加水煎煮3次,合并滤液,加热浓缩为清膏,加入紫河车细末和烱化的龟甲胶、鹿角胶调匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有头晕耳鸣者,加菊花100g,天麻150g,潼蒺藜150g。

如有心慌易惊者,加柏子仁150g,百合200g。

如有大便秘结者,加火麻仁150g,生何首乌300g。

### 3. 脾肾两虚型

#### 【方药】

熟地黄300g 茯苓300g 山茱萸150g 巴戟天150g 肉苁蓉150g 杜仲150g 石菖蒲150g 远志100g 五味子100g 大枣150g 砂仁30g 木香30g 龟版胶200g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烱,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有气短乏力者,加续断150g,黄芪300g。

如有纳呆食少,舌苔黄腻者,加川黄连20g,竹茹150g,枳实150g。

### 4. 心肝火盛型

#### 【方药】

黄连50g 黄芩150g 黄柏100g 山梔100g 生地黄200g 柴胡100g 酸枣仁300g 合欢皮150g 石菖蒲150g 龙胆草50g

上药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

老年痴呆症是本虚之人,选方不可久用,中病即止。



### 【加减变化】

如有大便秘结者，加大黄 150 g，火麻仁 150 g。

### 5. 痰浊阻窍型

#### 【方药】

苍术 150 g 白术 150 g 茯神 200 g 半夏 150 g 陈皮 90 g  
生甘草 60 g 神曲 150 g 石菖蒲 300 g 生枣仁 300 g 远志  
100 g 夜交藤 300 g 桔梗 30 g 川牛膝 150 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如是热痰甚者，加全栝楼 200 g，竹茹 150 g。

如是头晕头痛者，加天麻 150 g，泽泻 150 g。

### 6. 血瘀脑窍型

#### 【方药】

桃仁 150 g 红花 100 g 川芎 150 g 当归 150 g 葛根  
200 g 生地黄 200 g 枳壳 150 g 黄芪 200 g 人参 50 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有头痛如刺者，加延胡索 150 g，姜黄 150 g。

如有神情呆滞较重者，加石菖蒲 150 g，郁金 150 g。

## 二、自我调摄

(1) 进行康复医疗，可改善智力和生活能力，提高生活质量。如作业疗法，音乐疗法，情志疏导等。

(2) 饮食宜清淡而富于营养，忌食肥甘厚味和辛辣之品。选择瓜果如葡萄、苹果、核桃、杏仁等；蔬菜如蘑菇、黄花菜等。





## 震颤症

老年性震颤病是中枢神经系统变性的疾病,多发生在 50 岁以上,临床以四肢震颤、肌肉强直和运动减少为特征,又称为帕金森综合征。现代西医认为,老年人脑动脉硬化可使脑部黑质细胞变性,多巴胺含量减少、缺乏,导致椎体外系功能失调而产生本病。本病虽然进展很缓慢,但是在情绪激动、过度疲劳、紧张等情况下会明显加重。

老年性震颤病按照中医辨证有虚实之别。虚证多因脑髓不足、肝肾亏虚,以致气血不能上承脑,外不能养筋,偏于髓海不足型,多具头摇肢抖、头晕耳鸣、记忆不清、腰酸腿软、肢体麻木等。实证多因痰热、肝风交阻上冲所致,偏于痰热肝风交阻型者,多见头摇肢颤、头胀头痛、急躁易怒、痰多胸闷等。

### 一、膏方选用

#### 1. 髓海不足型

##### 【方药】

龟版胶 150 g 鳖甲胶 150 g 枸杞子 150 g 白芍药 150 g  
五味子 100 g 熟地黄 200 g 牛膝 150 g 山茱萸 100 g 当归  
100 g 杜仲 100 g 肉苁蓉 200 g 何首乌 150 g 生牡蛎 300 g  
钩藤 150 g 僵蚕 200 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

##### 【加减变化】

如有震颤严重者,加全蝎 30 g,蜈蚣 30 g。



如有肢体麻木者,加鸡血藤 300 g,天麻 100 g。

## 2. 痰热肝风交阻型

### 【方药】

半夏 100 g 陈皮 100 g 胆星 100 g 天麻 100 g 郁金 100 g 枳实 150 g 茯苓 150 g 黄芩 100 g 焦山栀 100 g 川牛膝 100 g 钩藤 150 g 制大黄 100 g 僵蚕 150 g 石决明 200 g 珍珠母 200 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有震颤严重者,加全蝎 30 g,蜈蚣 30 g。

如有烦躁易怒、睡眠不安明显者,加柴胡 60 g,炙远志 100 g,合欢皮 150 g,石菖蒲 100 g。

## 二、自我调摄

- (1)生活要有规律,保持良好的睡眠和充沛的精力。
- (2)坚持参加气功、太极拳等运动。
- (3)多吃蔬菜水果,少吃高脂肪食物,严禁酗酒和吸烟。



## 其他内科疾病

### 肿瘤放、化疗后

放疗和化疗是当前治疗肿瘤的主要方法,其目的是最大限度地杀死肿瘤细胞,同时尽量减少对正常细胞的损害。尽管近一二十年来肿瘤放化疗进展较快,但是迄今为止尚未发现有选择作用的放化疗,因此放化疗对正常组织细胞和肿瘤细胞同时产生生物效应和破坏作用,导致全身和局部的毒副反应。其主要表现是:①消化障碍:食欲明显减退,恶心腹胀,胃部饱胀等。②骨髓抑制:贫血和白细胞减少等。③机体衰弱:全身乏力、气短、虚汗等。④炎症反应:发热、疼痛、口腔溃疡、尿路感染等。

肿瘤放化疗后按照中医辨证有虚实之分,但是临床以虚证为主,多因放化疗法而致脏腑虚损;脾胃气虚型,多表现为疲乏无力、食欲不振、恶心呕吐、腹泻便溏等;肝肾不足、精血两亏型,多表现为头晕乏力、面色苍白或萎黄、腰膝酸软、白细胞减少、血小板降低、血红蛋白下降等。实证多因放化疗法而致瘀毒积聚。内服膏方比较适合于放化疗后产生的虚证,它在减轻其毒副作用、提高生活质量、延长生存期等方面,可弥补其他疗法的不足。



### 一、膏方选用

#### 1. 脾胃气虚型

##### 【方药】

黄芪 100 g 党参 150 g 白术 100 g 茯苓 200 g 炙甘草 30 g 柴胡 50 g 升麻 30 g 川朴 60 g 枳壳 150 g 陈皮 100 g 制半夏 100 g 薏苡仁 300 g 谷芽 100 g 神曲 150 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。一料服完,可再制一料,直至症状改善为止。

### 【加减变化】

如有腹泻便溏、胃纳不佳者,加怀山药150g,扁豆150g,砂仁60g,白豆蔻60g。

如有恶心、呕吐清水者,加竹茹150g,生姜60g,旋复花150g,代赭石200g。

如有气短乏力、口干明显者,加生晒参粉30g,西洋参50g,川石斛100g。

## 2. 肝肾不足型

### 【方药】

熟地黄150g 山茱萸100g 枸杞子150g 菟丝子150g  
何首乌200g 黄精150g 桑椹子150g 肉苁蓉150g 茯苓200g 怀山药150g 黄精150g 龟版胶100g 阿胶150g

上药除阿胶、龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有骨髓抑制,白细胞减少者,加女贞子150g,补骨脂100g,淫羊藿150g。

如有头晕眼花,心悸明显者,加丹参150g,枣仁150g,炙远志100g。

如有疲乏无力,气短者,加黄芪150g,生晒参粉50g。



## 二、自我调摄

- (1) 克服悲观情绪,树立信心,配合医生的治疗。
- (2) 在保证充足的休息的前提下,干一些力所能及的劳动,同时适当参加社会活动,开阔心胸,乐观向上。
- (3) 饮食注意营养,避免油腻,多吃蔬菜水果及高蛋白质类食品。

## 虚 汗

虚汗是指因机体阴阳失调、皮肤腠理不固而引起汗液外泄的病症,一般可分为自汗和盗汗。自汗的特征是平时容易出汗,稍动则出汗加重,大多发生在白天;盗汗的特征是入睡后易出汗,苏醒后汗出即止,大多发生于晚上。虚汗可以单独出现,也可见于多种疾病之中,如甲状腺功能亢进症、自主神经功能紊乱、更年期综合征、结核病或某些传染病的恢复期。其实出汗是人体的生理现象,如天气炎热、穿着过暖、渴饮热汤、劳动奔走等引起的发汗,有利于机体散热以调节体温;感冒时服用发散的中药后出汗,能够祛除病邪,有助于疾病的治疗。这种正常的生理现象无须服用膏方。



中医认为自汗大多因肺气不足、肌表疏松、腠理开泄所致,临床上除了容易出汗外,平时很容易感冒、面色㿔白、神疲气短等;盗汗多因阴虚火旺、热迫津液外泄所致,临床上除了入睡后出汗外,常伴有轰热颧红,稍一紧张则潮热加重、口干、大便干燥等。

### 一、膏方选用

#### 1. 自汗(卫表不固型)

##### 【方药】

黄芪 200 g 防风 60 g 白术 100 g 煅龙骨 300 g 煅牡蛎

300 g 乌梅 90 g 五味子 90 g 大枣 150 g 杭白芍 150 g 陈皮 30 g

上药除阿胶、鹿角胶、黑芝麻、胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烱，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有体虚、面色苍白、胃口不好者，加党参 100 g，茯苓 150 g，怀山药 150 g。

如有口干喜饮水者，加麦冬 150 g，北沙参 150 g，川石斛 100 g。

## 2. 盗汗(阴虚火旺型)

### 【方药】

当归 100 g 生地黄 200 g 熟地黄 250 g 川黄连 30 g 黄芩 90 g 黄柏 100 g 生黄芪 100 g 泽泻 100 g 地骨皮 200 g 煅牡蛎 300 g 糯稻根 300 g 煅龙骨 200 g 山茱萸 150 g 龟版胶 100 g 鳖甲胶 200 g

上药除阿胶、鹿角胶、黑芝麻、胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烱，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有心烦多梦易惊醒者，加丹参 150 g，连翘 100 g，竹叶 50 g，远志 100 g。

如有头晕耳鸣、口干者，加女贞子 300 g，枸杞子 200 g，天门冬 150 g，麦门冬 150 g。



## 二、自我调摄

- (1)平时加强锻炼身体,增强体质以防止疾病的产生。
- (2)虚汗患者可连续服用膏方,直至痊愈。

## 早 衰

早衰是指因各种原因使中壮年人过早地出现生理上衰老、体质上衰退和心理上衰弱的现象,所以又称之为“早衰综合征”。主要表现在五个方面:第一,身高和体重下降;第二,皱纹和色斑增多;第三,头发与牙齿脱落;第四,听力和视力减退;第五,思维与语言迟钝。关于未老先衰的病理机制至今尚未明确,尽管医学界已划定 60 岁是进入老年期的年龄界限,但是由于人们各自的生活环境、条件、状况不同,使衰老的发生并未受到绝对的年龄限制。有的人虽然年近古稀,但依然精力充沛,能从容应付各种繁杂的工作;而有的人还未及“知天命”之年,就已形衰力竭,一般的日常事务也有点力不从心。有研究表明,人体细胞中可能存在着“衰老基因”,当遗传物质不断解散达到一定阶段,触发了衰老基因时,或遗传密码遭到破坏时,人体必然趋向衰老。



早衰按照中医辨证多属虚证。或先天肾气不足,或后天久病体弱、耗伤精血,致肾气日衰、肾精不充,继而致脏腑功能进一步衰退而加速老化。临床多表现为须发早白、头晕耳鸣、牙齿松动脱落、心悸失眠健忘、精神萎靡、食欲不振、腰酸腿软、行走乏力、性欲冷淡、阳痿等。

### 一、膏方选用

#### 【方药】

熟地黄 150 g 怀山药 150 g 山茱萸 100 g 枸杞子 100 g

胡桃肉 150 g 杜仲 100 g 菟丝子 150 g 牛膝 150 g 麦门冬 150 g 天门冬 150 g 丹参 100 g 白芍药 200 g 茯苓 150 g 川芎 30 g 砂仁 30 g 木香 15 g 鹿角胶 100 g 龟版胶 100 g

上药除龟版胶、鹿角胶、胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烱，胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。膏方可四季服用。

### 【加减变化】

如食欲不振者，加党参 150 g，白术 100 g，炒山楂 100 g，鸡内金 60 g。

如心神不宁、失眠健忘者，加石菖蒲 150 g，酸枣仁 100 g，炙远志 100 g，柏子仁 150 g。

如头晕眼花、时而耳鸣者，加天麻 100 g，石菖蒲 150 g，磁石 300 g。

如性欲冷淡、小便清长者，加补骨脂 100 g，益智仁 150 g，淫羊藿 150 g。

如极易疲劳者，加人参 50 g，紫河车粉 50 g。

## 二、自我调摄

- (1) 饮食方面做到食有定时、定量，切忌暴饮暴食，酗酒嗜烟。
- (2) 坚持参加适合自身体力条件的运动，如太极拳、散步等。
- (3) 适度过性生活对健康是有益的。

## 体虚低热

体虚低热又称“功能性低热”，其临床特征是患者体温较正常人升高 0.3～0.5℃，但是一般不超过 38℃，各项体检指标可排除





各种器质性疾病的可能。现代西医认为体虚低热多见于青年女性,引起原因可能与自主神经功能紊乱有关,常伴有心悸、多汗、失眠等症。有些女青年每年在炎热的夏季出现低热、乏力、食欲减退等,但一旦入秋后,体温自然恢复正常,可反复多年,此称为夏季低热,属于体虚低热的范畴。有小部分急性传染病恢复期的患者,由于体温中枢调节功能尚未恢复正常,也会引起低热。

体虚低热按照中医辨证以虚为主,多因气血阴精亏虚,脏腑功能失调所致。可分为气虚低热,表现为低热常在疲劳后发生或加剧,头晕乏力、气短汗出、容易感冒、食欲不振、大便溏薄;血虚低热,表现为低热、头晕眼花、心悸不宁、唇甲色淡、面白少华等;阴虚低热,午后或夜间发热明显,五心烦热、盗汗颧红、口感便秘等。

## 一、膏方选用

### 1. 气虚低热

#### 【方药】

生黄芪 100 g 党参 150 g 白术 100 g 白芍药 150 g 当归 100 g 陈皮 60 g 升麻 60 g 柴胡 100 g 怀山药 150 g 银柴胡 100 g 胡黄连 90 g



上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有自汗较多者,加煅龙牡各 100 g,麻黄根 150 g。

如有食少便溏者,加茯苓 150 g,薏苡仁 200 g,扁豆 150 g。

### 2. 血虚低热

#### 【方药】

党参 150 g 茯苓 150 g 白术 100 g 当归 100 g 酸枣仁 150 g 白芍药 150 g 龙眼肉 60 g 稽豆衣 100 g 生地黄 150 g 白薇 150 g 秦艽 150 g 阿胶 100 g 龟版胶 100 g

上药除阿胶、龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有疲乏气短懒言者,加黄芪100g,生晒参50g。

如有心悸怔忡严重者,加生龙骨齿(各)200g,生牡蛎200g,熟地黄200g。

### 3. 阴虚发热

#### 【方药】

银柴胡150g 地骨皮150g 胡黄连100g 知母60g 青蒿150g 秦艽100g 生地黄150g 熟地黄150g 女贞子150g 旱莲草200g 生甘草60g 鳖甲胶200g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有盗汗明显者,加煅龙牡各200g 五味子100g 浮小麦200g。

如有虚烦不眠者,加酸枣仁150g 柏子仁200g 夜交藤300g。

## 二、自我调摄

(1)注意劳逸结合,有利于调整和恢复机体各器官的生理功能。

(2)饮食宜清淡,富有营养,而又易于消化的食品。



## 干燥综合征

干燥综合征是指以口腔和眼干燥为主要表现的一种疾病。任何年龄都可发生,但以中年女性多见。现代西医认为,此病是一种自身免疫性疾病,病变部位主要在泪腺和唾液腺。本病按中医归类属于“燥症”的范畴,但中医的燥症其病变部位较广泛,可影响到人体的各部位,出现皮肤干燥、指甲干枯、眼干鼻燥、口燥咽干、大便秘结等。

干燥综合征按照中医辨证有虚实两大类,虚证多因素体阴虚燥热,或气阴两亏所致。阴虚燥热型,除了有燥象外,常伴有低热或五心烦热、颧红盗汗;气阴两亏型,除了有燥象外,常伴有疲倦乏力、气短懒言。实证多因瘀血阻滞或湿热郁滞所致。瘀血阻滞型,除了有燥象外,常伴有面色晦滞、口唇紫暗;湿热郁滞型,除了有燥象外,常伴有小便黄赤而混浊。

### 一、膏方选用

#### 1. 阴虚燥热型

##### 【方药】

生地黄 300 g 熟地黄 300 g 麦门冬 300 g 女贞子 300 g  
泽泻 100 g 石斛 200 g 玉竹 150 g 旱莲草 300 g 北沙参  
300 g 天花粉 150 g 芦根 300 g 川楝子 50 g 枸杞子 150 g  
茯苓 300 g 鳖甲胶 200 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

##### 【加减变化】



如有潮热盗汗明显者,加地骨皮 300 g,青蒿 200 g,龟版胶 150 g。

如有烦躁不安者,加焦山栀 100 g,淡豆豉 60 g。

## 2. 气阴两亏型

### 【方药】

生地黄 300 g 麦门冬 300 g 玄参 150 g 党参 100 g 太子参 300 g 茯苓 300 g 枸杞子 150 g 怀山药 300 g 黄精 150 g 扁豆 150 g 石斛 150 g 玉竹 150 g 龟版胶 200 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有低热持续不退者,加青蒿 100 g,银柴胡 100 g,鳖甲胶 150 g。

如大便溏薄者,去生地黄、玄参,加白术 100 g,薏苡仁 300 g。

## 3. 瘀血阻滞型

### 【方药】

丹参 300 g 当归 100 g 赤芍药 150 g 白芍药 200 g 桃仁 150 g 牡丹皮 150 g 生地黄 150 g 三七 100 g 鸡血藤 300 g 夜交藤 300 g 川芎 30 g 炙甘草 30 g 川楝子 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有面色紫暗明显者,加水蛭 60 g,穿山甲 100 g,红花 50 g。

如有目干涩伴头痛明显者,加黄菊花 100 g,谷精草 150 g,木贼草 150 g。

## 4. 湿热郁滞型



### 【方药】

炒黄芩 100 g 炒黄柏 100 g 茵陈蒿 300 g 薏苡仁 300 g  
猪茯苓(各)150 g 滑石 200 g 杏仁 100 g 炒苍白术(各)100 g  
川牛膝 150 g 白豆蔻 50 g 金银花 150 g 板蓝根 100 g 生甘  
草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再  
加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有尿黄气臭者,加车前子 300 g,木通 60 g,泽泻 150 g。

如有口苦胸闷者,加川黄连 30 g,全栝楼 300 g 制半夏 60 g。

## 二、自我调摄

(1)干燥综合征是自身免疫性疾病,患者可以通过增强体质,  
调节机体的免疫功能,达到协助治疗的目的。

(2)重视情志的调摄,做到思想放松,情绪稳定,心情舒畅。

(3)忌食辛辣食品,不饮酒,不吸烟可有助于减轻症状。



## 妇 科

### 月经过多

月经过多是指每个月的经期持续时间超过正常范围,月经总量也比正常月经量明显增多(正常女性每次行经量为 50~80 毫升),而月经周期基本正常。现代医学中的子宫肌瘤、功能性子宫出血、盆腔炎、血小板减少症等都可能引起月经过多。

月经过多按照中医辨证有虚实之分。虚证多因体质虚弱,中气不足,气不摄血所致。临床表现为月经量多而色淡质稀,常伴有神疲乏力,面色苍白。实证多因体质阳盛,热伏子宫,迫血妄行;或瘀血阻滞,血不循经而导致月经过多。临床表现为月经量多而色深红或紫红,质黏稠有血块,常伴有腰腹胀痛、面红口干、小便黄、大便干。

#### 一、膏方选用

##### 1. 虚证

##### 【方药】

党参 200 g 黄芪 150 g 当归 150 g 白芍药 300 g 白术 200 g 茯苓 200 g 怀山药 300 g 黄精 150 g 升麻 50 g 酸枣仁 100 g 木香 15 g 仙鹤草 300 g 山稔根 200 g 阿胶 250 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加冰糖 300 g 收膏即成。每于经前 2~3 天开始服用,每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。可连服 2~3 个经期。



### 【加减变化】

如经量很多者,加艾叶炭 100 g,茜草炭 200 g,煅龙骨 200 g,煅牡蛎 200 g。

如月经中夹有血块,月经颜色偏暗者,加丹参 200 g,川芎 60 g。

如失眠健忘者,加龟版胶 100 g,酸枣仁 150 g。

## 2. 实证

### 【方药】

生地黄 300 g 牡丹皮 150 g 黄芩 100 g 黄柏 150 g 山栀 100 g 制大黄 100 g 苎麻根 300 g 乌贼骨 300 g 地榆 200 g 槐花 150 g 旱莲草 300 g 白芍药 300 g 丹参 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加冰糖 300 g 收膏即成。每于经前 2~3 天开始服用,每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。可连服 2~3 个经期。

### 【加减变化】

如有月经中血块很多,月经颜色偏鲜红者,加益母草 300 g,泽兰 150 g。

如有内热口干明显,喜喝冷饮者,加知母 60 g,麦门冬 200 g,地骨皮 300 g。

如是子宫肌瘤严重者,加三棱 150 g,莪术 150 g。

## 二、自我调摄

(1) 月经过多无论属虚、属实,时间一长都会导致机体亏损,患者都应增加营养,补充铁质,防止出血太多而引起贫血。

(2) 适当参加身体锻炼以增强体质,提高治疗效果。

(3) 对于血小板减少或严重的子宫肌瘤引起的经量增多,久治不愈者应积极配合原发病的治疗才能奏效。



## 闭 经

闭经,又称“经闭”。女青年年龄超过 18 周岁月经尚未来潮的称为“原发性闭经”;女性已经建立月经周期,但中断 3 个月以上不来月经而又未怀孕的称为继发性闭经。妇女在妊娠期、哺乳期、绝经期后的停经属于生理现象,不属闭经范畴。引起闭经的原因很多,其病理机制非常复杂。现代西医根据闭经的病变部位不同分为子宫性闭经、卵巢性闭经、垂体性闭经和丘脑性闭经,所以临床上遇到此类患者应认真检查后才能作出正确的诊断。本书介绍的膏方只能用于女性内分泌功能失调,对于先天性无子宫、无卵巢、阴道闭锁和人工流产导致子宫内膜过度损伤等器质性疾病引起的闭经,膏方不能解决病痛。

中医文献中记载的“暗经”,即虽然终身不来月经,但是仍能正常妊娠生育;“歇夏”,即每年夏天月经停行,但是天气凉爽后月经周期又恢复正常;“避年”,即每年仅来一次月经,自己感觉身体无病,这些情况都属于特殊的生理现象,所以并不需要治疗。

闭经按照中医辨证可分虚实两类:虚证称为“血枯闭经”,多因肝肾不足,或气血虚弱,使精枯血少,无血可下,月经由量少而渐至闭经,面色苍白或萎黄,神情疲乏,头晕耳鸣;实者称为血隔闭经,多因气滞血瘀,或痰湿阻滞,使脉道不通而经闭不行,月经数月不来,心情抑郁,面色晦暗,或形体肥胖,带下量多。

### 一、膏方选用

#### 1. 血枯闭经型

##### 【方药】

党参 200 g 黄芪 200 g 白术 100 g 白芍药 150 g 熟地黄 300 g 何首乌 300 g 鸡血藤 300 g 怀山药 300 g 当归 200 g





川芎 150 g 陈皮 30 g 枸杞子 200 g 丹参 300 g 益母草 300 g 红花 150 g 桃仁 200 g 泽兰 150 g 阿胶 300 g 大枣 200 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加红糖300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如腰酸腿软,头晕耳鸣明显者,加菟丝子150 g,黄精200 g,桑寄生150 g,杜仲150 g。

如有性欲淡漠者,加淫羊藿150 g,鹿角150 g,紫河车100 g。

## 2. 血隔闭经型

### 【方药】

当归 200 g 川芎 200 g 赤芍药 200 g 丹参 300 g 益母草 300 g 桃仁 300 g 红花 150 g 泽兰 200 g 三棱 150 g 莪术 150 g 凌霄花 100 g 香附 150 g 枳壳 150 g 牛膝 150 g 柴胡 100 g 甘草 50 g

上药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加红糖300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如是形体肥胖、胸闷痰多者,加茯苓150 g,半夏100 g,陈皮100 g,苍术100 g,石菖蒲200 g。

如有便秘、尿黄、口干者,加大黄60 g,麦门冬200 g,黄柏100 g,山栀100 g。

## 二、自我调摄

(1)闭经是一种比较复杂的病症,决不能不辨虚实就随便应用大量的活血祛瘀中药,这样会使病情更加复杂而贻误治疗。



(2)闭经应尽早治疗,否则会加重病情。对于未婚女子来说可能会造成不孕症;已婚女子会引起性功能减退而增加治疗的难度。

## 痛 经

痛经是指在妇女月经期或月经期前后发生明显小腹疼痛,疼痛剧烈时会引起呕吐、手足冰冷,甚至昏厥的病症。大多数妇女月经来潮时并无明显不适,部分妇女可能会感到小腹部有轻微的胀坠感,这是因为经期盆腔充血,子宫收缩的缘故,此属正常的经期生理反应,无需服药。仅有极少数妇女可能被诊断为痛经。现代医学中的子宫发育不良、子宫畸形、子宫肌瘤、子宫内膜异位和盆腔炎等都可能引起痛经。

痛经按照中医辨证可分虚实两大类:实证多因气滞血瘀、寒湿、湿热导致胞脉运行不畅,不通而痛,临床表现为小腹疼痛剧烈而拒按,腹痛大多发生在经前或经期,月经中常夹有血块;虚证多因气血不足、肝肾两亏导致胞脉失于濡养而作痛,临床表现为小腹疼痛而稍缓和,喜按,喜暖,腹痛大多发生在月经后期,月经量少而色淡。

### 一、膏方选用

#### 1. 实证膏方

##### 【方药】

当归 150 g 赤芍药 200 g 川芎 100 g 生地黄 150 g 桃仁 150 g 红花 50 g 丹参 200 g 益母草 300 g 香附 100 g 川楝子 150 g 延胡索 150 g 木香 90 g 槟榔 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加红糖 300 g 收膏即成。每于经前 7~10 g 天开始服用,每次 15~30 g,每日 2~3 次,开水调服。可连服 3~6 个经期。



### 【加减变化】

如每次痛经都伴有呕吐者,加制半夏 100 g,生姜 100 g,吴茱萸 60 g。

如小腹冷痛拒按者,去赤芍药、生地黄,加肉桂 20 g,小茴香 60 g,乌药 100 g。

如盆腔炎严重者,加红藤 150 g,牡丹皮 150 g,败酱草 200 g。

## 2. 虚证膏方

### 【方药】

党参 250 g 黄芪 300 g 当归 150 g 川芎 60 g 白芍药 300 g 熟地黄 200 g 香附 100 g 川楝子 150 g 延胡索 150 g 龟版胶 200 g 阿胶 200 g 陈皮 50 g

上药除龟版胶、阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加红糖 300 g 收膏即成。每于经前 10 天开始服用,每次 15~30 g,每日 2~3 次,开水调服。可连服 3~6 个经期。

### 【加减变化】

如有小腹冷痛,喜按、喜暖者,加艾叶 50 g,紫石英 150 g,肉桂 20 g。

如为腰膝酸软疼痛者,加桑寄生 150 g,五加皮 150 g,淫羊藿 100 g,巴戟天 100 g。

## 二、自我调摄

- (1)保持轻松、愉快的心情,消除不必要的恐惧和紧张情绪。
- (2)月经期间尽量少吃寒冷或刺激性食物,尤其不可吃冷饮。
- (3)月经期不宜用冷水洗足、洗阴部;特别注意小腹部的保暖。



## 习惯性流产

流产是指子宫内妊娠在 28 周以前中断的病症,根据现代西医的分类法,流产可分为早期流产和晚期流产两种:流产发生在妊娠 12 周以前的称为早期流产,其原因主要有黄体功能不全、精神因素、垂体功能不足、染色体异常和精子缺陷等;晚期流产通常发生在 12~28 周之间,最常见的原因是宫颈内口松弛、子宫畸形、子宫肌瘤、母儿血型不和等。而习惯性流产是特指自然流产连续发生三次或三次以上,每次发生流产的时间在或不在同一妊娠月份。临床上最常见的症状是阴道出血、腹痛、腰痛坠胀,甚至阴道有血块的排出。

习惯性流产中医称之为“滑胎”。按照中医辨证大多属虚证,多因素体气血两亏,不足以养胎,致胎孕不固,临床表现为阴道少量出血,色淡红,少腹坠胀,面色苍白等。或肾虚冲任不固,胎失所系而致,临床表现为阴道出血,少腹坠胀,或腰痛坠胀,头昏眼花,腰酸腿软。



### 一、膏方选用

#### 1. 气血两亏型

##### 【方药】

党参 200 g 黄芪 150 g 黄精 150 g 白术 200 g 茯苓 150 g 白芍药 300 g 当归 100 g 熟地黄 200 g 枸杞子 300 g 何首乌 150 g 杜仲 150 g 黄芩 100 g 升麻 30 g 炙甘草 60 g 阿胶 200 g 鹿角胶 100 g

上药除阿胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,

每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有胃纳不佳,脘腹胀满者,加陈皮 60 g,砂仁 50 g,白豆蔻 50 g,鸡内金 90 g。

如是头昏眼花,梦多健忘者,加龙眼肉 60 g,红枣 100 g,酸枣仁 150 g。

## 2. 肾气不足型

### 【方药】

熟地黄 200 g 当归 100 g 枸杞子 200 g 何首乌 200 g 桑寄生 250 g 续断 150 g 菟丝子 300 g 山茱萸 150 g 枳壳 300 g 升麻 30 g 砂仁 30 g 陈皮 30 g 阿胶 100 g 鹿角胶 120 g 龟版胶 120 g

上药除阿胶、鹿角胶、龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、鹿角胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如是腰酸腿软,小便清长者,加补骨脂 150 g,益智仁 100 g。

如有少腹冷痛明显者,加艾叶 50 g,淫羊藿 100 g。



## 二、自我调摄

(1) 习惯性流产患者得知怀孕后应尽早服用膏方以养胎、安胎。

(2) 对于已出现阴道少量出血的孕妇来说,应坚持服膏方。即使出血停止,症状减轻,仍需继续巩固服药以安胎、保胎。

(3) 除了服用膏方外,孕妇还应避免紧张情绪,戒躁勿怒。

## 不孕症

不孕症是指育龄妇女夫妻同居 2 年以上,不采取避孕措施而未能怀孕的病症。结婚后从未受孕者,称为原发性不孕;曾经受孕或流产后又 2 年以上未再受孕者,称为继发性不孕。受孕是一个复杂的生理过程,必须具备的基本条件是:女方能正常排卵;男方能排出正常数量和质量的精子;精子和卵子能结合;受精卵能着床。因此不孕症的原因涉及男女双方。本篇所述的不孕症特指女性患者。女性不孕症的原因十分复杂,临床上以内分泌紊乱,如下丘脑—垂体—卵巢轴的功能失调;黄体功能不健及生殖器官疾病,如输卵管阻塞、子宫内膜异位、生殖器结核病等为多见。不孕症在中医书籍中又称“无子”、“全不产”、“绝产”等。

不孕症按照中医辨证可分为虚实两类:虚证多因体质虚弱,气血不足,或房劳过度,肝肾虚衰,以致胞脉失养,不能摄精成孕,临床表现为月经延期,量少色淡,性欲减退,头晕眼花,腰酸腿软等;实证多因痰湿阻滞或气滞血瘀,以致胞脉受阻,不能受孕,临床表现为月经先后不定,经色紫暗或有小血块,经期腹痛,精神抑郁,或形体肥胖,胸闷乏力等。



### 一、方方选用

#### 1. 虚证

##### 【方药】

熟地黄 300 g 当归 100 g 鸡血藤 300 g 白术 150 g 茯苓 150 g 白芍药 200 g 枸杞子 200 g 菟丝子 150 g 肉苁蓉 300 g 淫羊藿 150 g 香附 60 g 鹿角胶 150 g 阿胶 150 g 龟版胶 150 g 炙甘草 60 g

上药除龟版胶、鳖甲胶、阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去

渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。可连服数料膏方。

### 【加减变化】

如是怕冷,手足不温者,加附子 30 g,肉桂 15 g。

如有五心烦热者,去鹿角胶、淫羊藿,加生地黄 150 g,女贞子 150 g,旱莲草 150 g。

如是失眠健忘者,加五味子 100 g,酸枣仁 150 g,龙眼肉 60 g。

如是腰酸腿软较重者,加杜仲 150 g,狗脊 100 g,桑寄生 150 g。

## 2. 实证

### 【方药】

桃仁 150 g 红花 100 g 当归 150 g 白芍药 200 g 熟地黄 200 g 川芎 60 g 香附 100 g 茯苓 150 g 川牛膝 150 g 桂枝 50 g 甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加红糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



### 【加减变化】

如是胁肋胀痛者,去熟地黄,加柴胡 60 g,川楝子 100 g,延胡索 150 g,玫瑰花 60 g。

如是形肥困倦者,去熟地黄、白芍药,加苍术 150 g,半夏 100 g,陈皮 60 g。

如是输卵管阻塞者,加穿山甲 100 g,虻虫 100 g,路路通 150 g。

如盆腔炎严重者,加红藤 200 g,败酱草 200 g,蒲公英 300 g。

## 二、自我调摄

(1)先作妇科检查、内分泌检查等明确病因,才能取得更好的

治疗效果。

(2)把握排卵前后 1~2 天性交能增加受孕机会,性交太少,不能把握受精机会。

(3)保持心情舒畅,使机体气血调和、疏泄正常。

## 白 带

白带是指阴道流出的白色分泌物,有病理性和生理性两种:病理性白带是指妇女阴道内流出的量较多的白色黏液,其质地黏稠,如涕如唾,而且绵绵不断;生理性白带是指正常妇女阴道内分泌的少量无色或略带白色、无臭、黏而不稠的液体,具有滑润阴道黏膜的作用,故古人有“十女九带”的说法。由于生理性白带主要来源于子宫颈腺体,以及少量的阴道黏膜渗出,而且其排出量与雌激素水平的高低有关,所以有些妇女在排卵期或妊娠期阴道分泌物会增多。临床所讲的白带通常就是指病理性白带,本书介绍的膏方适用于病理性白带。现代医学中的阴道炎、宫颈炎、盆腔炎、宫颈癌、子宫肌瘤等都可能引起病理性白带。

白带按照中医辨证可分虚实两类。虚证又分为脾虚型、肾虚型。脾虚型白带多因脾气虚弱,运化功能失常,使水谷不为精微,反聚为湿,湿浊下注,任脉不固,带脉失约而致带下。临床表现为带下色白、稀薄量多、神疲乏力、纳差便溏。肾虚型白带多因肾气亏耗,肾失闭藏,带脉失约,使精液滑脱而下,临床表现为带下色白如水、腰膝酸软、头晕耳鸣、小便清长。实证一般是指湿热型白带,多因湿热内困,损伤带脉、任脉,以致秽浊液体下流,临床表现为带下色黄如脓或如米泔、阴部瘙痒或灼热疼痛、小便黄赤。

### 一、膏方选用

#### 1. 脾虚型





### 【方药】

党参 200 g 白术 150 g 白芍药 150 g 怀山药 300 g 薏苡仁 300 g 扁豆 300 g 茯苓 200 g 莲子 150 g 芡实 200 g 白果 100 g 苍术 100 g 煅龙骨 300 g 煅牡蛎 300 g 陈皮 50 g 升麻 30 g 甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如带下不止,质地清稀者,加金樱子 300 g,椿根皮 150 g。

如疲乏无力,头晕明显者,加黄芪 150 g,黄精 200 g。

## 2. 肾虚型

### 【方药】

鹿角胶 200 g 龟版胶 150 g 菟丝子 200 g 潼蒺藜 200 g 杜仲 150 g 肉苁蓉 300 g 怀山药 300 g 莲子 150 g 芡实 200 g 山茱萸 150 g 金樱子 200 g 桑螵蛸 150 g 煅龙骨 300 g 煅牡蛎 300 g

上药除鹿角胶、龟版胶外,其余药物加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如小便量多者,加覆盆子 150 g,补骨脂 100 g,益智仁 150 g。

如是大便稀薄者,去肉苁蓉,加肉豆蔻 100 g,五味子 100 g。

如是肢冷形寒明显者,加附子 30 g,肉桂 15 g。

## 3. 湿热型

### 【方药】

龙胆草 50 g 山栀 100 g 黄芩 150 g 黄柏 100 g 车前子 300 g 泽泻 150 g 茯苓 200 g 猪茯苓 200 g 土茯苓 300 g



椿根皮 200 g 牛膝 150 g 生地黄 150 g 甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加白砂糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有阴部瘙痒者,加白鲜皮 150 g,苦参 150 g,地肤子 150 g。

如有带下秽臭者,加墓头回 150 g,红藤 150 g,败酱草 150 g。

## 二、自我调摄

(1) 白带失调患者应进行相关的妇科检查,以便及时发现和治疗引起白带的子宫肌瘤、宫颈炎、阴道炎等病。

(2) 脾虚患者可常吃怀山药、扁豆;肾虚者可多吃鸡肉、羊肉等,以增强体质,提高治疗效果。

(3) 节制性生活,注意保护肾气,避免因体虚而导致白带失调。

(4) 讲究个人卫生,坚持每天清洗阴部,预防感染。

## 慢性盆腔炎

慢性盆腔炎是指反复发作的下腹部疼痛、低热、疲劳、白带增多等的病症。其病变部位局限于输卵管、卵巢和子宫旁的结缔组织。西医认为本病多因急性盆腔炎治疗不当、迁延日久而成,也有因盆腔炎急性期不明显,忽视了治疗而造成。

慢性盆腔炎本病属中医“腹痛”、“带下”等证范畴。按照中医辨证可分湿热蕴结型、气滞血瘀型及肝肾不足型。湿热蕴结型多因洗涤用具不洁,或性交不洁等,使湿热病邪入侵,冲任失调所致,临床主要表现为少腹隐痛、低热起伏、带多秽臭、色黄;气滞血瘀型多因急性期治疗不当,病邪久留,瘀积于胞中,以致胞脉受阻,功能失常,临床主要表现为少腹刺痛、胀痛拒按、性交痛、白带增多、月经失调等;肝肾不足型多因久病不愈,肝肾受损,以致冲任功能失



常,经脉不畅,临床主要表现为少腹酸痛、腰膝酸软、带多质稀等。

## 一、膏方选用

### 1. 湿热蕴结型

#### 【方药】

金银花 300 g 连翘 200 g 红藤 300 g 败酱草 150 g 蒲公英 300 g 紫花地丁 300 g 茵陈蒿 200 g 延胡索 150 g 生蒲黄 150 g 香附 100 g 椿根皮 200 g 琥珀粉 20 g 生鳖甲 300 g 玄参 150 g 甘草 50 g

上药除琥珀外加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏后,加入琥珀粉调匀,再加白砂糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如带下量多,色黄黏稠者,加土茯苓 150 g,茯苓 200 g,萆薢 200 g。

如尿痛不畅,小便短赤者,加金钱草 300 g,滑石 200 g,瞿麦 150 g。

如腹部胀痛明显者,加枳实 100 g,大腹皮 150 g。

### 2. 气滞血瘀型

#### 【方药】

桃仁 200 g 红花 100 g 当归 150 g 川芎 60 g 赤芍药 150 g 丹参 300 g 生地黄 200 g 乳香 60 g 没药 60 g 柴胡 100 g 青皮 90 g 陈皮 60 g 川楝子 200 g 延胡索 150 g 甘草 30 g 蜂蜜 300 g。上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有带下量多,色黄者,加墓头回 150 g,白芷 100 g,白术



150 g。

如有腹部有包块，刺痛者，加三棱 150 g，莪术 150 g，穿山甲 100 g。

如有乳房胀满疼痛者，加八月札 100 g，娑罗子 100 g。

### 3. 肝肾不足型

#### 【方药】

熟地黄 200 g 怀山药 300 g 山茱萸 150 g 菟丝子 150 g  
杜仲 100 g 茯苓 300 g 丹参 200 g 当归 100 g 川芎 30 g 白  
芍药 150 g 枸杞子 150 g 龟版胶 250 g

上药除龟版胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15～30 g，每日 2 次，开水调服。

#### 【加减变化】

如带下量多，色白者，加鸡冠花 150 g，芡实 200 g，白果 150 g。

如是腹痛绵绵，喜按者，加延胡索 100 g，徐长卿 150 g，鸡血藤 300 g。

如腹部有包块，胀痛明显者，加三棱 150 g，莪术 150 g。

## 二、自我调摄

(1)慢性盆腔炎患者应配合中药保留灌肠，特别是盆腔有包块的患者更应内外治结合，才能达到事半功倍的效果。

(2)慢性盆腔炎患者应该注意外阴部的卫生，禁止经期同房，以防病邪侵犯机体，提高机体的抗病能力。

(3)注意休息，避免过度劳累，以防止抵抗力下降而引发慢性盆腔炎。



## 子宫肌瘤

子宫肌瘤是妇科临床常见的良性肿瘤之一,指生长于子宫任何部位的平滑肌瘤,大多发生在育龄期妇女。根据子宫肌瘤发生的部位可分为浆膜下子宫肌瘤、肌壁间子宫肌瘤和黏膜下子宫肌瘤。浆膜下子宫肌瘤是指肌瘤向子宫表面生长并突出;肌壁间子宫肌瘤是指肌瘤生长于肌壁中;黏膜下子宫肌瘤是指肌瘤向子宫腔内生长而突出。子宫肌瘤的典型症状为月经过多和继发贫血,此外,可以出现白带增多、尿频、尿潴留、便秘、小腹胀痛、腰痛或腿痛等。由于不少患者可以没有症状,所以通过妇科检查及B超才能得到明确的诊断。据统计,35岁以上的妇女中约有20%患有子宫肌瘤。由于子宫肌瘤在绝经后多会逐渐萎缩,故一般认为子宫肌瘤的发生与长期大量的雌激素刺激有关。

子宫肌瘤属中医“崩漏”、“癥瘕”范畴,按照中医辨证分析属虚实夹杂病症。多因气虚推动乏力,或气滞血瘀,或寒凝胞宫,瘀久成癥、冲任失调所致。无论虚实寒热,瘀血是本病的主要病理改变。血瘀为患,或成癥瘕,使肌瘤突现于子宫,并产生小腹胀痛、腰痛或腿痛、尿潴留、便秘等压迫症状;或血溢于脉外而出血,使月经量明显增加,继而引起血虚头晕等,故膏方的服用应该分平时方和经期方两种。



### 一、膏方选用

#### 1. 肌瘤平时膏方

##### 【方药】

当归 150 g 赤芍药 200 g 白芍药 150 g 川芎 150 g 三棱 150 g 莪术 150 g 香附 100 g 茯苓 200 g 桃仁 150 g 桂枝 60 g 生牡蛎 200 g 夏枯草 300 g 石见穿 200 g 党参 100 g

黄芪 150 g 青皮 60 g 陈皮 50 g 柴胡 60 g 炙甘草 30 g 鳖甲胶 300 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有内热较甚,口干,尿黄,便秘者,去桂枝,加生地黄 200 g,牡丹皮 150 g,山栀 100 g。

如是大便溏薄者,去当归,加白术 150 g,紫石英 150 g。

## 2. 肌瘤经期膏方

### 【方药】

党参 150 g 黄芪 150 g 白术 100 g 白芍药 300 g 熟地黄 300 g 当归 100 g 香附 100 g 桃仁 60 g 川芎 50 g 仙鹤草 300 g 鹿衔草 200 g 三七 100 g 花蕊草 150 g 茜草 150 g 龟版胶 150 g 鳖甲胶 150 g 阿胶 100 g

上药除龟版胶、鳖甲胶、阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加红糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如出血量多且有血块者,去桃仁、川芎,加蒲黄 100 g,五灵脂 150 g。

如有腹痛明显者,加川楝子 150 g,延胡索 150 g。

如有腹冷形寒者,加艾叶 60 g,肉桂 30 g,附子 30 g。

## 二、自我调摄

(1) 子宫肌瘤的治疗应根据患者的年龄、生育要求、肌瘤大小、



月经状况等情况,决定采取保守或手术治疗。一般认为,肌瘤大于3个月妊娠子宫;或出血引起严重贫血;或肌瘤迅速增大,都应及时进行手术治疗,以免贻误病情,甚至造成恶变等严重的后果。

(2)保守疗法中,由于孕激素、雄激素等治疗具有一定的副作用,以及肌瘤容易复发,而中医膏方对改善症状、缩小肌瘤具有良好的作用,而且服用方便,但是至少需要连续服用3个月才可能见效,所以要有充分的思想准备,避免急躁和随意停药。

(3)加强营养以防止因经血过多引起的贫血使机体免疫力下降。

## 产后体虚

产后体虚是指妇女分娩后出现的一组虚弱性的综合征。多因分娩过程中失血过多,或临产时用力过度,或生产过程创伤,或产后给婴儿哺乳消耗比较大所致。大部分产后妇女随着产后适度的营养和休养,可以较快地恢复体质,而无不适反应,故不需要服药调理;少部分妇女由于素体较弱,加之上述原因,以及产后各脏腑功能,尤其是脾胃功能较差,不能及时将食物中的精华物质传输为精微物质而营养全身,从而产生一系列虚弱症状,最常见的是产后多汗、产后乳少、产后失眠。



产后体虚按照中医辨证以虚为主,因气血津液耗伤,气虚表卫不固,则多表现为多汗,或自汗,即白天汗多,动则汗出更多;或盗汗,即睡中汗出,醒后汗出即止;因气血不足,乳汁无以化生,则乳汁稀少甚至无乳汁;因气血两亏,血脉空虚,心失所养,则心神不宁,夜不安寐。由于症属虚证,故无论是产后多汗、产后乳少还是产后失眠,都会出现头晕眼花,面色苍白,疲乏无力,食欲不振等。

## 一、膏方选用

### 1. 产后多汗

#### 【方药】

党参 150 g 黄芪 200 g 白术 150 g 防风 100 g 茯苓 150 g 炙甘草 50 g 五味子 90 g 麦门冬 150 g 白芍药 300 g 当归 90 g 煅牡蛎 300 g 煅龙骨 300 g 糯稻根 300 g 大枣 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有汗出怕风者,加桂枝 60 g,生姜 50 g。

如有胃口不好者,加陈皮 60 g,焦楂曲 100 g。

### 2. 产后乳少

#### 【方药】

黄芪 200 g 生熟地黄(各)200 g 白芍药 300 g 当归 100 g 党参 150 g 川芎 60 g 王不留行 150 g 路路通 150 g 通草 50 g 柴胡 60 g 炙甘草 50 g 阿胶 150

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有胃纳不佳,加茯苓 150 g,白术 100 g,陈皮 60 g。

如有乳房胀感明显者,加橘核 60 g,穿山甲 100 g。

### 3. 产后失眠

#### 【方药】

党参 150 g 茯苓 200 g 当归 100 g 白芍药 200 g 黄芪





200 g 夜交藤 300 g 酸枣仁 150 g 生地黄 150 g 远志 100 g 丹参 150 g 生龙骨 200 g 生牡蛎 300 g 大枣 100 g 龟版胶 100 g 阿胶 100 g

上药除龟版胶、阿胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有出汗较多者,加糯稻根300 g,五味子100 g 浮小麦300 g。

如有急躁紧张者,加香附100 g,郁金100 g,山栀60 g。

## 二、自我调摄

- (1)保持心情舒畅,有利于产后机体早日康复。
- (2)合理饮食,提高营养水平,有助于增强身体各器官的机能。
- (3)室内空气保持流通,避免直接吹风,以防外感疾病的发生。



## 更年期综合征

大多数妇女绝经期年龄在45~55岁之间,女性更年期是指女性绝经前后的2~3年时间内。更年期综合征又称“绝经前后诸症”,是指在更年期出现月经紊乱、头晕耳鸣、轰热汗出、烦躁易怒、心悸失眠、面目水肿、关节酸痛、神疲乏力、神志失常等一系列症状的病症。这些症状可以此起彼伏地出现,表现轻重不一样,轻者几个月就会消失,重者迁延数年,甚至10年左右。因此,更年期综合征会严重影响女性的正常工作与生活。现代医学认为本病多因卵巢功能衰退,雌激素分泌减少而致自主神经系统功能紊乱所致。有些中青年妇女,虽然还未到绝经之年,但是因患子宫肌瘤或卵巢

囊肿等病,已作两侧卵巢切除术后,也会出现更年期综合征的症状,所以这些妇女服用膏方时可以按绝经期妇女的辨证方法。

更年期综合征按照中医辨证以虚为主,肾阴虚型多因绝经前后肾阴衰弱、精血不足,使阴不潜阳所致;临床多表现为烘热汗出、烦躁易怒、心悸失眠,头晕耳鸣等。肾阳虚型多因肾阳虚衰,脏腑功能紊乱所致;临床多表现为虚烦不宁、面色晦黯、面目水肿,精神萎靡、腰酸腿软、手足不温等。

## 一、膏方选用

### 1. 肾阴虚型

#### 【方药】

生地黄 200 g 熟地黄 300 g 何首乌 200 g 枸杞子 200 g 山茱萸 150 g 怀山药 300 g 白芍药 300 g 菟丝子 150 g 女贞子 200 g 旱莲草 300 g 龟版胶 200 g 鳖甲胶 150 g 川牛膝 150 g 黑大豆 300 g 酸枣仁 150 g 远志 100 g 茯苓 150 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有阴虚火旺,面红,烦躁者,加黄柏 100 g,知母 100 g。

如有阴虚便秘,口干者,加麦门冬 200 g,天门冬 150 g,天花粉 150 g。

如有血压升高者,加夏枯草 300 g,菊花 100 g,珍珠母 300 g。

### 2. 肾阳虚型

#### 【方药】

仙茅 100 g 仙灵脾 150 g 菟丝子 300 g 杜仲 150 g 山茱萸 150 g 熟地黄 150 g 怀山药 150 g 枸杞子 150 g 何首乌



150 g 桑寄生 150 g 当归 50 g 鹿角胶 200 g 龟版胶 100 g

上药除鹿角胶、龟版胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鹿角胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如为怕冷明显者,加附子30 g,肉桂10 g。

如是小便清长者,加覆盆子150 g,桑螵蛸150 g,益智仁150 g。

如是耳鸣严重者,加磁石200 g,柴胡30 g,石菖蒲150 g。

## 二、自我调摄

(1)更年期的人各个脏器都可能产生功能减退。对于更年期妇女来讲,由于雌激素水平明显下降,还会引起或加重冠心病、动脉硬化、骨质疏松等老年病,所以要重视身体检查,以防贻误病情。

(2)处于更年期的妇女应保持心情乐观、豁达,以提高生活质量。

(3)避免过度疲劳,做到劳逸结合。饮食以清淡、营养、易消化为主。



## 乳腺小叶增生症

乳腺小叶增生是中、青年妇女中较常见的一种良性乳腺疾病,与卵巢功能失调有关。其特点是每次经期或月经前后出现乳房胀痛,周而复始发作。乳房胀痛往往与体内雌激素水平增高有关。雌激素水平增高可以使乳腺内水钠潴留而致乳房胀痛。从外部触摸,就像一些囊性的小肿块。

乳腺小叶增生按照中医辨证有虚实之别,实证多因肝郁气滞,或肝郁痰凝积聚乳房所致,临床上表现为乳房胀痛明显,经前加重,经后则减轻或消失,胸闷胁胀,烦躁易怒等;虚证多因肝肾阴虚,冲任不调所致,临床上表现为乳房胀痛,腰酸乏力,神疲倦怠,月经量少等。

## 一、膏方选用

### 1. 肝郁气滞痰凝

#### 【方药】

柴胡 90 g 当归 100 g 川芎 60 g 白芍药 150 g 白术 100 g 浙贝母 100 g 半夏 100 g 川楝子 150 g 香附 150 g 八月札 100 g 娑罗子 150 g 玫瑰花 60 g 枳壳 100 g 天门冬 100 g 夏枯草 300 g 木馒头 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如乳头刺痛者,加赤芍药 150 g,王不留行 100 g,郁金 100 g。

如乳胀有快者,加橘核 90 g,露蜂房 100 g。

如烦躁、尿黄者,加牡丹皮 100 g,山梔 100 g,麦门冬 150 g。

### 2. 肝肾阴虚型

#### 【方药】

熟地黄 150 g 当归 100 g 白芍药 200 g 枸杞子 150 g 女贞子 150 g 怀山药 150 g 茯苓 150 g 天门冬 100 g 玄参 150 g 夏枯草 300 g 海藻 200 g 贝母 100 g 香附 60 g 鳖甲胶 200 g

上药除鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开



水调服。

**【加减变化】**

如为腰膝酸软者,加桑寄生 150 g,杜仲 100 g,菟丝子 g。

如为阴虚火旺,潮热盗汗者,加地骨皮 150 g,牡丹皮 150 g,青蒿 100 g。

如有乳房胀痛者,加川楝子 150 g,山慈姑 60 g,橘核 90 g。

**二、自我调摄**

(1)乳腺小叶增生是妇女中常见的良性乳腺病,坚持服用膏方一般都能见效,而且大多能获得治愈。

(2)只有极少数病例可能恶变,当某些患者肿块迅速增大时应及时去医院检查,以免贻误病情。

(3)绝经期妇女如患有乳腺小叶增生,应考虑手术,以免恶变。



## 儿 科

### 小儿食欲不佳

在小儿科门诊经常可以遇到一些孩子出现食欲不佳甚至没有食欲,家长为此而感到十分焦急。孩子为什么会出现食欲不佳呢?现代医学认为孩子厌食的因素不外两方面:其一,为全身或局部疾病使消化液分泌及消化酶活性降低;以致消化功能减退,如结核、贫血、胃炎、腹泻等疾病,或者是某些药物因素影响,如服用红霉素、磺胺类药物及氨茶碱后;其二,为体内环境的改变刺激中枢神经系统,使消化功能的调节失去平衡,如由于受惊、紧张等情绪因素,或者是偏食引起锌缺乏,造成舌乳头萎缩,味觉敏感度减低而影响食欲。



小儿食欲不佳根据中医辨证以虚为主,虚实夹杂。多因小儿脏腑娇嫩,脾胃虚弱,饮食不慎、喂养不当所致。临床可以分为脾失健运、胃阴不足、脾胃气虚型。脾失健运型,表现为面色萎黄,不思饮食,甚至拒食,若强行进食后则会恶心、呕吐、腹胀,苔白不厚或薄腻;胃阴不足型,表现为不思饮食,口干多饮,大便干结,唇干色红,皮肤干燥,舌苔多为花剥苔或无舌苔;脾胃气虚型,表现为面色白或萎黄,形体瘦弱,食欲不振,食少或厌食,若进食稍多,则大便不通或大便溏泻,舌质淡,苔薄白。

#### 一、方方选用

##### 1. 脾失健运

【方药】

太子参 120 g 焦山楂 90 g 茯苓 90 g 白术 90 g 陈皮 90 g 枳实 300 g 神曲 90 g 麦芽 90 g 鸡内金 60 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,加饴糖 300 g,冰糖 200 g 收膏即成。每次 10~15 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有泛呕欲吐者,加姜半夏 60 g,姜竹茹 60 g。

如有腹部胀满者,加莱菔子 60 g,厚朴 100 g。

## 2. 胃阴不足型

### 【方药】

玄参 90 g 炒麦芽 90 g 鸡内金 60 g 麦门冬 90 g 生地黄 90 g 沙参 90 g 石斛 90 g 玉竹 90 g 乌梅 60 g 怀山药 90 g 甘草 20 g 黑芝麻 100 g 饴糖 150 g 冰糖 100 g

上药除黑芝麻外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 冰糖 200 g 收膏即成。每次 10~15 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有食欲不振者,加山楂 100 g。

如有大便干结,加火麻仁 100 g,全栝楼 60 g。

## 3. 脾胃气虚型

### 【方药】

党参 90 g 茯苓 90 g 白术 90 g 怀山药 90 g 扁豆 90 g 砂仁 30 g 桔梗 30 g 陈皮 60 g 莲子肉 100 g 芡实 150 g

上药除莲子肉、芡实外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,莲子肉、芡实煮熟至透烂,研碎,调入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 冰糖 200 g 收膏即成。每次 10~15 g,每日 2 次,开水调服。



## 二、调摄要点

(1)要培养小儿良好的饮食习惯。做到进食定时定量,儿童每日三餐,每餐间隔4~5小时;幼儿每日四餐,每餐间隔3~4小时。这样能使孩子知饥想食,增进食欲。

(2)适当限制零食,饮料不能代替喝水。夏季不可过食冷饮。

(3)纠正孩子偏食、挑食的坏毛病。注意食物中各种营养成分的搭配,不宜过多摄入高糖、高蛋白的食物。

(4)创造良好的就餐气氛。教育小孩集中思想,细嚼慢咽,不要边吃饭边玩。训练孩子自己进食,这样会增加他们进食的兴趣。

(5)加强体育锻炼,适当增加小孩户外活动的时间,参加力所能及的劳动及轻微的家务,以增加热量的消耗,增进食欲,促进食物的消化吸收。

(6)有条件时可在饭前给孩子吃点山楂、红果等酸性水果,以刺激胃液的分泌。必要时还可内服酵母生,多酶片等帮助消化。

(7)积极治疗原发病。如果食欲减退的原因是由于服用某些药物引起,应在医生指导下及时更换其他药物。



## 小儿久泻

久泻是指大便次数增多,粪便稀薄如水样,或伴不消化食物,或夹有黏液的病症,是小儿最常见的疾病之一,尤以2岁以下的婴幼儿更为多见,年龄愈小,发病率愈高。中医学认为,脾胃为“后天之本”,主运化水谷和输布精微,为气血生化之源。小儿运化功能尚未健全,而生长发育所需水谷精气却较成人更为迫切,故易为饮食所伤;加之小儿对疾病的抵抗力较差,寒暖不能自调,乳食不知自节,一旦调护失宜,则易致病。

小儿久泻按中医辨证有虚实之分,一般来说,感受外邪或饮食



所伤引起的泄泻,多属实证,若泄泻经久不愈,则称为“小儿久泻”,多属于虚证或虚实夹杂。临床常有脾胃虚弱、脾肾阳虚、脾虚肝旺等类型。脾胃虚弱型,表现为大便稀溏,或食后作泻,色淡不臭,时轻时重,面色萎黄,肌肉消瘦,神疲倦怠,舌淡苔白,且常反复发作;脾肾阳虚型,表现为久泻不止,食入即泻,粪质清稀,完谷不化,或见脱肛,形寒肢冷,面色㿔白,精神萎靡,睡时露睛,舌淡苔白,脉象细弱;脾虚肝旺型表现为腹痛肠鸣,烦躁易怒、哭闹即泻,大便色青,舌淡苔白。

## 一、膏方选用

### 1. 脾胃虚弱型

#### 【方药】

党参 100 g 怀山药 100 g 炒白术 60 g 茯苓 100 g 炒薏苡仁 100 g 炒白扁豆 100 g 陈皮 30 g 砂仁 50 g 炙甘草 30 g 焦山楂 100 g 莲子肉 150

上药除莲子肉外,其余加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,莲子肉炖至酥烂捣成泥状,冲入清膏和匀,最后加饴糖 200 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。



#### 【加减变化】

如有腹痛腹胀者,加木香 60 g,枳壳 100 g。

如有久泻不止,而无夹杂积滞者,加煨诃子肉 50 g,赤石脂 100 g。

### 2. 脾肾阳虚

#### 【方药】

补骨脂 100 g 煨肉豆蔻 50 g 五味子 50 g 党参 100 g 炒白术 100 g 茯苓 100 g 吴茱萸 50 g 芡实 250 g 莲子肉 150 g

上药除芡实、莲子肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,芡实、莲子肉炖至酥烂捣成泥状,再冲入清膏

和匀,最后加饴糖 200 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为久泻不止者,加煨诃子肉 60 g,赤石脂 60 g。

如为脱肛者,加黄芪 100 g,枳壳 100 g,柴胡 60 g。

如为畏寒腹痛者,加干姜 60 g,附子 30 g。

## 3. 脾虚肝旺型

### 【方药】

柴胡 60 g 白术 100 g 白芍药 100 g 陈皮 60 g 木香 50 g  
砂仁 30 g 怀山药 100 g 茯苓 100 g 芡实 250 g 莲子肉 150 g

上药除芡实、莲子肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将芡实、莲子肉炖至酥烂捣成泥状后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为消化不良者,加鸡内金 60 g,山楂 60 g。

如为泄泻次数多,泻下如水者,加肉豆蔻 60 g,五味子 50 g。

## 二、调摄要点

(1)婴幼儿进食应定时定量,按序添加辅食。营养不良及病后体弱小儿应加强护理,注意饮食卫生,严防食入污染变质食品。婴幼儿的衣着,应随气温升降而增减,夜晚睡觉要避免腹部受凉。

(2)不滥用抗生素,因为小儿久泻抗菌药物不但无效,反而会杀死肠道中的正常菌群,引起菌群紊乱,加重腹泻。

(3)让小儿多晒太阳,多做户外活动,提高对自然环境的适应能力,增强体质,提高机体抵抗力,避免感染各种疾病。

(4)小儿应防止过度疲劳、惊吓或精神过度紧张。

(5)腹泻期间应多补充水分,不必禁食,饮食要注意消化,富含



营养,但不宜吃油腻生冷之品。

## 小儿夏季热

小儿夏季热是儿科的常见病,有明显的季节性,常在春夏之交或夏季发病,好发于幼弱儿童,绝大多数病儿为周岁前后到2岁,6个月以下与3岁以上罹患者少见。本病特征:每遇夏季来临即有发热,病程一般历时1~2个月,也可持续整个夏季,起病缓慢,有夜热早凉的,也有早热暮凉的,部分病例喜伏地而卧,口渴、尿多、汗少甚至不出汗,此外,还有消瘦、乏力、食欲不振等症状。本病在秋凉后多能自愈,有的到了第二年夏天可再度发病。确切病因尚未弄清,推测可能与婴幼儿中枢神经系统发育不健全、汗腺功能不足、出汗少、不易散热等有关。患儿因持久发热,机体抵抗力减低,往往容易合并感染。

小儿夏季热按照中医辨证大多属虚,多为先天禀赋不足或病后虚弱,体质娇嫩,脾胃虚弱,在夏季炎热的环境中,感受湿热之气而致。临床以气阴两虚、脾胃虚弱型多见。气阴两虚型,表现为消瘦、口干,活动后容易疲劳,容易外感,舌红少津或花剥,如地图等;脾胃虚弱型,表现为面色萎黄,食欲不振,大便溏薄,多食易胀,苔薄腻等。



### 一、膏方选用

#### 1. 气阴两虚型

##### 【方药】

太子参 60 g 五味子 30 g 黄芪 60 g 白术 800 g 西洋参 10 g 怀山药 100 g 麦门冬 60 g 石斛 60 g 知母 60 g 黑芝麻 50 g 胡桃肉 100 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并

滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有口渴欲饮者,加芦根 100 g,天花粉 60 g。

如有身有低热者,加地骨皮 60 g,青蒿 60 g。

如有小便黄赤者,加滑石 100 g,竹叶 30 g,甘草 10 g。

## 2. 脾胃虚弱型

### 【方药】

党参 50 g 白术 80 g 黄芪 50 g 苍术 30 g 薏苡仁 60 g  
麦门冬 60 g 升麻 40 g 葛根 60 g 陈皮 50 g 神曲 60 g 茯苓  
60 g 莲子肉 100 g

上药除莲子肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,莲子肉炖至熟烂后,调入清膏和匀,最后加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有夜寐易惊者,加生龙骨 150 g,生牡蛎 150 g。

如有腹部胀满者,加枳壳 60 g,莱菔子 45 g。

## 二、调摄要点

(1) 注意合理喂养,补充营养,增强抗病能力,提高小儿体质。

(2) 不要动辄使用抗生素,否则不仅无益,反可能招来不良反应,损害孩子的健康。

(3) 夏天注意住房通风以防暑降温,适当多饮水,以凉开水为佳,果汁、蔬菜汁亦可,或常饮西瓜汁或金银花露,以清暑解热。

(4) 小儿夏季热具有持续发热、口渴、多尿的特点,以此可与感冒相鉴别。感冒、发热、咳嗽时忌服。

(5) 长期发烧者应补充蛋白质含量丰富的食物,如鸡蛋、鱼、瘦肉末等;忌食辛辣刺激、肥甘油腻及不易消化的食物。



## 小儿哮喘

小儿哮喘即“小儿支气管哮喘”，是小儿时期常见的一种慢性疾患，临床上以发作性胸闷、气喘、咳嗽，伴有咳嗽及痰声为特征。支气管哮喘的发病机制十分复杂，现代医学认为哮喘是由多种细胞特别是肥大细胞参与的慢性气道炎症，很多原因可以诱发哮喘急性发作，如花粉、尘螨、动物皮毛、烟雾、真菌、气候变化呼吸道病毒、细菌感染、剧烈运动及某些药物、食物等。临床将哮喘分为外源性哮喘与内源性哮喘，外源性哮喘由多种吸入物、食物过敏而引起；内源性哮喘以呼吸道感染，尤其是病毒性感染多见。也有兼有外源性和内源性哮喘特征的混合性哮喘。小儿哮喘多为外源性，春秋尤以秋季为重，咳、痰不明显，一般情况良好。小儿哮喘的反复发作者严重影响孩子的身体健康和生长发育，而近十几年来小儿哮喘的发病率均有上升趋势，因此必须引起大家的重视。对于哮喘的防治，发作期的控制症状与缓解期的预防复发是不可偏废的两个方面。



中医认为，小儿哮喘应分发作期和缓解期而分别施治。而中医膏方在防治小儿哮喘上的优势是在缓解期的辨证论治。缓解期的小儿哮喘可以分为肺气不足、脾虚湿蕴、肾气亏虚三型：肺气不足型，表现为面色㿔白，神疲乏力，自汗，容易感冒，苔薄，舌淡，脉无力；脾虚湿蕴型，表现为纳呆腹胀，形体瘦弱，肢体倦怠，大便稀溏，苔腻脉濡；肾气亏虚型，表现为咳喘气短，形体瘦弱，腰酸膝软，遗尿，苔薄，舌淡，脉虚。

### 一、膏方选用

#### 1. 肺气不足型

##### 【方药】

黄芪 100 g 党参 80 g 太子参 100 g 五味子 100 g 麦门冬 100 g 白芍药 60 g 茯苓 100 g 甘草 30 g 阿胶 150 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有汗出较多者，加牡蛎 150 g，糯稻根 100 g。

如有畏寒怕风者，加防风 60 g，桂枝 30 g。

## 2. 脾虚湿蕴型

### 【方药】

半夏 100 g 陈皮 100 g 白术 100 g 党参 100 g 茯苓 120 g 怀山药 100 g 薏苡仁 120 g 白芥子 100 g 胡桃肉 150 g

上药除胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加冰糖 200 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有胃口不香者，加炒谷麦芽各 150 g，鸡内金 120 g。

如有大便溏薄者，加葛根 100 g，苍术 120 g。

## 3. 肾气亏虚型

### 【方药】

熟地黄 100 g 人参 50 g 黄精 100 g 补骨脂 100 g 麦门冬 100 g 五味子 100 g 玉竹 100 g 黄芪 120 g 蛤蚧 1 对 肉桂 15 g 黑芝麻 100 g 胡桃肉 150 g

上药除黑芝麻、胡桃肉、人参、蛤蚧外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，黑芝麻、胡桃肉研碎，蛤蚧涂以蜜、酒，放火上烘脆，合人参分别研末，冲入清膏和匀，最后加蜂



蜜 300 g 收膏即成。每次 10~20 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有汗出较多者, 加牡蛎 150 g, 糯稻根 100 g。

如有夜间遗尿者, 加益智仁 100 g, 桑螵蛸 100 g。

## 二、调摄要点

(1) 保证患儿的饮食营养, 要注意蛋白质与维生素的摄入。

(2) 要根据气候变化增减衣服, 以适应寒热变化, 预防感冒。

(3) 忌食油煎、辛辣和海鲜之品, 因为油腻之品能助热生痰; 辛辣之品可刺激鼻咽, 引起咳喘, 芥菜、海等容易鲜引起过敏反应。

(4) 患儿的卧室宜向阳、通风且干燥; 室内严禁吸烟; 床上用品以棉质品, 不宜用羽绒、皮毛、丝绵等物品; 玩具宜选无毒木质、棉质等制品; 家中不宜养猫、狗、兔、鸟等动物。

(5) 养成良好的生活习惯, 饮食、睡眠、大便定时, 作息有规律。

(6) 让孩子每天有户外活动, 以增强体质。

(7) 了解哮喘发作前的先兆症状, 如连打喷嚏、不断咳嗽、烦躁等, 以便及时控制发作。



## 小儿汗症

小儿汗症是指小儿在日常环境中、在安静的状态下(如静卧、睡眠、静坐), 全身或身体某些部位出汗很多的一种病症。俗称“出虚汗”。本病多发生在 2~6 岁儿童, 可因多种因素所致, 如饮食不调、调护失宜、佝偻病、结核、甲状腺功能亢进、肠胃道病等, 除疾病的原因外, 更多的是由于小儿体质虚弱所致。根据不同的出汗情况, 中医将睡中汗出, 醒时汗止称为“盗汗”; 白天汗出, 稍动更甚的称为“自汗”。中医认为, 汗为人体五液之一, 为心所主, 由阳气蒸发津液, 发泄于皮肤表面而来的, 而心又主血, 因此有汗血同源的

说法,出汗过多,气随汗出易成伤津耗气,甚至有损于心血。所以应该早日调治。

小儿汗症根据中医辨证,有表虚不固、阴液不足、气阴两虚等类型。表虚不固型的出汗,以头和肩部特别明显,安静地坐着会出汗,运动时更明显。小孩精神不振,容易疲劳,面色较白,形体瘦弱,手脚较冷,怕冷怕风、食欲不佳,胃口不好,舌淡嫩。阴液不足型的出汗,以夜间盗汗为主。小孩面部偏红、嘴唇红,通常于下午开始掌心或足心会渐渐发热,睡觉不安稳、翻来覆去且易做梦,容易哭闹、生气,有时大便较为干燥等。气阴两虚型的出汗既可有盗汗,也可有自汗,有这种多汗症的小孩往往是瘦弱型的,既怕冷怕风,又口渴少眠,睡觉时无故出汗,醒后哭声无力,手脚心也会比较热。

## 一、方剂选用

### 1. 表虚不固型

#### 【方药】

黄芪 100 g 白术 60 g 防风 60 g 菊花 50 g 牡蛎 100 g  
浮小麦 120 g 太子参 100 g 黑芝麻 100 g 胡桃肉 150 g 阿胶 100 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,其余药物加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 200 g 冰糖 100 g 收膏即成。每次 10~15 g,每日 2 次,开水调服。一料服完,可再制一料,直到见效为止。

#### 【加减变化】

如是畏寒怕冷者,加桂枝 20 g,白芍药 80 g。

如是小儿遗尿者,加海螵蛸 60 g,益智仁 90 g。

如是胃纳不佳者,加焦山楂 60 g,谷麦芽各 90 g。





## 2. 阴液不足型

### 【方药】

当归 50 g 麦门冬 100 g 生地黄 60 g 沙参 60 g 石斛 60 g 五味子 60 g 碧桃干 60 g 黑芝麻 100 g 胡桃肉 100 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 200 g、冰糖 100 g 收膏即成。每次 10~15 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是睡眠不佳者,加合欢皮 150 g,夜交藤 150 g。

如是大便干结者,加火麻仁 60 g。

如是胃纳不佳者,加谷麦芽各 90 g。

## 3. 气阴两虚型

### 【方药】

党参 80 g 白术 80 g 太子参 80 g 麦门冬 80 g 五味子 60 g 桂枝 20 g 白芍药 60 g 红枣 50 g 生姜 20 g 甘草 20 g 黑芝麻 100 g 胡桃肉 150 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 200 g、冰糖 100 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如是汗出较多者,加麻黄根 60 g,煅牡蛎 200 g,浮小麦 120 g。

如是容易疲劳者,加黄芪 100 g,仙鹤草 100 g。

## 二、调摄要点

(1) 体质虚弱的小儿,可采用一些食疗方法,让其食用太子参、黄芪、红枣等煮稀饭;饮食上注意营养与消化吸收,荤素搭配,不要



养成孩子挑食的坏习惯。

(2)鼓励小孩多做户外活动,适当多晒太阳,以达到体格锻炼和增强体质的目的。

(3)勤换衣物,并保持皮肤清洁与干燥,汗后应避免直接吹风。更不要以湿冷的毛巾为他们擦汗,以免受凉。

(4)家长要注意小孩因为头部出汗,导致缺乏钙质而在头部和枕头接触的地方长不出头发而出现的“枕秃”现象,适当补充维生素D与钙质。

## 小儿遗尿

3岁以上的小儿,经常在睡眠中不知不觉地排尿,称为遗尿症,俗称“尿床”。轻者隔数夜一次,重者每夜一次或一夜数次,遗尿多发生在深夜,尿后能继续熟睡。随着年龄的增长,大部分患儿可自愈,也有延续几年甚至到成年的情况。遗尿若长期不愈,致使儿童遭受精神压力而产生自卑感,对小儿的智力、性格、体格发育都有一定影响。小儿遗尿可分为器质性和功能性两大类,而以功能性遗尿为主。引起功能性遗尿最常见的原因是精神因素,如父母的严厉训责,精神过度紧张,或日间活动量大,夜间睡眠过深不易醒;或由于膀胱功能发育不全,或傍晚饮大量水等等。除此之外,膀胱炎、包茎、龟头炎、蛲虫病刺激局部,可以导致大脑皮质及皮质下中枢功能失调而致遗尿。

中医认为,遗尿的发生,其病位虽在膀胱,但与肺、脾、肾功能失调有密切关系。按照中医辨证以虚证为主,可分为两型:下元虚寒型,多小儿先天不足,平素体弱多病,肾气不足,膀胱不能约束所致,表现为夜间遗尿,多则一夜数次,肢凉怕冷,面色苍白,小便清长,舌质较淡;脾肺气虚型,多因病后失调或喂养不当,脾肺气虚,摄纳无权所致,表现为睡后遗尿,少气懒言,神软乏力,面色苍白,



食欲不振,大便溏薄,常自汗出,舌淡苔白,脉细缓。至于膀胱炎、包茎、龟头炎、蛲虫病刺激局部,乃肝经湿热下注膀胱所致,症见遗尿,尿量不多,但尿味腥臊,尿色较黄,平时性情急躁,唇红、苔黄、脉滑数的湿热证,不在本篇膏方治疗范畴。

## 一、膏方选用

### 1. 下元虚寒型

#### 【方药】

党参 100 g 炙黄芪 100 g 益智仁 60 g 怀怀山药 100 g  
炒白术 100 g 桑螵蛸 60 g 复盆子 60 g 金樱子 60 g 菟丝子  
60 g 山茱萸 100 g 赤石脂 90 g 乌药 50 g 煅牡蛎 150 g 炙  
甘草 20 g 蚕茧 90 g 黑芝麻 100 g 胡桃肉 150 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有畏寒肢冷者,加附子 60 g,桂枝 30 g。

如有腰酸耳鸣者,加杜仲 100 g,菖蒲 60 g。

### 2. 脾肺气虚型

#### 【方药】

党参 100 g 炙黄芪 120 g 白术 60 g 茯苓 120 五味子 60  
升麻 60 g 生牡蛎 150 g 益智仁 100 g 桑螵蛸 120 g 黑芝麻  
100 g 胡桃肉 150 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如是自汗畏风者,加浮小麦 120 g,防风 60 g。



如是大便溏薄者,加葛根 100 g,怀山药 100 g。

## 二、调摄要点

(1)让患儿养成睡前排尿习惯。晚饭或睡前,不吃含水分较多的食物。

(2)自幼开始建立按时排尿的习惯,勿使儿童过度疲劳。

(3)入睡后在其发生遗尿的时间内唤醒小儿去小便,从而养成按时排尿的良好习惯。

(4)消除患儿紧张、恐惧情绪,有助于提高治疗效果。

## 小儿多动症

小儿多动症,又称为“轻微脑功能障碍”。是一种个性的发育延迟或偏移,发病在 7 岁以前,且病程在 7 个月以上。其特征表现为活动过度、注意力不集中、行为冲动三者同时存在,即很少睡眠,活动过度,不该活动时控制不住,注意力只能集中短暂时间,小动作特别多,而且容易激惹、冲动,情绪变化剧烈而迅速,容易大发脾气,具有明显的束缚不住的倾向,也有部分孩子心情抑郁,受到呵斥亦不争辩。多伴有学习困难,其中以注意力不集中最突出,严重影响课堂秩序。多动症的病因未完全明确,主要与以下因素有关:①大脑微小的难以检测到的损伤,这种损伤可能与难产有关,而使中枢神经系统发育延迟。②心理社会因素也可能是重要的诱因,例如:父母不合、离异,家庭和学校施加过重的学习负担等一些不良的心理发育环境。③此外,遗传因素、营养因素(维生素或微量元素缺乏)和慢性铅中毒也可能与多动症相关。

中医认为,小儿多动症多因心脾两虚、心神失养或肾阴不足、虚阳躁动所致。按照中医辨证有虚证和虚实夹杂,如阴虚火扰型,多表现为注意力涣散,思想不集中,小动作多,任性冲动,易出汗,



大便偏干,夜眠翻身多,舌质红。心脾气虚型,多表现为注意力涣散,思想不集中,小动作多,面色无华或形体瘦小,胃纳较差,或有遗尿,或性情沉默,好哭,动作迟缓懒散,舌质淡。治疗一般需要1~2个月开始见效,疗效持久而稳定。在服药的同时,家长与医生相互配合,以诱导为主,切不可打骂,激起对立情绪和逆反心理。

## 一、膏方选用

### 1. 肾阴不足型

#### 【方药】

知母 60 g 黄柏 60 g 牡丹皮 100 g 石菖蒲 60 g 煅龙牡(各)150 g 生地黄 100 g 麦门冬 60 g 淮小麦 100 g 甘草 60 g 首乌 60 g 仙灵脾 60 g 龟版胶 150 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g

上药除龟版胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加饴糖 200 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如多动少睡者,加五味子 100 g,酸枣仁 100 g。

如急躁易怒者,加焦山栀 60 g,制大黄 30 g。

### 2. 心脾气虚型

#### 【方药】

党参 100 g 黄芪 100 g 白术 100 g 茯苓 60 g 当归 60 g 远志 50 g 柴胡 50 g 升麻 50 g 淮小麦 100 g 大枣 60 g 甘草 30 g 丹参 6 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g

上药除黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



### 【加减变化】

如为沉默好哭者,加八月札 60 g,合欢皮 100 g。

如为遗尿者,加益智仁 60 g,桑螵蛸 60 g。

## 二、调摄要点

(1)正确对待多动症儿童,切忌简单、急躁、惩罚和歧视等粗暴方法,应向儿童心理医生咨询,采取行为矫正和教育疗法,即医生、家长、老师三方面合作,对孩子进行行为矫正。

(2)减少家庭、学校的过重的学习压力,根据孩子的实际情况提出正确的要求,并配合适当的体格锻炼,注意保持充足的睡眠,合理安排好学习时间。

(3)不可给患儿服用镇静剂;不要让孩子过多接触油漆、含铅食品;不要给孩子吃胡椒、辣椒等刺激性调味品;少吃富含甲基水杨酸盐类食物如西红柿、苹果、橘子等。

(4)忌过度运动。

(5)不宜让孩子观看恐怖、枪杀等场面惊险的电影、电视片。

## 儿童性早熟

性早熟是小儿常见的一种内分泌疾病,是指女孩在 8 岁以前,男孩在 9 岁以前出现第二性征,或女孩在 10 岁以前出现月经初潮。性早熟有真假之分,真性性早熟是内、外生殖器都提前成熟,也叫完全性性早熟,这样的孩子性发育与正常情况相同,内分泌的变化和内、外生殖器的发育都和正常成熟相似,伴有身高、体重加速增长,骨骼闭合提前,生长早期停止,造成最终身高较矮。假性性早熟的患儿是由于体外有异常过多的性激素来源造成的,体内因素多由周围内分泌腺、性腺或肾上腺皮质病变所致;体外因素多为误用含性激素的药物和食品、营养品,使用含有性激素的化妆



品,母亲孕期或哺乳期服用含有性腺激素的药物。假性性早熟没有生育能力,只表现为副性征的出现,如单纯的乳房提早发育、外阴生殖器发育、阴道流血等。性早熟无论真假,在发病初期都表现出生长过速、骨龄超前,但骨骼成熟过快和骨骺提前融合,以致孩子最终身高反较矮小,常不足 150 厘米。20 世纪 90 年代以来,儿童性早熟明显增多,分析原因,与滥用滋补品、营养品,或接触外源性性激素药物或含有性激素的制剂,如接触母亲用的含雌激素的化妆品(如丰乳霜),误服避孕药丸,环境类激素污染与电视、VCD 中心理刺激画面影响有很大的关系。

儿童性早熟按中医辨证可分虚实两类:虚证多因肾阴亏损,相火偏旺,阴阳平衡失调,除青春提前发动,副性征出现或月经过早来潮外,还有不同程度的阴虚火旺征象,如头晕,面红升火、潮热盗汗,五心烦热,口干咽燥,舌红少苔,脉细数等;实证与滥用补品、过食辛温之品,色情画面刺激,相火过旺或过食肥甘厚腻,胃强脾弱,湿热下注有关,除副性征出现或月经过早来潮外,可见情绪抑郁或急躁易怒,胸闷叹息,便秘尿赤,带下黄稠,口干而苦,舌红苔黄等肝郁化火征象,或形体肥胖,多食,便秘,带多,脉滑数等痰湿内盛之象。



## 一、膏方选用

### 1. 阴虚火旺型

#### 【方药】

知母 60 g 黄柏 60 g 生地黄 100 g 怀山药 100 g 牡丹皮 100 g 泽泻 100 g 炙龟版 150 g 炒麦芽 120 g 夏枯草 100 g 玄参 100 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 150 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加冰糖 300 g 收

膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有阴道出血者, 加炒黄芩 100 g, 白茅根 120 g。

如有大便干结者, 加制大黄 60 g, 全栝楼 120 g。

如有乳房有硬结者, 加夏枯草 100 g, 橘核 100 g。

## 2. 肝郁化火型

### 【方药】

生地黄 120 g 知母 100 g 炙龟版 120 g 玄参 120 g 夏枯草 100 g 黄柏 80 g 郁金 60 g 柴胡 60 g 海藻 100 g 昆布 100 g 生麦芽 120 g 当归 100 g 赤芍药 100 g 白芍药 100 g

上药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如乳房有硬块者, 加象贝母 100 g, 橘核 600 g。

如为郁郁寡欢者, 加合欢皮 150 g, 香附 100 g。

如有夜寐不安者, 加酸枣仁 100 g, 远志 60 g。

## 3. 痰湿内盛型

### 【方药】

姜半夏 100 g 茯苓 100 g 苍术 60 g 白术 100 g 黄柏 100 g 青皮 100 g 陈皮 100 g 仙茅 60 g 仙灵脾 100 g 王不留行 100 g 川贝母 100 g 炮山甲 60 g 全栝楼 100 g 荔枝核 100 g 益智仁 100 g

上药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有痰多胸闷者, 加全栝楼 100 g, 茯苓 100 g, 生薏苡仁 150 g。

如有大便干结者, 加生大黄 60 g, 枳壳 100 g。





如有带下量多者,加鸡冠花 100 g,海螵蛸 100 g。

## 二、自我调摄

(1)了解性早熟,以便早期发现并及时治疗。可以逆转孩子刚开始发育的第二性征,避免对儿童造成身心的伤害。

(2)帮助孩子解除心理压力,多做沟通,以便配合治疗。

(3)健康投资不要盲目,人参、蜂王浆、花粉、鸡胚、鸡精、蚕蛹、增高素等均存在较多性激素,甚至有促性腺激素样物质,不要随便给孩子食用。

(4)避免让孩子吃鸡、鸭、鹅的脖子,不吃牛鞭、牛睾丸之类的动物性器。

(5)避免过早的心理刺激,让孩子远离色情画面。

(6)养成孩子锻炼身体的好习惯,多做运动锻炼。



## 男 科

### 阳 痿

阳痿是指男子在性交时阴茎不能勃起,或勃起不坚,或坚而不久,以致不能插入阴道完成正常性交的一种病症。阳痿亦作“阳萎”。还有“筋痿”、“阴萎”、“阴器不用”等不同名称。痿者,萎弱不用之意。阳痿是男子性功能障碍中最常见、最严重的一种症状类型。据国外有关文献报告,阳痿患者约占性功能障碍的40%以上,有20%以上的人存在不同程度的各种性功能障碍。国内抽样调查资料显示,成年男性中10%以上的人有阳痿现象,其中糖尿病患者人群中阳痿发生率近乎60%。阳痿不仅失去性生活的快乐,而且是影响人们身心健康、家庭和睦和社会安定的重要因素。造成阳痿的因素很多:①心理因素:如忧思、恼怒、郁愤、思虑、猜嫉等。据统计,阳痿患者中约70%是由于心理因素所致。②血管因素:器质性阳痿患者中约有65%是血管病变引起的。身体其余部位有动脉病变的患者常有血管性阳萎。糖尿病、吸烟、酗酒、肥胖以及高血压患者带易出现阳痿,这多由于血管病变所致。③神经因素:由副交感神经受损引起的,导致阴茎血液流入减少。④药物因素:许多药物与阳痿有关,如某些抗高血压类、中枢神经抑制剂、与内分泌作用有关的药物如西咪替丁等。此外,还有雄激素不足、身体的虚弱和衰老、各种疾病、手术创伤等。

阳痿按中医辨证有虚实之分:虚证有阴虚火旺、命门火衰、心脾两虚、心肾不足之别;实证有肝郁气滞、湿热下注、血脉瘀阻之异。阴虚火旺型,多见于青壮年,有手淫史。阴茎能勃起,但临势



即软,伴有心悸出汗,精神紧张,口渴喜饮,腰酸膝软,足跟疼痛,尿黄便干,舌红苔少。命门火衰型,多见于老年人,或房劳过度,或少年手淫以致精气虚损。阴茎不能勃起,精液清冷,伴有头晕耳鸣,面色㿠白,畏寒喜热,精神萎靡,腰膝酸软,舌苔薄白。心脾两虚型,多见于脑力劳动的人,因思虑忧郁,损伤心脾。阴茎勃起困难,伴有面色萎黄,不思饮食,精力疲乏,心悸少寐,大便溏薄,舌淡苔薄。心肾不足型,多有性交受惊吓史。恐则伤肾,恐则气下。每临性生活时阴茎即萎,伴有胆怯多虑,心悸易惕,夜寐不安,遗精早泄,舌淡苔白。肝郁气滞型,多见于情怀不悦的人。阴茎不举,或举而不坚,精神抑郁,伴性欲减退,胸闷不舒,腹胀胁痛,舌质暗红。湿热下注型,多见于形体肥胖的人,或嗜食酒醇厚味的人。湿热下注,宗筋弛纵,可导致阳痿,阴茎萎软不举,阴囊潮湿,臊臭坠胀,甚则肿痛,尿后余沥,伴有肢体困倦,口干或苦,小便黄赤,大便黏滞,舌红,舌苔黄腻。血脉瘀阻型,多见于血管性阳痿的患者;或因跌打损伤,负重过度,强力行房等,损伤血络;或虽无明显外伤史,但病程日久,久病入络,引起血脉瘀滞而阳痿不举,舌质紫暗或有瘀点。



## 一、膏方选用

### 1. 阴虚火旺型

#### 【方药】

生熟地黄(各)100 g 山茱萸 100 g 菟丝子 100 g 茯苓 100 g 枸杞子 100 g 五味子 600 g 金樱子 100 g 牡丹皮 100 g 天花粉 100 g 川断 100 g 桑寄生 100 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 鳖甲胶 300 g

上药除鳖甲胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g

收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有夜间盗汗者, 加糯稻根 300 g, 煅牡蛎 300 g。

如有口干舌燥者, 加麦门冬 120 g, 玄参 120 g。

## 2. 命门火衰型

### 【方药】

熟地黄 150 g 枸杞子 100 g 锁阳 100 g 仙茅 120 g 淫羊藿 120 g 阳起石 120 g 山茱萸 100 g 怀山药 150 g 巴戟天 100 g 五味子 100 g 石菖蒲 60 g 肉苁蓉 100 g 菟丝子 100 g 楮实子 100 g 鹿角胶 100 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 100 g

上药除鹿角胶、阿胶、黑芝麻、胡桃肉外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将阿胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 黑芝麻、胡桃肉研碎后, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有心悸自汗者, 加黄芪 300 g, 党参 300 g, 龙骨 300 g, 牡蛎 200 g。

如有畏寒肢冷者, 加桂枝 90 g, 附子 60 g。

## 3. 心脾两虚型

### 【方药】

党参 200 g 黄芪 250 g 白术 200 g 茯神 100 g 酸枣仁 100 g 柏子仁 100 g 龙眼肉 50 g 木香 100 g 炙甘草 30 g 炒当归 100 g 炙远志 100 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 200 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 黑芝麻、胡桃肉研碎后, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜 300 g 收



膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

#### 【加减变化】

如有心气虚、心悸自汗、动则更甚者, 党参易人参 100 g, 龙骨 300 g, 牡蛎 200 g。

如有脾气虚、体倦乏力、大便溏稀者, 去当归, 加葛根 150 g, 陈皮 100 g。

#### 4. 心肾不足型

##### 【方药】

桂枝 60 g 龙骨 300 g 牡蛎 300 g 炙甘草 50 g 白芍药 100 g 党参 200 g 熟地黄 150 g 怀山药 150 g 巴戟天 100 g 山茱萸 150 g 石菖蒲 100 g 炙远志 60 g 菟丝子 150 g 当归 100 g 茯苓神 100 g 炙甘草 10 g 柴胡 10 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 200 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 黑芝麻、胡桃肉研碎后, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。



#### 【加减变化】

如为胆怯易惊者, 加龙齿 300 g, 灵磁石 150 g。

如有腰酸头晕者, 加杜仲 120 g, 枸杞子 120 g, 白蒺藜 100 g。

#### 5. 肝郁气滞型

##### 【方药】

升麻 60 g 柴胡 60 g 白芍药 100 g 白术 150 g 川芎 60 g 香附 100 g 娑罗子 120 g 橘叶 60 g 制首乌 100 g 枸杞子 100 g 肉苁蓉 100 g 巴戟天 100 g 枳壳 60 g 黑芝麻 150 g 阿胶 200 g

上药除阿胶、黑芝麻外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 黑芝

麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 200 g 收膏即成。  
每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如少腹胀痛者，加川楝子 100 g，延胡索 100 g。

如头目眩晕者，腰酸软者，加杜仲 120 g，枸杞子 120 g，白蒺藜 100 g。

## 6. 湿热下注型

### 【方药】

柴胡 60 g 茯苓 150 g，泽泻 100 g 薏苡仁 150 g 黄柏 60 g  
当归 100 g 防己 100 g 草薢 100 g 车前子 120 g 苍术 60 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如为阴部瘙痒者，加苦参 100 g，土茯苓 150 g。

如为心烦口苦者，加山栀 100 g，连翘 100 g。

如为湿热伤阴者，加生地黄 150 g，怀山药 150 g。

## 7. 血脉瘀滞型

### 【方药】

当归尾 100 g 赤芍药 100 g 桃仁 100 g 川芎 60 g 苏木 100 g 牡丹皮 100 g 丹参 100 g 枳壳 60 g 全栝楼 100 g 槟榔花 100 g 柴胡 60 g 制大黄 60 g 红花 60 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如为小便不畅者，加益母草 150 g，泽兰 120 g，车前子 120 g。

如为小腹急胀者，加乌药 120 g，川楝子 100 g。



## 二、自我调摄

(1)解除顾虑,放下包袱,树立信念,有利于阳痿的治疗。

(2)和谐的夫妻感情,是建立夫妻双方性感基础的重要条件,夫妻体贴、理解,亲密合作,共同维持好性生活,有利于消除精神负担,恢复功能。

(3)掌握性知识,正确对待性生活。要避免性交时精神过度紧张,不知所措,对首次性交失败或偶然失败,不要背上沉重的精神负担。

(4)注意日常生活中的精神调养,避免过度紧张、压抑,保持乐观向上的精神风貌。

(5)生活要有规律,注意营养,避免过度疲劳,增强体育锻炼,提高身体素质。

(6)居室条件差,外界干扰大等环境不良因素要争取改善。

(7)戒烟,不酗酒、不吸毒、不嫖娼。

(8)有病早治疗,如果是由于内分泌疾病、血管性疾病等引起的阳痿或药物因素导致的阳痿要积极治疗原发病,去除病因。



## 遗 精

所谓遗精,是指在非性交或手淫情况下生殖器将精液排出体外的一种现象。在入睡后做梦时遗精为“梦遗”,不在做梦时遗精为“无梦遗精”,清醒状态下遗精则为“滑精”。据统计,约80%的男子有过遗精现象。初次遗精的出现,是男子进入青春期的“标志”。男孩到了青春期,性器官逐渐发育成熟,睾丸开始不断地产生精子并分泌雄性激素。精囊、前列腺和尿道球腺也在不断地产生精浆。精子和精浆混合起来就成了精液。当精液在体内积聚到一定数量再也贮存不了时,常常会通过遗精的方式排出体外。这

就是中医所讲的“精满则溢”的道理。未婚男性在正常情况下,因为精子与精液的不断产生,每月遗精 1~2 次,是正常的生理现象。“精满自溢”,没有必要担心。若遗精次数过于频繁,甚至 2~3 天一次,同时遗精后出现精神萎靡、头昏头晕、失眠多梦、腰膝酸软、四肢乏力等症状时,即为遗精过频的病理现象。诱发遗精过频的病因较多,有时并非一种原因,而是多种原因混合在一起。如缺乏性知识;思想过度集中在性的问题上,大脑皮质始终存在一个性的兴奋灶,随时会触发脊髓中枢兴奋;精神上紧张、焦虑、恐惧,造成肌肉紧张与肌肉运动加强;劳累过度、长期慢性疾病、身体虚弱、营养不良,使射精功能紊乱。还有生殖系病变,如前列腺炎、精囊炎、包茎、包皮过长、包皮龟头炎等,出现炎症充血刺激,使阴茎易勃起,均可造成频繁遗精。另外,在患者日常生活中,穿紧身裤、睡眠时被褥太暖或太沉、睡前玩弄性器官、餐餐吃刺激性的食物或饮烈酒,容易诱发阴茎勃起,引起性器官充血,也可造成遗精。



遗精按中医辨证可分为阴虚火旺、肾虚不藏、湿热内蕴三类。阴虚火旺者常因用心过度,思欲不遂,杂念妄想,君相火旺或房室不节,疏泄失常,真阴受损,阴虚火旺,扰动精室所致,症见梦中遗精,夜寐不安,头目昏晕,心悸,精神不振,体倦无力,或兼小便短黄而有热感,舌质红,脉细数。肾虚不藏者因先天不足,禀赋亏虚或久病伤肾或过劳伤气,或恣情纵欲,耗伤精气,肾虚不能固摄所致,症见遗精频作,甚至滑精,头昏目眩耳鸣,腰酸,面白少华,畏寒肢冷,舌淡白或偏红,脉细弱。湿热内蕴常由醇酒厚味,损伤脾胃,膏粱厚味酿成湿热,流注于下,扰动精室所致,症见遗精频作,或尿时有精液外流,心烦少寐,口苦或渴,小便热赤或不爽,舌苔黄腻,脉濡数。

## 一、膏方选用

### 1. 阴虚火旺型



### 【方药】

知母 100 g 黄柏 100 g 生地黄 300 g 牡丹皮 200 g 山茱萸 150 g 怀山药 200 g 茯苓 120 g 麦门冬 200 g 天门冬 200 g 泽泻 100 g 五味子 150 g 酸枣仁 150 g 煅龙骨 300 g 煅牡蛎 300 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 龟版胶 300 g

上药除龟版胶、黑芝麻、胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如为神疲乏力，精神不振者，加太子参 150 g，黄芪 150 g，生白术 150 g。

如为心有妄想，夜有艳梦，心神不安者，加石菖蒲 60 g，远志 100 g，青龙齿 300 g。

如是夜间盗汗者，加糯稻根 250 g，浮小麦 200 g。

## 2. 肾虚不藏型

### 【方药】

熟地黄 300 g 山茱萸 150 g 金樱子 250 g 菟丝子 200 g 沙苑蒺藜 200 g 芡实 500 g 莲须 120 g 煅龙骨 300 g 煅牡蛎 300 g 莲子肉 300 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 300 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉、芡实、莲子肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，黑芝麻、胡桃肉研碎、芡实、莲子肉煮熟烂研成泥状后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有畏寒肢冷，加附子 100 g，肉桂 30 g。

如有腰酸肢软者，加杜仲 200 g，千年健 150 g。



如有头晕目眩者,加枸杞子 300 g,当归 120 g。

### 3. 湿热内蕴型

#### 【方药】

黄柏 100 g 车前子(包)300 g 莲子肉 500 g 丹参 200 g  
茯苓 300 g 苦参 120 g 生牡蛎 300 g 石菖蒲 100 g 白术  
300 g

上药除莲子肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,莲子肉煎煮炖烂研泥,冲入清膏和匀,最后加冰糖(烊化)300 g、蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为排尿不爽,少腹及阴部作胀者,可加败酱草 300 g,赤芍药 200 g,乌药 120。

如为小便白浊者,加薏苡仁 300 g,猪苓 150 g,泽泻 100 g。

## 二、自我调摄



(1)要正确对待遗精,多参加各种有益的文体活动,建立婚后正常的性生活,不看带有性刺激的杂志、书刊、影视片和录像。

(2)调整睡眠习惯,睡眠时下身及足部不宜过暖,睡眠姿势尽量减少俯卧位,两手避免放置在生殖器部,杜绝手淫习惯。

(3)注意生殖器官卫生,经常清洗生殖器,经常更换内衣裤。有包皮过长或包茎者要及时手术治疗。

(4)不穿紧身裤,不饮酒,不食刺激性食物。

(5)每晚临睡前用冷水冲洗阴囊 2~3 分钟,可降低性神经的兴奋性。

(6)经常做提肛锻炼。即将肛门一紧一松,反复做 20~30 次,收缩时深吸气,放松时呼气,动作宜柔和缓慢而有节奏。

(7)经常用手掌推擦腰部至骶尾骨处,一上一下推擦 100 次;

或用手指按压神门、足三里、太溪穴,每穴1分钟左右。

## 男子不育症

男性不育症是指婚后同居两年以上,未采取避孕措施,女方生育功能正常,因男方原因导致不能生育。男性不育占不育症的30%~50%。男性不育可有绝对不育和相对不育之分,绝对不育指完全没有生育能力;相对不育指具有一定生育能力,但某些指标达不到生育要求。也可分为原发性不育和继发性不育,原发性不育指婚后从未生育者;继发性不育指婚后有过生育,之后两年以上未避孕而未育者。

引起男性不育的原因很多,大致可分为性功能正常性男性不育和性功能障碍性男性不育。性功能正常性不育是指各种原因引起的精液、精子质量下降,如无精子、少精子、精子活力下降、畸形精子增多、精液不液化等。性功能障碍性不育所包括的疾病有阳痿、早泄(未入即泄)、不射精症、逆行射精症等,这些疾病都可影响精液射入女性阴道从而产生不育。此外,生殖器官异常、遗传性疾病、免疫性疾病、辐射、药物、有毒物质、烟酒、环境污染等因素都可不同程度地影响生育功能。总之,各种因素最终分别通过影响精子生成、成熟、运输、排泄、精卵结合而导致不育。

中医对于男性不育的研究由来已久,认为脏腑、气血、经络的任何环节出现异常,如先天禀赋不足、房事不调、情志不畅、饮食不节、劳倦久病、外邪侵袭、外伤等,都可能影响男性生育功能。男性不育症按照中医辨证有虚实之分,虚证见肾精不足、气血亏损;实证见肝郁气滞、血脉瘀阻、肝经湿热型。肾精不足型,表现为不育少精或阳事不举,腰酸、耳鸣、头晕;气血亏损型,表现为不育,临事不坚,神疲乏力,动则汗出,气短;肝郁气滞型表现为不育,少腹胀痛,情绪抑郁,胸闷不舒;血脉瘀阻型,表现为不育,精脉曲张,精液



不化,局部可有刺痛感,舌暗,边有瘀斑或瘀点;肝经湿热型,表现为不育,小腹胀痛,小便黄赤或浑浊,口苦,舌红,苔黄腻等。

## 一、膏方选用

### 1. 肾精不足型

#### 【方药】

女贞子 150 g 沙苑子 150 g 黄精 120 g 制首乌 120 g 当归 120 g 肉苁蓉 100 g 枸杞子 150 g 菟丝子 150 g 覆盆子 150 g 车前子 150 g 五味子 150 g 泽泻 100 g 当归 120 g 茯苓 120 g 甘草 30 g 怀山药 200 g 牡丹皮 120 g 白芍药 120 g 生地黄 150 g 党参 150 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 100 g 鹿角胶 200 g

上药除阿胶、鹿角胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为腰脊酸软者,加杜仲 200 g,狗脊 150 g。

如为畏寒肢冷者,加附子 60 g,肉桂 30 g。

如为夜尿频多者,加蚕茧 100 g,桑螵蛸 150 g。

### 2. 气血亏损型

#### 【方药】

党参 300 g 黄芪 200 g 白术 200 g 茯苓 150 g 当归 150 g 熟地黄 300 g 川芎 100 g 白芍药 120 g 怀山药 150 g 陈皮 100 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 250 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收



膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如为头晕目眩者, 加枸杞子 150 g, 菊花 100 g。

如为早泄阳痿者, 加阳起石 150 g, 淫羊藿 120 g, 锁阳 150 g。

## 3. 肝郁气滞型

### 【方药】

蜈蚣 10 条 柴胡 100 g 白芍药 150 g 白术 150 g 香附 120 g 青皮 100 g 茯苓 150 g 甘草 100 g

上药物除蜈蚣外, 加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 蜈蚣研粉, 与清膏调和均匀, 再加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如大便溏薄者, 加苍术 100 g, 怀山药 150 g。

如夜寐欠佳者, 加合欢皮 300 g, 夜交藤 300 g。

## 4. 血脉瘀阻型

### 【方药】

丹参 200 g 桃仁 120 g 红花 100 g 当归 150 g 熟地黄 300 g 川芎 100 g 白芍药 120 g 鸡血藤 150 g 赤芍药 150 g 青皮 120 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 200 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外, 余药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊, 黑芝麻、胡桃肉研碎后, 冲入清膏和匀, 最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有睾丸硬结者, 加夏枯草 120 g, 橘核 120 g。

如有小腹胀痛者, 加柴胡 100 g, 青皮 100 g。

## 5. 肝经湿热型

### 【方药】



龙胆草 100 g 败酱草 300 g 车前子(包煎)150 g 山栀 100 g 当归 120 g 生地黄 150 g 知母 100 g 黄柏 100 g 泽泻 120 g 茯苓 120 g 柴胡 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加冰糖 200 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有小便浑浊者,加萆薢 150 g,生薏苡仁 150 g。

如有小便不畅者,加乌药 120 g,瞿麦 120 g。

## 二、自我调摄

(1)患者对自己的病情有充分的认识,以便采取正确有效的治疗方案。急躁情绪。

(2)避免不良环境因素,包括接触放射线,某些化学品和重金属等对身体有害的物质及高温作业等。若查实确系此类原因所造成,那么应及早脱离接触或注意防护。

(3)不吸烟、不酗酒。大量吸烟者会影响精子质量;长期过量地饮酒,可致睾丸不能正常地产生男性激素和精子;过量喝咖啡也会影响生育,故应避免。

(4)不要长时间压迫阴囊部位,以免保持阴囊内较低温度,有利于精子的产生

(5)增加营养,适当摄入含有较多胆固醇,如肝、脑、肠、肚等动物内脏,精氨酸,如豆腐衣、核桃、芝麻等食物,及含锌,如牡蛎、牛肉、鸡肝、蛋黄等食物,因为这些食物有利于生育。维生素 A、B、C、E,都是产生精子所必需的营养物质,应适当补充。平时可在医生的指导下,适当选用长春广嗣丸、五子衍宗丸、左归丸、右归丸等。

(6)适当节制房事,因为房事过频会影响精子的质量,但也不用忍精不射,因为精液长期不予排出,精子又会在生殖道内老化而



失去活力。

## 男子更年期综合征

都知道女性有更年期,其实男性也有更年期,只是男性更年期综合征比女性出现晚,一般在 48~60 岁之间,其发生的程度也比女性轻。许多人因为症状不明显,在不知不觉中顺利度过了,也有一部分人症状比较明显,但是往往没有引起自己或家人的注意,被误诊为“神经衰弱”。现代西医认为发生男性更年期综合征的主要因素是体内睾酮水平随年龄增长而下降,也就是说男性更年期综合征是由性腺发生退行性改变,使雄性激素如睾酮等随着年龄的增加而降低所引起一系列生理病理改变。据研究,男性在 30~90 岁期间,睾酮每年平均下降 1%~2%,总下降幅度可高达  $1/3 \sim 1/2$ 。此外,慢性疾病、不良生活方式,如抽烟、酗酒及恶劣的生活环境也会导致睾酮水平下降。这种体内激素改变所表现出来的征候有很大的不同,有的人毫无感觉,有的人则因为机体的调节不平衡和适应能力较差及雄性激素减少,而表现出种种症状。归纳起来主要有以下 4 个方面:



**精神症状:**主要是性情改变,如情绪低落、忧愁伤感、沉闷欲哭,或精神紧张、神经过敏、喜怒无常,或胡思乱想、捕风捉影,缺乏信任感等。

**自主神经功能紊乱:**主要是心血管系统症状,如心悸怔忡、心前区不适,或血压波动、头晕耳鸣、轰热汗出;胃肠道症状,如食欲不振、脘腹胀闷、大便时秘时泄;神经衰弱表现,如失眠、少寐多梦、易惊醒、记忆力减退、健忘、反应迟钝等。

**性功能障碍:**常见性欲减退、阳痿、早泄、精液量少等。

**体态变化:**全身肌肉开始松弛,皮下脂肪较以前丰富,身体变胖,显出“福态”。

中医认为,人到更年期,肾气日衰,天癸将竭,肝阴亏损,脾失健运,心肾不交,脑失所养,从而出现阴阳平衡失调,脏腑功能紊乱的一系列症状。按中医辨证,可以分为肾精亏虚、脾肾两虚、心肾不交、肝肾阴虚等证。肾精亏虚证临床表现为腰酸耳鸣头晕,性欲减退,阳痿,早泄,精液量少;脾肾两虚证表现为神疲乏力,肌肉松弛,形体发胖,大便溏薄,腹胀食少,腰膝酸软,头发早白,阳痿,性欲淡漠;心肾不交证表现为心烦心悸,入睡困难,少寐多梦,头晕耳鸣,腰酸;肝肾阴虚表现为焦虑不安,脾气急躁,容易激动,烦躁易怒,胁肋隐隐作痛,遗精,轰热汗出,夜寐多梦,头晕腰酸。

## 一、膏方选用

### 1. 肾精亏虚型

#### 【方药】

熟地黄 300 g 山茱萸 200 g 怀山药 300 g 枸杞子 300 g  
杜仲 300 g 菟丝子 200 g 淫羊藿 300 g 茯苓 200 g 黑芝麻  
150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 300 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有畏寒肢冷者,加附子 60 g,肉桂 30 g。

如有夜尿频多者,加桑螵蛸 150 g,蚕茧壳 150 g。

### 2. 脾肾两虚型

#### 【方药】

党参 200 g 白术 300 g 茯苓 150 g 黄芪 200 g 怀山药  
300 g 陈皮 100 g 淫羊藿 150 g 仙茅 100 g 补骨脂 150 g  
莲子肉 250 g 芡实 250 g 阿胶 100 g 鹿角胶 150 g





上药除阿胶、鹿角胶、芡实、莲子肉、饴糖外,其余药物加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,芡实、莲子肉煮透熟烂,冲入清膏和匀,最后加饴糖200g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。一料服完,可再制一料,直到见效为止。

### 【加减变化】

如有腹胀食少者,加枳壳100g,焦山楂120g。

如有五更泄泻者,加肉豆蔻60g,五味子100g。

如有腰膝酸软者,加杜仲300g,狗脊150g。

如有畏寒肢冷者,加附子60g,桂枝60g。

### 3. 心肾不交型

#### 【方药】

熟地黄300g 怀山药300g 牡丹皮100g 泽泻100g 山茱萸150g 知母100g 黄柏100g 茯苓150g 夜交藤300g 合欢皮300g 五味子200g 黑芝麻150g 胡桃肉250g 阿胶200g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。



### 【加减变化】

如有头晕眼花者,加枸杞子150g,菊花100g。

如有遗精滑泄者,加金樱子150g,莲须100g。

如有腰膝酸软者,加杜仲300g,狗脊150g。

### 4. 肝肾阴虚型

#### 【方药】

生地黄300g 沙参100g 当归60g 枸杞子150g 麦门冬150g 川楝子100g 何首乌300g 早莲草300g 女贞子

120 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 300 g

上药除阿胶、黑芝麻、胡桃肉、冰糖外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冰糖烊化，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有烘热汗出者，加知母 100 g，黄柏 100 g。

如有头晕眼花者，加白蒺藜 150 g，菊花 100 g。

如有焦虑不安者，加紫贝齿 300 g，生龙牡各 300 g。

## 二、自我调摄

(1)有病早治，戒掉烟酒。因为高血压、肥胖症、糖尿病等慢性疾病以及酗酒抽烟等坏习惯会使身体状况恶化。

(2)作息规律，避免熬夜。午夜前后是人体分泌激素的关键时刻，不能因熬夜而受影响。

(3)加强锻炼，活动筋骨。使关节活动自如，肌肉有力。

(4)吃好早餐，多食果蔬。早餐是机体正常运转所必需的，富含维生素的水果和蔬菜，可帮助清除体内的氧化物，软化血管，促进血液循环。

(5)劳逸结合，避免过度疲劳，尤其要避免房事过度。过度劳累会耗损精气，加重更年期综合征程度。

(6)知足常乐，笑口常开，以保持乐观的心态，解除烦恼。

## 前列腺增生症

前列腺增生症，又称良性“前列腺肥大症”，是老年男性的常见病，多发病。发病年龄多见于 50 岁以后，临床上主要引起下尿路梗阻，表现为尿频、排尿困难和尿潴留等。长期的梗阻，还可造成



肾功能的损害。根据临床表现,本病当属中医学“癃闭”范畴,以小便不利,点滴而短少为特征。小便不畅,点滴而出,病势较缓者,称为“癃”;小便闭塞,点滴不通,病势较急者,称为“闭”。现代医学对前列腺增生症的病因尚未完全明了,目前有关本病病因的研究主要有内分泌学说、动脉硬化学说、新生物学说、炎症学说、种族因素学说、免疫因素学说、睾丸功能异常学说及性生活过度学说等,但均未证实或不能完全解释其发病机制。近年来,对内分泌学说的实验研究进展较快,多数学者认为,前列腺增生的病因是由于雄、雌激素间的平衡失调而引起。还有一种意见认为,可能与前列腺内 5 $\alpha$ -双氢睾酮增多有关。

前列腺增生症按中医辨证可以分为虚实两大类:虚证多因久病、年老,肾虚精亏,命门火衰,膀胱气化无权,或思虑、劳倦、饮食不节等因素损伤脾胃,脾虚中气不足,升清降浊的功能失调,以致小便不利;实证多为湿热之邪蕴结,或热壅于肺,肺气不降,水道通调不利,或瘀血、痰湿、败精等瘀结成肿块,阻塞尿道所致。虚证包括脾肾阳虚型,表现为小便频数,排尿无力,余沥不尽,腰膝酸软,神疲乏力,大便稀溏或便秘,舌淡、苔白,脉沉细;肾阴亏虚型,表现为小便频数或淋漓不畅,时发时止,遇劳即发,经久不愈,或伴头晕耳鸣,舌红少苔或无苔,脉细数。实证包括湿热蕴结型,表现为小便点滴不通,或频数短涩,终末尿浑浊,或口渴不欲饮,大便秘结,舌红、苔黄腻,脉沉数或滑数;气血瘀阻型,表现为小便不通,或滴沥不畅,或尿细如线,小腹胀满疼痛,舌紫黯或有瘀点,脉涩或细数;肝郁气滞型,表现为情志忧郁,或多烦善怒,小便不通或通而不畅,胁腹胀满,舌红苔薄黄,脉弦。



## 一、膏方选用

### 1. 脾肾阳虚型

#### 【方药】

熟地黄 300 g 怀山药 300 g 山茱萸 200 g 茯苓 200 g 肉桂 60 g 车前子 150 g 牛膝 150 g 泽泻 120 g 附子 90 g 牡丹皮 150 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 阿胶 100 g 鹿角胶 200 g

上药除阿胶、鹿角胶、黑芝麻、胡桃肉外，其余药物加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 200 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。一料服完，可再制一料，直到见效为止。

### 【加减变化】

如有畏寒肢冷者，加附子 60 g，肉桂 30 g。

如有夜尿频多者，加桑螵蛸 150 g，蚕茧壳 150 g。

如为腰膝酸软者，加杜仲 300 g，狗脊 150 g。

## 2. 肾阴亏虚型

### 【方药】

牡丹皮 150 g 山茱萸 120 g 怀山药 150 g 猪苓 150 g 茯苓 150 g 生地黄 150 g 泽泻 120 g 枸杞子 150 g 车前子 150 g 牛膝 150 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 250 g 龟版胶 300 g

上药除龟版胶、黑芝麻、胡桃肉外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，黑芝麻、胡桃肉研碎后，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有头晕目眩者，加钩藤 200 g，白蒺藜 150 g，菊花 100 g。

如有口干舌燥者，加石斛 120 g，麦门冬 120 g，北沙参 150 g。

如有腰膝酸软者，加杜仲 300 g，狗脊 150 g。

## 3. 湿热蕴结型

### 【方药】



滑石 200 g 甘草梢 120 g 车前子 150 g 篇蓄 150 g 瞿麦 150 g 山梔 100 g 大黄 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有大便于结者,加郁李仁 100 g,火麻仁 150 g。

如有纳谷不香者,加鸡内金 150 g。

如有少腹胀痛,加八月札 150 g,柴胡 120 g。

## 4. 气血瘀阻型

### 【方药】

当归尾 200 g 山甲片 150 g 桃仁 120 g 泽兰 120 g 泽泻 120 g 益母草 300 g 川牛膝 150 g 茯苓 150 g 桂枝 90 g 乌药 100 g 川芎 50 g 橘核 120 g 青皮 120 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为腰膝酸软者,加杜仲 300 g,狗脊 150 g。

如有少腹胀痛者,加八月札 150 g,香附 120 g。

## 5. 肝郁气滞型

### 【方药】

沉香 100 g 橘皮 120 g 当归 150 g 王不留行 120 g 石韦 150 g 滑石 200 g 郁金 120 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如心烦口苦者,加知母 100 g,黄柏 100 g。

如少腹胀痛者,加八月札 150 g,柴胡 120 g。



## 二、自我调摄

(1) 饮食宜多吃清淡易消化的食物,如蔬菜、水果等,同时补充含锌量较高的食物,如贝类、鱼、蛋类、花生、芝麻等,以增强前列腺的抗病能力。

(2) 少食刺激性食物,戒酒,以减少前列腺充血的机会,减少痔疮和便秘的发生。

(3) 尽可能少骑自行车,因自行车的坐垫压近尿道口上段的前列腺部位,使膀胱排空能力降低,易加重病情。

(4) 节制房事,要经常清洗生殖器和外阴部位,以防细菌进入尿道发炎,侵犯前列腺发炎。

(5) 常用温热水(40℃左右)洗浴外阴部、小腹部,可促进前列腺血液循环,有利于新陈代谢,增强局部的抗病能力。不要长期憋尿,憋尿会造成膀胱过于充盈,使膀胱肌张力减弱,导致排尿困难,诱发尿潴留,因此要做到有尿就排。

(6) 经常做提肛运动,主动而有规律地收缩肛门部位的肌肉,可反复向内提放,每次 50 次左右。

(7) 保持心情舒畅,避免忧思恼怒,忌纵欲,适当参加体育活动,有助于增强机体的抵抗力,改善前列腺局部的血液循环。

(8) 前列腺增生、慢性前列腺炎往往是反复发作,缠绵不断,重者痛不欲生,切莫延误,早诊断早治疗,一定要找正规医生。



## 外科皮肤科

### 痤疮

痤疮是毛囊皮脂腺的慢性炎症,其特点是在面部及胸背部散在生出针尖或米粒大小的黑头丘疹,挤压时有白色粉渣样物,愈后留下黑斑,严重者出现结节、瘢痕。由于多发生在青春期,所以中医称之为“青春疙瘩”、“粉刺”。这是一种损容性的皮肤病,当青年人脸上长了许多疙瘩后会感到十分苦恼。现代医学认为痤疮是因为青春期雄激素分泌增加,使皮脂腺分泌过盛,造成毛孔堵塞,加之局部感染产生炎症所致。过多的饮食辛辣刺激的食物以及精神紧张等是诱发本病的主要原因。

本病按照中医辨证大多属实,多因湿热蕴结,上壅于颜面,或血瘀痰结,久蕴不解,经脉不畅所致。湿热蕴结型,多表现为皮疹红肿,有脓包,口臭,便秘,尿黄。瘀痰结型,多表现为皮疹反复发作,经久不消,渐成黄豆大小结节,其色灰暗,按之如囊,斑痕叠起,皮肤粗糙。



#### 一、膏方选用

##### 1. 湿热蕴结型

##### 【方药】

山栀 90 g 茵陈蒿 150 g 黄芩 150 g 桑白皮 200 g 地骨皮 200 g 苦参 100 g 金银花 150 g 蒲公英 300 g 金钱草 150 g 车前子 150 g 赤小豆 150 g 甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再

加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如有大便干结者, 加大黄 30 g, 桃仁 100 g, 杏仁 100 g。玄参 100 g。

如有口中黏腻者, 加黄连 15, 佩兰 300 g, 茯苓 100 g 猪苓 150 g。

如有皮疹脓出不畅者, 加皂角刺 90 g, 穿山甲 90 g, 天花粉 150 g, 白芷 150 g。

## 2. 血瘀痰结型

### 【方药】

当归 100 g 丹参 150 g 牡丹皮 150 g 赤芍药 150 g 桃仁 100 g 半夏 150 g 陈皮 60 g 茯苓 150 g 海藻 200 g 昆布 150 g 夏枯草 300 g 益母草 200 g 金银花 150 g 连翘 100 g 山楂 150 g 黑豆 200 g 甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次, 滤汁去渣, 合并滤液, 加热浓缩为清膏, 再加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如为小便短赤、浑浊, 加黄柏 60 g, 川牛膝 150 g。

如有囊结叠生, 加三棱 90 g, 莪术 90 g, 乳香 60 g, 没药 60 g。

## 二、自我调摄

(1) 治疗痤疮应采用内服和外治相结合的办法, 这样才能提高疗效。

(2) 不要擅自用手挤捏痤疮, 以免继发感染。

(3) 少吃油腻、油炸、辛辣刺激性食物, 多饮水, 多吃蔬菜、水果, 保持大便通畅。

(4) 避免长期精神紧张, 保证充足睡眠, 放松面部肌肉, 有助于皮肤修复。





## 黄褐斑

黄褐斑是指分布于面部大小不一的黄褐色或深褐色的色素斑。虽然多无痛痒,但会影响美容,带来烦恼。面部色素沉着多发生在妊娠期、产后、月经期、更年期以及某些慢性疾病,如肝病、甲状腺功能亢进症等病,它是体内气血阴阳失调的信号,可以反映脏腑功能状况。现代研究表明黄褐斑的发生与性激素紊乱有关,极少数未婚女青年或未妊娠妇女也可能出现黄褐斑,这可能与遗传、内分泌、日光照等因素有关,使皮肤黑色素沉着而形成。

黄褐斑按照中医辨证可分虚实两类,实证多因气滞血瘀,郁热上熏而生褐斑;临床表现为黄褐色斑,烦躁易怒,胸胁胀痛。虚证多因肝肾阴虚,精血不荣颜面而成;或阴虚水亏,虚火上炎以致燥结斑黑;临床表现为黄斑褐黑,腰膝酸软,身体羸瘦。

### 一、膏方选用

#### 1. 气滞血瘀型

##### 【方药】

柴胡 90 g 香附 100 g 薄荷 30 g 山梔 100 g 陈皮 90 g  
黄芩 100 g 赤芍药 150 g 红花 100 g 丹参 150 g 牡丹皮  
150 g 川芎 50 g 黑大豆 150 g 赤小豆 150 g 金银花 150 g  
甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

##### 【加减变化】

如为口干,便秘者,加生地黄 200 g,麦门冬 200 g,玄参 150 g,生大黄 30 g。

如为小便黄赤者,加泽泻 100 g,木通 60 g。



## 2. 肝肾阴虚型

### 【方药】

熟地黄 300 g 生地黄 150 g 何首乌 150 g 山茱萸 150 g 怀山药 200 g 茯苓 200 g 女贞子 200 g 枸杞子 150 g 旱莲草 150 g 黑大豆 150 g 赤小豆 150 g 金银花 150 g 甘草 50 g 龟版胶 150 g 鳖甲胶 150 g。上药除龟版胶、鳖甲胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将龟版胶、鳖甲胶加适量清水浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如为烦热盗汗者，加地骨皮 150 g，牡丹皮 150 g。

如为面色晦滞者，加赤芍药 150 g，川芎 60 g，丹参 150 g。

## 二、自我调摄

(1) 紫外线照射能直接导致皮肤色素沉着，加深色斑，所以要尽量避免太阳直晒和暴晒。

(2) 保持心情舒畅，减少不必要的烦恼。

(3) 平时不要滥用刺激性的美容清洁剂。

## 脂溢性脱发

脂溢性脱发多发生于青壮年，以男性为多。其特点是：头皮带油腻发亮，头屑增多，头皮瘙痒，头发干燥变细，缺乏光泽。病程日久，可在头顶或前额两侧呈均匀或对称性脱发，很少累及后脑部及颞部。患这种脱发的女子常同时伴有头发和皮肤油腻，面部痤疮及多毛症。尽管脂溢性脱发是常见的皮肤科疾病，但是现代医学对其病因还未明了，认为可能与内分泌紊乱、免疫、神经、遗传和环境因素等有关。



脂溢性脱发按照中医辨证有虚实两类：虚证多因肝肾亏虚、或脾肾阳虚，以至头发失养而脱落；实证多因痰郁阻络，郁而血热风燥，或致湿浊化热，使湿热上蒸巅顶，侵蚀发根而引起头发油腻脱落。但是临床以实证为多见。血热风燥型，多表现为头发干燥，稀疏脱落，头皮屑叠飞，头皮瘙痒；湿浊内盛型，多表现为头发潮湿，头发彼此粘连在一起，头屑油腻，难以洗涤。

## 一、膏方选用

### 1. 血热风燥型

#### 【方药】

生地黄 300 g 白茅根 300 g 白薇 150 g 地骨皮 300 g 桑白皮 200 g 牡丹皮 150 g 玄参 150 g 生石膏 300 g 知母 100 g 牛蒡子 100 g 荆芥 100 g 防风 100 g 升麻 50 g 金银花 150 g 侧柏叶 150 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

#### 【加减变化】

如有头皮瘙痒者，加地肤子 150 g，僵蚕 150 g，白蒺藜 150 g。

如有心烦失眠者，加远志 100 g，夜交藤 300 g，五味子 60 g。

### 2. 湿浊内盛型

#### 【方药】

白术 150 g 茯苓 200 g 猪苓 150 g 草薢 200 g 车前子 300 g 泽泻 150 g 白鲜皮 150 g 薏苡仁 300 g 陈皮 60 g 半夏 90 g 山楂 150 g 丹参 150 g 川芎 60 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

#### 【加减变化】

如有消化不良、胸闷者，加莱菔子 100 g，木瓜 150 g。



如小便黄赤者,加茵陈蒿 200 g,山栀 100 g,川牛膝 150 g。  
如头皮烘热者,加侧柏叶 200 g,桑白皮 300 g,生地黄 150 g。

## 二、自我调摄

(1)保持心情开朗,情绪稳定,避免过度用脑。

(2)限制高蛋白、高脂肪食物,禁食辛辣、煎炸及酒类食物。多吃水果、蔬菜等。

(3)不要因为头皮瘙痒而频繁洗发,而且在洗发过程中不要用碱性肥皂。适当涂些含有硫磺的药皂,祛脂止痒效果会更好。

(4)经常按摩和梳头整发,以改善头皮的血液循环,加强头发的营养吸收和新陈代谢。

## 须发早白

我国大多数民族都为黑发,有少数人的头发为褐色,但是只要有光泽,仍是正常、健康的头发。一般来说人到了 40~50 岁后,头发会渐渐斑白,此为正常生理现象,无须治疗。但是对于一些无遗传因素的年轻人如出现白发丛生,发质枯燥,甚至两鬓如霜,则为不正常现象,这也就是中医所说的须发早白。现代医学认为须发早白是毛囊中黑色素数量减少或缺乏所致。青壮年精神过度紧张,或饮食中缺乏某些微量元素,或长期慢性消耗性疾病、内分泌障碍等都可诱发本症。

须发早白按照中医辨证可分虚实两类:虚证多因精血过度亏耗,使毛发失于濡养所致,多数发生在 40 岁以上,从鬓角开始,继而花白至银发,常伴有头昏眼花,失眠健忘,腰酸腿软;实证多因肝郁化火,毛根失养受伤所致,多以青壮年为主,头发由焦黄变花白,病变多从头顶或前额开始,逐渐蔓延扩大,伴有精神抑郁,烦躁易怒,头部烘热。



## 一、膏方选用

### 1. 精血亏耗型

#### 【方药】

制首乌 500 g 茯苓 300 g 当归 150 g 枸杞子 200 g 菟丝子 150 g 牛膝 150 g 枸杞子 200 g 女贞子 300 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 150 g 补骨脂 60 g 川芎 15 g 阿胶 200 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每交 15~30 g,每日 2 次,开水调服。可连服 2~3 料膏方。

#### 【加减变化】

如有失眠健忘者,加酸枣仁 200 g,夜交藤 300 g,淫羊藿 100 g。

如有头昏眼花耳鸣者,加天麻 100 g,磁石 200 g,鸡血藤 300 g。

### 2. 肝郁化火型

#### 【方药】

丹参 200 g 当归 60 g 合欢皮 150 g 生地黄 300 g 山栀 90 g 郁金 90 g 柴胡 60 g 牡丹皮 150 g 地骨皮 300 g 何首乌 500 g 女贞子 300 g 旱莲草 300 g 茯苓 150 g 远志 60 g 甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为急躁易怒者,加黄连 15 g,合欢皮 100 g,白蒺藜 150 g。

如有自觉烘热者,小便黄赤者,加车前子 300 g,滑石 300 g,苦参 50 g。



## 二、自我调摄

- (1) 注意充分休息,保持心情舒畅,克服悲观失望的消极情绪。
- (2) 本病见效大多缓慢,治疗处方确定后,不要随便改方。只有坚持正规治疗才能获效。
- (3) 多食富含维生素 B 族的食物,如猪肝、牛肝等。

## 老年性皮肤瘙痒

单纯性老年皮肤瘙痒症多见于 60 岁以上的老年人,主要与老年人皮肤生理结构及功能退化有关系。由于皮肤的汗腺和皮脂腺萎缩,分泌功能退化,使皮肤表面的水脂乳化保护物明显减少,皮肤缺乏润泽而显得干燥,引发瘙痒。长期反复的搔抓,又可使皮肤肥厚、苔藓化,甚至继发感染。

老年皮肤瘙痒按照中医辨证多属血虚风燥,临床上多表现为皮肤瘙痒且干燥,搔之有皮屑,常伴有头晕眼花、神疲乏力等症。



### 一、膏方选用

#### 1. 血虚风燥型

##### 【方药】

当归 100 g 白芍药 150 g 川芎 60 g 生地黄 150 g 熟地黄 150 g 何首乌 150 g 白蒺藜 150 g 防风 100 g 荆芥 100 g 生黄芪 150 g 甘草 60 g 鸡血藤 200 g 夜交藤 300 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量清水浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有搔抓后局部色红有渗出者,加益母草 200 g,赤芍药 100 g,牡丹皮 100 g,苦参 90 g。

如有皮肤肥厚者,加丹参 150 g,桃仁 100 g,红花 100 g。

如有睡眠不安者,加五味子 100 g,炙远志 100 g,酸枣仁 150 g。

如有大便干燥、口干者,加肉苁蓉 150 g,桑椹子 200 g,决明子 200 g。

如有腰酸腿软者,加菟丝子 150 g,枸杞子 150 g,山茱萸 100 g,杜仲 100 g。

## 二、自我调摄

(1)避免用刺激性较强的肥皂洗浴身体,以避免刺激皮肤。

(2)多食水果蔬菜,增加营养,以滋润养护衰老的皮肤。

(3)忌食辛辣、烟酒。

(4)经常用中药煎汤洗浴身体。处方为:夜交藤 100 g,白蒺藜 50 g,白鲜皮 50 g,蛇床子 30 g。



## 湿 疹

湿疹是由多种诱发因素引起的皮肤过敏性疾病。根据皮肤炎症的情况可分急性、慢性和亚急性三种。急性皮损常呈红斑血疹水疱、糜烂、渗出等;慢性皮损常呈局部褐红色肥厚,常有鳞屑脱落,或呈苔藓样改变;亚急性皮损则多表现为红肿,渗液开始减轻,主要为患部出现红斑鳞屑。其临床皮损具有剧烈瘙痒,反复发作和难于治疗的特点。关于其病因至今尚未十分清楚,可能与体质(与遗传基因有关,这类人对各种致病因子的敏感性比正常人高)、精神与神经(过度紧张、疲劳及自主神经功能紊乱)、消化功能障碍

(使异体蛋白等过敏因子进入体内,或造成维生素的缺乏)、感染(细菌、病毒、真菌等)、内分泌与代谢紊乱(糖尿病、月经不调等)有关,其中明显地直接引起湿疹的过敏因子有各种蛋白质食物、花粉、皮毛、细菌等。

湿疹属于中医学中“癣疮”的范畴。中医认为急性、亚急性湿疹多属实证,因风、湿、热客于肌肤而成;亚急性、慢性湿疹多属虚证或虚实兼夹,因脾虚或血虚风燥所致。本篇主要介绍慢性湿疹的膏方。慢性湿疹按照中医辨证,可分脾虚型和血虚风燥型。脾虚型,多表现为皮损暗淡不红,渗出很少,可有黄色脱屑或以结痂浸润的斑片为主,面色无华,大便溏薄,纳差;血虚风燥型,多表现为皮损肥厚、陈旧,伴色素沉着,渗出少而干燥,时缓时重,脱屑较多,可伴头晕失眠、口燥咽干、大便干结。

## 一、膏方选用

### 1. 脾虚型

#### 【方药】

黄芪 100 g 党参 150 g 白术 150 g 茯苓 150 g 薏苡仁 300 g 制半夏 100 g 陈皮 60 g 神曲 100 g 地肤子 100 g 生甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加冰糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有大便溏薄、腹胀较甚、渗液较多者,加苍术 100 g,砂仁 60 g,苦参 90 g,泽泻 100 g。

如有皮肤瘙痒明显者,加蛇蜕 100 g,徐长卿 150 g。

### 2. 血虚风燥型

#### 【方药】

当归 100 g 白芍药 150 g 川芎 60 g 生地黄 150 g 白蒺





藜 150 g 防风 60 g 荆芥 100 g 白薇 100 g 何首乌 150 g 蛇  
蜕 100 g 蝉蜕 100 g 丹参 100 g 龟版胶 150 g

上药除龟版胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量清水浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有头晕耳鸣腰酸明显者,加黄精 100 g,熟地黄 100 g。

如有小便黄赤者,加川牛膝 100 g,益母草 300 g。

如有瘙痒难忍者,加全蝎 30 g,徐长卿 100 g。

## 二、自我调摄

(1) 湿疹是一种反复发作的慢性皮肤病,而且是重要的心身疾病。患者特别要认识到不良精神刺激对本病的负性作用,所以应予以充分重视。平时注意调摄情绪,努力改变急躁性格,有助于病症的好转和治愈。

(2) 饮食以清淡为主,勿食辛辣食品和海鲜发物。

(3) 禁止用热水烫洗肢体和用碱性肥皂等刺激物洗涤。



# 伤骨科

## 骨 折

骨折是指骨的完整性或连续性因外力作用或病理因素而遭破坏的状态,骨折部位常有剧烈疼痛、肿胀、瘀血以及运动障碍。骨折发生后的愈合过程在组织解剖、生理病理以及生化等方面是按照一定的规律进行的,整个过程是持续的、逐步的和渐进的,一般可分为血肿机化期(早期)、原始骨痂期(中期)和骨痂改造期(后期),这三期之间并无明显的界限。在这三个阶段中,合理运用中医膏方能充分体现中医伤骨科治疗中的整体观,这对于骨折的早日治愈起着至关重要的作用。

早期(在骨折后 2~3 周内) 从骨折处形成血肿至青紫肿胀基本消退,通过内服活血化瘀膏方可以达到加强骨折端局部的血液循环,并消除瘀血肿块以及代谢分解的产物。

中期(在骨折后 4~8 周) 骨折端的血肿机化形成的纤维结缔组织逐步转变到原始骨痂。通过内服接骨续伤、活血化瘀膏方可以促进骨痂的形成,骨折的愈合。

后期(在骨折后 8~12 周) 断骨虽已连接,但还未坚固,功能活动还未完全恢复。通过内服补肝肾、壮筋骨、益气血的膏方,使骨折完全愈合,功能活动恢复正常。

### 一、膏方选用

#### 1. 早期

#### 【方药】

当归 150 g 生地黄 150 g 赤芍药 150 g 红花 100 g 桃仁



100 g 泽兰 150 g 地耳草 100 g 王不留行 100 g 乳香 100 g  
没药 100 g 藤黄 120 g 骨碎补 150 g 制大黄 100 g 三七  
100 g 谷芽 150 g 神曲 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有疼痛剧烈难忍者,加血竭 90 g,麝香 6 g。

如有骨折处红肿明显者,加益母草 300 g,水牛角 200 g,牡丹皮 150 g。

## 2. 中期

### 【方药】

三七 100 g 当归 150 g 川芎 100 g 生地黄 150 g 赤芍药  
150 g 白芍药 200 g 虻虫 100 g 骨碎补 150 g 自然铜 150 g  
扞扞活 100 g 川断 150 g 狗脊 150 g 伸筋草 150 g 谷芽  
150 g 神曲 100 g 龟版胶 100 g 鹿角胶 100 g

上药除龟版胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。



### 【加减变化】

如有疼痛剧烈者,加乳香 100 g,没药 100 g,血竭 100 g。

## 3. 后期

### 【方药】

炙黄芪 120 g 党参 150 g 白术 100 g 白芍药 150 g 当归  
100 g 川芎 90 g 杜仲 150 g 虻虫 100 g 骨碎补 150 g 续断  
150 g 狗脊 150 g 桑寄生 150 g 熟地黄 150 g 何首乌 150 g  
伸筋草 150 g 鸡血藤 150 g 陈皮 60 g 谷芽 150 g 龟版胶  
150 g 鹿角胶 150 g

上药除龟版胶、鹿角胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300g收膏即成。每次15~30g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如骨折处局部冷感明显者,加制附子60g,桂枝90g。

## 二、自我调摄

(1)在医生的指导下,正确操练,循序渐进,有利于促进骨折的治愈。

(2)后期配合中药熏洗局部,有助于早日恢复功能。处方:桂枝15g羌独活(各)10g,甘松10g,花椒10g,伸筋草30g,扞扞活30g,全当归15g。每日熏洗2~3次。

(3)注意营养,保证每天食入足够的蛋白质、钙类食品,如牛奶、鸡蛋等;同时食入蔬菜、水果,以保持大便的通畅。

## 骨质疏松症

骨质疏松症是老年人的常见病,绝经期后的妇女更为多见。疾病的早期常常无症状,或症状很轻微,但骨的脆性增高,患者容易发生骨折。随着骨钙的流失,症状逐渐加重,主要表现为腰背痛,容易发生骨折,身高缩短,甚至驼背。X线检查和骨密度测定能发现骨质的变化,但是由于只有当骨量丢失超过30%~50%时,X线才能反映出来,所以X线检查不能早期诊断骨质疏松症。现代西医认为本病与老年人性激素,包括雌激素和雄激素水平的明显下降甚至丧失有密切关系。此外,与营养不良、蛋白质缺少、钙摄入不足,以及代谢障碍、体力活动减少等都有联系。

骨质疏松症属于中医的“骨痿”,按中医辨证以虚为主,或肝肾



精血衰少、骨失髓养,或脾胃气血不足,骨失荣养所致。肝肾精血亏损型,常伴有头晕眼花,耳鸣耳聋,腰背酸痛,下肢痿软,精神疲惫等;脾胃气血不足型,常伴有疲乏气短,心悸健忘,面色㿔白、食欲不振,大便溏薄等。

## 一、膏方选用

### 1. 肝肾精血亏损型

#### 【方药】

熟地黄 200 g 怀山药 300 g 山茱萸 150 g 菟丝子 200 g 枸杞子 200 g 牛膝 150 g 杜仲 150 g 桑寄生 150 g 何首乌 300 g 千年健 150 g 骨碎补 150 g 川芎 50 g 当归 100 g 黑芝麻 150 g 胡桃肉 150 g 龟版胶 150 g 鹿角胶 150 g

上药除龟版胶、鹿角胶、黑芝麻、胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻、胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有腰背冷痛、喜暖喜按压者,加制附子 60 g,仙灵脾 150 g,仙茅 100 g。

如有潮热盗汗、烦热口干者,去鹿角胶、骨碎补,加川牛膝 150 g,炒黄柏 60 g,炒知母 60 g。

### 2. 脾胃气血两亏型

#### 【方药】

当归 150 g 白芍药 300 g 川芎 60 g 熟地黄 300 g 炙甘草 50 g 鸡血藤 300 g 白术 150 g 党参 200 g 茯苓 200 g 何首乌 300 g 枸杞子 200 g 女贞子 300 g 桑寄生 150 g 续断 150 g 骨碎补 100 g 龟版胶 150 g 阿胶 150 g



上药除阿胶、龟版胶外，余药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再将阿胶、龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊，冲入清膏和匀，最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

### 【加减变化】

如有食欲不振、大便溏薄者，加莲子 100 g，怀山药 200 g，扁豆 150 g，薏苡仁 200 g。

如有骨节刺痛、痛处固定者，加虻虫 60 g，鹿衔草 150 g，桃仁 100 g，红花 60 g。

## 二、自我调摄

(1) 骨质疏松症与年龄增长密切相关，对于老年人来讲，要做到积极预防，早发现，早治疗。

(2) 加强体育锻炼，合理补充钙、维生素和适量蛋白质，如牛奶、豆制品、鸡蛋、骨头汤、胡桃仁等，大量蛋白质的摄入会增加尿钙的排出，而不利于骨质疏松的防治。

(3) 吸烟、酗酒会影响人体的消化吸收，扰乱内分泌而增加骨质疏松发生的危险性，故应戒除吸烟、酗酒的不良嗜好。

(4) 多晒太阳，为钙的吸收创造条件。

## 足跟痛

足跟痛又称“肥大性跟骨炎”、“跟骨骨刺”，好发生于 40 岁以上的中老年人群，女性较男性发病率高。虽然从外表看既不红也不肿，但当站立时或行走时会感到针刺样疼痛，活动片刻后疼痛可稍减，休息后症状更减轻。现代西医认为步入中年后，足跖筋膜开始发生退行性改变，组成跖筋膜的纤维组织逐渐失去弹性，当长途步行或从高处跳下时，就容易受伤。而且随着年龄增大，跖筋膜弹



性更差,使足跟痛也就持续存在而得不到缓解;而且跖筋膜附着在跟骨结处的创伤性炎症反应长期存在,又会刺激跟骨骨膜,造成骨质增生,形成骨刺,当骨刺在负重情况下,对足底软组织产生机械性压迫而造成足跟疼痛。

足跟痛按照中医辨证多属虚证,多因肝肾精血不足,筋骨失养,兼血脉交阻所致。临床多表现为足跟疼痛,日久不愈,休息后可缓解,常伴有头昏眼花、耳鸣、健忘等。

## 一、膏方选用

### 1. 肝肾不足型

#### 【方药】

生地黄 150 g 熟地黄 200 g 杜仲 150 g 肉苁蓉 200 g 巴戟天 150 g 补骨脂 100 g 骨碎补 150 g 白芍药 200 g 赤芍药 150 g 当归 100 g 炙甘草 60 g 威灵仙 150 g 鸡血藤 300 g 龟版胶 150 g 鹿角胶 100 g

上药除龟版胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如有受寒后疼痛加重者,加淫羊藿 150 g,仙茅 150 g。

如有疼痛难忍者,加广地龙 100 g,蜈蚣 30 g,徐长卿 150 g。

如有头昏眼花明显者,加枸杞子 150 g,菊花 100 g,女贞子 150 g,菟丝子 150 g。

如有神疲乏力、心悸失眠者,加党参 150 g,麦门冬 200 g,枣仁 150 g,五味子 100 g。

如有下肢麻木者,加天麻 100 g,千年健 150 g。



## 二、自我调摄

- (1) 自己特制海绵鞋垫,以减少局部压力及磨擦而缓解症状。
- (2) 注意保暖和休息;避免剧烈的负重运动和长途行走。
- (3) 膏方的药渣可再次煎汤薰洗患肢,可有效减轻症状。
- (4) 骨刺形成后一般不会被吸收,所以调养很重要。

## 慢性腰痛

慢性腰痛是指反复发作的以腰部疼痛为主要症状的一类病症。主要表现为经常性腰部酸痛,时轻时重,受寒冷刺激或在阴雨天时腰痛会加重,活动后可减轻,静止较长时间后会自觉僵硬,但疲劳后又会加重。引起的原因很多,目前所知有九十余种疾病可以导致腰痛,如肾病、盆腔炎等,但极大部分是因腰部软组织慢性劳损而引起,如腰肌劳损、腰椎肥大、腰椎骨关节病或腰脊隐性裂等。

慢性腰痛按照中医辨证有虚实之分,实证多因寒湿或湿热阻遏经脉,气滞血瘀,不通而痛;但是中医认为慢性腰痛中虚证十有八九,虚证多因劳累太过,或久病体衰,或房室不节,以致肾精亏损,筋脉失濡而成,临床表现为腰痛喜按喜揉,腿膝无力,反复发作,遇劳加重,休息则减轻。偏肾阳虚者,常面色㿔白,手足不温,阳痿,尿清长;偏肾阴虚者,常面色潮红,手足心热,盗汗遗精。

## 一、膏方选用

### 1. 肾虚腰痛

#### 【方药】

熟地黄 200 g 山茱萸 150 g 怀山药 200 g 胡桃肉 100 g  
杜仲 150 g 川牛膝各 150 g 补骨脂 150 g 桑寄生 150 g 狗脊





150 g 五加皮 150 g 续断 100 g 千年健 150 g 当归 100 g  
杭白芍药 150 g 阿胶 200 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜300 g收膏即成。每次15~30 g,每日2次,开水调服。

### 【加减变化】

如有手足不温、小便清长者,加鹿角胶150 g,菟丝子150 g,附子60 g。

如手足心热、潮热盗汗者,加龟版胶150 g,枸杞子150 g,黄柏100 g,知母100 g,

如有夜尿频多者,加益智仁100 g,乌药100 g。

如有腰痛活动不利、日轻夜重者,加桃仁100 g,红花100 g,香附150 g。

## 二、自我调摄

(1)腰痛重在预防,故平时应该坚持进行以腰部活动为主的体育活动。

(2)注意保暖,不要坐卧冷湿之地,以免诱发加重腰痛。

(3)避免劳欲太过,以免耗伤肾精,使腰痛难愈。



## 慢性关节痛

慢性关节痛是指关节痛迁延数日、数年,甚至数十年的病症。临床上除了关节肿痛外,常可伴有不同程度的关节活动不利,甚至关节畸形、肌肉萎缩。引起慢性关节痛的疾病很多,如类风湿关节炎、痛风性关节炎、肥大性关节炎、感染性关节炎等。

慢性关节痛属于中医“痹证”的范畴,中医认为痹证是由于风

寒湿热等外邪侵袭人体,闭阻经络,气血运行不畅所导致。痹证日久容易出现两种病理变化:一是痹证日久不愈,气血运行不畅加重,使瘀血痰浊阻痹经络;二是痹证日久使气血耗伤,肝肾亏虚,故临床辨证可分痰瘀互阻型,表现为关节疼痛、肿大,甚至强直畸形,屈伸不利;肝肾亏虚型,表现为关节疼痛,时轻时重,日久难愈,形疲乏力,腰膝酸软,肌肉瘦削等。

## 一、方药选用

### 1. 痰瘀互阻型

#### 【方药】

桃仁 100 g 红花 100 g 当归 150 g 川芎 90 g 威灵仙 150 g 生地黄 150 g 地龙 100 g 虻虫 100 g 穿山甲 100 g 白芥子 90 g 胆星 60 g 乌梢蛇 150 g 僵蚕 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为疼痛较剧烈,且受寒后症状加重者,加全蝎 30 g,蜈蚣 30 g,炙细辛 60 g。

如为痛以上半身为主者,加羌活 90 g,姜黄 90 g,桂枝 60 g。

如为痛以下半身为主者,加独活 100 g,川牛膝 150 g,五加皮 150 g。

### 2. 肝肾亏虚型

#### 【方药】

熟地黄 200 g 杜仲 150 g 牛膝 150 g 桑寄生 200 g 狗脊 150 g 续断 150 g 骨碎补 100 g 党参 150 g 茯苓 150 g 当归 150 g 川芎 90 g 白芍药 200 g 独活 150 g 秦艽 150 g 制豨莶草 300 g 鸡血藤 300 g 龟版胶 150 g 鹿角胶 100 g

上药除龟版胶、鹿角胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并



滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鹿角胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为久病形瘦萎弱者,加黄精 150 g,怀山药 150 g,山茱萸 100 g。

如有头晕眼花耳鸣明显者,加枸杞子 150 g,菟丝子 150 g,石菖蒲 150 g。

## 二、自我调摄

(1)加强体育锻炼,避免居住在潮湿寒冷的环境,防止外邪侵袭人体而加重病情。

(2)加强营养,以增强体质,提高抗病能力。

(3)树立战胜疾病的信念,坚持药物治疗与体疗相结合。



## 五官科

### 口 疮

复发性口疮又名“口疳”，是指口腔黏膜上发生的黄白色如豆大的溃疡点，并且反复发作的病症。现代西医认为此病多因机体免疫紊乱，口腔自净功能减退，以致局部感染而引起黏膜炎症溃疡，相当于西医现代医学中的口炎。

复发性口疮按照中医辨证以虚为主，多因素体阴虚，加以久病后或劳伤过度，耗伤人体真阴，阴液不足，虚火旺盛，上炎口腔而发病。临床表现为口腔黏膜上有绿豆大小溃烂点，表面灰白，周围黏膜颜色淡红或不红，反复发作，此愈彼起，绵延不断，常伴有口干咽燥。

#### 一、方药选用

##### 【方药】

生地黄 300 g 熟地黄 150 g 麦门冬 350 g 白芍药 150 g  
贝母 100 g 牡丹皮 150 g 女贞子 200 g 旱莲草 150 g 生甘草  
30 g 山慈姑 100 g 鱼腥草 300 g 川牛膝 150 g 玄参 200 g

上药加水煎煮 3 次，滤汁去渣，合并滤液，加热浓缩为清膏，再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

##### 【加减变化】

如为牙龈红肿者，加生石膏 100 g，知母 100 g，升麻 90 g。

如为心烦难以入睡者，加黄连 30 g，丹参 150 g，连翘 100 g。

如为大便干结者，加生大黄 50 g，火麻仁 150 g，桃仁 150 g。

如为小便短赤者，加滑石 150 g，车前子 300 g。



## 二、自我调摄

- (1) 加强锻炼身体,增强体质,可以减少本病的反复发生。
- (2) 注意口腔卫生,三餐饭后勤漱口(食盐 5 g,薄荷 9 g,以开水冲泡后作为漱口液),减少感染的机会。
- (3) 避免辛辣、油腻、煎炸食品,可以有效预防本病。

## 口 臭

现代西医认为,口臭患者中有 80% 以上是因口腔内的原因,如口腔不洁、食物碎屑被口腔细菌分解而产生臭味;或龋洞内腐质发臭;或牙龈炎、牙周炎致牙周溢脓等。此外,严重的消化不良、胃病、肝病、糖尿病及大量吸烟、睡眠不足、精神紧张、疲劳等都可引起口臭。

口臭按中医辨证虽有虚实之分,但临床以实证多见,可分为胃热食积和邪热客肺两型。胃热食积型,多因平时喜欢吃辛辣油腻的食品,或暴饮暴食,损伤脾胃,使食物停积在脾胃,变为腐臊之气,薰发于口所致。临床上除口气秽浊腐臭外,常伴有胃脘胀满,不思饮食,大便干燥。邪热客肺型,口鼻为肺之门户,由于邪热客肺,肺失宣畅而化生的痰浊之气,随肺气上逆致口中秽臭。临床上除口臭外,常伴有咳嗽痰多、痰黄而多。此外,口腔不洁、食物残渣滞留在齿根或龋齿空洞中,日久则腐败酸臭。临床上除口臭外,常可发现口腔不清洁,或口腔内有感染病灶。本篇主要介绍胃热食积型和邪热客肺型的膏方选用。



### 一、膏方选用

#### 1. 胃热食积型

【方药】

黄连 30 g 石膏 150 g 升麻 100 g 秦皮 150 g 生地黄 150 g 佩兰 200 g 牡丹皮 150 g 川牛膝 100 g 生山楂 150 g 鸡内金 100 g 陈皮 60 g 枳实 100 g 槟榔 150 g 厚朴 60 g 白梅花 30 g 生甘草 30 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为大便数日一次,矢气很臭者,加生大黄 50 g,火麻仁 150 g。

如为口干喜冷饮者,加南沙参 150 g,芦根 150 g,天花粉 150 g。

## 2. 邪热客肺型

### 【方药】

地骨皮 300 g 桑白皮 300 g 黄芩 150 g 焦山栀 100 g 浙贝母 100 g 薏苡仁 300 g 牛蒡子 150 g 射干 150 g 山豆根 150 g 南沙参 150 g 麦门冬 150 g 生甘草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为身热口干明显者,加生石膏 300 g,知母 150 g。

如为咳嗽痰黄者,加知母 100 g,竹茹 100 g,栝楼皮 150 g。

## 二、自我调摄

(1)注意口腔卫生,不让食物残渣停留在口腔内,饭后勤漱口,并经常咀嚼口香糖,增加口腔内的清洁作用。

(2)因全身疾病或口腔疾病引起的口臭患者,应针对原发病治疗,因为原发病一旦治愈,口臭自然能够消除。

(3)口臭患者除了内服膏方外,还可以配合口腔清洗的方法,



内外治结合,可以明显提高除臭效果。

处方:紫荆皮 9 g,防风 6 g,薄荷 6 g,生石膏 12 g,食盐 9 g,生甘草 6 g。

用法:水煎漱口,每日一帖。

## 声音嘶哑

声音嘶哑是指声音不扬,甚至嘶哑失音的一种喉病。临床有急性和慢性之别。所谓急性声音嘶哑,西医认为多因喉部急性炎症所致;慢性声音嘶哑是指声音嘶哑久而未复的病症。现代西医认为慢性声音嘶哑多因声带小结或急性喉炎反复发作,或迁延不愈,或长期吸入粉尘、有害气体,或饮酒过度,或长期用嗓过度,或发声不出,或慢性咽炎、气管炎、鼻窦炎等炎症扩展到喉部,使喉部组织水肿充血,继而局部组织增生所致。本病中医称为“久喑”、“慢喉喑”,相当于西医的“慢性喉炎”、“声带小结”和“声带息肉”。本篇主要介绍慢性声音嘶哑的膏方选用。

慢性声音嘶哑按照中医辨证以虚为主,多因素体虚弱,加之劳累过度或久病而致肺肾阴虚、虚火上炎所致。临床除了声音嘶哑外,常伴有喉咙干燥、微有刺痛感,或局部有痒胀、异物感,入夜后喉咙不适,干燥感觉更加明显,并常伴有干咳或咳吐少量的黏液痰,患者多有习惯性的清嗓动作,表现为“吭喀”不已等。



### 一、膏方选用

#### 【方药】

百合 200 g 生地黄 150 g 熟地黄 200 g 麦门冬 200 g 玄参 150 g 当归 100 g 杭白芍 150 g 桂枝 50 g 贝母 100 g 木蝴蝶 100 g 蝉衣 90 g 胖大海 60 g 诃子 100 g 桔梗 100 g 金银花 150 g 生甘草 60 g 连翘 60 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如为气短懒言、容易感冒者,加生黄芪 150 g,炒白术 150 g,防风 60 g。

如为虚火较旺、口咽干燥明显者,加黄柏 60 g,知母 60 g,天门冬 150 g。

如为声带小结或声带息肉者,加夏枯草 200 g,海藻 150 g,生牡蛎 200 g,赤芍药 150 g,丹参 150 g。

如为咳吐痰涎较多者,加制半夏 100 g,僵蚕 150 g,茯苓 150 g,陈皮 60 g。

## 二、自我调摄

(1)声音嘶哑者,应该保护嗓音,注意休音,忌大声喊叫,以免加重病情。

(2)禁止烟酒的刺激,忌食辛辣、煎炙、燥热的食物,以免加重病情。

(3)及时治愈急性咽、喉、鼻炎,以免本病的发生。

## 牙齿松动

牙齿松动中医称之为“牙宣”。本病以牙齿松动、脱落、牙龈萎缩、牙根裸露、经常渗出少量血液为特征的病症。这是一种发生在牙齿支持组织的一种慢性、破坏性疾病。早期常常没有明显症状而被忽视,若不及时进行中西医药的治疗,日久牙齿失于支持、营养,必然会脱落。现代西医认为牙龈炎、牙周炎是引起本病的主要原因,因此本病与现代医学中的萎缩性牙周病极其相似。

牙齿松动按中医辨证可分虚实两大类:实证多因长期喜食肥





腻辛辣食物,或饮酒无度,使胃热壅盛,致牙龈出血,腐化成脓,日久则出现齿龈萎缩、牙根暴露、牙齿松动。临床表现为牙龈红肿、出脓、口臭、喜食冷饮、大便干结。虚证多因肾虚精亏,牙齿得不到精血濡养而致牙骨萎软,加之肾亏阴虚火旺,虚火上炎牙龈,久则牙齿动摇、根落。临床表现为牙龈溃烂萎缩,暗红肿,伴有头晕耳鸣、五心烦热等。

## 一、膏方选用

### 1. 胃火上炎型

#### 【方药】

黄连 30 g 升麻 100 g 石膏 200 g 知母 90 g 天花粉 150 g 生地黄 150 g 牡丹皮 150 g 赤芍药 100 g 当归 60 g 山栀 60 g 生甘草 50 g 川牛膝 100 g 牛蒡子 150 g 蒲公英 300 g 神曲 100 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为牙龈出血较多者,加马勃 60 g,旱莲草 200 g。

如为大便干燥难解者,加生大黄 50 g,火麻仁 150 g,枳实 100 g。

### 2. 肾阴亏损型

#### 【方药】

生地黄 150 g 熟地黄 200 g 茯苓 150 g 怀山药 200 g 泽泻 100 g 牡丹皮 100 g 山茱萸 150 g 女贞子 200 g 枸杞子 150 g 龟版胶 150 g 鳖甲胶 150 g 天门冬 150 g 川石斛 150 g 陈皮 50 g 神曲 100 g 川牛膝 100 g

上药除龟版胶、鳖甲胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶、鳖甲胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~



30 g, 每日 2 次, 开水调服。

### 【加减变化】

如为久病身体消瘦, 体虚乏力者, 加党参 150 g, 黄精 200 g, 何首乌 300 g。

如为久病形寒, 四肢怕冷者, 去鳖甲胶、生地黄, 加鹿角胶 100 g, 补骨脂 150 g。

## 二、自我调摄

(1) 积极治疗牙龈炎、牙周炎, 有效预防本病的发生。

(2) 饮食宜清淡而富有营养, 禁烟酒及辛辣油腻食物。

(3) 避免房劳多度, 以防伤肾而诱发本病。

(4) 坚持每天数次叩齿, 或用手指按摩牙槽, 改善局部的血液循环而可以有效防治本病。

## 过敏性鼻炎



过敏性鼻炎是一种发生于鼻黏膜的过敏性疾病, 临床以频繁打喷嚏, 大量流清水鼻涕, 鼻塞, 鼻、眼、咽痒等为主要表现。有的人一年四季发病, 称为常年性过敏性鼻炎; 有的人则有明显的季节性, 春天好发, 称为季节性过敏性鼻炎。现代西医认为本病与遗传性过敏体质关系很密切, 加上接触了引起本病发作的过敏源, 如花粉、灰尘、特殊的气味等, 导致鼻黏膜毛细血管扩张、通透性增加、水肿等, 从而产生一系列症状。

过敏性鼻炎属于中医学中“鼻塞”、“鼻窒”等范畴。中医认为本病是因感受外邪所致, 风寒、风热病邪侵犯肺卫, 肺失清肃, 影响鼻窍的通畅而致病。中医临床分别按照急性期和慢性期进行辨证论治, 本篇主要介绍慢性过敏性鼻炎的内服膏方。慢性期辨证可分肺虚邪滞型和气血瘀滞型两种。肺虚邪滞型, 多表现出间歇性

鼻塞,时轻时重,晨起鼻痒,喷嚏阵阵发作,鼻涕色白清稀,受寒后症状加重,常伴神疲乏力、食少便溏等;气血瘀滞型,多表现出持续性鼻塞,喷嚏较少,鼻涕黏稠,嗅觉减退和迟钝,常伴有头昏头痛、鼻黏膜呈暗红色、鼻甲肿大且表面不光滑。

## 一、膏方选用

### 1. 肺虚邪滞型

#### 【方药】

黄芪 200 g 白术 100 g 防风 10 g 党参 100 g 茯苓 150 g  
桔梗 30 g 苍耳子 100 g 辛夷花 100 g 蝉蜕 60 g 紫苏 100 g  
荆芥 100 g 怀山药 150 g 生甘草 30 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如鼻塞流涕较重者,加路路通 150 g,白芷 100 g,细辛 50 g。  
如反复感冒者,加紫河车粉 30 g,生晒参粉 50 g。

### 2. 气血瘀滞型

#### 【方药】

当归 100 g 川芎 100 g 赤芍药 150 g 细辛 60 g 白芷 150 g  
苍耳子 150 g 藿香 150 g 薄荷 100 g 红花 60 g 桃仁 100 g  
穿山甲 100 g 陈皮 60 g 桔梗 30 g 路路通 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为鼻涕黏稠、不易擤出者,加生地黄 100 g,南沙参 150 g,黄芩 100 g。



如有鼻塞头痛较重者,加地龙 100 g,僵蚕 150 g,白蒺藜 150 g。

## 二、自我调摄

(1)增强体质,提高自身的抗病能力,以减少感冒而引发或加重本病。

(2)保持室内清洁,避免扬灰,经常开窗,保持室内空气清新,可以避免因灰尘、气味的刺激而诱发本病。

(3)对于已经明确的过敏源,尽可能做到避免接触,以防止发病。

## 老年性耳鸣耳聋

耳鸣是指病人自觉耳内鸣响,如闻蝉声,或如潮声。耳聋是指不同程度的听觉减退,甚至消失。耳鸣可伴有耳聋,耳聋亦可由耳鸣发展而来。耳鸣、耳聋包含在很多西医疾病之中,五官科有外耳病变、鼓膜病变、中耳病变,内科有急性传染病、中枢性病变、药物中毒、贫血、高血压等。

耳鸣、耳聋在临床上的症状虽有所不同,但在病因病机上却有许多相似之处,中医认为均与肾有密切关系。按照中医辨证有虚实之分,一般暴聋者多实,渐起者多虚。实证多因风热、肝火、痰瘀所致。虚证多因气血不足、肾精亏虚所致。肝胆火盛型,多表现为突然耳鸣、耳聋,头痛面赤,口苦咽干,心烦易怒,大便秘结,舌红苔黄。痰火郁结型,多表现为两耳蝉鸣,有时闭塞如聋,胸闷多痰,苔薄黄而腻。中气不足型,多表现为耳鸣,或如蝉噪,或如钟鼓,或如水激,久则耳聋,面色黄白,倦怠无力,神疲纳少,舌淡苔薄。肾精亏损者,多表现为耳鸣耳聋,兼有头晕目眩,腰酸遗精,舌质偏红。



## 一、膏方选用

### 1. 肝胆火盛型

#### 【方药】

柴胡 100 g 黄芩 150 g 木通 100 g 车前子 150 g 泽泻 150 g 山栀 150 g 川连 50 g 大黄 150 g 龙胆草 50 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如心烦寐不安者,加龙齿 300 g,酸枣仁 300 g。

如急躁易怒者,加川牛膝 150 g,郁金 100 g。

### 2. 痰火郁结型

#### 【方药】

半夏 150 g 陈皮 100 g 生姜 15 g 黄芩 150 g 黄连 50 g 柴胡 100 g 枳壳 150 g 竹茹 150 g 石菖蒲 150 g

上药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。



#### 【加减变化】

如大便不爽者,加大黄 60 g,槟榔 100 g。

如胸闷不畅者,加栝楼皮 300 g,桔梗 50 g,旋复花 150 g。

### 3. 中气不足型

#### 【方药】

黄芪 200 g 人参 50 g 党参 150 g 茯苓 150 g 白术 150 g 陈皮 30 g 升麻 50 g 柴胡 50 g 葛根 150 g 蔓荆子 150 g 枳壳 300 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水

调服。

### 【加减变化】

如有头昏,腰膝酸软者,加熟地黄 200 g,菟丝子 200 g。

如有心慌,乏力者,加五味子 100 g,柏子仁 150 g。

## 4. 肾精亏损型

### 【方药】

柴胡 150 g 磁石 300 g 熟地黄 200 g 生地黄 200 g 山茱萸 150 g 茯苓 150 g 泽泻 150 g 牡丹皮 150 g 胡桃肉 150 g 龟版胶 100 g 鳖甲胶 100 g

上药除龟版胶、鳖甲胶胡桃肉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,胡桃肉研碎后,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有腰膝酸软,舌干红者,加女贞子 150 g,旱莲草 150 g。

如有气短乏力者,加人参 100 g,黄芪 200 g。

## 二、自我调摄

(1) 避免急躁,保持心情愉快,坚持用药,就能获得良好效果。

(2) 避免劳倦,节制房事,对预防本病有重要意义。

## 老年性视力减退

老年性视力减退是指 50 岁以上的老年人,视力逐渐减退的病症。早期多表现为眼前模糊不清,视物变形或复视、多视;后期,视力明显减退,甚至失明。现代临床上的老年性白内障、老年性黄斑变性、老年性视网膜病变等都可引起老年性视力减退。

老年性视力减退按照中医辨证大多属虚证,多因年老体弱、肝



肾不足、气血亏虚,以致精血不能上荣于目所致。肝肾不足型,视力减退,眼目干涩,且多伴有头晕耳鸣、腰酸腿软,精神不振等。气血亏虚型,视力减退,目光无神,且多伴有神疲乏力、面色萎黄、心悸失眠、胃纳不佳等。

## 一、膏方选用

### 1. 肝肾不足型

#### 【方药】

熟地黄 300 g 怀山药 150 g 山茱萸 150 g 枸杞子 150 g  
当归 100 g 茯苓 200 g 菟丝子 150 g 潼白蒺藜(各)150 g 黑芝麻 100 g 天麻 100 g 白芍药 150 g 楮实子 100 g 五味子 60 g 川芎 60 g 龟版胶 250 g

上药除龟版胶、黑芝麻外,其余药物加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将龟版胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,黑芝麻粉碎后,冲入清膏和匀,最后加蜂蜜 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为晶状体混浊较重,或黄斑萎缩者,加海藻 150 g,昆布 150 g,丹参 150 g。

如为腰酸腿软明显者,加杜仲 100 g,牛膝 150 g。

如为眼底出血者,加三七粉 30 g,仙鹤草 150 g,旱莲草 300 g。

### 2. 气血亏虚型

#### 【方药】

人参 50 g 黄芪 100 g 党参 150 g 白术 100 g 白芍药 150 g 茯苓 150 g 柴胡 60 g 升麻 30 g 当归 100 g 炙甘草 60 g 枸杞子 150 g 菟丝子 150 g 潼白蒺藜(各)150 g 石斛 150 g 阿胶 150 g

上药除阿胶外,余药加水煎煮3次,滤汁去渣,合并滤液,加热



浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烱,冲入清膏和匀,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

### 【加减变化】

如有黄斑渗血者,加蒲黄 100 g,茜草 100 g,仙鹤草 200 g。

如有黄斑萎缩,或晶体混浊者,加海藻 150 g,昆布 150 g,丹参 150 g。

如有大便溏薄者,加薏苡仁 200 g,扁豆 150 g,怀山药 150 g。

## 二、自我调摄

- (1) 重视用眼卫生,适当加强体育锻炼和饮食调治。
- (2) 劳逸结合,避免过度紧张和劳累,以及不必要的精神负担。
- (3) 对于白内障患者,经检查其晶状体全部混浊者,应采取手术治疗。



## 眼底出血

眼底出血一般是指视网膜和(或)玻璃体出血。西医认为糖尿病性视网膜病变、视网膜静脉周围炎、视网膜中央静脉阻塞等容易引起眼底发生微血管瘤、渗出、水肿、出血等;外伤、手术后也可能引起眼底出血。根据临床资料分析,糖尿病患者较容易发生眼底出血的情况。

眼底出血属于中医学“视瞻昏渺”、“暴盲”的范畴,多因气阴两亏,阴虚燥热,阴不制阳虚火上冲;或肝肾精亏,阴虚内热,迫血妄行;或眼络瘀阻,血不循经等。按照中医辨证有虚实之分,以虚为主,虚实夹杂。虚证包括气阴两亏型和肝肾阴虚型,气阴两亏型,表现为视力明显下降,两目干涩,劳则加重,倦怠乏力,口燥咽干;肝肾阴虚型,表现为两目昏花,视物变形或盲无所见,咽干口燥,腰



膝酸软。气滞瘀血型多为实证,表现为视力下降,甚至丧失,眼球胀痛或刺痛,胸胁胀满,面色晦滞。

## 一、膏方选用

### 1. 气阴两亏型

#### 【方药】

黄芪 300 g 生地黄 300 g 牡丹皮 150 g 黄精 150 g 怀山药 300 g 三七粉 30 g 茯苓 150 g 苍术 150 g 白术 150 g 阿胶 200 g

上药除三七粉、阿胶外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶加适量黄酒浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,再调入三七粉,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为舌边有齿痕,气虚明显者,加太子参 300 g。如视力明显下降,两目干涩,加枸杞子 150 g。

### 2. 肝肾阴虚型

#### 【方药】

生地黄 300 g 牡丹皮 150 g 玄参 150 g 山茱萸 150 g 麦门冬 150 g 三七粉 30 g 女贞子 150 g 旱莲草 200 g 菟丝子 150 g 阿胶 100 g 龟版胶 150 g

上药除阿胶、龟版胶、三七粉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再将阿胶、龟版胶加适量清水浸泡后隔水炖烊,冲入清膏和匀,再调入三七粉,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

#### 【加减变化】

如为眼内新出血者,加炒蒲黄 150 g,茜草 150 g,白茅根 200 g。



如为出血久不见收者,加赤芍药 150 g,川芎 150 g,丹参 200 g。

如为陈旧性出血伴机化者,加海藻 200 g,昆布 200 g。

### 3. 气滞血瘀型

#### 【方药】

生地黄 150 g 赤芍药 150 g 当归 100 g 川芎 60 g 红花 60 g 桃仁 100 g 柴胡 100 g 川牛膝 100 g 蒲黄 100 g 三七粉 30 g 茜草 100 g 桔梗 30 g 甘草 50 g

上药除三七粉外,余药加水煎煮 3 次,滤汁去渣,合并滤液,加热浓缩为清膏,再调入三七粉,最后加饴糖 300 g 收膏即成。每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。可连服数料,直到见效为止。

#### 【加减变化】

如为胸胁胀痛,口苦者,加柴胡 100 g,黄芩 100 g,郁金 150 g。

如为陈旧性出血伴机化者,加海藻 200 g,昆布 200 g。

## 二、自我调摄


(1) 保持精神愉快,避免情绪波动,防止过度劳累。

(2) 本病常见于糖尿病患者,所以,控制血糖与控制饮食十分重要。



下篇

市售膏方产品介绍





## 补气血阴阳类膏方

### 雷氏十全大补膏

【药物组成】 人参、白术、茯苓、甘草、当归、川芎、白芍药、熟地黄、黄芪、肉桂。

【功效说明】 温补气血。方中人参、白术、茯苓、甘草益气；当归、川芎、白芍药、熟地黄补血；黄芪、肉桂温煦气血，配合同用使本方具有温补气血的特点。

【应用指南】 主要用于气虚血少，面色苍白，疲乏无力，并伴有明显的手足发冷的患者。临床上凡虚癆、亚健康、贫血、妇女月经不调、外科手术后、胃下垂、各科肿瘤手术以及放、化疗以后，包括肿瘤放化疗期间具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 十全大补膏能增强免疫功能；不仅具有抗癌活性，并能增强化疗药物的抗癌作用，同时能明显降低放化疗引起的不良反应。

【用法用量】 每次 15~30 g，每日 2 次，早晚空腹时服，开水调服。

【使用注意】 凡阴虚火旺体质，如平时常有口干、便秘、潮热、盗汗等症的患者应忌服本膏方。



### 雷氏十八味人参补膏

【药物组成】 人参、党参、太子参、黄芪、茯苓、生地黄、熟地黄、阿胶、当归、枸杞子、黄精、玉竹何、首乌、女贞子、麦芽、谷芽、陈

皮、五味子。

**【功效说明】** 补气养血,益肝滋肾。方中人参、党参、太子参、黄芪、茯苓、生地黄、阿胶、当归健脾以补气血;熟地黄、枸杞子、黄精、首乌、女贞子、五味子补肝肾以益精血,配合同用使本方具有气血双补,肝肾同滋,心脾共健的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血虚弱,肝肾阴亏所致的面色萎黄,头晕眼花,气短乏力,失眠健忘,食欲不振,腰酸腿软等症的患者。临床上凡体质虚弱,早老症,贫血,大病、久病后等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 十八味人参补气膏能提高人体的免疫功能,增强特异性免疫和非特异性免疫;保护和改善骨髓造血功能,包括对药物,如环磷酰胺或放射线照射引起的血液系统毒性,使血细胞数量增加,血小板、血色素、血红蛋白增高;具有清除自由基,抗衰老的作用;调节中枢神经功能,提高机体的适应性及抗骨质疏松等作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

**【使用注意】** 感冒发热时暂停服用;脾虚湿重,大便溏薄者不宜服用。

## 八珍膏

**【药物组成】** 当归、川芎、白芍药、熟地黄、人参、白术、茯苓、炙甘草、生姜、大枣。

**【功效说明】** 补益气血。方中人参、白术、茯苓、炙甘草益气健脾;当归、川芎、白芍药、熟地补血调血,配伍同用使本方具有气血双补的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血两亏,面色苍白或萎黄,头晕眼



花,四肢倦怠,气短懒言,心悸怔忡,食欲不振等症的患者。临床上凡白细胞减少症、慢性胃炎、习惯性流产、席汉综合征、功能性子宫出血、月经不调、脱发等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 八珍膏可提高机体免疫力;显著促进网织红细胞成熟,增加血红蛋白;调节子宫功能;改善肝脏解毒功能;改善机体的功能状况。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

**【使用注意】** 实热病证,如见小便短赤、大便干结者忌服。

## 党参膏

**【药物组成】** 党参、砂糖。

**【功效说明】** 补中益气。方中独用党参补脾益肺,气血双补,不腻不燥为本方的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血两亏,气短乏力,面色萎黄,食欲不振,大便溏薄等症的患者。临床上凡病后体弱、滥用减肥药后,肠胃功能紊乱、消化道溃疡、贫血等具备上述症状者都可选用。



**【现代研究】** 党参膏能调节胃肠道运动,抑制胃液分泌、胃酸排出和胃蛋白酶活性,抗消化性溃疡;能增强免疫;可促进造血系统功能,增加红细胞数量和血红蛋白含量。此外,还有抗心肌缺血的作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,空腹用开水化服。

**【使用注意】** 感冒时暂停服用;消化不良、脘腹胀满者不宜服用。

## 代参膏

【药物组成】 党参、白术、黄芪、桂圆肉、砂糖。


【功效说明】 补中益气，健脾养胃。方中党参、白术、桂圆肉补中益气养血；黄芪益气升阳固表，配合同用使本方具有气血双补的特点。

【应用指南】 主要用于气血两亏，脾胃虚弱所致的食欲不振，汗多气短，心悸健忘等症的患者。临床上凡病后体虚、慢性肠胃道疾病、自汗盗汗等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 代参膏能增强机体免疫系统的功能，提高机体抗应激反应的能力；促进机体造血功能，增加红细胞和血红蛋白含量；调整胃肠道运动，抗消化性溃疡、保肝作用。此外，还能促进学习记忆，保护缺血心肌和改善其能量代谢。

【用法用量】 每次 15～30 g，每日 2 次，早晚空腹用开水冲服。

【使用注意】 感冒时暂停服用。



## 阿胶补血膏

【药物组成】 阿胶、熟地黄、党参、黄芪、枸杞子、白术。

【功效说明】 滋阴补血，补中益气，健脾润肺。方中党参、黄芪、白术补中益气，补肺固表；阿胶、熟地黄、枸杞子滋阴补血，配合同用使本方具有气血双补的特点。

【应用指南】 主要用于气血不足，肺脾虚弱，久病体弱所致的心悸健忘，面色萎黄，头昏目眩；或虚劳咳嗽，短气乏力，多汗自汗；或食欲不振，脘腹虚胀等症的患者。临床上凡贫血、低血压、肺结核、慢性肝炎、月经失调、闭经、功能性子宫出血、产后虚损等具备



上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 阿胶补血膏中阿胶能增加血液的红细胞数和血红蛋白量,并通过改善钙的平衡,使血清钙略增而起止血作用;熟地黄能补血,并改善肾脏功能;党参有补血作用,能增加家兔的红细胞和血红蛋白,并能促进新陈代谢,帮助消化,促进乳糜吸收;黄芪有类性激素和兴奋中枢神经系统作用,能增强机体免疫力,强心、利尿,对实验性肾炎有一定对抗作用;枸杞子具有轻微的抑制脂肪在肝细胞内沉积和促进肝细胞新生的作用;白术能健胃、利尿、镇静、保护肝脏和防止肝糖原减少。全方具有抗贫血、增强免疫等作用。

**【用法用量】** 每次 15 g,每日 2 次,早晚空腹用开水冲服。

**【使用注意】** 伤风感冒、消化不良、大便溏薄者都不宜服用。

### 参龙养血膏

**【药物组成】** 生晒人参、枸杞子、黄芪、麦门冬、党参、石斛、白术、菟丝子、黄精、锁阳、仙鹤草、淫羊藿、龙眼肉、桑枝、熟地黄、地耳草、首乌、山楂、丹参、茯苓、白芍药、陈皮油。



**【功效说明】** 益气温阳,滋阴养血。方中生晒人参、黄芪、麦门冬、党参、白芍药、茯苓、仙鹤草、龙眼肉健脾益气补血;黄精、熟地黄、何首乌、枸杞子、菟丝子补肾滋阴填精;淫羊藿、锁阳助阳壮肾,温而不热,配合同用使本方具有气血双补,阴阳平调,补而不腻的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血不足,阴阳两亏所致的神疲乏力,头晕眼花,腰膝酸软等症的患者。临床上凡体弱早衰、妇女月经不调、贫血、再生障碍性贫血、脑动脉硬化、产后、手术后、肿瘤放化疗后、早老症、以及多种慢性病具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 参龙养血膏能提高心、肝、肾血流量,改善肝、

心、肾的功能,消蛋白尿;降压、降血脂;提高免疫功能,增强机体抗病能力;增加血红蛋白和血小板数,改善贫血症状,消除疲劳;促进钙的吸收。

【用法用量】 每次 15 g,每日 2 次,早晚空腹用开水冲服。

【使用注意】 感冒发热时、暂停服用。

## 两仪膏

【药物组成】 人参、熟地黄、冰糖(或白蜜)。

【功效说明】 补中益气,滋阴补血。方中人参补心脾、益元气;熟地黄补肝肾、生精血,配合同用使本方具有补益中气与养阴填精同用的特点。

【应用指南】 主要用于精气亏损,身体羸瘦,神疲乏力,面色萎黄,健忘,耳鸣,短气。临床上凡贫血、或病后、产后具备上述症状者常可选用。此外,本方还常用作冬令进补。

【现代研究】 两仪膏可增加红细胞及血红蛋白;可升高血糖而具有抗低血糖作用。此外人参含有的皂苷、生物碱、蛋白质、维生素 B、菊糖等,熟地黄含有的地黄素、甘露醇、维生素 A 类物质,对于维持人体正常活动和调节机体生理功能方面来讲是十分重要的,这可能就是本方“补气补血”的物质基础。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 1~2 次,空腹用开水化服。

【使用注意】 若消化功能减退,伴有纳少、腹胀、便溏、舌苔厚腻者,忌服本方;感冒时暂停服用。

## 参鹿补膏

【药物组成】 红参、鹿肉、淫羊藿、狗脊、白术、鸡血藤、女贞子、玉竹、党参、熟地黄、续断、锁阳、墨旱莲、仙鹤草。



【功效说明】 益气养血，补肾壮阳。方中红参、党参、熟地黄等益气养血；鹿肉、淫羊藿、狗脊等补肾壮阳；墨旱莲、女贞子等滋肾益精，配合同用具有气血、阴阳兼顾的特点。

【应用指南】 主要用于肾阳亏虚，气血不足所致的畏寒肢冷，精神疲乏，头目眩晕，腰膝酸软等症。临床上凡贫血症、心功能衰弱、血压偏低、性功能障碍、肥大性脊椎炎、中老年体弱早衰、或妇女月经不调等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 参鹿补膏中的人参、党参均具有强心、利尿、降压、增强机体免疫功能及增强机体抗病能力的作用。鹿肉具有性激素样作用及强壮作用；有显著的强心作用；有升压作用；并能提高机体的工作能力，改善睡眠，食欲以及降低肌肉的疲劳。

【用法用量】 每次 15～30 克，每日 2 次，开水调服。

【使用注意】 阴虚火旺者不宜服用；凡感冒发热或伤食停滞，腹胀满者需暂停服用。

### 龟鹿二仙膏



【药物组成】 鹿角、龟版、人参、枸杞子。

【功效说明】 滋阴补血，养精助阳。方中龟版、鹿角滋阴补阳；人参、枸杞子益气养血，配合同用使本方具有阴阳、气血并补的特点。

【应用指南】 主要用于虚劳肾亏，阴阳两虚，遗精阳痿，腰脊酸痛，神疲无力，目视昏花等症的患者。临床上凡贫血、性功能障碍症、女子不孕症、男子不育症、糖尿病、神经衰弱、自发性气胸、老年性痴呆等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 龟鹿二仙膏中龟版有升血小板和白细胞的作用；鹿角有促进生长发育的作用，并能促进血液循环；人参具有抗缺氧、抗疲劳和抗神经衰弱作用，具有增强机体特异性和非特异性

免疫的功能,促进蛋白质合成和脂质的代谢;枸杞子含有多种氨基酸及钙、磷、铁等微量元素,能补充人体生长发育所必需的营养物质,并具有降血糖、降血脂等作用。全方具有促进人体生长发育、抗缺氧,抗疲劳以及增强机体的免疫功能。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

**【使用注意】** 感冒期间暂停服用;凡有口干咽燥、骨蒸潮热、舌红脉数等症属阴虚阳亢者,不宜服用本方。


## 葆春膏

**【药物组成】** 生晒人参、生黄芪、生地黄、熟地黄、鸡血藤、全当归、桑椹子、女贞子、淫羊藿、续断、南沙参、北沙参、灵芝、丹参、五味子、远志、石菖蒲、珍珠粉、生牡蛎、淡菜、虎杖、枇杷叶、陈皮、麦芽、谷芽。

**【功效说明】** 补气养血,协调阴阳,健脑宁神。方中生晒人参、生黄芪、生地黄、熟地黄、鸡血藤、全当归、桑椹子补气养血;灵芝、丹参、五味子、远志、石菖蒲、珍珠粉、生牡蛎益脑宁神;女贞子、淫羊藿、续断、南沙参、北沙参、淡菜助阳益阴,配合同用使本方既能养气血,宁心神,又能补肝肾,益脑髓,且具有寒温并用、阴阳协调的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血两亏,肝肾阴阳失调所致的头昏目眩、失眠心悸、盗汗、腰膝酸软等症的患者。临床上凡亚健康、神经衰弱、神经官能症、用脑过度、更年期综合征、早老症等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 葆春膏能增强机体免疫功能;促进消化吸收,促进物质代谢,促进蛋白质合成,具有延缓衰老的重要作用;能改善脂质代谢和对糖代谢;显著促进机体造血功能,增加外周血液中红



细胞、白细胞、血红蛋白的含量,改善贫血状态;改善血液流变学,使红细胞解聚,抗血小板聚集和血栓形成,降低血黏度;保护心肌,增强心肌收缩力,改善心肌缺血;抗心律失常。此外,还有镇静和抗惊厥的作用。

**【用法用量】** 每次 15 g,每日 2 次,早晚空腹用开水冲服。

**【使用注意】** 感冒发热时暂停服用。

## 六味地黄膏

**【药物组成】** 熟地黄、山茱萸、牡丹皮、怀山药、茯苓、泽泻。

**【功效说明】** 滋阴补肾。方用熟地黄、山萸肉、怀山药补肝、脾、肾阴精之不足,着重滋补肾阴,以治其本;泽泻、牡丹皮、茯苓泻虚火、泄湿浊之有余,配合同用使本方具有补中有泻,以补为主的特点。

**【应用指南】** 主要用于肾阴亏损所致的头晕目眩,耳鸣耳聋,遗精梦泄,牙齿动摇,腰膝酸软,足跟作痛,小儿囟门不合,骨蒸潮热,手足心热,颧红升火,盗汗,口燥咽干等症的患者。临床上凡高血压、糖尿病、慢性肾炎、肾结核血尿、慢性咽喉炎、喉痹、中心性视网膜脉络膜炎、视神经炎、白内障、黄斑变性、视神经病变、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、复发性口疮、甲状腺功能亢进、干燥综合征、妇女更年期综合征、无排卵性功能性子官出血、慢性尿路感染、神经衰弱、慢性前列腺炎、小儿发育不良、食道上皮细胞重度增生、鹅掌风、遗尿、颈椎病、突发性耳聋、艾迪生病等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 六味地黄膏具有增强人体功能,调整和提高人体代谢的功能;增强细胞免疫和单核细胞吞噬活性的能力;促进肾上腺皮质激素分泌,促进肾脏对尿素的排泄;对实验性肾性高血压有明显的降压作用,并有改善肾功能、降低死亡率的作用;能降低



化学致癌物所致肿瘤发生率,增强淋巴细胞对癌细胞的杀伤力。此外,还具有降血脂,降血糖和抗衰老等作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

**【使用注意】** 脾虚食少,或大便溏薄者,或胃脘胀满者都不宜服用。此外,服药期间忌食辛辣食物;感冒期间暂停服用。

## 右归膏

**【药物组成】** 熟地黄、怀山药、山茱萸、枸杞子、杜仲、菟丝子、鹿角胶、当归、肉桂、附子。

**【功效说明】** 温肾阳,补精血。方中熟地黄、怀山药、山茱萸、附子等温阳益火培肾;菟丝子、鹿角胶、枸杞子等养肝补肾益精,配合同用使本方具有阴中求阳的特点。

**【应用指南】** 主要用于命门火衰,精血不足,畏寒肢冷,神疲气怯,便溏腹痛,肢节痹痛,水肿尿频,阳痿遗精等症的患者。临床上凡男子性功能障碍症、不育症、前列腺肥大症、更年期综合征、月经过多症、慢性支气管炎、肺气肿、肺源性心脏病、高血压、贫血症、艾迪生病、遗传性小脑共济失调、重症肌无力、进行性肌营养不良症、骨质疏松症、肾下垂、坐骨神经痛、希恩病等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 右归膏能增强机体免疫,提高细胞免疫和促进体液免疫;能调节性激素,使男子肾阳虚雄激素(睾酮)含量低者升高,使女子肾阳虚雌激素(雌二醇)低者升高。此外,还有抗衰老和调节脏腑功能的作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

**【使用注意】** 阴虚火旺,潮热烦躁者忌服;感冒期间暂停服



用;服药期间忌食辛辣食物。

### 滋润琼玉膏

【药物组成】 生地黄、茯苓、党参、蜂蜜。

【功效说明】 养阴润肺,补气益脾。方中生地黄养阴生津;党参、茯苓补脾益肺,配合同用使本方具有补脾培肺、益气养阴同功的特点。

【应用指南】 主要用于气阴两亏,肺虚干咳,咽燥咯血,乏力气短等症的患者。临床上凡肺结核、肺气肿、慢性咳嗽、肺癌等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 滋润琼玉膏能增强机体免疫功能,有抗菌、消炎的作用。此外,还能补充机体所需营养物质。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 2 次,空腹用开水化服。

【使用注意】 感冒时暂停服用。

### 桑椹子膏



【药物组成】 桑椹子、砂糖。

【功效说明】 养血润燥。方中独用桑椹子滋养阴血,补益肝肾,润燥通便。使本方具有凉补不腻、补泻兼备的特点。

【应用指南】 主要用于阴血不足,肝肾两亏所致的头昏眼花,须发早白,腰膝酸软,肠枯便秘等症的患者。临床上凡中青年头发花白、老年人习惯性便秘等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 桑椹子膏有强壮、利尿、镇咳,以及增强机体特异性免疫和非特异性免疫的功能。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 2 次,空腹用开水化服。

【使用注意】 感冒时暂停服用。

## 补脏腑类膏方

### 雷氏洞天长春膏

**【药物组成】** 党参、黄芪、白术、茯苓、山药、熟地黄、当归、白芍药、川芎、何首乌、狗脊、女贞子、复盆子、怀牛膝、陈皮、杜仲、南沙参、百合、泽泻、甘草。


**【功效说明】** 填精养血，健脾补气，补益肝肾，养肺生津。本方由十全大补膏加味而成，方中党参、黄芪、白术、茯苓、熟地黄、当归、白芍药、川芎、甘草补益气血；熟地黄、何首乌益精生髓；杜仲、狗脊、牛膝补益肝肾；沙参、百合润肺养阴，配合同用使本方具有既益肺脾、补气血，又滋肝肾、填精髓的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血不足，精髓空虚，肝肾两亏所致的头昏眼花、疲乏无力、腰膝萎软、四肢倦怠、纳谷不香等症的患者。临床上凡大病、久病后，产后体虚，肿瘤放、化疗后以及中老年虚劳等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 洞天长春膏有明显改善和促进红细胞再生的作用；明显促进机体的免疫功能；促进放疗对机体损伤的恢复；有一定的抗衰老的作用。此外，方中黄芪还能强心、扩张血管；何首乌能降低血脂和降血黏度，有类似肾上腺皮质激素的作用；狗脊、杜仲有增强肾上腺皮质功能的作用及免疫促进作用；女贞子能升高白细胞，增强体液免疫功能；沙参有强心、祛痰、抗真菌的作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g，每日 1~2 次，开水冲服。

**【使用注意】** 感冒发热、食积胀满、脾虚泄泻时暂停服用。





## 健身长春膏

【药物组成】 红参、黄芪、茯苓、白术、白芍药、甘草、熟地黄、当归、川芎、枸杞子、何首乌、女贞子、桑椹子、陈皮、半夏。

【功效说明】 补气血，益肝肾。方中红参、黄芪、茯苓、白术、白芍药、当归、甘草益气补血；熟地黄、枸杞子、何首乌、女贞子、桑椹子补肝肾，益精血，配合同用使本方具有既益肝肾，又补气血的特点。

【应用指南】 主要用于气血不足，肝肾阴虚所致的神疲乏力、头晕眼花、耳鸣心悸、失眠、记忆力减退等症的患者。临床上凡体力及脑力疲劳过度、性功能低下、病后体衰、先天不足、后天失养、更年期综合征、早老症等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 健身长春膏具有抗疲劳，抗缺氧，抗衰老，提高机体免疫功能，调动和促进性功能等作用。

【用法用量】 每次 15 g，每日 2 次，早晚空腹用开水冲服。

【使用注意】 感冒发热时暂停服用。



## 虫草参芪膏

【药物组成】 冬虫夏草、黄芪、党参。

【功效说明】 补肺益肾。方中冬虫夏草温肾补肺，助阳益精；黄芪、党参补肺益气，培土生金，配合同用使本方具有补益肺肾，温阳益气的特点。

【应用指南】 主要用于肺肾不足，咳喘气短，久嗽咳血，畏寒自汗，或阳痿遗精等症的患者。临床上凡慢性支气管炎，支气管哮喘，肺气肿，肺心病，阳痿，病后体虚等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 虫草参芪膏能增强机体特异性免疫和非特异性

免疫功能,对体液免疫和细胞免疫都有显著的作用;具有明显的抗脂质过氧化、抗氧自由基作用,能延缓衰老;对肾脏具有保护作用,特别对受损伤的肾脏作用尤其显著。

【用法用量】 口服,每次 10~15 g,每日 2 次,温开水冲服。

【使用注意】 感冒期间暂停服用;咳喘痰黄脓者忌服。

## 归脾膏

【药物组成】 人参、白术、黄芪、茯神、龙眼肉、酸枣仁、木香、甘草。

【功效说明】 益气补血,健脾养心。方中人参、白术、黄芪、甘草补中益气健脾;茯神、龙眼肉、酸枣仁养血补心安神,配合同用使本方具有补心脾、益气血、养心神的特点。

【应用指南】 主要用于心脾两虚,气血不足,心悸怔忡,健忘失眠,多梦易惊,食少体倦,面色萎黄,妇女月经超前、量多色淡或淋漓不止等症的患者。临床上凡神经衰弱、失眠、头晕、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、白细胞减少症、胃、十二指肠溃疡、脑震荡后遗症、头痛、脱发、特发性水肿、心脏病、月经不调、功能性子宫出血、崩漏等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 归脾膏有提高红细胞和血红蛋白的作用;改善中枢神经,促进智力和镇静催眠;提高免疫功能。此外,对家兔烫伤休克期的血压、呼吸、血糖,均有一定的改善作用。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

【使用注意】 消化不良、食积腹胀、痰湿壅盛、瘀血积带者不宜服用;感冒期间暂停服用。



## 复脉膏

【药物组成】 炙甘草、人参、生地黄、桂枝、阿胶、麦门冬、麻仁、生姜、大枣。

【功效说明】 益气养血，滋阴复脉。方用炙甘草、人参、大枣益气以补心脾；生地黄、阿胶补血以养心；桂枝通阳以复脉，配合同用使本方具有益气血、调阴阳、复心脉的特点。

【应用指南】 主要用于气虚血弱，心悸气短，虚烦失眠，大便干结等症的患者。临床上凡病毒性心肌炎、风湿性心脏病、肺源性心脏病、冠心病、心律失常、神经衰弱、消化性溃疡、萎缩性胃炎、口疮、贫血、脑震荡后遗症、关节痹痛等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 复脉膏能抗心律失常，明显降低药物诱导的室颤和心动过速的发生率；抗心肌缺血，缩小心肌梗死的范围；抗缺氧，提高小白鼠减压耐缺氧试验的存活率。

【用法用量】 每次 15 g，每日 2~3 次，开水化服。



## 黄芪膏

【药物组成】 黄芪、炼蜜。

【功效说明】 补中益气，调荣养卫。方中用黄芪补益肺脾，固表止汗，托疮生肌，利水消肿。具有扶正祛邪的特点。

【应用指南】 主要用于气虚无力，体倦肢怠，或痈疽难溃，或久溃不敛，或易感冒，易汗出等症的患者。临床上体质虚弱、反复感冒、体虚多汗、外科疮疡溃久不愈、手术后创口久不收口等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 黄芪膏具有强心，扩张冠状血管，明显增强耐缺氧作用，对心肌缺血与心律失常有一定的保护作用，对心功能不全

有预防作用;能扩张外周血管,改善微循环,降低血压;保肝;增强机体免疫功能。

**【用法用量】** 每次 15~30 克,每日 2 次,开水调服。


**【使用注意】** 疮疡红肿成脓者忌服;感冒时暂停服用。

## 参苓白术膏

**【药物组成】** 莲子肉、薏苡仁、砂仁、桔梗、扁豆、茯苓、人参、甘草、白术、怀山药。

**【功效说明】** 益气健脾,和胃渗湿。方中人参、白术、甘草、茯苓、扁豆、山药健脾益气;薏苡仁、砂仁渗湿化湿,配合同用使本方具有平补和缓、不腻不燥、不寒不热的特点。

**【应用指南】** 主要用于脾胃虚弱,湿邪阻滞所致的面色萎黄,四肢无力,饮食不化,或吐或泻,胸脘痞塞等症的患者。临床上凡慢性肾炎、慢性肠炎、浅表性胃炎、胃肠功能紊乱、消化不良、糖尿病、肝硬化、肺源性心脏病、慢性支气管炎、妇女带下、水肿、乳糜尿、恶性肿瘤放、化疗产生的毒副反应等具备上述症状者都可选用。



**【现代研究】** 参苓白术膏小剂量对肠管蠕动有兴奋作用,大剂量有抑制作用,可解除肠管痉挛,并能增加肠管对水和氯离子的吸收;改善代谢,降低尿素、肌肝和尿酸;提高机体的免疫功能。此外,方中白术、山药还有保护肝脏,防止肝糖原减少的作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水化服。

**【使用注意】** 感冒发热者不宜服用,阴虚火旺者也不宜服用。

## 补中益气膏

**【药物组成】** 黄芪、炙甘草、人参、当归、陈皮、升麻、柴胡、

白术。

【功效说明】 益气升阳,调补脾胃。方中黄芪、人参、白术、炙甘草补中益气健脾;黄芪、柴胡、升麻益气升阳举陷,配伍同用使本方具有补益升提的特点。

【应用指南】 主要用于脾胃气虚,中气下陷,内脏下垂,阴挺脱肛,少气懒言,体倦肢软,饮食无味,大便溏薄,或发热自汗等症的患者。临床上凡胃下垂、胃黏膜脱垂、肾下垂、子宫下垂、重症肌无力、久泻、功能性发热、崩漏、带下、慢性肝炎、腹股沟疝、肠套叠、肠炎、乳糜尿、小儿神经性尿频、尿失禁、癃闭、肾绞痛、白细胞减少症、失眠、耳鸣、低血压、结肠功能紊乱、慢性肾盂肾炎、视神经萎缩、梅尼埃病等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 补中益气膏具有增强机体网状内皮系统吞噬,促进机体非特异免疫和提高机体细胞免疫的功能;调节胃肠运动,当小肠蠕动亢进时起抑制作用,张力下降时则有兴奋作用;抗胃溃疡,抗胃黏膜损伤;促进蛋白合成,防止贫血发展;增强体力;强心;升血压等。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

【使用注意】 阴虚发热,潮热出汗者不宜服用;内热壅盛,小便短赤,大便干结者忌服。



### 黄芪建中膏

【药物组成】 黄芪、桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣、饴糖。

【功效说明】 温中补气,缓急止痛。方中桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣、饴糖温中补虚,和里缓急;黄芪益气补中,固表止汗,配合同用使本方具有益气补虚与温中缓急并用的特点。

【应用指南】 主要用于中气虚寒所致的虚劳腹痛,喜温喜按,


自汗或盗汗,短气体倦的患者。临床上凡慢性胃炎,胃、十二指肠球部溃疡,慢性肝炎,慢性肠炎等症见虚劳腹痛、喜温喜按者;或慢性支气管炎,血小板减少性紫癜,再生障碍性贫血,产后发热,贝赫切特综合征(白塞综合征),更年期综合征等症见自汗或盗汗、短气体倦者都可选用。

**【现代研究】** 黄芪建中膏能抑制胃酸分泌和抑制胃蛋白酶的活性,具有抗溃疡、解痉止痛等作用。故临床对胃与十二指肠球部溃疡、慢性胃炎等疾病有明显治疗效果。此外,本方具有提高细胞免疫功能作用;能调节中枢神经系统而具有镇静等作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 胃痛拒按者不宜服用。

## 人参滋补膏



**【药物组成】** 人参、白术、熟地黄、生地黄、鸡血藤、仙鹤草、续断、桑寄生、狗脊、菟丝子、女贞子、墨旱莲、首乌藤、合欢皮。

**【功效说明】** 补气血,益肝肾,强筋骨。方中人参、白术、熟地黄、生地黄、鸡血藤、仙鹤草补益气血;续断、桑寄生、狗脊补益肝肾,强健筋骨;熟地黄、女贞子、墨旱莲、菟丝子、女贞子养阴血、补肝肾;首乌藤、合欢皮养心安神,配合同用使本方具有养阴精、益气血、补肝肾、强筋骨的特点。

**【应用指南】** 主要用于气血两亏,肝肾阴虚所致的精神疲倦、腰膝酸软、失眠健忘、头目眩晕、四肢无力、气短懒言等症的患者。临床上凡中老年人体质虚衰、更年期综合征、贫血等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 人参滋补膏中人参、白术均能增强免疫功能;调节神经系统,使已紊乱的胃肠功能恢复正常;促进骨髓造血功能,加速红细胞生成。熟地黄能补血,改善肾脏功能。枸杞子能抗脂

肪肝,并促进肝细胞新生。首乌能降低血脂和降血黏度,并有类似肾上腺皮质激素的作用。

**【用法用量】** 每次 15 g,每日 2 次,早晚空腹用开水冲服。

**【使用注意】** 感冒发热时暂停服用;消化不良、大便溏薄者不宜服用。



## 安神类膏方

### 益肾安神膏

【药物组成】 人参、珍珠粉、南沙参、北沙参、丹参、黄芪、五味子(制)、桑椹、女贞子(制)、当归、淫羊藿、香附(制)、灵芝、甘松、鸡血藤、淡菜、九节菖蒲、远志(制)、牡蛎、续断、虎杖、枇杷叶、陈皮、地黄、麦芽、稻芽。

【功效说明】 补益气血,益肾安神。方中人参、黄芪、当归、鸡血藤、地黄、丹参、五味子、九节菖蒲、远志(制)、牡蛎、珍珠粉等益气血,宁心神;女贞子、淫羊藿、灵芝、淡菜、续断等补肾健脑,配合同用使本方具有气血双补,心脑同治的特点。

【应用指南】 主要用于气血亏虚,心脑失养所致的头昏目眩,失眠心悸,腰膝酸软等症的患者。临床上凡神经衰弱、神经官能症、冠心病、心律失常、贫血、产后等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 益肾安神膏能提高机体的工作能力,降低肌肉的疲劳;能镇静、催眠、抗惊厥,改善睡眠和食欲;明显增加冠脉血流量,改善心肌缺血和心功能。此外还具有降血压、降胆固醇、降血糖和保肝等作用。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 2 次,空腹用开水化服。

【使用注意】 感冒发热、腹泻腹痛时不宜服用。

### 人参养荣膏

【药物组成】 白芍药、当归、陈皮、黄芪、桂心、人参、白术、甘





草、熟地黄、五味子、茯苓、远志、生姜、大枣。

**【功效说明】** 益气补血,养血安神。方由八珍膏加减而成,方中人参、黄芪、茯苓、白术、甘草、当归、白芍药、熟地黄、陈皮补益气血,健脾益肺;五味子、远志养心安神,配合同用使全方于脾、肺、心三脏并补,气、血、神三者均养;既有益气生血之功,又有宁心安神之力的特点。

**【应用指南】** 主要用于脾肺气虚,营血不足,心神不安所致的倦怠无力,食少气短,心悸怔忡,失眠健忘,毛发脱落,或疮疡溃后久不收敛。临床上凡贫血、再生障碍性贫血、慢性骨髓炎、外科疮疡、低血压病、脱发、慢性肝炎、小儿多动症、厌食症、智力偏低等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 人参养荣膏可增强机体特异性和非特异性免疫功能;能明显增加冠心病患者的左室收缩力,增加心输出量,有一定强心作用;降血压;提高机体应激能力;促进造血功能作用和抗贫血作用;有抗溃疡和抗胃黏膜损伤作用;具有增强学习的记忆作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 1~2 次,开水冲服。

**【使用注意】** 感冒发热和食积腹痛时暂停服用。



## 杞圆膏

**【药物组成】** 枸杞子、龙眼肉。

**【功效说明】** 滋阴补肾,养血安神。方中枸杞子补肾益精,养肝明目;龙眼肉益脾补气,滋阴养血,配合同用使本方同补脾肾,并养阴血,具有平补不膩的特点。

**【应用指南】** 主要用于脾肾虚衰,阴血不足所致的失眠健忘,心悸怔忡,头晕眼花,面色萎黄,气短乏力等症的患者。临床上凡贫血、神经衰弱、肺结核、肺气肿、心脏病、亚健康状态者、久病后等

具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 杞圆膏具有强壮作用,方中枸杞子还有保肝、兴奋大脑神经、降血糖、促进造血、增强免疫等作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,早晚空腹用开水化服。

**【使用注意】** 消化不良、食欲不振者不宜服用。



## 乌发类膏方

### 乌发膏

【药物组成】 制何首乌、茯苓、当归、枸杞子、菟丝子、牛膝、补骨脂、黑芝麻、蜂蜜。

【功效说明】 补血养阴，乌发壮骨。方中何首乌为主药，养血益肝，固精益肾，健筋骨，乌须美发；枸杞子、菟丝子补肾益精、养肝补血；补骨脂补肾壮阳；当归补血养肝；牛膝滋补肝肾、强壮筋骨；茯苓健脾化湿，配合同用，以滋阴、养血、益精为主，兼顾补阳，使本方具有阴阳并补、精血互生的特点。本方虽名曰乌发，实则为补益抗衰之妙剂。

【应用指南】 主要用于肝肾不足，须发早白，脱发，齿牙松动，腰膝酸软，以及肾虚精少不育等症的患者。临床上凡体虚衰弱、未老先衰、中青年须发早白、脱发、男子不育、遗精、再生障碍性贫血等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 乌发膏能提高应激抗病能力，促进血红蛋白合成以抗贫血。方中何首乌能阻止胆固醇在肝内沉积，减轻动脉粥样硬化。此外，还有抗凝、耐缺氧、抗氧化、强壮等作用。

【用法用量】 每次 15～30 g，每日 2 次，早晚空腹用开水化服。

【使用注意】 大便溏薄及有痰湿者不宜服用；服药期间忌食猪血、羊血等食品。



## 清热类膏方

### 夏枯草膏

【药物组成】 夏枯草、蜂蜜。

【功效说明】 清火，明目，散结，消肿。方用夏枯草泄肝火，散郁结，善消肝火痰凝之结块。

【应用指南】 主要用于肝火目赤肿痛，头痛眩晕；肝郁痰凝的瘰癧，瘰癧，痰核等症的患者。临床上凡高血压、单纯性甲状腺肿大、甲状腺腺瘤、淋巴结结核、淋巴腺炎、乳腺增生症、乳腺癌等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 夏枯草膏有降压、抗菌、抗炎、抗肿瘤等作用。

【用法用量】 每次 15～30 g，每日 2 次，开水化服。

【使用注意】 脾胃虚寒、大便溏薄、食欲不振者不宜服用。久服对胃有刺激性，宜饭后服用。

### 小败毒膏

【药物组成】 大黄、金银花、蒲公英。

【功效说明】 清热解毒，消肿止痛。方中大黄、金银花、蒲公英均为苦寒清热，解毒消肿之品，配合同用使本方具有较强的解毒消痈之功。

【应用指南】 主要用于疮疖痈肿，妇女乳痈，丹毒流注，热毒红肿等症的患者。临床上凡外科皮肤感染引起的急性脓肿、急性乳腺炎、急性淋巴结炎、急性蜂窝织炎等具备上述症状者都可



选用。

**【现代研究】** 小败毒膏具有较强的抗菌作用,其中金银花对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、大肠杆菌、铜绿假单胞菌、肺炎双球菌等有抗菌作用,对真菌、病毒亦有抑制作用,还能抑制炎性渗出及炎性增生,并能促进白细胞的吞噬作用,此外,还有退热作用;蒲公英对金黄色葡萄球菌等及皮肤多种真菌有抑制作用;大黄对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、铜绿假单胞菌有抑制作用,也能抑制真菌、病毒,还能降低毛细血管的脆性,有止血作用。

**【用法用量】** 每次 10~20 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 体质虚弱、脾胃虚寒,大便溏薄者不宜服用。



## 止咳化痰类膏方

### 宁嗽膏

【药物组成】 麻黄、紫菀、百部、甘草、杏仁。

【功效说明】 祛痰止咳。方中紫菀、百部、甘草化痰止咳；麻黄、杏仁止咳平喘，配合同用使本方具有化痰止咳平喘的特点。

【应用指南】 主要用于痰多咳嗽，胸闷气急症的患者。临床上凡感冒咳嗽、急慢性气管炎、支气管扩张、肺炎等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 宁嗽膏有镇咳祛痰、抗菌抑菌、解热等作用。

【用法用量】 每次 15 g，每日 3 次，开水化服。



### 枇杷叶膏

【药物组成】 枇杷叶、砂糖。

【功效说明】 清肺降气，止咳化痰。方中独用枇杷叶清降肺气而止咳是为本方的特点。

【应用指南】 主要用于肺热所致的咳嗽痰少，或痰中带血，久咳音哑等症的患者。临床上凡急慢性气管炎，哮喘等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 枇杷叶膏有平喘镇咳祛痰作用。此外还能抗菌和抑制血糖的升高。

【用法用量】 每次 15 g，每日 3 次，开水冲服。

【使用注意】 感冒初起痰多者不宜服用。

## 蛇胆川贝枇杷膏

【药物组成】 蛇胆汁、川贝母、枇杷叶、半夏、桔梗等。

【功效说明】 清肺止咳，祛痰定喘。方中蛇胆汁、川贝母、枇杷叶、半夏、桔梗化痰止咳；蛇胆汁、枇杷叶清肺降气，配合同用使本方具有清肺化痰、止咳平喘的特点。

【应用指南】 主要用于肺热痰阻，肺气不降的咳嗽痰多而黏、咯痰不爽，气喘胸闷等症。临床上凡感冒、上呼吸道感染、支气管炎、肺炎、肺气肿等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 蛇胆川贝枇杷膏具有镇咳祛痰、解痉平喘作用，其中川贝母对气管平滑肌有明显的松弛作用，与阿托品比较无显著差异；蛇胆能扩张支气管、解除支气管痉挛，而具有平喘作用；枇杷叶有轻度祛痰作用，镇咳作用较强。

【用法用量】 每次 15~30 g，每日 1~2 次，开水化服。

【使用注意】 孕妇慎用，痰液清稀者慎用。



## 蜜炼川贝枇杷膏

【药物组成】 川贝母、枇杷叶、沙参、桔梗、陈皮、半夏、北五味、款冬花、杏仁、薄荷脑。

【功效说明】 清热理气化痰，润肺止咳平喘。方中川贝母、款冬花、沙参清热润肺，化痰止咳；桔梗、陈皮、半夏、北五味宣肺化痰止咳；枇杷叶、杏仁降肺止咳平喘；薄荷脑疏散风热，配合同用使本方具有清润宣降的特点。

【应用指南】 主要用于风热或肺热或引起的咳嗽痰多，痰黄黏稠，胸闷气急等症，或肺燥咳嗽，干咳痰少、不易咳出的患者。临床上凡伤风感冒、急慢性支气管炎、咳嗽、肺炎等具备上述症状者

都可选用。

【现代研究】 蜜炼川贝枇杷膏有镇咳、祛痰、平喘、抗菌、消炎等作用。

【用法用量】 每次 15~30 g, 每日 3 次, 开水化服。

【使用注意】 肺寒咳嗽、痰白清稀者不宜应用。

## 养阴清肺膏

【药物组成】 生地黄、麦门冬、玄参、川贝母、白芍药、牡丹皮、薄荷、甘草。

【功效说明】 养阴润燥, 清肺利咽。方中生地黄、麦门冬、玄参养阴润肺; 川贝母润肺化痰; 白芍药敛阴和血; 牡丹皮、薄荷清热利咽, 气香清凉, 配合同用使本方具有清润肺燥、利咽止咳的特点。

【应用指南】 主要用于阴虚肺燥, 咽喉干痛, 干咳少痰, 或痰中带血等症的患者。临床上凡慢性咳嗽、支气管扩张咯血、慢性咽喉炎、扁桃腺炎、声带小结、口腔溃疡等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 养阴清肺膏有抗菌, 解毒, 抗炎, 镇静, 祛痰, 止咳, 解热等作用。

【用法用量】 每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水化服。

【使用注意】 咳嗽痰黄、浓稠者不宜服用。

## 止咳定喘膏

【药物组成】 白萝卜、梨、生姜、麻黄、饴糖、白糖、蜂蜜。

【功效说明】 润肺化痰、止咳定喘。方中萝卜润肺化痰、祛风涤热; 梨润肺止咳, 利咽生津; 生姜发汗解表、温肺止咳; 麻黄宣肺解表、止咳平喘, 配合同用使本方具有宣降并用的特点。

【应用指南】 主要用于外感风寒, 痰热内蕴所致的咳嗽哮喘,





痰多气急,咽喉干燥等症的患者。临床上凡慢性支气管炎、支气管哮喘、支气管肺炎、大叶性肺炎、感冒等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 止嗽定喘膏中麻黄能解除气管、支气管的痉挛,使支气管舒张,而达到平喘的作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 3 次,开水化服。

**【使用注意】** 高血压患者慎用。

### 固本咳喘膏

**【药物组成】** 土壅大白蚁巢、黄芪、五味子、淫羊藿、矮地茶、苦杏仁。

**【功效说明】** 补肺温肾,止咳祛痰。方中土壅大白蚁巢、淫羊藿、五味子、黄芪益肺肾,定咳喘;矮地茶、苦杏仁化痰湿,止咳喘,配合同用使本方具有肺肾同补,痰喘共治的特点。

**【应用指南】** 主要用于肺肾两亏,咳嗽咯痰,气短喘促等症的患者。临床上凡慢性支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺心病等具备上述症状者都可选用。



**【现代研究】** 固本咳喘膏有增强免疫、抗炎、镇咳、平喘的作用;有增强体力、促进生长等作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水化服。

### 虫草川贝止咳膏

**【药物组成】** 冬虫夏草、蛤蚧、川贝、人参、款冬花、桔梗、苦杏仁、砂仁、陈皮、紫苑、甘草、木香、百合、百部、茯苓、前胡、半夏。

**【功效说明】** 温肾益肺,止咳化痰,定喘。方中冬虫夏草、蛤蚧、人参温补肺肾;川贝、款冬花、紫苑、百合、百部润肺止咳;桔梗、

杏仁、前胡、半夏、陈皮、甘草化痰止咳定喘，配合同用使本方具有扶正益肺肾，祛邪平痰喘的特点。

**【应用指南】** 主要用于肺肾两亏，咳嗽痰多，气短气急，或久咳气喘，动则益甚等症的患者。临床上凡慢性气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺心病等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 虫草川贝止咳膏有镇咳、祛痰、平喘、抗炎、耐疲劳、耐寒、耐缺氧等作用。

**【用法用量】** 每次 15 g，每日 2 次，开水化服。

**【使用注意】** 咳喘痰黄黏稠者不宜服用。

## 参贝北瓜膏

**【药物组成】** 党参、浙贝母、鲜北瓜、南沙参、鲜生姜等。

**【功效说明】** 养阴清肺，补中益气，生津止咳，平喘化痰。方中党参补脾益肺，补气生津；浙贝母、鲜北瓜、南沙参养阴清肺，化痰止咳，配合同用使本方具有平补气阴、清润肺燥、止咳化痰的特点。

**【应用指南】** 主要用于肺虚，气阴两亏所致的哮喘气短、干咳少痰，津少口渴，或咳痰不爽等症的患者。临床上凡哮喘、慢性支气管炎等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 参贝北瓜膏能调节免疫平衡，以增强免疫系统作用为主；镇咳，祛痰；能明显舒张支气管平滑肌，又有促进唾液分泌的作用。

**【用法用量】** 每次 15 g，每日 3 次，开水冲服。

**【使用注意】** 感冒初起者、痰黄黏稠者都不宜服用。



## 贝母梨膏

【药物组成】 川贝母、梨膏。

【功效说明】 润肺止咳，化痰。方中川贝母清肺润燥，止咳化痰；梨膏润肺生津，配合同用使本方具有清润的特点。

【应用指南】 主要用于肺燥津亏所致的咳嗽、咯痰不爽、口干咽燥、咽喉干痛等症的患者。临床上凡慢性支气管炎、肺结核、慢性咽喉炎等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 贝母梨膏具有镇咳祛痰、抗菌抑菌的作用。其中川贝母有较强的镇咳祛痰作用；对多种细菌，如炭疽杆菌、甲型及乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、类白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、柠檬色葡萄球菌、白色葡萄球菌及枯草杆菌等均有不同程度的抑菌作用。

【用法用量】 每次 15～30 g，每日 2～3 次，开水冲服。

【使用注意】 脾胃虚寒、大便溏薄者不宜服用；感冒咳嗽、痰白清稀者也不宜服用；服药期间忌辛辣食物。



## 二冬膏

【药物组成】 天门冬、麦门冬、天花粉、黄芩、知母、荷叶、人参、甘草。

【功效说明】 养阴清热，生津止渴，润肺止咳。方中天门冬、麦门冬、天花粉、人参润肺养阴，益气生津；黄芩、知母、甘草清肺除热，配合同用使本方具有扶正与祛邪兼顾的特点。

【应用指南】 主要用于肺胃阴虚燥热，干咳无痰或咯痰不爽，咽喉干燥，口渴多饮的患者。临床上凡糖尿病、百日咳、肺结核、慢性咽喉炎等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 二冬膏具有镇咳祛痰作用,对炭疽杆菌、甲型及乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、类白喉杆菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌及枯草杆菌均有不同程度的抑菌作用。此外,方中的麦门冬还具有能显著提高动物耐缺氧能力;促进心肌损伤的愈合;扩张冠状动脉,增加心肌营养性血流量的作用以及降血糖作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 大便溏薄或感冒时忌服。

## 雪梨膏

**【药物组成】** 生梨、砂糖。

**【功效说明】** 清热润肺,止咳化痰。方中独用生梨,药性甘凉、清润止咳为本方的特点。

**【应用指南】** 主要用于肺燥咳嗽,干咳痰少,或咽喉干痛,口渴津少等症的患者。临床上凡燥咳、百日咳、咽炎、以及热病发热等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 雪梨膏能增加呼吸道分泌量,有祛痰作用。并有一定的抑菌作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 3 次,开水化服。

**【使用注意】** 大便稀薄或咳嗽痰白清稀者不宜服用。



## 利咽类膏方

### 橄榄膏

【药物组成】 鲜橄榄、砂糖。

【功效说明】 清咽止渴。方中橄榄清利咽喉,生津止渴,使本方具有清润利咽的特点。

【应用指南】 主要用于喉火上炎所致的咽喉肿痛,口燥舌干等症的患者。临床上凡急慢性咽炎、扁桃腺炎等具备上述症状者都可选用。此外,饮酒过度也可用此醒酒。

【现代研究】 橄榄膏能提高唾液腺功能,增加唾液分泌和增加唾液内免疫球蛋白的含量。此外,能保护口腔黏膜,防止病原体的入侵,并有抗炎作用。

【用法用量】 每次 15 g,每日 3 次,开水化服。

【使用注意】 痰壅咽喉不利者不宜服用。



## 消食类膏方

### 山楂膏

【药物组成】 山楂、白糖。

【功效说明】 健胃消食、活血理气。方中山楂有很好的助脾健胃、促进消化的功效，尤能消油腻肉积；并且还有较好的活血散瘀的作用。

【应用指南】 主要用于消化不良，尤其是吃油腻肉食后脘腹胀满、嗳气频作，或腹痛腹泻者；以及产后瘀血腹痛、恶露不尽等症的患者。临床上凡消化不良、痢疾、肥胖、妇女痛经、产后腹痛等具备上述症状者都可选用。此外，高血压病，高脂血症，冠心病等也可选用。

【现代研究】 山楂膏能扩张冠状动脉，增加冠脉血流量，抗心肌缺血，抗心律失常；有持久的降压作用；能降低胆固醇；收缩子宫；增加胃中消化酶，促进消化。

【用法用量】 每次 15~30 g，每日 3 次，开水化服。

【使用注意】 胃酸过多，或患有消化道溃疡者不宜服用；孕妇不宜服用。



## 祛风湿类膏方

### 桑枝膏

【药物组成】 桑枝、砂糖。

【功效说明】 祛风湿，舒筋络。方中桑枝祛风湿，利关节，通筋络。药性平和、寒热均治为本方的特点。

【应用指南】 主要用于风湿入络，骨节疼痛，筋骨牵强，四肢麻木。临床上凡关节痛，无论症属风寒湿痹，还是风湿热痹，具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 桑枝膏有镇静、利尿、降压作用。

【用法用量】 每次 15 g，每日 3 次，开水化服。



## 固涩类膏方

### 金锁固精膏

【药物组成】 沙苑、蒺藜、芡实、莲须、龙骨、牡蛎。

【功效说明】 固肾涩精。方中芡实、沙苑子补肾涩精；龙骨、牡蛎、莲须固涩止遗，配合同用使本方既能补肾精不足，又能涩精液之外泄。补涩同用，标本兼顾，为其配伍特点。

【应用指南】 主要用于遗精，滑泄，腰酸耳鸣，神疲乏力，四肢酸软等。临床上凡男子不育症、遗精、滑精、妇女带下、慢性前列腺炎、乳溢症、乳糜尿、重症肌无力等具备上述症状者都可选用。

【现代研究】 金锁固精膏中龙骨、牡蛎含有大量钙盐，吸收后具有促进血液凝固，降低血管壁通透性的作用；沙苑、蒺藜补肾固精，有收缩子宫和抗利尿作用；莲须有软化血管，防止动脉粥样硬化的作用。

【用法用量】 每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

【使用注意】 下焦湿热，或相火偏旺引起的遗精，症见口苦，口腻，小便短赤，或潮热盗汗，五心烦热者不宜服用本膏方。

### 金樱子膏

【药物组成】 金樱子。

【功效说明】 固肾涩精，缩尿止遗。方中独用金樱子酸涩收敛，固精缩尿，止泻止带为本方之特点。

【应用指南】 主要用于肾关不固的梦遗滑精，遗尿尿频；脾肾





两虚的带下清稀,以及脾虚泄泻便溏等症。临床上凡神经衰弱、遗精、小儿遗尿、慢性肾炎、轻度子宫脱垂、慢性肠炎等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 金樱子膏含鞣质,具有收敛作用,能使肠液分泌减少而达止泻目的;能促进胃液分泌,有助于消化;降血脂,尤其降胆固醇;有较强地抗菌、抗病毒作用,对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌有很强的抑菌作用,对铜绿假单胞菌、变形杆菌、伤寒杆菌、福氏痢疾杆菌有一定程度的抑菌作用;对流感病毒有很强的抑制作用。

**【用法用量】** 每次 15 g,每日 2 次,开水冲服。

**【使用注意】** 湿热引起的上述遗泄者,症见口苦,小便黄赤,舌苔黄腻者不宜服用本方;感冒期间暂停服用。

## 四神膏

**【药物组成】** 肉豆蔻、补骨脂、五味子、吴茱萸。

**【功效说明】** 温补脾肾,涩肠止泻。方中肉豆蔻、补骨脂温补脾肾,涩肠止泻;五味子、吴茱萸温中止泻;配合同用使本方具有温补收敛的特点。



**【应用指南】** 主要用于脾肾虚寒所致的五更泄泻或久泻,食不消化,腹部冷痛,腰酸肢冷,神疲乏力等症的患者。临床上凡五更泄泻、慢性肠炎、慢性结肠炎、过敏性结肠炎、溃疡性结肠炎、肠结核等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 四神膏能调节肠道平滑肌活动,明显抑制肠道的自发活动,并能解除肠痉挛;增强消化功能,促进食欲。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 3 次,开水化服。

**【使用注意】** 实热泄泻、大便臭秽、肛门灼热者不宜服用。

## 调经类膏方

### 益母草膏

【药物组成】 益母草。

【功效说明】 活血调经，祛瘀生新。方用单味益母草以奏祛瘀生新，调经止痛之效。具有药单而功强的特点。

【应用指南】 主要用于瘀血阻滞引起的月经不调、经行不畅，痛经、血块紫黯，闭经，产后恶露不净，小腹疼痛；以及水瘀互阻引起水肿等症的患者。临床上凡经闭、经前或经行小腹胀痛、难产、产后腹痛、产后恶露不净等、急性肾炎、慢性肾炎、泌尿系结石、慢性前列腺炎、中心性视网膜炎、原发性高血压、冠心病、缺血性中风、肝硬化腹水、急性血栓性深静脉炎等具备上述症状者都可选用。



【现代研究】 益母草膏能兴奋子宫；扩张外周血管，改善微循环；显著增加冠脉血流量，减慢心率，抗心肌梗死，保护心肌超微结构；能抑制血小板聚集，抗血凝，抗体外血栓形成。此外，对皮肤真菌有抑制作用。

【用法用量】 每次 15~30 g，每日 2 次，开水化服。

【使用注意】 孕妇忌服。

### 复方鸡血藤膏

【药物组成】 鸡血藤、续断、川牛膝、黑大豆和红花。

【功效说明】 养血补肾，活血调经。方中鸡血藤补血活血调

经;续断、牛膝补肾固腰强筋;红花活血化瘀止痛;黑大豆滋肝益脾养血,配伍同用使本方在补血、活血、调经之中具有补而不滞、活而不破的特点。

**【应用指南】** 主要用于肝血不足、血行不畅所致的月经不调,量少色淡无块,或有瘀块;面色萎黄,头晕耳鸣,心悸心慌,睡眠不宁;关节痹痛日久,腰酸腿痛,筋骨不得屈伸,动之则痛剧,面色苍白等症的患者。临床上凡月经不调、贫血、风湿性关节炎、类风湿关节炎等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 复方鸡血藤膏对甲醛性关节炎有显著的抗炎、镇痛作用;增强造血功能,升高白细胞、红细胞和血红蛋白;增强子宫收缩,对已孕子宫更为明显。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水化服。

**【使用注意】** 脾虚腹泻者不宜服用。

### 肝郁调经膏



**【药物组成】** 白芍药、郁金、当归、葛根、香附、丹参。

**【功效说明】** 疏肝解郁,调和气血。方中当归、丹参、白芍药和血调经;郁金、香附疏肝解郁,配合同用使本方具有气血同调,疏养兼治的特点。

**【应用指南】** 主要用于肝郁气滞,经脉不畅所致月经失调,痛经,乳房胀痛,不孕等症的患者。临床上凡月经不调、闭经、痛经、子宫内膜异位、妇女乳房小叶增生等具备上述症状者都可选用。

**【现代研究】** 肝郁调经膏中当归具有镇痛、扩张血管、降血脂、抗贫血、抑制子宫收缩,松弛子宫平滑肌、抗炎抗菌、提高机体免疫力、显著促进网织红细胞成熟、而具有抗贫血作用。香附也可抑制子宫平滑肌,还具有雌激素样作用和解热镇痛作用。郁金和丹参都具有改善循环、镇痛和抑制炎症的作用。全方能抑制子宫

收缩,而具有镇痛作用;抗贫血;以及改善血液循环。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 孕妇慎服。



## 名医名药,雷氏有方

### 扶正益肺膏

【主要组成】 人参、黄芪、党参、白术、茯苓、荆芥、防风、川芎、蛤蚧、白芍药、桂枝、炙细辛、五味子、南五加、紫河车、红景天、灵芝、阿胶等。

【功效主治】 益肺固表,扶正祛邪。肺虚不固,容易受邪,反复感冒,咳嗽难愈,痰白清稀;或体虚多汗,动则更甚,恶风畏寒,疲乏气短等症。也可用于预防非典型肺炎。

【药理作用】 扶正益肺膏能双向调节机体的免疫功能,药物通过改变细胞内环核苷酸的数量和比例起到双向调节作用。对于免疫功能低下的个体,可以显著增强机体免疫功能,促进干扰素的生成。动物实验证明,本品能显著增强巨噬细胞的吞噬功能,对咳嗽有明显的抑制作用,对气管平滑肌收缩有抑制作用。增强肾上腺皮质功能,提高机体抗应激功能。此外,还有抗菌、抗炎作用。

【用法用量】 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

【使用注意】 咳嗽痰黏稠者不宜服用,感冒高热时暂停服用。



### 消斑悦容膏

【主要组成】 熟地黄、生地黄、何首乌、菟丝子、黄精、当归、鸡血藤、丹参、香附、郁金、桃仁、川芎、泽泻、牡丹皮、黑料豆、女贞子、枸杞子、墨旱莲、灵芝、杏仁、蜂蜜、龟版胶等。

【功效主治】 养肝补肾,活血消斑。用于颜面黄斑褐黑,日晒

后加剧,肤质干枯,色泽不华,头晕眼花,精神不振,倦怠无力,腰酸腿软等症。

**【药理作用】** 消斑悦容膏具有提高机体免疫功能;抗衰老、抗氧化、抗过敏、抗炎、降血脂;调节内分泌,促进肾上腺皮质激素的合成;具有雌激素样作用;对皮肤具有营养作用,增加皮肤弹性。促进皮肤吸水能力,软化角质蛋白,吸收紫外线作用,延缓皮肤衰老。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 大便溏薄者慎用。

### 减肥降脂通便膏

**【主要组成】** 生黄芪、灵芝、白术、汉防己、泽泻、生首乌、猪苓、茯苓、陈皮、山楂、丹参、三七、银杏叶、荷叶、焦山栀、决明子、山绿茶、神曲、鳖甲胶等。

**【功效主治】** 降脂减肥,活血通脉,利湿通便。用于肥胖,伴有高血脂者。症见形肥,精神不振,面色不润,肢体倦怠,懒于活动,大便不畅,小便混浊。

**【药理作用】** 减肥降脂通便膏可抑制胆固醇合成酶活力,显著降低胆固醇、三酰甘油等,减少其在血管壁中沉积;促进消化;调节胃肠道平滑肌的功能,使胃收缩强度明显加强,加快排空。此外,还有利尿作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 大便稀薄、形寒肢冷者不宜服用。

### 养颜壮健膏

**【主要组成】** 人参、黄芪、当归、川芎、白芍药、熟地黄、茯苓、



白术、半夏、陈皮、砂仁、山药、肉苁蓉、菟丝子、枸杞子、莲子、芡实、大枣、鸡内金、鹿角胶、龟版胶、蜂蜜等。

**【功效主治】** 补脾肾,壮形体,益气血,调阴阳。用于体虚失养,脾肾亏虚,气血不足,阴阳失调,形体消瘦,面色萎黄,头晕眼花,不思饮食,大便溏薄,四肢无力,精神倦怠等症。

**【药理作用】** 养颜肥健膏可增强非特异性免疫和特异性免疫功能,提高机体抗病能力;保护各种原因引起的造血功能障碍,改善骨髓造血功能,显著增加清蛋白、白球蛋白比、血红蛋白、红细胞和血小板;调节胃肠功能,促进消化液分泌和肠道吸收功能;兴奋子宫,此外,还有强心、抗肿瘤、抗突变、和清除体内活性氧自由基等作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 感冒发热期间暂停服用。

### 养心安神膏



**【主要组成】** 人参 黄芪、党参、白术、茯苓、熟地黄、生地黄、当归、川芎、珍珠粉、丹参、酸枣仁、龙眼肉、炙远志、五味子、红景天、南五加、麦门冬、莲子、炙甘草、大枣、阿胶、龟版胶等。

**【功效主治】** 养心安神,滋补强身。用于顽固性神经衰弱,失眠心烦,多梦易惊,健忘梦遗,头昏耳鸣,心悸怔忡,面色萎黄,食欲不振,少气无力,大便干燥等。

**【药理作用】** 养心安神膏具有一定中枢性镇静催眠作用,能提高入睡率,缩短入睡时间,延长睡眠时间,抗惊厥作用。可以减少实验动物的自发活动,表现出安静、嗜睡。其镇静效应与常用的镇静催眠药相当。显著对抗实验动物的惊厥反应,如咖啡因引起的过度兴奋。此外,还有促进机体免疫功能,调节机体内分泌,改善机体代谢等作用。

【用法用量】 每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

【使用注意】 胸闷腹胀、食欲不振、舌苔厚腻者不宜服用。

## 补肾强身膏

【主要组成】 鹿角胶、海龟胶、人参、黄芪、茯苓、白术、冬虫夏草、黄精、熟地黄、山茱萸、山药、杜仲、桑寄生、菟丝子、枸杞子、五味子、何首乌、石斛、补骨脂、淫羊藿、海龙、丹参、川芎、当归、木香、陈皮等。

【功效主治】 补肾填精, 温阳益气。用于未老先衰, 形瘦羸弱, 须发花白, 头晕目眩, 耳鸣耳聋, 腰膝酸软, 精神萎靡, 性欲减退, 男子不育, 阳痿遗精, 女子宫寒不孕以及带下清稀等症。

【药理作用】 补肾强身膏具有增强人体功能, 促进蛋白质和核酸合成, 改善机体免疫状态; 增强机体抗氧化, 抗衰老、耐寒冷, 抗疲劳, 强心, 抗心肌缺血等作用; 调节内分泌, 有性激素样作用, 促进精液分泌。对实验动物睾丸间质细胞损伤有明显的修复作用, 维持睾丸曲精管上皮正常生精周期。

【用法用量】 每次 15~30 g, 每日 2 次, 开水调服。

【使用注意】 感冒发热期间暂停服用; 大便溏薄、不思饮食者不宜服用。

## 养肝明目膏

【主要组成】 石斛、枸杞子、菊花、桑叶、熟地黄、山茱萸、山药、茯苓、当归、川芎、白芍药、菟丝子、潼蒺藜、女贞子、车前子、决明子、珍珠粉、升麻等。

【功效主治】 养肝补血, 祛风明目。用于肝虚血少, 头晕眼花, 视物不清, 目涩畏光, 以及风热上受, 迎风流泪, 眼边刺痒等。





**【药理作用】** 养肝明目膏含有丰富的维生素和微量元素,以及其他有益的活性成分,可以增加营养供应,改善机体状况。对非特异性免疫、特异性细胞免疫和特异性体液免疫均有增强作用,是较全面的免疫增强药物;能显著降低胆固醇,升高卵磷脂胆固醇比值。此外,对实验动物的高温、低温、缺氧及游泳诸刺激均有明显保护作用。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 大便稀薄者慎用。

### 补气养血膏

**【主要组成】** 人参、党参、黄芪、白术、茯苓、黄精、生地黄、熟地黄、白芍药、当归、山药、枸杞子、鹿茸、阿胶、龟版胶、砂仁、陈皮、谷芽、神曲、炙甘草、大枣。

**【功效主治】** 健脾滋肾,益气补血。用于脾肾两亏,气血不足,面黄肌瘦,头晕眼花,心悸失眠,气短懒言,食欲不振,疲乏无力,妇女经少,闭经等。



**【药理作用】** 益气补血膏能兴奋造血系统,促进红细胞增生,增加血红蛋白,升高白细胞;增加血清清蛋白,纠正清、球蛋白比例失常;提高机体免疫功能,抗肿瘤,抗突变,同时提高机体应激性;抗疲劳,强心,护肝以及调节子宫功能。

**【用法用量】** 每次 15~30 g,每日 2 次,开水调服。

**【使用注意】** 感冒期间暂停服用;消化不良、食欲不振者忌服。

### 健脾开胃膏(小儿方)

**【主要组成】** 太子参、黄芪、当归、白芍药、党参、白术、茯苓、

陈皮、半夏、砂仁、山药、莲子、扁豆、山楂、鸡内金、玉竹、谷麦芽、大枣、炙甘草、蜂蜜等。

**【功效主治】** 健脾开胃，益气和胃。用于脾胃虚弱，面黄肌瘦，精神不振，食欲不振，疲乏气短，大便溏薄等。

**【药理作用】** 健脾开胃膏具有调节胃肠功能，促进消化吸收；降低胃酸，抗消化性溃疡；增强免疫功能，提高机体的抗病能力。

**【用法用量】** 每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

**【使用注意】** 发热腹泻，腹痛时不宜服用。

### 健脑益智膏(小儿方)


**【主要组成】** 龟版胶、孩儿参、灵芝、红景天、珍珠层粉、熟地黄、山茱萸、石菖蒲、远志、五味子、天麻、川芎、麦门冬、天门冬、茯苓、黄精、胡桃仁、莲子、百合、木香、砂仁和连翘。

**【功效主治】** 养心滋肾，健脑益智。用于小儿轻微脑功能综合征，症见好动、任性，前说后忘，注意力不集中；或小儿轻度智力发育不良，反应较慢，精神不振等。

**【药理作用】** 健脑益智膏能促进脑内 RNA 和蛋白质的合成，改善脑神经递质的传递功能，增进脑神经发育，提高脑的供血供氧。提高机体反应能力，提高记忆能力，增强工作效率。此外，还具有提高机体免疫功能、改善心肌代谢、增强心肌收缩力等作用。


**【用法用量】** 每次 15~30 g，每日 2 次，开水调服。

**【使用注意】** 儿童食欲不振，消化不良时不宜服用；感冒期间暂停服用。



附篇

膏方导航





## 上海市相关医院、药店简介

膏方的配伍是否合理？膏滋药的加工是否道地？当您想服用具有独特疗效中医膏方，不妨就近前往中医医院，或者开设有中医专科的综合性医院，请有经验的中医专家，特别是请熟悉自己病情的医生为自己把脉处方。同时，为了使膏方确实能够获得满意的治疗效果，您应该将处方送往有膏方定制特色的中药房、中药店妥善定制加工。

### 上海中医药大学附属医院

上海中医药大学及其所属的 3 家附属医院中医药专家云集，各医院中医各科齐全，特别是许多知名的中医专家妙手回春，各有专长，深得患者的信赖。



上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

地址：上海市甘河路 110 号

邮编：200437

电话：021 - 65161782

上海中医药大学附属曙光医院

地址：上海市卢湾区普安路 185 号

电话：021 - 63261650

邮编：200021

上海中医药大学附属龙华医院

地址:徐汇区宛平南路 725 号

邮编:200032

电话:021-64385700,64398310

### 上海其他的中医特色医院

上海市中医医院

地址:上海市芷江中路 274 号

邮编:200071

电话:021-56639828

上海市香山中医院

地址:上海市卢湾区上海香山路 28 号

邮编:200020

电话:021-63276730,53061730

上海中医文献馆中医门诊部

地址:瑞金二路 156 号(近打浦桥)

邮编:200025

电话:64335009

上海市名老中医门诊部

地址:石门一路 67 弄 1 号(近延安路)

邮编:200041

电话:62588203

上海市黄浦区中心医院中医门诊部



地址:九江路 150 号  
邮编:200002  
电话:63233184(分机 29)

中国人民解放军上海八五医院  
地址:华山路 1328 号  
邮编:200052  
电话:62528805

上海市中西医结合医院  
地址:保定路 230 号  
邮编:200082  
电话:65415910

此外,上海大多数的综合性医院都开设中医科,可以放心前往就诊。

## 药店



上海有多家闻名中外的百年老字号会聚沪上,如著名的雷允上、童涵春、胡庆余、蔡同德都以中药饮片品种齐全、加工精良蜚声海内外,每年的膏方定制分别数以千万料;同时这些老字号还在上海市的各区县甚至其他省市有各自的分号和连锁药店,消费者可以放心、称心地就近就医和中药膏方的定制加工。

上海雷允上药品连锁经营有限公司吴中路连锁店 \*  
地址:中山西路 1500 号(近吴中路)  
邮编:200335

电话:021-34241785

市区交通线路有:73、87、113、224、251、506、524、548、721、752、808、909路,中卫线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司河南路连锁店 \*

地址:河南中路 506 号(近宁波路)

邮编:200002

电话:021-63217961

市区交通线路有:220、66、926、920、864、49、17、64、21、14、20、37、937路,地铁二号线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司兰坪路连锁店 \*

地址:兰坪路 130 号(近剑川路)

邮编:200240

电话:021-34020587

市区交通线路有:东闵线、徐闽线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司福济药房 \*

地址:平顺路 115 号(近临汾路)

邮编:200435

电话:021-5691291

市区交通线路有:46、95、253、118路等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司莘庄连锁店

地址:莘沥路 524 号(近西环路)

电话:021-64980403

市区交通线路有:756路、沪莘线、莘仙线、鲁莘线、莘北专线等。





上海雷允上药品连锁经营有限公司大华连锁店

地址:宝山区南化苑路8号(近新沪路)

电话:021-66341225

市区交通线路有:737、738、510、923、112路等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司乳山路连锁店

地址:浦东新区乳山路145号(近崂山西路)

电话:021-58764337

市区交通线路有:771、639、779、620、619、610、639、617、787、935路,隧道三线,地铁二号线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司博山路连锁店

地址:浦东新区博山东路480号(近云山路)

电话:021-50341848

市区交通线路有:787、772路,大桥三线,隧道六线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司冠生园路连锁店

地址:徐汇区冠生园路242号(近漕宝路)

电话:021-34140871

市区交通线路有:224、703、43路,地铁一号线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司衡山连锁店

地址:徐汇区衡山路3号(近东平路)

电话:021-64159050

市区交通线路有:15、824、830、02、49、96、126、920、926路,地铁一号线等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司灵石路连锁店



地址:闸北区灵石路 702 号甲(近万荣路)

电话:021-56777720

市区交通线路有:206、791、951 路等。

上海雷允上药品连锁经营有限公司凉城连锁店

地址:虹口区车站南路 418 号(近凉城路)

电话:021-65266920

市区交通线路有:874、875、876、518、132、133、134、142、66、21、823、107、853、745 路等。

上海雷允上新虹联药房江湾店

地址:虹口区场中路 16 号(近逸仙路)

电话:021-65448036

市区交通线路有:118、116、812、51、52、875、97、66、101 路,东方明珠线等。

上海雷允上新虹联药房辉河路店

地址:虹口区辉河路 56 号(近巴林路)

电话:021-55889509

市区交通线路有:123、580、933 路等。

上海雷允上新虹联药房赤峰路店

地址:虹口区赤峰路 358 号(近曲阳路)

电话:021-65558990

市区交通线路有:123、100、116、576、503、810、115 路等。

上海雷允上新虹联药房打虎山路店

地址:杨浦区打虎山路 22 号(近鞍山路)



电话:021-65034491

市区交通线路有:6、14、70、103、863、220 路等。

在上海的各区县药材公司中,上海养和堂药业连锁经营有限公司有近百家药店,其中的养和堂川沙店也堪称百年老店。公司中对中药膏方加工有特色的连锁中药店有:

上海养和堂药业连锁经营有限公司张江店 \*

地址:张江镇川北公路 3003 号

邮编:201203

电话:58957298

上海养和堂药业连锁经营有限公司川沙店 \*

地址:川沙镇北市街 2 号

邮编:201200

电话:58981521

上海养和堂药业连锁经营有限公司高桥店 \*

地址:高桥镇慈善街 27 号

邮编:200137

电话:58672793

上海养和堂药业连锁经营有限公司金杨店 \*

地址:金桥镇云山路 1119 号

邮编:201206

电话:50701085

上海养和堂药业连锁经营有限公司机场店 \*



地址:机场镇施新路 717 弄 26 号

邮编:201201

电话:68963878

上海养和堂药业连锁经营有限公司北蔡店 \*

地址:北蔡镇沪南公路 818 号

邮编:201204

电话:58433439

上海养和堂药业连锁经营有限公司陆家嘴店 \*

地址:德州路 195 号

邮编:200126

电话:58831982

上海养和堂药业连锁经营有限公司乳山店 \*

地址:乳山路 79 号

邮编:200120

电话:58404191

上海养和堂药业连锁经营有限公司三林店 \*

地址:三林镇军民路 18-20 号

邮编:200124

电话:58410371

上海养和堂药业连锁经营有限公司张桥店 \*

地址:张桥镇佳临路 580 号

邮编:201206

电话:50311040



注:有\*号的药房,在膏方节期间设有专家坐堂,为病人把脉开方。

全国主要城市中一些享有声誉的特色中药店,如北京的同仁堂、天津的达仁堂、苏州的雷允上、杭州的胡庆余堂、广州的敬修堂等均可做膏方的加工配制,在此不一一介绍。

