针灸经络穴位速记手册

ZHENJIU JINGLUO XUEWEI SUJI SHOUCE

主编 黄 泳 王升旭
编者 陈俊琦 尚如国
杨继生 付恩力
夏冒李 许 鹏



广东省出版集团
广东科技出版社

■封面设计 沧浪鱼■责任编辑 New2k.com

针灸经络穴位速记手册

针灸经络取穴图解随身读

袖珍针灸取穴图解

ISBN 978-7-5359-4268-5

9 787535 942685 >

定价: 10.00元

针灸经络穴位速记手册

主编：黄　泳　王升旭
编者：陈俊琦　尚如国　杨继生
付恩力　夏冒李　许　鹏

廣東省出版集團
广东科技出版社
·广　州·

图书在编版目（CIP）数据

针灸经络穴位速记手册/黄泳，王升旭主编．—广州：广东科技出版社，2007.4

ISBN 978-7-5359-4268-5

Ⅰ．针…　Ⅱ．①黄…②王…　Ⅲ．①针灸疗法—经络—手册②针灸疗法—穴位—手册　Ⅳ．R224-62

中国版本图书馆CIP数据核字（2006）第150373号

出版发行：广东科技出版社

（广州市环市东路水荫路11号　邮码：510075）

E-mail:gdkjzbb@21cn.com

http://www.gdstp.com.cn

经　　销：广东新华发行集团股份有限公司

排　　版：广东科电有限公司

印　　刷：广东省肇庆市科建印刷有限公司

（广东省肇庆市星湖大道　邮码：526060）

规　　格：850 mm×1 168mm　1/64　印张4.25　字数100千

版　　次：2007年4月第1版

2007年4月第1次印刷

印　　数：1~10 000册

定　　价：10.00元

如发现因印装质量问题影响阅读，请与承印厂联系调换。

目　录

第1章　经络速记 …… 1
第1节　经络的概念及组成 …… 1
一、经络的概念 …… 1
二、经络系统的组成 …… 1
第2节　经脉系统 …… 3
一、十二经脉 …… 3
二、十二经别 …… 31
三、十二筋经 …… 31
四、十二皮部 …… 31
五、奇经八脉 …… 31
第3节　络脉系统 …… 43
一、十五络脉 …… 43
二、孙络、浮络 …… 44
第2章　穴位速记 …… 45
第1节　穴位总论 …… 45
一、穴位的概念 …… 45
二、穴位的分类 …… 45
三、穴位的治疗作用 …… 46
四、穴位的定位方法 …… 47

五、特定穴概述……52
第2节　穴位各论 ……53
一、手太阴肺经所属穴位……53
二、手阳明大肠经所属穴位……60
三、足阳明胃经所属穴位……73
四、足太阴脾经所属穴位……92
五、手少阴心经所属穴位……104
六、手太阳小肠经所属穴位……109
七、足太阳膀胱经所属穴位……119
八、足少阴肾经所属穴位……148
九、手厥阴心包经所属穴位……161
十、手少阳三焦经所属穴位……167
十一、足少阳胆经所属穴位……178
十二、足厥阴肝经所属穴位……198
十三、督脉所属穴位……206
十四、任脉所属穴位……218
十五、常用奇穴……230
第3章　特定穴速记 ……244
第1节　五输穴 ……244
一、五输穴的概念……244
二、五输穴的内容……244
第2节　原穴 ……246
一、原穴的概念……246
二、原穴的内容……246

第3节　络穴 …… 247
一、络穴的概念…… 247
二、络穴的内容…… 248
第4节　郄穴 …… 249
一、郄穴的概念…… 249
二、郄穴的内容…… 249
第5节　下合穴 …… 251
一、下合穴的概念…… 251
二、下合穴的内容…… 251
第6节　俞穴 …… 252
一、俞穴的概念…… 252
二、俞穴的内容…… 252
第7节　募穴 …… 253
一、募穴的概念…… 253
二、募穴的内容…… 253
第8节　八会穴 …… 255
一、八会穴的概念…… 255
二、八会穴的内容…… 255
第9节　八脉交会穴 …… 256
一、八脉交会穴的概念…… 256
二、八脉交会穴的内容…… 256
第10节　交会穴…… 257
一、交会穴的概念…… 257
二、交会穴的内容…… 257
【附录】　穴名检索…… 258

第1章 经络速记

第1节 经络的概念及组成

一、经络的概念

经络是经脉和络脉的总称，是指人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯串上下的路径。“经”有路径的含义，为直行的主干；“络”有网络的含义，为经脉所分出的小支。经络纵横交错，遍布于全身。

【记忆重点】

经络的概念包括两层意思：①经络是经脉和络脉的总称；②经络是运行气血的通道、联系全身的网络。

二、经络系统的组成

经络系统由经脉和络脉组成。经脉包括十二经脉、奇经八脉以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部；络脉包括十五络、浮络和孙络。经络系统内属脏腑，外连体表。经络系统的组成见图1-1。

【记忆重点】

把经络系统的组成归纳为下面的歌诀：


经络系统
经脉
十二经脉
手三阴经
手太阴肺经……列缺
手厥阴心包经…… 内关
手少阴心经……通里
手三阳经
手阳明大肠经……偏历
手少阳三焦经……外关
手太阳小肠经……支正
足三阳经
足阳明胃经……丰隆
足少阳胆经……光明
足太阳膀胱经……飞扬
足三阴经
足太阴脾经……公孙
足厥阴肝经……蠡沟
足少阴肾经……大钟
脾之大络……大包
督脉……长强
任脉……鸠尾
奇经八脉
冲脉
带脉
阴维脉
阳维脉
阴跷脉
阳跷脉
十二经别
十二经筋
十二皮部
分手足三阴、三阳与十二经脉相同
十五络脉
络脉
孙络
浮络
遍布全身

图1-1　经络系统的组成

“四十二，一十五，奇经八脉浮孙数”

其中，四十二指的是4个以“十二”命名的系统，分别是十二经脉、十二经别、十二筋经、十二皮部；“一十五”指的是一个以“十五”命名的系统，十五络脉。把歌诀一分两边，左边是经脉系统，右边则是络脉系统，如下所示：

四十二，	一十五，
奇经八脉	浮孙数。

第2节 经脉系统

一、十二经脉

（一）十二经脉总论

1. 十二经脉的命名

十二经脉的名称包括3个部分：手足、阴阳、脏腑。

手足指的是经脉的循行分布，“手——经”绝对不会在足上分布，“足——经”也绝对不会在手上分布。

十二经脉根据阴阳分为阴经、阳经。阴经之中又分为太阴、少阴和厥（jué）阴；阳经之中又分为阳明、太阳和少阳。三阴三阳是从阴阳气的盛衰来分：阴气最盛为太阴，其次为少阴，再次为厥阴；阳气最盛为阳明，其次为太阳，再次为少阳。

脏腑包括“六脏”和“六腑”。“六脏”是心、肝、脾、肺、肾、心包；“六腑”是小肠、大肠、胆、胃、膀胱、三焦。

上述3个部分组合而成十二经脉的具体名称：手太阴肺经、手少阴心经、手厥阴心包经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经、足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经、足阳明胃经、足太阳膀胱经、足少阳胆经。

2. 十二经脉的表里属络关系

十二经脉组成6对表里经组合：手足太阴配手足阳明、手足厥阴配手足少阳、手足少阴配手足太阳。阳经为表经，阴经为里经。

属络关系是指十二经脉与十二脏腑有固定的联系，包括属和络的联系。其规律为本经属于本脏（腑），络于相表里的腑（脏）。

3. 十二经脉的走行

手足三阴三阳经的走行，如图1-2所示：



图1-2 十二经脉走行

【记忆重点】

十二经脉的循行走向归纳为以下歌诀：

手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，

足三阳经从头走足，足三阴经从足走胸。

4. 十二经脉的交接

十二经脉的交接规律：相表里的阴经与阳经在四肢末端交接，同名的阳经与阳经在头面部交接，阴经与阴经在胸部交接。

【记忆重点】

十二经脉的交接归纳为以下歌诀：

阳经与阳经交会于头面，阴经与阴经交会于胸腹，阴经与阳经交会于手足。

5. 十二经脉的体表分布

十二经脉在体表左右对称地分布于头面、躯干和四肢，纵贯全身。其大致分布规律为：

阳经在外侧，阳明在前，少阳在中，太阳在后；

阴经在内侧，太阴在前，厥阴在中，少阴在后。

具体分布如图1-3。

上肢和下肢：阳经在外侧，阳明在前，少阳在中，太阳在后；阴经在内侧，太阴在前，厥阴在中，少阴在后。但足厥阴肝经在足大趾至内踝上8寸一段走于足太阴脾经之前，至内踝上8寸才走到中间。

头部：阳明走前额，少阳走颞侧，太阳走后枕。六阳经均上头，故称头为诸阳之会。

躯干：阴经走胸腹，阳经阳明走胸腹，少阳走胁肋，太阳走背腰。

【记忆重点】



图1-3　十二经脉体表分布

（1）手三阴经在上肢内侧的分布规律：肺经在前线、心包经在中线、心经在后线。联想胸腔中肺的体积最大、心包体积次之、心的体积最小，肺、心包、心由大到小的顺序，就是肺经、心包经、心经在上肢内侧由前到后的排列顺序。

（2）手三阳经在上肢外侧的分布规律：按照表里经关系，推导出与肺经、心包经、心经相表里的大肠经、三焦

经、小肠经同样按照前、中、后的顺序在上肢外侧分布。

（3）足三阴经在上肢内侧的分布规律：脾经在前线、肝经在中线、肾经在后线。脾脏位居中焦，肝、肾同居下焦，但是肝的位置比肾高些。所以，按照脾、肝、肾3脏由高到低的顺序排列就是脾经、肝经、肾经在下肢内侧由前到后的排列顺序。

（4）足三阳经在下肢的分布规律：按照表里经关系，推导出与脾经、肝经、肾经相表里的胃经、胆经、膀胱经同样按照前、中、后的顺序在下肢前面、外侧和后面分布。

6. 十二经脉的流注

十二经脉的流注顺序：十二经脉的流注始于手太阴，经过手阳明、足阳明、足太阴、手少阴、手太阳、足太



图1-4　十二经脉流注顺序之1

阳、足少阴、手厥阴、手少阳、足少阳，终于足厥阴，再周而复始，如环无端，营周不息（如图1-4）。

【记忆重点】

（1）把十二经脉流注拆开成为3个小的循环：太阴循环、少阴循环、厥阴循环。太阴循环起于手太阴肺经、终于足太阴脾经，手足太阴经与相表里的手足阳明经组成了一个由胸→手→头→足→胸的循环；少阴循环起于手少阴心经、终于足少阴肾经，手足少阴经与相表里的手足太阳经组成了一个由胸→手→头→足→胸的循环；厥阴循环起于手厥阴心包经、终于足厥阴肝经，手足厥阴经与相表里的手足少阳经组成了一个由胸→手→头→足→胸的循环；3个小的循环组成一个大的十二经脉的循环。

运用本方法记忆，关键要记住：①“太阴”、“少阴”、“厥阴”这个阴经由多到少的排列顺序；②与太阴、少阴、厥阴相表里的经脉；③每个小的循环都是从“手——阴经”开始、到“足——阴经”结束。

（2）按照大写的英文字母“E”勾边。先按照“肺、脾、心、肾、心包、肝”的顺序由上至下排列各条经脉，再推导出与每条经脉相表里的阳经，相表里的经脉排列在一行。如下图组成英文字母“E”的形状，再顺着“E”的轮廓勾边，就把十二经脉按照流注顺序串了起来。如图1-5所示。

运用本方法记忆，关键要记住：①“肺、脾、心、肾、心包、肝”的顺序；②与之相表里的阳经名称；③顺



图1-5　十二经脉流注顺序之2

若“E”的最外边轮廓勾画。

（3）按照以下歌诀记忆：

肺交大肠胃交脾，心与小肠膀肾宜，

心包三焦胆传肝，气血周流不停息。

（二）十二经脉各论

1. 手太阴肺经

【经脉的循行】起于中焦，向下联络大肠，回绕过来沿着胃的上口，通过横膈，属于肺脏，从“肺系”（肺与喉咙相联系的部位）横行出来（中府），向下沿上臂内侧，行于手少阴经和手厥阴经的前面，下行到肘窝中，沿前臂内侧前缘，进入寸口，经过鱼际，沿着鱼际的边缘，出拇指内侧端（少商）。

［手腕后方的支脉］从列缺处分出，一直走向食指内侧端（商阳），与手阳明大肠经相接（如图1-6）。



图1-6　手太阴肺经经脉循行示意图

【经脉与脏腑器官联络】肺经属肺，络大肠，环循胃口，联络喉咙。

【经脉主治】主治咳嗽、气喘、少气不足以息、咳血、伤风、胸部胀满、咽喉肿痛、缺盆部和手臂内侧前缘痛、肩背部寒冷、疼痛等头面、喉、胸、肺病和经脉循行部位的病证。

【记忆重点】手太阴肺经起于胸中、止于手指，循行于上肢内侧前线，联系了肺、大肠、胃、喉咙。

2. 手阳明大肠经

【经脉的循行】起于食指末端（商阳），沿食指内（桡）侧向上，通过第1、第2掌骨之间（合谷），向上进入两筋（拇长伸肌腱和拇短伸肌腱）之间的凹陷处，沿前臂前方，至肘部外侧，再沿上臂外侧前缘，上走肩端（肩髃），沿肩峰前缘，向上出于颈椎“手足三阳经聚会处”（大椎，属督脉），再向下进入缺盆（锁骨上窝部），联络肺脏，通过横膈，属于大肠。

［缺盆部支脉］上走颈部，通过面颊，进入下齿龈，回绕至上唇，交叉于人中，左脉向右，右脉向左，分布在鼻孔两侧（迎香），与足阳明胃经相接（如图1-7）。

【经脉与脏腑器官联络】大肠经属大肠，络肺；入下齿中，挟口、鼻。

【经脉主治】主治腹痛、肠鸣、泄泻、便秘、痢疾、咽喉肿痛、齿病、鼻流清涕或出血和本经循行部位的病证。



图1–7　手阳明大肠经经脉循行示意图

【记忆重点】手阳明大肠经起于手指、止于头面，循行于上肢外侧前线，联系了大肠、肺、齿、口、鼻。

3. 足阳明胃经

【经脉的循行】起于鼻翼两侧（迎香），上行到鼻根部，与旁侧足太阳经交会，向下沿鼻的外侧（承泣），进入上齿龈内，回出环绕口唇，向下交会于颏（kē）唇沟承浆（任脉）处，再向后沿着口腮后下方，出于下颌（hé）大迎处，沿着下颌角颊车，上行耳前，经过上关（足少阳经），沿着发际，到达前额（神庭）。

［面部支脉］从大迎前下走人迎，沿着喉咙，进入缺盆部，向下通过横膈，属于胃，联络脾脏。

［缺盆部直行的脉］经乳头，向下挟脐旁，进入少腹两侧的气冲穴。

［胃下口部支脉］沿着腹里向下到气冲会合，再由此下行至髀关，直抵伏兔部，下至膝盖，沿着胫骨外侧前缘，下经足跗，进入第2足趾外侧端（厉兑）。

［胫部支脉］从膝下三寸（足三里）处分出，进入足中趾外侧端。

［足跗部支脉］从跗上（冲阳）分出，进足大趾内侧端（隐白），与足太阴脾经相接（如图1-8）。

【经脉与脏腑器官联络】胃经属胃，络脾；起于鼻，入上齿，环口挟唇，循喉咙。

【经脉主治】主治肠鸣腹胀、水肿、胃痛、呕吐或消



图1-8　足阳明胃经经脉循行示意图

谷善饥、口渴、咽喉肿痛、鼻衄（nù）、胸及膝髌等本经循行部位疼痛、热病、发狂等胃肠病和头面、目、鼻、口齿病和神志病，以及经脉循行部位的病证。

【记忆重点】足阳明胃经起于头面、止于足趾，循行于头面部、躯干的前面、下肢的前面，联系了胃、脾、鼻、齿、口唇、喉咙。

4. 足太阴脾经

【经脉的循行】起于足大趾末端（隐白），沿着大趾内侧赤白肉际，经过大趾本节后的第一跖（zhí）趾关节后面，上行至内踝前面，再上小腿，沿着胫骨后面，交出足厥阴经的前面，经膝股部内侧前缘，进入腹部，属于脾脏，联络胃，通过横膈上行，挟咽部两旁，连系舌根，分散于舌下。

［胃部支脉］向上通过横膈，流注于心中，与手少阴心经相接（如图1-9）。

【经脉与脏腑器官联络】脾经属脾，络胃，流注心中；挟咽，连舌本，散舌下。

【经脉主治】主治胃脘痛、食则呕、嗳气、腹胀便溏、黄疸、身重无力、舌根强痛、下肢内侧肿胀、厥冷等脾胃病、妇科病、前阴病和经脉循行部位的病证。

【记忆重点】足太阴脾经起于足趾、止于胸腹，循行于下肢内侧前线、躯干的前面，联系了脾、胃、心、咽、舌。

5. 手少阴心经



图1-9　足太阴脾经经脉循行示意图

【经脉的循行】起于心中，出属“心系”（心与其他脏器相联系的部位），通过横膈，联络小肠。

［“心系”向上的支脉］挟着咽喉上行，连系于“目系”（眼球连系于脑的部位）。

［“心系”直行的脉］上行于肺部，再向下出于腋窝部（极泉），沿着上臂内侧后缘，行于手太阴经和手厥阴经后面，到达肘窝，沿前臂内侧后缘，到掌后豌豆骨部进入掌内，沿小指内侧至末端（少冲），与手太阳小肠经相接（如图1-10）。



图1-10　手少阴心经经脉循行示意图

【经脉与脏腑器官联络】心经属心，络小肠，上肺；挟咽，系目。

【经脉主治】主治心痛、咽干、口渴、目黄、胁痛、上臂内侧痛、手心发热等心、胸、神志病和经脉循行部位的病证。

【记忆重点】手少阴心经起于胸、止于手指，循行于上肢内侧的后线，联系了心、小肠、肺、咽、目。

6. 手太阳小肠经

【经脉的循行】起于手小指外侧端（少泽），沿手背外侧至腕部，出于尺骨茎突，直上沿前臂外侧后缘，经尺骨鹰嘴和肱骨内上髁（kē）之间，沿上臂外侧后缘，出于肩关节，绕行肩胛部，交会于大椎（督脉），向下进入缺盆部，联络心脏，沿着食管，通过横膈，到达胃部，属于小肠。

［缺盆部支脉］沿着颈部，上达面颊，至目外眦（zì），转入耳中（听宫）。

［颊部支脉］上行目眶下，抵于鼻旁，至目内眦（睛明），与足太阳膀胱经相接，而又斜行络于颧骨部（如图1-11）。

【经脉与脏腑器官联络】小肠经属小肠，络心，抵胃；循咽，至目锐眦，入耳中，抵鼻。

【经脉主治】主治少腹痛、腰脊痛引睾丸、耳聋、目黄、颊肿、咽喉肿痛、肩臂外侧后缘痛等头、项、耳、目、咽喉病和热病、神志病，以及经脉循行部位的病证。



图1-11　手太阳小肠经经脉循行示意图

【记忆重点】手太阳小肠经起于手指、止于头面，循行于上肢外侧的后面，联系了小肠、心、胃、咽、目、耳、鼻。

7. 足太阳膀胱经

【经脉的循行】起于目内眦（睛明），上额，交于巅

顶（百会）。

［巅顶部的支脉］从头顶到颞颥（niè rú）部。

［巅顶部直行的脉］从头顶入里络于脑，回出分开下行项后，沿着肩胛部内侧，挟着脊柱，到达腰部，从脊旁肌肉进入体腔，联络肾脏，属于膀胱。

［腰部的支脉］向下通过臀部，进入胭窝中。

［后项的支脉］通过肩胛骨内缘直下，经过臀部（环跳）下行，沿着大腿后外侧，与腰部下来的支脉会合于胭窝中，由此向下，通过腓（féi）肠肌，出于外踝的后面，沿着第5跖骨粗隆，至小趾外侧端（至阴），与足少阴肾经相接（如图1-12）。

【经脉与脏腑器官联络】膀胱经属膀胱，络肾；起于目内眦，至耳上角，入络脑。

【经脉主治】主治小便不通、遗尿、癫狂、疟疾、目痛、迎风流泪、鼻塞多涕、鼻衄、头痛，以及项、背、股、臀部和下肢后侧本经循行部位疼痛等头、项、目、背、腰、下肢部病证，以及脏腑、神志病。

【记忆重点】足太阳膀胱经起于头面、止于足趾，循行于头部后面、躯干的后面、下肢的后面，联系了膀胱、肾、目、耳、脑。

8. 足少阴肾经

【经脉的循行】起于足小趾之下，斜向足心（涌泉），出于舟骨粗隆下，沿内踝后，进入足跟，再向上行于腿肚内侧，出胭窝内侧，向上行股内后缘，通向脊柱



图1-12　足太阳膀胱经经脉循行示意图

（长强），属于肾［腧（shù）穴通路：还出于前，向上行腹部前正中线旁开0.5寸，胸部前正中线旁开2寸，终止于锁骨下缘俞（shù）府穴］，联络膀胱。

［肾脏部直行的脉］从肾上贯肝膈，入肺中，循着喉咙，上挟舌本。

［肺部的支脉］从肺出来络心，注入胸中，与手厥阴心包经交接（如图1—13）。

【经脉与脏腑器官联络】肾经属肾，络膀胱，上贯肝，入肺中，络心；循喉咙，挟舌本。

【经脉主治】主治咳血、气喘、舌干、咽喉肿痛、水肿、大便秘结、泄泻、腰痛、下肢内后侧痛、痿弱无力、足心热等妇科、前阴病和肾、肺、咽喉病，以及经脉循行部位的病证。

【记忆重点】足少阴肾经起于足趾、止于胸腹，循行于下肢内侧的后面，联系了肾、膀胱、肝、肺、心、喉咙、舌。

9. 手厥阴心包经

【经脉的循行】起于胸中，出属心包络，向下通过膈肌，从胸至腹依次联络上、中、下三焦。

［胸部支脉］沿着胸中，出于胁部，至腋下3寸处（天池），上行抵腋窝中，沿上臂内侧，行于手太阴和手少阴之间，进入肘窝中，向下行于前臂的两筋（桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱）之间，进入掌中，沿着中指到指端（中冲）。



图1-13　足少阴肾经经脉循行示意图

［掌中支脉］从劳宫分出，沿无名指到指端，与手少



图1-14　手厥阴心包经经脉循行示意图

阳三焦经相接（如图1-14）。

【经脉与脏腑器官联络】心包经属心包，络三焦。

【经脉主治】主治心痛、胸闷、心悸、心烦、癫狂、腋肿、肘臂挛急、掌心发热等心、胸、胃、神志病，以及经脉循行部位的病证。

【记忆重点】手厥阴心经起于胸中、止于手指，循行于上肢内侧的中线，联系了心包、三焦。

10. 手少阳三焦经

【经脉的循行】起于无名指末端（关冲），上行于小指与无名指之间，沿着手背，出于前臂外侧尺骨和桡骨之间，向上通过肘尖，沿上臂外侧，上达肩部，交出足少阳经的后面，向上进入缺盆，分布于胸中，散络于心包，向下通过膈肌，从胸至腹属上、中、下三焦。

［胸中支脉］从胸向上，出于缺盆部，上走颈旁，连系耳后，沿耳后直上，出于耳部上行额角，再屈而下行至面颊部，到达眼下部。

［耳部支脉］从耳后进入耳中，出走耳前，与前脉交叉于面颊部，到达目外眦（丝竹空之下），与足少阳胆经相接（如图1-15）。

【经脉与脏腑器官联络】三焦经属三焦，络心包；系耳后，出耳上角，入耳中，至目锐眦。

【经脉主治】主治腹胀、水肿、遗尿、小便不利、耳聋、耳鸣、咽喉肿痛、目赤肿痛、颊肿和耳后、肩臂、肘部外侧疼痛等侧头、耳、胸胁、咽喉病和热病，以及经脉



图1-15　手少阳三焦经经脉循行示意图

循行部位的病证。

【记忆重点】手少阳三焦经起于手指、止于头面，循行于上肢外侧的中线，联系了三焦、心包、耳、目。

11. 足少阳胆经

【经脉的循行】起于目外眦（瞳子髎），上行到额角，下耳后，沿颈旁，行手少阳三焦经之前，至肩上退后，交出手少阳三焦经之后，向下进入缺盆。

［耳后支脉］从耳后进入耳中，出走耳前，至目外眦后方。

［外眦部支脉］从目外眦处分出，下走大迎，会合手少阳三焦经到达目眶下，下行经颊车，于颈部向下会合前脉于缺盆，然后向下进入胸中，通过膈肌，络于肝，属于胆，沿着胁肋内，出于少腹两侧腹股沟动脉部，绕阴部毛际，横行进入髋关节部。

［缺盆部直行脉］从缺盆下行腋下，沿胸侧，经过季胁，下行会合前脉于髋关节部，再向下沿着大腿外侧，出膝外侧，下行经腓骨前面，直下到达腓骨下段，下出外踝之前，沿足背部，进入第四趾外侧端。

［足背部支脉］从足背分出，沿第1、2跖骨间，出于大趾端，穿过趾甲，回过来到趾甲后的毫毛部（大敦），与足厥阴肝经相接（如图1-16）。

【经脉与脏腑器官联络】胆经属胆，络肝；起于目锐眦，下耳后，入耳中，出耳前。

【经脉主治】主治口苦、目疾、疟疾、头痛、颔痛、



.图1-16　足少阳胆经经脉循行示意图

目外眦痛、缺盆部肿痛、腋下肿、胸胁股及下肢外侧痛、足外侧痛、足外侧发热等侧头、目、耳、咽喉病和神志病、热病，以及经脉循行部位的其他病证。

【记忆重点】足少阳胆经起于头面、止于足趾，循行于头侧部、躯干的侧面、下肢的侧面，联系了胆、肝、目、耳。

12. 足厥阴肝经

【经脉的循行】起于足大趾背毫毛部（大敦），沿着足背内侧上行，经过内踝前1寸处，向上行小腿内侧，在内踝上8寸处交出足太阴脾经之后，上行腘内侧，沿着大腿内侧，进入阴毛中，环绕阴部，上达小腹，挟胃旁，属于肝，络于胆，向上通过横膈，分布于胁肋，沿着喉咙的后面，向上进入鼻咽部，连接于“目系”（眼球连系于脑的部位），向上出于前额，与督脉会合于巅顶。

［目系支脉］从“目系”下行颊里，环绕唇内。

［肝部支脉］从肝分出，通过横膈，向上流注于肺，与手太阴肺经相接（如图1-17）。

【经脉与脏腑器官联络】肝经属肝，络胆；过阴器，连目系，环唇内。

【经脉主治】主治腰痛、胸满、呃逆、遗尿、小便不利、疝气、少腹肿等肝病、妇科病、前阴病和经脉循行部位的其他病证。

【记忆重点】足阳明胃经起于头面、止于足趾，循行于头面部、躯干的前面、下肢的前面，联系了肝、胆、阴



图1-17　足厥阴肝经经脉循行示意图

器、目、唇。

二、十二经别

十二经别是十二经脉离、入、出、合的别行部分，是十二经脉深入胸腹、联系头部的重要支脉。

十二经别多从四肢肘膝关节以上的正经别出（离），经过躯干深入体腔与相关的脏腑联系（入），再浅出体表上行头项部（出），在头项部阳经经别合于本经经脉，阴经的经别合于与其表里的阳经经脉（合），由此将十二经别汇合成6组，称为“六合”。

三、十二筋经

十二经筋是十二经脉之气结聚于筋肉关节的体系，是十二经脉的外周连属部分。

十二经筋均起于四肢末端，上行于头面胸腹部。

四、十二皮部

十二皮部是十二经脉功能活动反映于体表皮肤的部位，也是络脉之气散布的部位。

以十二经脉体表的分布范围为依据，将皮肤划分为12个区域，也就是十二经脉在皮肤上的分属部分。

五、奇经八脉

（一）奇经八脉总论

1. 奇经八脉的组成

奇经八脉，是十二经脉以外的8条经脉，包括督脉、任脉、带脉、冲脉、阴蹻（qiāo）脉、阳蹻脉、阴维脉、阳维脉。

各经的命名则主要依据其功能分布而定，如督脉总领一身阳气，为阳脉之督纲，故以“督”名之；任脉总任诸阴，对全身阴经脉气有总揽、总任的作用，故以“任”名之；冲脉容纳、调节十二经脉和五脏六腑的气血，是总领诸经气血之要冲，故以“冲”名之；带脉回绕横围于腰腹，有如束带，约束全身直行的阴阳诸经，因而称之为“带脉”；蹻脉交通一身阴阳之气，调节肢体运动，故以“蹻”名之；阴维、阳维维系、联络全身的阴阳经脉以归于任、督脉，故以“维”名之。

【记忆重点】奇经八脉的组成可以记忆为：“冲任督带，阴阳维蹻”。

2. 奇经八脉与十二经脉的区别

“奇”，是奇特、奇异之意，指这八条经脉既不直接隶属于十二脏腑，又无表里相配关系，其分布和作用有异于十二正经，穴位分布也不同与十二经脉。

【记忆重点】见表1-1。

表1-1　奇经八脉与十二经脉的区别

区别点	正　经	奇　经
与脏腑的关系	与脏腑有直接的联系	与脏腑没有直接的联系

续表

区别点	正　经	奇　经
表里关系	有	无
穴位分布	每条经脉都有所属穴位分布	只有任、督二脉有穴位分布

3. 奇经八脉的功能

奇经八脉纵横交错地循行分布于十二经脉之间，主要作用体现在两个方面：①沟通十二经脉之间的联系，将部位相近、功能类似的经脉联系起来，起到统摄有关经脉气血、协调阴阳的作用；②对十二经脉气血有着蓄积和渗灌的作用，奇经八脉犹如湖泊水库，耳十二经脉则犹如江河之水。

【记忆重点】奇经八脉的功能："统摄"、"溢蓄调节"。

（二）奇经八脉各论

1. 任脉

【经脉的循行】起于小腹内，下出于会阴，向上行于阴毛部，沿着腹内，向上经过关元等穴，到达咽喉部，再上行环绕口唇，经过面部，进入目眶下（承泣）（如图1-18）。

【经脉与脏腑器官联络】咽喉、目。

【经脉主治】主治疝气、带下、腹中结块等腹、胸、颈、头面的局部病证和相应的内脏器官疾病，少数腧穴有



图1-18　任脉循行示意图

强壮作用或可治疗神志病。

【记忆重点】任脉主要分布在前正中线上，任脉为阴脉之海。

2. 督脉

【经脉的循行】起于小腹内，下出于会阴，向后行于脊柱的内部，上达项后风府，进入脑部，上行巅顶，沿前额下行鼻柱（如图1-19）。



图1-19　督脉循行示意图

【经脉主治】主治脊柱强痛、角弓反张等神志病、热

病和腰骶（dǐ）、背、头项局部病证，以及相应的内脏疾病。

【记忆重点】督脉主要分布在后正中线上，督脉为阳脉之海。

3. 冲脉

【经脉的循行】起于小腹内，下出于会阴部，向上循行于脊柱之内，其外行者经气冲与足少阴经交会，沿着腹



图1-20　冲脉循行示意图

部两侧，上达咽喉，环绕口唇（如图1-20）。

【经脉主治】腹部气逆而拘急。

【记忆重点】与足少阴肾经并行，冲脉为十二经之海、冲为血海。

4. 带脉

【经脉的循行】起于季肋部的下面，斜向下行到带脉、五枢、维道，横行绕身一周（如图1-21）。

图1-21　带脉循行示意图

【经脉主治】腹满，腰部觉冷如坐水中。

【记忆重点】环腰一周，约束诸脉。

5. 阴维脉

【经脉的循行】起于小腿内侧，沿大腿内侧上行到腹部，与足太阴经相合，过胸部，与任脉会于颈部（如图1-22）。



图1-22　阴维脉循行示意图

【经脉主治】心痛、忧郁。

【记忆重点】与足太阴脾经、足厥阴肝经并行，阴维脉调节六阴经经气。

6. 阳维脉

【经脉的循行】起于足跟外侧，向上经过外踝，沿足少阳经上行至髋（kuān）关节部，经胁肋后侧，从腋后



图1-23　阳维脉循行示意图

上肩，至前额，再到颈后，合于督脉（如图1-23）。

【经脉主治】恶寒发热、腰痛。

【记忆重点】与足少阳胆经并行，阳维脉调节六阳经经气。

7. 阴跷脉

【经脉的循行】起于足舟骨的后方，上行内踝的上面，直上沿大腿内侧，经过阴部，向上沿胸部内侧，进入锁骨上窝，上经人迎的前面，过颧部，到目内眦，与足太阳经和阳跷脉相会合（如图1-24）。

【经脉主治】多眠，癃闭。

【记忆重点】与足少阴肾经并行，阴跷脉调节肢体运动，司眼睑（jiǎn）开合。

8. 阳跷脉

【经脉的循行】起于足跟外侧，经外踝上行腓骨后缘，沿股外侧和胁后上肩、过颈部上挟口角，进入目内眦，与阴跷脉会合，再沿足太阳经上额，与足少阳经合于风池（如图1-25）。

【经脉主治】目内眦痛，不眠。

【记忆重点】与足太阳膀胱经并行，阳跷脉调节肢体运动、司眼睑开合。



图1-24　阴跷脉循行示意图



图1-25　阳跷脉循行示意图

第3节 络脉系统

一、十五络脉

1. 十五络脉的含义

十五络脉是十四经脉（十二经脉加上任、督二脉）在四肢部以及躯干前、后、侧三部的重要支脉，十二经脉和任、督脉各有一络脉，加上脾之大络，合称十五络。

十五络以其发出所在腧穴命名，分别为手太阴之络列缺、手阳明之络偏历、手厥阴之络内关、手少阳之络外关、手少阴之络通里、手太阳之络支正、足太阴之络公孙、足阳明之络丰隆、足厥阴之络蠡（lí）沟、足少阳之络光明、足少阴之络大钟、足太阳之络飞扬、任脉之络鸠尾、督脉之络长强、脾之大络大包。

2. 十五络脉的循行分布特点

十二经脉的络脉均从本经四肢肘膝以下的络穴分出，走向与其相表里的经脉，即阴经别络于阳经，阳经别络于阴经。任脉的别络从鸠尾分出以后散布于腹部；督脉的别络从长强分出经背部向上散布于头，左右别走足太阳经；脾之大络从大包分出以后散布于胸胁。此外，还有从十五络脉分出的浮行于浅表部位的浮络和细小的孙络，遍及全身，难以计数。

二、孙络、浮络

孙络是细小的络脉，浮络是浮于浅表的络脉。这些细小的、浅表的络脉遍布全身。

【记忆重点】

络脉的主干是十五络脉，由十二经脉各分出一支，加上任、督、脾之大络组成。十二经脉的络脉网络了四肢，任脉络脉网络了胸腹部，督脉络脉网络了背腰部，脾之大络网络了胁肋部。

第2章 穴位速记

第1节 穴位总论

一、穴位的概念

穴位，针灸学中的术语是“腧穴”。腧穴是人体脏腑经络之气输注于体表的特殊部位。“腧”与“输”义通，有转输、输注的含义；“穴”即孔隙的意思。穴位也被称作“节”、“会”、“气穴”、“气府”、“骨空”等。

二、穴位的分类

人体的穴位很多，分为经穴、经外奇穴和阿是穴3大类。

1. 经穴

凡归属于十二经脉与任、督二脉的穴位，称为“十四经穴”，简称“经穴”。这些穴位有确定的名称、确定的位置和明确的经脉归属，即定名、定位和定经。经穴共有361个，其中双穴（十二经脉）309个（穴名），单穴（任、督脉）52个，是穴位的主要部分。

2. 奇穴

不属于十四经穴的一些穴位，因其有奇效，故称“奇穴”。又因其在十四经以外，故又称为“经外奇穴”。奇穴有确定的穴名，确定的位置但没有经脉归属，即定名、定位、不定经。有些奇穴是由多个刺激点组成无法归经，如十宣、八邪、八风、华佗夹脊、四缝等；有些是十四经穴确定后再陆续发现的经验穴，还没有归经。

3. 阿是穴

不属于十四经穴、经外奇穴的一些压痛点、敏感点或有阳性反应物如结节和皮下条索状物等处，称为阿是穴。阿是有“痛”的意思，因按压痛处，病人会“阿”的一声，故名为“阿是”。这类穴位既无具体名称，也无固定部位，具有不定名、不定位和不定经的特点。

三、穴位的治疗作用

通过针刺、艾灸等方法刺激穴位，可以疏通经络、调节气血、平衡阴阳，从而达到扶正祛邪的目的。在治疗上，穴位的作用主要有以下3个方面。

1. 近治作用

这是一切穴位（包括十四经穴、奇穴、阿是穴）主治作用的共同特点。这些穴位均能治疗该穴所在部位及邻近部位及邻近组织、器官的病证。如眼区的睛明、承泣、四白、球后各穴，均能治眼病；耳区的听宫、听会、翳风、耳门诸穴，均能治疗耳病；胃部的中脘、建里、梁门诸穴，均能治疗胃病等。

2. 远治作用

这是十四经穴位主治作用的基本规律。在十四经穴位中，尤其是十二经脉在四肢肘、膝关节以下的穴位，不仅能治局部病证，而且能治本经循行所涉及的远隔部位的组织、器官、脏腑的病证，有的甚至具有影响全身的作用。如合谷穴，不仅能治上肢病证，而且能治颈部和头面部病证，同时能治外感病的发热；足三里穴不但能治疗下肢病证，而且对调整消化系统的功能，甚至对人体免疫功能、神经系统和内分泌系统等各方面都具有调节作用。

3. 特殊作用

穴位的治疗作用还表现在对机体的双向良性调整作用。如泄泻时，针刺天枢能止泻；便秘时，针刺天枢又能通便。心动过速时，针刺内关能减慢心率；心动过缓时，针刺内关又可使之恢复正常。针刺足三里可使高血压患者降低血压，又可使休克患者血压升高。此外，穴位治疗作用还具有相对的特异性，如大椎退热，至阴矫正胎位等，均是其特殊的治疗作用。

四、穴位的定位方法

针灸临床中，治疗效果与取穴是否准确有着密切的关系。为了定准穴位，必须掌握好定位方法，常用的方法有以下4种。

1. 骨度分寸定位法

骨度分寸定位法以骨节为主要标志，测量人体不同部

位的长度，作为量取穴位标准的方法。骨度分寸法有横寸和直寸之分。常用的横寸有：两额角发际之间9寸、两乳头之间8寸、两肩胛骨内缘之间6寸。常用的直寸有：前后发际之间12寸、胸骨上窝至胸剑联合9寸、胸剑联合至脐中8寸、脐中至耻骨联合上缘5寸、腋前皱襞（bi）至肘横纹9寸、肘横纹至腕横纹12寸、股骨大转子至膑骨下缘19寸、臀横纹至腘横纹14寸、髌骨下缘至外踝尖16寸、耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘18寸、胫骨内侧髁下方至内踝尖13寸。特定部位的骨度分寸只能作为取该部位穴位所用（如表2-1和图2-1）。

表2-1　常用的骨度折量寸表

部位	起止点	折量寸	度量法	说明
头面部	前发际正中至后发际正中	12	直寸	用于确定头部经穴的纵向距离
	眉间（印堂）至前发际正中	3	直寸	
	第7颈椎棘突下（大椎）至后发际正中	3	直寸	用于确定前或后发际及其头部经穴的纵向距离
	眉间（印堂）至后发际正中第7颈椎棘突下（大椎）	18	直寸	
	前两额发角（头维）之间	9	横寸	用于确定头前部经穴的横向距离
	耳后两乳突（完骨）之间	9	横寸	用于确定头后部经穴的横向距离

续表

部位	起止点	折量寸	度量法	说明
胸腹胁部	胸骨上窝（天突）至胸剑联合中点（歧骨）	9	直寸	用于确定胸部任脉经穴的纵向距离
	胸剑联合中点（歧骨）至脐中	8	直寸	用于确定上腹部经穴的纵向距离
	脐中至耻骨联合上缘（曲骨）	5	直寸	用于确定下腹部经穴的纵向距离
	两乳头之间	8	横寸	用于确定胸腹部经穴的横向距离
	腋窝顶点至第11肋游离端（章门）	12	直寸	用于确定胁肋部经穴的纵向距离
背腰部	肩胛骨内缘（近脊柱侧点）至后正中线	3	横寸	用于确定背腰部经穴的横向距离
	肩峰缘至后正中线	8	横寸	用于确定肩背部经穴的横向距离
上肢部	腋前、后纹头至肘横纹（平肘尖）	9	直寸	用于确定上臂部经穴的纵向距离
	肘横纹（平肘尖）至腕掌（背）侧	12	直寸	用于确定前臂部经穴的纵向距离
下肢部	耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘	18	直寸	用于确定下肢内侧足三阴经穴的纵向距离
	胫骨内侧髁下方至内踝尖	13	直寸	
	股骨大转子至腘横纹	19	直寸	用于确定下肢外后侧足三阳经穴的纵向距离（臀沟至腘横纹相当14寸）
	腘横纹至外踝尖	16	直寸	用于确定下肢外后侧足三阳经穴的纵向距离



(a) 骨度折量寸(头部)

(b) 骨度折量寸(正面)

(c) 骨度折量寸(背面)

图2-1　常用的骨度折量寸

2. 解剖标志定位法

解剖标志定位法是以人体表面具有特征的解剖标志为依据，来确定穴位位置的方法。人体的解剖标志有固定标志和活动标志两种。

固定标志：以人体表面固定不移,又有明显特征的部位作为取穴标志。

活动标志：人体某个动作出现的隆起、凹陷、孔隙、皱纹等作为取穴标志。

3. 手指同身寸取穴法

以患者手指的长度或宽度为标准来取穴的方法称为手指同身寸取穴法，简称指寸法。常用的指寸法有中指同身寸、拇指同身寸和横指同身寸3种。

中指同身寸法：是以患者的中指中节屈曲时内侧两端纹头之间作为一寸，可用于四肢部取穴的直寸和背部取穴的横寸。

拇指同身寸法：是以患者拇指指关节的横度作为一寸，亦适用于四肢部的直寸取穴。

横指同身寸法：又名“一夫法”，将食指、中指、无名指和小指并拢，以中指中节横纹处为准，四指横量作为3寸。用于四肢部取穴的直寸（如图2–2）。

4. 简便取穴法

简便取穴法是临床一种简便易行的方法，常作为一种辅助方法使用。如立正姿势，垂手中指端取风市；两手虎口自然平直交叉在食指尽端到达处取列缺等。



(a) 中指寸　　(b) 拇指寸　　(c) 一夫法

图2-2　手指同身寸穴法

五、特定穴概述

有一部分穴位被称为“特定穴”，它们除具有经穴的共同主治特点外，还有其特殊的性能和治疗作用，故又有特别的称号。特定穴包括五输穴、原穴、络穴、俞穴、募（mù）穴、郄（xì）穴、下合穴、八会穴、八脉交会穴、交会穴等10类。

【记忆重点】

（1）穴位的概念：脏腑、经脉之气输注于体表的部位。

（2）穴位的分类：经穴、奇穴、阿是穴。

（3）穴位的治疗作用：近治、远治、特殊。

（4）穴位的定位方法：骨度分寸、自然标志、手指同身寸、简便取穴法。

（5）特定穴（10类）：五输原络俞募，下合八八郄交会。

第2节 穴位各论

一、手太阴肺经所属穴位

1. 中府（LU1）肺募穴

［定位］在胸前壁的外上方，云门穴下1寸，平第一肋间隙，距正中线6寸（如图2-3）。



图2-3

［主治］咳嗽、气喘、胸中胀痛、胸痛、肩背痛。

［刺灸法］向外斜刺0.5～0.8寸，可灸。**不可向内深刺，以免伤及肺脏。**

2. 云门（LU2）

［定位］在胸前壁的外上方，肩胛骨喙（hui）突上方，锁骨下窝凹陷处，距前正中线6寸（如图2-3）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、肩关节内侧痛。

［刺灸法］向外斜刺0.5～0.8寸；可灸。**不可向内深刺，以免伤及肺脏。**

3. 天府（LU3）

［定位］在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前横纹头下3寸处（如图2-4）。



图2-4

［主治］气喘、瘿（yǐng）气、鼻衄、上臂内侧疼痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸。

4. 侠白（LU4）

［定位］在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前横纹头下4寸，或肘横纹上5寸处（如图2—4）。

［主治］咳嗽、气喘、干呕、烦满、上臂内侧痛。

［刺灸法］直刺0.5~1寸；可灸。

5. 尺泽（LU5）合穴

［定位］肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷中（如图2—4）。

［主治］咳嗽、气喘、咯（kǎ）血、潮热、咽喉肿痛、胸部胀满、小儿惊风、吐泻、肘臂挛痛。

［刺灸法］直刺0.8~1.2寸，或点刺出血；可灸。

6. 孔最（LU6）郄穴

［定位］在前臂掌面桡侧，当尺泽与太渊连线上，腕横纹上7寸（如图2—5）。

［主治］咳嗽、气喘、咯血、咽喉肿痛、肘臂挛痛、痔疾。

［刺灸法］直刺0.5~1寸；可灸。

7. 列缺（LU7）络穴、八脉交会穴（通于任脉）

［定位］在前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸。当肱骨肌与拇长展肌之间（如图2—5）。

［主治］咳嗽、气喘、咽喉痛、半身不遂、口眼㖞

（wāi）斜、偏头痛、颈强痛、牙痛。

［刺灸法］向上斜刺0.3～0.5寸，可灸。

8. 经渠（LU8）经穴

［定位］在前臂掌面桡侧，桡骨茎突与桡动脉之间的凹陷处，腕横纹上1寸（如图2–5）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛、手腕痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸，不灸。

9. 太渊（LU9）输穴、原穴、八会穴之脉会

［定位］在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉搏动处（如图2–5）。

［主治］咳嗽、气喘、咳血、胸痛、咽喉肿痛、无脉证、手腕痛。

［刺灸法］避开桡动脉，直刺0.3～0.5寸，可灸。

10. 鱼际（LU10）荥（yíng）穴

［定位］在手拇指本节（第一掌指关节）后凹陷处，约当第一掌骨中点桡侧，赤白肉际处（如图2–5）。

［主治］咳嗽、咳血、发热、咽喉肿痛、失音、乳痈、掌中热。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

11. 少商（LU11）井穴

［定位］在拇指末节桡侧，距指甲角0.1寸（如图2–5）。

［主治］咽喉肿痛、中风昏迷、中暑呕吐、小儿惊风、癫狂、咳嗽、鼻衄。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或点刺出血。



图2-5

【记忆小结1】手太阴肺经穴位一览（如表2-2）。

表2-2　手太阴肺经穴位一览表

穴位	定位	主治
中府*（LU1）	在胸前壁的外上方，云门穴下1寸，平第一肋间隙，距正中线6寸	咳嗽，气喘，胸中胀痛，胸痛，肩背痛

续表

穴位	定位	主治
云门（LU2）	在胸前壁的外上方，肩胛骨喙突上方，锁骨下窝凹陷处，距前正中线6寸	咳嗽、气喘、胸痛、肩关节内侧痛
天府（LU3）	在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前横纹头下3寸处	气喘、瘿气、鼻衄、上臂内侧疼痛
侠白（LU4）	在臂内侧面，肱二头肌桡侧缘，腋前横纹头下4寸，或肘横纹上5寸处	咳嗽、气喘、干呕、烦满、上臂内侧痛
尺泽*（LU5）	肘横纹中，肱二头肌腱桡侧凹陷中	咳嗽，气喘，咯血，潮热，咽喉肿痛，胸部胀满，小儿惊风，吐泻，肘臂挛痛
孔最*（LU6）	在前臂掌面桡侧，当尺泽与太渊连线上，腕横纹上7寸	咳嗽、气喘、咯血、咽喉肿痛、肘臂挛痛、痔疾
列缺*（LU7）	在前臂桡侧缘，桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸。当肱桡肌与拇长展肌腱之间	咳嗽、气喘、咽喉痛、半身不遂、口眼㖞斜、偏头痛、颈强痛、牙痛
经渠（LU8）	在前臂掌面桡侧，桡骨茎突与桡动脉之间的凹陷处，腕横纹上1寸	咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛、手腕痛

续表

穴 位	定 位	主 治
太渊*（LU9）	在腕掌侧横纹桡侧，桡动脉搏动处	咳嗽、气喘、咳血、胸痛、咽喉肿痛、无脉证、手腕痛
鱼际*（LU10）	在手拇指本节（第一掌指关节）后凹陷处，约当第一掌骨中点桡侧，赤白肉际处	咳嗽、咳血、发热、咽喉肿痛、失音、乳痈、掌中热
少商*（LU11）	在拇指末节桡侧，距指甲角0.1寸	咽喉肿痛、中风昏迷、中暑呕吐、小儿惊风、癫狂、咳嗽、鼻衄

注：*为重点掌握穴位（下同）

【记忆小结2】手太阴肺经穴位总图（如图2-6）。

【记忆重点】

（1）手太阴肺经所属穴位歌诀：

手太阴肺十一穴，中府云门天府诀，

侠白之下是尺泽，孔最下行接列缺，

曾有经渠与太渊，鱼际少商如韭叶。

（2）手太阴肺经穴位主治概要：

①均治肺、胸疾患以及局部病变。

②肘以下穴位可泻热解表，治疗咽喉疾病。

③腕关节附近穴位可治头面、项、齿病变。

④尺泽、少商可镇静熄风开窍，用于急救。



图2-6　手太阴肺经穴位总图

二、手阳明大肠经所属穴位

1. 商阳（LI1）井穴

［定位］在手指末端桡侧，距指甲角0.1寸（如图2-7）。

［主治］咽喉肿痛、耳鸣耳聋、中风昏迷、热病无汗、下齿痛、青盲。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或点刺出血。

2. 二间（LI2）荥穴

［定位］微握拳，在手食指本节前（第2掌指关节），桡侧凹陷处（如图2-7）。



图2-7

［主治］齿痛、咽喉肿痛、口眼㖞斜、目痛、热病。

［刺灸法］直刺0.2～0.4寸；可灸。

3. 三间（LI3）输穴

［定位］微握拳，在手食指本节后（第2掌指关节），桡侧凹陷处（如图2-7）。

［主治］咽喉肿痛、齿痛、身热、腹胀肠鸣。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

4. 合谷（LI4）原穴

［定位］在手背，第1、2掌骨间，当第2掌骨桡侧的中点处（如图2-7）。

［主治］头痛、齿痛、目赤肿痛、咽喉肿痛、失音、口眼㖞斜、半身不遂、痄腮（zhà sāi）、疔（dīng）疮、经闭、腹痛、牙关紧闭、小儿惊风、鼻衄、耳鸣耳聋、发热恶寒、无汗、多汗、瘾（yǐn）疹、疟疾。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

5. 阳溪（LI5）经穴

［定位］在腕背横纹桡侧，手拇指向上翘起时，当拇短伸肌腱和拇长伸肌腱之间的凹陷中（如图2-7）。

［主治］头痛、耳鸣耳聋、咽喉肿痛、腕臂痛、齿痛。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

6. 偏历（LI6）络穴

［定位］屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池穴连线上，腕横纹上3寸（如图2-8）。

［主治］耳鸣耳聋、目赤、鼻衄、喉痛、手臂酸痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸，斜刺1寸；可灸。

7. 温溜（LI7）郄穴

［定位］屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，腕横纹上5寸（如图2-8）。

［主治］头痛、面肿、咽喉肿痛、肩背酸痛、疔疮、吐舌、肠鸣腹痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。



图2-8

8. 下廉（LI8）

［定位］在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹下4寸（如图2-8）。

［主治］头痛、眩晕、肘臂痛、半身不遂、腹痛、腹胀、目痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

9. 上廉（LI9）

［定位］在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹下3寸（如图2-8）。

［主治］头痛、半身不遂、肩臂酸痛麻木、腹痛、肠鸣、腹泻。

［刺灸法］直刺0.8～1寸；可灸。

10. 手三里（LI10）

［定位］在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹下2寸（如图2-8）。

［主治］肘臂疼痛、上肢瘫痪麻木、腹痛、腹泻、腹胀、齿痛、失音。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

11. 曲池（LI11）合穴

［定位］在肘横纹外侧端，屈肘时当肘横纹终点与肱骨外上髁连线中点（如图2-8）。



图2-9

［主治］热病、半身不遂、风疹、手臂肿痛无力、咽喉肿痛、齿痛、目赤痛、腹痛吐泻、痢疾、高血压、瘰疬（luǒ lì）、癫狂。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

12. 肘髎（liáo）（LI12）

［定位］在臂外侧，屈肘，曲池上方1寸，当肱骨边缘处（如图2-9）。

［主治］肘臂部酸痛、麻木、挛急和嗜卧。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

13. 手五里（LI13）

［定位］在臂外侧，当曲池与肩髃连线上，曲池穴上3寸处（如图2-9）。

［主治］肘臂疼痛挛急、瘰疬。

［刺灸法］直刺0.8～1寸；可灸。

14. 臂臑（nào）（LI14）

［定位］在臂外侧，三角肌止点处，当曲池与肩髃连线上，曲池穴上7寸（如图2-9）。

［主治］瘰疬，肩背疼痛、目疾、颈项拘挛。

［刺灸法］直刺或向上斜刺0.8～1.5寸；可灸。

15. 肩髃（yú）（LI15）

［定位］在肩部，三角肌上，臂外展或向前平伸时，当肩峰前下方凹陷处（如图2-9）。

［主治］肩臂疼痛、半身不遂、手臂挛急、瘾疹、瘰疬。

［刺灸法］直刺或向下斜刺0.8~1.5寸；可灸。

16. 巨骨（LI16）

［定位］在肩上部，当锁骨肩峰端与肩胛冈之间凹陷处（如图2-10）。



图2-10

［主治］肩背及上臂疼痛、伸展及抬举不便和瘰疬、瘿气。

［刺灸法］直刺0.4～0.6寸，**不可深刺，以免刺入胸腔造成气胸**；可灸。

17. 天鼎（LI17）

［定位］在颈外侧部，胸锁乳突肌后缘，当喉结旁扶突与缺盆连线中点（如图2-11）。

［主治］咽喉肿痛、暴喑（yīn）、气梗、梅核气、瘰疬。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。



图2-11

18. 扶突（LI18）

［定位］在颈外侧部，喉结旁，当胸锁乳突肌的前后缘之间（如图2-11）。

［主治］咳嗽、气喘、咽喉肿痛、暴喑、瘰疬、瘿气。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

19. 口禾髎（LI19）

［定位］在上唇部，鼻孔外缘直下，平水沟穴（如图2-12）。

［主治］口㖞、鼻塞不通、鼻衄。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；不宜灸。



图2-12

20. 迎香（U20）

［定位］在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中（如图2-12）。

［主治］鼻塞不通、口喎、鼻衄、面痒、鼻息肉。

［刺灸法］宜刺或向上斜刺0.2～0.5寸；不宜灸。

【记忆小结1】手阳明大肠经穴位一览表（见表2-3）。

表2-3　手阳明大肠穴位一览表

穴位	定　位	主　治
商阳*（LI1）	在手指末端桡侧，距指甲角0.1寸	咽喉肿痛、耳鸣耳聋、中风昏迷、热病无汗、下齿痛、青盲

续表

穴位	定　位	主　治
二间（LI2）	微握拳，在手食指本节前（第二掌指关节），桡侧凹陷处	齿痛、咽喉肿痛、口眼㖞斜、目痛、热病
三间*（LI3）	微握拳，在手食指本节后（第二掌指关节），桡侧凹陷处	咽喉肿痛、齿痛、身热、腹胀肠鸣
合谷（LI4）	在手背，第一、二掌骨间，当第二掌骨桡侧的中点处	头痛、齿痛、目赤肿痛、咽喉肿痛、失音、口眼㖞斜、半身不遂、痄腮、疔疮、经闭、腹痛、牙关紧闭、小儿惊风、鼻衄、耳鸣耳聋、发热恶寒、无汗、多汗、癫痫、疟疾
阳溪（LI5）	在腕背横纹桡侧，手拇指向上翘起时，当拇短伸肌腱和拇长伸肌腱之间的凹陷中	头痛、耳鸣耳聋、咽喉肿痛、腕臂痛、齿痛
偏历（LI6）	屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪与曲池穴连线上，腕横纹上3寸	耳鸣耳聋、目赤、鼻衄、喉痛、手臂酸痛
温溜（LI7）	屈肘，在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，腕横纹上5寸	头痛、面肿、咽喉肿痛、肩背酸痛、疔疮、吐舌、肠鸣腹痛

续表

穴位	定　位	主　治
下廉（LI8）	在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹下4寸	头痛、眩晕、肘臂痛、半身不遂、腹痛、腹胀、目痛
上廉（LI9）	在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹下3寸	头痛、半身不遂、肩臂酸痛麻木、腹痛、肠鸣、腹泻
手三里*（LI10）	在前臂背面桡侧，当阳溪穴与曲池穴连线上，肘横纹下2寸	肘臂疼痛、上肢瘫痪麻木、腹痛、腹泻、腹胀、齿痛、失音
曲池*（LI11）	在肘横纹外侧端，屈肘时当尺泽与肱骨外上髁连线中点	热病、半身不遂、风疹、手臂肿痛无力、咽喉肿痛、齿痛、目赤痛、腹痛吐泻、痢疾、高血压、瘰疬、癫狂
肘髎（LI12）	在臂外侧，屈肘，曲池上方1寸，当肱骨边缘处	肘臂部酸痛、麻木、挛急和喘卧
手五里（LI13）	在臂外侧，当曲池与肩髃连线上，曲池穴上3寸处	肘臂疼痛挛急，瘰疬

续表

穴位	定　位	主　治
臂臑*（LI14）	在臂外侧，三角肌止点处，当曲池与肩髃连线上，曲池穴上7寸	瘰疬，肩背疼痛、目疾、颈项拘挛
肩髃*（LI15）	在肩部，三角肌上，臂外展或向前平伸时，当肩峰前下方凹陷处	肩臂疼痛、半身不遂、手臂挛急、瘾疹、瘰疬
巨骨（LI16）	在肩上部，当锁骨肩峰端与肩胛冈之间凹陷处	肩背及上臂疼痛、伸展及抬举不便和瘰疬、瘿气
天鼎（LI17）	在颈外侧部，胸锁乳突肌后缘，当喉结旁扶突与缺盆连线中点	咽喉肿痛、暴喑、气梗、梅核气、瘰疬
扶突（LI18）	在颈外侧部，喉结旁，当胸锁乳突肌的前后缘之间	咳嗽、气喘、咽喉肿痛、暴喑、瘰疬、瘿气
口禾髎（LI19）	在上唇部，鼻孔外缘直下，平水沟穴	口㖞、鼻塞不通、鼻衄
迎香*（LI20）	在鼻翼外缘中点旁，当鼻唇沟中	鼻塞不通、口㖞、鼻衄、面痒、鼻息肉

【记忆小结2】手阳明大肠经穴位总图（如图2-13）。



图2-13 手阳明大肠经穴位总图

【记忆重点】

（1）手阳明大肠经所属穴位歌诀：

手阳明穴起商阳，二间三间合谷藏，
阳溪偏历复温溜，下廉上廉三里长，
曲池肘髎五里近，臂臑肩髃巨骨当，
天鼎扶突禾髎接，鼻旁五分是迎香。

（2）手阳明大肠经穴位主治概要：

①均治局部及附近组织病变。

②肘以下穴位可治疗头面五官疾病、大肠疾病、热病、癫狂。

③合谷、曲池、肩髃可治风疹、瘾疹。合谷、曲池治疗范围广。

三、足阳明胃经所属穴位

1. 承泣（ST1）

［定位］在面部瞳孔直下，当眶下缘与眼球之间（如图2-14）。

［主治］眼睑瞤（rún）动、目赤肿痛、夜盲、口眼㖞斜、迎风流泪。

［刺灸法］紧靠眶下缘直刺0.3～0.7寸；不宜灸。**针刺时，应缓慢进针，不宜提插，以防刺破血管，引起眶内出血。**



图2-14

2. 四白（ST2）

［定位］在面部瞳孔直下，当眶下孔凹陷中（如图2-14）。

［主治］目赤痛痒、目翳、眼睑瞤动、迎风流泪、头面疼痛、口眼㖞斜。

［刺灸法］直刺0.2～0.4寸；不宜灸。

3. 巨髎（ST3）

［定位］在面部瞳孔直下，平鼻翼下缘处，当鼻唇沟外侧（如图2-14）。

［主治］口眼㖞斜、眼睑瞤动、鼻衄、齿痛、面痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.6寸；可灸。

4. 地仓（ST4）

［定位］在面部口角外侧，上直对瞳孔（如图2-14）。

［主治］口眼㖞斜、口角瞤动、齿痛、流涎、唇缓不收。

［刺灸法］向颊车方向平刺0.5～1.5寸；可灸。

5. 大迎（ST5）

［定位］在下颌角前方，咬肌附着部的前缘，面动脉搏动处（如图2-15）。

［主治］牙关紧闭、齿痛、口喎、颊肿、面肿、面痛、唇瞤动。

［刺灸法］直刺0.2～0.4寸；可灸。



图2-15

6. 颊车（ST6）

［定位］在面颊部，下颌角前上方约一横指（中指），当咀嚼时咬肌隆起，按之凹

陷处（如图2-15）。

［主治］口眼㖞斜、颊肿、齿痛、牙关紧闭、面肌痉挛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸，或向地仓斜刺1～1.5寸；可灸。

7. 下关（ST7）

［定位］在面部耳前方，当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中（如图2-15）。

［主治］牙关紧闭、下颌疼痛、口㖞、面痛、齿痛、耳鸣、耳聋。

［刺灸法］直刺0.5～1.2寸；可灸。

8. 头维（ST8）

［定位］在头侧部，当额角发际上0.5寸，头正中线旁4.5寸（如图2-15）。

［主治］头痛、目眩、迎风流泪、眼睑瞤动、视物不明、目痛。

［刺灸法］向后平刺0.5～1寸；不宜灸。

9. 人迎（ST9）

［定位］在颈部喉结旁，当胸锁乳突肌前缘，颈总动脉搏动处（如图2-16）。

［主治］咽喉肿痛、高血压、头痛、瘰疬、饮食难下、胸满气喘。

［刺灸法］避开颈总动脉直刺0.2～0.4寸；不宜灸。

10. 水突（ST10）

［定位］在颈部胸锁乳突肌的前缘，当人迎与气舍连线的中点（如图2-16）。

［主治］咳逆上气、喘息不得卧、咽喉肿痛、呃逆、瘰疬、瘿瘤。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。



图2-16

11. 气舍（ST11）

［定位］在颈部，当锁骨内侧端的上缘，胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间（如图2-16）。

［主治］咽喉肿痛、喘息、呃逆、瘿气、瘰疬、颈项强痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

12. 缺盆（ST12）

［定位］在锁骨上窝中央，距前正中线4寸（如图2-16）。

［主治］咳嗽气喘、咽喉肿痛、缺盆中痛、瘰疬。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

13. 气户（ST13）

［定位］在胸部，当锁骨中点下缘，距前正中线4寸（如图2-17）。

［主治］咳喘、胸痛、呃逆、胁肋疼痛。

［刺灸法］沿肋间隙向外斜刺0.5～0.8寸；可灸。

14. 库房（ST14）

［定位］在胸部，当第1肋间隙，距前正中线4寸（如图2—17）。

［主治］咳嗽、胸痛、胁胀、气喘。

［刺灸法］沿肋间隙向外斜刺0.5～0.8寸；可灸。

15. 屋翳（ST15）

［定位］在胸部，当第2肋间隙，距前正中线4寸（如图2—17）。



图2—17

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、乳痈、身肿、皮肤疼痛。

［刺灸法］沿肋间隙向外斜刺0.5～0.8寸；可灸。

16. 膺窗（ST16）

［定位］在胸部，当第3肋间隙，距前正中线4寸（如图2—17）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、乳痈。

［刺灸法］沿肋间隙向外斜刺0.5～0.8寸；可灸。

17. 乳中（ST17）

［定位］在胸部，当第4肋间隙，乳头中央，距前正中线4寸（如图2—17）。

［刺灸法］**本穴不针不灸，只作胸腹部腧穴的定位标志。**

18. 乳根（ST18）

［定位］在胸部，当乳头直下，乳房根部，第5肋间隙，距前正中线4寸（如图2-17）。

［主治］乳痈、乳汁少、胸痛、咳嗽、呃逆。

［刺灸法］沿肋间隙向外斜刺0.5～0.8寸，直刺0.4寸；可灸。

19. 不容（ST19）

［定位］在上腹部，当脐中上6寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］呕吐、胃痛、腹胀、食欲不振。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

20. 承满（ST20）

［定位］在上腹部，当脐中上5寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］胃痛、呕吐、腹胀、肠鸣食欲不振。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

21. 梁门（ST21）

［定位］在上腹部，当脐中上4寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］胃痛、呕吐、腹胀、食欲不振、大便溏薄。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

22. 关门（ST22）

［定位］在上腹部，当脐中上3寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］腹痛、腹胀、肠鸣泻泄、食欲不振、水肿。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。



图2-18

23. 太乙（ST23）

［定位］在上腹部，当脐中上2寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］腹痛、腹胀、心烦、癫狂。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

24. 滑肉门（ST24）

［定位］在上腹部，当脐中上1寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］癫狂、呕吐、腹胀、腹泻。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

25. 天枢（ST25）大肠募穴

［定位］在腹中部，距脐中2寸（如图2-18）。

［主治］腹痛、腹胀、肠鸣泻泄、便秘、肠痈、热病、疝气、水肿、月经不调。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

26. 外陵（ST26）

［定位］在下腹部，当脐中下 1寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］腹痛、疝气、痛经。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

27. 大巨（ST27）

［定位］在下腹部，当脐中下 2寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］小腹胀满、小便不利、遗精、早泄、惊悸不眠、疝气。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

28. 水道（ST28）

［定位］在下腹部，当脐中下 3寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］小腹胀满、腹痛、痛经、小便不利。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

29. 归来（ST29）

［定位］在下腹部，当脐中下 4寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］小腹疼痛、经闭、痛经、子宫下垂、白带、疝气、茎中痛、小便不利。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

30. 气冲（ST30）

［定位］在腹股沟稍上方，当脐中下5寸，距前正中线2寸（如图2-18）。

［主治］小腹痛、疝气、腹股沟疼痛。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

31. 髀（bì）关（ST31）

［定位］在大腿前面，当髂（qià）前上棘与髌底外侧端的连线上，屈股时平会阴，居缝匠肌外侧凹陷处（如图2-19）。

［主治］髀股痿痹、下肢不遂、腰腿疼痛、筋急不得屈伸。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

32. 伏兔（ST32）

［定位］在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上6寸（如图2-19）。

［主治］腿痛、下肢不遂、脚气、疝气、腹胀。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

33. 阴市（ST33）

［定位］在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上3寸（如图2-19）。

［主治］膝关节痛、下肢屈伸不利、腰痛、下肢不遂、腹胀、腹痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

34. 梁丘（ST34）郄穴

［定位］屈膝，在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上2寸（如图2-19）。



图2-19

［主治］胃痛、膝关节肿痛、屈伸不利、乳痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

35. 犊鼻（ST35）

［定位］屈膝，在膝部髌骨与髌韧带外侧凹陷中（如图2-20）。

［主治］膝痛、关节屈伸不利、脚气。

［刺灸法］向后内斜刺0.8～1.5寸；可灸。

36. 足三里（ST36）合穴、胃下合穴

［定位］在小腿前外侧，当犊鼻下3寸，距胫骨前缘一横指（中指）（如图2-20）。

［主治］胃痛、呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、下肢痿痹、泄泻、痢疾、便秘、疳（gān）疾、癫狂、中风、脚气、水肿、下肢不遂、心悸、气短、虚劳羸（léi）瘦。**本穴有强壮作用，为保健要穴。**

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

37. 上巨虚（ST37）

［定位］在小腿前外侧，当犊鼻下6寸，距胫骨前缘～横指（中指）（如图2-20）。

［主治］腹痛、腹胀、痢疾、便秘、肠痈、中风瘫痪、脚气、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

38. 条口（ST38）

［定位］在小腿前外侧，当犊鼻下8寸，距胫骨前缘～横指（中指）（如图2-20）。

［主治］肩臂不得举、下肢冷痹、脘腹疼痛、跗（fū）肿、转筋。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

39. 下巨虚（ST39）小肠下合穴

［定位］在小腿前外侧，当犊鼻下9寸，距胫骨前



图2-20

缘～横指（中指）（如图2-20）。

［主治］小腹痛、腰脊痛引睾丸、乳痈、下肢痿痹、泻泄、大便脓血。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

40. 丰隆（ST40）络穴

［定位］在小腿前外侧，当外踝尖上8寸，条口外，距胫骨前缘二横指（中指）（如图2-20）。

［主治］痰多、哮喘、咳嗽、胸痛、头痛、咽喉肿痛、便秘、癫狂、痫（xián）证、下肢痿痹、呕吐。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

41. 解溪（ST41）经穴

［定位］在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷中，当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间（如图2-21）。

［主治］头痛、眩晕、癫狂、腹胀、便秘、下肢痿痹、目赤、胃热谵（zhàn）语。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

42. 冲阳（ST42）原穴

［定位］在足背最高处，当拇长伸肌腱和趾长伸肌腱之间，足背动脉搏动处（如图2-21）。



图2-21

［主治］胃痛、腹胀、口眼㖞斜、面肿齿痛、足痿无力、脚背红肿。

［刺灸法］避开动脉，直刺0.3～0.5寸；可灸。

43. 陷谷（ST43）输穴

［定位］在足背，当第2、第3跖骨结合部前方凹陷处（如图2-21）。

［主治］面目浮肿、肠鸣腹泻、足背肿痛、热病、目赤肿痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

44. 内庭（ST44）荥穴

［定位］在足背，当第2、第3趾间，趾蹼（pǔ）缘后方赤白肉际处（如图2-21）。

［主治］齿痛、口㖞、喉痹、鼻衄、腹痛、腹胀、痢疾、泻泄、足背肿痛、热病、胃痛吐酸。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

45. 厉兑（ST45）井穴

［定位］在足第2趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（指寸）（如图2-21）。

［主治］面肿、齿痛、口㖞、鼻衄、胸腹胀满、热病、多梦、癫狂。

［刺灸法］浅刺0.1寸。

【记忆小结1】足阳明胃经穴位一览表（见表2-4）。

表2-4　足阳明胃经穴位一览表

穴位	定　位	主　治
承泣*（ST1）	在面部瞳孔直下，当眶下缘与眼球之间	眼睑眴动、目赤肿痛、夜盲、口眼㖞斜、迎风流泪
四白*（ST2）	在面部瞳孔直下，当眶下孔凹陷中	目赤痛痒、目翳、眼睑眴动、迎风流泪、头面疼痛、口眼㖞斜
巨髎（ST3）	在面部瞳孔直下，平鼻翼下缘处，当鼻唇沟外侧	口眼㖞斜、眼睑眴动、鼻衄、齿痛、面痛
地仓*（ST4）	在面部口角外侧，上直对瞳孔	口眼㖞斜、口角眴动、齿痛、流涎、唇缓不收
大迎（ST5）	在下颌角前方，咬肌附着部的前缘，面动脉搏动处	牙关禁闭、齿痛、口㖞、颊肿、面肿、面痛、口唇眴动
颊车*（ST6）	在面颊部，下颌角前上方约一横指（中指），当咀嚼时咬肌隆起，按之凹陷处	口眼㖞斜、颊肿、齿痛、牙关紧闭、面肌痉挛
下关*（ST7）	在面部耳前方，当颧弓与下颌切迹所形成的凹陷中	牙关紧闭、下颌疼痛、口㖞、面痛、齿痛、耳鸣、耳聋
头维*（ST8）	在头侧部，当额角发际上0.5寸，头正中线旁4.5寸	头痛、目眩、迎风流泪、眼睑眴动、视物不明、目痛
人迎（ST9）	在颈部喉结旁，当胸锁乳突肌前缘，颈总动脉搏动处	咽喉肿痛、高血压、头痛、瘰疬、饮食难下、胸满气喘

续表

穴位	定　位	主　治
水突（ST10）	在颈部胸锁乳突肌的前缘，当人迎与气舍连线的中点	咳逆上气、喘息不得卧、咽喉肿痛、呃逆、瘰疬、瘿瘤
气舍（ST11）	在颈部，当锁骨内侧端的上缘，胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间	咽喉肿痛、喘息、呃逆、瘿气、瘰疬、颈项强痛
缺盆（ST12）	在锁骨上窝中央，距前正中线4寸	咳嗽气喘、咽喉肿痛、缺盆中痛、瘰疬
气户（ST13）	在胸部，当锁骨中点下缘，距前正中线4寸	咳喘、胸痛、呃逆、胁肋疼痛
库房（ST14）	在胸部，当第1肋间隙，距前正中线4寸	咳嗽、胸痛、胁胀、气喘
屋翳（ST15）	在胸部，当第2肋间隙，距前正中线4寸	咳嗽、气喘、胸痛、乳痈、身肿、皮肤疼痛
膺窗（ST16）	在胸部，当第3肋间隙，距前正中线4寸	咳嗽、气喘、胸痛、乳痈
乳中（ST17）	在胸部，当第4肋间隙，乳头中央，距前正中线4寸	本穴不针不灸，只作胸腹部腧穴的定位标志
乳根（ST18）	在胸部，当乳头直下，乳房根部，第5肋间隙，距前正中线4寸	乳痈、乳汁少、胸痛、咳嗽、呃逆
不容（ST19）	在上腹部，当脐中上6寸，距前正中线2寸	呕吐、胃痛、腹胀、食欲不振

续表

穴位	定位	主治
承满（ST20）	在上腹部，当脐中上5寸，距前正中线2寸	胃痛、呕吐、腹胀、肠鸣食欲不振
梁门*（ST21）	在上腹部，当脐中上4寸，距前正中线2寸	胃痛、呕吐、腹胀、食欲不振、大便溏薄
关门（ST22）	在上腹部，当脐中上3寸，距前正中线2寸	腹痛、腹胀、肠鸣泻泄、食欲不振、水肿
太乙（ST23）	在上腹部，当脐中上2寸，距前正中线2寸	腹痛、腹胀、心烦、癫狂
滑肉门（ST24）	在上腹部，当脐中上1寸，距前正中线2寸	癫狂、呕吐、腹胀、腹泻
天枢*（ST25）	在腹中部，距脐中2寸	腹痛、腹胀、肠鸣泻泄、便秘、肠痈、热病、疝气、水肿、月经不调
外陵（ST26）	在下腹部，当脐中下1寸，距前正中线2寸	腹痛、疝气、痛经
大巨（ST27）	在下腹部，当脐中下2寸，距前正中线2寸	小腹胀满、小便不利、遗精、早泄、惊悸不眠、疝气
水道（ST28）	在下腹部，当脐中下3寸，距前正中线2寸	小腹胀满、腹痛、痛经、小便不利
归来*（ST29）	在下腹部，当脐中下4寸，距前正中线2寸	小腹疼痛、经闭、痛经、子宫下垂、白带、疝气、茎中痛、小便不利
气冲（ST30）	在腹股沟稍上方，当脐中下5寸，距前正中线2寸	小腹痛、疝气、腹股沟疼痛

续表

穴位	定　位	主　治
髀关（ST31）	在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，屈股时平会阴，居缝匠肌外侧凹陷处	髀股痿痹、下肢不遂、腰腿疼痛、筋急不得屈伸
伏兔*（ST32）	在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上6寸	腿痹、下肢不遂、脚气、疝气、腹胀
阴市（ST33）	在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上3寸	膝关节痛、下肢屈伸不利、腰痛、下肢不遂、腹胀、腹痛
梁丘*（ST34）	屈膝，在大腿前面，当髂前上棘与髌底外侧端的连线上，髌底上2寸	胃痛、膝关节肿痛、屈伸不利、乳痈
犊鼻（ST35）	屈膝，在膝部髌骨与髌韧带外侧凹陷中	膝痛、关节屈伸不利、脚气
足三里*（ST36）	在小腿前外侧，当犊鼻下3寸，距胫骨前缘一横指	胃痛、呕吐、腹胀、肠鸣、消化不良、下肢痿痹、泄泻、痢疾、便秘、痎疾、癫狂、中风、脚气、水肿、下肢不遂、心悸、气短、虚劳羸瘦。本穴有强壮作用，为保健要穴
上巨虚（ST37）	在小腿前外侧，当犊鼻下6寸，距胫骨前缘一横指	腹痛、腹胀、痢疾、便秘、肠痈、中风瘫痪、脚气、下肢痿痹

续表

穴位	定位	主治
条口（ST38）	在小腿前外侧，当犊鼻下8寸，距胫骨前缘一横指	肩臂不得举、下肢冷痹、脘腹疼痛、跗肿、转筋
下巨虚*（ST39）	在小腿前外侧，当犊鼻下9寸，距胫骨前缘一横指	小腹痛、腰脊痛引睾丸、乳痈、下肢痿痹、泻泄、大便脓血
丰隆*（ST40）	在小腿前外侧，当外踝尖上8寸，条口外，距胫骨前缘二横指	痰多、哮喘、咳嗽、胸痛、头痛、咽喉肿痛、便秘、癫狂、痫证、下肢痿痹、呕吐
解溪*（ST41）	在足背与小腿交界处的横纹中央凹陷中，当拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间	头痛、眩晕、癫狂、腹胀、便秘、下肢痿痹、目赤、胃热谵语
冲阳（ST42）	在足背最高处，当拇长伸肌腱和趾长伸肌腱之间，足背动脉搏动处	胃痛、腹胀、口眼㖞斜、面肿齿痛、足痿无力、脚背红肿
陷谷（ST43）	在足背，当第2、第3跖骨结合部前方凹陷处	面目浮肿、肠鸣腹泻、足背肿痛、热病、目赤肿痛
内庭*（ST44）	在足背，当第2、第3趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处	齿痛、口㖞、喉痹、鼻衄、腹痛、腹胀、痢疾、泻泄、足背肿痛、热病、胃痛吐酸
厉兑（ST45）	在足第2趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（指寸）	面肿、齿痛、口㖞、鼻衄、胸腹胀满、热病、多梦、癫狂

【记忆小结2】足阳明胃经穴位总图（如图2–22）。



图2–22　足阳明胃经穴位总图

【记忆重点】

（1）足阳明胃经所属穴位歌诀：

四十五穴足阳明，承泣四白巨髎经，
地仓大迎颊车对，下关头维和人迎，
水突气舍连缺盆，气户库房屋翳屯，
膺窗乳中连乳根，不容承满梁门起，
关门太乙滑肉门，天枢外陵大巨存，
水道归来气冲穴，髀关伏兔走阴市，
梁丘犊鼻足三里，上巨虚连条口位，
下巨虚跳上丰隆，解溪冲阳陷谷中，
又次内庭厉兑穴，大趾次趾之端终。

（2）足阳明胃经穴位主治概要：

①头面部穴位以局部及附近组织病变为主：面、口、耳、目、头。

②颈部穴位以局部为主：咽喉，瘿瘤。

③胸部穴位：心、胸、肺、乳房。

④上腹部穴位：脾、胃、肠。

⑤下腹部穴位：泌尿生殖系、胃肠。

⑥股部穴位：股病，腹痛。

⑦膝以下穴位：脾、胃、肠病变，水液病，神志病，头面五官及局部病变。

⑧脚上穴位：热病，局部病。

四、足太阴脾经所属穴位

1. 隐白（SP1）井穴

［定位］在足大趾末节内侧，距趾甲角0.1寸（指寸）

（如图2-23）。

［主治］腹胀、便血、尿血、崩漏、月经过多、癫狂、多梦，惊风、昏厥、胸痛。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或用三棱针点刺出血；可灸。



图2-23

2. 大都（SP2）荥穴

［定位］在足内侧缘，当足大趾本节（第1趾跖关节）前下方赤白肉际凹陷处（如图2-23）。

［主治］腹胀、胃痛、消化不良、泄泻、便秘、热病无汗、体重肢肿、心痛、心烦。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

3. 太白（SP3）输穴、原穴

［定位］在足内侧缘，当足大趾本节（第1趾跖关节）后下方赤白肉际凹陷处（如图2-23）。

［主治］胃痛、腹胀、腹痛、肠鸣、呕吐、泄泻、痢疾、便秘、痔疾、脚气、体重节痛。

［刺灸法］直刺0.8～1寸；可灸。

4. 公孙（SP4）络穴、八脉交会穴之一（通于冲脉）

［定位］在足内侧缘，当第1跖骨基底部的前下方（如图2-23）。

［主治］胃痛、呕吐、饮食不化、肠鸣腹胀、腹痛、泄泻、痢疾、心烦失眠、水肿、发狂妄言、嗜卧、脚气。

［刺灸法］直刺0.5～1寸，可灸。

5. 商丘（SP5）经穴

［定位］在足内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点（如图2-23）。

［主治］腹胀、肠鸣、泄泻、便秘、食不化、黄疸、怠惰嗜卧、癫狂、小儿癫痫、咳嗽、足踝痛、痔疾。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

6. 三阴交（SP6）肝、脾、肾三经交会穴

［定位］在小腿内侧，当足内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方（如图2-24）。

［主治］肠鸣泄泻、腹胀、食不化、月经不调、崩漏、赤白带下、阴挺、经闭、痛经、难产、产后血晕、恶露不尽、遗精、阳痿、早泄、阴茎痛、疝气、水肿、小便不利、遗尿、足痿痹痛、脚气、失眠、湿疹、荨（xún）麻疹、高血压、神经性皮炎、不孕。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。孕妇不宜针。

7. 漏谷（SP7）

［定位］在小腿内侧，当足内踝尖与阴陵泉的连线

上，距内踝尖6寸，胫骨内侧缘后方（如图2-24）。

［主治］腹胀、肠鸣、腰膝厥冷、小便不利、遗精、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

8. 地机（SP8）郄穴

［定位］在小腿内侧，当足内踝尖与阴陵泉的连线上，阴陵泉穴下3寸（如图2-24）。



图2-24

［主治］腹痛、泄泻、小便不利、水肿、月经不调、遗精、腰痛不可俯仰、食欲不振。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

9. 阴陵泉（SP9）合穴

［定位］在小腿内侧，当胫骨内侧髁后下方凹陷中（如图2-24）。

［主治］腹胀、水肿、小便不利或失禁、阴茎痛、妇人阴痛、遗精、膝痛、黄疸。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

10. 血海（SP10）

［定位］屈膝，在大腿内侧，髌底内侧端上2寸，当股四头肌内侧头的隆起处（如图2-25）。

［主治］月经不调、痛经、经闭、崩漏、癥瘕、皮肤瘙痒、丹毒、小便淋漓、股内侧痛。

［刺灸法］直刺1～1.2寸；可灸。



图2-25

11. 箕门（SP11）

［定位］在大腿内侧，当血海与冲门连线上，血海上6寸（如图2-25）。

［主治］小便不利、五淋、遗溺、腹股沟肿痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；**不宜灸。针刺时必须避开动脉。**

12. 冲门（SP12）

［定位］在腹股沟外侧，距耻骨联合上缘中点3.5寸，当髂外动脉搏动处的外侧（如图2-26）。

［主治］腹痛、疝气、痔疾、崩漏、带下。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。



图2-26

13. 府舍（SP13）

［定位］在下腹部，当脐中下4寸，冲门上方0.7寸，距前正中线4寸（如图2-26）。

［主治］腹痛、疝气、结聚。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

14. 腹结（SP14）

［定位］在下腹部，大横下1.3寸，距前正中线4寸

（如图2-26）。

［主治］腹痛、腹泻、大便秘结。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

15. 大横（SP15）

［定位］在腹中部，距脐中4寸（如图2-26）。

［主治］腹痛、腹泻、大便秘结。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

16. 腹哀（SP16）

［定位］在上腹部，当脐中上3寸，距前正中线4寸（如图2-26）。

［主治］腹痛、泄泻、痢疾、便秘、消化不良。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

17. 食窦（SP17）

［定位］在胸外侧部，当第5肋间隙，距前正中线6寸（如图2-27）。

［主治］胸胁胀痛、嗳（ài）气、反胃、腹胀、水肿。

［刺灸法］斜刺或向外平刺0.5～0.9寸；可灸。**本经自食窦至大包诸穴，内有肺脏均不可深刺。**

18. 天溪（SP18）

［定位］在胸外侧部，当第4肋间隙，距前正中线6寸（如图2-27）。

［主治］胸痛、咳嗽、乳痈、乳汁少。

［刺灸法］斜刺或向外平刺0.5～0.8寸；可灸。

19. 胸乡（SP19）

［定位］在胸外侧部，当第3肋间隙，距前正中线6寸（如图2-27）。

［主治］胸胁胀痛。

［刺灸法］斜刺或向外平刺0.5～0.8寸；可灸。



图2-27

20. 周荣（SP20）

［定位］在胸外侧部，当第2肋间隙，距前正中线6寸（如图2-27）。

［主治］胸胁胀痛、咳嗽、气喘、胁痛。

［刺灸法］斜刺或向外平刺0.5～0.8寸；可灸。

21. 大包（SP21）脾之大络

［定位］在侧胸部腋中线上，当第6肋间隙处（如图

2–27）。

［主治］胸胁胀满、咳嗽、气喘、胁肋痛、全身疼痛、四肢无力。

［刺灸法］斜刺或向后平刺0.5～0.8寸；可灸。

【记忆小结1】足太阴脾经穴位一览表（表2–5）。

表2–5　足太阴脾经腧穴一览表

穴位	定　位	主　治
隐白*（SP1）	在足大趾末节内侧，距趾甲角0.1寸（指寸）	腹胀、便血、尿血、崩漏、月经过多、癫狂、多梦，惊风、昏厥、胸痛
大都（SP2）	在足内侧缘，当足大趾本节（第1趾跖关节）前下方赤白肉际凹陷处	腹胀、胃痛、消化不良、泄泻、便秘、热病无汗、体重肢肿、心痛、心烦
太白*（SP3）	在足内侧缘，当足大趾本节（第1趾跖关节）后下方赤白肉际凹陷处	胃痛、腹胀、腹痛、肠鸣、呕吐、泄泻、痢疾、便秘、痔疾、脚气、体重节痛
公孙*（SP4）	在足内侧缘，当第1跖骨基底部的前下方	胃痛、呕吐、饮食不化、肠鸣腹胀、腹痛、泄泻、痢疾、心烦失眠、水肿、发狂妄言、嗜卧、脚气
商丘（SP5）	在足内踝前下方凹陷中，当舟骨结节与内踝尖连线的中点	腹胀、肠鸣、泄泻、便秘、食不化、黄疸、怠惰嗜卧、癫狂、小儿癫痫、咳嗽、足踝痛、痔疾

续表

穴位	定　位	主　治
三阴交*（SP6）	在小腿内侧，当足内踝尖上3寸，胫骨内侧缘后方	肠鸣泄泻、腹胀、食不化、月经不调、崩漏、赤白带下、阴挺、经闭、痛经、难产、产后血晕、恶露不尽、遗精、阳痿、早泄、阴茎痛、疝气、水肿、小便不利、遗尿、足痿痹痛、脚气、失眠、湿疹、荨麻疹、高血压、神经性皮炎、不孕
漏谷（SP7）	在小腿内侧，当足内踝尖与阴陵泉的连线上，距内踝尖6寸，胫骨内侧缘后方	腹胀、肠鸣、腰膝厥冷、小便不利、遗精、下肢痿痹
地机（SP8）	在小腿内侧，当足内踝尖与阴陵泉的连线上，阴陵泉穴下3寸	腹痛、泄泻、小便不利、水肿、月经不调、遗精、腰痛不可俯仰、食欲不振
阴陵泉*（SP9）	在小腿内侧，当胫骨内侧踝后下方凹陷中	腹胀、水肿、小便不利或失禁、阴茎痛、妇人阴痛、遗精、膝痛、黄疸
血海*（SP10）	屈膝，在大腿内侧，髌底内侧端上2寸，当股四头肌内侧头的隆起处	月经不调、痛经、经闭、崩漏、瘾疹、皮肤瘙痒、丹毒、小便淋漓、股内侧痛
箕门（SP11）	在大腿内侧，当血海与冲门连线上，血海上6寸	小便不利、五淋、遗溺、腹股沟肿痛

续表

穴位	定　位	主　治
冲门（SP12）	在腹股沟外侧，距耻骨联合上缘中点3.5寸，当髂外动脉搏动处的外侧	腹痛、疝气、痔疾、崩漏、带下
府舍（SP13）	在下腹部，当脐中下4寸，冲门上方0.7寸，距前正中线4寸	腹痛、疝气、结聚
腹结（SP14）	在下腹部，大横下1.3寸，距前正中线4寸	腹痛、腹泻、大便秘结
大横*（SP15）	在腹中部，距脐中4寸	腹痛、腹泻、大便秘结
腹哀（SP16）	在上腹部，当脐中上3寸，距前正中线4寸	腹痛、泄泻、痢疾、便秘、消化不良
食窦（SP17）	在胸外侧部，当第5肋间隙，距前正中线6寸	胸胁胀痛、嗳气、反胃、腹胀、水肿
天溪（SP18）	在胸外侧部，当第4肋间隙，距前正中线6寸	胸痛、咳嗽、乳疖、乳汁少
胸乡（SP19）	在胸外侧部，当第3肋间隙，距前正中线6寸	胸胁胀痛
周荣（SP20）	在胸外侧部，当第2肋间隙，距前正中线6寸	胸胁胀痛、咳嗽、气喘、胁痛
大包（SP21）	在侧胸部腋中线上，当第6肋间隙处	胸胁胀满、咳嗽、气喘、胁肋痛、全身疼痛、四肢无力

【记忆小结 2】足太阴脾经穴位总图（如图2-28）。



图2-28　足太阴脾经穴位总图

【记忆重点】

（1）足太阴脾经所属穴位歌诀：

足太阴经脾中州，隐白在足大趾头，

大都太白公孙成，商丘三阴交可求，

漏谷地机阴陵泉，血海箕门冲门开，
府舍腹结大横排，腹哀食窦天溪连，
胸乡周荣大包尽，二十一穴太阴全。

（2）足太阴脾经穴位主治概要：

①膝以下穴位：脾胃病、小便病、水肿、生殖系病、局部病、神志病。

②股部穴位：生殖系病、皮肤病、局部病。

③胸、腹部穴位：局部病。

④尺泽、少商可镇静熄风开窍，用于急救。

五、手少阴心经所属穴位

1. 极泉（HT1）

［定位］在腋窝顶点，腋动脉搏动处（如图2-29）。

［主治］上肢不遂、心痛、胸闷、胁肋胀痛、瘰疬、肩臂疼痛、咽干烦渴。

［刺灸法］**避开腋动脉，**直刺或斜刺0.5～1寸；**不灸。**

2. 青灵（HT2）

［定位］在臂内侧，当极泉与少海的连线上，肘横纹上3寸，肱二头肌的内侧沟中（如图2-29）。

［主治］目黄、头痛、振



图2-29

寒、胁痛、肩臂痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

3. 少海（HT3）合穴

［定位］屈肘，当肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线之中点处（如图2-29）。

［主治］心痛、臂麻酸痛、手颤、健忘、暴喑、肘臂伸屈不利、瘰疬、腋胁痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

4. 灵道（HT4）经穴

［定位］在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧，腕横纹上1.5寸（如图2-30）。

［主治］心痛、心悸怔忡（zhēngchōng）、暴喑、舌强不语、头晕目眩、肘臂挛痛。

［刺灸法］直刺0.2～0.5寸；可灸。

5. 通里（HT5）络穴

［定位］在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧，腕横纹上1寸（如图2-30）。

［主治］暴喑、舌强不语、心悸怔忡、腕臂痛。

［刺灸法］直刺0.2～0.5



图2-30

寸；可灸。

6. 阴郄（HT6）郄穴

［定位］在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧，腕横纹上0.5寸（如图2-30）。

［主治］心痛、惊悸、心悸、吐血、衄血、失语、骨蒸盗汗。

［刺灸法］直刺0.2～0.5寸；可灸。

7. 神门（HT7）输穴；原穴

［定位］在腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷中（如图2-30）。

［主治］心痛、心烦、健忘失眠、惊悸怔忡、痴呆、癫狂痫证、目黄胁痛、掌中热、呕血、吐血、头痛、眩晕、失音。

［刺灸法］直刺0.2～0.5寸；可灸。

8. 少府（HT8）荥穴

［定位］在手掌面，第4、第5掌骨之间，握拳时当小指尖处（如图2-31）。

［主治］心悸、胸痛、小便不利、遗尿、阴痒、阴痛、手小指拘急、掌中热、善惊。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸。



图2-31

9. 少冲（HT9）井穴

［定位］在手小指末节桡侧，距指甲角0.1寸（如图2-31）。

［主治］心悸、心痛、癫狂、热病、中风昏迷、臂内后廉痛。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或点刺出血；可灸。

【记忆小结1】手少阴心经穴位一览表（如表2-6）。

表2-6　手少阴心经穴位一览表

穴位	定　位	主　治
极泉*（HT1）	在腋窝顶点，腋动脉搏动处	上肢不遂、心痛、胸闷、胁肋胀痛、瘰疬、肩臂疼痛、咽干烦渴
青灵（HT2）	在臂内侧，当极泉与少海的连线上，肘横纹上3寸，肱二头肌的内侧沟中	目黄、头痛、振寒、胁痛、肩臂痛
少海*（HT3）	屈肘，当肘横纹内侧端与肱骨内上髁连线之中点处	心痛、臂麻酸痛、手颤、健忘、暴喑、肘臂伸屈不利、瘰疬、腋胁痛
灵道（HT4）	在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧，腕横纹上1.5寸	心痛、心悸怔忡、暴喑、舌强不语、头晕目眩、肘臂挛痛
通里*（HT5）	在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧，腕横纹上1寸	暴喑、舌强不语、心悸怔忡、腕臂痛

续表

穴位	定　位	主　治
阴郄*（HT6）	在前臂掌侧，当尺侧腕屈肌腱的桡侧，腕横纹上0.5寸	心痛、惊恐、心悸、吐血、衄血、失语、骨蒸盗汗
神门*（HT7）	在腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷中	心痛、心烦、健忘失眠、惊悸怔忡、痴呆、癫狂痫证、目黄胁痛、掌中热、呕血、吐血、头痛、眩晕、失音
少府（HT8）	在手掌面，第4、第5掌骨之间，握拳时当小指尖处	心悸、胸痛、小便不利、遗尿、阴痒、阴痛、手小指拘急、掌中热、善惊
少冲（HT9）	在手小指末节桡侧，距指甲角0.1寸	心悸、心痛、癫狂、热病、中风昏迷、臂内后廉痛

【记忆小结2】手少阴心经穴位总图（如图2–32）。

【记忆重点】

（1）手少阴心经所属穴位歌诀：

九穴心经手少阴，极泉青灵少海深，

灵道通里阴郄遥，神门少府少冲存。

（2）手少阴心经穴位主治概要：

①极泉、青灵可治心胸病、局部病。

②肘以下部位可治心胸病、神志病、局部病，泻心经火热，治疗心经所过头面五官病。



图2-32　手少阴心经穴位总图

六、手太阳小肠经所属穴位

1. 少泽（SI1）井穴

［定位］在手小指末节尺侧，距指甲角0.1寸（如图

2-33）。

［主治］头痛、目翳、咽喉肿痛、乳痈、乳汁少、昏迷、热病、耳鸣、耳聋、肩臂外后侧疼痛。

［刺灸法］直刺0.2～0.4寸；可灸。

2. 前谷（SI2）荥穴

［定位］在手尺侧，微握拳，当小指本节（第5掌指关节）前的掌指横纹头赤白肉际（如图2-33）。



图2-33

［主治］热病汗不出、疟疾、癫狂、痫证、耳鸣、头痛、目痛、咽喉肿痛、乳少。

［刺灸法］直刺0.2～0.3寸；可灸。

3. 后溪（SI3）输穴、八脉交会穴（通于督脉）

［定位］在手掌尺侧，微握拳，当小指本节（第5指掌关节）后的远侧掌横纹头赤白肉际（如图2-33）。

［主治］头项强痛、耳聋、热病、疟疾、癫狂、痫证、盗汗、目眩、目赤、咽喉肿痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

4. 腕骨（SI4）原穴

［定位］在手掌尺侧，当第5掌骨基底与钩骨之间的凹陷处，赤白肉际（如图2-33）。

［主治］头痛、项强、耳鸣耳聋、目翳、指挛臂痛、热病汗不出、疟疾、胁痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

5. 阳谷（SI5）经穴

［定位］在手腕尺侧，当尺骨茎突与三角骨之间的凹陷处（如图2-33）。

［主治］头痛、目眩、耳鸣、耳聋、热病、癫狂痫、腕痛。

［刺灸法］直刺或斜刺0.5～0.8寸；可灸。

6. 养老（SI6）郄穴

［定位］在前臂背面尺侧，当尺骨小头近端桡侧凹陷中（如图2-34）。

［主治］目视不明、肩臂疼痛。

［刺灸法］直刺或斜刺0.5～0.8寸；可灸。



图2-34

7. 支正（SI7）络穴

［定位］在前臂背面尺侧，当阳谷与小海的连线上，腕背横纹上5寸（如图2-34）。

［主治］项强、肘挛、手指痛、头痛、热病、目眩、好笑善忘、消渴。

［刺灸法］直刺0.3～0.8寸；可灸。

8. 小海（SI8）合穴

［定位］在肘内侧，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处（如图2-34）。

［主治］肘臂疼痛、癫痫、耳鸣、耳聋。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

9. 肩贞（SI9）

［定位］在肩关节后下方，臂内收时，腋后纹头上1寸（指寸）（如图2-35）。

［主治］肩胛痛、手臂麻木、上肢不举、缺盆中痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

10. 臑俞（SI10）

［定位］在肩部，当腋后横纹直上，肩胛冈下缘凹陷中（如图2-35）。



图2-35

［主治］肩臂疼痛、瘰疬。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

11. 天宗（SI11）

［定位］在肩胛部，当冈下窝中央凹陷处，与第4胸椎相平（如图2-35）。

［主治］肩胛疼痛、肘臂后外侧疼痛、气喘、乳痈。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

12. 秉风（SI12）

［定位］在肩胛部冈上窝中央，天宗直上，举臂有凹陷处（如图2-35）。

［主治］肩臂疼痛、上肢酸麻。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

13. 曲垣（yuán）（SI13）

［定位］在肩胛部，冈上窝内侧端，当肩俞与第2胸椎棘突连线的中点处（如图2-35）。

［主治］肩胛部疼痛、拘挛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

14. 肩外俞（SI14）

［定位］在背部，当第1胸椎棘突下，旁开3寸（如图2-35）。

［主治］肩背酸痛、颈项强急。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

15. 肩中俞（SI15）

［定位］在背部，当第7颈椎棘突下，旁开2寸（如图

2-35）。

［主治］肩背疼痛、咳嗽、哮喘。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

16. 天窗（SI16）

［定位］在颈外侧部，胸锁乳突肌的后缘，扶突后，与喉结相平（如图2-36）。

［主治］耳鸣、耳聋、咽喉肿痛、颈项强痛、暴喑、瘾疹、癫狂。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。



图2-36

17. 天容（SI17）

［定位］在颈外侧部，当下颌角的后方，胸锁乳突肌的前缘凹陷中（如图2-36）。

［主治］耳鸣、耳聋、咽喉肿痛、颈项强痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

18. 颧髎（SI18）

［定位］在面部，当目外眦直下，颧骨下缘凹陷处（如图2-37）。

［主治］口眼㖞斜、眼睑瞤动、齿痛、唇肿。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸，或斜刺0.5～1寸；可灸。

19. 听宫（SI19）

［定位］在面部，耳屏前，下颌骨髁状突的后方，张口时呈凹陷处（如图2-37）。

［主治］耳鸣、耳聋、聍（tīng）耳、齿痛、癫狂病。

［刺灸法］张口，直刺0.5～1寸；可灸。



图2-37

【记忆小结1】手太阳小肠经穴位一览表（如表2-7）。

表2-7　手太阳小肠经穴位一览表

穴位	定　位	主　治
少泽*（SI1）	在手小指末节尺侧，距指甲角0.1寸	头痛、目翳、咽喉肿痛、乳痈、乳汁少、昏迷、热病、耳鸣、耳聋、肩臂外后侧疼痛

续表

穴位	定位	主治
前谷（SI2）	在手尺侧，微握拳，当小指本节（第5掌指关节）前的掌指横纹头赤白肉际	热病汗不出、疟疾、癫狂、痫证、耳鸣、头痛、目痛、咽喉肿痛、乳少
后溪*（SI3）	在手掌尺侧，微握拳，当小指本节（第5指掌关节）后的远侧掌横纹头赤白肉际	头项强痛、耳聋、热病、疟疾、癫狂、痫证、盗汗、目眩、目赤、咽喉肿痛
腕骨*（SI4）	在手掌尺侧，当第5掌骨基底与钩骨之间的凹陷处，赤白肉际	头痛、项强、耳鸣耳聋、目翳、指挛臂痛、热病汗不出、疟疾、胁痛
阳谷（SI5）	在手腕尺侧，当尺骨茎突与三角骨之间的凹陷处	头痛、目眩、耳鸣、耳聋、热病、癫狂痫、腕痛
养老（SI6）	在前臂背面尺侧，当尺骨小头近端桡侧凹陷中	目视不明、肩臂疼痛
支正*（SI7）	在前臂背面尺侧，当阳谷与小海的连线上，腕背横纹上5寸	项强、肘挛、手指痛、头痛、热病、目眩、好笑善忘、消渴
小海*（SI8）	在肘内侧，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间凹陷处	肘臂疼痛、癫痫、耳鸣、耳聋
肩贞（SI9）	在肩关节后下方，臂内收时，腋后纹头上1寸（指寸）	肩胛痛、手臂麻木、上肢不举、缺盆中痛
臑俞（SI10）	在肩部，当腋后横纹直上，肩胛冈下缘凹陷中	肩臂疼痛、瘰疬

续表

穴位	定　位	主　治
天宗*（SI11）	在肩胛部，当冈下窝中央凹陷处，与第4胸椎相平	肩胛疼痛、肘臂后外侧疼痛、气喘、乳痈
秉风（SI12）	在肩胛部冈上窝中央，天宗直上，举臂有凹陷处	肩臂疼痛、上肢酸麻
曲垣（SI13）	在肩胛部，冈上窝内侧端，当肺俞与第2胸椎棘突连线的中点处	肩胛部疼痛、拘挛
肩外俞*（SI14）	在背部，当第1胸椎棘突下，旁开3寸	肩背酸痛、颈项强急
肩中俞（SI15）	在背部，当第7颈椎棘突下，旁开2寸	肩背疼痛、咳嗽、哮喘
天窗（SI16）	在颈外侧部，胸锁乳突肌的后缘，扶突后，与喉结相平	耳鸣、耳聋、咽喉肿痛、颈项强痛、暴喑、瘿瘿、癫狂
天容（SI17）	在颈外侧部，当下颌角的后方，胸锁乳突肌的前缘凹陷中	耳鸣、耳聋、咽喉肿痛、颈项强痛
颧髎*（SI18）	在面部，当目外眦直下，颧骨下缘凹陷处	口眼㖞斜、眼睑瞤动、齿痛、唇肿
听宫*（SI19）	在面部，耳屏前，下颌骨髁状突的后方，张口时呈凹陷处	耳鸣、耳聋、聤耳、齿痛、癫狂痫

【记忆小结2】手太阳小肠经穴位总图（如图

2–38）。



图2–38　手太阳小肠经穴位总图

【记忆重点】

（1）手太阳小肠经所属穴位歌诀：

手太阳穴一十九，少泽前谷后溪数，

腕骨阳谷养老强，支正小海外辅肘，
肩贞臑俞接天宗，臑外秉风曲垣首，
肩外俞连肩中俞，天窗巧与天容偶，
锐骨之尖上颧髎，听宫耳前珠上走。

（2）手太阳小肠经穴位主治概要：

①腕以下穴位：小肠经所过头面五官病、热病、部分神志病、项强、局部病（少泽通乳）。

②腕至肘的穴位：热病、头目疾患、面颊病、上肢病、癫狂痫、局部病变。

③肩周围及颈项、头面穴位：局部病变。

七、足太阳膀胱经所属穴位

1. 睛明（BL1）

［定位］在面部，目内眦角稍上方凹陷处（如图2-39）。



图2-39

［主治］目赤肿痛、迎风流泪、胬（nǔ）肉攀睛、视物不明、近视、夜盲、目翳。

［刺灸法］嘱闭目，医者左手轻推眼球向外侧固定，左手缓慢进针，紧靠眶缘直刺0.3～0.5寸；不宜灸。针刺本穴容易引起内出血，出针后需用消毒干棉球按压片刻。不捻转，不提插(或只轻微地

捻转和提插)。

2. 攒（cuán）竹（BL2）

［定位］在面部，当眉头凹陷中，眶上切迹处（如图2–39）。

［主治］前额痛、眉棱骨痛、目眩、目视不明、目赤肿痛、近视、眼睑瞤动、面瘫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；不宜灸。

3. 眉冲（BL3）

［定位］在头部，当攒竹直上入发际0.5寸，神庭与曲差连线之间（如图2–40）。

［主治］痛证、头痛、眩晕、目视不明、鼻塞。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；不宜灸。



图2–40

4. 曲差（BL4）

［定位］在头部，当前发际正中直上0.5寸，旁开1.5寸，即神庭与头维连线的内1/3与中1/3交点上（如图

2—40）。

［主治］头痛、眩晕、目视不明、目痛、鼻塞。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

5. 五处（BL5）

［定位］在头部，当前发际正中直上1寸，旁开1.5寸（如图2—40）。

［主治］头痛、目眩、目视不明。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

6. 承光（BL6）

［定位］在头部，当前发际正中直上2.5寸，旁开1.5寸（如图2—40）。

［主治］头痛、目眩、呕吐烦心、目视不明、鼻塞多涕、癫痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

7. 通天（BL7）

［定位］在头部，当前发际正中直上4寸，旁开1.5寸（如图2—40）。

［主治］头痛、头重、眩晕、鼻塞、鼻渊。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

8. 络却（BL8）

［定位］在头部，当前发际正中直上5.5寸，旁开1.5寸（如图2—40）。

［主治］眩晕、耳鸣、鼻塞、癫狂、痛证、目视不明。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

9. 玉枕（BL9）

［定位］在后头部，当后发际正中直上2.5寸，旁开1.3寸，平枕外隆凸上缘的凹陷处（如图2-41）。



图2-41

［主治］头痛、目痛、鼻塞、呕吐。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

10. 天柱（BL10）

［定位］在项部，大筋（斜方肌）外缘之后发际凹陷中，约当后发际正中旁开1.3寸（如图2-41）。

［主治］头痛、项强、眩晕、目赤肿痛、肩背痛、鼻塞。

［刺灸法］直刺或斜刺0.5～0.8寸，**不可向内上方深刺**；可灸。

11. 大杼（zhù）（BL11）八会穴之骨会

［定位］在背部，当第1胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］咳嗽、发热、头痛、肩背痛、颈项拘急。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。**本经背部诸穴不宜深刺，以免伤及内部重要脏器。**

12. 风门（BL12）



图2-42

［定位］在背部，当第2胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］伤风咳嗽、发热头痛、目眩、项强、胸背

痛、鼻塞多涕。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

13. 肺俞（BL13）肺背俞穴

［定位］在背部，当第3胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2—42）。

［主治］咳嗽、气喘、胸满、背痛、潮热、盗汗、骨蒸、吐血、鼻塞。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸，不宜深刺，以免伤及内部重要脏器；可灸。

14. 厥阴俞（BL14）心包背俞穴

［定位］在背部，当第4胸椎棘突下、旁开1.5寸（如图2—42）。

［主治］心痛、心悸、胸闷、咳嗽、呕吐。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；不宜深刺，以免伤及内部重要脏器；可灸。

15. 心俞（BL15）心背俞穴

［定位］在背部，当第5胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2—42）。

［主治］癫狂、痫证、惊悸、失眠、健忘、心烦、咳嗽、吐血、梦遗、心痛、胸背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸，不宜深刺，以免伤及内部重要脏器；可灸。

16. 督俞（BL16）

［定位］在背部，当第6胸椎棘突下，旁开1.5寸（如

图2-42）。

［主治］心痛、腹痛、腹胀、肠鸣、呃逆。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；**不宜深刺，以免伤及内部重要脏器**；可灸。

17. 膈俞（BL17）八会穴之血会

［定位］在背部，当第7胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］胃脘痛、呕吐、呃逆、饮食不下、咳嗽、吐血、潮热、盗汗。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；**不宜深刺，以免伤及内部重要脏器**；可灸。

18. 肝俞（BL18）肝背俞穴

［定位］在背部，当第9胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］黄疸、胁痛、吐血、目赤、目视不明、眩晕、夜盲、癫狂、痫证、背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸，**不宜深刺，以免伤及内部重要脏器**；可灸。

19. 胆俞（BL19）胆背俞穴

［定位］在背部，当第10胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］黄疸、胁痛、呕吐、食不化、口苦。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；**不宜深刺，以免伤及内部重要脏器**；可灸。

20. 脾俞（BL20）脾背俞穴

［定位］在背部，当第11胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］腹胀、泻泄、呕吐、胃痛、消化不良、水肿、背痛、黄疸。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

21. 胃俞（BL21）胃背俞穴

［定位］在背部，当第12胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］胃脘痛、腹胀、呕吐、完谷不化、肠鸣、胸胁痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

22. 三焦俞（BL22）三焦背俞穴

［定位］在腰部，当第1腰椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］胃脘痛、腹胀、呕吐、完谷不化、肠鸣、胸胁痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

23. 肾俞（BL23）肾背俞穴

［定位］在腰部，当第2腰椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］遗精、阳痿、早泄、不孕、不育、遗尿、月经不调、白带、腰背酸痛、头昏、耳鸣、耳聋、小便不利、水肿、咳喘少气。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

24. 气海俞（BL24）

［定位］在腰部，当第3腰椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］腰痛、痛经、肠鸣、痔疾。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

25. 大肠俞（BL25）大肠背俞穴

［定位］在腰部，当第4腰椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］腰脊疼痛、腹痛、腹胀、泻泄、便秘、痢疾。

［刺灸法］直刺0.5～1.2寸；可灸。

26. 关元俞（BL26）

［定位］在腰部，当第5腰椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-42）。

［主治］腹胀、泻泄、小便不利、遗尿、消渴、腰痛。

［刺灸法］直刺0.5～1.2寸；可灸。

27. 小肠俞(BL27) 小肠背俞穴

［定位］在骶部，当骶正中嵴（jǐ）旁1.5寸，平第1骶后孔（如图2-42）。

［主治］遗精、遗尿、白带、小腹胀痛、泻泄、痢疾、腰腿痛。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

28. 膀胱俞（BL28）膀胱背俞穴

［定位］在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第2骶后孔（如图2-42）。

［主治］遗尿、遗精、小便不利、泻泄、腰骶部疼痛。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

29. 中髎（lǎo）俞（BL29）

［定位］在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第3骶后孔（如图2-42）。

［主治］腰脊痛、消渴、痢疾。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

30. 白环俞（BL30）

［定位］在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第4骶后孔（如图2-42）。

［主治］腰腿痛、白带、遗精、月经不调。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

31. 上髎（BL31）

［定位］在骶部，当髂后上棘与后正中线之间，适对第1骶后孔处（如图2-42）。

［主治］腰痛、月经不调、带下、遗精、阳痿、大小便不利。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

32. 次髎（BL32）

［定位］在骶部，当髂后上棘内下方，适对第2骶后孔处（如图2-42）。

［主治］腰痛、月经不调、痛经、小便不利、遗精、遗尿、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

33. 中髎（BL33）

［定位］在骶部，当次髎下内方，适对第3骶后孔处（如图2-42）。

［主治］腰痛、月经不调、小便不利、赤白带下、便秘。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

34. 下髎（BL34）

［定位］在骶部，当中髎下内方，适对第4骶后孔处（如图2-42）。

［主治］腰痛、小便不利、肠鸣、便秘、小腹痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

35. 会阳（BL35）

［定位］在骶部，尾骨尖旁开0.5寸（如图2-42）。

［主治］阳痿，遗精、带下、痢疾、泻泄、痔疾。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

36. 承扶（BL36）

［定位］在大腿后面，臀下横纹的中点（如图2-43）。

［主治］腰骶臀股部疼痛、痔疾。

［刺灸法］直刺1～2.5寸；可灸。

37. 殷门（BL37）

［定位］在大腿后面，承扶与委中连线上，承扶下6寸（如图2—43）。

［主治］腰腿痛、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。



图2—43

38. 浮郄（BL38）

［定位］在腘横纹外侧端，委阳上1寸，股二头肌腱内侧（如图2—43）。

［主治］膝腘部疼痛、麻木、挛急。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

39. 委阳（BL39）三焦下合穴

［定位］在腘横纹外侧端，当股二头肌腱的内侧（如图2—43）。

［主治］腹满、小便不利、腰脊强痛、下肢挛痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

40. 委中（BL40）合穴、膀胱下合穴

［定位］在腘横纹中点，当股二头肌腱与半腱肌腱的中间（如图2—43）。

［主治］腰痛、下肢痿痹、中风昏迷、半身不遂、腹痛、呕吐、腹泻、小便不利、遗尿、丹毒。

［刺灸法］直刺1~1.5寸，或用三棱针点刺咽静脉出血。

41. 附分（BL41）

［定位］在背部，当第2胸椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。



图2-44

［主治］肩背拘急、颈项强痛、肘臂麻木。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

42. 魄户（BL42）

［定位］在背部，当第3胸椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。

［主治］咳嗽、气喘、肺结核、肩背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

43. 膏肓（BL43）

［定位］在背部，当第4胸椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。

［主治］咳嗽、气喘、吐血、盗汗、肺结核、健忘、遗精、肩胛背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

44. 神堂（BL44）

［定位］在背部，当第5胸椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。

［主治］咳嗽、气喘、胸闷、背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

45. 噫嘻（yīxī）（BL45）

［定位］在背部，当第6胸椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。

［主治］咳嗽、气喘、肩背痛、疟疾、热病。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

46. 膈关（BL46）

［定位］在背部，当第7胸椎棘突下，旁开3寸（如图2—44）。

［主治］呕吐、嗳气、食不下、胸闷、脊背强痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

47. 魂门（BL47）

［定位］在背部，当第9胸椎棘突下，旁开3寸（如图2—44）。

［主治］胸胁痛、呕吐、背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

48. 阳纲（BL48）

［定位］在背部，当第10胸椎棘突下，旁开3寸（如图2—44）。

［主治］肠鸣、泻泄、黄疸、消渴、腹痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

49. 意舍（BL49）

［定位］在背部，当第11胸椎棘突下，旁开3寸（如图2—44）。

［主治］腹胀、肠鸣、呕吐、食不下。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

50. 胃仓（BL50）

［定位］在背部，当第12胸椎棘突下，旁开3寸（如图2—44）。

［主治］胃脘痛、腹胀、消化不良、水肿、背痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

51. 肓门（BL51）

［定位］在腰部，当第1腰椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。

［主治］腹痛、便秘、痞块、乳疾。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

52. 志室（BL52）

［定位］在腰部，当第2腰椎棘突下，旁开3寸（如图2-44）。

［主治］遗精、阳痿、阴痛、小便不利、水肿、腰脊强痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

53. 胞肓（BL53）

［定位］在臀部，平第2骶后孔，骶正中嵴旁开3寸（如图2-44）。

［主治］肠鸣、腹胀、腰痛、小便不利、阴肿。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

54. 秩（zhi）边（BL54）

［定位］在臀部，平第4骶后孔，骶正中嵴旁开3寸（如图2-44）。

［主治］腰腿痛、下肢痿痹、阴痛、痔疾。

［刺灸法］直刺1.5～3寸；可灸。

55. 合阳（BL55）

［定位］在小腿后面，当委中与承山的连线上，委中下2寸（如图2-45）。

［主治］腰脊强痛、下肢痿痹、疝气、崩漏。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

56. 承筋（BL56）

［定位］在小腿后面，当委中与承山的连线上，腓肠肌肌腹中央，委中下5寸（如图2-45）。

［主治］小腿痛、霍乱转筋、痔疾、腰背拘急。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

57. 承山（BL57）

［定位］在小腿后面正中，委中与昆仑之间，当伸直小腿或足上提时腓肠肌肌腹下出现尖角凹陷处（如图2-45）。



图2-45

［主治］腰背痛、小腿转筋、痔疾、便秘、腹痛、疝气。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

58. 飞扬（BL58）络穴

［定位］在小腿后面，当外踝后昆仑直上7寸，承山外下方1寸处（如图2-45）。

［主治］头痛、目眩、鼻塞、腰背痛、腿软无力、痔

瘘（lòu）、癫狂。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

59. 附阳（BL59）阳跷郄穴

［定位］在小腿后面，当外踝后昆仑直上3寸（如图2-45）。

［主治］头重、头痛、腰腿痛、下肢瘫痪、外踝红肿。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

60. 昆仑（BL60）经穴

［定位］在足部外踝后方，当外踝尖与跟腱之间凹陷处（如图2-46）。

［主治］头痛、项强、目眩、鼻衄、疟疾、肩背拘



图2-46

急、腰痛、脚跟痛、小儿痫证、难产。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸，可灸。

61. 仆（pú）参（BL61）

［定位］在足外踝部后下方，昆仑穴直下，跟骨外侧赤白肉际处（如图2-46）。

［主治］下肢痿痹、足跟痛、霍乱转筋、癫痫、脚气、膝肿。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

62. 申脉（BL62）八脉交会穴（通阳蹻脉）

［定位］在足外侧部，外踝直下方凹陷中（如图2-46）。

［主治］痫证、癫狂、头痛、失眠、眩晕、腰痛、目赤痛、项强。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

63. 金门（BL63）郄穴

［定位］在足外侧，当外踝前缘直下，骰（t ó u）骨下缘处（如图2-46）。

［主治］癫痫、小儿惊风、腰痛、下肢痹痛。

［刺灸法］直刺0.2～0.4寸；可灸。

64. 京骨（BL64）原穴

［定位］在足外侧，第5跖骨粗隆下方，赤白肉际处（如图2-46）。

［主治］头痛、项强、腰腿痛、目翳、癫痫。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

65. 束骨（BL65）输穴

［定位］在足外侧，足小趾本节（第5跖趾关节）的后方，赤白肉际处（如图2-46）。

［主治］头痛、项强、目眩、癫狂、腰背痛、下肢后侧痛。

［刺灸法］直刺0.2～0.5寸；可灸。

66. 足通谷（BL66）荥穴

［定位］在足外侧，足小趾本节（第5跖趾关节）的前方，赤白肉际处（如图2—46）。

［主治］头痛、项强、目眩、鼻衄、癫狂。

［刺灸法］直刺0.2～0.3寸；可灸。

67. 至阴（BL67）井穴

［定位］在足小趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（指寸）（如图2—46）。

［主治］头痛、鼻塞、鼻衄、目痛、胞衣不下、胎位不正、难产。

［刺灸法］浅刺0.1寸。胎位不正用灸法。

【记忆小结1】足太阳膀胱经穴位一览表（见表2-8）。

表2-8 足太阳膀胱经穴位一览表

穴位	定位	主治
睛明*（BL1）	在面部，目内眦角稍上方凹陷处	目赤肿痛、迎风流泪、胬肉攀睛、视物不明、近视、夜盲、目翳
攒竹*（BL2）	在面部，当眉头凹陷中，眶上切迹处	前额痛，眉棱骨痛、目眩、目视不明、目赤肿痛、近视、眼睑润动、面瘫

续表

穴位	定位	主治
眉冲（BL3）	在头部，当攒竹直上入发际0.5寸，神庭与曲差连线之间	痫证、头痛、眩晕、目视不明、鼻塞
曲差（BL4）	在头部，当前发际正中直上0.5寸，旁开1.5寸，即神庭与头维连线的内1/3与中1/3交点上	头痛、眩晕、目视不明、目痛、鼻塞
五处（BL5）	在头部，当前发际正中直上1寸，旁开1.5寸	头痛、目眩、目视不明
承光*（BL6）	在头部，当前发际正中直上2.5寸，旁开1.5寸	头痛、目眩、呕吐烦心、目视不明、鼻塞多涕、癫痫
通天（BL7）	在头部，当前发际正中直上4寸，旁开1.5寸	头痛、头重、眩晕、鼻塞、鼻渊
络却（BL8）	在头部，当前发际正中直上5.5寸，旁开1.5寸	眩晕、耳鸣、鼻塞、癫狂、痫证、目视不明
玉枕（BL9）	在后头部，当后发际正中直上2.5寸，旁开1.3寸，平枕外隆凸上缘的凹陷处	头痛、目痛、鼻塞、呕吐
天柱*（BL10）	在项部，大筋（斜方肌）外缘之后发际凹陷中，约当后发际正中旁开1.3寸	头痛、项强、眩晕、目赤肿痛、肩背痛、鼻塞
大杼*（BL11）	在背部，当第1胸椎棘突下，旁开1.5寸	咳嗽、发热、头痛、肩背痛、颈项拘急

续表

穴位	定位	主治
风门*（BL12）	在背部，当第2胸椎棘突下，旁开1.5寸	伤风咳嗽、发热头痛、目眩、项强、胸背痛、鼻塞多涕
肺俞*（BL13）	在背部，当第3胸椎棘突下，旁开1.5寸	咳嗽、气喘、胸满、背痛、潮热、盗汗、骨蒸、吐血、鼻塞
厥阴俞（BL14）	在背部，当第4胸椎棘突下，旁开1.5寸	心痛、心悸、胸闷、咳嗽、呕吐
心俞*（BL15）	在背部，当第5胸椎棘突下，旁开1.5寸	癫狂、痫证、惊悸、失眠、健忘、心烦、咳嗽、吐血、梦遗、心痛、胸背痛
督俞（BL16）	在背部，当第6胸椎棘突下，旁开1.5寸	心痛、腹痛、腹胀、肠鸣、呃逆
膈俞*（BL17）	在背部，当第7胸椎棘突下，旁开1.5寸	胃脘痛、呕吐、呃逆、饮食不下、咳嗽、吐血、潮热、盗汗
肝俞*（BL18）	在背部，当第9胸椎棘突下，旁开1.5寸	黄疸、胁痛、吐血、目赤、目视不明、眩晕、夜盲、癫狂、痫证、背痛
胆俞*（BL19）	在背部，当第10胸椎棘突下，旁开1.5寸	黄疸、胁痛、呕吐、食不化、口苦
脾俞*（BL20）	在背部，当第11胸椎棘突下，旁开1.5寸	腹胀、泻泄、呕吐、胃痛、消化不良、水肿、背痛、黄疸

续表

穴位	定位	主治
胃俞*（BL21）	在背部，当第12胸椎棘突下，旁开1.5寸	胃脘痛、腹胀、呕吐、完谷不化、肠鸣、胸胁痛
三焦俞*（BL22）	在腰部，当第1腰椎棘突下，旁开1.5寸	胃脘痛、腹胀、呕吐、完谷不化、肠鸣、胸胁痛
肾俞*（BL23）	在腰部，当第2腰椎棘突下，旁开1.5寸	遗精、阳痿、早泄、不孕、不育、遗尿、月经不调、白带、腰背酸痛、头昏、耳鸣、耳聋、小便不利、水肿、咳喘少气
气海俞（BL24）	在腰部，当第3腰椎棘突下，旁开1.5寸	腰痛、痛经、肠鸣、痔疾
大肠俞*（BL25）	在腰部，当第4腰椎棘突下，旁开1.5寸	腰脊疼痛、腹痛、腹胀、泻泄、便秘、痢疾
关元俞（BL26）	在腰部，当第5腰椎棘突下，旁开1.5寸	腹胀、泻泄、小便不利、遗尿、消渴、腰痛
小肠俞*（BL27）	在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第1骶后孔	遗精、遗尿、白带、小腹胀痛、泻泄、痢疾、腰腿痛
膀胱俞*（BL28）	在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第2骶后孔	遗尿、遗精、小便不利、泻泄、腰骶部疼痛
中膂俞（BL29）	在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第3骶后孔	腰脊痛、消渴、痢疾
白环俞（BL30）	在骶部，当骶正中嵴旁1.5寸，平第4骶后孔	腰腿痛、白带、遗精、月经不调
上髎（BL31）	在骶部，当髂后上棘与后正中线之间，适对第1骶后孔处	腰痛、月经不调、带下、遗精、阳痿、大小便不利

续表

穴位	定位	主治
次髎*（BL32）	在骶部，当髎后上棘内下方，适对第2骶后孔处	腰痛、月经不调、痛经、小便不利、遗精、遗尿、下肢痿痹
中髎（BL33）	在骶部，当次髎下内方，适对第3骶后孔处	腰痛、月经不调、小便不利、赤白带下、便秘
下髎（BL34）	在骶部，当中髎下内方，适对第4骶后孔处	腰痛、小便不利、肠鸣、便秘、小腹痛
会阳（BL35）	在骶部，尾骨尖旁开0.5寸	阳痿，遗精、带下、痢疾、泻泄、痔疾
承扶*（BL36）	在大腿后面，臀下横纹的中点	腰骶臀股部疼痛、痔疾
殷门（BL37）	在大腿后面，承扶与委中连线上，承扶下6寸	腰腿痛、下肢痿痹
浮郄（BL38）	在胭横纹外侧端，委阳上1寸，股二头肌腱内侧	膝胭部疼痛、麻木、挛急
委阳（BL39）	在胭横纹外侧端，当股二头肌腱的内侧	腹满、小便不利、腰脊强痛、下肢挛痛
委中*（BL40）	在胭横纹中点，当股二头肌腱与半腱肌腱的中间	腰痛、下肢痿痹、中风昏迷、半身不遂、腹痛、呕吐、腹泻、小便不利、遗尿、丹毒
附分（BL41）	在背部，当第2胸椎棘突下，旁开3寸	肩背拘急、颈项强痛、肘臂麻木
魄户（BL42）	在背部，当第3胸椎棘突下，旁开3寸	咳嗽、气喘、肺结核、肩背痛

续表

穴位	定位	主治
膏肓*（BL43）	在背部，当第4胸机棘突下，旁开3寸	咳嗽、气喘、吐血、盗汗、肺结核、健忘、遗精、肩胛背痛
神堂（BL44）	在背部，当第5胸椎棘突下，旁开3寸	咳嗽、气喘、胸闷、背痛
噫嘻（BL45）	在背部，当第6胸椎棘突下，旁开3寸	咳嗽、气喘、肩背痛、疟疾、热病
膈关（BL46）	在背部，当第7胸椎棘突下，旁开3寸	呕吐、嗳气、食不下、胸闷、脊背强痛
魂门（BL47）	在背部，当第9胸椎棘突下，旁开3寸	胸胁痛、呕吐、背痛
阳纲（BL48）	在背部，当第10胸椎棘突下，旁开3寸	肠鸣、泻泄、黄疸、消渴、腹痛
意舍（BL49）	在背部，当第11胸椎棘突下，旁开3寸	腹胀、肠鸣、呕吐、食不下
胃仓（BL50）	在背部，当第12胸椎棘突下，旁开3寸	胃脘痛、腹胀、消化不良、水肿、背痛
肓门（BL51）	在腰部，当第1腰椎棘突下，旁开3寸	腹痛、便秘、痞块、乳疾
志室*（BL52）	在腰部，当第2腰椎棘突下，旁开3寸	遗精、阳痿、阴痛、小便不利、水肿、腰脊强痛
胞肓（BL53）	在臀部，平第2骶后孔，骶正中嵴旁开3寸	肠鸣、腹胀、腰痛、小便不利、阴肿

续表

穴位	定位	主治
秩边*（BL54）	在臀部，平第4骶后孔，骶正中嵴旁开3寸	腰腿痛、下肢痿痹、阴痛、痔疾
合阳（BL55）	在小腿后面，当委中与承山的连线上，委中下2寸	腰脊强痛、下肢痿痹、疝气、崩漏
承筋（BL56）	在小腿后面，当委中与承山的连线上，腓肠肌肌腹中央，委中下5寸	小腿痛、霍乱转筋、痔疾、腰背拘急
承山*（BL57）	在小腿后面正中，委中与昆仑之间，当伸直小腿或足上提时腓肠肌肌腹下出现尖角凹陷处	腰背痛、小腿转筋、痔疾、便秘、腹痛、疝气
飞扬（BL58）	在小腿后面，当外踝后昆仑直上7寸，承山外下方1寸处	头痛、目眩、鼻塞、腰背痛、腿软无力、痔瘘、癫狂
跗阳（BL59）	在小腿后面，当外踝后昆仑直上3寸	头重、头痛、腰腿痛、下肢瘫痪、外踝红肿
昆仑*（BL60）	在足部外踝后方，当外踝尖与跟腱之间凹陷处	头痛、项强、目眩、鼻衄、疟疾、肩背拘急、腰痛、脚跟痛、小儿痫证、难产
仆参（BL61）	在足外踝部后下方，昆仑穴直下，跟骨外侧赤白肉际处	下肢痿痹、足跟痛、霍乱转筋、癫痫、脚气、膝肿
申脉*（BL62）	在足外侧部，外踝直下方凹陷中	痫证、癫狂、头痛、失眠、眩晕、腰痛、目赤痛、项强

续表

穴位	定位	主治
金门（BL63）	在足外侧，当外踝前缘直下，骰骨下缘处	癫痫、小儿惊风、腰痛、下肢痹痛
京骨（BL64）	在足外侧，第5跖骨粗隆下方，赤白肉际处	头痛、项强、腰腿痛、目翳、癫痫
束骨（BL65）	在足外侧，足小趾本节（第5跖趾关节）的后方，赤白肉际处	头痛、项强、目眩、癫狂、腰背痛、下肢后侧痛
足通谷（BL66）	在足外侧，足小趾本节（第5跖趾关节）的前方，赤白肉际处	头痛、项强、目眩、鼻衄、癫狂
至阴*（BL67）	在足小趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（指寸）	头痛、鼻塞、鼻衄、目痛、胞衣不下、胎位不正、难产

【记忆小结 2 】足太阳膀胱经穴位总图（如图2–47、图2–48）。



图2–47　足太阳膀胱经穴位总图之1



图2-48　足太阳膀胱经穴位总图之2

【记忆重点】

（1）足太阳膀胱经所属穴位歌诀：

足太阳穴六十七，睛明内眦陷中取，
攒竹眉冲与曲差，五处等半上承光，
通天络却玉枕后，天柱后际大筋旁，
第一大杼二风门，三椎肺俞四厥阴，
心五督六膈俞七，九肝十胆仔细寻，
十一脾俞十二胃，十三三焦十四肾，
十五气海肠十六，七八关元小肠分，
十九膀胱廿（nian）中膂，廿一椎旁白环生，
上髎次髎中复下，八髎骶后八孔当，
会阳尾骨端外取，附分扶脊第二行，
魄户膏肓及神堂，噫嗜膈关魂门当，
阳纲意舍与胃仓，肓门志室续胞肓，
二十一椎秩边场，承扶臀横纹中央，
殷门浮郄到委阳，委中合阳承筋乡，
承山飞扬踝跗阳，昆仑仆参申脉忙，
金门京骨束骨接，通谷至阴小趾旁。

（2）足太阳膀胱经穴位主治概要：

①头面部穴位：局部就近组织兵变为主，神志病变。

②脊背部穴位：相应脏腑病，局部病变，脊背病；俞穴：本脏腑及所开之窍的病变。

③腰骶穴位：相应脏腑、腰腿痛。

④大腿穴位：下肢病、二便病、腰脊痛。

⑤小腿穴：腰脊、下肢病变、大便病、抽搐。

⑥足部穴位：神志病，经脉循行部位病（头、目、鼻病），疟疾，部分妇产科病。

八、足少阴肾经所属穴位

1. 涌泉（KI1）井穴

［定位］在足底部，卷足时足前部凹陷处，约当足底第2、第3趾趾缝纹头端与足跟连线的前1/3与后2/3交点上（如图2-49）。



图2-49

［主治］头痛、头晕、小便不利、便秘、小儿惊风、足心热、癫证、昏厥。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

2. 然谷（KI2）荥穴

［定位］在足内侧缘，足舟骨粗隆下方，赤白肉际（如图2-50）。



图2-50

［主治］月经不调、带下、遗精、小便不利、泻泄、胸胁胀痛、咳血、小儿脐风、口噤不开、黄疸、下肢痿痹、足跗痛。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

3. 太溪（KI3）输穴；原穴

［定位］在足内侧内踝后方，当内踝尖与跟腱之间的凹陷处（如图2-50）。

［主治］头痛目眩、咽喉肿痛、齿痛、耳聋、气喘、胸痛咯血、消渴、月经不调、失眠、健忘、遗精、阳痿、小便频数、腰脊痛、下肢厥冷、内踝肿痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

4. 大钟（KI4）络穴

［定位］在足内侧内踝后下方，当跟腱附着部的内侧前方凹陷处（如图2-50）。

［主治］咳血、腰脊强痛、痴呆、嗜卧、月经不调、足跟痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

5. 水泉（KI5）郄穴

［定位］在足内侧内踝后下方，当太溪直下1寸（指寸），跟骨节结内侧凹陷处（如图2-50）。

［主治］月经不调、痛经、小便不利、腹痛、头昏目花。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

6. 照海（KI6）八脉交会穴（通阴跷脉）

［定位］在足内侧，内踝尖下方凹陷处（如图2—50）。

［主治］痫证、失眠、小便不利、小便频数、咽干咽痛、目赤肿痛、月经不调、痛经、赤白带下。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

7. 复溜（KI7）经穴

［定位］在小腿内侧，太溪直上2寸，跟腱的前方（如图2—51）。

［主治］泻泄、肠鸣、水肿、腹胀、腿肿、足痿、盗



图2—51

汗、身热无汗、腰脊强痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

8. 交信（KI8）阴跷脉郄穴

［定位］在小腿内侧，太溪直上2寸，复溜前0.5寸，胫骨内侧缘的后方（如图2-51）。

［主治］月经不调、崩漏、阴挺、泻泄、大便难、睾丸肿痛、五淋、疝气、阴痒、泻痢赤白和膝、股、腘内廉痛。

［刺灸法］直刺0.6～1.2寸；可灸。

9. 筑宾（KI9）阴维脉郄穴

［定位］在小腿内侧，当太溪与阴谷的连线上，太溪上5寸，腓肠肌肌腹的内下方（如图2-51）。

［主治］癫狂、痫证、呕吐、疝气、小腿内侧痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

10. 阴谷（KI10）合穴

［定位］在腘窝内侧，屈膝时当半腱肌腱与半膜肌腱之间（如图2-52）。



图2-52

［主治］阳痿、疝气、月经不调、崩漏、小便难、阴中痛、癫狂、膝股内侧痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

11. 横骨（KI11）

［定位］在下腹部，当脐中下5

寸，前正中线旁开0.5寸（如图2—53）。

［主治］小腹胀痛、遗精、阳痿、遗尿、小便不利、疝气。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。



图2-53

12. 大赫（KI12）

［定位］在下腹部，当脐中下4寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］阴挺、遗精、带下、月经不调、痛经、泻泄。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

13. 气穴（KI13）

［定位］在下腹部，当脐中下3寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］月经不调、带下、小便不利、泻泄。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

14. 四满（KI14）

［定位］在下腹部，当脐中下2寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］月经不调、带下、遗尿、遗精、疝气、便秘、腹痛、水肿。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

15. 中注（KI15）

［定位］在下腹部，当脐中下1寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］月经不调、腹痛、便秘、泻泄。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

16. 肓俞（KI16）

［定位］在腹中部，当脐中旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］腹痛、腹胀、呕吐、便秘、泻泄。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

17. 商曲（KI17）

［定位］在上腹部，当脐中上2寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］腹痛、泻泄、便秘。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

18. 石关（KI18）

［定位］在上腹部，当脐中上3寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］呕吐、腹痛、便秘、不孕。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

19. 阴都（KI19）

［定位］在上腹部，当脐中上4寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］腹痛、腹泻、月经不调、不孕、便秘。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

20. 腹通谷（KI20）

［定位］在上腹部，当脐中上5寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］腹胀、腹痛、呕吐。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

21. 幽门（KI21）

［定位］在上腹部，当脐中上6寸，前正中线旁开0.5寸（如图2-53）。

［主治］腹胀、腹痛、呕吐、泻泄。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。本穴不可深刺，以免伤及肝脏。

22. 步廊（KI22）

［定位］在胸部，当第5肋间隙，前正中线旁开2寸（如图2-54）。

［主治］胸痛、咳嗽、气喘、呕吐、乳痈。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。本经胸部诸穴不可深刺，以免伤及内脏。



图2-54

23. 神封（KI23）

［定位］在胸部，当第4肋间隙，前正中线旁开2寸（如图2-54）。

［主治］咳嗽、气喘、胸胁支满、呕吐、不嗜食、乳痈。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。

24. 灵墟（KI24）

［定位］在胸部，当第3肋间隙，前正中线旁开2寸。

［主治］咳嗽、气喘、痰多、胸胁胀痛、呕吐、乳痈。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。

25. 神藏（KI25）

［定位］在胸部，当第2肋间隙，前正中线旁开2寸（如图2-54）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、烦满、呕吐、不嗜食。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。

26. 彧（yù）中（KI26）

［定位］在胸部，当第1肋间隙，前正中线旁开2寸（如图2-54）。

［主治］咳嗽、气喘、胸胁胀满、不嗜食。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。

27. 俞府（KI27）

［定位］在胸部，当锁骨下缘，前正中线旁开2寸（如图2-54）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、呕吐、不嗜食。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。

【记忆小结1】足少阴肾经穴位一览表（如表2-9）。

表2-9　足少阴肾经穴位一览表

穴位	定位	主治
涌泉*（KI1）	在足底部，卷足时足前部凹陷处，约当足底第2、第3趾趾缝纹头端与足跟连线的前1/3与后2/3交点上	头痛、头晕、小便不利、便秘、小儿惊风、足心热、癫证、昏厥
然谷*（KI2）	在足内侧缘，足舟骨粗隆下方，赤白肉际	月经不调、带下、遗精、小便不利、泻泄、胸胁胀痛、咳血、小儿脐风、口噤不开、黄疸、下肢痿痹、足跗痛
太溪*（KI3）	在足内侧内踝后方，当内踝尖与跟腱之间的凹陷处	头痛目眩、咽喉肿痛、齿痛、耳聋、气喘、胸痛咯血、消渴、月经不调、失眠、健忘、遗精、阳痿、小便频数、腰脊痛、下肢厥冷、内踝肿痛
大钟（KI4）	在足内侧内踝后下方，当跟腱附着部的内侧前方凹陷处	咳血、腰脊强痛、痴呆、嗜卧、月经不调、足跟痛
水泉（KI5）	在足内侧内踝后下方，当太溪直下1寸（指寸），跟骨节结内侧凹陷处	月经不调、痛经、小便不利、腹痛、头昏目花

续表

穴位	定　位	主　治
照海（KI6）	在足内侧，内踝尖下方凹陷处	痫证、失眠、小便不利、小便频数、咽干咽痛、目赤肿痛、月经不调、痛经、赤白带下
复溜（KI7）	在小腿内侧，太溪直上2寸，跟腱的前方	泻泄、肠鸣、水肿、腹胀、腿肿、足痿、盗汗、身热无汗、腰脊强痛
交信（KI8）	在小腿内侧，太溪直上2寸，复溜前0.5寸，胫骨内侧缘的后方	月经不调、崩漏、阴挺、泻泄、大便难、睾丸肿痛、五淋、疝气、阴痒、泻痢赤白和膝、股、腿内廉痛
筑宾（KI9）	在小腿内侧，当太溪与阴谷的连线上，太溪上5寸，腓肠肌肌腹的内下方	癫狂、痫证、呕吐、疝气、小腿内侧痛
阴谷（KI10）	在腘窝内侧，屈膝时当半腱肌腱与半膜肌腱之间	阳痿、疝气、月经不调、崩漏、小便难、阴中痛、癫狂、膝股内侧痛
横骨（KI11）	在下腹部，当脐中下5寸，前正中线旁开0.5寸	少腹胀痛、遗精、阳痿、遗尿、小便不利、疝气
大赫（KI12）	在下腹部，当脐中下4寸，前正中线旁开0.5寸	阴挺、遗精、带下、月经不调、痛经、泻泄
气穴（KI13）	在下腹部，当脐中下3寸，前正中线旁开0.5寸	月经不调、带下、小便不利、泻泄
四满（KI14）	在下腹部，当脐中下2寸，前正中线旁开0.5寸	月经不调、带下、遗尿、遗精、疝气、便秘、腹痛、水肿

续表

穴位	定　位	主　治
中注（KI15）	在下腹部，当脐中下1寸，前正中线旁开0.5寸	月经不调、腹痛、便秘、泻泄
肓俞（KI16）	在腹中部，当脐中旁开0.5寸	腹痛、腹胀、呕吐、便秘、泻泄
商曲（KI17）	在上腹部，当脐中上2寸，前正中线旁开0.5寸	腹痛、泻泄、便秘
石关（KI18）	在上腹部，当脐中上3寸，前正中线旁开0.5寸	呕吐、腹痛、便秘、不孕
阴都（KI19）	在上腹部，当脐中上4寸，前正中线旁开0.5寸	腹痛、腹泻、月经不调、不孕、便秘
腹通谷（KI20）	在上腹部，当脐中上5寸，前正中线旁开0.5寸	腹胀、腹痛、呕吐
幽门（KI21）	在上腹部，当脐中上6寸，前正中线旁开0.5寸	腹胀、腹痛、呕吐、泻泄
步廊（KI22）	在胸部，当第5肋间隙，前正中线旁开2寸	胸痛、咳嗽、气喘、呕吐、乳痈
神封（KI23）	在胸部，当第4肋间隙，前正中线旁开2寸	咳嗽、气喘、胸胁支满、呕吐、不嗜食、乳痈
灵墟（KI24）	在胸部，当第3肋间隙，前正中线旁开2寸	咳嗽、气喘、痰多、胸胁胀痛、呕吐、乳痈
神藏（KI25）	在胸部，当第2肋间隙，前正中线旁开2寸	咳嗽、气喘、胸痛、烦满、呕吐、不嗜食
彧中（KI26）	在胸部，当第1肋间隙，前正中线旁开2寸	咳嗽、气喘、胸胁胀满、不嗜食
俞府（KI27）	在胸部，当锁骨下缘，前正中线旁开2寸	咳嗽、气喘、胸痛、呕吐、不嗜食

【记忆小结2】足少阴肾经穴位总图（如图2–55）。



图2-55　足少阴肾经穴位总图

【记忆重点】

（1）足少阴肾经所属穴位歌诀：

足少阴穴二十七，涌泉然谷太溪溢，
大钟水泉照海明，复溜交信筑宾接，
阴谷胫骨内踝后，以上从足走上膝，
横骨大赫逆气穴，四满中注肓俞列，
商曲石关阴都连，通谷幽门半寸辟，
步廊神封及灵墟，神藏彧中俞府毕。

（2）足少阴肾经穴位主治概要：

①足部穴位：经脉所过之咽、舌、目、二阴及耳病变；所过脏腑之肾、膀胱、肝、肺、心病变。

②小腿部穴位：二便病；水液病；部分生殖系病；部分神志病；局部病。

③胸腹部穴位：局部病。

九、手厥阴心包经所属穴位

1. 天池（PC1）

［定位］在胸部，当第4肋间隙，乳头外1寸，前正中线旁开5寸（如图2-56）。

［主治］咳嗽、气喘、胸闷、心烦、胁肋疼痛。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸，**不可深刺，以免伤及肺脏**；可灸。

2. 天泉（PC2）

［定位］在臂内侧，当腋前横纹头下2寸，肱二头肌

的长、短头之间（如图2—57）。



图2—56　　图2—57

［主治］心痛、咳嗽、胸胁胀痛、臂痛。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

3. 曲泽（PC3）合穴

［定位］在肘横纹中，当肱二头肌腱的尺侧缘（如图2—57）。

［主治］心痛、心悸、胃痛、呕吐、泻泄、热病、肘臂挛痛。

［刺灸法］直刺0.8～1寸；或用三棱针刺血。

4. 郄门（PC4）郄穴

［定位］在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横

纹上5寸（如图2-58）。

［主治］心痛、心悸、呕血、咳血、癫痫。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

5. 间使（PC5）经穴

［定位］在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间（如图2-58）。

［主治］心痛、心悸、胃痛、呕血、热病、疟疾、癫狂痫、臂痛。



图2-58

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

6. 内关（PC6）络穴、八脉交会穴（通阴维脉）

［定位］在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间（如图2-58）。

［主治］心痛、心悸、胸闷、胸痛、胃痛、呕吐、呃逆、癫痫、热病、上肢痹痛、偏瘫、失眠、眩晕、偏头痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

7. 大陵（PC7）输穴、原穴

［定位］在腕横纹的中点处，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间（如图2-58）。

［主治］心痛、心悸、胃痛、呕吐、癫狂、疮疡、胸胁痛、桡腕关节疼痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

8. 劳宫（PC8）荥穴

［定位］在手掌心，当第2、第3掌骨之间，偏于第3掌骨，握拳屈指时中指尖处（如图2–59）。



图2–59

［主治］心痛、呕吐、癫狂痫、口疮、口臭。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

9. 中冲（PC9）井穴

［定位］在手中指末节尖端中央（如图2–59）。

［主治］心痛、昏迷、舌强肿痛、热病、小儿夜啼、

中暑、昏厥。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或用三棱针点刺出血。

【记忆小结1】手厥阴心包经穴位一览表（表2-10）。

表2-10　手厥阴心包经穴位一览表

穴位	定　位	主　治
天池（PC1）	在胸部，当第4肋间隙，乳头外1寸，前正中线旁开5寸	咳嗽、气喘、胸闷、心烦、胁肋疼痛
天泉（PC2）	在臂内侧，当腋前横纹头下2寸，肱二头肌的长、短头之间	心痛、咳嗽、胸胁胀痛、臂痛
曲泽*（PC3）	在肘横纹中，当肱二头肌腱的尺侧缘	心痛、心悸、胃痛、呕吐、泻泄、热病、肘臂挛痛
郄门（PC4）	在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上5寸	心痛、心悸、呕血、咳血、癫痫
间使*（PC5）	在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上3寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间	心痛、心悸、胃痛、呕血、热病、疟疾、癫狂痫、臂痛
内关*（PC6）	在前臂掌侧，当曲泽与大陵的连线上，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间	心痛、心悸、胸闷、胸痛、胃痛、呕吐、呃逆、癫痫、热病、上肢痹痛、偏瘫、失眠、眩晕、偏头痛
大陵*（PC7）	在腕横纹的中点处，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间	心痛、心悸、胃痛、呕吐、癫狂、疮疡、胸胁痛、桡腕关节疼痛

续表

穴位	定　位	主　治
劳宫*（PC8）	在手掌心，当第2、第3掌骨之间，偏于第3掌骨，握拳屈指时中指尖处	心痛、呕吐、癫狂痫、口疮、口臭
中冲*（PC9）	在手中指末节尖端中央	心痛、昏迷、舌强肿痛、热病、小儿夜啼、中暑、昏厥

【记忆小结2】手厥阴心包经穴位总图（如图2-60）。



图2-60　手厥阴心包经穴位总图

【记忆重点】

（1）手厥阴心包经所属穴位歌诀：

九穴心包手厥阴，天池天泉曲泽深，

郄门间使内关对，大陵劳宫中冲寻。

（2）手厥阴心包经穴位主治概要：

①肘以上穴位：心、胸、肺，局部病变为主。

②肘以下穴位：心、胸、肺病，神志病，胃痛。部分穴位可止血、泻热，治疗头面、喉、耳、目、舌之病，局

部病。

十、手少阳三焦经所属穴位

1. 关冲（SJ1）井穴

［定位］在手环指末节尺侧，距指甲角0.1寸（指寸）（如图2-61）。

［主治］头痛、目赤、耳聋、喉痹、热病、昏厥。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或用三棱针点刺出血。

2. 液门（SJ2）荥穴

［定位］在手背部，当第4、第5指间，指蹼缘后方赤白肉际处（如图2-61）。

［主治］头痛、目赤、耳聋、耳鸣、喉痹、疟疾、手臂痛。



图2-61

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

3. 中渚（zhǔ）（SJ3）输穴

［定位］在手背部，当环指本节（掌指关节）的后方，第4、第5掌骨间凹陷处（如图2-61）。

［主治］头痛、目赤、耳聋、耳鸣、喉痹、热病、手指不能屈伸。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

4. 阳池（SJ4）原穴

［定位］在腕背横纹中，当指伸肌的尺侧缘凹陷处（如图2-61）。

［主治］目赤肿痛、耳聋、喉痹、疟疾、消渴、腕痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

5. 外关（SJ5）络穴、八脉交会穴（通阳维脉）

［定位］在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上2寸，尺骨与桡骨之间（如图2-62）。

［主治］热病、头痛、颊痛、目赤肿痛、耳鸣、耳聋、瘰疬、胁肋痛、上肢痹痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。



图2-62

6. 支沟（SJ6）经穴

［定位］在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上3寸，尺骨与桡骨之间（如图2-62）。

［主治］耳鸣、耳聋、暴喑、瘰疬、胁肋痛、便秘、热病。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

7. 会宗（SJ7）郄穴

［定位］在前臂背侧，当腕横纹上3寸，支沟尺侧，尺骨的桡侧缘（如图2-62）。

［主治］耳聋、癫痫、上肢痹痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

8. 三阳络（SJ8）

［定位］在前臂背侧，腕背横纹上4寸，尺骨与桡骨之间（如图2-62）。

［主治］耳聋、暴喑、齿痛、上肢痹痛。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

9. 四渎（SJ9）

［定位］在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，肘尖下5寸，尺骨与桡骨之间（如图2-62）。

［主治］耳聋、暴喑、齿痛、手臂痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。



图2-63

10. 天井（SJ10）合穴

［定位］在臂外侧，屈肘时当肘尖直上1寸凹陷处（如图2-63）。

［主治］偏头痛、耳聋、瘰疬、胸胁痛、癫痫。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可

灸。

11. 清冷渊（SJ11）

［定位］在臂外侧，屈肘时当肘尖直上2寸，即天井上1寸（如图2-63）。

［主治］头痛、目黄、上肢痹痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

12. 消泺（luò）（SJ12）

［定位］在臂外侧，当清冷渊与臑会连线的中点处（如图2-63）。

［主治］头痛、齿痛、项强、肩背痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

13. 臑会（SJ13）

［定位］在臂外侧，当肘尖与肩髎的连线上，肩髎下3寸，三角肌的后下缘（如图2-63）。

［主治］瘿气、瘰疬、上肢痹痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

14. 肩髎（SJ14）

［定位］在肩部，肩髃后方，当臂外展时，于肩峰后下方呈现凹陷处（如图2-63）。

［主治］臂痛、肩痛不能举。

［刺灸法］向肩关节直刺1～1.5寸；可灸。

15. 天髎（SJ15）

［定位］在肩胛部，肩井与曲垣的中间，当肩胛骨上角处（如图2-64）。



图2-64

［主治］肩臂痛、颈项强直。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

16. 天牖（yǒu）（SJ16）

［定位］在颈侧部，当乳突的后方直下，平下颌角，胸锁乳突肌的后缘（如图2-65）。



图2-65

［主治］头痛、头晕、目痛、耳聋、瘰疬、项强。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

17. 翳（yi）风（SJ17）

［定位］在耳垂后方，当乳突与下颌角之间的凹陷处（如图2-66）。

［主治］耳鸣、耳聋、口眼㖞斜、牙关紧闭、齿痛、颊肿、瘰疬。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

18. 瘈（chi）脉（SJ18）

［定位］在头部，耳后乳突中央，当角孙至翳风之间，沿耳轮连线的中、下1/3的交点处（如图2-66）。



图2-66

［主治］头痛、耳鸣、耳聋、小儿惊风。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸，或点刺出血；可灸。

19. 颅息（SJ19）

［定位］在头部，当角孙至翳风之间，沿耳轮连线的上、中1/3的交点处（如图2-66）。

［主治］头痛、耳鸣、耳聋、小儿惊风。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

20. 角孙（SJ20）

［定位］在头部，折耳廓向前，当耳尖直上入发际处（如图2-66）。

［主治］颊肿、目翳、齿痛、项强。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

21. 耳门（SJ21）

［定位］在面部，当耳屏上切迹的前方，下颌骨髁状突后缘，张口有凹陷处（如图2-66）。

［主治］耳鸣、耳聋、聍耳、齿痛。

［刺灸法］张口，直刺0.5～1寸；可灸。

22. 耳和髎（SJ22）

［定位］在头侧部，当鬓发后缘，平耳郭根之前方，颞浅动脉的后缘（如图2-66）。

［主治］头痛、耳鸣、牙关紧闭、口㖞。

［刺灸法］避开动脉，斜刺或平刺0.3～0.5寸；可灸。

23. 丝竹空（SJ23）

［定位］在面部，当眉梢凹陷处（如图2-66）。

［主治］头痛、目赤肿痛、眼睑瞤动、齿痛、癫狂痫。

［刺灸法］平刺0.5～1寸；可灸。

【记忆小结1】手少阳三焦经腧穴一览表（如表2-11）。

表2-11　手少阳三焦经腧穴一览表

穴位	定位	主治
关冲*（SJ1）	在手环指末节尺侧，距指甲角0.1寸（指寸）	头痛、目赤、耳聋、喉痹、热病、昏厥
液门（SJ2）	在手背部，当第4、第5指间，指蹼缘后方赤白肉际处	头痛、目赤、耳聋、耳鸣、喉痹、疟疾、手臂痛
中渚*（SJ3）	在手背部，当环指本节（掌指关节）的后方，第4、第5掌骨间凹陷处	头痛、目赤、耳聋、耳鸣、喉痹、热病、手指不能屈伸
阳池*（SJ4）	在腕背横纹中，当指伸肌的尺侧缘凹陷处	目赤肿痛、耳聋、喉痹、疟疾、消渴、腕痛
外关*（SJ5）	在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上2寸，尺骨与桡骨之间	热病、头痛、颊痛、目赤肿痛、耳鸣、耳聋、瘰疬、胁肋痛、上肢痹痛

续表

穴位	定　位	主　治
支沟*（SJ6）	在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，腕背横纹上3寸，尺骨与桡骨之间	耳鸣、耳聋、暴喑、瘰疬、胁肋痛、便秘、热病
会宗（SJ7）	在前臂背侧，当腕横纹上3寸，支沟尺侧，尺骨的桡侧缘	耳聋、癫痫、上肢痹痛
三阳络（SJ8）	在前臂背侧，腕背横纹上4寸，尺骨与桡骨之间	耳聋、暴喑、齿痛、上肢痹痛
四渎（SJ9）	在前臂背侧，当阳池与肘尖的连线上，肘尖下5寸，尺骨与桡骨之间	耳聋、暴喑、齿痛、手臂痛
天井*（SJ10）	在臂外侧，屈肘时当肘尖直上1寸凹陷处	偏头痛、耳聋、瘰疬、胸胁痛、癫痫
清冷渊（SJ11）	在臂外侧，屈肘时当肘尖直上2寸，即天井上1寸	头痛、目黄、上肢痹痛
消泺（SJ12）	在臂外侧，当清冷渊与臑会连线的中点处	头痛、齿痛、项强、肩背痛
臑会（SJ13）	在臂外侧，当肘尖与肩髎的连线上，肩髎下3寸，三角肌的后下缘	瘿气、瘰疬、上肢痹痛
肩髎*（SJ14）	在肩部，肩髃后方，当臂外展时，于肩峰后下方呈现凹陷处	臂痛、肩痛不能举

续表

穴位	定位	主治
天髎（SJ15）	在肩胛部，肩井与曲垣的中间，当肩胛骨上角处	肩臂痛、颈项强直
天牖（SJ16）	在颈侧部，当乳突的后方直下，平下颌角，胸锁乳突肌的后缘	头痛、头晕、目痛、耳聋、瘰疬、项强
翳风*（SJ17）	在耳垂后方，当乳突与下颌角之间的凹陷处	耳鸣、耳聋、口眼㖞斜、牙关紧闭、齿痛、颊肿、瘰疬
瘈脉（SJ18）	在头部，耳后乳突中央，当角孙至翳风之间，沿耳轮连线的中、下1/3的交点处	头痛、耳鸣、耳聋、小儿惊风
颅息（SJ19）	在头部，当角孙至翳风之间，沿耳轮连线的上、中1/3的交点处	头痛、耳鸣、耳聋、小儿惊风
角孙（SJ20）	在头部，折耳廓向前，当耳尖直上入发际处	颊肿、目翳、齿痛、项强
耳门*（SJ21）	在面部，当耳屏上切迹的前方，下颌骨髁状突后缘，张口有凹陷处	耳鸣、耳聋、聤耳、齿痛
耳和髎（SJ22）	在头侧部，当鬓发后缘，平耳廓根之前方，颞浅动脉的后缘	头痛、耳鸣、牙关紧闭、口㖞
丝竹空*（SJ23）	在面部，当眉梢凹陷处	头痛、目赤肿痛、眼睑瞤动、齿痛、癫狂痫

【记忆小结2】手少阳三焦经穴位总图（如图2-67）。



图2-67　手少阳三焦经穴位总图

【记忆重点】

（1）手少阳三焦经所属穴位歌诀：

二十三穴手少阳，关冲液门中渚旁，

阳池外关支沟正，会宗三阳四渎长，

天井清冷渊消泺，膑会肩髎天髎堂，
天牖翳风瘈脉青，颅息角孙耳门乡，
和髎前接丝竹空，三焦经穴此推详。

（2）手少阳三焦经穴位主治概要：

①腕以下穴位：经脉所过头面五官病，热病，局部病。

②腕至肘穴位：头面五官病，热病，局部病。外关、支沟、天井可治项强，部分心、胸、肺病。

③肘以上穴位：局部病。耳后穴位可治抽搐。

十一、足少阳胆经所属穴位

1. 瞳子髎（GB1）

［定位］在面部，目外眦旁，当眶外侧缘处（如图2-68）。



图2-68

［主治］头痛、目赤肿痛、目翳、青盲。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸，或三棱针点刺出血。

2. 听会（GB2）

［定位］在面部，当耳屏间切迹的前方，下颌骨髁状突的后缘，张口有凹陷处（如图2-68）。

［主治］耳鸣、耳聋、聤耳、面痛、齿痛、口㖞。

［刺灸法］张口，直刺0.5～1寸；可灸。

3. 上关（GB3）

［定位］在耳前，下关直上，当颧弓的上缘凹陷处（如图2-68）。

［主治］偏头痛、耳鸣、耳聋、聤耳、口眼㖞斜、齿痛、口噤（jìn）。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

4. 颔（hàn）厌（GB4）

［定位］在头部鬓发上，当头维与曲鬓弧形连线的上1/4与下3/4交点处（如图2-68）。

［主治］偏头痛、目眩、耳鸣、齿痛、癫痫。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

5. 悬颅（GB5）

［定位］在头部鬓发上，当头维与曲鬓弧形连线的中点处（如图2-68）。

［主治］偏头痛、目赤肿痛、齿痛。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

6. 悬厘（GB6）

［定位］在头部鬓发上，当头维与曲鬓弧形连线的上3/4与下1/4交点处（如图2-68）。

［主治］偏头痛、目赤肿痛、耳鸣。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

7. 曲鬓（GB7）

［定位］在头部，当耳前鬓角发际后缘的垂线与耳尖水平线交点处（如图2-68）。

［主治］头痛、齿痛、牙关紧闭、暴喑。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

8. 率谷（GB8）

［定位］在头部，当耳尖直上入发际1.5寸，角孙直上方（如图2-68）。

［主治］偏头痛、眩晕、小儿急慢性惊风。

［刺灸法］平刺0.5～1寸；可灸。

9. 天冲（GB9）

［定位］在头部，当耳根后缘直上入发际2寸，率谷后0.5寸处（如图2-68）。

［主治］头痛、牙龈肿痛、癫疾。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

10. 浮白（GB10）

［定位］在头部，当耳后乳突的后上方，天冲与完骨的弧形连线的中1/3与上1/3交点处（如图2-68）。

［主治］头痛、耳鸣、耳聋、目痛、瘿气。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

11. 头窍阴（GB11）

［定位］在头部，当耳后乳突的后上方，天冲与完骨的弧形连线的中1/3与下1/3交点处（如图2-68）。

［主治］头痛、耳鸣、耳聋。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

12. 完骨（GB12）

［定位］在头部，当耳后乳突的后下方的凹陷处（如图2-68）。

［主治］头痛、颈项强痛、齿痛、口喎、疟疾、癫痫。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。

13. 本神（GB13）

［定位］在头部，当前发际上0.5寸，神庭与头维连线的内2/3与外1/3的交点处（如图2-69）。

［主治］头痛、目眩、癫痫、小儿惊风。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

14. 阳白（GB14）

［定位］在前额部，当瞳孔直上，眉上1寸（如图2-69）。

［主治］头痛、目眩、目痛、视物模糊、眼睑瞤动。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。



图2-69

15. 头临泣（GB15）

［定位］在头部，当瞳孔直上入发际0.5寸，神庭与头维连线的中点（如图2-69）。

［主治］头痛、目眩、流泪、鼻塞、小儿惊痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

16. 目窗（GB16）

［定位］在头部，当前发际上1.5寸，头正中线旁开2.25寸（如图2-69）。

［主治］头痛、目赤肿痛、青盲、鼻塞、癫痫、面部浮肿。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

17. 正营（GB17）

［定位］在头部，当前发际上2.5寸，头正中线旁开2.25寸（如图2-69）。

［主治］头痛、目眩、唇吻强急、齿痛。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

18. 承灵（GB18）

［定位］在头部，当前发际上4寸，头正中线旁开2.25寸（如图2-69）。

［主治］头痛、眩晕、目痛、鼻塞、鼽（qiú）衄。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

19. 脑空（GB19）

［定位］在头部，当枕外隆凸的上缘外侧，头正中线旁开2.25寸，平脑户（如图2-69）。

［主治］头痛、目眩、颈项强痛、癫狂痫。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

20. 风池（GB20）

［定位］在项部，当枕骨之下，与风府相平，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处（如图2-69）。

［主治］头痛、眩晕、目赤肿痛、鼻渊、鼻衄、耳鸣、耳聋、颈项强痛、感冒、癫痫、中风、热病、疟疾、瘿气。

［刺灸法］针尖微下，向鼻尖斜刺0.8～1.2寸，或平刺透风府穴，深部为延髓，必须严格掌握针刺角度与深度；可灸。

21. 肩井（GB21）

［定位］在肩上，前对乳中，当大椎与肩峰连线的中点（如图2-71）。

［主治］头项强痛、肩背疼痛、上肢不遂、难产、乳痈、乳汁不下、瘰疬。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸，**深部正当肺尖，不可深刺，孕妇禁针；可灸。**



图2-70

22. 渊腋（GB22）

［定位］在侧胸部，举臂，当腋中线上，腋下3寸，第4肋间隙中（如图2-71）。

［主治］胸痛、胁痛、上肢痹痛。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸，**不可深刺，以免伤及内部重要脏器。**



图2-71

23、辄（zhé）筋（GB23）

［定位］在侧胸部，渊腋前1寸，平乳头，第4肋间隙中（如图2-71）。

［主治］胸痛、胁痛、气喘、呕吐、吞酸。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸，**不可深刺，以免**

伤及内部重要脏器。

24. 日月（GB24）胆募穴

［定位］在上腹部，当乳头直下，第7肋间隙，前正中线旁开4寸（如图2-72）。

［主治］呕吐、吞酸、胁肋疼痛、呃逆、黄疸。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸，**不可深刺，以免伤及内部重要脏器**；可灸。



图2-72

25. 京门（GB25）肾募穴

［定位］在侧腰部，章门后1.8寸，当第12肋骨游离端的下方（如图2-71）。

［主治］小便不利、水肿、腰痛、胁痛、腹胀、泻泄。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸，**不可深刺，以免伤及内部重要脏器**；可灸。

26. 带脉（GB26）

［定位］在侧腹部，章门下1.8寸，当第11肋骨游离端下方垂线与脐水平线的交点上（如图2-71）。

［主治］经闭、月经不调、带下、腹痛、疝气、腰胁痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

27. 五枢（GB27）

［定位］在侧腹部，在髂前上棘的前方，横平脐下3

寸处（如图2-73）。



图2-73

［主治］腹痛、疝气、带下、便秘、阴挺。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

28. 维道（GB28）

［定位］在侧腹部，当髂前上棘的前下方，五枢前下0.5寸（如图2-73）。

［主治］腹痛、疝气、带下、阴挺。

［刺灸法］直刺或向前下方斜刺1～1.5寸；可灸。

29. 居髎（GB29）

［定位］在髋部，当髂前上棘与股骨大转子最凸点连线的中点处（如图2-73）。

［主治］腰痛、下肢痿痹、瘫痪、疝气。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

30. 环跳（GB30）

［定位］在股外侧部，侧卧屈股，当股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外1/3与中1/3交点处（如图2-74）。

［主治］腰胯疼痛、半身不遂、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺2～3寸；可灸。



图2-74

31. 风市（GB31）

［定位］在大腿外侧部的中线上，当腘横纹上7寸，或直立垂手时，中指尖处（如图2-75）。

［主治］半身不遂、下肢痿痹、遍身瘙痒、脚气。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。



图2-75

32. 中渎（dú）（GB32）

［定位］在大腿外侧，当风市下2寸，或腘横纹上5寸，股外侧肌与股二头肌之间（如图2-75）。

［主治］下肢痿痹麻木、半身不遂。

［刺灸法］宜刺1～1.5寸；可灸。

33. 膝阳关（GB33）

［定位］在膝外侧，当阳陵泉上3寸，股骨外上髁上方的凹陷处（如图2-75）。

［主治］膝腘肿痛挛急、小腿麻木。

［刺灸法］宜刺0.8～1寸。

34. 阳陵泉（GB34）合穴；胆下合穴；八会穴之筋会

［定位］在小腿外侧，当腓骨头前下方凹陷处（如图2-76）。

［主治］胁痛、口苦、呕吐、半身不遂、下肢痿痹、脚气、黄疸、小儿惊风。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。



图2-76

35. 阳交（GB35）阳维脉郄穴

［定位］在小腿外侧，当外踝尖上7寸，腓骨后缘（如图2-76）。

［主治］胸胁胀满、下肢痿痹、癫狂。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

36. 外丘（GB36）郄穴

［定位］在小腿外侧，当外踝尖上7寸，腓骨前缘，平阳交（如图2-76）。

［主治］ 颈项强痛、胸胁胀满、下肢痿痹、癫狂。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

37. 光明（GB37）络穴

［定位］ 在小腿外侧，当外踝尖上5寸，腓骨前缘（如图2-76）。

［主治］目痛、夜盲、下肢痿痹、乳房胀痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

38. 阳辅（GB38）

［定位］ 在小腿外侧，当外踝尖上4寸，腓骨前缘稍前方（如图2-76）。

［主治］偏头痛、目外眦痛、咽喉肿痛、瘰疬、胸胁胀痛、脚气、下肢痿痹、半身不遂。

［刺灸法］直刺0.8～1寸；可灸。

39. 悬钟（GB39）八会穴之髓会

［定位］ 在小腿外侧，当外踝尖上3寸，腓骨前缘（如图2-76）。

［主治］项强、胸胁胀痛、下肢痿痹、咽喉肿痛、脚气、半身不遂、痔疾。

［刺灸法］直刺0.8～1寸；可灸。

40. 丘墟（GB40）

［定位］ 在足外踝的前下方，当趾长伸肌腱的外侧凹陷中（如图2-77）。

［主治］颈项痛、胸胁胀痛、下肢痿痹、疟疾。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

41. 足临泣（GB41）输穴；八脉交会穴，通于带脉

［定位］在足背外侧，当足4趾本节（第4趾跖关节）的后方，小趾伸肌腱外侧凹陷处（如图2–77）。

［主治］目赤肿痛、胁肋疼痛、月经不调、遗溺、乳痈、瘰疬、疟疾、足跗疼痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

图2–77

42. 地五会（GB42）

［定位］在足背外侧，当足4趾本节（第4趾跖关节）的后方，第4、第5跖骨之间，小趾伸肌腱的内侧缘（如图2–77）。

［主治］头痛、目赤、耳鸣、胁痛、乳痈、内伤出血、足背肿痛。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

43. 侠溪（GB43）荥穴

［定位］在足背外侧，当足第4、第5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际（如图2–77）。

［主治］头痛、目眩、耳鸣、耳聋、目赤肿痛、热病、胁肋疼痛、乳痈。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。

44. 足窍阴（GB44）井穴

［定位］在足第4趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（如图2-77）。

［主治］头痛、目赤肿痛、耳聋、咽喉肿痛、热病、失眠、胁痛、咳逆、月经不调。

［刺灸法］浅刺0.1寸，或点刺出血；可灸。

【记忆小结1】足少阳胆经穴位一览表（如表2-12）。

表2-12　足少阳胆经穴位一览表

穴位	定位	主治
瞳子髎（GB1）	在面部，目外眦旁，当眶外侧缘处	头痛、目赤肿痛、目翳、青盲
听会（GB2）	在面部，当耳屏间切迹的前方，下颌骨髁状突的后缘，张口有凹陷处	耳鸣、耳聋、聤耳、面痛、齿痛、口㖞
上关（GB3）	在耳前，下关直上，当颧弓的上缘凹陷处	偏头痛、耳鸣、耳聋、聤耳、口眼㖞斜、齿痛、口噤
颔厌（GB4）	在头部鬓发上，当头维与曲鬓弧形连线的上1/4与下3/4交点处	偏头痛、目眩、耳鸣、齿痛、癫痫
悬颅（GB5）	在头部鬓发上，当头维与曲鬓弧形连线的中点处	偏头痛、目赤肿痛、齿痛

续表

穴位	定位	主治
悬厘（GB6）	在头部鬓发上，当头维与曲鬓弧形连线的上3/4与下1/4交点处	偏头痛、目赤肿痛、耳鸣
曲鬓（GB7）	在头部，当耳前鬓角发际后缘的垂线与耳尖水平线交点处	头痛、齿痛、牙关禁闭、暴喑
率谷*（GB8）	在头部，当耳尖直上入发际1.5寸，角孙直上方	偏头痛、眩晕、小儿急慢性惊风
天冲（GB9）	在头部，当耳根后缘直上入发际2寸，率谷后0.5寸处	头痛、牙龈肿痛、癫疾
浮白（GB10）	在头部，当耳后乳突的后上方，天冲与完骨的弧形连线的中1/3与上1/3交点处	头痛、耳鸣、耳聋、目痛、瘿气
头窍阴（GB11）	在头部，当耳后乳突的后上方，天冲与完骨的弧形连线的中1/3与下1/3交点处	头痛、耳鸣、耳聋
完骨（GB12）	在头部，当耳后乳突的后下方的凹陷处	头痛、颈项强痛、齿痛、口喎、疟疾、癫痫
本神（GB13）	在头部，当前发际上0.5寸，神庭与头维连线的内2/3与外1/3的交点处	头痛、目眩、癫痫、小儿惊风

续表

穴位	定位	主治
阳白*（GB14）	在前额部，当瞳孔直上，眉上1寸	头痛、目眩、目痛、视物模糊、眼睑瞤动
头临泣*（GB15）	在头部，当瞳孔直上入发际0.5寸，神庭与头维连线的中点	头痛、目眩、流泪、鼻塞、小儿惊痫
目窗（GB16）	在头部，当前发际上1.5寸，头正中线旁开2.25寸	头痛、目赤肿痛、青盲、鼻塞、癫痫、面部浮肿
正营（GB17）	在头部，当前发际上2.5寸，头正中线旁开2.25寸	头痛、目眩、唇吻强急、齿痛
承灵（GB18）	在头部，当前发际上4寸，头正中线旁开2.25寸	头痛、眩晕、目痛、鼻塞、鼽衄
脑空（GB19）	在头部，当枕外隆凸的上缘外侧，头正中线旁开2.25寸，平脑户	头痛、目眩、颈项强痛、癫狂痫
风池*（GB20）	在项部，当枕骨之下，与风府相平，胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷处	头痛、眩晕、目赤肿痛、鼻渊、鼻衄、耳鸣、耳聋、颈项强痛、感冒、癫痫、中风、热病、疟疾、瘿气
肩井*（GB21）	在肩上，前对乳中，当大椎与肩峰连线的中点	头项强痛、肩背疼痛、上肢不遂、难产、乳痈、乳汁不下、瘰疬

续表

穴位	定位	主治
渊腋（GB22）	在侧胸部，举臂，当腋中线上，腋下3寸，第4肋间隙中	胸痛、胁痛、上肢痹痛
辄筋（GB23）	在侧胸部，渊腋前1寸，平乳头，第4肋间隙中	胸痛、胁痛、气喘、呕吐、吞酸
日月*（GB24）	在上腹部，当乳头直下，第7肋间隙，前正中线旁开4寸	呕吐、吞酸、胁肋疼痛、呃逆、黄疸
京门（GB25）	在侧腰部，章门后1.8寸，当第12肋骨游离端的下方	小便不利、水肿、腰痛、胁痛、腹胀、泻泄
带脉*（GB26）	在侧腹部，章门下1.8寸，当第11肋骨游离端下方垂线与脐水平线的交点上	经闭、月经不调、带下、腹痛、疝气、腰胁痛
五枢（GB27）	在侧腹部，在髂前上棘的前方，横平脐下3寸处	腹痛、疝气、带下、便秘、阴挺
维道（GB28）	在侧腹部，当髂前上棘的前下方，五枢前下0.5寸	腹痛、疝气、带下、阴挺
居髎（GB29）	在髋部，当髂前上棘与股骨大转子最凸点连线的中点处	腰痛、下肢痿痹、瘫痪、疝气

续表

穴位	定位	主治
环跳*（GB30）	在股外侧部，侧卧屈股，当股骨大转子最凸点与骶管裂孔连线的外1/3与中1/3交点处	腰胯疼痛、半身不遂、下肢痿痹
风市*（GB31）	在大腿外侧部的中线上，当胭横纹上7寸，或直立垂手时，中指尖处	半身不遂、下肢痿痹、遍身瘙痒、脚气
中渎（GB32）	在大腿外侧，当风市下2寸，或胭横纹上5寸，股外侧肌与股二头肌之间	下肢痿痹麻木、半身不遂
膝阳关（GB33）	在膝外侧，当阳陵泉上3寸，股骨外上髁上方的凹陷处	膝胭肿痛挛急、小腿麻木
阳陵泉*（GB34）	在小腿外侧，当腓骨头前下方凹陷处	胁痛、口苦、呕吐、半身不遂、下肢痿痹、脚气、黄疸、小儿惊风
阳交（GB35）	在小腿外侧，当外踝尖上7寸，腓骨后缘	胸胁胀满、下肢痿痹、癫狂
外丘（GB36）	在小腿外侧，当外踝尖上7寸，腓骨前缘，平阳交	颈项强痛、胸胁胀满、下肢痿痹、癫狂
光明*（GB37）	在小腿外侧，当外踝尖上5寸，腓骨前缘	目痛、夜盲、下肢痿痹、乳房胀痛

续表

穴位	定位	主治
阳辅（GB38）	在小腿外侧，当外踝尖上4寸，腓骨前缘稍前方	偏头痛、目外眦痛、咽喉肿痛、瘰疬、胸胁胀痛、脚气、下肢痿痹、半身不遂
悬钟*（GB39）	在小腿外侧，当外踝尖上3寸，腓骨前缘	项强、胸胁胀痛、下肢痿痹、咽喉肿痛、脚气、半身不遂、痔疾
丘墟*（GB40）	在足外踝的前下方，当趾长伸肌腱的外侧凹陷中	颈项痛、胸胁胀痛、下肢痿痹、疟疾
足临泣*（GB41）	在足背外侧，当足4趾本节（第4趾跖关节）的后方，小趾伸肌腱外侧凹陷处	目赤肿痛、胁肋疼痛、月经不调、遗溺、乳痈、瘰疬、疟疾、足跗疼痛
地五会（GB42）	在足背外侧，当足4趾本节（第4趾跖关节）的后方，第4、第5跖骨之间，小趾伸肌腱的内侧缘	头痛、目赤、耳鸣、胁痛、乳痈、内伤出血、足背肿痛
侠溪（GB43）	在足背外侧，当足第4、第5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际	头痛、目眩、耳鸣、耳聋、目赤肿痛、热病、胁肋疼痛、乳痈
足窍阴（GB44）	在足第4趾末节外侧，距趾甲角0.1寸	头痛、目赤肿痛、耳聋、咽喉肿痛、热病、失眠、胁痛、咳逆、月经不调

【记忆小结2】足少阳胆经穴位总图（如图2-78）。



图2-78　足少阳胆经穴位总图

【记忆重点】

（1）足少阳胆经所属穴位歌诀：

足少阳经瞳子髎，四十四穴行逍逍，
听会上关颔厌集，悬颅悬厘曲鬓翘，
率谷天冲浮白次，窍阴完骨本神邀，
阳白临泣目窗辟，正营承灵脑空摇，

风池肩井渊腋部，辄筋日月京门标，
带脉五枢维道续，居髎环跳风市招，
中渎阳关阳陵穴，阳交外丘光明青，
阳辅悬钟丘墟外，足临泣下跗骨间，
地五会连侠溪穴，足窍阴在四趾梢。

（2）足少阳胆经穴位主治概要：

①头面部穴位：局部病，目、鼻、耳病；风池作用广泛，肩井作用特殊。

②胸胁部穴位：局部病。两个募穴。

③腰腹部穴位：带脉病为主，疝气。

④股部穴位：局部病。

⑤膝以下穴位：胆经所过部位疾患，胆腑病。

⑥踝以下穴位：热病。

十二、足厥阴肝经所属穴位

1. 大敦（dūn）（LR1）井穴

［定位］在足大趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（指寸）（如图2-79）。

［主治］疝气、遗尿、月经不调、经闭、崩漏、阴挺、癫痫。

［刺灸法］斜刺0.1～0.2寸，或点刺出血；可灸。

2. 行间（LR2）荥穴

［定位］在足背侧，当第1、第2趾间，趾蹼缘的后方赤白肉际处（如图2-79）。

［主治］头痛、目眩、目赤肿痛、青盲、口喎、胁痛、疝气、小便不利、崩漏、癫痫、月经不调、痛经、带下、中风。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

3. 太冲（LR3）输穴；原穴

［定位］在足背侧，当第1跖骨间隙的后方凹陷处（如图2-79）。



图2-79

［主治］头痛、眩晕、目赤肿痛、口喎、胁痛、遗尿、疝气、崩漏、月经不调、癫痫、呃逆、小儿惊风、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

4. 中封（LR4）经穴

［定位］在足背侧，当足内踝前，商丘与解溪连线之间，胫骨前肌腱的内侧凹陷处（如图2-79）。

［主治］疝气、遗精、小便不利、腹痛、内踝肿痛。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

5. 蠡沟（LR5）络穴

［定位］在小腿内侧，当足内踝尖上5寸，胫骨内侧面的中央（如图2-80）。

［主治］小便不利、遗尿、月经不调、带下、下肢痿痹。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

6. 中都（LR6）郄穴

［定位］在小腿内侧，当足内踝尖上7寸，胫骨内侧面的中央（如图2-80）。

［主治］疝气、崩漏、腹痛、泻泄、恶露不尽。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

7. 膝关（LR7）

［定位］在小腿内侧，当胫骨内上髁的后下方，阴陵泉后1寸，腓肠肌内侧头的上部（如图2-80）。



图2-80

［主治］膝髌肿痛、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

8. 曲泉（LR8）合穴

［定位］在膝内侧，屈膝，当膝关节内侧面横纹内侧端，股骨内侧髁的后缘，半腱肌、半膜肌止端的前缘凹陷处（如图2-81）。



图2-81

［主治］腹痛、小便不利、遗精、阴痒、膝痛、月经不调、痛经、带下。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

9. 阴包（LR9）

［定位］在大腿内侧，当股骨内上髁上4寸，股内肌与缝匠肌之间（如图2-81）。

［主治］腹痛、遗尿、小便不利、月经不调。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

10. 足五里（LR10）

［定位］在大腿内侧，当气冲直下3寸，大腿根部，耻骨结节的下方，长收肌的外缘（如图2-82）。



图2-82

［主治］小腹痛、小便不通、阴挺、睾丸肿痛、嗜卧、瘰疬。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

11. 阴廉（LR11）

［定位］在大腿内侧，当气冲直下2寸，大腿根部，耻骨结节的下方，长收肌的外缘（如图2-82）。

［主治］月经不调、带下、小腹痛。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

12. 急脉（LR12）

［定位］在耻骨结节的外侧，当气冲外下方腹股沟动

脉搏动处，当正中线旁2.5寸（如图2-82）。

［主治］疝气、小腹痛、阴挺。

［刺灸法］避开动脉，直刺0.5～0.8寸；可灸。

13. 章门（LR13）脾募穴；八会穴之脏会

［定位］在侧腹部，当第11肋游离端的下方（如图2-83）。

［主治］腹痛、腹胀、泻泄、胁痛、痞块

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸；可灸。



图2-83

14. 期门（LR14）肝募穴

［定位］在胸部，当乳头直下，第6肋间隙，前正中线旁开4寸（如图2-83）。

［主治］胸胁胀痛、腹胀、呕吐、乳痈。

［刺灸法］斜刺或平刺0.5～0.8寸；可灸。

【记忆小结1】足厥阴肝经穴位一览表（如表2-13）。

表2-13　足厥阴肝经穴位一览表

穴位	定位	主治
大敦*（LR1）	在足大趾末节外侧，距趾甲角0.1寸（指寸）	疝气、遗尿、月经不调、经闭、崩漏、阴挺、癫痫
行间*（LR2）	在足背侧，当第1、第2趾间，趾蹼缘的后方赤白肉际处	头痛、目眩、目赤肿痛、青盲、口喎、胁痛、疝气、小便不利、崩漏、癫痫、月经不调、痛经、带下、中风
太冲*（LR3）	在足背侧，当第1跖骨间隙的后方凹陷处	头痛、眩晕、目赤肿痛、口喎、胁痛、遗尿、疝气、崩漏、月经不调、癫痫、呃逆、小儿惊风、下肢痿痹
中封*（LR4）	在足背侧，当足内踝前，商丘与解溪连线之间，胫骨前肌腱的内侧凹陷处	疝气、遗精、小便不利、腹痛、内踝肿痛
蠡沟（LR5）	在小腿内侧，当足内踝尖上5寸，胫骨内侧面的中央	小便不利、遗尿、月经不调、带下、下肢痿痹
中都（LR6）	在小腿内侧，当足内踝尖上7寸，胫骨内侧面的中央	疝气、崩漏、腹痛、泻泄、恶露不尽
膝关（LR7）	在小腿内侧，当胫骨内上髁的后下方，阴陵泉后1寸，腓肠肌内侧头的上部	膝髌肿痛、下肢痿痹

续表

穴位	定位	主治
曲泉*（LR8）	在膝内侧，屈膝，当膝关节内侧面横纹内侧端，股骨内侧髁的后缘，半腱肌、半膜肌止端的前缘凹陷处	腹痛、小便不利、遗精、阴痒、膝痛、月经不调、痛经、带下
阴包（LR9）	在大腿内侧，当股骨内上髁上4寸，股内肌与缝匠肌之间	腹痛、遗尿、小便不利、月经不调
足五里（LR10）	在大腿内侧，当气冲直下3寸，大腿根部，耻骨结节的下方，长收肌的外缘	小腹痛、小便不通、阴挺、睾丸肿痛、嗜卧、瘰疬
阴廉（LR11）	在大腿内侧，当气冲直下2寸，大腿根部，耻骨结节的下方，长收肌的外缘	月经不调、带下、小腹痛
急脉（LR12）	在耻骨结节的外侧，当气冲外下方腹股沟动脉搏动处，当正中线旁2.5寸	疝气、小腹痛、阴挺
章门*（LR13）	在侧腹部，当第11肋游离端的下方	腹痛、腹胀、泻泄、胁痛、痞块
期门*（LR14）	在胸部，当乳头直下，第6肋间隙，前正中线旁开4寸	胸胁胀痛、腹胀、呕吐、乳痈

【记忆小结2】足厥阴肝经穴位总图（如图2-84）。



图2-84　足厥阴肝经穴位总图

【记忆重点】

（1）足厥阴肝经所属穴位歌诀：

一十四穴足厥阴，大敦行间太冲侵，

中封蠡沟中都迹，膝关曲泉阴包临，

五里阴廉急脉穴，章门常对期门深。

（2）足厥阴肝经穴位主治概要：

①足上穴位：肝经所过头面五官、胸、肺、肝、胆、胃、泌尿生殖系、下肢局部病变。

②踝至腹股沟穴位：泌尿生殖系、少腹痛、疝气、局

部病。曲泉治疗范围广。

③胸胁穴位：局部病变，癫狂痫。

十三、督脉所属穴位

1. 长强（DU1）络穴

［定位］在尾骨端下，当尾骨端与肛门连线的中点（如图2-85）。



图2-85

［主治］泻泄、便血、便秘、痔疾、脱肛、癫狂、腰脊和尾骶部疼痛。

［刺灸法］斜刺，针尖向上与骶骨平行刺入0.5～1寸，不得刺穿直肠，以防感染；不灸。

2. 腰俞（DU2）

［定位］在骶部，当后正中线上，适对骶管裂孔（如图2-85）。

［主治］月经不调、痔疾、腰脊强痛、下肢痿痹、癫痫。

［刺灸法］向上斜刺0.5～1寸；可灸。

3. 腰阳关（DU3）

［定位］在腰部，当后正中线上，第4腰椎棘突下凹陷中（如图2-85）。

［主治］月经不调、遗精、阳痿、腰骶痛、下肢痿痹。

［刺灸法］向上微斜刺0.6～1寸；可灸。

4. 命门（DU4）

［定位］在腰部，当后正中线上，第2腰椎棘突下凹陷中（如图2-85）。

［主治］遗精、阳痿、带下、遗尿、尿频、月经不调、泻泄、腰脊强痛、手足逆冷。

［刺灸法］向上斜刺0.5～1寸；可灸。

5. 悬枢（DU5）

［定位］在腰部，当后正中线上，第1腰椎棘突下凹

陷中（如图2-85）。

［主治］泻泄、腹痛、腰脊强痛。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸；可灸。

6. 脊中（DU6）

［定位］在背部，当后正中线上，第11胸椎棘突下凹陷中（如图2-85）。

［主治］泻泄、黄疸、痔疾、小儿疳疾、脱肛、腰脊强痛。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸。

7. 中枢（DU7）

［定位］在背部，当后正中线上，第10胸椎棘突下凹陷中（如图2-85）。

［主治］黄疸、呕吐、腹满、腰脊强痛。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸。

8. 筋缩（DU8）

［定位］在背部，当后正中线上，第9胸椎棘突下凹陷中（如图2-85）。

［主治］癫痫、抽搐、背强、胃痛。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸；可灸。

9. 至阳（DU9）

［定位］在背部，当后正中线上，第7胸椎棘突下凹陷中（如图2-85）。

［主治］胸胁胀满、黄疸、咳嗽、气喘、背痛、脊强。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸；可灸。

10. 灵台（DU10）

［定位］在背部，当后正中线上，第6胸椎棘突下凹陷中（如图2—85）。

［主治］咳嗽、气喘、疔疮、脊背强痛。

［刺灸法］向上斜刺0.5～1寸；可灸。

11. 神道（DU11）

［定位］在背部，当后正中线上，第5胸椎棘突下凹陷中（如图2—85）。

［主治］心悸、健忘、咳嗽、脊背强痛。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸；可灸。

12. 身柱（DU12）

［定位］在背部，当后正中线上，第3胸椎棘突下凹陷中（如图2—85）。

［主治］咳嗽、气喘、癫痫、脊背强痛。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸；可灸。

13. 陶道（DU13）

［定位］在背部，当后正中线上，第1胸椎棘突下凹陷中（如图2—85）。

［主治］头痛、疟疾、热病、脊强。

［刺灸法］向上微斜刺0.5～1寸；可灸。

14. 大椎（DU14）

［定位］在后正中线上，第7颈椎棘突下凹陷中（如图2—85）。

［主治］热病、疟疾、咳嗽、气喘、骨蒸盗汗、癫痫、头痛项强、肩背痛、腰脊强痛、风疹。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

15. 哑门（DU15）

［定位］在项部，当后发际正中直上0.5寸，第1颈椎下（如图2-86）。

［主治］暴喑、舌强不语、癫狂痫、头痛、项强。

［刺灸法］直刺或向下斜刺0.5～1寸，**不可向上斜刺或深刺。因为深部接近延髓，必须严格掌握针刺的角度和深度。**



图2-86

16. 风府（DU16）

［定位］在项部，当后发际正中直上1寸，枕外隆凸直下，两斜方肌之间凹陷中（如图2-86）。

［主治］头痛、项强、眩晕、咽喉肿痛、失音、癫狂、中风。

［刺灸法］直刺或向下斜刺0.5～1寸，不可深刺，以免伤及深部延髓。

17. 脑户（DU17）

［定位］在头部，当后发际正中直上2.5寸，风府上1.5寸，枕外隆凸的上缘凹陷处（如图2-86）。

［主治］头痛、头晕、项强、失音、癫痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

18. 强间（DU18）

［定位］在头部，当后发际正中直上4寸（如图2-86）。

［主治］头痛、目眩、项强、癫痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

19. 后顶（DU19）

［定位］在头部，当后发际正中直上5.5寸（如图2-86）。

［主治］头痛、眩晕、癫狂痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

20. 百会（DU20）

［定位］在头部，当前发际正中直上5寸，或两耳连

线的中点（如图2-86）。

［主治］头痛、眩晕、中风失语、癫狂、脱肛、泻泄、阴挺、健忘、不寐。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

21. 前顶（DU21）

［定位］在头部，当前发际正中直上3.5寸（如图2-86）。

［主治］头痛、眩晕、鼻渊、癫痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

22. 囟会（DU22）

［定位］在头部，当前发际正中直上2寸（如图2-86）。

［主治］头痛、眩晕、鼻渊、癫痫

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸，小儿前囟未闭者禁针；可灸。

23. 上星（DU23）

［定位］在头部，当前发际正中直上1寸（如图2-86）。

［主治］头痛、目痛、鼻渊、鼻衄、癫狂、疟疾、热病。

［刺灸法］平刺0.5～1寸；可灸。

24. 神庭（DU24）

［定位］在头部，当前发际正中直上0.5寸（如图2-86）。

［主治］头痛、眩晕、失眠、鼻渊、癫痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。

25. 素髎（DU25）

［定位］在面部，当鼻尖的正中央（如图2-86）。

［主治］鼻渊、鼻衄、喘息、昏迷、惊厥、新生儿窒息。

［刺灸法］向上斜刺0.3～0.5寸，或点刺出血。

26. 水沟（人中DU26）

［定位］在面部，当人中沟的上1/3与中1/3交点处（如图2-86）。

［主治］昏迷、昏厥、癫狂痫、小儿惊风、口角㖞斜、腰脊强痛。

［刺灸法］向上斜刺0.3～0.5寸，或用指甲按掐。

27. 兑端（DU27）

［定位］在面部，当上唇的尖端，人中沟下端的皮肤与唇的移行部（如图2-86）。

［主治］癫狂、齿龈肿痛、口㖞、鼻衄。

［刺灸法］向上斜刺0.2～0.3寸。

28. 龈交（DU28）

［定位］在上唇内，唇系带与上齿龈的相接处（如图2-87）。



图2-87

［主治］癫狂、齿龈肿痛、口㖞、口臭、鼻渊。

［刺灸法］向上斜刺0.2~0.3寸，或点刺出血。

【记忆小结1】督脉穴位一览表（表2-14）。

表2-14　督脉穴位一览表

穴位	定位	主治
长强*（DU1）	在尾骨端下，当尾骨端与肛门连线的中点	泻泄、便血、便秘、痔疾、脱肛、癫狂痫、腰脊和尾骶部疼痛
腰俞（DU2）	在骶部，当后正中线上，适对骶管裂孔	月经不调、痔疾、腰脊强痛、下肢痿痹、癫痫
腰阳关*（DU3）	在腰部，当后正中线上，第4腰椎棘突下凹陷中	月经不调、遗精、阳痿、腰骶痛、下肢痿痹
命门*（DU4）	在腰部，当后正中线上，第2腰椎棘突下凹陷中	遗精、阳痿、带下、遗尿、尿频、月经不调、泻泄、腰脊强痛、手足逆冷
悬枢（DU5）	在腰部，当后正中线上，第1腰椎棘突下凹陷中	泻泄、腹痛、腰脊强痛
脊中（DU6）	在背部，当后正中线上，第11胸椎棘突下凹陷中	泻泄、黄疸、痔疾、小儿疳疾、脱肛、腰脊强痛
中枢（DU7）	在背部，当后正中线上，第10胸椎棘突下凹陷中	黄疸、呕吐、腹满、腰脊强痛
筋缩（DU8）	在背部，当后正中线上，第9胸椎棘突下凹陷中	癫痫、抽搐、背强、胃痛

续表

穴位	定位	主治
至阳*（DU9）	在背部，当后正中线上，第7胸椎棘突下凹陷中	胸胁胀满、黄疸、咳嗽、气喘、背痛、脊强
灵台（DU10）	在背部，当后正中线上，第6胸椎棘突下凹陷中	咳嗽、气喘、疔疮、脊背强痛
神道（DU11）	在背部，当后正中线上，第5胸椎棘突下凹陷中	心悸、健忘、咳嗽、脊背强痛
身柱（DU12）	在背部，当后正中线上，第3胸椎棘突下凹陷中	咳嗽、气喘、癫痫、脊背强痛
陶道（DU13）	在背部，当后正中线上，第1胸椎棘突下凹陷中	头痛、疟疾、热病、脊强
大椎*（DU14）	在后正中线上，第7颈椎棘突下凹陷中	热病、疟疾、咳嗽、气喘、骨蒸盗汗、癫痫、头痛项强、肩背痛、腰脊强痛、风疹
哑门*（DU15）	在项部，当后发际正中直上0.5寸，第1颈椎下	暴喑、舌强不语、癫狂痫、头痛、项强
风府*（DU16）	在项部，当后发际正中直上1寸，枕外隆凸直下，两斜方肌之间凹陷中	头痛、项强、眩晕、咽喉肿痛、失音、癫狂、中风
脑户（DU17）	在头部，当后发际正中直上2.5寸，风府上1.5寸，枕外隆凸的上缘凹陷处	头痛、头晕、项强、失音、癫痫
强间（DU18）	在头部，当后发际正中直上4寸	头痛、目眩、项强、癫痫

续表

穴位	定位	主治
后顶（DU19）	在头部，当后发际正中直上5.5寸	头痛、眩晕、癫狂痫
百会*（DU20）	在头部，当前发际正中直上5寸，或两耳连线的中点	头痛、眩晕、中风失语、癫狂、脱肛、泻泄、阴挺、健忘、不寐
前顶（DU21）	在头部，当前发际正中直上3.5寸	头痛、眩晕、鼻渊、癫痫
囟会（DU22）	在头部，当前发际正中直上2寸	头痛、眩晕、鼻渊、癫痫
上星*（DU23）	在头部，当前发际正中直上1寸	头痛、目痛、鼻渊、鼻衄、癫狂、疟疾、热病
神庭（DU24）	在头部，当前发际正中直上0.5寸	头痛、眩晕、失眠、鼻渊、癫痫
素髎*（DU25）	在面部，当鼻尖的正中央	鼻渊、鼻衄、喘息、昏迷、惊厥、新生儿窒息
水沟*（DU26）	在面部，当人中沟的上1/3与中1/3交点处	昏迷、昏厥、癫狂痫、小儿惊风、口角㖞斜、腰脊强痛
兑端（DU27）	在面部，当上唇的尖端，人中沟下端的皮肤与唇的移行部	癫狂、齿龈肿痛、口喎、鼻衄
龈交（DU28）	在上唇内，唇系带与上齿龈的相接处	癫狂、齿龈肿痛、口喎、口臭、鼻渊

【记忆小结2】督脉穴位总图（如图2-90、图2-91）。



图2-88　督脉穴位总图之1



图2-89　督脉穴位总图之2

【记忆重点】

（1）督脉所属穴位歌诀：

督脉二八行于脊，长强腰俞阳关密，
命门悬枢接脊中，中枢筋缩至阳逸，
灵台神道身柱长，陶道大椎平肩列，
哑门风府上脑户，强间后顶百会率，
前顶囟会下上星，神庭素髎水沟系，
兑端开口唇中央，龈交唇内齿缝间。

（2）督脉穴位主治概要：

①所有穴位：经脉所过部位病变。

②所有穴位：神志病。

③头顶和项部穴位：鼻病、感冒。

④大椎治疗范围广。

十四、任脉所属穴位

1. 会阴（RN1）

［定位］在会阴部，男性当阴囊根部与肛门连线的中点，女性当大阴唇后联合与肛门连线的中点（如图2-90）。

图2-90

［主治］小便不利、遗尿、遗精、阳痿、痛经、月经不调、带下。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。孕妇慎用。

2. 曲骨（RN2）

［定位］在下腹部，当前正中线上，耻骨联合上缘的中点处（如图2-91）。

［主治］小便不利、遗尿、遗精、阳痿、痛经、月经不调、带下。

［刺灸法］直刺0.5～1寸，内为膀胱，应在排尿后进行针刺；可灸。孕妇慎用。



图2-91

3. 中极（RN3）膀胱募穴

［定位］在下腹部，前正中线上，当脐中下4寸（如图2-91）。

［主治］小便不利、遗尿、疝气、遗精、阳痿、月经不调、崩漏、带下、阴挺、不孕。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。**孕妇慎用。**

4. 关元（RN4）小肠募穴

［定位］在下腹部，前正中线上，当脐中下3寸（如图2-91）。

［主治］遗尿、小便频数、尿闭、泻泄、遗精、阳痿、疝气、月经不调、带下、不孕、中风脱证、虚劳羸瘦**（本穴有强壮作用，为保健要穴）**。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。**孕妇慎用。**

5. 石门（RN5）三焦募穴

［定位］在下腹部，前正中线上，当脐中下2寸（如图2-91）。

［主治］腹痛、水肿、疝气、小便不利、泻泄、经闭、带下、崩漏。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。**孕妇慎用。**

6. 气海（RN6）肓之原穴

［定位］在下腹部，前正中线上，当脐中下1.5寸（如图2-91）。

［主治］腹痛、泻泄、便秘、遗尿、疝气、遗精、阳痿、月经不调、经闭、崩漏、虚脱、形体羸瘦**（本穴有强**

壮作用，为保健要穴）。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。孕妇慎用。

7. 阴交（RN7）

［定位］在下腹部，前正中线上，当脐中下1寸（如图2-91）。

［主治］腹痛、疝气、水肿、月经不调、带下。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。孕妇慎用。

8. 神阙（RN8）

［定位］在腹中部，脐中央（如图2-91）。

［主治］腹痛、泻泄、脱肛、水肿、虚脱。

［刺灸法］因消毒不便，故一般不针，多用艾条灸或艾炷隔盐灸。

9. 水分（RN8）

［定位］在上腹部，前正中线上，当脐中上1寸（如图2-91）。

［主治］水肿、小便不通、腹泻、腹痛、反胃、吐食。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

10. 下脘（RN10）

［定位］在上腹部，前正中线上，当脐中上2寸（如图2-91）。

［主治］腹痛、腹胀、泻泄、呕吐、食谷不化、痞块。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

11. 建里（RN11）

［定位］在上腹部，前正中线上，当脐中上3寸（如图2-91）。

［主治］胃痛、呕吐、食欲不振、腹胀、水肿。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

12. 中脘（RN12）胃募穴；八会穴之腑会

［定位］在上腹部，前正中线上，当脐中上4寸（如图2-91）。

［主治］胃痛、呕吐、吞酸、呃逆、腹胀、泻泄、黄疸、癫狂。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

13. 上脘（RN13）

［定位］在上腹部，前正中线上，当脐中上5寸（如图2-91）。

［主治］胃痛、呕吐、呃逆、腹胀、癫痫。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

14. 巨阙（RN14）心募穴

［定位］在上腹部，前正中线上，当脐中上6寸（如图2-91）。

［主治］胸痛、心痛、心悸、呕吐、癫狂痫。

［刺灸法］向上斜刺0.5～1寸，**不可深刺，以免损伤肝脏；可灸。**

15. 鸠尾（RN15）络穴；膏之原穴

［定位］在上腹部，胸剑结合部下1寸（如图2-91）。

［主治］胸痛、呃逆、腹胀、癫狂痫。

［刺灸法］向上斜刺0.5～1寸。

16. 中庭（RN16）

［定位］在胸部，当前正中线上，平第5肋间，即胸剑结合部（如图2-92）。

［主治］胸胁胀痛、心痛、呕吐、小儿吐乳。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。



图2-92

17. 膻（dàn）中（RN17）心包募穴；八会穴之气会

［定位］在胸部，当前正中线上，平第4肋间，两乳头连线的中点（如图2-92）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、心悸、乳少、呕吐、

噎（dē）膈。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

18. 玉堂（RN18）

［定位］在胸部，当前正中线上，平第3肋间（如图2-92）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、呕吐。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

19. 紫宫（RN19）

［定位］在胸部，当前正中线上，平第2肋间（如图2-92）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

20. 华盖（RN20）

［定位］在胸部，当前正中线上，平第1肋间（如图2-92）。

［主治］咳嗽、气喘、胸胁胀痛

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

21. 璇玑（jī）（RN21）

［定位］在胸部，当前正中线上，天突下1寸（如图2-92）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

22. 天突（RN22）

［定位］在颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央（如

图2-93）。

［主治］咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛、暴喑、瘿气、梅核气、噎膈。

［刺灸法］先直刺0.2寸，然后将针尖转向下方，紧靠胸骨后方刺入1～1.5寸；可灸。

图2-93

23. 廉泉（RN23）

［定位］在颈部，当前正中线上，结喉上方，舌骨上缘凹陷处（如图2-93）。

［主治］舌下肿痛、舌纵流涎、舌强不语、暴喑、喉痹、吞咽困难。

［刺灸法］向舌根斜刺0.5～0.8寸；可灸。

24. 承浆（RN24）

［定位］在面部，当颏唇沟的正中凹陷处（如图

2-92）。

［主治］口喎、齿龈肿痛、流涎、暴喑、癫狂。

［刺灸法］斜刺0.3～0.5寸；可灸。

【记忆小结 I】任脉穴位一览表（表2-15）。

表2-15　任脉穴位一览表

穴位	定　位	主　治
会阴（RN1）	在会阴部，男性当阴囊根部与肛门连线的中点，女性当大阴唇后联合与肛门连线的中点	小便不利、遗尿、遗精、阳痿、痛经、月经不调、带下
曲骨（RN2）	在下腹部，当前正中线上，耻骨联合上缘的中点处	小便不利、遗尿、遗精、阳痿、痛经、月经不调、带下
中极*（RN3）	在下腹部，前正中线上，当脐中下4寸	小便不利、遗尿、疝气、遗精、阳痿、月经不调、崩漏、带下、阴挺、不孕
关元*（RN4）	在下腹部，前正中线上，当脐中下3寸	遗尿、小便频数、尿闭、泻泄、遗精、阳痿、疝气、月经不调、带下、不孕、中风脱证、虚劳羸瘦（本穴有强壮作用，为保健要穴）
石门（RN5）	在下腹部，前正中线上，当脐中下2寸	腹痛、水肿、疝气、小便不利、泻泄、经闭、带下、崩漏

续表

穴位	定　位	主　治
气海*（RN6）	在下腹部，前正中线上，当脐中下1.5寸	腹痛、泻泄、便秘、遗尿、疝气、遗精、阳痿、月经不调、经闭、崩漏、虚脱、形体羸瘦（本穴有强壮作用，为保健要穴）
阴交（RN7）	在下腹部，前正中线上，当脐中下1寸	腹痛、疝气、水肿、月经不调、带下
神阙*（RN8）	在腹中部，脐中央	腹痛、泻泄、脱肛、水肿、虚脱
水分（RN9）	在上腹部，前正中线上，当脐中上1寸	水肿、小便不通、腹泻、腹痛、反胃、吐食
下脘*（RN10）	在上腹部，前正中线上，当脐中上2寸	腹痛、腹胀、泻泄、呕吐、食谷不化、痞块
建里*（RN11）	在上腹部，前正中线上，当脐中上3寸	胃痛、呕吐、食欲不振、腹胀、水肿
中脘*（RN12）	在上腹部，前正中线上，当脐中上4寸	胃痛、呕吐、吞酸、呃逆、腹胀、泻泄、黄疸、癫狂
上脘（RN13）	在上腹部，前正中线上，当脐中上5寸	胃痛、呕吐、呃逆、腹胀、癫痫
巨阙（RN14）	在上腹部，前正中线上，当脐中上6寸	胸痛、心痛、心悸、呕吐、癫狂痫
鸠尾（RN15）	在上腹部，胸剑结合部下1寸	胸痛、呃逆、腹胀、癫狂痫

续表

穴位	定　位	主　治
中庭（RN16）	在胸部，当前正中线上，平第5肋间，即胸剑结合部	胸胁胀痛、心痛、呕吐、小儿吐乳
膻中*（RN17）	在胸部，当前正中线上，平第4肋间，两乳头连线的中点	咳嗽、气喘、胸痛、心悸、乳少、呕吐、噎膈
玉堂（RN18）	在胸部，当前正中线上，平第3肋间	咳嗽、气喘、胸痛、呕吐
紫宫（RN19）	在胸部，当前正中线上，平第2肋间	咳嗽、气喘、胸痛
华盖（RN20）	在胸部，当前正中线上，平第1肋间	咳嗽、气喘、胸胁胀痛
璇玑（RN21）	在胸部，当前正中线上，天突下1寸	咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛
天突*（RN22）	在颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央	咳嗽、气喘、胸痛、咽喉肿痛、暴喑、瘿气、梅核气、噎膈
廉泉*（RN23）	在颈部，当前正中线上，结喉上方，舌骨上缘凹陷处	舌下肿痛、舌纵流涎、舌强不语、暴喑、喉痹、吞咽困难
承浆*（RN24）	在面部，当颏唇沟的正中凹陷处	口喎、齿龈肿痛、流涎、暴喑、癫狂

【记忆小结2】任脉穴位总图（如图2-94）。



图2-94　任脉穴位总图

【记忆重点】

（1）任脉所属穴位歌诀：

任脉廿四起会阴，曲骨中极关元针，

石门气海阴交生，神阙一寸上水分，
下脘建里中上脘，巨阙鸠尾步中庭，
膻中玉堂连紫宫，华盖璇玑天突逢，
廉泉承浆任脉终。

（2）任脉穴位主治概要：

以局部和就近病变为主，有的穴位有强壮作用，如中极、关元、气海、神阙。

十五、常用奇穴

（一）头颈部穴

1. 四神聪（EX-HN1）

［定位］在头顶部，当百会前后左右各1寸，共4穴（如图2-95）。

［主治］头痛、眩晕、失眠、健忘、癫痫。

［刺灸法］平刺0.5～0.8寸；可灸。



图2-95

2. 印堂（EX-HN3）

［定位］在额部，两眉头的中间（如图2-96）。

［主治］头痛、眩晕、鼻衄、鼻渊、小儿惊风、失眠。

［刺灸法］提捏局部皮肤，平刺0.3～0.5寸，或用三棱针点刺出血；可灸。



图2-96

3. 鱼腰（EX-HN4）

［定位］在额部，瞳孔直上，眉毛中（如图2-96）。

［主治］眉棱骨痛、眼睑瞤动、眼睑下垂、目赤肿痛、口眼㖞斜、目翳。

［刺灸法］平刺0.3～0.5寸；可灸。

4. 上明

［定位］在额部，眉弓中点，眶上缘下（如图

2-96）。

［主治］目疾。

［刺灸法］轻压眼球向下，向眶缘缓慢直刺0.5～1.5寸，不提插。

5. 太阳（EX-HN5）

［定位］在颞部，当眉梢与目外眦之间，向后约一横指的凹陷中（如图2-98）。

［主治］头痛、目疾。

［刺灸法］直刺或斜刺0.3～0.5寸，或点刺出血。

6. 球后（EX-HN7）

［定位］在面部，当眶下缘外1/4与内3/4交界处（如图2-96）。

［主治］目疾。

［刺灸法］轻压眼球向上，向眶缘缓慢直刺0.5～1.5寸，不提插。

7. 上迎香（EX-HN8）

［定位］在面部，当鼻翼软骨与鼻甲的交界处，近鼻唇沟上端处（如图2-96）。

［主治］鼻渊、鼻部疮疖（jiē）。

［刺灸法］向内平刺0.3～0.5寸；可灸。

8. 夹承浆

［定位］在面部，承浆穴旁开1寸（如图2-96）。

［主治］齿龈肿痛、口喎。

［刺灸法］斜刺或平刺0.3～0.5寸；可灸。

9. 金津（EX-HN12）

［定位］在口腔内，当舌下系带左侧静脉上（如图2-97）。

［主治］口疮、舌强、舌肿、呕吐、消渴。

［刺灸法］点刺出血。



图2-97

10. 玉液（EX-HN13）

［定位］在口腔内，当舌下系带右侧静脉上（如图2-97）。

［主治］口疮、舌强、舌肿、呕吐、消渴。

［刺灸法］点刺出血。

11. 牵正

［定位］在面颊部，耳垂前0.5～1寸处（如图2-98）。

［主治］口喎、口疮。

［刺灸法］点刺出血。

12. 翳明（EX-HN14）

［定位］在项部，当翳风穴后1寸（如图2-98）。

［主治］头痛、眩晕、目疾、耳鸣、失眠。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。



图2-98

13. 安眠

［定位］在项部，当翳风穴与风池穴连线的中点（如图2-98）。

［主治］失眠、头痛、眩晕、心悸、癫狂。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸；可灸。

（二）胸腹部穴

1. 子宫（EX-CA1）

［定位］在下腹部，当脐中下4寸，中极旁开3寸（如图2-99）。



图2-99

［主治］阴挺、月经不调、痛经、崩漏、不孕。

［刺灸法］直刺0.8～1.2寸。

2. 三角灸

［定位］以两口角之间的长度为一边，作等边三角形，将顶角置于脐心，底边呈水平线，两底角处是该穴（如图2-99）。

［主治］疝气、腹痛。

［刺灸法］艾炷灸5～7壮。

（三）背部穴

1. 定喘（EX-B1）

［定位］在背部，当第7颈椎棘突下，旁开0.5寸（如图2-100）。

［主治］哮喘、咳嗽、肩背痛。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

2. 夹脊（EX-B2）

［定位］在背腰部，当第1胸椎至第5腰椎棘突下两侧，后正中线旁开0.5寸，一侧17穴，左右共34穴（如图



图2-100

2-100）。

［主治］适应范围较广，其中上胸部的穴位治疗心肺、上肢疾病；下胸部的穴位治疗胃肠疾病；腰部的穴位治疗腰腹及下肢疾病。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；或用梅花针扣刺；可灸。

3. 胃脘下俞（EX-B3）

［定位］在背部，当第8胸椎棘突下，旁开1.5寸（如图2-100）。

［主治］胃痛、腰痛、胸胁痛、消渴。

［刺灸法］斜刺0.3～0.5寸；可灸。

4. 痞根（EX-B4）

［定位］在腰部，当第1腰椎棘突下，旁开3.5寸（如图2-100）。

［主治］痞块、腰痛。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

5. 腰眼（EX-B7）

［定位］在腰部，当第4腰椎棘突下，旁开约3.5寸凹陷中（如图2-100）。

［主治］腰痛、月经不调、带下。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

6. 十七椎（EX-B8）

［定位］在腰部，当后正中线上，第5腰椎棘突下（如图2-100）。

［主治］腰腿痛、下肢瘫痪、崩漏、月经不调。

［刺灸法］直刺0.5～1寸；可灸。

7. 腰奇（EX-B9）

［定位］在骶部，当尾骨端直上2寸，骶角之间凹陷中（如图2-100）。

［主治］癫痫、头痛、失眠、便秘。

［刺灸法］向上平刺1～1.5寸；可灸。

（四）上肢部穴

1. 肩前

［定位］在肩部，正坐垂臂，当腋前皱襞顶端与肩髃穴连线的中点（如图2-101）。

［主治］肩臂痛、臂不能举。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

2. 肘尖（EX-UE1）

［定位］在肘后部，屈肘当尺骨鹰嘴的尖端（如图2-102）。

［主治］瘰疬、痈疽、肠痈。

［刺灸法］艾炷灸7～15壮。

3. 二白（EX-UE2）

［定位］在前臂掌侧，腕横纹上4寸，桡侧腕屈肌腱的两侧，一侧各1穴，一臂2穴，左右两臂共4穴（如图2-101）。



图2-101

图2-102

［主治］痔疾、脱肛、前臂痛、胸胁痛。

［刺灸法］直刺0.5～0.8寸；可灸。

4. 中泉（EX-UE3）

［定位］在腕背侧横纹中，当指总伸肌腱桡侧的凹陷处（如图2-103）。

［主治］胸闷、胃痛、呕吐。

［刺灸法］直刺0.3～0.5寸；可灸。



图2-103

5. 中魁（EX-UE4）

［定位］在中指背侧近侧指间关节的中点处（如图2-104）。



图2-104

［主治］噎膈、呕吐、食欲不振、呃逆。

［刺灸法］针刺0.2～0.3寸；艾炷灸5～7壮。

6. 腰痛点（EX-UE7）

［定位］在手背侧，当第2、第3掌骨及第4、第5掌骨之间，当腕横纹与掌指关节中点处，一侧2穴，左右共4穴（如图2-103）。

［主治］急性腰扭伤。

［刺灸法］由两侧向掌中斜刺0.5～0.8寸。

7. 落枕穴（EX-UE8）

［定位］在手背侧，当第2、第3掌骨间，指掌关节后约0.5寸处（如图2-103）。

［主治］落枕、手臂痛、胃痛。

［刺灸法］直刺或斜刺0.5～0.8寸。

8. 八邪（EX-UE9）

［定位］在手背侧，微握拳，第1至第5指间，指蹼后方赤白肉际处，左右共8穴（如图2-103）。

［主治］手指麻木、烦热、目痛、毒蛇咬伤、手背肿痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸，或点刺出血。

9. 四缝（EX-UE10）

［定位］在第2至第5指掌侧，近端指关节的中央，一手4穴，左右共8穴（如图2-105）。



图2-105

［主治］小儿疳疾、百日咳。

［刺灸法］点刺出血或挤出少许黄色透明黏液。

10. 十宣（EX-UE11）

［定位］在手十指尖端，距指甲游离缘0.1寸（指寸），左右共10穴（如图2-104）。

［主治］昏迷、癫痫、高热、咽喉肿痛。

［刺灸法］浅刺0.1～0.2寸，或点刺出血。

（五）下肢部穴

1. 环中（EX-LE1）

［定位］在臀部，环跳穴与腰俞穴连线的中点（如图2-106）。

［主治］坐骨神经痛、腰痛、腿痛

［刺灸法］直刺2～3寸。



图2-106

2. 百虫窝（EX-LE3）

［定位］屈膝，在大腿内侧，髌底内侧端上3寸，即血海上1寸（如图2-107）。

［主治］风湿痒疹、下部生疮。

［刺灸法］直刺1.5～2寸；可灸。

3. 鹤顶（EX-LE2）

［定位］在膝上部，髌底的中点上方凹陷处（如图2-107）。

［主治］膝痛、足胫无力、瘫痪。

［刺灸法］直刺1～1.5寸；可灸。

4. 膝眼（EX-LE5）

［定位］屈膝，在髌韧带两侧凹陷中。在内侧的称内膝眼，在外侧的



图2-107

称外膝眼（如图2-107）。

［主治］膝痛、腿痛、脚气。

［刺灸法］向膝中斜刺0.5～1寸；或透刺对侧膝眼；可灸。

5. 胆囊（EX-LE6）

［定位］在小腿外侧上部，当腓骨小头前下方凹陷处（阳陵泉）直下2寸（如图2-107）。

［主治］急、慢性胆囊炎、胆石症、胆道蛔虫症、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1～2寸；可灸。

6. 阑尾（EX-LE7）

［定位］在小腿前侧上部，当犊鼻下5寸，胫骨前缘旁开一横指（如图2-107）。

［主治］急、慢性阑尾炎、消化不良、下肢痿痹。

［刺灸法］直刺1.5～2寸；可灸。

7. 八风（EX-LE10）

［定位］在足背侧，第1至第5趾间，趾蹼缘后方赤白肉际处，一足4穴，左右共8穴（如图2-107）。

［主治］足跗肿痛、毒蛇咬伤、脚气、趾痛。

［刺灸法］斜刺0.5～0.8寸或点刺出血。

第3章　特定穴速记

第1节　五　输　穴

一、五输穴的概念

五输穴为十二经脉每条经脉在四肢肘、膝关节以下的5个重要穴位。十二经脉共有五输穴60个。

五输穴分别称为：井、荥、输、经、合。古人把经气的运行比喻为水流的从小到大，从浅到深。井为源头，经气所出之处；荥为涓涓泉水，经气小且浅；输为小溪流，经气逐渐从小到大，由浅人深；经为江河，经气较大、较深；合为百川汇合人海，经气充盛，在此汇人脏腑。阴经五输穴的五行属性为井属木，荥属火，输属土，经属金，合属水；阳经五输穴的五行属性为井属金，荥属水，输属木，经属火，合属土。

二、五输穴的内容

见表3-1。

表3-1　五输穴一览表

经　脉	井	荥	输	经	合
手太阴肺经	少商	鱼际	太渊	经渠	尺泽
手阳明大肠经	商阳	二间	三间	阳溪	曲池
足阳明胃经	厉兑	内庭	陷谷	解溪	足三里
足太阴脾经	隐白	大都	太白	商丘	阴陵泉
手少阴心经	少冲	少府	神门	灵道	少海
手太阳小肠经	少泽	前谷	后溪	阳谷	小海
足太阳膀胱经	至阴	通谷	束骨	昆仑	委中
足少阴肾经	涌泉	然谷	太溪	复溜	阴谷
手厥阴心包经	中冲	劳宫	大陵	间使	曲泽
手少阳三焦经	关冲	液门	中渚	支沟	天井
足少阳胆经	足窍阴	侠溪	足临泣	阳辅	阳陵泉
足厥阴肝经	大敦	行间	太冲	中封	曲泉

【记忆重点】

少商鱼际与太渊，经渠尺泽肺相连，
商阳二三间合谷，阳溪曲池大肠牵，
厉兑内庭陷谷胃，冲阳解溪三里随，
隐白大都太白脾，商丘阴陵泉要知，
少冲少府属于心，神门灵道少海寻，
少泽前谷后溪腕，阳谷小海小肠经，
至阴通谷束京骨，昆仑委中膀胱经，

涌泉然谷与太溪，复溜阴谷肾所宜，
中冲劳宫心包经，大陵间使传曲泽，
关冲液门中渚焦，阳池支沟天井索，
窍阴侠溪临泣胆，丘墟阳辅阳陵泉，
大敦行间太冲存，中封曲泉属于肝。

第2节 原　　穴

一、原穴的概念

原穴是脏腑的原气输注、经过和留止的部位。原穴与三焦有密切的关系，三焦是原气的别使，导源肾间动气，而输布于全身，调和内外，宣导上下，关系着人的脏腑气化功能，而原穴就是其留止之处，所以说“五脏六腑之有病者，皆取其原也”。十二经各有一原穴，均分布在四肢腕踝关节附近。

二、原穴的内容

表3-2　原穴一览表

经　脉	原穴
手太阴肺经	太渊
手阳明大肠经	合谷
足阳明胃经	冲阳
足太阴脾经	太白

续表

经　脉	原穴
手少阴心经	神门
手太阳小肠经	腕骨
足太阳膀胱经	京骨
足少阴肾经	太溪
手厥阴心包经	大陵
手少阳三焦经	阳池
足少阳胆经	丘墟
足厥阴肝经	太冲

【记忆重点】

阴经以输代原，阳经有专门的原穴。详见五腧穴记忆歌诀，其中斜体字所示穴位即是各经原穴。

第3节　络　　穴

一、络穴的概念

络穴，是络脉由经脉别出部位的穴位，是表里两经联络之处。十四经脉各有一络穴，加上脾之大络共十五络穴。十二经脉络穴均位于四肢肘膝关节以下部位，任、督脉络穴和脾之大络分别位于躯干的前、后和侧面。

二、络穴的内容

表3-3　络穴一览表

经　脉	络穴
手太阴肺经	列缺
手阳明大肠经	偏历
足阳明胃经	丰隆
足太阴脾经	公孙
手少阴心经	通里
手太阳小肠经	支正
足太阳膀胱经	飞扬
足少阴肾经	大钟
手厥阴心包经	内关
手少阳三焦经	外关
足少阳胆经	光明
足厥阴肝经	蠡沟
督脉	长强
任脉	鸠尾
脾之大络	大包

【记忆重点】

人身络穴一十五，我今逐一从头举，

手太阴络为列缺，手少阴络即通里，
手厥阴络为内关，手太阳络支正是，
手阳明络偏历当，手少阳络外关位，
足太阳络号飞扬，足阳明络丰隆记，
足少阳络为光明，足太阴络公孙寄，
足少阴络名大钟，足厥阴络蠡沟配，
阳督之络号长强，阴任之络号尾翳，
脾之大络为大包，十五络脉君须记。

第4节　郄　　穴

一、郄穴的概念

郄穴是经脉经气深聚的部位。十二经脉及阴阳跷、阴阳维脉各有一个郄穴，共有十六个郄穴，称为十六郄。

二、郄穴的内容

见表3–4。

表3–4　郄穴一览表

经　脉	郄穴
手太阴肺经	孔最
手阳明大肠经	温溜
足阳明胃经	梁丘

续表

经　脉	郄　穴
足太阴脾经	地机
手少阴心经	阴郄
手太阳小肠经	养老
足太阳膀胱经	金门
足少阴肾经	水泉
手厥阴心包经	郄门
手少阳三焦经	会宗
足少阳胆经	外丘
足厥阴肝经	中都
阴维脉	筑宾
阳维脉	阳交
阴跷脉	交信
阳跷脉	附阳

【记忆重点】

郄义即孔隙，本属气血集；
肺向孔最取，大肠温溜别；
胃经是梁丘，脾属地机穴；
心则取阴郄，小肠养老别；
膀胱金门守，肾向水泉施；
心包郄门刺，三焦会宗持；

胆郄在外丘，肝经中都是；
阳跷附阳走，阴跷交信期；
阳维阳交穴，阴维筑宾知。

第5节 下 合 穴

一、下合穴的概念

下合穴是六腑之气下合于足三阳经的六个穴位，又称六腑下合穴。足三阳经的下合穴即五输穴中的合穴。手三阳经除了在上肢五输穴中的合穴外，在下肢另有下合穴。

二、下合穴的内容

见表3-5。

表3-5 下合穴一览表

六 腑	下合穴
大肠	上巨墟
胃	足三里
小肠	下巨墟
膀胱	委中
三焦	委阳
胆	阳陵泉

【记忆重点】

胃经下合三里乡，上下巨虚大小肠，
膀胱当合委中穴，三焦下合属委阳，
胆经之合阳陵泉，腑病用之效必彰。

第6节 俞 穴

一、俞穴的概念

俞穴，又称背俞穴，是脏腑经气输注于背腰部之处。

二、俞穴的内容

见表3-6。

表3-6 俞穴的内容一览表

脏 腑	俞 穴
肺	肺俞
大肠	大肠俞
胃	胃俞
脾	脾俞
心	心俞
小肠	小肠俞
膀胱	膀胱俞

续表

脏　腑	俞　穴
肾	肾俞
心包	厥阴俞
三焦	三焦俞
胆	胆俞
肝	肝俞

【记忆重点】

三椎肺俞厥阴四，心五肝九十胆俞，
十一脾俞十二胃，十三三焦椎旁居，
肾俞却与命门平，十四椎外穴是真，
大肠十六小十八，膀胱俞与十九平。

第7节　募　　穴

一、募穴的概念

募穴是脏腑经气汇聚于胸腹部之处。

二、募穴的内容

见表3-7。

表3-7　募穴的内容一览表

脏　腑	募　穴
肺	中府
大肠	天枢
胃	中脘
脾	章门
心	巨阙
小肠	关元
膀胱	中极
肾	京门
心包	膻中
三焦	石门
胆	日月
肝	期门

【记忆重点】

天枢大肠肺中府，关元小肠巨阙心，
中极膀胱京门肾，胆日月肝期门寻，
脾募章门胃中脘，气化三焦石门针，
心包募穴何处取？胸前膻中觅浅深。

第8节 八 会 穴

一、八会穴的概念

八会穴是指脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓等精气所汇集的8个穴位，分布于躯干部和四肢部。

二、八会穴的内容

见表3-8。

表3-8 八会穴的内容一览表

脏会	章门	筋会	阳陵泉
腑会	中脘	脉会	太渊
气会	膻中	骨会	大杼
血会	膈俞	髓会	绝骨

【记忆重点】

脏会章门腑中脘，髓会绝骨筋阳陵，
骨会大杼血膈俞，气在膻中脉太渊。

第9节　八脉交会穴

一、八脉交会穴的概念

十二经脉与奇经八脉相通的八个穴位。

二、八脉交会穴的内容

见表3-9。

表3-9　八脉交会穴一览表

经脉	八脉交会穴	主治范围
冲脉	公孙	心、胸、胃
阴维脉	内关	
督脉	后溪	目内眦、颈项、耳、肩
阳跷脉	申脉	
带脉	足临泣	目锐眦、耳后、颊、颈、肩
阳维脉	外关	
任脉	列缺	肺系、咽喉、胸膈
阴跷脉	照海	

【记忆重点】

公孙冲脉胃心胸，内关阴维下总同；

临泣胆经连带脉，阳维目锐外关逢；
后溪督脉内眦颈，申脉阳跷络亦通；
列缺任脉行肺系，阴跷照海膈喉咙。

第10节 交 会 穴

一、交会穴的概念

两条或两条以上的经脉在循行过程中相互交会，在会合部位的穴位称交会穴，多分布于躯干部。

二、交会穴的内容

历代文献对交会穴的记载不尽相同，一般而言，交会穴有95个。限于篇幅，不一一列举。

【附录】穴名检索

A

安眠……234

B

八风……243
八邪……241
不容……78
本神……181
白环俞……128
百会……211
百虫窝……242
步廊……155
秉风……113
胞肓……134
髀关……81
臂臑……65

C

长强……206
尺泽……55
冲门……96
冲阳……84
次髎……128
承山……135
承光……121
承扶……129
承灵……183
承泣……73
承浆……225
承筋……135
承满……78
瘈脉……172
攒竹……120

D

大横……98
大巨……80
大包……99
大迎……74
大杼……122
大肠俞……127

大钟……149
大都……93
大陵……163
大敦……198
大椎……209
大赫……153
地五会……190
地仓……74
地机……95
定喘……235
兑端……213
带脉……185
胆俞……125
胆囊……243
膻中……223
督俞……124
犊鼻……82

E

二白……238
二间……61
耳门……173
耳和髎……173

F

飞扬……135
丰隆……84
风门……122
风市……187
风池……183
风府……211
伏兔……81
扶突……67
附分……130
府舍……97
肺俞……124
浮白……180
浮郄……130
复溜……150
跗阳……136
腹结……97
腹通谷……154
腹哀……98

G

公孙……94
归来……81

光明……189
关门……78
关元……220
关元俞……127
关冲……167
肝俞……125
膏肓……132
膈关……132
膈俞……125

H

华盖……224
后顶……211
后溪……110
会阳……129
会阴……218
会宗……169
合阳……134
合谷……61
肓门……133
肓俞……153
环中……241
环跳……187
滑肉门……80
魂门……133
颔厌……179
横骨……151
鹤顶……242

J

巨骨……66
巨阙……222
巨髎……74
交信……151
夹承浆……232
夹脊……235
间使……163
极泉……104
角孙……173
鸠尾……222
京门……185
京骨……137
肩井……184
肩贞……112
肩外俞……113
肩中俞……113
肩前……238
肩髃……65

肩髎……170
居髎……186
金门……137
金津……233
经渠……56
建里……222
急脉……201
脊中……208
厥阴俞……124
筋缩……208
颊车……74
解溪……84
睛明……119
箕门……96

K

孔最……55
口禾髎……67
库房……77
昆仑……136

L

厉兑……85
列缺……55
劳宫……164
灵台……209
灵道……105
灵墟……156
络却……121
落枕……240
梁门……78
梁丘……82
颅息……173
廉泉……225
阑尾……243
漏谷……94
蠡沟……199

M

目窗……182
命门……207
眉冲……120

N

内关……163
内庭……85
脑户……211
脑空……183

睫会……170
睫俞……112

P

仆参……136
偏历……62
脾俞……125
痞根……237
魄户……132
膀胱俞……127

Q

气户……76
气穴……153
气冲……81
气舍……76
气海……220
气海俞……126
丘墟……189
山池……64
山泽……162
曲垣……113
曲差……120
曲骨……218
曲泉……200
曲鬓……180
牵正……233
青灵……104
前谷……110
前顶……212
缺盆……76
清冷渊……170
球后……232
期门……202
强间……211
颧髎……114

R

人迎……75
日月……185
乳中……77
乳根……78
然谷……148

S

十七椎……237
十宣……241
三阳络……169

三阴交…… 94
三间…… 61
三角灸……235
三焦俞……126
上巨虚…… 83
上关……179
上明……231
上迎香……232
上星……212
上脘……222
上廉…… 63
上髎……128
少冲……107
少府……106
少泽……109
少商…… 56
少海……105
手三里…… 64
手五里…… 65
水分……221
水沟……213
水突…… 75
水泉……149
水道…… 80
石门……220
石关……154
申脉……137
四白…… 73
四神聪……230
四满……153
四渎……169
四缝……241
丝竹空……174
束骨……137
身柱……209
肾俞……126
神门……106
神庭……212
神封……156
神堂……132
神道……209
神阙……221
神藏……156
食窦…… 98
俞府……156
素髎……213
商丘…… 94
商曲……154

商阳…… 60
率谷……180

T

天井……169
天池……161
天冲……180
天宗……113
天府…… 54
天枢…… 80
天突……224
天柱……122
天泉……161
天容……114
天鼎…… 66
天窗……114
天溪…… 98
天牖……170
天髎……170
太乙…… 79
太白…… 93
太冲……199
太阳……232
太渊…… 56
太溪……149
头临泣……182
头窍阴……181
头维…… 75
听会……179
听宫……115
条口…… 83
通天……121
通里……105
阳道……209
瞳子髎……178

W

五处……121
五枢……185
外丘……188
外关……168
外陵…… 80
完骨……181
委中……130
委阳……130
胃仓……133
胃俞……126
胃脘下俞……237

犀翳…… 77
维道……186
温溜…… 62
腕骨……110

X

下巨虚…… 83
下关…… 75
下脘……221
下廉…… 63
下髎……129
小肠俞……127
小海……112
心俞……124
血海…… 95
囟会……212
行间……198
侠白…… 55
侠溪……190
郄门……162
消泺……170
胸乡…… 98
陷谷…… 85
悬枢……207
悬厘……180
悬钟……189
悬颅……179
璇玑……224
膝关……200
膝阳关……188
膝眼……242

Y

云门…… 54
玉枕……122
玉堂……224
玉液……233
印堂……231
阳白……181
阳交……188
阳池……168
阳谷……111
阳纲……133
阳陵泉……188
阳辅……189
阳溪…… 62
阴市…… 82
阴包……201

阴交……221
阴谷……151
阴郄……106
阴都……154
阴陵泉……95
阴廉……201
迎香……68
鱼际……56
养老……111
哑门……210
幽门……154
涌泉……148
彧中……156
鱼腰……231
殷门……129
膺窗……77
液门……167
渊腋……184
隐白……92
意舍……133
腰阳关……207
腰俞……207
腰眼……237
腰奇……237
腰痛点……240
龈交……213
噫嘻……132
翳风……172
翳明……234

Z

子宫……234
支正……111
支沟……168
中冲……164
中极……220
中府……53
中注……153
中枢……208
中泉……239
中庭……223
中封……199
中都……200
中渚……167
中渎……187
中脘……222
中脊俞……128
中髎……129

中魁……239
正营……183
至阳……208
至阴……138
志室……134
足三里……82
足五里……201
足临泣……190
足通谷……138
足窍阴……191
肘髎……65
肘尖……238
周荣……99
秩边……134
章门……202
辄筋……184
紫宫……224
筑宾……151
照海……150