

民间验方五谷汤

张晓燕

(建瓯市中西医结合医院, 福建 建瓯 353100)

关键词: 五谷汤; 制备工艺; 药理

中图分类号: R289.5

文献标识码: B

文章编号: 1000-338X(2007)05-0055-01

五谷汤相传为本土民间验方, 但凡家中小儿食积、外感腹泻、纳呆食少, 便往药店抓上两贴五谷汤, 故此方有着极深厚的群众基础。其组方简单合理, 具有消导除积, 健脾调胃的功效, 用于小儿食积气滞、吞酸噎气、恶心呕吐、脾胃失健和感冒腹泻后有余热、食欲不振等症。本方由我院制剂室制成糖浆用于临床 10 余年(现已停产), 广受欢迎, 在当地已是家喻户晓, 妇孺皆知。为了进一步提高制剂质量及更加适应小儿用药特点, 笔者对该方传统制备工艺进行改进, 改进后服用量减少一半, 疗效不受影响。现总结报道如下:

1 处 方

麦芽 7.5 kg, 谷芽 7.5 kg, 神曲 1.5 kg, 山楂 7.5 kg, 钩藤 1.5 kg, 蝉蜕 1.5 kg。

2 传统制作工艺

将处方中麦芽、谷芽、神曲、山楂、钩藤、蝉蜕 6 味药材共入提取锅中, 加水淹过药面 2 cm, 浸渍 1 h 后, 加热煎煮提取 3 次, 每次时间为 1 h。3 次提取液滤出合并, 于蒸发锅中浓缩药至适量, 静置 48 h, 去除沉淀物, 加入 10% 蔗糖矫味, 0.5% 苯甲酸钠防腐, 溶解混合均匀, 调整药液总量, 分装成 100 瓶(250 ml/瓶)。

3 改进后制作工艺

将处方中麦芽、谷芽、神曲、山楂、蝉蜕 5 味药材粉碎, 大小约 3 mm。装入提取锅中, 加水淹过药面 2 cm, 浸渍 1 h 后加热煎煮, 第一次煎煮时依照传统汤剂煎煮特点, 钩藤后入。共煎煮 3 次, 每次时间为 1 h, 3 次提取液滤出合并, 于蒸发锅中浓缩药至适量, 静置 48 h, 去除沉淀物, 加入 10% 蔗糖矫味, 0.5% 苯甲酸钠防腐, 溶解混合均匀, 调整药液总量, 分装成 250 瓶(100 ml/瓶)。

4 改进前后的外观性状、水煎出物含量、服用量比较

4.1 外观性状比较: 改进前, 糖浆外观呈浅棕色、半透明状, 味酸甜。改进后, 糖浆外观呈黑褐色, 味酸甜。

4.2 改进前后水煎出物总量测定: 精密量取改进前后 2 种滤液 25 ml, 置于干燥恒重的蒸发皿中, 在水浴上蒸干后, 于 105℃干燥 3 h, 移至干燥器中冷却 30 min, 迅速精密测定重量, 以干燥品计算出供试品中水煎出物的百分含量。结果表明: 改进后的水煎出物量约为改进前煎出量的 1.8 倍。

4.3 服用量对比: 改进前服用量每日 3 次, 每次 10 ml。改进后服用量每日 3 次, 每次 5 ml。

5 小 结

5.1 中药材有效成分的浸出包括渗透、溶解、扩散几个过程。把药材制成颗粒, 增加溶媒与药材组织的接触面, 从理论上提高了有效成分的煎出率。在浸出过程中, 扩散占着最主要作用, 根据扩散定律:

$ds = -DF(dc/dx)dt$ (dt 为扩散时间; ds 为在 dt 时间内的扩散量; D 为扩散系数; dc/dx 为浓度差; F 为扩散面积的粉碎度; 负号表示扩散趋向平衡时浓度降低)。

在 dt 时间的扩散量与粉碎度、扩散过程中的浓度和扩散系数成正比, 扩散面积越大, 越有利于浸出。

5.2 中药材的粉碎度要视所采用的溶媒和药材的性质而有所区别。本方中麦芽、谷芽、山楂果皮较坚硬, 其有效成分不易煎出, 经粉碎成粗粉后, 煎出量明显提高。若粉碎成较细的粉末, 易造成沉积、糊化及过滤困难, 故本方制成粗粉较为适宜。

5.3 《中国药典》把“水溶性浸出物”作为鉴定中药质量指标之一, 故把本制剂的水煎出量为制剂改进前后有效成分含量标准, 水煎出量提高, 制剂疗效也相应提高。实验结果表明: 改进后制剂的水煎出量约为原制剂的 1.8 倍, 小儿服用减至半量, 疗效未受影响。

5.4 笔者认为本方虽为本土验方, 主要还是根据小儿“肝常有余, 脾常不足”特点进行组方用药, 方用麦芽、谷芽、山楂、神曲以消食导滞; 又用钩藤、蝉蜕助以凉肝镇惊。由于本方保持传统汤剂的特点, 携带服用方便, 无不良反应, 因而倍受小儿患者父母的欢迎, 值得临床推广。

收稿日期: 2007-06-04

民间验方五谷汤

作者：[张晓燕](#)
作者单位：[建瓯市中西医结合医院, 福建, 建瓯, 353100](#)
刊名：[福建中医药](#)
英文刊名：[FUJIAN JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE](#)
年，卷(期)：2007, 38 (5)

引用本文格式：[张晓燕](#) [民间验方五谷汤](#)[期刊论文]-[福建中医药](#) 2007 (5)