

科学技术文献出版社重庆分社

脐疗

吕炳奎 审订

韩文震 刘凤美

韩文领 韩文治

编著

脐疗

吕炳奎书



韩文领 韩文震 韩文治 刘凤美 编著
吕炳奎 审订

科学技术文献出版社重庆分社

脐 疗

韩文领等 编著

科学技术文献出版社重庆分社 出版
发 行

重庆市市中区胜利路132号

全 国 各 地 新 华 书 店 经 销
重 庆 印 制 一 厂 印 刷

开本：787×1092毫米1/32印张：4.25字数：9万

1990年8月第1版

1990年8月第1次印刷

科技新书目：223—359

印数：1—5200

ISBN7-5023-1147-5/R·183 定价：1.70元

内 容 提 要

全书分上、下两编：上编为总论，用中医和现代医学理论阐述了脐疗的原理、各种施治方法、剂型及禁忌症；下编按内、外、妇、儿、五官和皮肤科分别介绍了117种病症的治疗处方和使用方法。内容简明扼要，具体实用，可供广大医务工作者和中医药爱好者参考阅读。

前 言

脐疗是中医外治法之一，是一种古老而又新兴的疗法。公元281~361年间，晋代葛洪著的《肘后备急方》中，就有脐疗的记载。历代亦有所发展，如唐代的《外台秘要》，明代的《本草纲目》、《普济方》，清代的《理渝骈文》等书，均记载了应用脐疗的经验。但由于多种历史原因，脐疗一直未能得到应有的重视和应用。解放后，党和政府非常重视中医药学，脐疗犹如枯木逢春，得到了较快的发展和较广泛的应用，各种医学杂志不断刊登脐疗的一些经验。大量事实证明，脐疗不仅疗效显著可靠，而且简便易行。然而，从脐疗的现状来看，多偏重于脐疗的临床实践，还没有对脐疗进行系统的研究，至今仍无脐疗专著问世。这给后学者带来了一定的困难，也不利于脐疗的发展和推广。

我从12岁随父学医，幼年亦对脐疗颇有好感。记得，笔者在5岁时，曾患慢性腹泻，多方治疗无效，后来，家母用“慈母保婴散”敷脐，经治三次之后，拖延年余的痼疾痊愈。因此，我在20余年的行医实践中，一直热衷于学习、应用、收集、研究、整理脐疗，并取得了一些经验和成绩。在此基础上，结合古今有关脐疗的论述和经验，与韩文振、韩文治、刘凤美共同写成《脐疗》一书。

本书分上、下两编。上编为总论，用中医和现代医学理论阐述脐疗的原理，介绍各种施治方法、剂型及脐疗的注意事项；下编为验方选集，按病症分类法介绍脐疗验方。本书力求通俗易懂、简明扼要，具体实用，可供广大医务工作者和中医爱好者学习参考。

在编写过程中，承蒙国家卫生部中医局吕炳奎老局长对本书进行详尽的审订和指导，在此特表谢忱。

由于笔者水平所限，难免有不足之处，敬请广大读者指正。

韩文领写于开封

1990.1.

目 录

上编 总论

一、脐疗的治疗原理	(1)
二、脐疗的优点	(5)
三、脐疗的剂型简介	(6)
四、脐疗方法简介	(7)
五、脐疗的注意事项	(9)

下编 脐疗验方 选 集

一、内科疾病	(11)
感冒	(11)
病毒性肝炎	(12)
中暑	(13)
疟疾	(14)
蛔虫病	(16)
痢疾	(17)

急性胃肠炎	(19)
慢性肠炎	(20)
急性胃炎	(21)
急性肠炎	(22)
泄泻	(23)
五更泄	(28)
恶心、呕吐	(29)
胃痛	(30)
便秘	(31)
二便不通	(33)
消化不良	(34)
噤口痢	(35)
腹胀	(36)
关格	(37)
肠梗阻	(37)
高热	(39)
腹水	(40)
肝硬化腹水	(41)
脾肿大	(43)
臌胀	(43)
急性支气管炎	(44)
慢性支气管炎	(45)

咳嗽.....	(46)
哮喘.....	(47)
虚癆、肺结核.....	(48)
吐血.....	(49)
高血压.....	(49)
冠心病、心绞痛.....	(50)
神经官能症.....	(51)
失眠.....	(51)
阳痿.....	(52)
遗精、滑精.....	(53)
男女交合后气绝 症.....	(54)
男子缩阴症.....	(55)
眩晕.....	(55)
厥症.....	(56)
中风、脑血管意外	(57)
癫痫.....	(57)
烦躁.....	(58)
晕车.....	(59)
面神经麻痹.....	(59)
面肌痉挛.....	(61)
急性肾炎.....	(61)
尿路感染.....	(62)
泌尿系结石.....	(63)
小便不禁.....	(64)
小便频数.....	(64)
尿浊、白浊.....	(65)
水肿.....	(66)
前列腺炎.....	(68)

尿潴留.....	(69)
小便不利.....	(72)
黄疸.....	(73)
黑疸.....	(75)
发热.....	(76)
腹痛.....	(76)
症瘕、积聚、痞块	(79)
盗汗.....	(81)
自汗.....	(81)
腰痛.....	(82)
疝气.....	(83)
健身延寿方.....	(84)
二、妇科疾病.....	(86)
月经不调.....	(86)
痛经.....	(87)
经闭.....	(89)
带下.....	(90)
子宫脱垂.....	(91)
难产.....	(91)
胎盘滞留.....	(92)
死胎.....	(93)
先兆流产、习惯性 流产.....	(94)
不孕症.....	(94)
产后感冒.....	(95)
妊娠期小便不利及 小便不通.....	(96)
产后腹痛.....	(96)
产后尿潴留.....	(97)

三、儿科疾病..... (97)

婴幼儿腹泻..... (97)

小儿消化不良..... (103)

小儿缺钙症..... (103)

小儿哮喘..... (104)

小儿腹胀..... (105)

小儿口疮..... (106)

小儿水肿..... (107)

小儿疝气..... (107)

婴儿脐中流水..... (109)

小儿吐泻..... (109)

小儿积滞..... (110)

小儿积聚、腹中

痞块..... (110)

小儿夜啼症..... (111)

小儿肾炎水肿..... (118)

小儿二便不通..... (113)

遗尿..... (113)

小儿痢疾..... (115)

小儿疳积..... (115)

小儿急性支气管

炎..... (116)

小儿马牙..... (117)

小儿惊风..... (117)

小儿虚脱..... (119)

小儿流涎..... (119)

四、外科和皮肤科

疾病..... (119)

疮疖痈疽..... (120)

脱肛..... (120)

破伤风..... (120)

脐湿、脐炎..... (121)

乳腺炎..... (123)

荨麻疹..... (123)

皮肤瘙痒症..... (124)

面部黄褐斑..... (124)

五、五官科疾病..... (125)

口腔炎、口疮..... (125)

牙痛..... (126)

总 论

一、脐疗的治疗原理

脐疗是中医学的一种外治法，这一疗法是运用中西医理论，将药物填、敷、贴、灸、熨、熏、洗、蒸于脐部，达到防治疾病的目的。

脐部，通常是指脐眼部位。《难经》中有“从脐眼到气海之间，是五脏六腑之本，十二经之根，呼吸之门。”之说。

神阙穴位于脐眼中央，故又名脐中穴；《道藏》曰：“脐为后天之气舍”，故神阙穴又称气舍穴，因足阳明经有一个气舍穴，因此，本穴只称神阙而不称气舍。《针灸穴名解》曰：“本穴在脐，脐为先天之结蒂，又为后天之气舍，此间元气尚存。在内景接近大小两肠，大肠为传导之官，变化出焉；小肠为受盛之官，化物出焉，两肠俱关于化，即大而化之之谓神也。”《道藏》曰：“神者变化之极也，故名之以神，阙为中门，出入中门，以示显贵。人身以神志为最贵。此穴为心肾（心藏神，肾藏志）交通之门户，故称之神阙。”

《东医宝鑑》在论脐时讲：“夫人之脐也，受生之初，父精母血相受，凝结以成胞，胎在母腹中，母呼儿呼，母吸儿吸，是胎儿之脐带如花果在枝而通蒂也。既生之后，从口呼

吸，脐门自闭。既长之后，外耗精神，内伤生冷，真气不得调畅，所以，蒸脐固蒂，如水灌土培，草木自茂壮也。”以上论述是很有道理的，现代医学对脐也有类似的认识，如《辞海》在“脐”这个条目下写道：脐带是胎儿和胎盘之间的联系结构，状如绳索。由粘液性结蒂组织所组成，内含一支脐静脉，沿着胎儿腹壁内面通连于肝的血窦，和一对脐动脉与胎儿主动脉相通连。这两种血管的另一端，形成许多互相联系的毛细血管网，分布于胎盘绒毛内。通过胎盘绒毛上皮的渗透作用，胎儿血液与绒毛间隙内母体血液之间进行着物质的交换。胎儿娩出后，脐带失去作用，于数分钟内搏动停止，此时应在脐带根部将其结扎剪断，断端经消毒处理后，妥善包扎，以防感染。

神阙穴是人体的一个重要经穴，它之所以有广泛而显著的治疗作用，这和经络有着密切关系。为了说明这一点，有必要略述经络之概况：经络者，是人体经脉和络脉的总称。凡直行干线都称为经脉；由经脉分出来的网络身体各部分的支脉叫做络脉。经络是运行全身气血、联系脏腑肢节、沟通上下内外、调节体内各部分的通路。通过经络的作用，使人体所有的内脏器官、孔窍、皮毛及筋骨等组织，紧密地联结起来，构成一个统一的、有机的整体。从以上论述可知，经络在人体的生理、病理上都具有重要作用。神阙穴居脐中，是任脉的一个重要穴位，据经络学说和针灸学循经取穴的原理，神阙穴不仅和任脉有密切联系，而且和许多经络、脏腑有着联系。《类经图翼》曰：脐，足阳明下挟脐；足太阴之筋，结于脐；手少阴之筋，下系于脐；冲脉者，起于气街，并足少阴之经，挟脐上行，至胸中而散。督脉少腹直上者，贯脐中央。

任脉者，任，即担任之意。这条经脉起于胞中，行于胸腹部的正中。鉴于足三阴经和阴维、冲脉都有分支直接会合于任脉，所以，任脉起着调节全身阴气的作用，故任脉有“阴脉之海”之称。另外，任，还有“妊养”的意思，其脉起于胞中，在女子具有孕育胎儿的作用，故又有“任主胞胎”之说。

所谓阴脉者，概括的讲，就是手三阴和足三阴之脉。任脉为阴脉之海，能总任一身之阴经，故任脉有病时，则出现疝气、带下、上腹痛、少腹痛、痔疾、泄泻、疟疾、咳嗽、吐血、尿血、牙痛、咽痛、小便不利、噎膈、腰痛、呕吐、呃逆、乳痈、乳痛、月经不调、流产、不孕、死胎不下、产后中风、崩漏、胸腹部的内脏机能失调及元气虚弱等病症。依据经络学说的原理，任脉有病能出现以上诸证，相应地循任脉之经脉施治，同样可以治疗以上诸证。

脐疗的中心点乃神阙穴，乃任脉的重要经穴之一，它在生理上和治疗上对任脉都有一定的代表性，这种论点早已被大量的医疗实践和实验所证明，因此，当任脉及诸阴脉有病时，在神阙穴施治，就能起到疏通经络、调理阴阳气血、强身健体及防治疾病的作用。

从气功学的角度来看，脐（包括神阙穴）尤为重要，从古至今的气功家都重视丹田的作用。丹田就是指脐部或脐周围之处。古代医家曾说：“真阳在，人命在。真阳散，人即死，故称脐为命之蒂。”这里所说的真阳，是指婴儿出生落地，剪断脐带，从母体带来的一点先天之气（又叫元气），此气在人出生后就归入脐内，所以，练气功者就是要练这点先天之气。练气功的重要方法之一，即“意守丹田”（即意守脐部）。在这里且不讲其具体方法，单讲一下意守丹田的作用，

足以使人们认识到脐疗的价值。

意守丹田可使心不外驰，排除杂念，达到诱导大脑安静的目的。再则，由于脐部解剖部位和此区域的内脏组织等因素，意守丹田能改善腹部血液循环，促进腹式呼吸的形成，从而调整了植物神经功能和内脏的生理活动。

意守丹田时，注意力集中于小腹，这样可以诱导血液下降。由于腹式呼吸的形成，呼吸细缓深长，增加了肺活量和换气量，从而增加了血液的含氧量和心肌的收缩力，提高了肌肉张力，达到疏通经络、调和气血、增强内脏功能之效。因此，意守丹田可使疾病康复，机体强健。

从现代医学的观点来看，脐部的皮肤比较薄嫩，这里的神经、血管比较丰富。肺部有肋间神经前皮支、腹壁上下动脉分支。从解剖部位来看，脐部靠近腹腔和盆腔，腹腔和盆腔内有植物神经的主要神经丛存在，如腹腔丛、肠系膜间丛、腹下丛及盆腔丛等，还有最主要的神经节，如腹腔节、肠系膜节、主动脉肾节、肠系膜下节。其中以腹腔丛及盆腔丛最为主要。它们支配所有腹腔和盆腔的脏器和血管，包括膈肌、肝、脾、胃、肠、肾、肾上腺、输尿管、膀胱、卵巢及子宫（或输精管）等及其所属的全部血管。因此，脐部有较强而迅速的吸收能力，有良好的感受功能及传导能力。如用干姜粉、细辛粉加酒调糊热敷脐部，在很短时间内（约5分钟）全身亦感到有温热感，从而足见其吸收传导之快，作用范围之广。我们通过多年的实践认识到：当用各种适宜病情的药物施治于脐部时，均能刺激局部的神经末梢，再通过神经系统的反射与传导，从而调整了机体植物神经的机能、改善了内脏及组织的生理活动和病理变化，增强了机体的免疫力和抗病能力，达到了强身健体、防病治病的目的。

此外，我们还发现了一个规律，一般情况下，内服甲药能治甲病，用甲药敷脐同样能治甲病。运用这一规律，对于创制新的脐疗方剂是有价值的，也为药物治疗开创一个新的给药途径。

二、脐疗的优点

1. 脐疗所采用的验方大都具有“简、便、验”的特点，因此，广大群众和医务人员容易学习掌握，便于推广普及。
2. 脐疗所用药物多是普通的中草药及食物，药源广泛，取材方便，因此，有利于群防群治工作的开展。
3. 脐疗给药途径特殊，避免了药物口服的缺点，也避免了药物被破坏分解。克服了服药困难，对于那些不愿服药和不能服药的病症，如婴幼儿、妇女、老年人以及休克、昏厥的患者，尤为适宜。
4. 脐疗用药量小，具有节省药物的优点。
5. 由于脐疗是脐部用药，经皮肤直接进入血液循环，故可迅速发挥疗效。脐疗常使用丸、散、膏、丹等制剂，均可贮备待用，一旦需要，举手可得，因此，有利于对危急病症的抢救与治疗。
6. 脐疗对患者没有痛苦，对于那些打针怕疼、针灸怕针、吃药怕苦、服药易吐的患者非常适宜。
7. 脐疗乃一种外治法，在治疗中万一发生意外反应，随时可去掉所用之药，所以说，脐疗比较安全。

三、脐疗的剂型简介

1. 丸剂：把药物研成细末，用水或蜜或药汁等拌和，制成圆球形的大小不一的药丸。这种剂型便于贮存、便于使用，有利于救急。

2. 散剂：把药物研成极细末，填放脐部，或用酒、醋、水、蜜等调敷脐部。

3. 膏剂：膏剂在使用时可分为两类。

(1) 膏药：是我国一种具有传统特色的、附有裱背的外贴膏剂。其制法是先按处方将药料切段或捣碎，放在植物油（豆油、花生油等）里浸泡3—5天，然后加热煎炸（若有花、叶等不耐高热的药料，可后放），炸至药料焦枯成炭状时，除去药渣，用大火继续熬炼药油，边炼边搅，熬至烟雾由白转青，药油滴水成珠不散（约250—300℃）时，减小火力，再徐徐加入黄丹（或铅粉），不断搅拌至黄丹全部融合成膏为止，将锅离火。喷水搅后，再将药膏倒入凉水中浸泡，以溶去刺激性物质，去其火毒后备用。用时将膏药料微火或隔水加热溶化，摊于布、纸或兽皮上，外贴患处或穴位处（如脐部）。

(2) 软膏：将应贴的药物研为细末，放入醋或酒内，加热熬成膏状，用时摊贴穴位上即可。或将药物研细末后，加入适量的蜂蜜或姜汁、或凡士林等调为膏状，摊贴在穴位上（如脐部），定时更换。

4. 丹剂：系采用升华法制成的金属化合物，呈结晶状制品。为中医外科常用药，如白降丹等。但有些丸散也称做

丹，如人丹、紫雪丹等。

5. 糊剂：将药物研末，用粘合剂（如酒、鸡蛋清、姜汁等）调为糊状，摊敷脐部，外盖纱布，再用胶布固定。

6. 饼剂：将药物研末后，加适量的水调拌均匀，做成大小不等的饼状药片，贴敷脐部，外用纱布、胶布固定。或将新鲜的植物茎叶、根茎捣碎，制成药饼，烘热敷脐上。

四、脐疗方法简介

1. 填法：将药物填于脐内。

2. 敷法：把新鲜的植物药捣烂，或用干的药物研末，加水（或加酒等）调和为膏状，敷于脐部，定时换药。

3. 贴法：即把膏药、软膏贴在脐部。从广义上讲，贴法是将药物贴在脐部以治病。

4. 覆法：将用量较多的药物捣烂或研末，覆盖在脐部及脐周围，如百部覆等。

5. 灸法：灸法是利用某些药物（如艾叶等）的燃烧，使其火热熏灼身体某一部位，以达到治疗疾病的一种方法。由于使用的材料不同，使用的方法不同，治疗效果也不相同。但是温热作用是其共同特点。随着所用的药物之不同，又分为艾火灸、硫黄灸、黄蜡灸、烟草灸、灯火灸、桑木灸等。

由于脐部皮肤娇嫩，因此不宜直接灸脐部，只宜悬起灸和隔物灸。

（1）悬起灸：即手持点燃的艾条（或香烟等）在患者脐部上方悬起，使皮肤有明显的温热感，一般灸10—15分

钟。

(2) 隔物灸：灸时艾炷（或艾条等）与皮肤之间隔一药物，这既发挥艾炷灸的温热作用，又有所隔药物的功能。它比直接着肤灸温和，因此，脐疗常采用隔物灸，如隔姜灸、隔盐灸、隔葱灸等。

6. 熨法：用药末或药物粗末炒热布包外熨脐部，起到散寒、理气、活血止痛的作用。

7. 熏法：利用药物燃烧时产生的热气或药物煮沸后产生的蒸气来熏脐部，用以治病的一种方法。

8. 罨包法：将药物放脐上，加以包扎，称为罨包法。其中分为干罨和湿罨二种。将药粉干撒脐部的叫干罨；将药水浸泡纱布上，趁温热敷脐部，叫湿罨。

9. 涂法：是用药汁、药膏、食用油和药物调和，涂于脐部，外用纱布、胶布固定，以达治疗目的，称为涂法。

10. 药汁滴脐法：将药煎取汁，根据病情需要，把药汁温热或冰凉后，一滴滴徐徐滴入脐内，以取得治疗效果。

11. 按摩推拿法：本法是以各种手法为主，达到防治疾病的一种外治法。它的手法种类很多，这里不便全部介绍，仅介绍脐部的按摩推拿手法。

(1) 揉法：用拇指指端或食指指端紧紧附着于穴位上，作和缓回转的按抚动作。揉的频率较慢，每分钟50—100次。

(2) 摩法：是用手指或手掌在身体某个部位摩动的一种手法。操作时用指或掌在皮肤表面回旋摩动，作用力温和而浅，仅达皮肤或皮下。摩法的频率根据病情的需要而定，一般慢的每分钟30—60次，快的每分钟100—200次。

(3) 搓法：双掌挟住或置于一定部位，双手交替或同时用力搓之。若用于腹部则形似摩法。

(4)按法：用拇指指面按压脐部及脐周围。按压的力量以出现发酸、发胀的感觉为度，持续按压2~5分钟，再慢慢放松减压，也可间断性的一按一放，有节奏的按压。

(5)拿法：用拇指和食指拿定选定的部位，一紧一松地反复用力的手法，称为拿法。

(6)点法：用拇指或中指指端，在选定的部位上，有节奏的用力叩击，称为点法。

五、脐疗的注意事项

应用脐疗治疗疾病，一般是不会有危险的，也很少有副作用。但是，如果不遵医嘱，随便使用脐疗，轻者影响疗效，重者也会发生问题，因此，应注意以下几点：

1.应用脐疗时，首先要用75%酒精消毒脐部，以免发生感染。

2.脐部皮肤娇嫩，不耐强烈刺激。如果所敷药物刺激性较强(如白芥子等)，在敷药前应先在脐部涂一层凡士林。

3.凡用炒热、蒸热之品敷脐，应待放温后再用，不可乘热敷脐上，以防烫伤。

4.脐疗的敷药时间，治疗轻症，病愈则去药(如治便秘，大便通畅则去药)；治疗慢性病，一般1—2天换药一次。凡需用药三次以上者，在每两次用药之间，要间隔3—7小时，以免因长期连续用药，刺激脐部皮肤过久，引起皮肤发痒等不良反应。

5.凡在治疗中出现不良反应者，如疼痛、过敏反应、病情加重等，应立即去药。

6.使用脐疗前，先询问患者病史，如有皮肤过敏者，就不宜采用刺激性较强的药物。

7.对于久病体弱及患有严重心脏病的患者，用药量不宜过大，特别是有毒的、或药性峻烈的药物，用药要谨慎，敷药时间不宜过长，病愈即去药，最好在医生的指导下进行治疗。

脐疗验方选集

一、内科疾病

感冒

1. 感冒灵敷剂

主治：感冒，恶寒发热，鼻塞流涕。

处方：解热止痛片1片，麻黄素片1片，扑尔敏1片。

用法：上药共研细末，用温开水调为糊状，填于脐中，外用胶布固定，24小时换药1次，连用2—3次。

处方来源：笔者临床验方。

2. 散寒发汗膏

主治：暴受风寒的风寒感冒症。

处方：葱白50克，胡椒1克。

用法：上药共捣烂如膏状，敷于脐上，外以纱布、胶布固定。再用暖水袋在脐部熨之。并同时服热姜汤水一杯。每日用药一次。

处方来源：民间验方。由于此方疗效甚佳，因此，此方在开封地区流传很广。

4. 感冒散

主治：风热感冒，发热、自汗、头痛、口渴、或咳嗽，舌苔薄白或微黄，脉浮数。

处方：淡豆豉30克，连翘15克，薄荷9克。

用法：上药共研细末备用。每次取药粉20克，加入葱白适量，捣烂如膏，敷风池、大椎穴上；再用药粉15克，冷水调为糊，填脐上，外用纱布、胶布固定，3~8小时去药，每日1次。

处方来源：《穴位贴药疗法》

4. 葱白连翘散

主治：风热感冒。

处方：葱白30克，连翘15克。

用法：上药共捣烂，用纱布包好敷脐上，等到将要出汗时，急喝白开水一杯，以加速发汗。

处方来源：《中医简易外治法》

5. 发汗散

主治：感寒无汗的感冒。

处方：芥子适量。

用法：芥子研末备用，每取适量（1—2克左右）以水调为糊状填脐内，以热物隔衣熨之，取汗出为佳。

处方来源：《本草纲目》

6. 发汗散寒散

主治：风寒感冒。证见恶寒无汗，浑身酸痛乏力，鼻塞流清涕。

处方：生姜10克，葱白30克，麻黄6克。

用法：上药共捣烂如泥状，敷脐部，其上置热水袋熨之，盖被取汗。

处方来源：《韩明本医案》

病毒性肝炎

1. 瓜蒂敷脐剂

主治：病毒性肝炎，谷丙转氨酶升高。

处方：甜瓜蒂(另研)、秦艽各60克，青皮、紫草、黄芩、丹参各30克，铜绿15克，冰片(另研)6克。

用法：上药均研细末后混合均匀备用。每次取1.5—2克填脐中，外用胶布贴敷固定，每天换药1次，连用10—15次为1个疗程。

疗效：用上方治疗肝炎谷丙转氨酶升高150例，谷丙酶降至正常77例，降酶幅度在50%以上者15例，有效27例，无效31例。

处方来源：《浙江中医药》，1978年第3期。

2. 山甲没药敷脐方

主治：病毒性肝炎，对肝区疼痛较甚者尤为适用。

处方：穿山甲末100克，喷入乳香、没药乙醇浸液70毫克，烘干，再加鸡矢藤挥发油0.5毫升及冰片3克备用。

用法：用时取该药粉200毫克，以食醋调糊敷脐中，外用胶布紧贴固定，每3—5天换药1次，连用6次。

处方来源：民间验方，笔者将此方用于临床，确有一定疗效。

中暑

1. 仁丹敷脐法

主治：中暑。

处方：仁丹(中成药)。

用法：每次取仁丹15克研粉，温水调糊填脐内，外用胶布贴之固定。

处方来源：《中医简易外治法》

2. 清暑敷脐方

主治：中暑。

处方：痧药(中成药，药店有售)。

用法：每取痧药3克，研粉填脐，外用胶布贴之固定。

处方来源：《中医简易外治法》

疟疾

1. 二甘散

主治：疟疾。

处方：甘草、甘遂各等量。

用法：上药共研细末，装瓶备用。在疟疾发作前3小时，将药末0.6克撒于脐内，然后用胶布贴牢，勿使散出，24小时后去掉，小儿每次可用0.4克。切忌内服。

疗效：用上方治疗34例，治愈33例。

处方来源：《江苏中医》，1965年第12期。

2. 贴脐截疟

主治：疟疾。

处方：胡椒、雄黄各等量。

用法：上药共研末，用面糊调和，做丸如桐子大，硃砂为衣。将1丸放脐中，外用膏药贴之即止。

处方来源：《串雅外编》

3. 生半夏散

主治：疟疾。

处方：生半夏3克。

用法：上药研末，填脐中，外用胶布贴之固定，一天一换，一般2—3次即愈。

处方来源：笔者验方。

4. 青蒿糊

主治：疟疾。

处方：鲜青蒿50克。

用法：捣烂敷脐部，外用胶布固定，每日换药1次。

处方来源：民间验方，刘凤美医师用于临床，屡获良效。

5. 截疟丸

主治：疟疾。

处方：川椒0.5克，雄黄1克，桂心0.6克，麝香0.015克。

用法：上药共研末纳脐内，外用普通膏药盖之。

处方来源：《理瀹骈文》

6. 复方阿魏散

主治：疟疾。

处方：阿魏0.6克，常山1克。

用法：上药共研细末，于发病前2小时撒脐内，外用胶布固定，24小时后去药，不愈再换药1次。一般1次即愈。

处方来源：刘凤美医师经验方。

7. 二母散

主治：各型疟疾。

处方：生知母、生贝母、生半夏各等量。

用法：上药共研细末，于发病前1个半小时，脐部洗净，再用生姜汁涂数次，然后将药粉0.5—1克置肚脐上，外用胶布固定。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

8. 二椒散

主治：疟疾。

处方：白胡椒10克，花椒10克，硫黄10克，生半夏10

克。

用法：上药共研细末，在疟疾发作前4小时，用药粉如黄豆大，放在脐内，用胶布敷盖，待疟疾过后第二天去药。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

9. 大黄生姜膏

主治：疟疾。

处方：川大黄3克，生姜3克。

用法：上药共捣如泥状，再做成饼如铜钱大小，在发疟前1—2小时贴于脐部，以胶布固定，待疟疾过后去药。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：福建省人民医院编《中医验方》

10. 苍耳子叶敷剂

主治：疟疾。

处方：苍耳子叶5片。

用法：将叶揉软，于发作前2小时贴在肚脐上。

处方来源：开封市卫生局编《医药卫生科技资料》

蛔虫病

1. 驱蛔糊

主治：蛔虫。

处方：白杨树皮、石蒜各30克。

用法：上药共捣烂，敷脐部。每天换药1次，连用3天。

处方来源：《贵州民间方药集》

2. 花椒楝皮膏

主治：蛔虫。

处方：花椒15克，贯众、苦楝皮各30克。

用法：上药加水煎煮，去渣，将药汁浓缩成膏，外敷脐

部，即下蛔虫。

处方来源：《贵州民间方药集》

痢疾

1. 止痢丹

主治：痢疾。

处方：白胡椒 6 克，吴茱萸 6 克。

用法：上药共研末，和蒸米饭同捣匀制成两个圆饼，交换敷在脐部。4 小时后腹中可出现肠鸣声，7 小时后即思饮食。

处方来源：福建省人民医院编《中医验方》

2. 十香暖脐膏

主治：腹痛泻痢。

处方：十香暖脐膏(中成药，药店有售)。

用法：用时将膏药贴于脐部，外用纱布、胶布覆盖固定。

处方来源：《中国膏药学》

3. 宁和堂暖脐膏

主治：水泻白痢。

处方：香油 500 克，生姜 500 克(切片)，黄丹 250 克(研极细)。如常法熬膏药摊布上备用。

用法：用时贴脐上。

处方来源：《串雅内编》

4. 泄痢通治膏

主治：泄痢。

处方：木鳖仁 30 克，穿山甲 15 克，麻油，黄丹收膏备用。

用法：用时放火上烘热，摊纸上贴脐。

处方来源：《理瀹骈文》

5. 将军丸

主治：热痢。

处方：大黄末5克。

用法：以水和为丸，填脐中，布盖之。

处方来源：《理瀹骈文》

6. 香连散

主治：赤白痢。

处方：吴茱萸3克，黄连、木香各6克。

用法：上药共研细末，水调为糊敷脐部。

处方来源：《理瀹骈文》

7. 吴茱萸糊

主治：冷痢。

处方：吴茱萸6克，黄酒适量。

用法：将吴茱萸研末，用黄酒调为糊状，填于脐中，外用布包扎，一天换药1次。

处方来源：《理瀹骈文》

8. 平胃散熨剂

主治：泄痢。

处方：苍术、陈皮、甘草各20克，厚朴15克。

用法：上药共研细末，分为二包，分别用布包起，以一包放脐上，热熨斗熨之，逼药气入腹。另一包放在枕边，嗅其气，此乃开胃、思食、止痢之良法。

处方来源：《理瀹骈文》

9. 二豆膏

主治：痢疾。对小儿下痢尤为效著。

处方：巴豆1粒，绿豆3粒，胡椒3粒。

用法：上药用布包捣烂，加红枣肉2枚(捣如泥状)，贴在脐部，痢即可止，痢止去药。

处方来源：《陕西中医验方选编》

10. 硫黄蓖麻膏

主治：下痢虚寒。

处方：硫黄15克，蓖麻仁7个。

用法：上药合捣研如膏，填脐中，外用布覆盖，以衣棉隔，热物熨之。

处方来源：《本草纲目》

11. 苦参敷剂

主治：细菌性痢疾。

处方：苦参(研细末)2—5克。

用法：温水调为糊状，敷脐部，外用胶布固定。每天换药1次。

处方来源：民间单验方。

12. 吴茱萸大蒜糊

主治：痢疾。

处方：吴茱萸6克，大蒜30克。

用法：上药共捣烂，适加温水调为糊状，敷脐部。敷药前，先在脐部涂一层凡士林，以防起泡。

处方来源：《内病外治》

急性胃肠炎

1. 艾叶散

主治：急性胃肠炎。

处方：艾叶30—60克。

用法：把艾叶放锅内，加白酒50克拌匀炒热，用布包住，熨肚脐部，冷则再炒热复熨之，熨1小时以上。

处方来源：民间验方。

2. 葱白熨

主治：急性胃肠炎，腹痛、腹泻、恶心呕吐。

处方：葱白180—250克。

用法：将葱白切碎，炒热熨脐部。

处方来源：民间单验方。

3. 隔盐灸法

主治：功能回阳救逆，驱寒、止痛、止脱。治疗急性胃肠炎，中风脱症，受寒腹痛、泄泻。

处方：大青盐30克(炒后研末)。

用法：将大青盐填满脐，上用大艾炷灸之。

处方来源：此法乃针灸学的常用方法之一，开封地区的农民甚喜用此法。方虽简便，但疗效显著可靠。

4. 白芷小麦糊

主治：急性胃肠炎。证见脘腹痛，吐泻并作。

处方：白芷60克(研末)，小麦粉15克。

用法：上药共合一处，以食醋调为糊敷脐上，纱布包扎固定。

处方来源：《内病外治》

慢性肠炎

1. 肠炎散

主治：慢性肠炎，泄泻。

处方：丁香、白芍、甘草各等量。

用法：上药共研细末备用。临用时取药粉6克，水调为

糊状，填脐中，外贴胶布以固定，敷药12小时后去药，每天换药1次，连用数天。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

2. 丁香硫黄散

主治：慢性肠炎，慢性泄泻，虚寒性泄泻。

处方：丁香、硫黄各2克，白胡椒1.5克，绿豆粉4克。

上药共研末备用。

用法：每次取药粉3克填入脐中，外以胶布固定，每天换药1次，连用7—10日。

处方来源：笔者经验方。

3. 绿豆膏

主治：慢性肠炎。脾胃虚寒，脾失健运，消化不良，暖气吞酸，便稀肠鸣。

处方：绿豆粉9克，母丁香6克，白胡椒6克，枯矾9克，淡吴茱萸3克。将上药共研为极细末，加入太乙膏120克熔化搅匀，制成膏药备用。

用法：用时取一贴膏药贴于脐部，1~2日换药1次。

处方来源：《中国膏药学》

急性胃炎

1. 良姜散

主治：急性胃炎。

处方：良姜15克，吴茱萸12克。共研细末备用。

用法：将药末装入纱布包内，盖敷脐上，并用暖水袋热敷之，每次熨1—3小时。

处方来源：韩良医师经验方。

2. 生姜葱白饼

生治：急性胃炎，胃脘发凉，胀满疼痛，恶心呕吐。

处方：生姜30克，葱白20克，艾叶10克。

用法：上药共捣烂如泥，做成圆饼，敷于脐部，并用暖水袋热熨之，每次熨1小时。

处方来源：笔者临床经验方。

3. 止呕止痛散

主治：急性胃炎，症见胃痛呕吐。

处方：胃复安3片，颠茄片2片，生姜6克。

用法：上药合共捣烂，填脐中，外贴胶布。每天换药1次。

处方来源：笔者临床经验方。

急性肠炎

1. 二茴膏

主治：急性肠炎，慢性肠炎，腹痛泄泻。

处方：二茴膏（中成药，药店有售）。

用法：临用时，用微火化开，膏药贴于脐部，3—5天换膏药1次。

处方来源：《中国膏药学》

2. 连附散

主治：急性肠炎。

处方：黄连3克，香附15克，良姜15克。

用法：以上诸药共合研细末，填脐内，外盖纱布敷料，并以胶布固定，一天换药1次。

疗效：用上方治疗急性肠炎19例，敷药一次见效12例，敷药两次见效者5例，敷药三次见效者1例，无效1例。

处方来源：开封市牛锡芳中医经验方。

泄泻

1. 炮姜散

主治：寒泻。

处方：炮姜30克，研末备用。

用法：将炮姜末填入脐中，外用胶布固定。敷药3小时后去药，每天换药1次。

处方来源：开封市武明钦中医经验方。据其介绍，应用此方30余年，屡获良效。

2. 松香散

主治：寒泻。

处方：松香末5克。

用法：将松香末填脐中，外用胶布固定。每日换药1次。

处方来源：此方乃开封市刘学勤中医的经验方，据其介绍，疗效颇佳。

3. 胡椒饼

主治：寒泻。

处方：胡椒6克。

用法：将胡椒研末，和米饭作一个小饼，敷于脐上，外用纱布包扎固定，每天换药1次。

处方来源：《验方新编》

4. 艾绒饼

主治：寒泻。

处方：艾绒6克。

用法：艾绒用酒拌匀炒热，制成饼状趁热敷脐部，外用热水袋熨之，一日熨敷2次，一般治疗1次即愈。

处方来源：笔者验方。

5. 车前肉桂散

主治：寒泻。

处方：车前子、肉桂各等量，共研末，备用。

用法：临用时，用药粉5克敷脐上，外用胶布固定，每天换药1次。

处方来源：《理渝骈文》

6. 胡椒硫黄散

主治：泄泻腹痛，少腹发凉。

处方：胡椒、硫黄各等量。

用法：将上药共研细末备用。每次取药粉1.5克撒脐内，用胶布固定，隔日换药。

禁忌：孕妇禁用。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

7. 三子膏

主治：肚腹冷痛，大便溏泻，脐腹发胀。

处方：三子膏（中成药，药店有售）。

用法：贴脐部，三日换药一次。

禁忌：孕妇忌贴。

处方来源：《全国中药成药处方集》

8. 五香膏

主治：受寒腹痛，呕吐泄泻。

处方：五香膏（中成药，中药店有售）。

用法：贴于脐部，3日换药一次。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：《中国膏药学》

9. 祛寒止泄散

主治：寒泄。成人、小儿寒泄均效。

处方：木鳖子1个，公丁香3克，麝香0.01克。

用法：上药共研末，撒膏药上贴脐部。

处方来源：《陕西中医验方选编》

10. 苍术散

主治：泄泻，对受寒脾湿泄泻尤宜。

处方：苍术，研末备用。

用法：每用苍术粉2克，温水调匀敷脐部，外贴胶布，一天换药1次。

处方来源：民间验方。

11. 大小膏（又名暖脐膏）

主治：寒冷腹痛，大便泄泻。

处方：大小膏（中成药，中药店有售）。

用法：微火化开贴脐部。

禁忌：忌食生冷，孕妇忌贴。

处方来源：《全国中药成药处方集》

12. 水泻糊

主治：水泻。

处方：葱1支，生姜6克，黄丹（如豆大）1块。

用法：以上诸药共捣烂如糊状，将药糊敷脐部，外用纱布包扎。一日换药2次。若能配合暖水袋热敷则疗效更好。

处方来源：韩良医师经验方。

13. 隔盐灸治水泻方

主治：单纯性或寒性水泻，腹痛肠鸣。

处方：取食盐10克，放脐中凸出脐上0.5—1厘米，盐末上面放直径约4厘米的铁瓶盖（或用姜、蒜片等），瓶盖上放艾团（艾卷亦可），一次灸3—7壮（或5—10分钟），每天灸

2—3次。灸时患者有热、痒感，腹痛显著减轻。

疗效：用上方治疗748例，治愈率90%，显效5%，无效5%。一般灸1—2次腹痛减轻，灸2—3次大便次数减少，灸2—3日治愈。

处方来源：《赤脚医生杂志》，1974年第4期。

14. 巴蜡丸

主治：腹泻。

处方：黄蜡、巴豆各等分。

用法：共研细末，每次取黄豆大的药末填脐中，外用胶布盖贴。

处方来源：《陕西中医验方选编》

15. 车前滑石散

主治：热泻。

处方：车前子60克。

用法：捣取汁，调甘草末3克，滑石末6克，敷脐眼上。

处方来源：《理瀹骈文》

16. 蒸脐法

主治：功能健脾益胃，散寒止泄，增强体质。治疗虚寒积滞，虚泄便溏。

处方：五灵脂24克，生青盐15克，乳香3克，没药3克，夜明砂6克，地鼠粪9克，干葱头6克，木通9克，麝香0.01克。

用法：以上诸药共研细末备用。临用时，取面粉适量，加入少量药末，用水调和做成面团围在脐上；再将药末6克放其中；另用槐枝剪成一个圆币形，将脐上的药末盖好，上面用艾炷灸，1岁1壮，灸治一次换一次药末，隔一天治疗1次。

处方来源：此法乃针灸学中的常用方法之一，历代医籍多有记载。笔者在临床常用此法，屡获良效。

17. 硫黄朱矾丸

主治：气虚暴泻。

处方：硫黄6克，枯矾3克，朱砂0.1克。

用法：上药共合研末，水调为丸，填放脐中，外用胶布固定。

处方来源：《理瀹骈文》

18. 温中散

主治：寒泻及大吐泻而伤元气症。

处方：炮姜80克，附子15克。

用法：上药共研细末，敷脐部。

处方来源：《理瀹骈文》

19. 参附丸

主治：体虚脐腹冷痛，便溏虚泻。

处方：人参、附子、肉桂、炮姜各3克。

用法：上药共研末，纳脐内，外用胶布固定。

处方来源：《理瀹骈文》

20. 止泻膏

主治：脾肾虚之久泄不止。

处方：五倍子10克，黑附子10克，补骨脂10克，雄黄10克，冰片3克，麝香1克，芝麻油500克，铅丹250克，巴豆仁10克。

制法：用芝麻油将巴豆仁炸焦去渣，炼油入丹成黑膏，摊在布上，将余药研成极细末，每张膏药撒上适量药粉即成。

用法：临用时，用微火烘热膏药，贴脐上，2—4日换药

1次。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

21. 天香膏

主治：治久泻、腹痛、胃肠炎。

处方：天香膏（中成药，中药店有售）。

用法：贴脐部，3日换药1次。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：《全国中药成药处方集》

22. 仲参膏

主治：脐腹冷痛，泄泻久痢、久泄等症。

处方：仲参膏（中成药，中药店有售）。

用法：贴于脐部，3天换药1次。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：《中国膏药学》

23. 吴茱萸食盐熨

主治：腹泻，对脾肾虚寒之久泄尤效。

处方：吴茱萸60克（研细末），食盐60克。

用法：上药共放锅内炒热，装入布袋内，趁热敷脐部，药粉凉后，可加用热水袋熨之，每天熨一次，每次熨1—2小时。

处方来源：民间验方。

五更泻

1. 温肾止泄膏

主治：五更泄。

处方：肉桂、鸡内金各3克，硫黄、枯矾、五倍子各6克，白胡椒1.5克。共研细末，为1次用药量。

用法：取鲜葱头3—5根捣烂，和药末拌匀，加适量醋调成糊状，敷摊于脐部，用纱布、胶布固定。每次敷2小时，每日1次，6次为1疗程。敷药处可能有痒、灼痛感，停药后即可消失。

疗效：用上方共治19例，治愈10例，好转6例，无效3例。

处方来源：《湖北中医杂志》，1986年第2期。

2. 加味暖脐膏

主治：五更泄。

处方：暖脐膏1帖，吴茱萸粉1克。

用法：微火把暖脐膏化开，将吴茱萸粉撒膏药上，趁温贴脐部，2日换药1次。

处方来源：笔者经验方。

3. 肉桂苍术散

主治：五更泄，寒泄。

处方：肉桂、苍术各等量，共研末备用。

用法：取药粉1—3克，温水调匀敷脐部，外贴胶布以固定，每天换药1次，连用10次为1疗程。

处方来源：笔者临床经验方。

恶心、呕吐

1. 止吐膏

主治：恶心、呕吐。

处方：爱茂尔针1支，生姜9克。

用法：先将生姜捣烂如泥，然后和爱茂尔针调在一起，敷在脐部，外用纱布包扎，每次敷5小时。

处方来源：笔者临床经验方。

2. 一粒珠

主治：呕吐、泄泻。

处方：雄黄7克，五倍子7克，枯矾15克，葱头5个，肉桂3克，麝香0.1克。

用法：以上诸药共捣碎制成饼，贴脐部，并用暖水袋热熨之。

处方来源：《理渝骈文》

3. 生姜胃复安饼

主治：恶心、呕吐。

处方：炒吴茱萸30克，葱白6克，生姜7克。上药共捣烂做成一个小饼；先将胃复安3片研末，撒于脐内，然后把药饼敷脐上，外用纱布覆盖，胶布固定。能加暖水袋热熨则疗效更好。

处方来源：此方乃笔者止呕的传统用方，实践证明，疗效甚好。

胃痛

1. 麝香暖脐膏

主治：脾胃不和，胃脘疼痛，寒冷水泄，少腹抽痛，偏坠疝气，胃寒腰痛，大便溏泄，子宫寒冷，白浊白带等。

处方：本品由麝香、当归、肉桂、没药、白芷、沉香、乳香等多味中药精制成的橡皮膏（中成药，中药店有售）。

用法：每次取1贴膏药贴脐部，每天更换1次。

处方来源：《全国中药成药处方集》

2. 雄黄四香丸

主治：九种心胃痛，呕吐、噎膈、久痢、疝气等。

处方：雄黄、朱砂、木香、沉香、丁香、麝香、桂皮、

鸦片各0.5克。

用法：上药共研末，人乳和为丸，填脐中，外用暖脐膏贴之。

处方来源：《理渝骈文》

3. 巴豆灸

主治：阴寒性胃痛，食积，消化不良，便溏。

处方：巴豆7个（去壳不去油），黄连末2克。

用法：上药合捣烂如糊状，敷脐中，再用艾炷灸之。

处方来源：此方乃开封市针灸名医王其祥的经验方。

4. 隔姜灸

主治：寒性胃痛、腹痛、呕吐、泄泻。

方法：用生姜切成半分厚薄片，中间扎些小孔，放于脐上，上用艾炷灸之，每次灸15分钟。

处方来源：民间疗法。历代针灸书中多载此法，在民间流传很广。

便秘

1. 枳实盐熨法

主治：便秘。

处方：枳实15克，麸皮500克，盐100克。

用法：上药共合炒热，布包熨脐部，每次熨2小时。

处方来源：开封市范林中医经验方。

2. 大戟红枣膏

主治：便秘。

处方：大戟粉1.5克，枣肉6枚。

用法：上药合共捣如膏，贴脐部。

处方来源：《理渝骈文》

3. 蜗牛糊剂

主治：大便秘结。

处方：蜗牛1个，麝香0.15克。

用法：将上药共捣如糊状，敷脐内。

处方来源：《陕西中医验方选编》

4. 便秘饼

主治：大便秘结，精神不振，舌质淡，舌苔薄，脉虚弱。

。处方：葱白50克（连须洗净），生姜30克，食盐15克，淡豆豉6克，以上诸药混合一处捣烂制成药饼。

用法：将药饼放火上烘熟，敷于脐上，用细带固定，冷后烘热再敷之，一般12—24小时气通自愈。

处方来源：《穴位贴药疗法》

4. 秘结散

主治：大便秘结（不拘热秘、冷秘、虚秘、气秘皆宜）。

处方：甘遂3克，麝香0.3克，食盐5克。上药合共研为末，为一次量。

用法：把药末填入脐内，以艾叶揉碎做成圆柱形，放在药粉之上，用火点燃灸之。一般5—7壮即通。如轻症可用药粉填入脐内，盖以纱布，再用胶布固定，亦有效。

处方来源：《穴位贴药疗法》

5. 腑行膏

主治：大便不通。

处方：大黄、元明粉、生地、当归、枳实各30克，厚朴、陈皮、木香、槟榔、桃仁、红花各15克，用麻油熬，黄

丹收膏备用。

用法：用时烘热摊纸上贴脐即可。

禁忌：孕妇忌贴。

处方来源：《理瀹骈文》

6. 芒硝大黄水滴法

主治：便秘。

处方：生大黄10克，芒硝7克。

用法：上药共用水煎浓汁，放凉，一滴滴将药汁滴入脐中即可。

处方来源：民间梁全森中医经验方。

7. 点、按脐部法

主治：气滞便秘。

方法：医者用中指点、按脐部，先用中指以每分钟60次的频率点脐部，然后再揉按脐部5分钟。

处方来源：笔者经验方。

二便不通

1. 皂刺膏

主治：二便不通。

处方：皂角刺1000克。

用法：捣碎蒸熟，布包热敷脐部，待凉更换，连续热敷9次。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

2. 巴连饼

主治：二便不通。

处方：巴豆(去壳不去油)，黄连各15克。

用法：上药共捣烂做成药饼。先滴葱、盐汁于脐内，再

把饼敷脐上，灸二七壮，取利为度。

处方来源：《本草纲目》

3. 通结散

主治：二便闭结不通。

处方：麝香0.3克，膏药1张，生姜120克，大葱250克，紫苏120克，陈醋120克。

用法：将膏药火烤扯开，麝香放于病人脐中，将膏药贴盖脐上。再将生姜、大葱、紫苏用石臼捣烂，入锅内同醋炒热，用布袋包住，包扎在病人脐部。麝香经热熨由脐眼入内，二便立通，其痛自止。

禁忌：寒性下结，二便不通，少腹冷气等不可用。

处方来源：《陕西中医验方选编》

4. 通便方

主治：二便不通。

处方：独蒜3个，车前子60克，田螺3个。

用法：上药共捣烂，贴肚脐1小时即通。

处方来源：《陕西中医验方选编》

5. 冷淋法

主治：热证，大小便不通。

处方：取白矾6克研末，填于脐中，以冷水滴白矾上，待感觉到冷透入腹中，大小便自然通畅。

处方来源：开封市第三人民医院高国华中医经验方。

消化不良

1. 健脾消胀膏

主治：消化不良、腹部胀满，暖气，不思饮食。

处方：吴茱萸30克，丁香6克，胡椒30粒。

用法：上药共研粉，每次取1.5克，调入适量凡士林，敷于脐部，每日换药1次。

处方来源：《家用便方》

2. 消胀糊

主治：消化不良，腹满，不思食。

处方：车前子30克，蜗牛20克，大蒜30克。

用法：上药共捣为糊状，敷脐。

处方来源：《家用便方》

3. 助消化方

主治：调节胃肠机能，温里去寒，止痛，止泄，治疗消化不良。

处方：吴茱萸3克。

用法：把吴茱萸研末，用醋调为糊状，摊于纱布上，敷于脐部，再用暖水袋热熨之，12小时更换1次。

处方来源：开封市韩文超中医经验方。据其介绍，此方不仅治疗消化不良症，还可治疗偏头痛。

4. 生姜汤

主治：老年怕冷，停滞不化，消化不良。

处方：生姜60克(或用紫苏60克)，加水两小盆煎煮，滤去渣，将药汤倒入浴盆内，让患者坐浴盆内，揉脐周围，并用生姜汤洗脐及脐周围。

处方来源：《理瀹骈文》

噤口痢

1. 开噤散

主治：噤口痢。

处方：水鳖仁6个，研末分成两份备用。

用法：面烧饼1个，切作两半，只用半个烧饼挖一孔，纳入1份木鳖仁。以饼乘热覆在病人脐上，1小时后再换另半个热饼，其痢即止，遂思饮食。

处方来源：《串雅外编》

2. 噤痢膏

主治：噤口痢。

处方：牙皂6克，细辛27克，葱茎6支，田螺2个，小麦曲12克。

用法：以上诸药混合，捣烂如膏，敷脐上，再盖以纱布，绷带固定，药干另换。

处方来源：《穴位贴药疗法》

3. 黄瓜藤散

主治：噤口痢。

处方：黄瓜藤适量。

用法：把黄瓜藤烧炭存性，研细。每次取6克，香油调为糊，敷于脐上，有极效。

处方来源：《验方新编》

腹胀

1. 消胀散

主治：腹胀。

处方：厚朴、枳壳各等量，共研末备用。

用法：每次取2克药粉填于脐内，外贴胶布以固定，每天换药1次，3天为1疗程。

处方来源：《浙江中医杂志》，1982年第3期。

2. 理气散

主治：脘腹胀满，时而胀痛。

处方：木香6克，槟榔9克，甘遂3克，葱白15克。

用法 上药共捣碎，炒热，趁温敷脐部，并用暖水袋热敷，敷3小时去药。

处方来源：开封市何保仪中医临床验方。

关格

1. 关格熨治法

主治：关格症。此病乃是小便不通与呕吐不止并见的病症。小便不通称为“关”，呕吐不止名为“格”，故称“关格症”。

处方：葱白500克，切细，入元寸1.5克，拌匀分两包。先以一包置脐部，热熨斗熨之，半时后另换一包（熨剂不温时则可换之），至愈为度。

处方来源：《理渝骈文》

2. 升降法

主治：关格虚证。

处方：黄芪6克，白朮9克，升麻3克，柴胡6克，木香6克，槟榔9克。

用法：以上诸药共研为末，布包放脐上，热熨斗熨之。

处方来源：《理渝骈文》

3. 冰麝皂角散

主治：痰格中焦之关格症。

处方：皂角、冰片、元寸各1克。

用法：上药共研末，酒调为糊纳脐中。通窍后，继用祛寒降火之剂即可。

处方来源：《理渝骈文》

肠梗阻

1. 麝香散

主治：动力性肠梗阻。

处方：麝香0.15—0.25克。

用法：上药研细末，填敷于脐内，外贴胶布固定。然后点燃艾卷，隔布灸至肛门矢气为止。如用本方治疗12小时以上无效者，则改用其它治疗方法。

处方来源：《陕西中医》，1984年第5期。

2. 通结灸

主治：粘连性肠梗阻，麻痹性肠梗阻，蛔虫性肠梗阻，疝嵌顿等。

处方：将生姜切成1分厚之薄片，置于脐部，将拌有冰片末的艾绒捏成宝塔糖样大小，放置于姜片上施灸。1片姜烧三柱艾（约20分钟）为1次，每日3次。

疗效：用上方治疗肠梗阻31例，有效27例，一般都在1—2天内解除梗阻。

处方来源：《湖南中医杂志》，1985年第1期。

3. 烟丝敷剂。

主治：蛔虫性肠梗阻。

处方：烟丝1份，植物油2份。

用法：烟丝与植物油合捣为糊状，敷于脐及脐周围，直径约6厘米，厚度约1—2厘米，让陪护者用手掌心适当加压固定。1小时后去除烟丝检查，如虫体松解不明显者，可适当加以按摩。按摩方法：先是手掌心与包块呈垂直方向进行，然后改为顺时针方向按摩，按摩15分钟左右。梗阻解除后即可投以驱蛔药物。有脱水、酸中毒、感染者适当对症治疗。

疗效：用上方治疗30例，4例无效，26例在治疗后12—

48小时内排出蛔虫，病告痊愈。

处方来源：《广西卫生》，1974年第3期。

4. 雄黄鸡蛋清贴脐剂

主治：蛔虫性肠梗阻。症见阵发性腹痛、腹胀不排气、便秘、呕吐等。

处方：雄黄3—10克，研细末，用鸡蛋清调为糊状，敷脐部，外用纱布包扎。若在病人腹部摸到条索样团块，可用热水袋在此处热熨之，则会收到更好的疗效。

处方来源：民间单验方。

高热

1. 文蛤散

主治：高烧。

处方：文蛤、首乌各3克，白矾4克。

用法：上药共研末，水调为糊，敷于脐部。

处方来源：《贵州民间方药集》

2. 青蛙冰片贴

主治：高热。

处方：青蛙1只，冰片0.3克，雄黄0.15克。

用法：将青蛙剖开，纳冰片、雄黄于内，敷脐部1—2小时。

处方来源：《湖南农村常用中草药手册》

3. 消食退烧糊

主治：小儿隔食发烧，食积高烧。

处方：土知母（鸢蛋尾科植物鸢尾）根31克，鸡蛋1个。

用法：将土知母捣烂，用鸡蛋清调糊敷脐眼，数小时后，烧退食消。

处方来源：《贵州民间方药集》

4. 燕窝泥敷脐方

主治：高热。

处方：燕子窝泥30克，田螺（去壳）9个，井底泥30克（可用黄泥代替），青黛0.6克。

用法：上药合鸡蛋清调为糊状，敷脐部1—2小时。

处方来源：《湖南农村常用中草药手册》

腹水

1. 腹水散

主治：腹水症。症见腹大，手按如囊裹水，脘腹胀闷，面色萎黄，小便少，舌苔白腻，脉缓无力。

处方：商陆、大戟、甘遂各等份。上药合共研细末备用。

用法：每次取药末5—10克，填于脐内，盖以纱布，胶布固定，一天换药1次。

处方来源：《穴位贴药疗法》

2. 腹水消

主治：腹水，水肿，小便不利，头晕目眩，背冷脚痠，身重，腹胀，食欲不振，大便溏薄，舌苔白滑，脉沉细。凡风湿性心脏病，心机能不全，肝硬化，慢性肾炎等引起的水肿、腹水出现上述症状者，均可采用本方。

处方：商陆100克，元寸1克，葱白适量。

用法：将商陆研为细粉，每次用药粉3—5克，葱茎白一支，共捣成膏，再加适量凉开水调为糊状备用。用时先取元

寸0.1克放进脐中(无元寸也有疗效)，再将调好的药糊敷在上面，盖以纱布，外以胶布固定。每天换药1次，一般贴药糊后24小时，尿量即可显著增加，3—5天见效，7天为1疗程。

注意：使用上法，如病情严重，药量过大，或用药时间过久，可能出现眩晕、呕吐，但不妨碍治疗。停药后，这种副作用就会消失。

处方来源：《穴位贴药疗法》

肝硬化腹水

1. 消肿丹

主治：肝硬化腹水，心源性水肿，肾炎水肿及各种水肿。

处方：商陆1000—2000克。

用法：上药研细末备用。用时取1.5克商陆粉和鲜姜泥(鲜姜2片捣烂)及适量水调成糊状，敷满脐部，纱布固定。每天更换1—2次。7天为1疗程。

疗效：用上方治疗肝硬化腹水8例，用药后平均每日尿量增加到1037—1550毫升，为用药前的4.4—6倍。一般在7天内见效。

处方来源：《赤脚医生杂志》，1979年第9期。

2. 消肿利水饼

主治：肝硬化腹水。

处方：巴豆12克，轻粉6克，硫黄粉3克。

用法：巴豆(去壳不去油)同轻粉共研细末，加入硫黄粉调匀，做成饼状，放入布袋里(布袋长12厘米，宽12厘米)。先将脐部用75%酒精消毒，用一层脱脂棉盖在脐上，然后再

敷上盛药的布袋，绷袋包扎，不得移动，勿使靠近皮肤，敷药后2天内，脐周围可出现丘疹或小疱，可用紫药水外涂，再扑上滑石粉即可。

注意事项：本方有剧毒，切勿入口，外用亦需加倍注意。

处方来源：《新中医药》，1958年第6期。

3. 治腹水方

主治：肝硬化腹水。

处方：甘遂20克，研末备用。

用法：每次取甘遂粉2克填脐内，外贴胶布固定。一般贴12—24小时去药。

疗效：用药2—4小时后，即能自动排尿或排稀水样大便。

处方来源：开封市乔天祥中医经验方。

4. 阿魏硼砂散

主治：肝硬化腹水。

处方：阿魏、硼砂各30克，共研末备用。

用法：用白酒将药粉调为糊状，敷脐部，外用布带束住。敷药后不久，尿量就开始增加。

处方来源：湖南省《中医单方验方》

5. 加味十枣散

主治：肝硬化腹水及各种腹水症。

处方：甘遂（醋炒）30克，芫花20克，大戟30克，大枣10枚，商陆20克。

用法：上药共研末备用。每次用药粉3克，温开水调为糊状，敷脐部，外用纱布包扎。每日换药1次，连用6次为1疗程。

处方来源：民间医生姚景凯经验方。据其介绍，此方乃

其继承姚龙伯（开封市名医，以内儿科著称于世）的经验，用于临床，常获著效。

脾肿大

1. 皮巴膏

主治：脾肿大。

处方：皮硝6克，生栀子、巴豆、杏仁、葱根各7个，独头蒜1个，白面1撮，白酒1盅。

用法：上药共捣烂，调匀，加酵母10克，敷脐部，纱布包扎，1昼夜取下，1周后再敷。一般敷3—5次即可。

注意事项：敷药后局部皮肤潮红或起水泡，除此，未发现其他副作用。

疗效：用上方治疗5例脾肿大患者，疗效甚好。

处方来源：《山东中医学院学报》，1980年第2期。

2. 散积消肿膏

主治：脾肿大。

处方：云南白药1克，阿魏1.5克（研末）。

用法：将上药混合填于脐内，外用胶布固定。隔天换药1次。

处方来源：开封市塑料编织袋总厂医务所刘凤美的经验方。

腹胀

1. 利水膏

主治：腹胀，大小便不利。

处方：蜗牛、大蒜、皂角各10克。

用法：上药合共捣烂如泥状，敷于脐部，干后换之。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

2. 臌胀散

主治：臌胀症。症见腹大胀闷，敲之如鼓，面色萎黄，小便短少，食少，食后腹胀加重，呃声连续不断，舌苔白腻。

处方：巴豆霜、广木香、甘遂各等量。

用法：上药合共研末备用。每次取5克敷脐部，用纱布包扎。一日换药一次。

处方来源：《理瀹骈文》

3. 驱臌膏

主治：气臌、水臌。

处方：大蒜头、车前子各15克。

用法：上药共合捣烂敷脐上，布包扎，1日换药1次。

处方来源：《理瀹骈文》

4. 化痞丹

主治：臌胀，小儿腹中痞块，面黄肌瘦，肚大青筋，午后发热。

处方：桃仁7个，杏仁7个，小枣7个，梔子30克，朴硝9克，川军9克，鸡子清3个，蜂蜜30克。

用法：将以上诸药共研末，用鸡子清和蜜调匀为糊，摊在布上，贴脐部，7日换药，连贴3次。

处方来源：笔者经验方。

急性支气管炎

1. 决明莱菔散

主治：急性支气管炎。

处方：草决明60克，莱菔子30克。

用法：上药共捣碎为末，敷脐部，外用纱布包扎。

处方来源：《中医简易外治法》

2. 麻杏石甘散

主治：急性气管炎，咳嗽，吐痰，咽痛。

处方：麻黄10克，杏仁9克，生石膏15克，甘草6克。

用法：上药共研末，每次取药末3克，温水调糊敷脐部，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

3. 急性支气管炎1号

主治：急性支气管炎。

处方：红霉素片1片，克咳敏1片，咳快好1片，麻黄素1片。上药为一次量，共研末备用。

用法：用温开水将药粉调为糊状，填脐中，外用胶布固定，每天换药1次。连用5次为1疗程。

处方来源：开封市卫生局周予奎主治医师经验方。

慢性支气管炎

1. 温肺散

主治：慢性支气管炎，吐痰清稀色白，咳嗽喘满。

处方：制半夏10克，白果仁9克，杏仁6克，细辛6克。

用法：以上诸药共研末，用姜汁调为糊状，外敷脐部，纱布包扎。每日换药1次。

处方来源：笔者家传方。

2. 七五止咳粉

主治：慢性支气管炎。

处方：公丁香0.5克，肉桂、麻黄各5克，苍耳子3克。上药共研末，密贮备用。

用法：用时先将肚脐用75%酒精消毒，趁酒精未干之际，

将药粉倒入脐内，药量视肚脐大小而定，小者倒满脐，大脐者倒半脐即可，最后盖上一张比脐大的普通胶布。胶布四周必须贴严，以免药粉和气漏出，每隔48小时换药1次。贴10次为1个疗程。若局部发生皮炎，可涂氟氢松霜。

处方来源：成都军区机关第一门诊部经验方。《新医学杂志》，1977年第12期

3. 艾炷隔姜灸

主治：慢性支气管炎。

处方：白芥子3克，半夏3克，公丁香0.5克，麻黄5克，细辛2克，麝香0.2克。上药共研末，密贮备用。

用法：取药粉适量填满脐窝，将鲜姜1片（厚约0.3厘米，姜片可用针扎数孔）盖在药末上，上置大艾炷施灸。每日灸1次，每次灸3—5壮，10次为1疗程，疗程间隔3—5天。

处方来源：笔者临床常用方。

咳嗽

1. 宣肺止咳糊

主治：风寒咳嗽喘逆。

处方：麻黄7克，杏仁9克，甘草6克，百部10克。

用法：上药共研末，温水调敷脐部，纱布包扎。每天换药1次，连用5—7次。

处方来源：笔者经验方。

2. 止嗽散

主治：感冒后遗之咳嗽，久咳不止。

处方：蜂房6克，杏仁9克，勾藤9克，米壳6克，百部20克。共研末备用。

用法：温水调为稠糊状，敷脐部，纱布包扎，每天换药

1次。

处方来源：民间单验方。

3. 罌粟壳散

主治：久嗽不止。

处方：罌粟壳，研末备用。

用法：每次取罌粟壳末3克，敷脐上，外贴胶布密封。每天换药1次。

处方来源：《理瀾骈文》

4. 止咳平喘散

主治：感冒咳嗽。

处方：麻黄素1片，克咳敏1片。

用法：上药共研细粉，填入脐中，外用胶布贴之密封。每天换药1次，连用3—5天为1次疗程。

处方来源：开封市第三人民医院张春生药师经验方。

哮喘

1. 热参散

主治：哮喘。

处方：热参浸膏0.1克，白术0.5克，硫黄0.5克，甘草0.1克。

用法：上药共研末，敷于脐内，1周换药1次，1个月为1个疗程。

处方来源：河南中医学院李忠医师的经验方。

2. 平哮散

主治：哮喘。

处方：氨茶碱2片，克咳敏1片，芫花1克，细辛1克。上药共研末备用。

用法：将上药末敷脐部，外用纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：开封市卫生局主治医师陈中和经验方。

虚癆、肺结核

1. 虚癆散

主治：虚癆，骨蒸潮热，咳嗽，多痰，吐血，两颧发红，自汗或盗汗，脉细数。

处方：川乌、乳香、没药、续断各15克，雄黄10克，硃砂15克，元寸0.5克。

用法：除元寸外，其余诸药混合粉碎为末。每次先取元寸 $\frac{1}{3}$ ，放入脐中，再取药末15克，撒于元寸之上，盖以槐皮，上放预制的艾绒炷，点燃灸之，至病人腹中作响，大便下涎物为止。隔一天灸治1次，灸后只服米汤，食白粥，饮少量黄酒以助药力，至愈为止。

处方来源：《穴位贴药疗法》

2. 肺结核敷脐方

主治：肺结核。

处方：利福平胶囊1丸，雷米封1片，雄黄0.3克，胡黄连（研末）1克。

用法：上药共研细末，用蜂蜜调为膏，敷脐部，每天换药1次，20天为1疗程。

处方来源：陈中和经验方。

3. 肺病敷脐膏

主治：肺阴不足，虚火上升，干咳少痰，午后发热，经常低烧，夜间盗汗，肺结核病。

处方：地骨皮15克，六神丸200丸，雷米封20片，五倍子20克。上药共研末，备用。

用法：每次取药粉2克，适加蜂蜜调为膏状，敷脐部，外用纱布固定。每天换药1次，连用30次为1疗程。每次换药前，让脐部晾3小时，以免引起脐部不适。

处方来源：孙玉中经验方。

吐血

1. 醋制大黄散

主治：吐血。

处方：大黄6克。

用法：将大黄研末，醋调为糊，敷脐部，外用纱布、胶布固定。每天换药1次。

处方来源：《理渝骈文》

2. 二蓟膏

主治：吐血。

处方：大蓟、小蓟、茅根、大蒜各10克。

用法：上药合共捣烂如膏，敷脐部。

处方来源：《内病外治》

高血压

1. 脐压散

主治：高血压。

处方：胆汁制吴茱萸500克，龙胆草醇提取物6克，硫黄50克，醋制白矾100克，朱砂50克，环戊甲噻嗪175毫克。将上药合共研末备用。

用法：每次取药粉200毫克左右，倒入脐内，敷盖棉球，外用胶布固定，每周换药1次。同时测量血压，连用1个月无效者，即当停药。



疗效：用上方治疗116例，总有效率为77%。

处方来源：《新中医》，1981年第3期。

2. 桃杏膏

主治：高血压。

处方：桃仁2克，杏仁2克，心痛定2片，罗布麻片剂2片。

上药共研细末。一次量。

用法：药粉用蜂蜜调成膏，敷脐部，外用伤湿止痛膏固定，每天换药1次，连续用药10次为1疗程。

处方来源：韩文超医师经验方。

冠心病、心绞痛

1. 冠心宁

主治：冠心病心绞痛。

处方：山楂浸膏20克，甘草浸膏8克，葛根浸膏10克，白芍270克，厚朴100克。上药共研细末，加入鸡矢藤挥发油6毫升，细辛挥发油1毫升，乳香、没药醇液70毫升，冰片5克共混合，阴干，密闭保存备用。

用法：每次取药粉200毫克，用黄酒调为糊状，放入脐内，上盖胶布，每3天换药1次。

疗效：用上方治疗3例冠心病心绞痛，对控制心绞痛有显著作用。

处方来源：《河南赤脚医生》，1980年12期。

2. 心绞痛缓解剂

主治：心绞痛。

处方：川芎12克，冰片7克，硝酸甘油10片。上药共研细末，备用。

用法：每次取药粉0.5克，用丹参注射液调为糊状，敷于

脐内，上盖胶布。隔日换药1次。

处方来源：笔者经验方。

神经官能症

1. 脐周团摩法

主治：心血虚的心神经官能症，腹痛，慢性肠炎，慢性胰腺炎。

方法：让患者仰卧，医者用掌心及其余4指均置于脐部周围皮肤上，由内向外，或上、下、左、右摩动，用力均匀徐缓。摩至脐部潮红为度。

2. 安神丹

主治：神经官能症。症见烦躁、失眠、头痛、头晕、记忆力减退。

处方：朱砂10克，琥珀12克，丹参15克，枣仁12克，茯神10克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉2克，蜂蜜调为膏，敷脐部，每天换药1次。

处方来源：开封市卫生局主治医师孙玉中的经验方。

失眠

1. 珍珠丹参散

主治：失眠。

处方：珍珠层粉、丹参粉、硫黄粉各等量，共合备用。

用法：每次取药粉0.25克填于脐内，外贴胶布，每天换药1次，连用3—5天为1疗程。

处方来源：《浙江中医杂志》，1982年第3期。

2. 安眠散

主治：失眠。

处方：丹参、远志、硫黄各10克，上药共研末，备用。

用法：每次取药粉0.5—1克，以水调为糊，敷脐内，外贴胶布固定。每天换药1次。

处方来源：民间验方。

阳痿

1. 壮阳膏

主治：阳痿不举，腰膝酸软，神疲体倦，气短畏寒，脉细弱。

处方：乌附子1个（重45克），阿片1.5克，穿山甲3克，硫黄6克，元寸0.3克。

制法：先将乌附子挖去内部，成一空壳，将挖出的附子末，和其他3味药混合粉碎为末，填入附子壳内，用好酒250毫升，放锅内将附子煎煮，煎熬至酒干，将附子取出，和元寸混合，捣为膏备用。

用法：每次取药膏（如黄豆大）一块填入脐中，外用胶布固定。3日换药1次。如能用此药膏（如黄豆大一块）再贴曲骨穴，效果更好。

处方来源：《验方新编》

2. 阳痿丸

主治：阳痿

处方：急性子10克，鸦片3克，蟾酥2.4克，元寸0.6克，葱白适量。

制法：先将前3味药研为细末，加入元寸，再研极细，滴水成丸药1粒，用葱白捣烂包住，外用湿纸再包一层，放炭火中煨3—5分钟，取出换纸，再包再煨，如此反复7次，去

掉纸和葱，将药制成丸如绿豆大备用。

用法：睡前取药丸3粒，用白酒化开，一丸填脐内，一丸敷曲骨穴，一丸涂阴茎头上。每晚1次。

处方来源：《验方新编》

遗精、滑精

1. 遗精散

主治：遗精。

处方：五倍子20克，煨后研细末备用。

用法：每次取五倍子末0.5—1克，撒膏药上贴脐部。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

2. 梦泄方

主治：梦中遗精。

处方：紫花地丁（鲜品）80克，捣烂如膏，贴脐上，立止。

处方来源：《串雅内编》

3. 矛盾丸

主治：相火旺之梦遗。

处方：甘遂、甘草各9克。上药共研为丸，猪脊筋捣为丸，填入脐中，外用一般膏药贴之。

处方来源：《理渝骈文》

4. 秘精丹

主治：梦遗滑精。

处方：五倍子15克，龙骨15克，朱砂3克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉3克，用温开水调为糊状，填敷脐中，外用纱布、胶布固定，每天换药1次，连用3—5天。

处方来源：民间单验方。

5. 乾坤丹

主治：遗精、滑精。对心肾不交的遗精较为适宜。症见梦中遗精，心悸，体倦乏力，小便短黄而有热感，舌质红，脉象细数。

处方：黄连6克，肉桂3克，黄柏6克，制附子3克，五倍子15克。共研末备用。

用法：每次取药粉1—2克，用温开水调糊，填敷脐部，外用纱布、胶布固定，每天换药1次，连用7—10次。

处方来源：民间单验方。

6. 刺猬皮散

主治：遗精、滑精。

处方：刺猬皮20克，研末备用。

用法：每次取药粉1克，白酒调糊，填敷脐中，每两日换药1次。

处方来源：民间单验方。

男女交合后气绝症

1. 回阳丹

主治：男女交合后气绝症。或寒中三阴，口噤失音，肚疼，两手无脉，厥逆唇青，男子肾囊缩入，女子乳头缩入等。

处方：葱白500克。

用法：将葱微炒捣烂，分作两包，轮流熨肚脐部及脐下部位，待暖气入内自愈。同时以葱白三寸捣烂酒煎灌下，阳气即回。或用罐装热水在葱上熨之更妙。

处方来源：《陕西中医验方选编》

2. 還元膏

主治：男女交合后气绝症。症见突然晕厥，面白唇青，手足发冷，肚疼囊缩。

处方：胡椒1克，干姜2克，细辛1克，共研末。

用法：将药末放碗内，用白酒调为糊状，填脐中，外用纱布包扎，再用暖水袋热熨之。至出汗则愈。

处方来源：民间单方。

男子缩阴症

1. 鲜葱熨剂

主治：房事后恣食生冷，以致肾囊紧缩，小便抽疼，大便不通。

处方：鲜葱3斤。

用法：将葱用陈醋炒热，再用布包好，熨脐周围，待腹内作响，病退为止。

处方来源：《陕西中医验方选编》

2. 热熨回阳法

主治：男子缩阴症。症见面青唇白，少腹剧痛，病势危急。

处方：生姜120克，大葱240克，胡椒15克，硫黄30克。

用法：将前3味药炒热，同硫黄装入袋内，热熨脐部及脐下一寸处，并用烧酒壶热熨。

处方来源：《陕西中医验方选编》

眩晕

1. 眩晕停填脐剂

主治：眩晕症。

处方：眩晕停10片，全虫2条。共研细末，备用。

用法：每次取药粉0.3克，撒入脐内，外贴胶布固定，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

2. 除眩散

主治：肝阳上亢，眩晕，头角阵疼，烦躁易怒，或耳鸣多梦，颜面潮红，舌苔黄，脉弦数。

处方：吴茱萸(胆汁拌制)100克，龙胆草50克，土硫黄20克，朱砂15克，明矾30克，将以上诸药合共研末，用小蕲根汁调和成糊，备用。

用法：每次取药糊10—15克敷于脐部，胶布固定，两日换药1次，1月为1疗程，一般7—10天见效，2—3个月可愈。如同时用此膏敷涌泉穴上，则疗效更好。

处方来源：《穴位贴药疗法》

厥症

1. 回厥散

主治：突然昏倒，不省人事，四肢厥冷，出冷汗，气喘，阳气欲脱等症。

处方：食盐50克，研末炒热，待温敷脐部，再以麦麸加醋炒热，布包，放盐上熨之，片刻即可使患者苏醒。

处方来源：民间单验方。

2. 复苏灵

主治：突然昏倒，不省人事，四肢发凉，出冷汗，脉细弱。

处方：干姜粉10克，制附子10克，葱白100克。

用法：上药共捣烂，放锅中炒热，趁温热熨脐部，至苏醒去药。

处方来源：民间单验方。

中风、脑血管意外

1. 大活络丹敷脐法

主治：脑血栓形成后遗症。

处方：大活络丹半粒至1粒。

用法：用白酒将大活络丹调软，敷脐部，外用纱布、胶布固定。每天换药1次。

处方来源：开封市郭西斋中医经验方。

2. 巴豆纳脐法

主治：中风闭证，属寒便秘。

处方：巴豆3粒，去皮捣烂如泥，用布包后填入脐中即可。

处方来源：《理瀹骈文》

备注：此方所治之中风，又称卒中，类中风。指猝然昏仆，不省人事，或突然口眼喎斜，半身不遂，言语不利的病症。相当于现代的脑血管意外等病。至于中风闭证，是指具有中风诸症状的基础上，伴有牙关紧闭，两手握固等症状。

癫痫

1. 定痫散

主治：癫痫。证见突然跌仆，不省人事，四肢抽搐，口吐白沫，或发羊叫声，醒后亦如常人，仅感身困乏力。

处方：芫花50克（醋浸泡一天），明雄6克，胆南星10克，白胡椒5克。以上诸药合共研末备用。

用法：每次取药末10—15克，蜂蜜调为膏，填于脐中，盖以纱布、胶布固定。3天换药1次，连续3个月为1个疗程。

处方来源：民间单验方。

2. 定癇散2号

主治：癲癇。

处方：胆南星、雄黄各3克，醋荒花 50 克，上药共研细末，以白胡椒挥发油0.05毫升调匀备用。

用法：每次取药末150—250毫克填于脐中，外用胶布密封固定。第一次敷药5天后换药，以后每隔3天换药一次，3个月至半年为1疗程。

处方来源：民间单验方。

3. 定癇散3号

主治：癲癇。

处方：丹参粉1克，月石1克，苯妥英钠0.25克。上药共研细末，分作10份备用。

用法：用时每次取1份药粉填入脐内，外用胶布固定，每天换药1次，连用10天为1疗程。

处方来源：《浙江中医药杂志》，1982年第3期。

4. 定癇膏

主治：癲癇。

处方：制马钱子、僵蚕、胆南星、明矾各15克，共合研末备用。

用法：每次取药粉5—10克，用生姜10克，艾叶3克合捣为膏，贴于脐部，再用艾绒炷放药膏上灸之，按患者年龄。一岁灸一壮，每天灸治1次。

处方来源：笔者经验方。

烦躁

1. 地仙膏

主治：心虚烦躁。邪攻而烦。

处方：地骨皮1000克，麻油熬，黄丹收，贴脐处。

处方来源：《理瀹骈文》。

2. 镇静除烦散

主治：烦躁不安。

处方：黄连6克，朱砂5克，安定18片，上药共研细粉，备用。

用法：每次取药粉0.3克，填脐内，外贴胶布，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

晕车

1. 防晕方

主治：防治晕车、晕船。

治法：在乘车前先用伤湿止痛膏贴在脐上。如乘车超过1天，第二天另换1张贴上。

疗效：用上法防治晕车20余例，均取得满意疗效。

处方来源：《广西中医药》，1978年第1期。

2. 乘晕宁填脐方

主治：晕车、晕船。

处方：乘晕宁2片，研为细末，用姜汁调为糊状，填脐内，外贴伤湿止痛膏，每天换药1次。

处方来源：笔者临床经验方。

面神经麻痹

1. 正面膏

处方：胆南星8克，雄黄3克，醋芫花50克，马钱子总碱

0.1毫克。共研末，再喷入白胡椒挥发油0.05毫升，混匀密封保存备用。

用法：每次取药粉200毫克敷于脐中，胶布密封固定，2—5天换药1次。

疗效：用上方治疗面神经麻痹15例，治愈5例，显效7例，改善1例，无效2例。

处方来源：《辽宁中医》，1979年第4期。

2. 齐痉散

主治：面神经麻痹。

处方：胆南星8克，明雄3克，醋芫花50克，黄芪30克，马钱子生物总碱0.1毫克，共烘干研末，再喷入白胡椒挥发油0.05毫升混匀。如肝阳上扰加羚羊角粉3克，勾藤20克；血瘀加乳香15克，没药15克，冰片10克，再合齐痉散为1料药备用。

用法：每次取药粉250毫克。填入脐内按紧，胶布密封固定，2—5天换药1次，直至病愈。

处方来源：《辽宁中医杂志》，1981年2期。

3. 面瘫方

主治：面神经麻痹。

处方：马钱子50克，芫花20克，雄黄2克，川乌3克，胆南星5克，白胡椒2克，白附子3克。先将马钱子放砂锅内，加水及绿豆（一把），放火上煎熬，待绿豆熟，将马钱子捞出，剥去皮，打成碎块，然后在铁锅内放沙土炒之，不断搅拌，炒至马钱子呈黄褐色时（不可炒黑，黑则无效），取出与诸药混合，共研末备用。

用法：每次取药末10克，撒于胶布中间（如法制两块），分贴于脐部及牵正穴上，两天换药1次，5—10天见效。

处方来源：开封市胡云鹏中医经验方。

面肌痉挛

1. 松肌1号

主治：面肌痉挛症。

处方：齐痉散（参面神经麻痹）。

用法：每次取齐痉散0.2克填入脐内，外用胶布密封贴固，每天换药1次，连用20天为1疗程，隔5天再进行第2疗程，应用本方3个疗程无效者，应改用其他疗法。

处方来源：《浙江中医杂志》，1982年第3期。

2. 松肌2号

主治：面肌痉挛症。

处方：全虫10克，蜈蚣6克，安定12片，卡马西平16片，地巴唑10片。上药共研极细末，密贮备用。

用法：每次取药粉0.3克，填于脐内，外用伤湿止痛膏贴固，每天换药1次，15次为1疗程，1疗程无效者改用其他疗法。

处方来源：笔者经验方。

急性肾炎

1. 急性肾炎膏

主治：急性肾炎之水肿。

处方：车前子20克，田螺5个，蒜30克。以上诸药用水煎之，去渣，将药液浓缩成膏状备用。

用法：用时取本药膏适量填脐，至脐窝满为度，外用纱布包扎固定。每天换药1次。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

2. 宣肺消肿散

主治：急性肾炎，证见面目浮肿。小便不利，浑身乏力，时有低烧。

处方：麦迪霉素片2克（20片），双氧克尿塞 250 毫克，琥珀6克，共研末备用。

用法：每次取药粉200毫克填脐内，上面盖上一个酒精棉球，再用纱布包扎，每天换药1次，15次为1个疗程。

处方来源：笔者经验方。

3. 肾炎膏

主治：急性肾炎。

处方：垂盆草、马兰根、毛茛、败酱草各9克，胡葱根5根，白芨、川贝、山楂各3克。

用法：前5种药捣烂，后3种药研末与前5种药混合，加适量的酒调和，做成一个药饼，敷脐上，纱布包扎，24小时去药，脐部皮肤会起水泡，用消毒针挑破，然后涂呋喃西林油膏亦可。一个月内不吃盐及荤腥。

处方来源：《江苏医药》，1976年第1期。

4. 甜蓼糊

主治：急性肾炎。

处方：鲜甜蓼全草一把，野芥菜根30克。

用法：上药合共捣烂，敷脐部，每天1次，每次3—5小时去药，连用1个月。

处方来源：民间单验方。

尿路感染

1. 淋症膏

主治：尿路感染，小便黄赤，尿时涩疼，尿热、尿频。

尿急、口渴，舌苔黄，脉数。

处方：葱白5支（带须、去土，勿洗），篇蓄3克，大黄2克，木通2克，瞿麦6克，上药共捣烂为膏备用。

用法：用时取药膏（如枣大）一块，放于脐中，上盖纱布，再用胶布固定，1日一换。

处方来源：《穴位贴药疗法》

2. 清热利尿散

主治：尿路感染。

处方：麦迪霉素2克（约20片），呋喃妥因片1:5克，三黄片20片。上药共研极细末备用。

用法：每次取药散0.3克，填脐内，外用胶布密封贴固，每天换药一次。

处方来源：笔者临床经验方。

泌尿系结石

1. 尿结石膏

主治：尿路结石，腰腹剧痛，尿中带血。

处方：小茴香3克，金钱草6克，葱白5支，蓖麻子7粒，食盐6.5克。

用法：以上诸药共捣烂如泥，每次取枣大一块放在脐中，外用纱布、胶布贴固，每天换药一次。如果同时加贴膀胱俞穴，效果更好。

处方来源：开封市张楠医师经验方。

2. 石淋膏

主治：尿结石。

处方：虎杖根100克，乳香15克，琥珀10克。以鲜虎杖根和诸药混合，捣烂如膏（如无鲜虎杖根，也可用干品研

末，用葱白和诸药捣烂如膏)。

用法：取药膏如枣大一块，放于脐中和肾俞穴上，一穴用1丸药膏，每日换药1次。

处方来源：《穴位贴药疗法》

小便不禁

1. 姜附赤脂散

主治：小便不禁。

处方：附子、干姜、赤石脂各等量，共研为末，水调为糊，每次用如枣大一块，敷脐部，外用纱布固定。

处方来源：《理渝骈文》

2. 固脬膏

主治：小便不禁。

处方：山芋肉10克，龙骨15克，小茴香6克，肉桂9克。上药烘干共研末备用。

用法：每次取药粉1克，蜂蜜调为膏，外用纱布、胶布包扎，每天换药1次，10—15天为1个疗程。

处方来源：此方乃笔者从一老药工那里学得，用于临床，效佳。

小便频数

1. 肉桂丁香散

主治：寒性小便频数。

处方：肉桂6克，丁香6克，上药共研末备用。

用法：将上药末用黄酒调为糊状，贴脐部，每日换药1次。

处方来源：《陕西中医验方选编》

2. 五倍子诃子散

主治：小便频数。

处方：五倍子10克，诃子8克，龙骨12克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉1克填脐内，外用胶布贴固，每天换药一次。

处方来源：民间单验方。

尿浊、白浊

1. 牡蛎大蒜饼

主治：尿浊。

处方：童便制牡蛎15克，大蒜头1个。

用法：上药共捣烂敷脐部，外用纱布包扎固定。敷药前，先在脐部涂一层凡士林，以免引起脐部起水泡。

处方来源：《理渝骈文》

2. 白浊散

主治：男子白浊，神疲肢倦（劳累后加重）。

处方：龙骨、虎骨、蛇骨、乌附片、广木香、丁香、乳香、没药、雄黄、朱砂、胡椒、小茴香、五灵脂、夜明砂、两头尖、青盐各10克，将以上诸药合共研细末备用。

用法：先取元寸0.2克放于脐中，再取药末15克撒在元寸上面，盖以槐皮，肚脐周围用荞麦面加水调糊圈围上，以艾炷放槐皮上点燃灸之，待热气透入腹中止灸，1日1次，病愈为止。

处方来源：此方为针灸医生常用的方法，不仅能治白浊，还可治疗慢性肠炎，妇女宫寒不孕，月经后期等病。

3. 澄浊散

主治：尿浊（属肾虚兼有湿热者）。

处方：菖蒲12克，木通、大黄、五倍子、诃子、杜仲、小茴香各6克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉2—4克，温开水调为稠糊状，填脐，外用纱布覆盖，胶布固定，每天换药1次，8—15次为1疗程。

处方来源：开封市谢百合中医经验方。

水肿

1. 健脾利水散

主治：脾肾阳虚型水肿。证见浮肿，下肢肿甚。

处方：桂枝、干姜、党参、白术、硫黄、白芍、白矾各等量。上药共研末，备用。

用法：每次取药粉0.5—1克纳脐中，胶布贴固，1周更换1次。

处方来源：《河南省秘验单方集验》

2. 木蓬膏

主治：胸腹积水，胀满疼痛，四肢浮肿，小便不利，积聚痞块。

处方：木蓬膏（中成药，中药店有售）。

用法：贴脐部。

禁忌：孕妇忌贴。

处方来源：《全国中药成药处方集》

3. 巴豆水银膏

主治：水肿。

处方：巴豆12克（去油），水银6克，车前子9克，大枣3枚。

用法：将水银研开后，合诸药共为细末，用水调糊，将药

放入生白布袋内，置于脐上用带扎紧约1小时，若泻下3次，即可将药袋去掉。

附注：此方药性剧烈，必须在有经验的医生指导下慎重使用。

处方来源：《陕西中医验方选编》

4. 麝香猪尿脬

主治：水肿。

处方：胆矾1.5克，大黄9克，麝香0.3克，白酒120克，猪尿脬一个。

用法：先将前3味药研为细末，连酒装入猪尿脬内，放沸水内煮热，敷脐上，小便大利、肿即消。

处方来源：《陕西中医验方选编》

5. 田螺贴

主治：肾脏性水肿，腹水。

处方：取田螺（去壳）2—3个洗净，加食盐3茶匙，捣烂，摊于约9×9厘米的玻璃纸上，敷脐上，外以纱布包扎，每日1次，10次为1疗程。一般需3个疗程以上。

处方来源：《中药大辞典》

6. 揉按擦万金油法

主治：水肿、中风、脑充血、腹寒痛、肠鸣等症。

方法：揉、按神阙穴及脐周围，并擦以万金油（亦清凉油）。

处方来源：笔者临床常用方法之一。

7. 蜈蚣散

主治：水肿。

处方：活蜈蚣4—5只，放石器内捣烂如泥，摊布上，贴脐部。

处方来源：《常见病单验方资料研究》

8. 利水膏

主治：水肿（各种水肿病）。

处方：蝼蛄7只（去足），甘遂末3克，大黄末3克。

用法：以上诸药合共捣烂（若药末干燥，可加适量醋以调和），放脐上，外以布包扎，3日1换，连用3次。

处方来源：江苏省射阳县科委编《祖国医学采风录》

9. 商陆麝香散

主治：水肿、肿胀。

处方：商陆粉3克，麝香0.15克，共捣烂填脐中，小便利则肿胀自消。

处方来源：《理渝骈文》

10. 胃苓散

主治：阴水证。症见水肿尿涩，喘急股冷，或大便滑泻，脉沉濡。

处方：苍术9克，厚朴7克，陈皮9克，甘草10克，白术9克，泽泻9克，猪苓12克，茯苓12克。

用法：以上诸药共研末，炒热，布包熨脐部。

处方来源：《理渝骈文》

前列腺炎

1. 安尿通

主治：慢性前列腺炎。

处方：麝香0.15克，白胡椒7粒。上药为1次用量。按此比例配制，白胡椒研细末瓶装密封备用。

用法：用药前先洗净脐部，倒入麝香粉，再撒上胡椒粉，最后盖一圆纸片，外用胶布固定，须贴紧勿令药粉漏

出，每7—10天换药1次，10次为1疗程，每疗程间隔5天。

疗效：用上方治疗11例。治愈6例，好转3例，疗程2—4个。2例中断治疗。

处方来源：《江西中医药》，1984年第2期。

2. 通尿膏

主治：老年性前列腺炎。小腹胀疼，小便不利或尿闭。

处方：葱白200克，硫黄20克。

用法：上药共合捣烂成糊状，敷脐部，上用热水袋熨之，熨1小时后，再将药糊熨膀胱区。

处方来源：《韩明本医案》

3. 田螺水滴脐法

主治：前列腺肥大所致的尿闭。

处方：田螺1个，冰片0.5克。将冰片放田螺内取水，滴脐眼内。

处方来源：《养生寿老集》

4. 艾叶菖蒲熨

主治：前列腺肥大所致的尿闭症。

处方：艾叶60克，菖蒲30克。

用法：上药合共捣碎，炒热，布包熨脐部，一次熨20分

● 钟。

处方来源：笔者经验方。

尿潴留（癃闭）

1. 通尿丹

主治：尿潴留。

处方：甘草、甘遂各2克。

用法：上两药混合研成细末，敷于脐部，外用胶布固

定，敷药24小时去掉，如无效，可再换药1次。

处方来源：《浙江中医杂志》，1981年10期。

2. 青蒿散

主治：尿潴留。

处方：鲜青蒿200—300克。

用法：将上药捣碎（勿让药汁流失），随即敷于脐部，外覆塑料薄膜及棉垫各1块，用胶布固定。待排尿后即可去药。

疗效：用上方治疗45例，一般多在敷药后20—30分钟内排尿。

处方来源：《中医杂志》，1982年第4期。

3. 二白膏

主治：尿潴留。

处方：葱白一支，白胡椒7粒。

用法：上两药合共捣烂如泥，敷于脐部，外盖以塑料薄膜，再用胶布固定。

疗效：用上方治疗尿潴留12例，皆获痊愈。一般敷药3—4小时后即见效。

处方来源：《新中医》，1984年第9期。

4. 蒜梔膏

主治：小便不通。

处方：独头大蒜1个，梔子21个，盐1匙。

用法：上药共捣烂，敷脐中，良久即通，若不通，敷阴囊上立愈。

处方来源：《种福堂公选良方》。

5. 利尿散

主治：小便不通，小便不利。

处方：商陆15克，麝香0.15克。

用法：将上药共研末，装入小布袋内，盖敷在脐部，外用绷带包扎，候药气入腹(约1小时左右)，小便即通。

处方来源：福建省中医研究所编《中医验方》第三集。

6. 葱盐熨

主治：小便不通。

处方：带须葱白500克，洗净切碎，加入食盐50克，共捣为泥，炒热分两包交替熨脐部，冷则调换。

处方来源：开封市卫生局编《医药卫生科技资料》。

7. 麝香通闭散

主治：癃闭。

处方：麝香0.15克，分做2份，1份填脐内(外用胶布贴固)，1份塞鼻内闻之，1—3小时即通。

处方来源：民间单验方。

8. 麝香皂角散

主治：小便不通。

处方：麝香0.06克，皂角末0.3克，葱白6克。

用法：先把麝香放脐内，再把皂角末放在麝香上，葱白捣烂炒热敷脐上，用布包好。

处方来源：《陕西中医验方选编》。

9. 蜈蚣散

主治：小便不通。

处方：蜈蚣5个，大蒜头1个。

用法：上药共捣烂如泥，贴脐中约半小时即可见效。

处方来源：《陕西中医验方选编》。

10. 癃闭膏

主治：湿热郁结，小便点滴不爽，或点滴不通，小腹胀满，咽干口燥，舌苔黄，脉数。

处方：梔子4克，食盐1克，独头蒜1个(去皮)，麝香0.3克。以上诸药共捣为膏。

用法：将药膏敷脐部，纱布包扎固定。一般12—24小时小便即通。如能再用此药膏敷关元穴上，疗效更好。

处方来源：《普济方》

11. 利尿方

主治：小便不通。

处方：食盐炒热，填满脐眼，上用艾火烧5次，即通。

处方来源：《验方新编》

12. 通尿饼

主治：癃闭。

处方：莴苣子50克，捣烂做成药饼，贴脐，热熨斗熨之，尿即通。

处方来源：《本草纲目》

小便不利

1. 蜗牛麝香泥

主治：小便不利。

处方：蜗牛15克，麝香0.15克。

用法：先把麝香放在肚脐内，再将蜗牛捣成泥敷脐部，用布盖敷，胶布固定，并用暖水袋热熨之。

处方来源：开封市卫生局编《医药卫生科技资料》

2. 瓦松熨剂

主治：小便不利。

处方：瓦松100克，切碎放锅中炒热，趁其温热熨脐部。

冷则再炒热熨之。

处方来源：民间单验方。

3. 明矾酒

主治：小便不利。

处方：明矾、白酒，分量不拘多少。

用法：白酒50克，倒入碗内，放入明矾10克，研至明矾溶化，以手指蘸矾酒，在患者脐部摩涂15分钟左右。

处方来源：《陕西中医验方选编》

黄疸

1. 黄疸经效灸法

主治：黄疸。

处方：铜制钱1个，毛边纸数张，黄蜡或白蜡一块，湿面一块。

制法：先将毛边纸裁成六寸见方，再把蜡放铁勺内置火上溶化。用蜡汁将纸烫润浸匀，卷成纸筒（中间留的空隙不要太窄），用蜡封固。再用水调合小麦面一块如鸽卵大，捏成比纸筒稍宽的圆圈。

用法：令患者仰卧，露出肚脐。将铜制钱置肚脐上，钱眼对准肚脐窝；再把蜡纸筒的一端，拍在铜钱上，把面圈扣在铜钱和蜡纸筒下头的周围，并用手指按紧，使蜡纸筒稳定。用火燃着蜡纸筒的上端，在肚脐上灸。等蜡纸筒燃烧到离肚脐约1寸许时，迅速吹灭取下，以免灼伤皮肤。另换一个蜡纸筒，如法再灸。病轻的，第一次灸2—3回（用一个蜡纸筒为1回），以后每日灸1—2回，连灸3—4日。病重的，第一次灸3—4回，以后每日灸2—3回，连灸3—4日。总之，灸的天数多少和时间长短，应根据病情的轻重而定。但每次不

宜回数太多和时间过长。只要不间断，即可见效，不要操之过急。另外，从开始灸的第一天起，每日用茵陈30克，水煎温服，每日服1次，连服4—7天。

反应：灸1回后，肚脐内及未烧尽的蜡纸筒内，会发现许多黄色粉末。再灸时，将肚脐上黄粉扫掉。无任何副作用及危险。

疗效：用本法治疗黄疸，疗效较好，轻者10天左右可愈，重者2周至3周即能恢复健康。

处方来源：河北省中医研究院编《中医验方汇编》

2. 南星散

主治：黄疸。

处方：南星30克。

用法：将南星捣碎，放于茶杯内，扣脐上，3—5小时去药，脐部皮肤起泡，用消毒过的针挑破，让泡中水流尽即可。

处方来源：《理渝骈文》

3. 百部覆

主治：阳黄。

处方：新鲜百部100克。

用法：将百部根捣烂覆脐上。糯米饭一碗，水、酒各50克调和米饭令软，趁温盖在药面上，用纱布包扎，1—2日内有酒气，水从小便出，肿自消。

处方来源：《理渝骈文》

4. 茵陈敷脐方

主治：黄疸。

处方：茵陈、梔子、芒硝、大黄各30克，杏仁、鳖甲、巴豆霜各10克，豆豉10克，共煎浓汁，棉花蘸药汁热敷于

脐。

处方来源：《内病外治》

5. 肝炎黄疸方

主治：病毒性肝炎黄疸症。

处方：甜瓜蒂3克，虎杖6克，垂柳叶9克，石苇3克。上药共研细末备用。

用法：每次取药末5克，用醋调为糊，敷脐部，纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

黑疸

1. 矾石散

主治：黑疸。多因疸证经久不愈，肝肾虚衰，瘀浊内阻所致。症见身黄不泽，目青，面额色黑，心中懊恼，腹胀等。

处方：明矾15克，滑石9克，大麦芽9克。

用法：上药共研末，温水调成稠膏敷脐部，每天换药1次。

处方来源：《理渝骈文》

2. 瓜蒂皂矾散

主治：黑疸。

处方：甜瓜蒂10克，皂矾9克，茵陈12克，干姜5克，丹参15克，上药共研末备用。

用法：每次取药粉1—2克，填脐中，外用胶布贴固，每天换药1次，15次为1疗程。

处方来源：笔者家传方。

发热

1. 蚯蚓敷脐法

主治：外感病的发热不退症。

处方：蚯蚓10余条。

用法：将蚯蚓浸在酒中约10余分钟，然后取出，蘸明矾末，整条盘在脐部，并以纱布盖覆，胶布固定。

处方来源：福建省中医研究院编《中医验方》第三集。

2. 百灵膏

主治：各种发热症。

处方：生石膏粉5克，安乃近注射液1支(2毫升)。

用法：用安乃近注射液将石膏粉调为糊状，敷脐上，每天换药1次。

处方来源：笔者临床经验方。

腹痛

1. 腹痛灵

主治：急性胃肠炎、肠痉挛、慢性肠炎等病引起的腹痛。

处方：食盐5—10克，研末，炒热后备用。

用法：将食盐末放脐内，厚约0.3厘米。上置艾炷灸之，灸至脐部有较明显的烧灼感时，将艾炷压灭。再点燃一个艾炷灸之。

疗效：用上方治疗50例腹痛，其中因急性胃肠炎者20例，肠痉挛者7例，均经灸1—2次后痛止病愈；因溃疡病和慢性胃炎致腹痛者21例，胆囊炎2例，灸1次痛止治愈者15例，明显好转者8例。

处方来源：《浙江中医杂志》，1982年第8期。

2. 温中祛寒散

主治：脾肾阳虚、阴寒内盛所致的腹痛腹胀，恶心呕吐，肠鸣泄泻，寒疝尿闭，四肢厥冷等。

处方：吴茱萸、干姜、丁香各50克，小茴香75克、肉桂、生硫黄各30克，山梔子20克，胡椒5克，草拨25克。上药共研末备用。

用法：每次取药末25克(小儿用15克)，加等量面粉和匀，用温水调为糊状敷脐上，外用纱布包扎，并用暖水袋热敷，每日换药1次。

处方来源：《辽宁中医杂志》，1980年第11期。

3. 温中止痛散

主治：寒泄腹痛。

处方：盐制附子10克，研末备用。

用法：将附子末填脐内，外用纱布包扎，并用暖水袋热敷，敷药24小时后去药。

疗效：一般敷药后2—5小时痛亦消失。

处方来源：笔者临床验方。

4. 隔葱灸

主治：寒性腹痛泄泻，虚脱，肠胀气，尿闭。

处方：葱白30克，艾炷。

用法：将葱白捣烂做饼，敷于脐部，再将大艾炷放葱饼上，点燃灸之，一次灸20分钟左右。

处方来源：灸法常用方法之一，在民间应用此法者甚多。

5. 揉、搓、摩神阙穴

主治：腹痛、腹胀、腹泻、便秘、乳痢。

用法：(1)用拇指端紧附脐窝上，作和缓回转之按抚动作，约揉50—100次。

(2) 以左大拇指按患者脐部，以右拇指在患者脐周围

搓之。

(3) 以掌心按脐及小腹，向上，下，左，右而摩之，数10次即可。

处方来源：民间单方。

6. 岁照丸

主治：阴寒内积，腹痛暴起，遇冷更甚，得温则缓，大便溏泻。

处方：葱白带须5寸，胡椒按年龄计算，每岁用1粒，最多不超过20粒，枯矾1克。

用法：上药共合捣烂如膏，填脐中，外用纱布包扎，再用暖水袋热敷药上，约2—3小时即愈。

处方来源：《理渝骈文》

7. 代灸涂脐膏

主治：下元虚寒，脐腹冷痛。

处方：大附子、马蔺子、蛇床子、木香、肉桂、吴茱萸各6克。

用法：上药共研末，用姜汁调成膏，敷于脐部，外以布包扎。

处方来源：《东医宝鑑》

8. 姜桂散

主治：腹寒痛。

处方：炮姜、肉桂各2克，共研细末，撒在暖脐膏上贴于脐部；隔日换药1次。

处方来源：《理渝骈文》

9. 理气止痛散

主治：气滞腹痛，症见腹胀痛，得矢气则舒。

处方：小茴香、花椒、元胡、乳香、枳实、厚朴各10

克，共研末备用。

用法：每次取药末1—2克，用十滴水调为稠糊敷脐部，外用胶布贴固，每天换药1次。

处方来源：民间医生卢书堂的经验方。据其介绍，应用此方20余年，治愈腹痛患者700余人，多次受到患者赞誉。

10. 川椒乌梅散

主治：虫积腹痛。

处方：川椒、乌梅各30克，共研细末，炒热熨脐腹部，待冷再炒热熨之，虫即下。

处方来源：《理渝骈文》

症瘕、积聚、痞块

1. 香槟膏

主治：腹中食积痞块，胸胁胀满，肚腹疼及妇女症瘕血块。

处方：香槟膏(中成药，药店有售)。

用法：将膏药微火熔开贴于肚脐上。

禁忌：孕妇勿贴。

处方来源：天津市达仁堂经验方。

2. 昆布膏

主治：功能活血化瘀止痛，治疗腹中痞块，症瘕血块。

处方：昆布膏(中成药，中药店有售)。

用法：用时取1贴膏药贴脐部。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：《中国膏药学》

附注：症瘕，指腹腔内痞块。一般隐于腹内，按之有形可验，坚硬不移，痛有定处者为症(繁体字即瘕)；聚散无

常，推之游移不定，痛无定处者为瘕。痞块，乃证名，指腹腔内的积块。积聚，乃病证名，指腹内结块，或胀或痛的病证。

3. 良姜膏。

主治：腹中痞块，症瘕血块。

处方：良姜膏(中成药，中药店有售)。

用法：贴脐部，3—5日换药1次。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：涇阳大寺经验方《中国膏药学》

4. 甲鱼膏

主治：症瘕痞块，婴儿积痞，肚胀腹痛，腹泻痢疾，干血癆症(子宫内膜结核)。

处方：甲鱼膏(中成药，中药店有售)。

用法：贴肚脐上，5日换药1次。

禁忌：贴膏药期间，忌食生冷油腻，孕妇勿贴。

处方来源：北京同仁堂制药厂生产《中国膏药学》

5. 大香膏(又名阿魏化痞膏)

主治：腹中积聚痞块，胸胁胀满，肚腹冷痛。

处方：大香膏(中成药，中药店有售)。

用法：微火化开贴脐部及患处。

处方来源：《全国中药成药处方集》

6. 化积膏

主治：诸积痞块。

处方：香附240克，五灵脂240克(半生半熟)，黑丑、白丑各30克。以上诸药用麻油熬，黄丹收，再兑入木香末30克搅匀，摊纸上，备用。

用法：贴肚脐上，3日换药1次。

处方来源：《理渝骈文》

盗汗

1. 敛汗丹

主治：盗汗。

处方：朱砂粉0.3克，五倍子1.5克。

用法：上药共研末，用冷开水调为糊剂，临睡前填脐中，上盖纱布，胶布固定，次晨即可去药，连用2—4夜。

疗效：用上方治疗肺结核盗汗44例，经观察45天至半年，其中42例敷药2—4次，盗汗消失。

处方来源：《新医学》，1975年第6期。

2. 黄柏散

主治：盗汗。

处方：黄柏2克。

用法：将黄柏研为末，以温开水调糊，敷脐部，1天换药1次。

处方来源：《理渝骈文》

3. 文蛤首乌散

主治：盗汗。

处方：文蛤、首乌各3克。

用法：上药共研末，水调为糊，敷于脐部，外用纱布包扎。

处方来源：《贵州民间方药集》

自汗

1. 五倍子散

主治：自汗、多汗。

处方：五倍子适量。

用法：将五倍子研末，每取1—3克填脐内，外贴胶布固定。并用暖水袋热敷3分钟。隔天换药一次。一般用药2—4次即愈。

处方来源：《浙江中医药》，1979年第9期。

2. 止汗丹

主治：自汗、盗汗。

处方：生五倍子、明矾各15克，上药共研末备用。

用法：每次取药粉2—3克，水调为糊，填敷脐中，外贴胶布固定，每天换药1次，连用3—5天。

处方来源：《理瀹骈文》

3. 首乌散

主治：自汗不止。

处方：何首乌30克，研末备用。

用法：每次取首乌散3克，水调为糊，填脐内，外用胶布贴盖固定，每天换药1次。

处方来源：《理瀹骈文》

腰痛

1. 韭蛇膏

主治：肾虚之腰痛腿软。

处方：韭子30克，蛇床子30克，附子30克，官桂30克，独头蒜500克，川椒90克。

制法：上药用香油1000毫升浸10日，加丹熬膏。硫黄、母丁香各18克，元寸9克，上药共研末，与蒜捣为丸，如豆大，备用。

用法：先取药丸1粒填脐内，外贴韭蛇膏，3日换药1

次。

禁忌：孕妇忌用。

处方来源：《丹方精华》

2. 生姜膏

主治：腰痛。

处方：生姜500克(捣取汁120克)，水胶30克，共煎熬成膏备用。

用法：每次取10克生姜膏摊贴脐部，每天换药1次。

处方来源：《串雅内编》

疝气

1. 治疝膏

主治：疝气。

处方：木瓜6克，橘核仁3克，小茴香6克，桃仁6克。

上药共研末，酒调为糊膏。

用法：敷脐部，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

2. 川楝吴萸散

主治：疝气。

处方：川楝子、吴茱萸各6克。

用法：上药共研末，布包熨脐部，并用暖水袋热熨之。

3. 盐熨疗法

主治：疝气痛。

处方：食盐250克。

用法：将盐炒热，趁热敷脐部。

处方来源：《食物疗法》

4. 消疝散

主治：疝气。

处方：酢浆草、天胡荽各16克。

用法：上药共研末，水调敷脐，每日换药2次。

处方来源：《贵州民间方药集》

健身延寿方

1. 长生延寿丹

主治：健身强体，益寿延年，并治腹冷无子，虚寒腹泻。

处方：人参、附子、胡椒各21克，夜明砂、没药、虎骨、龙骨、五灵脂、白附子、朱砂、元寸各15克，青盐12克，小茴香12克，丁香、雄黄、乳香、木香各9克。上药共研末。另用白面作条圈于脐上，将上药末分为3份，先取元寸0.15克入脐内。再将一份药末入面圈内，按药令紧，中插数孔，外用槐皮一片盖于药上，以艾火灸之，待热气透身，患者必倦如醉，灸之5—10壮，遍身大汗。若不出汗则为病未除，可待3—5天后再灸之，令遍身出大汗为度。

注意：慎风寒，戒生冷油腻，，保养1月，百病皆除，益寿延年。

处方来源：《东医宝鑑》

2. 小接命熏脐秘方

主治：强身健体，去病延年。治疗身体虚弱，久病体虚，慢性腹泻，精疲力乏。

处方：乳香、没药、煅鼠粪、青盐、两头尖、续断各6克，元寸0.3克。上药共研末备用。

用法：令食饱而卧，用荞麦面水和捏成条状，再捏成面圈放在脐上，直径约二寸，将药末放脐内，用槐皮一片盖药末之上，以豆大的艾炷灸之，每次灸10—20个艾炷。总之，

灸之汗出为度。无病者每日灸1次，有病者3日灸1次，灸之腹内作声作痛，大便有涎沫等物出即可。若作为强身防病，每年中秋日熏蒸一次即可。

处方来源：《东医宝鑑》

3. 揉脐健身术

主治：功能强身防病，帮助消化，改善心血管功能，促进新陈代谢，减肥。治疗食欲不振、消化不良、高血压、慢性肠炎、腰痛、肥胖病。

方法：用左手按脐部，右手按左手背上，用力以顺时针转，深揉腹脐部，每次揉30—40遍，每天1次，常练效著。

处方来源：笔者常练之功法，经常教授予亲朋及患者，学练者常赞誉此功法简便易学，疗效卓著。

备注：笔者之一韩文震，现为气功医师，任深圳市武术医疗养生研究所所长。

4. 刺五加灸脐法

主治：强身健体，提高机体免疫力，对慢性虚弱性疾病尤为适宜。

处方：刺五加30克，鼠粪40克，共研末备用。

用法：每次取药末3克填脐中，上放艾炷，点燃灸之，连灸2—4个艾炷。

处方来源：笔者经验方。

5. 蒸脐法

主治：健身强体，增强抗病能力。

处方：五灵脂24克，青盐15克，乳香3克，没药3克，夜明砂6克，地鼠粪9克(微炒)，葱头(干者)6克，木通9克，元寸0.1克。以上诸药共研细末备用。

用法：水和大麦面作成面圆圈，置脐上，将前药末6克放于脐内，用槐树皮剪如钱大，盖于药上，以艾炷灸，每岁1壮，药与槐树皮不时添换。

处方来源：《针灸大成》

二、妇 科 疾 病

月经不调

1. 红花膏

主治：妇女月经不调，腰痠痛，痛经。

处方：红花膏(中成药，药店有售)。

用法：贴脐部，3日换药1次。

禁忌：孕妇忌贴

处方来源：保定市商业局中药制药厂生产《中国膏药学》

2. 养血调经膏(又名木香膏)

主治：妇女子宫寒冷，月经不调，腹痛带下。

处方：养血调经膏(中成药，药店有售)。

用法：微火化开贴脐上。

禁忌：孕妇忌贴。

处方来源：《全国中药成药处方集》

3. 二皮膏

主治：妇女气虚血寒，经血清冷，月经不调，赶前错后，行经腹痛等。

处方：二皮膏(中成药，中药店有售)。

用法：贴脐部，3天换药1次。

禁忌：孕妇忌贴。

处方来源：《全国中药成药处方集》。

4. 止痛调经散

主治：月经不调，月经延后，虚寒痛经，子宫寒冷，腰痠怕冷。

处方：炮姜10克，山楂20克，元胡6克，以上诸药共研末备用。

用法：每次取药末6克，用黄酒调为糊状，敷脐部，外用纱布固定，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

痛经

1. 痛经灵

主治：痛经。

处方：当归、吴茱萸、乳香、没药、肉桂、细辛各50克，樟脑3克。

用法：先将当归、吴茱萸、肉桂、细辛水煎2次，煎液浓缩为糊状，混入(溶于95%乙醇)适量的乳香、没药液，烘干后研细末，加樟脑备用。月经前3天取药粉5克，用黄酒调为糊状，外敷脐部，用胶布固定，药干则调换1次药，月经3天后取下，每月1次，连续使用，治愈为止。

疗效：用上方治疗痛经60例，治愈52例，有效6例，无效2例。

处方来源：《浙江中医学院学报》，1985年第4期。

2. 痛经脐敷剂

主治：痛经。

处方：山楂、葛根、乳香、没药、穿山甲、川朴各100

克，白芍150克，甘草、桂枝各30克，细辛挥发油、鸡矢藤挥发油各适量。

用法：上药（除挥发油外）共研细末，加入细辛挥发油3克，鸡矢藤挥发油3克，冰片6克，混匀密贮备用。于月经前3—5天，取药剂0.2—0.25克，用醋或姜汁或酒调糊，敷于脐部，经后第三天去药。

疗效：经用上方治疗38例，其中6例痊愈，18例显效，9例改善，5例无效。有效的33例均在用药1次后，腹痛即明显改善。

处方来源：《浙江中医杂志》，1980年第12期。

3. 葱姜熨剂

主治：痛经。

处方：食盐、葱白各250克，生姜125克。

用法：上药共炒热，装布袋中温熨脐部及下腹部，凉后再炒再熨。每次熨20—30分钟，每日1—2次。

处方来源：笔者临床常用验方。

4. 益桂膏

主治：痛经。

处方：益母草9克，桂枝6克，茯苓9克，白术、当归、泽泻、香附各6克，川芎、元胡各4.5克，香油150毫升，黄丹120克。用香油炸枯诸药去渣，加入黄丹收膏，摊于牛皮纸上备用。

用法：每次取1帖膏药贴脐部或关元穴上。

处方来源：《中国膏药学》

5. 脐部挤推法

主治：痛经，月经不调，产后腹痛，心中烦闷，高血压

病，腹痛，腹胀，绕脐疼痛，腹泻，麻痹性肠梗阻。

方法：让患者仰卧，医者站其头部前方。医者以两拇指掌侧分置脐上两侧滑肉门穴处，其余4指分置腹部两侧，自上向下，同时自外向内将腹部肌肉挤推2—5分钟。两手挤推时，两侧用力应一样。挤推时主要是两拇指掌侧用力，而用力大小以皮肤微红为度。操作时患者有挤压及微胀感，治疗后有局部温热与腹部轻松的感觉。

6. 痛经散

主治：痛经。

处方：白芷、五灵脂、青盐各6克。上药共研末备用。

用法：每次取药末3克，填于脐中，上盖姜片，用艾炷灸之，以自觉脐腹内有温暖感为度，隔日1次。

处方来源：河南省开封市卫生局孙玉中的经验方。

经闭

1. 经闭饼

主治：经闭。

处方：白胡椒、黄丹、火硝各9克，共研细末，水调做成3个药饼备用。

用法：将脐部洗净，把药饼1个贴脐部，再用热水壶置药饼上熨之，连用2—3次。

处方来源：沈阳市祖国医学研究所编《防治当前几种多发病的土验单方简介》

2. 绿矾散

主治：经闭，小腹疼痛。

处方：绿矾15克。

用法：将绿矾炒热，待温贴脐。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

3. 通经山楂膏

主治：经闭。

处方：山楂（鲜品）10枚，赤芍3克，生姜15克，共捣烂如泥，放锅中炒热熨脐部。每次熨30分钟，每天一次，连用3—5次。

带下

1. 紫河膏

主治：腰冷腹痛，妇女赤白带下，经血不调，子宫寒冷，腰痠腿痛。

处方：紫河膏（中成药，药店有售）。

用法：将膏烤后贴脐上。

处方来源：《中国膏药学》

2. 姜椒膏

主治：痞块症瘕，妇人血寒，白带清冷，久不孕育，腰腹冷痛。

处方：姜椒膏（中成药，药店有售）。

用法：将膏药贴脐部，5—7天换药一次，连贴5—10贴。

处方来源：《全国中药成药处方集》

3. 元参膏（又名十香暖脐膏）

主治：白带、久泄、腹冷痛。

处方：元参膏（中成药，药店有售）。

用法：将膏药贴肚脐部，3日换药1次。

处方来源：《全国中药成药处方集》

4. 盐艾熨

主治：白带。

处方：盐100克，艾绒30克。

用法：两药同炒热，熨脐部，每次熨30分钟。

处方来源：《理渝骈文》

子宫脱垂

1. 蓖麻膏

主治：子宫脱垂。

处方：蓖麻仁30粒，捣烂敷肚脐部，外盖纱布。胶布固定。1天换药1次，连用3—7天。

处方来源：民间单验方。

2. 升陷膏

主治：子宫脱垂。

处方：蓖麻子30克，胡椒3克。

用法：上药共捣烂如膏敷脐部，外用纱布、胶布固定，1天换药1次，5天为1个疗程。

处方来源：笔者经验方。

难产

1. 难产仙方

主治：难产。

处方：蓖麻子仁70个。元寸1克。

用法：上药共捣如泥，用绢帛包之敷于脐部，再用布包扎紧，即时产下。如倒生者，让接生者把胎儿送进，片时即顺下。

处方来源：《串雅外编》

2. 如神丹

主治：难产。

处方：巴豆3粒(去壳)，蓖麻子仁30粒，元寸0.03克。

用法：上药合共捣碎做成一个药饼，将药饼贴脐上即产。胎儿产下即去药饼。

处方来源：《串雅外编》

3. 龟壳散

主治：难产，死胎不下。

处方：龟版60克，川芎30克，当归30克，头发灰15克，蝉蜕7个，蛇蜕1条(烧灰)。

用法：以上诸药共研为末，以葱汁、麻油各半调为糊状，外敷脐部，闭目静卧一时即生。

处方来源：《理瀹骈文》

4. 催产膏

主治：难产。

处方：蓖麻子100粒，雄黄、朱砂各4.5克，蛇蜕1尺长(烧存性)。

用法：上药共研末，饭和为丸，如弹子大。临产时先用川椒汤淋脐下，拭干，取1丸药填脐内，外用纱布包扎，头产出时即去药。

处方来源：《产鉴》

胎盘滞留

1. 黑豆熨

主治：胞衣不下。

处方：黑豆3斤，醋4斤。

用法：将上药放锅中煎数沸，布蘸煎汁熨脐腹，自下。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 下胞散

主治：产后胞衣不下。

处方：伏龙肝50克，甘草15克。

用法：先将伏龙肝研末，以醋调如糊状，敷于脐部。再将甘草煎汤服下，约10余分钟胎衣即下。若同时敷关元穴上，疗效更好。

处方来源：民间单验方。

3. 伏龙肝散

主治：产后胞衣不下。

处方：伏龙肝100克，研末。

用法：醋调伏龙肝末为糊状，敷脐部。

处方来源：《产宝》

死胎

1. 加味平胃散

主治：死胎不下。

处方：苍术6克，厚朴6克，陈皮4克，甘草4克，朴硝15克，桂心9克，元寸0.3克。

用法：以上诸药共研为末，水调敷脐部。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 立圣丹

主治：难产，死胎不下。

处方：寒水石120克（60克生用，60克煅赤，共研末）。朱砂15克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉1克，以水调为糊状，敷脐部。

处方来源：《理瀹骈文》

3. 下胎方

主治：妊娠热病致胎死腹中。

处方：巴豆3粒，蓖麻子30粒，麝香0.1克。

用法：上药共捣烂如膏，贴脐中。

处方来源：《产鉴》

先兆流产、习惯性流产

1. 艾炷隔盐灸

主治：习惯性流产。

方法：取精白细盐适量，纳入脐中，使与脐平，上置艾炷灸之。艾炷如枣核大，每次施灸5—10壮，隔日灸治1次，10次为1疗程。

处方来源：笔者常用的施治法。

2. 水火膏

主治：胎动不安。

处方：大黄、芒硝、板蓝根、浮萍、海蛤粉各3克。

用法：上药共研末，水调敷脐。

处方来源：《理渝骈文》

3. 白苧麻敷脐

主治：先兆流产，胎动漏红。

处方：白苧麻根内皮120克。

用法：将白苧麻根内皮捣烂敷脐部，胎安后即去药。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

不孕症

1. 温脐调经方

主治：经脉不调，久不受孕，痞积，白浊，遗精，妇人赤白带下。

处方：白檀、羚羊角各30克，零陵香、沉香、白芷、马

豆铃、木鳖子、甘松、升麻、血竭各15克，丁香21克，麝香3克。上药共研为末，分作3份，每次取1份药末用纱布包之，敷于脐部，并用艾炷灸之。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 温脐种子方

主治：妇女宫寒不孕，下元虚亏。

处方：五灵脂、白芷、青盐各6克，元寸0.3克，上药共研末，填脐部，再用艾炷灸之，灸至脐腹温暖为度，5日后再次灸1次。

处方来源：笔者经验方。

产后感冒

1. 天麻芎归散

主治：产后受风寒，产后中风感冒。

处方：川芎、当归、天麻、羌活、熟地各10克，上药共研末备用。

用法：每次取药末10克，醋调敷脐部，外用纱布、胶布固定，1天换药1次。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 养血宣肺散

主治：产后感冒。

处方：荆芥穗、薄荷叶、苏叶各10克，板蓝根、当归各15克。上药共研末，备用。

用法：每次取药末5克，填入脐中，外用纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

妊娠期小便不利及小便不通

1. 通尿膏

主治：妊娠期小便不通。

处方：冬葵子、滑石、梔子各3克。

用法：上药共研末，和田螺肉9克共捣烂如膏，或用生葱汁将药粉调膏，贴脐中立通。

处方来源：《产鉴》

2. 子淋膏

主治：妊娠期小便频数而短，尿多混浊或红赤，尿时艰涩不利，且有热痛，心烦口渴。

处方：滑石120克，研为细末备用。

用法：每次取滑石粉30克，水调为糊，敷于脐部，上盖纱布，胶布固定。干后再换。

处方来源：《穴位贴药疗法》

产后腹痛

1. 艾叶散

主治：产后腹痛欲死，因感寒而发者。

处方：陈蕲艾二斤，焙干，研末铺脐上，以纱布覆盖，再用热水袋热熨，待口中艾气出，则痛自止。

处方来源：《中药大辞典》

2. 失笑散

主治：产后小腹痛。

处方：生蒲黄10克，五灵脂10克。上药共研粗末，洒酒少许于药上，放锅上炒之令热，装布袋内，趁热熨脐部，每次熨20分钟，每天熨1—2次。

处方来源：笔者经验方。

产后尿潴留

1. 隔盐葱灸法

主治：产后尿潴留。

方法：先将炒热的食盐填入脐内，上置葱饼（葱白捣成泥状，压成约0.3厘米厚），然后将艾炷压在葱饼上，点燃艾炷，待皮肤有灼痛感时再换1个艾炷。待有热气入腹难忍即有尿意。小便自解后，可隔日再灸1—2个艾炷以巩固疗效。

疗效：用上法治疗17例产后尿潴留，结果：灸1艾炷自解小便者10例，2—4艾炷者6例，2天灸7艾炷者1例，总有效率100%。

处方来源：《中西医结合杂志》，1985年第11期。

2. 葱白熨

主治：产后尿潴留和妊娠合并尿潴留。

处方：葱白250克。

用法：将葱白切碎炒热，用纱布包好，在脐部热熨至患者自觉有热气入腹内即可。药凉则可重炒热再熨之。

疗效：用上方治疗10例，均治愈。一般热敷2—3次即通。

处方来源：广西《玉林医药》，1978年第1期。

三、儿科疾病

婴幼儿腹泻

1. 肉蔻散

主治：婴幼儿腹泻。

处方：肉蔻、车前子、诃子、木香各等份。上药共研细

末备用。

用法：每次取药粉适量（6个月以下婴儿每次用2克，6—12个月每次用2.5克。1岁以上每次用3—5克），先用生姜汁调为糊状，铺在5×5厘米的胶布上，贴在脐部。每次贴4小时，每日贴2次，间隔2小时即可。

注意事项：（1）暂禁食2—4小时，但可喂服糖盐水，腹部不能受凉。

（2）如遇皮肤对胶布过敏者，可用绷带等物代替。

疗效：用上方治疗婴幼儿腹泻60多例，一般1—2次即愈。有效率达87%以上。

处方来源：《中原医刊》，1986年第4期。

2. 二香散

主治：婴幼儿泄泻。

处方：丁香、木香各8克，肉桂5克。上药共研细末，装入纱布袋内备用。

用法：将药袋敷在脐部，每天换药1次，一般1—3次即可见效。

疗效：用上方治疗66例，痊愈56例，显效6例，好转4例。

处方来源：《中医杂志》，1985年第6期。

3. 针刺神阙穴下缘疗法

主治：小儿泄泻。

处方：令患儿平卧位，腰部须垫着实。针刺神阙穴下缘，进针6—8分，平补平泄，捻转5—7次后出针。发热者可加刺曲池；呕吐者可加刺内关穴；腹胀者可加刺足三里，均取双侧穴，用泻法，不留针。

疗效：用上方治疗小儿泄泻210例，针刺2次后泻止者

198例，无效12例。

处方来源：《浙江中医杂志》，1985年第4期。

4. 温中止泄散

主治：小儿腹泻。

处方：白胡椒2份，肉桂1份，丁香1份。上药共研细末，装瓶备用。

用法：每次取1—2克药粉调敷脐部，外用胶布固定。每日换药1次，治愈为止。

疗效：用上方治疗小儿腹泻150例，95%的患儿均在用药1—2次后痊愈。

处方来源：《广西卫生》，1973年第2期。

5. 止泄膏

主治：小儿单纯性腹泻。黄绿色水样便。

处方：白胡椒10粒，干姜10克，生姜10克，小茴香12克，肉桂3克，葱白3棵。

用法：先将前5味药共研为粗末，然后和葱白共捣烂，再加酒精适量将诸药拌湿润，共放锅内炒热，装布袋内热敷于脐部，每日热敷2次，每次热敷15—20分钟。1剂药可用1天，用时再炒热。

处方来源：此方系笔者家传方，家母（张淑清）经常用此方为乡亲儿童治疗腹泻，疗效颇佳，深受乡邻赞誉。

6. 大蒜熨脐法

主治：小儿腹泻。

处方：大蒜1—2片。

用法：将大蒜放热灰中煨熟，去皮捣烂如泥状，温敷脐部，外用胶布固定。

疗效：用上方治疗10例，均1—2次治愈。

处方来源：《中华医学杂志》，1976年第12期。

7. 石榴皮糊

主治：小儿腹泻，中毒性消化不良。

处方：鲜石榴果皮30克。

用法：将鲜石榴果皮捣为糊状，敷于脐部，外用胶布封贴，每24小时换药1次。

疗效：用上方治疗24例，1次治愈12例，2次治愈5例，3次治愈4例，好转3例。

处方来源：《河南中医学院学报》，1977年第4期。

8. 小儿腹泄饼

主治：小儿腹泻，水样便，每日大便3—7次，对慢性腹泻尤佳。

处方：五倍子（炒黄）10克，干姜10克，吴茱萸5克，公丁香5克。

用法：上药共研末备用。每次取药末10克，用白酒调成软面团状，做成直径5厘米的药饼，敷脐部，固定。每天换药1次，连用1—8次。一般2—5次即愈。

处方来源：《铁道医学》，1980年第3期。

9. 华佗治小儿泄泻神方

主治：小儿泄泻。

处方：木鳖子一枚（煨熟去壳），丁香3粒。

用法：上药共研末，米糊为丸，填入小儿脐中，外贴寻常膏药即可。

处方来源：《华佗神医秘传》

10. 白胡椒散

主治：小儿腹泻。

处方：白胡椒适量。

用法：每次用白胡椒1—2粒研成细末，填脐中，用胶布贴敷，每24小时换药1次，连用2—3次。

疗效：经用上方治疗小儿腹泻209例，治疗1—2天后病愈者139例，大便次数明显减少者31例，无效39例，总有效率为81%。

处方来源：《河北中医》，1985年第4期。

11. 吴茱萸胡椒膏

主治：小儿因受寒而致腹泻。

处方：吴茱萸30克，白胡椒30个，丁香6克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉1.5克，加适量凡士林调膏，敷脐部固定，2日换药1次，一般2—3次即愈。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

12. 蓍草熨剂

主治：小儿腹泻，亦治成人腹泻。

处方：鲜蓍草100克。

用法：将蓍草捣烂如泥，炒热敷脐部，冷则重炒复熨之，每天1次，每次熨20分钟。

处方来源：河南省开封市韩良经验方。

13. 止泄贴脐剂

主治：婴幼儿消化不良性腹泻，单纯性腹泻，中毒性消化不良腹泻。以上各类型的大便均为稀水样，并伴有乳块及未消化的食物。

处方：苍术15克，吴茱萸15克，丁香3克，胡椒15个。上药均焙干，共研细末备用。

用法：每次取药粉1—3克，用食油调为糊状，敷于脐部，以胶布外贴固定。每天换药1次，有脱水者禁食12小时，

服糖苏打盐水。一般均治疗1—2次即愈。

处方来源：《新医学杂志》，1975年第6期。

14. 伤湿止痛膏贴脐法

主治：小儿单纯性消化不良。症见每日腹泻数次至10余次，大便呈糊状或水样，常伴有溢乳或轻度呕吐。

方法：伤湿止痛膏（成药，药店有售），剪成4厘米×4厘米，贴脐，半天换1次，泻止后再贴两天。

处方来源：笔者经验方。

15. 慈母保婴散

主治：婴幼儿脾虚久泻，慢性肠炎。

处方：干姜3克，白胡椒10粒，五倍子2克。

用法：上药共研细末，用温开水调为糊状，填敷脐部，再用纱布、胶布固定，每天换药1次。

处方来源：笔者在5岁时，曾患慢性腹泻，多方治疗无效，迁延年余，经用此方3次，拖延年余之痼疾如失。后来，用此方治愈数十个小儿腹泻，笔者在行医期间，亦常用此方，并定名为慈母保婴散。

16. 健脾止泄散

主治：小儿脾虚泄泻。

处方：肉桂、苍术各等量，共研末备用。

用法：每次取药末2克，用唾液调和封贴脐部，24小时换药1次。并可同时配合艾条温灸足三里穴，每日1次，每次20分钟。

处方来源：《上海中医药杂志》，1982年第6期。

17. 消食止泄散

主治：小儿伤食泄泻。

处方：朴硝、苍术粉各适量。

用法：先用朴硝（一般60—120克）罨于腹部，绷带包扎，6—12小时后取下。再取苍术粉2克，用唾液调和填脐，外盖以胶布，1—2日换药1次，一般2—3次即愈。

处方来源：《上海中医药杂志》，1982年第6期。

小儿消化不良

1. 消食散

主治：小儿消化不良。

处方：槟榔9克，良姜3克。

用法：上药共研末，敷于脐部，外用纱布、胶布固定。

处方来源：笔者经验方。

2. 小儿脐周团摩法

主治：小儿消化不良，食欲不振，吐乳，腹痛，腹胀，肠鸣，泄泻。

方法：先让患儿仰卧，医者以掌心置神阙穴上，以脐为中心，先作顺时针方向旋转5—10分钟，再作逆时针方向旋转团摩5—10分钟。团摩手法宜轻揉，频率宜慢。向每一方向旋转团摩均应以腹部微汗为度。治疗后，腹部均有温热及舒适的感觉。

3. 朴硝陈皮散

主治：小儿消化不良，食欲不振，腹胀满，腹泻。

处方：朴硝6克，陈皮3克。

用法：上药共研细末，水调为稠糊，外用纱布、胶布固定，每日换药1次，连用3次为1疗程。

处方来源：笔者临床经验方。

· 小儿缺钙症

1. 日光灸

主治：小儿缺钙症，虚寒腹痛泄泻。

方法：将艾绒15克敷于脐部，脐部暴露，在日光下曝晒，每次10—20分钟。

处方来源：民间单验方。

2. 鸡蛋壳敷脐法

主治：小儿缺钙症，慢性腹泄。

处方：鸡蛋壳、苍术各10克，共研末备用。

用法：每次取药末1克，温水调为糊状，填脐中，在红外线灯下照射20分钟。

处方来源：笔者临床常用方。

小儿哮喘

1. 定喘丹

主治：小儿哮喘，成人哮喘亦可治疗。

处方：热参总生物碱。

用法：每次取热参总生物碱0.05—0.1克，研末填脐内，外贴胶布固定，每次换药1次，连用10次为1疗程。

处方来源：《浙江中医杂志》，1982年第3期。

2. 平喘散

主治：小儿哮喘症。

处方：白胡椒10克，白矾3克，麻黄素20片，克咳敏15片。上药共研末备用。

用法：每次取1克药粉，水调敷脐部，外贴胶布固定，每天换药1次，连用10次为1个疗程。

处方来源：笔者经验方。

小儿腹胀

1.消胀散

主治：小儿腹胀肠鸣。

处方：野菊花30克，食盐、米饭各少许。

用法：上药共捣碎，和菜油少许，绍兴酒50克共炒，炒后趁热敷脐部(勿过热，以免烫伤)，再用甘遂末3克，麝香末0.3克，分5次撒在脐上。

处方来源：福建省中医研究所编《中医验方》第三集。

2.火硝膏

主治：小儿腹胀。

处方：火硝3克。

用法：将火硝撒在普通膏药上，贴在脐部。或用布袋装火硝30克，敷脐部，热水袋热熨之，每天1次，每次10小时。

处方来源：民间单验方。

3.冰片敷脐法

主治：小儿重症感染并发腹胀。

处方：冰片0.2—0.5克，研末。

用法：填脐内，外贴胶布固定。再用松节油热敷。每天换药一次。

疗效：用上方治疗重症肺炎合并心衰、肠炎、重度失水、先天性心脏病、病毒性脑炎合并脑水肿等病引起的腹胀9例，均在6—12小时内缓解，一般1—2次即可。

处方来源：《湖南医药杂志》，1983年第2期。

4.驱胀散

主治：新生儿腹胀。

处方：麝香0.15克，芒硝黄豆大。

用法：将上药混合置于患儿脐内，外用1平方寸大小的棉垫3—4块，重叠敷盖在药上(即脐上)，绷带包扎，10小时后去药。一般1—2次即愈。

处方来源：《新中医》，1982年第2期。

5. 顺气消胀散

主治：新生儿腹胀。

处方：玄明粉15克，小茴香3克。

用法：将上药共研末，装布袋内，敷脐上，12小时后去药，如不愈，重复敷药。

疗效：用上方治疗60余例，效果显著，一般用药1—2次即愈。

处方来源：《新中医》，1983年第6期。

小儿口疮

1. 细辛散

主治：小儿口疮。

处方：细辛适量，研末备用。

用法：每次取1克细辛末，醋调敷脐，每天换药1次。

处方来源：《本草纲目》

2. 黄柏细辛散

主治：小儿口疮。

处方：黄柏、生石膏、细辛各2克。上药共研末，备用。

用法：药粉用水调糊，敷脐部，纱布包扎。每日换药一次，连用3—7次为1疗程。

处方来源：开封市二建公司卢春荣的经验方。

小儿水肿

1. 消肿散

主治：小儿水肿。

处方：金樱子根30克。

用法：将金樱子根捣烂，用香油调糊，敷脐部，外用纱布、胶布固定，1日换药1次，连用3—5天。

处方来源：民间单验方。

2. 地龙膏

主治：小儿水肿。

处方：地龙、猪苓、针砂各30克。

用法：上药共研末，捣葱汁和药为膏，敷脐，外用纱布包扎。每天换药1次。

处方来源：《严氏济生方》

小儿疝气

1. 治疝散

主治：小儿疝气(3个月—1岁婴幼儿)。

处方：白胡椒3克。研末备用。

用法：将上药分为两份，分贴于肚脐部及两足心，上盖棉花，以胶布固定。每半月换贴1次。

疗效：用上方治疗50例，均有效。一般治疗3—4次，即可痊愈。

处方来源：《中医医论医方医案选》

2. 脐疝方

主治：小儿脐疝。

处方：猪牙皂2克，雄黄1.5克，细辛1.5克，地龙1条，吴茱萸1.5克，乳香1.5克，没药1.5克，冰片1.5克。上药共

研末备用。

用法：每次取药粉 3 克，用开水调成糊状，外敷于脐部处，再以铜钱 1 枚，压盖于药上，最后用绷带固定，每日换药 1 次，5 日为 1 个疗程。如未愈，可再治疗 1 个疗程。

疗效：用上方治疗 13 例，治愈 11 例，1 例好转，1 例效果不详。

处方来源：《广西中医药》，1985 年第 6 期。

3. 安脐糊

主治：脐疝。

处方：赤小豆、豆豉、天南星(去皮脐)，白蔹各 3 克。
上药共研末，为 1 次用量。

用法：用芭蕉树汁（或温开水）调药粉为糊，敷于脐四周，以纱布包扎，日换 2 次。

疗效：一般用药 2—3 剂即愈。

处方来源：《陕西中医》，1981 年第 6 期。

4. 艾绒敷剂

主治：脐疝。

处方：艾绒适量。

用法：用艾绒包裹五分硬币 1 个，外包纱布，压在脐部固定，7 天换药 1 次，直至痊愈为止。

疗效：用上法治疗脐疝 8 例，疗效良好。

处方来源：《新医学杂志》，1977 年第 12 期。

5. 艾绒贴

主治：脐疝。

处方：艾绒、食醋各适量。

用法：将艾绒置食醋内浸泡。将突出的脐疝复位后，把醋艾绒置脐内，以填满为度，将硬纸垫压盖在脐孔上，再用

胶布加以固定。

疗效：用上方治疗10例脐疝，均获痊愈。

处方来源：《辽宁中医杂志》，1982年第6期。

婴儿脐中流水

1. 车前子散

主治：婴儿脐中流水、脐湿症。

处方：车前子5克，炒焦研末。

用法：撒脐中，外用纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：开封市中医院韩春海经验方。

2. 五倍子散

主治：婴儿脐中流水症。

处方：五倍子3克，炒深黄色后研末。

用法：换药末撒脐中，外用纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：《韩明本医案》

小儿吐泻

1. 保安丹

主治：小儿吐泻。

处方：白术(炒)、苍术(土炒)、茯苓各15克，陈皮、吴茱萸各10克，丁香、泽泻各3克，白胡椒2克，草果5克。上药共研细末，贮瓶备用。

用法：每次取药末2—5克直接放入或用水调糊敷于脐中，外用胶布固定。24小时将药取下，每天敷药1次。敷药后需保持温暖，可用暖水袋热熨，或上盖棉垫。

疗效：用上方治疗13例，治愈12例，平均用药时间3天。

处方来源：《广西中医药》，1983年第5期。

2. 藿香正气散

主治：小儿吐泻。

处方：藿香、制半夏、苏叶、厚朴各10克，樟脑、冰片各2克。上药共研末备用。

用法：每次取药末1—2克，填脐中，外用胶布包扎，每天换药1次。

处方来源：笔者家传方。

小儿积滞

1. 消食散

主治：小儿积滞，食积腹胀。

处方：山楂、玄明粉各10克，肉桂、厚朴各6克，鸡内金9克，莱菔子10克。上药共研末，瓶装备用。

用法：每次取药粉3克，用温开水调为糊状，敷于脐部，外用纱布、胶布固定。每天换药1次。外敷1—2天即可获效，3—5天即可痊愈。

处方来源：笔者经验方。

2. 消积散

主治：小儿积滞。

处方：玄明粉3克，胡椒粉0.5克。

用法：上药混匀，放入脐中，上敷消毒纱布，外用胶布固定，每天换药1次。

疗效：用上方治疗100例，一般3—5天即愈。

处方来源：《辽宁中医杂志》，1983年第12期。

小儿积聚、腹中痞块

1. 芫莢膏

主治：小儿积聚，腹中痞块，胸胁胀满。

处方：茺莢膏(中成药，药店有售)。

用法：将膏药贴脐部，3天换药1次。

禁忌：忌食生冷油腻等物。

处方来源：《全国中药成药处方集》

2. 全归膏

主治：小儿积聚，腹中痞块。

处方：全归膏(中成药，药店有售)。

用法：每次取膏药1帖，贴敷脐部。

处方来源：《全国中药成药处方集》。

3. 千金膏

主治：小儿积聚，腹中痞块。

处方：千金膏(中成药，中药店有售)。

用法：贴脐上，3日换药1次。

处方来源：《中国膏药学》

小儿夜啼症

1. 镇惊丹

主治：小儿夜啼症。

处方：朱砂0.5克，五倍子1.5克，陈细茶1克。

用法：前2味研末，陈细茶嚼烂，混合后加水少许捏成小饼状敷于脐中，外用纱布、胶布固定。每晚换药1次。

疗效：用上方治疗12例，治疗3—6次均愈。

处方来源：《四川中医》，1984年第6期。

2. 牵牛子散

主治：小儿夜啼症。症见小儿夜间烦躁哭闹，天明即止，饮食、嬉玩如常。

处方：牵牛子 7 粒。

用法：上药研末，水调为糊，临睡前敷于肚脐上，用胶布固定。

处方来源：《中医杂志》，1983年第 4 期。

3. 朱砂定啼法

主治：小儿夜啼。

处方：朱砂 1 克。

用法：将朱砂研末，水调为糊，敷脐部，外贴胶布固定。

处方来源：《理渝骈文》

4. 镇静丹

主治：小儿夜啼。

处方：丁香 3 粒，勾藤 3 克，蝉蜕 2 克。

用法：上药共研末，水调为糊，敷脐部，纱布包扎固定。

处方来源：笔者经验方。

小儿肾炎水肿

1. 敷脐消肿法

主治：小儿肾炎水肿。在用此方的同时，需配合服用治肾炎的药物。

处方：野生大麦冬（百合科）的鲜块根 50 克。捣烂如泥，敷脐部，每天换药 1 次。

处方来源：民间单验方。

2. 马蹄金敷剂

主治：小儿肾炎水肿，急、慢性肾炎均可用之，但需配合其他药物治疗，不能单纯依靠此方，以免贻误时机。

处方：马蹄金、地胆草各30克。

用法：共捣烂如泥，敷脐部。

处方来源：《内病外治》

小儿二便不通

1.通便熨剂

主治：小儿大小便不通。

处方：葱白2根，酒糟一撮。

用法：上药共捣烂炒热，敷脐部，外用纱布包扎。

处方来源：民间单验方。

2.通便饼

主治：小儿大小便不通。

处方：葱二棵，生姜6克，豆豉、食盐各9克。

用法：以上诸药同捣烂，做成药饼，将药饼烤热敷脐部，用布扎紧，约1—2小时后见效。

处方来源：笔者经验方。

遗尿

1.葱白硫黄散

主治：遗尿症。

处方：2寸带须葱白3支，硫黄30克。

用法：上药共捣烂如泥，睡前将药泥敷于脐部，外用纱布包扎，8—10小时后去药。

疗效：用上方治疗7例，多在治疗2—3次后获效。经随访未复发。

处方来源：《中医杂志》，1982年第12期。

2.缩泉膏

主治：遗尿症。

处方：炮附子 6 克，补骨脂 12 克，生姜 30 克。

用法：前 2 味药共研末，生姜捣烂为泥，和药粉调为膏，敷脐部，外用纱布、胶布固定，5 天换药 1 次。

疗效：用上方治疗遗尿症 25 例，经换药 2—6 次，痊愈 20 例，显效 3 例，无效 2 例。

处方来源：《江苏中医杂志》，1984 年第 2 期。

3. 遗尿糊

主治：遗尿症。

处方：白术、白芍、白矾、硫黄、甘草各等份。上药共研细末，备用。

用法：每次取药粉 10 克，葱汁（或用水）调糊，敷于脐部，3 日换药 1 次。

处方来源：《河南省秘验单方集锦》

4. 遗尿方 1 号

主治：遗尿症。

处方：覆盆子、金樱子、菟丝子、五味子、仙茅、山芋肉、补骨脂、桑螵蛸各 60 克，丁香、肉桂各 30 克。上药共研末，装瓶备用。

用法：每次取药粉 1 克，填脐内，滴 1 至 2 滴酒精后，再贴上暖脐膏（中药店有售）。每 3 天换药 1 次。

疗效：用上方治疗 11 例，均治愈。一般经治疗 2—4 次亦可痊愈。

处方来源：《中医杂志》，1984 年第 4 期。

5. 龙骨散

主治：遗尿。

处方：龙骨 15 克，经火煅后研末备用。

用法：用醋将龙骨粉调为糊状，敷脐眼，外用布包住，每天换药1次，连用5—7次。

处方来源：《理渝骈文》

小儿痢疾

1. 治泻痢散

主治：小儿泻痢及成人水泻白痢，受寒腹痛。

处方：母丁香4粒，木鳖子1个，麝香0.3克，肉桂3克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉1克，水调为丸，纳脐中，外用寻常膏药贴之，其症重者可用热茶壶熨之。

处方来源：《串雅内编》

2. 白头翁散

主治：小儿痢疾。

处方：白头翁15克，黄连10克，白胡椒6克。上药共研细末备用。

用法：每次取药粉2克，水调为糊，填脐中，外用纱布固定，每日换药1次。

处方来源：笔者经验方。

小儿疳积

1. 消积散

主治：小儿疳积。

处方：山楂、栀子、大枣(去核)各7粒，葱头9个，芒硝30克。

用法：上药共研末，加面粉30克，白酒适量调和做成两个药饼，冷敷于脐部与脐对侧(背部正中)，用纱布包扎，每隔2—

3小时将药饼取下，加白酒适量再敷，每日数次，共敷3天3夜。

疗效：用上方治疗小儿疳积数十例，均获良效。

处方来源：《湖南医药杂志》，1980年第4期。

2. 皮硝敷剂

主治：疳积。

处方：皮硝30—60克。

用法：将皮硝放布袋内，敷脐上，每日换药1次。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

3. 二仁膏

主治：疳积。

处方：桃仁、杏仁、大黄、山栀各6克，芒硝9克，蛋清、葱白汁、醋、白酒各少许。

用法：前5味药共研末，与蛋清、葱、醋、酒共调匀，敷于脐部，每日换药1次，一般治疗3次即愈。

处方来源：《广西中医药》，1983年第3期。

4. 艾椒糊

主治：疳积，对虚寒型疳积尤为适宜。

处方：艾叶、胡椒各1克，共研末备用。

用法：药粉用黄酒调糊，敷于脐部，隔日换药1次，连用3—5次为1疗程。

处方来源：《新编中医学概要》

小儿急性支气管炎

1. 一捻金

主治：小儿急性支气管炎（症见胸满喘急，痰涎壅塞）、肺炎等病。

处方：白丑、黑丑各等份，半生半炒，各取头末15克，

大黄30克，槟榔7克，木香4克，轻粉0.03克。

用法：上药共研末，蜜调做成一个药饼，贴脐部，以微见腹泻为度。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 马脾风散

主治：寒邪入肺，郁而化热，痰喘上气，急性支气管炎。

处方：朱砂7.5克，甘遂4.5克，轻粉1.5克。

用法：上药共研末备用。每次取0.03克药粉，蜜调为糊，敷脐上。

处方来源：《理瀹骈文》

小儿马牙

1. 芙蓉饼

主治：小儿马牙，重舌等症。

处方：鸡蛋1个煮熟，取芙蓉叶150克捣烂，包住鸡蛋，再煎为饼，贴脐部。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 黄芩散

主治：小儿马牙，哭闹不愿吮乳。

处方：黄芩10克，研末备用。

用法：每次取黄芩末0.5克，用鸡蛋清调为稀糊状，涂脐中，外贴胶布固定，每12个小时换药1次。

处方来源：笔者经验方。

小儿惊风

1. 急惊糊

主治：小儿急惊风，症见高热昏迷，两目上视，牙关紧闭，抽搐等。

处方：梔子7克，明雄黄1.5克，冰片0.3克，鸡蛋清1个，麝香0.1克。

用法：上药共研末，用鸡蛋清调为糊状，敷于脐部，外用纱布，胶布固定。每天换药1次。

处方来源：笔者临床常用方。

2. 急慢惊风膏

主治：急、慢惊风。

处方：桃仁、郁李仁各14粒，黄梔子6克。上药共研末，用鸡蛋清调为糊状，敷脐部，每天换药1次。连贴3次为1个疗程。

处方来源：民间单验方。

3. 慢惊膏

主治：小儿大病或吐泻后，四肢厥逆，抽搐昏迷，两目上视，甚者角弓反张。

处方：胡椒7粒，生梔子7粒，肉桂3克，葱白7枚，白颈蚯蚓一条（无此药也可以）。

用法：先将前3味药研末，再加入蚯蚓和适量的鸡蛋清，捣烂为膏，贴于脐部。外以纱布敷料固定。

处方来源：《穴位贴药疗法》

4. 解痉丹

主治：小儿慢惊风。

处方：全虫5个，蜈蚣1条，蝉蜕头7个。

用法：上药共研末放脐内，外盖刚煮熟的鸡蛋1个。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

小儿虚脱

1. 吴茱萸饼

主治：小儿虚脱。

处方：吴茱萸1.5克，研细末。

用法：吴茱萸末用酒调和作饼，敷脐上。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 葱白附子回阳丹

主治：小儿虚脱。

处方：制附子10克（研末），葱白50克。

用法：上药共合捣烂敷脐部，上面用暖水袋热敷之。

处方来源：笔者经验方。

小儿流涎

1. 梔子膏

主治：小儿流涎症。

处方：梔子2克，炒焦研末。

用法：将梔子末用水调为糊，敷脐部，外用纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：《俞穴敷药疗法》

2. 止涎散

主治：小儿流涎症。

处方：胆南星10克，吴茱萸20克。上药共研末。备用。

用法：每次取药粉1克，蜜调为膏敷脐部，外用纱布包扎。每天换药1次，连用5次为1个疗程。

处方来源：开封市五中韩斌经验方。

四、外科和皮肤科疾病

疮疖痈疽

1. 砒霜固脐法

主治：疮口日久不敛。

处方：乌鸡骨30克，砒霜3克，共研末备用。

用法：将药粉填脐内，外用盐泥封固。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 五神膏

主治：内脏生痈。

处方：杏仁30克，元参15克，蛇蛻、蜂房、乱发各7.5克，麻油80毫升，黄丹20克，熬成药膏备用。

用法：将药膏贴脐部，以泻为度。

处方来源：《理瀹骈文》

脱肛

1. 三叶敷剂

主治：脱肛。

处方：柑树叶、桃树叶、薄荷各30克。

用法：将以上3种药的嫩叶合捣烂如泥，用布包后敷肚脐眼。

处方来源：《广西民族药简编》

2. 蓖麻子膏

主治：脱肛。

处方：蓖麻子仁60克。

用法：将蓖麻仁捣烂如泥，分为两份，一份敷脐部，一份敷头部百会穴处。两天换药1次，连用3次。

处方来源：河南省开封市齐光仁经验方。

破伤风

1. 解痉丸

主治：破伤风入里发搐，目直上视，二便不通者。

处方：野鸽粪(炒)、江鱼鳔(烧存性)、白僵蚕各15克，雄黄3克，蜈蚣2条，天麻6克。

用法：上药共研为末，再用防风10克煎水调药粉为丸，纳入脐中，外用胶布固定。两日换药1次。

处方来源：《理瀹骈文》

2. 脐风糊

主治：小儿脐风。小儿出生后，有脐风先兆症状时，可作防治之用。

处方：枯矾8克，硼砂8克，朱砂2克，冰片0.2克，元寸0.2克。上药共研末备用。

用法：每次取药末2克，填于脐内，外以纱布、胶布固定，每天换药1次。

处方来源：《穴位贴药疗法》

附注：“脐风”即新生儿破伤风。主要由于断脐时受到感染所致。病发必有先兆，多在4—7天内发病，表现为精神躁扰，啼哭，不时喷嚏，吮乳口松等，见此先兆症状，方可用此药敷脐。

3. 僵蚕散

主治：小儿脐风。

处方：僵蚕10克，研末。

用法：僵蚕末用蜜调糊，敷脐部。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

脐湿、脐炎

1. 赤石脂散

主治：脐湿、脐肿、脐疮。

处方：赤石脂、枯矾各5克，共研末备用。

用法：先用双氧水洗净脐部，每次用药粉1克左右撒脐中，外用纱布包扎。每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

2. 马齿苋散

主治：婴儿脐疮，脐湿、脐肿，脐炎。

处方：马齿苋200克，晒干，烧存性研末备用。

用法：洗净脐部，将药末1克撒脐中，每天1次。

处方来源：《常见病验方研究参考资料》

3. 白药敷脐法

主治：脐炎、脐肿痛。

处方：云南白药1克（中成药，中药店有售）。

用法：先用生理盐水清洗脐部，然后在患处撒上云南白药，外用纱布包扎，隔日换药1次。

疗效：用上方治疗10例脐炎，均取得良好的效果。

处方来源：《中医杂志》，1983年第4期。

4. 金黄散

主治：脐疮。脐部红、肿、热、疼，甚至糜烂，脓水流溢。

处方：黄连、银花、煅龙骨各10克。上药共研末，备用。

用法：脐部常规消毒后，撒适量金黄散，纱布包扎，每天换药一次。

处方来源：笔者经验方。

乳腺炎

1. 消炎膏

主治：急性乳腺炎。

处方：白菊花15克，蒲公英60克。

用法：上药合捣烂，用温开水调匀，装纱布包中，敷于脐部，外用纱布、胶布固定，1天换药1次。

处方来源：《中医简易外治法》

2. 清热消炎散

主治：急性乳腺炎。

处方：麦迪霉素1片，苯海拉明1片，三黄片1片。

用法：上药共研末，水调为糊，敷脐部，外用纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：开封市第三人民医院张春生经验方。

荨麻疹

神阙穴拔火罐法

主治：荨麻疹。

处方：在脐部（神阙穴）拔火罐。其方法：令患者仰卧，将酒精棉球点燃，迅速投入罐内，随即取出，趁势将火罐扣在脐上，待3—5分钟后，将火罐取下，连续拔2—3次。每天治疗1次，3次为1个疗程。

疗效：用上方治疗各种原因引起的荨麻疹105例，治疗1个疗程后，治愈101例。

处方来源：《中国针灸》，1983年第2期。

皮肤瘙痒症

1. 祛瘀散

主治：皮肤瘙痒症，痒疹，荨麻疹。

处方：红花、桃仁、杏仁、生栀子各15克，冰片5克。
上药共研末，瓶装备用。

用法：每次取药粉1克，用凡士林（或蜂蜜）调成糊状，敷脐上，再用敷料固定，每日换药1次。敷2—10次为一个疗程。

疗效：用上方治疗荨麻疹38例，治愈37例，好转1例；全身皮肤瘙痒症21例，局限性皮肤瘙痒症5例，均治愈；痒疹26例，治愈24例，好转2例。

处方来源：《广西中医药》，1984年第4期。

2. 止痒散

主治：皮肤瘙痒症。

处方：地肤子、红花、僵蚕、蝉衣各9克，共研末备用。

用法：每次取药粉1—2克，水调为糊，敷于脐部，外用纱布包扎。

处方来源：笔者经验方。

面部黄褐斑

去斑膏

主治：面部黄褐斑。

处方：（1）山楂、葛根各100克，甘草30克，白芍150克，共水煎2次，合并煎液浓缩成膏。（2）鸡矢藤、穿山甲、厚朴各100克，桂枝30克，共研细粉；（3）乳香、没药各100克，冰片15克，共溶于95%乙醇200毫升中，除去不溶物，再烘干为末。以上三者混合，瓶中密贮备用。

用法：每次取药粉200毫克填脐内，外用胶布贴固，3—7天换药1次。

疗效：用上方治疗黄褐斑3例，均治愈。

处方来源：《辽宁中医杂志》，1984年1期。

五、五官科疾病

口腔炎、口疮

1. 细辛散

主治：口腔炎，口腔溃疡。

处方：细辛6克。上药研末，分为5份备用。

用法：每次取药末1份，用米醋调为糊状，外敷脐部，再用胶布封固。

疗效：用上方治疗口腔炎15例，全部治愈。

处方来源：《新中医》，1974年第1期。

2. 赴筵散

主治：口腔炎、口疮。

处方：黄连、干姜、黄柏、黄芩、栀子、细辛各3克。

用法：上药共研末，用水调糊敷脐，外用布包之。

处方来源：《理瀹骈文》

3. 赴筵散2号

主治：口舌糜烂，口疮。

处方：黄连、细辛各2克。

用法：上药共研末，水调为糊敷脐，每天换药1次。

处方来源：《理瀹骈文》

4. 细辛吴萸散

主治：口疮，对小儿口疮尤为适宜。

处方：细辛4.5克，吴茱萸6克。

用法：上药共研末，分为5份，每次取1份，米醋调糊敷脐部，外用纱布包扎，每天换药1次，连用4—5天为1疗程。

处方来源：《上海常用中草药》

牙痛

1. 生石膏散

主治：胃火牙痛，牙龈肿痛，口腔炎。

处方：生石膏15克，细辛3克，丹皮4克，黄连5克，升麻3克，大黄3克，生地6克。上药共研末备用。

用法：每次取药粉6克，水调为糊，敷于脐部，每天换药1次。

处方来源：笔者经验方。

2. 牙痛散

主治：风火牙痛。

处方：细辛6克，荜茇3克，生石膏9克，大黄6克。上药共研末备用。

用法：将上药用水调糊，敷脐部，纱布包扎，每天换药1次。

处方来源：开封市第三人民医院张跃祖经验方。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTAyMjUyNzEuemlw",
  "filename_decoded": "10225271.zip",
  "filesize": 6017966,
  "md5": "ee39a670150b810da013e96a500fa71a",
  "header_md5": "46650453b2b43007e31de42110d1fd62",
  "sha1": "d1754c0ca53d5d67c40a2508fe455d64bc959cc4",
  "sha256": "a506471e95b70bea685a415d689ba57cc98422ea8b55cb8c692ae9871f8d385f",
  "crc32": 2052593454,
  "zip_password": "wcpfxk&^TDwcpfxk",
  "uncompressed_size": 6079588,
  "pdg_dir_name": "",
  "pdg_main_pages_found": 126,
  "pdg_main_pages_max": 126,
  "total_pages": 135,
  "total_pixels": 526309968,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```