

14

彩
辨
舌
指南
圖

古越王
署檢



武

14

中医研院 241 平

灰布腰

辨舌指南

14-1

主

四明曹炳章著

彩圖
辨舌指南

王一寒題



0048287

53023

彩 图
辨 舌 指 南

曹炳章著

*

江苏省书刊出版营业许可证出〇〇一号

江 苏 人 民 出 版 社 出 版
南 京 湖 南 路 十 三 号

江苏省新华书店发行 江苏新华印刷厂印刷

*

开本 850×1168 耗1/32 印张 13 插 19

一九六二年十二月第一版

一九六二年十二月南京第一次印刷

印数 1—5,200 (内精装 1,200)

出版者的話

本書作者曹炳章先生，名赤電。浙江鄞縣曹妙乡人。生于公元一八七七年；卒于一九五五年。先生學就醫道，開業于紹興。由于先生悉心鉅研，醫術精湛，對於祖國醫學頗多貢獻。其編撰選校出版的中医書籍，共有十種，本書是其中的一部重要著作。

本書作者在編寫過程中，曾參考百余種有關驗舌方面的文獻，經過十年的廣搜博采，積累資料，復行刪繁就簡，去蕪存精，五易其稿而成本書。全書共分五編。首編為辨舌總論，論述舌之生理解剖及其功用，并闡明舌生苔之種種原理。二編為觀舌總綱，闡明辨察舌之形容、質本、神色、津液和苔垢顏色之要領。三編為辨舌証治，以識諸家察舌辨証之法及舌病治法。四編為辨舌各論，詳述各舌病証之用藥，并附舌苔彩色圖一百一十九幅。五編為雜論方案，羅列諸家辨舌精論與察舌辨証之醫案，作為規範。

本書為論述舌診較為全面而具體的一部著作。但因旧刻版本印數不多，現今難以購得，爰將一九二八年「集古閣」印行之「彩圖辨舌指南」原本，影印出版，以適應醫界研究舌診和臨床參考之需。

本書原為手寫石印，其中引文錯訛、脫簡頗多。茲請南京中醫學院診斷教研組丁光迪醫師作了校勘。校勘的範圍是：一、片段引述，論証的問題與原著有出入者；二、引文中的重要錯字、錯句和脫簡字句；三、作者論述文中明顯的和疑似的錯訛字句。至於引文中個別字句與原著虽有出入，但無乖原意者，均不在校勘之列。由於現有參考資料不全，倘有未能校出者，敬希讀者指正。

江蘇人民出版社

辨舌指南凡例八則

一本書卷一至卷三。上考素靈。近探各家。刪繁就簡。彙輯而成。凡屬長篇。必書明原著姓名。若各家東鱗西爪。略採數語。餘多炳章經驗編述者。但求語氣貫通。未註原書。閱者諒之。

一本書卷四至五。辨舌各論。冠以（舌鑑）者。卽以傷寒舌鑑。徐靈胎舌鑑。傷寒舌辨。彙攷訂正為原文。冠以（辨正）者。卽梁特巖舌鑑辨正也。其餘諸家發明。列於梁氏原文之下。小字別之。庶幾不致混淆。

一原本圖形。雖分白黃紅黑各色。如尖紅邊紅。中白根黃等類。仍辨大意。未詳病舌所顯之真色。初學者不能辨認。往往有望洋之歎。炳章有見於此。茲將二十年臨證經驗所得。以十一色繪成各舌精圖。以俾對圖認症。一目了然。惟濃淡神彩。不能畢肖原圖。尤關於印刷手習輕重之間。稍變其真色。大抵閱歷深者。必能以意會之。

一原本辨舌。拘於傷寒。不知各種雜病。皆可察舌。以別藏府虛實寒熱。炳

章更將體質稟賦老幼壽夭逆順生死。又加詳細發明。辨舌之法。可謂詳且備矣。

一本書各章所辨。間有前後重複者。如津液。苔垢。神氣。顏色等。皆互有關係。欲辨晰清明。非反覆申說。不能達其真理。閱者恕之。

一本書卷六附方。皆關前論所引用。若前論方名下。藥味已附者。不再重列。引用以外之友。概不錄之。

一辨舌較診脈為確。因脈夾皮。而舌則親切顯露。且脈隨寒熱變化。真假無定。而舌色則不亂絲毫。確然可恃。且藏府經絡有寒熱處。或腐壞處。而舌體繫屬部位之苔質。亦必改變。閱者能將全書分看合看。悉心推究。自能明之。

一近來書肆。翻印醫書。惟以廉價相競。校對多不講究。魯魚亥豕。差誤不堪卒讀。不知醫書一字之誤。關人生命。炳章校印及自著出版各書。抄寫完成。必再經親目校正。間有差誤。見即改正。然後付印。自問絕少差誤。閱者辨之。

編述者曹炳章謹誌

辨舌指南周序一

竊維四診以望居其先。望者何。察面色。觀目神。辨舌苔。驗齒垢。四者而四者之中。尤以辨舌為最要。蓋舌為心之外候。苔乃胃之明徵。人之有病與否。但觀苔色如何。即可知其大略。較之西醫用器探病。尤為確切。故林慎庵曰。觀舌為外診要務。非虛語也。惜我中國四千餘年以來。往聖昔賢之著作。或言病理。或言脈理。或言治法。醫籍繁多。幾於汗牛充棟。而辨舌之書。獨少概見。如杜清碧金鏡錄。張誕先傷寒舌鑑。梁特巖舌鑑。辨正徐洄溪舌鑑等書。世皆奉為圭臬。然亦語焉不詳。其餘散見於各書者。或但舉一隅。而未能綜核全體。或僅述外表。而不能洞澈中藏。至於生理若何。氣化若何。功用若何。則更缺焉不講。以診斷上最親切最重要之點。而無人焉為之發明其蘊奧。闡別其機能。宜乎後人之無所取法也。吾友曹君炳章。潛心醫學。歷數十寒暑。手不釋卷。筆不停揮。著述等身。不可悉數。曩有辨舌新編。登諸紹興醫報。海內醫林。無不爭先快觀。而曹君自謂辨之

未詳。心猶未愜。近十年來。復精心結撰。纂成辨舌指南。篇中援引古今名家醫書。不下百數十家。東西洋近譯名家醫書。亦不下數十家。且旁及各埠醫報雜誌。無不廣羅博採。棄其糟粕。擷其精華。書分六卷。卷中列章分節。按節又分子目。條理井然。且有論有圖。有治法。有醫案。又有藥方。可謂毫髮無遺憾矣。自此書出。庶使後之學者。辨舌察病。審病用藥。不致茫無依據。則此書洵不啻南鍼之指也。稿既成。曹君命余參校。余自慚觀書不多。兼年老才疏。懼無以膺斯任。然念曹君數年來撰述之苦心。且已將做名忝列鴻編。俾駕駘下乘。亦得附驥尾而顯名。則余雖謏陋。亦何敢負其雅意。遂不得不拭老眼之昏花。為之逐條披閱。錯誤者更正之。遺落者添註之。間亦略為修飾之。惟是證引既多。校讎非易。且搜採多西醫之說。文經繙譯。辨別尤難。故雖反覆推詳。恐不免猶有疏漏之處。尚望海內外博雅之士。詳覽而指正之。此則曹君之幸。亦鄙人之幸也。是為序。

中華民國九年季冬之月古越周炳堦越銘氏書於濂溪別墅之小隱廬

彩圖辨舌指南卷一目錄

周序

凡例 八則

緒言

第一編 辨舌總論

第一章 辨舌之生理解剖及功用

第一節 舌之構造 第二節 舌之乳頭

第三節 舌之脈絡 第四節 舌之腦氣筋

第五節 舌之骨與舌根 第六節 舌之細胞與神經

第七節 舌之唾液腺 第八節 舌之功用 一別味
二發聲

第二章 辨舌之味覺神經及機能

第一節 味覺神經 第二節 神經種類及機能

第三章 辨舌審內藏經脈之氣化

第一節

手少陰心經

第二節

足少陰腎經

第三節

足太陰脾經

第四節

足陽明胃經

第五節

足太陽膀胱經

第六節

手少陽三焦經

第七節

足厥陰肝經

第四章

辨舌察臟腑之病理

第五章

辨舌明體質稟賦之鑑別

第一節

體格

(甲) 強壯體
(丙) 中等體

(乙) 薄弱體

第二節

體質

(子) 肺陽質
(寅) 脾陽質
(辰) 肝陽質
(午) 心陽質
(申) 脾陰質
(戌) 肺陰質
(丑) 腎陰質
(卯) 肝陰質
(巳) 心陰質
(未) 脾陰質

第三節

稟賦

(甲) 男
(乙) 女
(丙) 老
(丁) 幼

(戊) 孕
(己) 產
(庚) 嬰孩

第六章

辨舌生苔之原理

第七章

辨舌苔有根無根之鑑別

第八章

辨舌苔察時溫與伏熱

辨舌指南卷二目錄

第二編

觀舌總綱

第九章

觀舌之心法

第十章

辨舌之形容

第一節

軟硬

第二節

脹癆

第三節

戰痿

第四節

歪邪

第五節

舒縮

第六節

吐弄

第十一章

辨舌之質本

第一節

點刺

第二節

瓣暈

第三節

星斑

第四節

裂紋

第五節

凸凹

第六節

直橫

第十二章

辨舌之神氣

第一節

淡濃

第二節

深淺

第三節

榮枯

第四節

老嫩

第十三章

辨舌之津液

第一節

潤燥

第二節

滑濡

第三節

腐膩

第四節

糙粘

第十四章

辨舌之苔垢

第一節

常變

第二節

觸染

第三節

偏全

第四節

薄厚

第五節

化退

第六節

滯鬱

第十五章

辨舌之顏色

第一節

白苔肺經

第二節

黃苔胃經

第三節

紅色膽經

第四節

黑色脾經

第五節

灰色脾經

第六節

焦紫肝經

第七節

紫色腎經

第八節

絳色心經

第九節

青滑肝經

第十節

藍色肝經

辨舌指目卷三目錄

第三編

辨舌證治

第十六章

仲景察舌辨證法

第十七章

胡玉海察舌辨證法

第十八章

吳坤安察舌辨證歌

第十九章

察舌辨證之鑑別

第一節

虛實

第二節

寒熱

第三節

真假

第四節

陰陽

第五節

順逆

第六節

生死

第二十章

辨舌病證治之鑑別

(甲) 舌之體質病

第一節

腫舌

第二節

木舌

第三節

重舌

第四節

舌菌

第五節

舌黃

第六節

舌疔

第七節

舌癰

第八節

舌瘡

第九節

舌衄

第十節

舌斷

(乙) 舌之功用病

第一節

舌強

第二節

舌瘡

第三節

舌痺

第四節

舌麻

第五節

舌縱

第六節

舌嚙

第七節

舌吐

第八節

舌短

第二十一章

辨舌病之治療法

第一節

舌病簡效方

第二節

舌病針灸法

第三節

舌病導引法

辨舌指南卷四目錄

第四編

辨舌各論

第二十二章

白苔類診斷鑑別法(計三十四舌附彩圖廿七枚)

第二十三章

黃苔類診斷鑑別法(計二十五舌附彩圖廿一枚)

第二十四章

黑色類診斷鑑別法(三十二舌附彩圖廿七枚)

辨舌指南卷五目錄

第二十五章

灰色類診斷鑑別法(計十四舌附彩圖十二枚)

辨舌指南卷六目錄

第五編 雜論方案

第三十章 辨舌雜論補遺

第三十一章 察舌辨證醫案

第三十二章 辨舌證治要方

第二十六章 紅舌類診斷鑑別法（計二十舌附彩圖十四枚）


第二十七章 紫舌類診斷鑑別法（計十三舌附彩圖十三枚）

第二十八章 醬色舌類診斷鑑別法（計三舌附彩圖三枚）

第二十九章 藍舌類診斷鑑別法（計三舌附彩圖三枚）

辨舌指南目錄

圖之胃入水食肺入氣空



全舌部位應臟腑圖



全舌部位

- (一) 舌根 內應腎。(辨正。主腎。命門。大腸。)
- (二) 舌背 內應胃。(辨正。左主胃。右主脾。)
- (三) 舌尖 內應心。(辨正。心主心。包絡。小腸。膀胱。)
- (四) 舌側 內應肝膽。(辨正。左主肝。右主膽。)
- (五) 舌底 見第二圖。


舌上乳頭

即舌背上之無數小突起。血管及神經。皆分佈於其內。舌乳頭當分三種。臚列於下。


(甲) 絲狀乳頭 在舌傍及舌面。其上面有絲形突起之線。

(乙) 蕈狀乳頭 散在絲狀乳頭之間。為小橢圓體。作蕈狀。

(丙) 輪廓乳頭 在舌根近傍。排列如人字形。較前數種為大。內藏味神經之末梢。曰味蕾。其形似壺。內容針狀之味細胞。




舌底面圖



舌底面圖說

舌尖向上。提過上切齒。領骨下降。舌中線有紅軟粘膜。中有褶紋。為(三)舌下褶。褶之兩側近尖處有數小腺。為(二)舌前腺。割開見之。有卵形之腺一對。並畧近舌尖兩側處之曲血腺。時有一粘膜枝。名旁褶。在舌及口底相接之處。即舌下腺之凸。並(一)舌下腺。口一行。在中腺之兩側。舌下褶之根。有一刺。刺上有(五)領腺。口在刺之前。見一小羣輔涎腺。即切齒腺。對中切牙根處。與領骨緊相接。



彩圖辨舌指南卷一

曹氏醫學叢書之十

鄞縣 曹赤電炳章撰述

紹興 周炳堉越銘參訂

緒言

嘗觀近世科學家之學說。莫不先有理想。而後成實驗。醫學一道。何莫不然。如聽病有筭。診脈有表。探淋有管。度寒暑有針。食管尿管直腸各有探耳目喉陰俱有鏡。此外醫家用器。不勝枚舉。皆可補耳力目力藥力所不及。較之我國之四診法。可謂精而細。約而明。然亦祇能辨其有形之實迹。不能察其無形之氣化。若我中醫望舌一端。用以察病。纖毫攸分。較之用器尤為明著。陶保廉云。舌無隔膜。且為心苗。目視明澈。勝於手摸。林慎菴曰。觀舌為外症要務。以其能別虛實死生也。利濟外乘云。欲知消化器之情形。可辨舌色如何。便知大略。周雪樵云。舌膜與消化部各器具連。故能顯消化部之病。又與津液器循環器。亦有密切之關係。新靈樞云。舌與消化器有密切之關係。凡腸胃有病。必現於舌苔。舌鑑辨正云。舌居肺上。膜理

與腸胃相連。腹中元氣薰蒸蘊毓。親切顯露。有病與否。昭然若揭。徐靈胎曰。舌為心之外候。苔乃胃之明徵。察舌可占正之盛衰。驗苔以識邪之出入。有病與否。昭昭若揭。柯為良云。凡舌上面有刺。刺中有腦絲。能主嘗味。有苔可以察病。劉吉人云。舌為胃之外候。以助輸送食物。入食管胃脘之用。其舌體之組織。係由第五對腦筋達舌。其功用全賴此筋運動。舌下有青紫筋二條。乃下焦腎脈上達。有穴二。名曰金津玉液。所以生津液以濡舌質。拌化食物者也。舌之表面。乃多數極小乳頭鋪合而成。此乳頭極小。微點。以顯微鏡窺之。則時見形如芒刺。摸之棘手。或隱或見。或大或小。或平滑。或高起。隨時隨症。變易不定。中醫以舌苔辨症者。苔即胃中食物腐化之濁氣。堆於乳頭之上。此明舌苔之所由生也。常人一日三餐。故苔日亦三變。謂之活苔。無病之象也。其所以能變者。因飲食入胃時。將腐濁遏鬱下降。故苔色一退。至飲食腐化。濁氣上蒸。苔色又生。胃中無腐濁。則苔薄而少。有腐濁則苔厚而多。此其常理也。嘉納翰云。凡各種重病。舌皆有苔。傷風發熱病。第一層時。喉核生矣。舌上有一層白蜜色之苔。發熱病

第二層舌有厚黃色或黑色之苔。若胃腸中有燥糞。胆汁則逆流而上。其色卽黃。苔色黑者。表明血中有炭氣。為有毒也。血不清潔。生津不爽。並大便秘惡臭之時。舌有一層厚黑乾舌。牙有黑垢。舌有紫色乾苔。惹厭之病將退。舌卽漸變濕潤。黃疸病舌有胆汁色之苔。身虛泄血病。舌有濕苔。好飲酒。其舌上常有裂紋。則舌體多紫。其他病理。西醫重實迹。中醫重氣化。科學哲學。事實不同。惟辨舌苔參西衷中。義理皆同。然西醫不若中醫之精且細也。蓋上古之言舌苔者。始自內經。繼則仲景華陀。素問云。舌轉可治。金匱云。舌黃下之。傷寒論云。有舌白苔滑。及舌乾卽下諸說。華佗察色訣云。舌卷黑者死。觀舌察病。自古有之。惟古人畧而不詳耳。至元杜清碧之金鏡錄。始增至三十六舌。逮後觀舌心法。增廣至一百三十七舌。張氏涎先取觀舌心法。正其錯誤。削其繁蕪。共得一百二十舌。名曰傷寒舌鑑。而後西蜀王文選所編活人心法。內有舌鑑一卷。據云合張氏一百廿舌。金鏡錄三十六舌。段正誼瘟疫十三舌。擇錄一百四十九舌。張氏之說。亦居其九。厥後梁特巖將王氏原文。逐條辨正。更為精密。其他如傷寒舌辨。一

百三十五舌。徐洄溪舌鑑一百二十九舌。皆有可攷。脈理正義。汪氏遵經。傷寒折衷。胡玉海傷寒一書。郭元峰脈如。周微之傷寒補例。形色簡摩。診家直訣。葉氏溫熱論。醫門棒喝。馬氏醫悟等書。雖非辨舌專書。然皆各有經驗發明。猶當參考。又如近出劉吉人察舌辨證心法。紹興醫會刊印流行能獨具識見。多特別發明。為診斷上所需之常識。亦醫家必要之書也。他如何廉臣君刊行之感證寶筏。原名傷寒指掌。為吳坤安著。邵仙根評。其辨舌亦甚精確。何氏增入梁氏辨正。馬氏醫悟。更為完備。如辨舌十法。原書儘六法。自第七辨暈起至第十。從舌鑑辨正補入。察舌八法。錄舌鑑辨正者十之八。馬氏醫悟者十之二。惟吳氏原書無此篇。為何君所增訂。亦嘉惠後人之盛心也。余願為表揚之。其餘辨舌之法。雖散見各書。然其間有博而不精。或略而不詳。且東鱗西爪。不易卒讀。猶不能盡備其書。如傷寒舌鑑一書。近世雖已風行海內。然其斷病用藥。有非治溫暑時疫所宜。以致初學者。無入門之直徑。有有書不如無如之嘆。據炳章二十餘年臨證之實驗。無論內傷外感。以察舌為最有確憑。早有斯見。爰將古今名家醫書百

五六十家。東西洋近譯醫書三十餘家。及各埠醫報雜誌三十餘種等書。廣搜博採。凡關於驗舌治病諸法。摘錄無遺。先後十年。積稿盈篋。戊午春。悉心董理。以刪繁就簡。去粕存精。計存四冊。凡生理解剖之實質。則參用西法。氣化理想之經驗。則仍衷中醫。越時三載。稿凡五易。首總論。以明舌之生理解剖及功用。與生苔種種之原理。二編總綱。以察形容質本神色津液苔垢顏色之要領。三編證治。以識諸家察舌辨證之法。及舌病治法。四編各論。以別各舌病證之用藥。并附精繪十一色彩圖。一百三十餘枚。五編雜論方案。以徵明辨舌察病之實據。釐訂六卷。列為三十二章。名曰辨舌指南。茲將各章總目。重述於下。俾明大要。

第一章。辨舌之生理解剖及功用。分舌之構造。舌之乳頭。舌之脈絡。舌之腦氣筋。舌之骨與舌根。舌之細胞與神經。舌之唾液腺。舌之能別味與發聲功用。為八節。第二章。辨舌之味覺神經之機能。第三章。辨舌審內臟經脈之氣化。分手少陰心。足少陰腎。足太陰脾。足陽明胃。足太陽膀胱。手少陽三焦。足厥陰肝。為七節。第四章。辨舌察臟腑之病理。第五章。辨舌明體

質稟賦之鑑別。第六章辨舌生苔之原理。第七章辨舌苔有根無根之鑑別。第八章辨舌察時溫與伏熱。第九章觀舌之心法。第十章辨舌之形容。分軟硬、脹癰、戰痿、歪邪、舒縮、吐弄、為六節。第十一章辨舌之質本。分刺點、辨暈、星斑、裂紋、凸凹、直橫、為六節。第十二章辨舌之神氣。分濃淡、深淺、榮枯、老嫩、為四節。第十三章辨舌之精液。分潤燥、滑濇、腐膩、糙粘、為四節。第十四章辨舌之苔垢。分常變、觸染、偏全、薄厚、化退、滯鬱、為六節。第十五章辨舌之顏色。分白苔、黃苔、紅色、絳色、灰色、黑色、紫色、青滑、藍色、為十節。第十六章仲景察舌辨證法。第十七章胡玉海察舌辨證法。第十八章吳坤安察舌辨證歌。第十九章察舌辨證之鑒別。分虛實、寒熱、真假、陰陽、順逆、生死、為六節。第二十章辨舌病證治之鑑別。(甲)舌之體質病。分腫舌、木舌、重舌、舌菌、舌黃、舌疔、舌癰、舌瘡、舌衄、舌斷、為十節。(乙)舌之功用病。分舌強、舌瘡、舌痺、舌麻、舌縱、舌嚙、舌吐、舌短、為八節。第二十一章辨舌病之治療法。分舌病簡效方、舌病針灸法、舌病導引法、為三節。第二十二章白苔類診斷鑑別法。(計三十四舌)第二十三章黃苔類診斷鑑別法。(計

二十五舌)第二十四章黑舌類診斷鑑別法(計三十二舌)第二十五章
灰舌類診斷鑑別法(計十四舌)第二十六章紅舌類診斷鑑別法(計二
十舌)第二十七章紫舌類診斷鑑別法(計十三舌)第二十八章醬色舌類
診斷鑑別法(計三舌)第二十九章藍舌類診斷鑑別法(計三舌)統計
一百四十四舌。附彩圖一百二十二枚。墨圖六枚。第三十章辨舌雜論補
遺。第三十一章察舌辨證醫案。第三十二章辨舌證治要方。每編列章分
節。或由節再分子目。條分縷晰。各有發明。須將各條互相參合。方能知其
真理。能知綱要。則其變化自可類推。隅反也。且可認色分經。據證立方。先
淺見而後精深。非敢貢高明之研究。第以為初學之導線。至於精益求精。
積密益加密。仍當參之診斷諸書。以窮其變。而達其微。庶幾審病用藥。靡
有子遺矣。是乎否乎。敢質。

博雅諸君。務乞指余之不逮。則余實厚幸矣。

中華民國九年九月重九日四明曹赤電炳章氏序於越城和濟藥局

第一編 辨舌總論

第一章 辨舌之生理解剖及功用

第一節 舌之構造

舌為動物司器官。在口中下顎上。乃一塊赤色筋肉質纖維所成。其中有多絲能自由運動。且以生津液。表面包以黏膜如皮。並浸口液之內。有多數小粒之隆起。即味覺之乳嚙體。內含血管。及與腦相連之味神經。滿佈其中。以辨食味而分布味神經。及舌神經之小枝於其內。故舌能顯明內筋條。並腦線器具之情形。並行血法與生津液器具之情形。特能顯明消化器津液情形者。因舌與胞膜及消化器相接。為感覺最敏銳處也。

第二節 舌之乳頭

舌乳頭當分三種 圖見前

- (一) 絲狀乳頭 在舌傍及舌面。其上面有絲形突起之絨。
- (二) 蕈狀乳頭 散在絲狀乳頭之間。於舌尖為最多。
- (三) 輪廓乳頭 在舌根近傍。排列如人字形。較前數種為大。內藏味神經之末梢。曰味蕾。物質溶解後。觸於乳頭時。即透入內部。而刺激。

末器味神經傳之於腦。故感覺其味。

第三節 舌之脈脰

舌之脈脰。由舌脰及上咽頭之脰而來。

第四節 舌之腦氣筋

即分布舌上之腦氣筋也。上連於腦。有司味神經。及動舌神經之別。以司辨其運動舌體之用。蓋舌之腦筋。每半邊各三。即第五筋之司味枝。散於舌前端及邊之芒。並舌咽頭之舌枝。散於舌底與舌邊之嫩膜及大芒。並舌下筋散於舌之肌質。司味筋兩枝。乃尋常知覺兼司味之用。其舌下者。乃運動舌之筋。司味筋之一。以供舌之芒與嫩膜。其全路之列。俱深同下牙。先列於外後蹬肌之下。即牙筋之裏邊。與內牙床脈脰之一枝相合。其中竅絲。亦與此處相合。而為尖角。後則此筋行於內後蹬肌。與牙床枝裏邊之間。斜過舌邊咽頭。上縮肌之上。

第五節 舌之骨與舌根

舌骨附列於喉與舌根之小骨形。以韌帶連於喉頭。祇有一枚。為軀幹

骨之一。舌根猶言舌本。謂舌之近喉處也。

第六節 舌之細胞與神經

凡舌面有刺。名曰乳頭。其兩傍有小刺。名曰味蕾。內含細長之細胞。一個至十個。卽味細胞。味細胞之下端。味神經伏焉。供給辨味之物質。變成液體。浸及味蕾。刺激神經。傳之於腦。遂生味覺。心學要覽味神經。觸神經。蔓布全身。而味神經。惟口中有之。此神經歸宿於舌皮及口後部之皮肉。舌皮內有無數之小體。狀若花蕾。名曰味蕾。味蕾展其外端於口內。其中心有細胞。細胞之末稍極細。視之宛如纖絨。因名曰絲綿稍。絲綿稍植立於味蕾之罅隙內。味神經達於味蕾。并於其細胞間分枝。食物未經溶解。則不能辨其味。必先溶化。下降於味蕾內。圍繞絲絨細胞之稍。而後味神經傳至腦髓。告以所嘗之物為何味也。

第七節 舌之唾液腺

唾液腺。卽分泌唾液腺之一。有耳下腺。顎下腺。舌下腺。三對。末端各有球囊。如葡萄。血脰纏絡。其週圍如網。有排泄細胞。常分泌唾液。滋潤口內。口

含食物。則腺之機能。忽發。分泌液甚多。又飢餓而見食物及感香氣亦能流出唾液。○耳下腺最大。在外耳之直下。別有腺。開口於上顎面。齒之近傍。以輸送唾液。喉痧及感冒時。往往熱腫發脹。俗稱疔腮。○顎下腺在下顎之內前部。舌下腺在口底黏膜之下。其輸送腺。皆開口於舌尖舌部之兩側。○黏液腺由唾液腺分泌之液。亦曰口津。以潤舌面及潤濕口腔。及消化食物之用。

(甲) 唾液性質 唾液者。稀淡無色。而粘滑之鹼液也。流出之始。有泡沫而透明。無何其上面清澄而生純白之沈澱物。以顯微鏡觀之。見微細之顆粉。少許之油球。及薄扁平之鱗形物。卽口窩裏膜剝落之內皮細胞也。又有口中粘液膜所出之少許小球細胞混合之。

(乙) 唾液效用 唾液以濕潤口內言語及咀嚼時。使舌易運動。又溶解有味物之分子。滲入舌之黏膜而覺其味。咀嚼之際。混淆於食物。使成易嚥之軟塊。此皆唾液之功用也。

第八節 舌之功用

舌字从干从口。干，干戈也。凡物入口，必干於舌。故舌之功用，為食物辨味及發聲。凡食物自口下於胃，謂之下嚥。下嚥有三期：第一期，由口及口蓋之筋，送食物於咽喉；第二期，由咽喉之筋，移於胃脘；第三期，由胃脘之筋，下之於胃。

(二) 別味 舌為味官，能辨食物之優劣。凡物有味者，無甘酸辛苦，皆溶解於水。惟金石不溶解，故多無味。但其味可溶而含於物，其物自具一種味之原質。然往往因多嘗和料，薑桂芥及習慣常食物，亦不克辨原嗜之味。亦反失其功用。味覺統常辨甘酸苦鹹四種，澀與辣乃為皮下筋之收縮，非真味覺。謝氏生理學云：舌背感鹹味苦，味最敏。而此處之腦腺為第九對，與胃相感。食鹹與苦，每致嘔吐，職是故也。舌之兩傍，感甘酸最敏。而是處之腦線為第五對，其分支至面部，故食酸則面現鰭容。新智囊云：舌之尖端司辣及酸之味覺，舌背司甘及苦之味覺。舌根司燒肉及其他脂肪甚濃厚食物之味覺。且味覺有時與嗅覺視覺觸覺等相聯絡，聯絡嗅覺而感物之香味，聯絡觸覺而辨物之為水質或

脂肪質聯絡視覺。而就物色之美惡。以知味之如何。

(二)發聲。舌者。聲音之機也。唐容川云。舌為心苗。言為心聲。故舌能辨音。究音之所由生。則根於腎氣。蓋腎挾舌本。故先舌動而後能發音。橫骨者。神氣之所使。主發舌者也。橫骨在舌本。心藏神。而開竅於舌。故橫骨為其所使。以為發音之機。以舌在口中作聲曰咤。語音不正曰禪。綏以上辨舌之生理解剖。及味覺功用。已略備大概。其他味覺神經之科學。上實驗研究。下章引據霍令斯荷斯教授。及和布芬勃葛博士之新發明。詳辨之。

第二章 辨舌之味覺神經之機能

樓英曰。濁氣出於胃。走唇舌而為味。凡物體入口。溶解觸於舌面。而生感覺。能判斷其甘苦辛酸之作用。謂之味覺。且為消化器之保護。此作用雖專屬於舌。其兩頰之內側與口。亦少助之。謝氏生理學云。司嘗之職。舌與上顎之小刺任之。滴醋一滴於舌上。對鏡視之。即可見刺之簇豎。舌之皮突起。小刺之上。細如毛髮。觀之不啻絲絨也。功能收吸所嘗之液。而達於

腦腺。故曰味覺。此就其大要言之。至於從科學上實質之研究。茲再節錄學生雜誌之霍令斯荷斯教授。及和布芬勃葛博士之辨舌覺之新發見。以俾我中醫界參攷實質之借鏡。（專載學生雜誌第七卷三號學藝門「關於味覺的新發見」）

第一節 味覺神經

從頭蓋過面龐到口內之頭蓋神經。共有三條。是皆含有味覺神經纖維。其第一為舌神經。其纖維佔在舌面前部及兩側。及舌尖。約當全舌之長三分之二。其第二為第九神經。或稱喉舌神經。其纖維佔在舌根和軟顎。其第三為肺胃神經。自胃而來。其纖維佔在舌之極根。及喉頭。此謂滿佈全舌之神經纖維之來源。

第二節 神經種類及機能

味官和腦筋處。有許多各自分離小圈。每小圈各自成一體。體內包含一核。和兩組神經細枝。胞中。其一組是極短極多。又一組比較略長。却單獨一支。凡圈一羣。成一神經節。為傳達感覺之樞紐。連絡腦筋和味覺神經。

味覺器官與腦海連絡形狀圖



此圖是味覺器官和感覺神經和動作神經連絡之全圖。圖中(子)是舌(丑)是神經分支即帶味覺神經纖維。維經過耳鼓神經的(寅)是耳鼓(卯)又一神經分支。即帶味覺神經至神經中樞者(辰)是在腦海外之味覺神經中樞。專司舌夫的味覺(巳)是又一神經分支。帶布在舌根之味覺神經纖維到(午)(未)是專司舌根味覺之神經中樞(申)是延髓穴。即轉接各種器官之報告。而達之最高腦府者(酉)腦(戌)從腹部來之胃神經。連合腸胃和腦海之東西(亥)胃神經之支管。接收喉頭所感得味覺。因而起涎。以便送食物進胃。注意。凡物味佳者始起涎。又圖中之(一)(二)(三)(四)表示舌之分段。詳見下面之舌面分段圖。又可參閱下文之線狀點、羣狀點、圓狀點、三種解剖分圖。和味蕾之解剖圖。

節有四個。皆經過舌本。和味細胞纏繞。味細胞在味蕾之內。至於神經節他端之神經支。便直通腦海。至大腦中樞而止。其直接之神經幹。便是大頭蓋神經之中樞。神經名加色令神經節。若將加色令神經割去。據理

知覺亦失。豈知事實上則不然。並不全舌知覺失却。只有前半部約佔全舌三分之二。失却知覺。似乎舌上其餘各部之神經纖維。並不與神經節關聯。却另從一條路繞到腦中。此是實驗時第一次奇異之發見。後又照此法實驗一次。割後若干時。前部已失之知覺。仍能回復原狀。此是第二次之發見。且味覺可以借用耳神經。逆達腦海。據近世科學家詳考之後。始知散佈在舌前半部之神經纖維。雖從第七頭蓋神經之神經節所發生。而實則先須繞過耳鼓神經。然後能達到舌頭前部。所以耳鼓神經亦可以傳導味覺到腦海。此是霍斯荷斯教授所發明。


科覺家再加研究。又試驗耳鼓神經。不但能代傳達味知覺到腦海。並且能直接感受味覺。可以在中耳耳腔內耳鼓神經上實驗得之。何以驗之。假如耳腔內之耳鼓神經七行。使一種機械刺激。便能令腦海起一種酸味覺。倘然行使一種化學刺激。便起甜味覺。行使電力刺激。便起苦味覺。祇無鹹味味覺。此是屢試不爽。布博士又考查耳聾之人。味覺亦鈍。又如患傷寒熱病熱甚時。舌起厚苔。致失味覺。而耳亦聾。此更是味覺與耳

聯有密切之關係。為實驗證明之實情。

再觀舌官和腦海直接連絡之神經。即是上文所說自神經細胞一端發出之神經支幹。其絡點便是居於腦底之『延髓穴』。延髓是脊髓之頂端。位在顱內。較脊髓略大。如繩端上一個結。就是觸覺神經和腦海之聯絡。是借脊髓做傳達中樞。味覺神經和腦海。却有直接聯絡神經。做傳達中樞。不靠脊髓轉達。但味覺神經。仍和『動作神經中心』及咀嚼神經。吞嚥神經有關連。此關連是在延髓中。因此味覺器官與脊髓中樞有關係。所以味覺能引起他官之感應。比如吾人見了美食。便不知不覺。口內流涎。此即是胃液分泌。吾人從此可以證明味覺神經。和動作神經協作。此皆說明味覺神經內部之組織。實有神妙不可思議之奇異。

再說舌頭外部。即表面之味覺神經之組織。亦有研究之價值。第一先辨舌頭表面。凡舌頭正面之皮最粗糙。且最厚。因常和食物相接觸。所以格外生得厚些。其餘如舌尖和舌邊之皮。比較就薄了。其正表面粗糙部分。又可分為外內兩部。有感覺神經頭露出。即是和味覺相關連。內部便都

舌面分段圖



此圖中(一)是蕈狀乳頭(二)是線狀乳頭(三)是圓狀乳頭(注意他之形狀像個井欄)(四)卷葉乳頭圖中僅示(一)(二)(四)三者所占之地段而已詳圖另列之

是血脰神經纖維和無數之腺。外部更有許多小點。形狀不同分佈亦甚散亂。卽此小點。便是畫分舌面為內外兩部之表記。內外部區分之處。以一排較大之點為界線。此等大點。約數十二。排列兩面。成個英文V字形。式。看圖中之(三)便知。V字形是尖端向內。開端朝外。又從V字尖處起。有條溝直達舌尖。好比把舌面平分為兩邊。

再辨舌乳頭。可分四類。(一)圓狀乳頭。(二)蕈狀乳頭。(三)線狀乳頭。(四)卷葉乳頭。圓狀乳頭。就是排列成V字形之十二(或十個)個大乳頭。此種大乳頭。中有小窪。四圍畧高。猶如牆圍。所以曰圓狀乳頭。上文所講關



動脈血脈

血脈

上圖即線狀乳頭內味覺神經纖維形狀如毛刷者即神經頭也。



動脈

味覺神經形

上圖是蕈狀乳頭內部構造解剖圖其蕈狀表皮極薄頗靈感。


連味覺之感覺神經頭便是露在此乳頭上。尤以在乳頭四圍高起部分者為多。總有幾百個。故食物進口時。皆從外部感覺味之好歹。舌尖正面雖有極靈感覺其反皮却無感覺其餘除舌面內部。是無感覺前已說過外如軟腭及扁桃腺皆畧有感覺。嗓子頂頭和噪口亦畧有感覺。惟上腭完全無感覺。以上所云感覺是專指味感覺又嗅覺器官且有味感覺如甜味和鹹味鼻子亦可以畧辨一二耳。

再看上文所說小乳頭如(二)(三)(四)種是何構造曰其小乳頭內皆含有無數小體。稱為(味杯)察其形狀實似未開之花蕾。所以又改名為味蕾。味蕾和外界相通之路名為(味竅)為極細極微人目所不能見之孔。

開在小乳頭面上。味蕾所以要如此深藏密躲。無非使外界略粗食物。不能接觸耳。味竅之對徑。有人測量之。大約一英寸一千分之一。可謂小至



上圖是圓狀乳頭。解剖後所見之解剖面。平常肉眼所見圓狀乳頭形狀。頗似井欄。現在解剖後。用顯微鏡觀察。始知此形。



上圖即是(味蕾)之解剖放大之圖。(味蕾)是各種乳頭內。皆有為傳達味覺到腦海之機關。頗是重要。圖中上面一根。便是毛刷形之東西。他之大小。可以表示味竅之大小。此圖是放大五百倍之形。

極矣。味蕾上面。又有毛刷一般。從味蕾發出。散佈味竅左右。以便收取食物之味。傳達於味蕾。

第三節 吐覺之錯覺

味覺亦常有錯覺。譬如糖屬及硫酸鎂和其他一二物。在舌邊及舌尖嘗時。其味是甜。但在舌根上嘗。其味變為苦。還有許多食物。吾人常說有味。其實無味。不過因此物有濃嗜。嗜入鼻中。因而覺得。所以亦可說是味覺

之錯覺。比如樟腦。人皆說有味。實在無味。試掩鼻而舐之。便知是無。又如咖啡。和金雞納霜之味一般。蘋蘩和洋蔥之味亦是一般。却因為各有各香氣。便使味覺起了錯覺。所以不同也。註嘗探味也。口中不須齒以舌解。凡舌出。取無渣食物曰舐。或作嗜。及銑。如犬舐遺白仙藥是也。

凡原質之味。只有四種。甜。酸。鹹。苦。是也。其餘之味。皆不純粹。與各感覺官。皆畧有關係。與嗅覺關係亦最多。曾有人實地試驗。證明食物之中。肉類。麪包。牛油。乳油。橄欖油。以及各種菓子。各色蔬菜。皆是相同之味。若將食物形狀。遮住。住食之。便分別不出。是何食物。雞肉。火雞。鶴鷄。等等。更不能從味道上分別耳。不過是香味形狀名目聯念等等合之。不是從味道可以定名也。

又說甜和苦。是絕對相反之味。那知舌上感覺甜和苦之味。却不在同一部位。大概舌尖最能辨甜。舌根最能辨苦。所以直吞苦物。往往不覺得苦。舌邊最能辨酸。又成人味覺。和小兒味覺。又有不同。上文說過成人舌尖反面舌中心一條。沒有一點味覺。小兒便不然。幾乎滿口筋肉。皆有味覺。

所以最喜滿口含物。此因為滿口含有味覺大抵一切生理狀況近乎等生物。此卽是證據。

又如舌上小乳頭感覺機能亦各不同。有些只能感覺一味。有些便能感覺二個以上。據科學家精細實驗。曉得一百二十五人之中。六十人是對於甜酸苦三味皆起感覺。十二人只感酸和甜。餘十二人只感酸。又七人感受苦和酸。四人感受苦和甜。三人只感得甜。

此外味覺之幻覺最顯著者。是甜和鹹之比較。若用一點鹹水滴在舌頭一側。同時又將一點無味之蒸餾水滴在舌頭又一側。竟覺得蒸餾水變為甜。此是證明兩性相反之緣故。能使無味之水生出相反之味感覺。若改用糖水和蒸餾水。照前法試驗。則蒸餾水又變為鹹。其理正同。所以味之性質。若依感授性之難易而定次序。便是（一）甜（二）酸（三）鹹（四）苦是也。

以上從霍教授及和布博士之新發明。參以生理學諸書而成之。

第三章 辨舌審內臟經脈之氣化

微臍八篇云。男子生鼻之後。目卽生焉。目應肝膽。女子生鼻之後。舌卽生焉。舌應心腸。目現於體外。陽之用也。舌隱於體內。陰之用也。蓋舌為心官。主嘗五味。以佈五臟。故心之本脉繫於舌根。脾之絡脉繫於舌傍。肝脉循陰器。絡於舌本。腎之津液。出於舌端。分佈五臟。又云。舌為心之外應。其本達於氣脰。有竅曰玄膺。為腎之上津。上通七竅。乃真氣出入之關。知之者生。不知者死。蠡海集云。心之竅通於舌。舌雖心竅。而津液生之。則由心腎交媾。水火既濟。陰陽升降之理也。李時珍曰。舌下有四竅。兩竅通心氣。兩竅通腎液。心氣流於舌下。為神水。腎液流於舌下。為靈液。道家謂之金漿玉醴。溢為醴泉。聚為華池。散為津液。降為甘露。所以灌溉臟腑。潤澤肢體。是以脩養家嚙津納氣。謂之清水灌靈根。人能終日不唾。則精氣常留。顏色不槁。若久唾。則損精氣。易成肺癆。皮膚枯涸。故曰遠唾不如近唾。近唾不如不唾。人若有病。則心腎不交。腎水不上。故津液乾而真氣耗也。大抵無論內傷外感。無不顯現於舌。因舌與內臟經脉。均有連繫。故辨舌質。可訣五臟之虛實。視舌苔。可察六淫之淺深。茲篇就其內臟氣化外應。喉舌

本旨詳辨於后

第一節 手少陰心經

素問應象大論云。心主言。在竅為舌。又云。手少陰之別繫舌本。經筋篇云。手少陰之筋。支者繫舌本。經絡篇云。心氣通於舌。心和則舌能知五味矣。心病則舌卷短。顙赤。故舌為心之主。五閱五使篇云。舌者心之官也。註云。心開竅於舌。故舌為心之官。脉要精微論云。心脉搏堅而長。當病舌卷不能言。註云。搏堅而長者。搏擊應手有力而長。此為太過之脉。心火太過。故當病舌卷。心主言。故不能言也。喬岳曰。心絕則舌不收。及不能語。經脉篇云。手少陰之別。名曰通里。去腕一寸半。別而上行。循經入於心中。繫舌本。屬目系。其實則支。虛則不能言。註云。手少陰之別絡。與經相干。名曰通里之間。去腕一寸半。別經而上行。循經入於心中。繫舌本。屬目系。其氣實焉間。若有所支而不暢。虛則不能言。蓋心主言。而經別絡舌本也。

第二節 足少陰腎經

經絡篇云。足少陰循喉嚨挾舌本。至任脉廉泉穴而終。疾病篇云。足少陰

之脉。貫腎繫舌本。憂恚無言篇云。足之少陰。上繫於舌。絡於橫骨。終於會厭。衛氣篇云。足少陰之標在背膕。與舌下兩脉也。經別篇云。足少陰之正直者繫舌本。舌縱涎下煩惋。取足少陰。元珠曰。舌之下竅。腎之津液所潮也。註云。下竅。廉泉穴也。一名舌本。在頰下結喉上。靈樞又云。廉泉。玉英者。津液之道也。孫文垣曰。廉泉穴。腎之津液所關。靈樞曰。胃熱則廉泉開。故涎下也。靈樞經脉篇云。腎足少陰之脉。循喉嚨。挾舌本。是主腎所生病者。口熱舌乾。咽腫。上氣噤乾及痛。煩心心痛。註云。夫腎主藏精。如主腎所生病。則精液不能上滋。而為口熱。舌乾。噤痛。煩心諸證。蓋水不上濟。則火盛於上矣。素問云。刺足少陰脉。重虛出血。為舌難。以言。景日昃曰。有寒傷腎。帝中腫者。禁針。帝中即喉花。關於性命。不可不知。

第三節 足太陰脾經

經別篇云。足太陰之正。貫舌中。經水篇云。足太陰之正。上至髀。合於陽明。與別俱行。上結於咽。貫舌中。衛氣篇云。足太陰之標在背膕。與舌本也。脉度篇云。脾氣通於口。脾和則口能知五穀矣。心氣通於舌。心和則舌能知

五味矣。當曲頰入繫舌本。註云。口能辨五味。舌能辨五味。心脾和則口與舌俱和。而五穀五味入口。卽辨矣。素問云。中央黃色。入通於脾。故病在舌本。李東垣云。舌者。心也。復能知味。是舌中有脾也。王肯堂云。舌主嘗五味。以榮養爲身。資生於脾。以分佈津液於五臟。故心之本末繫於舌根。脾之絡脉繫於舌傍。靈樞經脉篇云。脾足太陰之脉。上馬扶咽。連舌本。散舌下。是動則病舌本強。食則嘔。胃脘痛。腹脹善噫。得後與氣。則快然如衰。身體皆重。註云。舌本。舌根也。舌本強。食則嘔等證。皆脾經之所爲病也。善噫者。脾氣上走心爲噫也。得後與氣。則快然如衰者。厥逆從上下散也。靈樞又曰。足太陰是動。則病舌本強。所生病者。舌本痛。又云。刺舌下中脉。太過血出不止爲瘡。註云。舌下脉。脾脉也。瘡。不能言也。孫景思云。舌者。心氣之所主。脾脾之所通。二臟不和。風邪中之。則舌強不能言。壅熱攻之。則舌腫不能轉。更有重舌。木舌。舌腫出血等證。皆由心脾二經風熱所乘而然也。

第四節 足陽明胃經

營衛生會篇云。上焦出於胃上口。並咽以上。貫鬲而布胸中。走腋循太陰

之分而行。還至陽明。上至舌下。足陽明。註云。上焦出於胃上口。者。上焦所歸之部署也。並咽以上。貫鬲而布胸中。出走腋下。循太陰之雲門中府之分而行。還至陽明之天鼎扶突而上。至舌復下於足陽明之分也。藏象篇云。其濁氣出於胃。走唇舌而為味。張鷟舉曰。脾胃主四肢。其脉連舌本而絡於唇口。胃為水穀之海。脾氣磨而消之。由是水穀之精。化為營衛。以養四肢。若起居失職。飲食不時。則致脾胃之氣不足。而營衛之養不周。風邪乘虛而干之。則四肢與唇口俱痺。語言蹇澀。久久不治。變為痿疾。經云。治痿獨取陽明。謂足陽明也。治法宜多用脾胃藥。少服去風藥。則可安矣。

第五節 足太陽膀胱經

靈樞經筋篇云。足太陽之筋。其支者別入結於舌本。

第六節 手少陽三焦經

靈樞經筋篇云。手少陽之筋。其支者當曲頰入繫舌本。其病舌卷。

第七節 足厥陰肝經

靈樞經脉篇云。足厥陰氣絕則筋絕。厥陰者。肝脉也。肝者。筋之合也。筋者。

聚於陰器。而脉絡於舌本也。故脉不榮則筋急。筋急則引舌與卵。故唇青舌卷卵縮。則筋先死。庚篤辛死。金勝木也。註云。足厥陰之氣主筋。故氣絕則筋絕矣。厥陰者肝脉也。肝者筋之合。謂厥陰之氣合於肝脉。肝藏之氣合於筋也。聚於陰器者。筋氣之會於宗筋也。筋聚於陰器。而絡於舌本。故脉不榮於筋。則筋急而舌卷囊縮矣。厥陰氣絕。則筋先死。庚篤辛死。金勝木。而肝藏之木氣絕也。診要經終論云。厥陰終者。中熱咽乾。善溺心煩則舌卷而卵上縮而終矣。註云。肝合筋。筋聚陰器。絡舌本。故舌卷卵縮而終也。

第四章 辨舌察臟腑之病理

蓋心者生之本。形之君。至虛至靈。具眾理而應萬事者也。其竅開於舌。其經通於舌。故舌者心之外候也。是以望舌可測其臟腑經絡寒熱虛實也。屠漸齋云。辨舌欲知臟病。當先觀其舌形。如舌瘦而長者為肝病。短而大者為心病。厚而大者為脾病。圓而小者為肺病。短闊而動如波起伏者為腎病。此大要也。而尤以察胃氣為至要。有胃氣則舌柔。和無胃氣則舌板。

硬如中風入臟則舌難言傷寒舌短卽為死症皆板硬而無胃氣也
不但病時之舌能辨內臟寒熱虛實且無病之舌亦能察人之性情假如
長舌之人快活而具勇敢之氣長舌而闊雄辯之才長舌而細居心狹窄
短舌之人憂鬱而有偽善之性廣舌之人多辯不堪勝任大事舌廣而厚
氣度軒昂舌大且闊中心坦直狹長之舌臨事而乏誠意短廣之舌虛偽
而放大言舌形短小中心多偽舌形短窄非佞卽妄夫舌之人發言銳利
而聳人聽聞薄舌之人多言而利舌形夫細喜談鬼怪此無病之舌關於
為人性情之鑑別也

其他如過啖五味內傷臟氣則舌亦現特徵千金方云心欲苦多食苦則
舌皮槁而外毛焦枯肺欲辛多食辛則舌筋急而爪乾枯肝欲酸多食酸
則舌肉肥而唇揭脾欲甘多食甘則舌根痛而外髮落腎欲鹹多食鹹則
舌脉短而變色此五味內合五臟本其所欲然太過於常皆能致病而舌
亦能發現各種特徵矣

又如舌通各經內臟內臟有病無論屬寒屬熱與舌之味覺亦有特殊徵

象可辨寒熱虛實亦宜知之如胃虛則舌淡胆熱則舌苦脾疸則舌甘宿食則舌酸寒勝則舌鹹脾腎虛留濕亦鹹風熱則舌濇鬱熱則口臭凝滯則生瘡心火鬱則舌出血上焦熱則舌尖裂風火兼痰則舌胖短風痰濕熱則舌本強臟熱則舌生瘡引唇揭赤腑寒則舌本縮口噤唇青肝壅則舌出血如湧脾閉則舌白如雪三經為四氣所中則舌卷不能言七情氣鬱則舌腫不能語舌下有小白舌者心脾壅熱舌出數寸者因產後中毒及大驚舌腫者病在血舌痿者病在肉舌偏斜者病在經舌缺陷者病在臟舌戰動者病在脾舌縱舌縮者病在肝舌裂舌爛者病在脉舌卷舌短者心肝之證候舌強舌硬者心脾之病形弄舌者太陰之形證蠶舌者少陰之氣逆此即病在內而顯現於舌之證據也

薛己云舌雖為心苗以證言之五臟皆有所主如口舌腫痛或狀如無皮或作熱作渴為中氣虛熱若眼如烟觸體倦少食或午後益甚為陰血虛熱若咽痛舌瘡口乾足熱日晡益甚為腎經虛火若四肢逆冷惡寒不食或痰甚眼赤為命門火衰若發熱作渴飲冷便閉為脾胃實火若發熱惡

寒口乾而渴。食少倦怠。為脾經虛熱。若舌本作強。鰓頰腫痛。為脾經濕熱。若痰涎作渴。口舌腫痛。為上焦有熱。若思慮過度。口舌生瘡。咽喉不利。為脾經血傷。火動。若恚怒過度。寒熱口苦。而舌腫痛。為肝經血傷。火動。病因多端。當因時制宜耳。

第五章 辨舌明體質秉賦之鑑別

辨舌審病。雖有確據。然亦體格體質。人有不同。男女老少。又有分別。有平時有苔。而病時反無苔者。諸如此類。尤不勝枚舉。茲就體格體質秉賦。臚列於左。

第一節 體格

蓋體格之良否。雖關於健康。然於疾病發生時。以及日後。可治與不可治。亦多有研究之價值。茲將體格。在醫學上。當分為三種。列下。

(甲) 強壯體 平時舌質闊厚而坦。舌色淡紅。舌背常有滑苔。或白或微黃。有神彩。骨骼強大。胸廓廣闊。筋肉堅細而不粗鬆。皮膚滑潤而光澤。

(乙) 薄弱體。舌質尖薄。邊尖多紅。或紫。或有瘀。甚則沿邊屈曲如齒形。舌心苔少。或無苔。外證骨骼細弱。胸廓狹小。筋肉瘦軟。皮膚寬。(丙) 中等體。舌質狹長不厚。色亦淡紅。微有薄苔。尖邊淡紅。其外證骨骼。筋肉。皮膚。亦介於兩體格之中間者也。

第二節 體質

人之有體格。而後有體質。故體質在醫學上。亦當別之為四。茲就各質之形狀列下。

(子) 肺癆質。全身構造薄弱。頭長如鶴。皮色蒼白。胸狹小。或扁平。顏細長。顴骨稍赤。眼球大而有一種光澤。其外貌秀麗。其舌質坦薄。邊尖紅赤。舌根有苔。厚膩。中尖無苔。口中常有津。病至二期。則根苔灰白。邊紫紅。乾咳涎痰。甚則痰中帶血絲血塊。重至三期。舌轉紅赤。無垢苔。咽痛。咳嗽膿痰。或仍涎痰。潮熱盜汗。便溏胃鈍。為終期也。

(丑) 卒中質。骨骼筋肉均肥大。全身富於脂肪。顏大而白。或亦有兼蒼兼赤。頸短而厚。肩高而聳。其外貌雖甚強健。而身體畧為運動。則呼

吸因之迫促。其舌質闊厚而長。尖端平圓。色淡紅而白。舌面常有白膩垢。苔。此質因常多脂肪少血。平素肝胃多有痰濕貯藏。故常有苔垢。病則胃中聚痰更多。舌質常呈胖短。甚則強硬或脹大。牙關亦緊。口不能出聲。肺氣。膈室塞。則不治矣。

(寅)神經質。神經質之特性。不在體格體質。而在其舉動行為。容貌伶仃。視物敏極。髮潤而光。言語爽快。教以學問。按藝則比常人易於領悟。惟其意思無常。時興奮。時鬱悶。凡作事性急。其舌質薄小而端尖。邊紅微紫。雖有乳刺上無浮垢。或有苔亦薄。此質之人。陰液虧。肝火旺。其有外邪之時。其苔白而帶灰。不厚膩。若多服溫燥藥。則易變光絳舌。

(卯)腺病質。主在小兒期。皮色蒼白。筋肉瘦而不潤。額面如浮腫。顏面狹小。身體細弱。皮膚易變。靜脈透於外面。往往生皮疹。其舌質薄短而尖。色多紫紅。苔色灰白而少。

前論體格體質之強弱。不拘男女與壯少。今論稟賦。則男女又有別。少壯亦有殊。且孕婦與產後。亦各有異諦。不可不分別詳之。爰再述於后。

(甲)男女 男女氣血異體。證治亦有大端不同者。男子氣壯。血不易
瘀。舌黑耳聾。血絡痺也。如熱入血室。舌卷囊縮。血痺之甚。筋失養也。亦
有未及化熱。兩脇血絡先痺者。其證舌苔忽黃忽白。必帶灰黑。小便忽
閉忽通。煩躁不能安眠。或有一邊不良於眠。其脈忽長忽短。忽洪忽緊。
全無定象。必須攻血通瘀。方可治之。未有瘀不化。黑不退。而病能愈者
也。若婦人血盛。經水適來適斷。與病相觸。肝胃之絡最易停瘀。舌黑謔
語。事所常有。但耳不聾。乳不縮。不為敗證。即耳微聾。而謔妄狂躁者。亦
邪正相搏之象。惟聲息低微。不能轉側。乃為危象。其舌或藍或灰或黑。
有僅在一偏。有全舌皆透。均不得據為凶候。故治婦科傷寒溫病。起手
卽宜兼和血以防之。否則病愈而絡瘀不淨。積為胃痛腰痛痼疾。又世
以黑而芒刺為熱。濕潤為寒。然瘀血舌黑。雖熱而不生芒刺。蓋男子之
血必因寒而瘀。因熱而瘀。因溫病過服寒劑。遇熱閉絡。而瘀。婦女不必
因寒因熱邪在血。不必相入而血能自瘀。故病愈而黑不退者。有之。
傷寒例 張石頑云。夏月熱病邪大。與時大。內外燔灼。苔黑易生。猶可攻治。
錄節

冬月傷寒。舌苔全黑。決難救也。周微之云。此乃指黑而潤者。是血因寒而瘀。夏熱瘀。易行。冬寒瘀。難行也。若熱瘀。則冬夏皆出。

(乙) 孕產

凡妊娠溫暑傷寒。必先固其胎。胎安病易治。既察其胎。又

審其色。面以候母。舌以候子。色澤則安。色敗則死。正脈理若面舌俱帶白者。寒證也。宜溫之。若舌色絳赤。熱入血分。恐逼胎下墜也。面舌俱紅者。母子俱生也。若面舌色赤。口中吐沫者。母死子活也。唇舌俱青。口中沫出者。母子俱死也。申氏曰。產婦亦有面舌俱白色。黯無神。氣血俱虛。亦死證也。舌見灰黑。而有青筋。子已受傷。急下其胎。母尚可保。若舌見青黑。子已全死。外證面如黃土色。或乾白。口出白沫。胸悶臍腹冷。胎停不動。甚則胸塞口吐白沫。而有臭穢氣。或指甲亦黑。則母子均不救矣。其他產後辨舌。亦有不同。脈理正義云。產後百脈皆虛。以心主血也。經云。少陰氣絕。則血不行。舌紫黑者。為血先死。亦謂不治。此皆余臨證目擊如此。學者不可不知也。

(丙) 老年

老年氣血衰頹。津液枯涸。一經染病。元氣不能抵抗。邪氣

內潰。故舌與少壯異。凡老年陰陽俱不足者。苔雖白必浮。中有裂紋者。中陽虛者。質腴無華者。濁陰內聚雖潤而非液者。兩畔厚白。中有裂紋。質絳為痰火。質白為痰氣。此苔易脫。脫後色絳。胃陰竭也。脫後色白。肺陰涸也。均為不治。上半有薄白苔。下半如刀切。齊者是生氣不至於胃。上有而下竭。待心。肺胃三經津液盡而死矣。上半無苔而光絳。乃胃火旺。陰將涸也。宜急救其陰。若下半有白厚濕苔。用蒸動腎氣法。十中可救一二。亦有因前醫誤用溫燥之劑。肝陰受燥。其苔必乾白無液。或如豆瓣。厚薄不勻。不可再用。劫陰之藥。若初起厚白苔。服藥後苔脫去。苔根或起。泡或顯紅刺。為痰熱化解。使一脫之後。並無泡刺。而苔質現乾絳。裂紋亦為傷液之徵。宜滋其陰。苔聚於中。兩傍化露。而老黃乾厚。熱傷肺胃。心營受燥也。非紫雪紫實合玉女煎之類。不可如乾厚見黑色。涕涎一條者。結津也。危在頃刻。苔脫後舌上如塗墨者。危。須問曾否食過青菓。山楂。石榴等酸味之物。否則即屬腎氣上泛。而欲氣促痰升之兆。急用救逆回陽之法。如頭汗。面黑等象。已顯是其機已發。不可救藥。

矣。此醫學扶微中語。余屢試驗。不失毫釐。故轉錄之。余治驗一高年陰液大虧。素有肝陽上亢之病。一經溫暑之病。醫者初誤芳燥淡滲。大便不下。身熱增劇。舌黑燥無津。繼用甘寒陰柔。熱退身涼。脈沈弱無力。舌仍乾燥。硬如栗壳一層。口燥不喜飲。大便始終不下已十餘日。小便清長。人體不能動。凡用涼瀉之品。日見沉困。後邀余治。余謂此因初服芳燥。重傷其津。繼用涼潤陰柔。而無助輸運之品。故大便不下。甚則命火亦被熄滅。其腸中宿垢。同藥汁冰伏下焦。以致氣化失蒸騰之職。故仍口燥。舌仍乾黑。而津液不能上升故也。故如此。余用熟地、麥冬、淡苁蓉、以益腎陰。鹽炒黨參、以立中氣。炮薑、肉桂、以溫脾壯命火。大黃、元明粉、以消潤導下。服一劑。大便即下盈斗。下後舌苔仍不退。惟口齒已潤。後改用復脈湯加減五六劑。乾苔脫去。如壳一片。舌質淡紅。而光軟無津。仍用復脈五六劑。則苔漸生。而胃納始動。元氣漸復。此亦為治老年水虧木旺。熱病過涼。立溫潤攻下之例也。

(丁)嬰孩。凡小兒三四歲以下。患溫熱雜病。辨舌與常人畧同。惟產

生至一二歲。其舌有特種疾患。不可不防之。美醫嘉約翰云。小兒之病。
 舌上每有白衣。若初生小兒。舌上白膜裹住。或如石榴子。或遍舌根。哭
 不出聲。若不刮去。其兒必啞。或發驚。先將舌上白膜用指甲刮破。令出
敷之。若出血不止。用髮灰摻之。即止。若小兒舌根下忽有筋一條。絆其舌尖。不能吮乳。或
 舌下總筋上生白膜。連舌尖絆住。用銀針磨尖。輕輕挑斷之。其法用簪
直勒至舌尖下。斷其膜。須仔細下簪。勿穿在總筋之內。及誤傷舌根。及
小舌。為禍不少。挑後拭去血涎。用蒲黃海硝研末。摻之。或陳墨亦可用。
 若初生兒。舌上忽生黃泡出水。此為心脾之火。用大螺螄肉三枚。焙為
慈反五分。共若小兒初生。舌上生白屑。如米劇者。口鼻亦有之。此由胞
胎中受穀氣盛。所謂鵝口是也。用水片一分。煎和吹搽。白粒上。凡小兒舌大腫
 硬。不能轉動。此心火挾痰也。用竹片輕刮拭淨。不可用手按舌根。乃損
 長成言語不正。若舌腫滿口。或脹出口外。難納藥者。用殭蚕芽兒等分
 為末。少許吹鼻中。口自開。頑痰自出。再用筋繞絲綿。蘸甘草湯潤其舌。
 然後用蒲黃末摻之。此皆小兒所特有也。

第六章 辨舌質生苔之原理

章虛谷曰。觀舌質可驗其正之陰陽虛實。審苔垢即知其邪之寒熱淺深。診家直訣云。凡察舌須分舌苔舌質。舌苔雖惡。舌質如常。胃氣濁穢而已。形色簡摩云。舌苔可刮而去者。屬氣分。主六府。若刮而不去。即漸侵血分。內連於臟。全屬血分。與五臟。舌尖上紅粒。細如粟者。乃心氣挾命火真火而鼓起者也。然此皆屬舌質也。至於苔乃胃氣之所薰蒸。五臟皆稟氣於胃。故可藉以診五臟之寒熱虛實也。章虛谷曰。舌苔由胃中生氣所現。而胃氣由心脾發生。故無病之人。常有薄苔。是胃中之生氣如地上之微草也。若不毛之地。則土無生氣矣。又云。苔者如地上之草。根從下生。垢者如地上浮垢。刷之即去。無根者。表分濁氣所聚。其病淺。有根者。邪氣內結。其病深有根之苔。當分其厚薄鬆實。厚者邪重。薄者邪輕。鬆者胃氣疎通。實者胃氣閉結也。吳坤安云。舌之有苔。猶地之有苔。地之苔濕氣上泛而生。舌之苔胃蒸脾濕上潮而生。故曰苔平。人舌中常有浮白苔一層。或浮黃苔一層。夏月濕土司令。苔每較厚。而微黃。但不滿不板滯。其脾胃濕熱素重者。往往終年有白厚苔。或舌中灰黃。至有病時。脾胃津液為邪所鬱。或

因。瀉。痢。脾。胃。氣。陷。舌。反。無。苔。或。比。平。苔。較。薄。其。胃。腎。津。液。不。足。者。舌。多。赤。而。無。苔。或。舌。尖。邊。多。紅。點。若。舌。中。有。紅。路。一。條。俗。稱。雞。心。苔。血。液。尤。虛。此。平。人。之。常。苔。也。周。徵。之。曰。嘗。見。舌。中。心。如。錢。大。光。滑。無。苔。其。色。淡。紫。但。苔。常。遺。滑。餘。無。他。病。又。見。舌。質。通。體。隱。隱。藍。色。餘。無。他。苔。但。患。胃。氣。痛。者。此。皆。痰。血。阻。於。胃。與。包。絡。之。脈。中。使。真。氣。不。能。上。潮。故。光。滑。不。起。軟。刺。是。血。因。寒。而。瘀。也。通。體。隱。藍。是。濁。血。滿。布。於。微。絲。血。脰。也。故。舌。苔。無。論。何。色。皆。屬。易。治。舌。質。既。變。即。當。察。其。色。之。死。活。活。者。細。察。底。裏。隱。隱。猶。見。紅。活。此。不。過。血。氣。之。有。阻。滯。非。臟。氣。之。敗。壞。也。死。者。底。裏。全。變。乾。晦。枯。萎。毫。無。生。氣。是。臟。氣。不。至。矣。所。謂。真。臟。之。色。也。若。血。敗。凝。於。中。而。舌。必。強。硬。而。死。也。故。察。舌。之。吉。凶。則。關。乎。舌。質。也。章。虛。谷。曰。凡。舌。光。如。鏡。毫。無。苔。垢。或。有。浮。垢。刷。之。即。光。者。其。色。紅。活。是。胃。中。虛。熱。色。赤。者。營。中。邪。熱。皆。胃。津。乾。涸。必。多。煩。渴。當。用。涼。血。滋。陰。兼。助。胃。氣。其。苔。可。以。漸。生。若。舌。質。紅。紫。雜。現。而。色。不。勻。營。血。淤。滯。也。苔。垢。雜。色。並。現。或。中。有。邊。無。中。無。邊。有。胃。氣。不。化。也。若。舌。絳。而。光。亮。或。絳。而。不。鮮。甚。至。乾。晦。枯。萎。或。淡。而。無。色。如。猪。腰。樣。者。此。

胃肝腎陰枯極而舌無神氣者也。急宜加減炙甘草湯加沙參玉竹鷄子黃生龜版等類濡潤以救之。若舌本淡白或如煮熟猪肝者此元陽敗胃無生氣如不毛之地故光而無苔必不能進食也。縱服大劑參附後不能生苔或如浮皮此殘燈餘焰必死不治。倘有薄苔漸生則漸思食方為生機。然百中無一二者其有舌本全白如紙毫無紅色不論有苔無苔元陽已絕而死。劉吉人云舌上無苔質光如鏡為胃陰胃陽兩傷胃腸中之茸毛貼壁完穀不化飢不受食之候。完穀傷陰亦有頑痰膠滯胃中痰滯胃中而如茸毛亦不起皆有此候。又有前半光滑無苔後根上有肉瘤兩粒如古肉色者陰虛癆病之象也。如表面無苔而皮內有一塊如錢大或黃或白者正氣不足血液虧虛兼有痰凝之候。

第七章 辨舌苔有根無根之鑑別

周微之云前人只論有地無地可以辨熱之浮沉虛實不知有根無根亦可察中氣之存亡也。地者苔之裏一層也。根者舌苔與舌質之交際也。夫苔者胃氣濕熱之所薰蒸也。濕熱者生氣也。無苔者胃陽不能上蒸也。腎

陰不能上濡也。前人言之晰矣。至於苔之有根者其薄苔必勻勻鋪開。緊貼舌面之上。其厚苔必四圍有薄苔輔之。亦緊貼舌上。似從舌裏生出。方為有根。若厚苔一片四圍淨潔如截。頗似別以一物塗在舌上。不是舌上所自生者。是無根也。此必久病先有胃氣而生。苔繼乃胃氣告匱不能接生新苔。而舊苔仍浮於舌面。不能與舌中之氣相通。即胃腎之氣不能上潮以通於舌也。驟飲誤服涼藥傷陽。熱藥傷陰。乍見此象者。急救之猶或可復。若病勢纏綿日久。漸見此象。真氣已索。無能為矣。常見寒濕內盛之病。舌根一塊白厚苔。如久經水浸之形。急用溫裏。此苔頻退復生。新薄苔即為生機。余亦見寒濕內盛之人。初病舌不見苔。及服溫化之藥。乃漸生白苔。而由白轉黃。而病始愈。又如寒濕在裏。誤服涼藥。呃逆不止。身黃似疸。而舌反無苔。脈象沉細無力。此脾胃氣陷之徵也。水氣凌心。胃陽下陷。忽變無苔。日久即變黯紫也。都元峯苔亦有內熱閉滯致脾氣不行。飲食津液停積於胃。故舌生苔。若脾氣不滯。則飲食運化津液流通。雖內熱未必有苔也。周氏又云。亦有常人胃中風有冷痰。凝血舌上。常見一塊光平。

如鏡又凡有痞積及心胃氣疼者舌苔亦多怪異婦人尤甚又見病困將死之人舌心一塊厚苔灰黃滯黯四面無輔此陰陽兩竭舌質已枯本應無苔而猶有此者為病中胃強能食五藏先敗胃氣後竭也或多服人參無根虛陽結於胸中不得遽散其餘焰上蒸故生此惡苔甚或氣絕之後半月胸中猶熱氣口脈猶動也余又見一腎陰腎陽大虧之人舌質紫紅潤澤無垢近舌根生一塊黑潤厚苔其苔上生緊密黑毛長二三分百藥罔效余用大劑溫腎填陰服多劑黑毛始脫黑苔亦逐漸化盡而愈此腎命大虧濁陰上結而生苔毛腎得溫補命火蒸騰濁陰漸化也

第八章 辨舌苔察時溫與伏熱

吳坤安云凡外邪之入先到衛分衛分不解而後入氣分而營分再不解則深入血分如風熱無濕者舌質白潤無苔或有苔亦薄熱兼濕者必有濁苔而多痰此邪在衛分可汗解之如麻杏薄荷之類如舌苔白厚而乾邪在氣分宜解肌清熱如荊葛翹荷之類白內兼黃仍屬氣分之熱不可用營分藥白苔邊紅此溫邪入肺灼乾肺津不可辛溫過表清輕涼散為

當若氣分。化熱不解。則入營分。此由衛而氣。由氣而營。由營而血。逐層遞進。順傳之徑也。或溫邪由口鼻吸入。上焦心肺先受。而後竟入營分。舌苔亦由白而絳。為逆傳也。邪熱入營。舌質必絳。而燥。惟犀、羚、梔、翹、鮮、大青為妙品。以能透熱於營中也。邪在營分。不解。漸入血分。入血分。則舌質深絳。煩躁不寐。時有譫語。宜急清血分。之熱。如鮮生地、丹皮、金汁、犀角之類。若舌質紅苔白。根帶黃。此熱雖入營。溫濕之邪尚在氣分。流連可冀戰汗而解。若舌紅絳。中仍帶黃白等色。是邪在營衛之間。當用犀、羚以透營分之熱。荆、薄以解衛分之邪。兩解以和之。此由外而內。自上而下。順逆傳經法也。外感溫病。風寒諸感。無不皆然。若伏氣溫病。自裏出表。乃先從血分而後達於氣分。故溫暑初起。舌即絳者。因內挾伏氣。而邪不入氣分。而直窺營分也。宜先清營分之熱。如鮮地、大青、丹梔、豆豉、白薇之類。大抵寒溫自表傳裏。發病即現白苔。而舌質之色如常。無變溫暑之邪自裏達表。初起舌質光紅。雖有浮垢。反而無根。馬良伯云。凡風寒濕諸熱病。始起則舌滑而薄。溫熱暑風。始起則舌即絳色。蓋溫暑病。裏先有鬱熱。故宜清泄。甚或用。

涼切忌。辛溫芳燥。邵仙根云。傷寒邪從肌表而入。以舌之白黃分表裏。而汗下之溫暑從口鼻吸。入以舌之絳白分營衛。而清解之更以舌質之燥潤辨津液之存亡。炳章按。凡伏氣溫暑起病之初。往往舌紅潤而無苔垢。診其脈軟或弦或數。口未渴而心煩惡熱。即宜投以清解營陰之藥。迨邪自營從氣分出而化苔。然後再清其氣分熱可也。若伏邪重者。初起即舌絳咽乾。甚則有肢冷脈伏之假象。亟宜大清營分伏邪。而反現厚膩黃濁之苔。此即內伏之邪外達也。既達於氣分。則從氣分治之。更有邪伏於深沉不能一齊化達者。如前化出之苔已退盡。色亦淡紅。惟口苦或甜黏。其內伏未盡之邪仍留也。踰一二日舌復乾絳。苔復黃燥。當再清之化之。正如抽蕉剝繭層出不窮。秋月伏暑深沉者。屢多此類之症。余前治姚姓婦。伏暑因初病時尚食肉品麥麵。兼服補品。迨熱重胃閉始停。而後身灼熱。胸痞便閉。小溲短濇。因熱逼血室。經水適來。俄頃未淨即止。以至熱入血室。耳聾目閉。神昏譫語。手足癱瘓。便閉溲濇。前醫皆遵熱入血室例治。多罔效。至病勢危殆。始邀余診治。余診其脈弦數搏指。舌底苔灰黑黃。

焦浮鋪苔上。且黏厚板實。舌尖深絳。邊紫兼青。詢其前由。問其服方。參攷現證。為其疏方。遂重用蚕砂。鼠糞。化濁道而通胞門之淤塞。硝黃牙皂。以滌垢攻堅。積地鼈桃仁。逐瘀通血。絡鮮生地。大青葉。羚羊。勾藤。清血熱而熄肝風。鮮菖蒲。天竺黃。豁痰而開心竅。服一劑。而大便下黑垢痰塊成團。成粒者甚多。瘕瘕即定。神志畧清。次晨復診。脈勢已平。而舌苔鬆腐。黑垢滿堆。刮去瓢餘。未減其半。且踰時又厚。繼進桃仁承氣湯。加減服至五劑。舌垢始淨。身涼胃動。調理而痊。按此證。因先病伏暑。挾濕。繼則挾食。再則阻經。停瘀。濕蒸熱灼。便閉溲瀯。邪無去路。又值經來。邪熱竟入血室。經水被熱煎熬。以致凝瘀。淤塞胞門。前醫雖當熱入血室治。然藥性不能直入淤塞之胞門。故皆罔效。證因挾濕。挾食。挾瘀。堆積至重重疊疊。余治以先通胞門。淤塞其血室內之熱亦可同時引導下出。舌苔因化反厚者。此因積藏過多。如抽蕉剝繭。層出不窮者是也。又有濕遏熱伏之證。亦同前狀。初起脈沉濡而數。舌尖絳邊絳。畧淡中根灰白。或灰黃厚膩。日晡熱甚。便不暢。溲短瀯。此為熱伏於內。濕遏於外。伏暑秋瘟秋燥。均多此證。

治法以蚕砂、滑石、萹皮、薤白、化濁宣氣開鬱。鮮生地、豆豉、青蒿、白薇、焦梔、以清透營熱從外達濕化熱透大便自下。小溲亦長。若誤用荊防枳樸反增胸悶乾嘔。若用硝黃妄下則下利稀水。口舌化燥胸悶乾嘔熱亦反增脾胃濁垢反不下。此余屢驗之矣。


辨舌指南卷一

辨舌指南

卷一 第八章 辨舌苔察時溫

二十四

終



彩圖辨舌指南卷二

鄞縣 曹赤電炳章撰述

紹興 周炳堦越銘參校

第二編 觀舌總綱

第九章 觀舌之心法

臨證觀舌。最為可憑。然亦未可執一。正義云。凡見黑舌。問其曾否食酸甜鹹物。因是物能染成黑色。非因病而生也。然染成之黑。必潤而不燥。刮之即退。虛寒舌潤。能染。若實熱舌苔。乾燥。何能染。及耶。凡臨證欲視病人舌苔。燥潤。禁飲湯水。飲後則難辨矣。王秉衡曰。淡白舌苔。亦有熱病。黃厚滿舌。亦有寒症。舌絳無津。亦有痰症。當以脈證便溺參勘。又白苔食橄欖。即黑。酸物食枇杷。即黃。又如燈下看黃苔。每成白色。然則舌雖可憑。而亦未盡可憑。非細心審察。亦難免於誤治矣。其他觀法。再舉於后。

一舌色 凡病人欲察舌之時。宜先診而後食。則苔之厚薄。易分。診而後飲。則苔之滑濇。易辨。至於乾黑之舌。又當以蜜拭其苔垢。然後視其

形色。紅赤者可治青黑者不可治。亦望舌之所宜知也。

二舌質。凡舌質亦有。色如絳紅紫青藍。即其色也。血熱之症。舌質底

色紫。又有大小。如濕熱有痰之症。舌質脹大滿口。迹有齒印。

三舌尖。凡舌尖屬心。如滿舌白苔。舌尖有紅刺。此心火旺。感勿用溫

燥之藥。

四舌心。凡舌四邊有苔。中心則無。或中有直裂。或有直槽。或有橫裂。

皆心胃陰液不足。亦忌溫燥。

五舌邊。苔色與邊齊否。舌邊缺曲如鋸齒者。不治也。舌邊紅者。脾熱

也。舌邊青色一條者。木尅土也。胡玉海云。舌邊肝膽部位。有一點紫泡。

如黃豆大。此熱毒歸臟在左者。重在右者。輕在中間。更輕。其證舌紅面

赤。而兩手見陰脈。或脈來擺搖無根。恍惚難憑者。為不治也。

六舌根。凡根後有無苔。色接續有無大肉癰。亦須注意。

七燥潤。若以手摸之。或滑潤。或燥刺棘手。有看之似潤。而摸之燥者。

有看之似燥。而摸之滑者。

八、變換。劉吉人云。觀其變換與不變換。總之苔黃為正。白次之。無論何症。若用藥當。皆由白而黃。由黃而退。由退復生新薄白苔。此為順象。若用藥不當。則由黃而白。由白而灰。由灰而黑。由活苔變為死苔。此逆象也。驟退驟無。不由漸退。此臨象也。更有氣聚苔聚。氣飲苔飲。氣化苔化。氣散苔散。氣散布苔亦散布。氣凝聚而結。苔亦凝聚而結。氣結於一邊。苔亦結於一邊。故氣鬱之症。苔邊整齊如石。陷之起邊。線內有苔。線外無苔。但紅邊而已。若氣化則布散。由密而疎。散則不似斬然齊一之邊矣。故苔有邊齊如斬者。皆氣聚也。有積滯抑鬱者也。

第十章 辨舌之形容

心者生之本。其經通於舌。其竅開於舌。故舌為心之外候也。察舌質形容。可定內藏之虛實。觀舌苔垢色。可以辨外邪之寒熱。所謂形容者。如舌之軟硬。舌之脹癢。舌之戰痠。舌之歪邪。舌之伸縮。舌之吐弄。是也。皆能辨藏府經絡之寒熱虛實。病之可治與不可治。於此已可判矣。故先錄此例如左。

第一節 軟硬

軟者痿柔也。氣液自滋。硬者強硬也。脈絡失養。有胃氣則舌柔。和無胃氣則舌板硬。舌軟者軟而不能動也。舌紅痿軟難言者。心脾虛也。心清語塞。舌軟無力難言者。營衛不足也。軟而淡紅者。宜補氣血。深紅者。宜涼氣血。赤紅者。宜清涼藏府。紫紅者。宜寒涼攻瀉。鮮紅灼紅者。宜滋陰降火。絳紅而光。痿軟者。陰虧已極。不治之症也。舌萎軟黃燥。腹滿不得睡。將發黃也。聲亂音嘶。舌萎聲不得前者。因誤發其汗也。舌萎人中滿唇反者。脾經氣絕也。在病後乏力之時。舌亦萎軟不能言。養胃益陰則自復也。舌強硬者。如木舌。重舌。腫舌。大舌之類。皆藏府俱熱而心經尤為熱極也。舌忽腫而不硬者。木舌也。舌腫滿口溢。出如猪胞。氣息不得通。硬如木石者。血壅氣滯也。舌木硬者。厥陰病也。舌紅而強硬失音者。死候也。凡紅舌強硬為藏府實熱已極。不如燥火內伏。誤服溫藥。則舌根亦強硬不能言語。或時疫直入三陰。皆裏症實熱。宜苦寒救。舌邊四圍紅色。中間至根有乾硬黑色。如有長小舌。其上有刺者。熱毒堅結大腸也。宜白虎承有痰

者舌灰胖而硬宜豁痰亦有白苔乾硬如砂皮者俗名水此邪熱在表時
津液已乾燥後雖入胃不能變黃宜增液承氣下之下後白苔潤澤者生
凡疫症苔如積粉此火極水化若誤認為寒妄投溫燥其苔愈厚津液愈
耗水不上升二火煎熱變白為黑其堅硬似鐵其厚似甲敲之憂憂有聲
言語不清非舌卷也專用甘寒以充津如五汁飲增液湯之類大抵溫暑
熱症舌硬不語下症為多雜症舌強硬胃氣將絕也如中風入臟則舌難
言傷寒舌短亦為死症皆板硬無胃氣也凡板硬之舌不論何色不治者多
有苔硬如石如繭裂為龜紋刮之不去在舌心者可治滿舌如是者不治

第二節 脹癰

脹者浮而腫大也或水浸或痰溢或濕熱上蘊癰者薄而瘦小也或心虛
或血微或內熱消肉舌腫脹者病在血舌赤脹大滿口者心胃之熱也舌
赤腫滿不得息者心經熱甚而血壅也舌腫大者或因熱毒或因藥毒也
唇舌紫黯青腫者中毒也舌紫腫厚者酒毒上壅心火炎上也或飲冷酒
壅遏其熱也舌紫短圓圍者食滯中宮而又熱傳厥陰也宜即下之如神

志清爽。舌脹大不能出口者。此屬脾濕。胃熱鬱極化風。化痰毒延口也。邪在脾胃。唇口亦腫也。如脹大不能出口。神不清者。病在心脾兩臟也。用六黃磨汁。和八煎劑內。更須參辨苔色。如舌色白滑黑滑者。多由水氣浸淫者。宜通陽利水。黃膩滿佈者。由濕熱鬱而化毒。宜清濕火化毒。白膩黃膩者。痰濁相搏上溢為脹也。宜蠲痰化濁。舌黃脹大滿口者。乃胃府濕熱蘊結不消也。舌紅脹大滿口者。乃心胃俱有熱毒也。紅舌脹出口外不銛者。熱毒乘心也。外用銀針。砭去惡血。以有紅點者。熱毒乘心也。若舌腫耳乾下血不止。脚浮者。六日死。足腫者。九日死。腎絕也。又耳乾舌腫光絳。溺血大便赤泄。足腫者。肉絕九日死。胃絕五日死也。嘉約翰云。舌之腫大。或有出於心。火發炎。或因於疔毒者。或因於過服汞藥而致者。間有舌微腫一伸出。即現齒印者。舌癰者。薄瘦也。舌肉屬心。脾心脾虛則舌瘦癰也。亦須辨其苔色。若淡紅嫩紅者。心血不足也。紫絳灼紅者。內熱動風也。舌乾絳甚。則紫暗如猪肝色者。皆心肝血枯也。舌紫枯癰形如猪肝色。絕無津液。乃不治證也。舌質

不赤中黃無苔枯瘦者乃過汗津枯血燥死證也。舌紅乾癟不能言者亦死證也。舌紅乾癟能言者因證治之或可救也。

第三節 戰痿

舌為心苗其伸縮展轉則筋之所為肝之用也。舌戰者舌顫掉不安也。舌紅而戰動難言者心脾虛也。汗多亡陽者有之。舌挺出振戰者多見於酒客濕熱病神經衰弱者大抵舌戰由於氣虛者蠕蠕微動由於肝風者習習煽動更宜參之舌色如舌色淡紅而戰者氣血俱虛也。嫩紅而戰者血虛液虧也。鮮紅而戰者血液虧肝風內動也。紫紅而戰者肝藏熱毒動風也。

舌痿者舌軟而不能動也。為舌神經麻痺所致亦有暴久之分。如暴痿多由於熱灼故常現於紅乾之舌如深紅者宜清涼氣血紫紅者宜泄肝熱通府氣鮮紅宜滋陰降火色淡紅者宜補氣血若病久舌色絳而痿軟者陰虧已極津氣不能分佈於舌大為不治葉天士云若舌絳而不鮮乾枯而痿者腎陰涸也。宜阿膠雞子黃地黃天冬等治之吳坤安云舌形欲束伸不過齒紫絳

痿軟為肝。腎陰液枯。潤而敗。若其舌色紅澤而光。或其色鮮紅者。屬胃陰乾涸。猶可滋養。胃陰虛谷云。舌本或短。或痿而赤。色苔厚者。為邪閉。色淡白如煮熟猪肝。而痿者。不論有苔無苔。皆為正敗。死不可治。

第四節 歪邪

歪者。斜偏一邊也。瘰癧與偏枯。常見當再辨其色。若色紫紅。勢急者。由肝風發。瘰癧宜熄風鎮瘰。色淡紅。勢緩者。由中風偏枯。若舌偏歪。語塞。口眼喎斜。半身不遂者。偏風也。舌偏向左者。左癱。舌偏向右者。右瘓。宜補氣舒筋。通絡化痰。嘉約翰云。舌伸出有偏於一邊者。乃第九對腦筋壞也。偏右者。則壞右之半面。偏左者。則壞左之半面。而將發半身不遂之病也。

第五節 舒縮

舒者。伸也。伸之無力者。氣虛也。宜補中。欲伸如。有綿帛者。經脈不和。非燥耶。寒也。熱病舌難伸出。伸則頻振。語言不清者。正氣虛弱之險症也。舌出不能收。不能語者。心絕也。舌伸長收緩。面紅煩躁。口渴溺赤者。心經有熱也。舌形堅乾。伸出似有摺紋者。氣盛有大也。若形鬆潤如絮浸水中者。氣

虛有濕也。舌常欲伸出口外者，心有熱。痰舌中脹也。常以舌舐唇者，胃熱而唇燥也。舌伸出長而尖者，熱未甚。尚宜透邪，伸出圓長而平者，熱已甚。急宜清熱。伸舌圓短不能出齒外，熱已盛極，速當瀉火。舌絳欲伸出而抵齒難驟伸者，痰阻舌根，內有肝風也。亦有脾腎氣敗而舌短不能伸者，因脾腎之脈連舌本，其形貌面色亦必枯痺，多為死證。如舌根黃尖白短縮不燥硬而麻木欲伸不能出者，肝風挾痰也。宜熄風化痰，伸而常舐唇者，脾燥也。紅舐者，全舌必紫而兼瘀，臟府為疫毒內攻逼迫，心經所以舌出口外時動不止，或銛上下唇左右口角，或舐至鼻尖，尖不等，皆宜苦寒清熱。瀉府也。偶時伸出弄唇者，中蛇毒也。伸出不收者，痰涎上壅也。若發熱口噤，臨死舌出數寸者，此女勞復陽氣虛極也。陰陽易舌出數寸者，死證也。舌出數寸者，又有因產後與中毒大驚之候也。據證治之，猶可生也。小兒病舌出不能收者，心氣散也不治。若舌枯細而長如絳色無苔，或乾枯紅長而有直紋透舌尖者，陰虧已甚，心氣已絕於內，不能上通舌根，故不顯苔也。必死。若赤紫紅色中尚有黃黑膩苔者，雖有直紋透尖，仍宜作藏府

實熱治之餘如乾紅舌忽瘦而長為心氣絕也亦不治

縮者卷短也舌係收緊不能伸長之謂也凡舌短由於生就者無關壽夭

若因病縮短不能伸長者皆危證也邪陷三陰皆有此證如邪客於少陰

則舌卷而短客乎少陽之絡今人喉痛舌卷口乾心煩客乎陽明之筋其

病支痛轉筋舌卷客厥陰絡者則舌卷唇青卵上縮凡舌短囊縮者屬熱

極舌短囊不縮者屬虛寒舌短而胖者屬痰濕舌本短縮者厥陰外

證必目睛直視男子囊縮婦人乳縮乃藏府熱極而肝血竭也郭元峯云

舌青紫而焦燥或脹大或卷縮者為熱證然寒證亦必卷縮筋脈得寒而

收引也然苔不焦燥為辨凡舌短縮強硬神昏譫語及素有痰病而舌本

硬縮及神昏不語者皆不治舌本縮口噤唇青者小腸府寒也言聲憂懼

舌本卷縮者脾寒受邪木剋土也舌形灰色漸乾縮者死證也舌卷縮如

丹燕唾不得足踝微腫者肉絕死證也顴赤舌短卷者心病也舌卷不能

言者亦心病也汗出不流舌卷黑者心絕也舌苔根黃尖白不甚乾燥短

縮不能伸出者風痰挾宿食也

宜清化劑中加薑汁竹瀝川
貝胆星以化厚痰切忌滋膩垢膩搗去仍

縮者內有所阻。猶可治也。舌縮邊卷者。胃液燥也。湯飲潤之。仍卷者。胃液燥極也。湯飲潤之。即坦者。病去而舌未和也。為可治。舌紅短而有白泡者。心火燔灼。因浮火不入血絡。故有白泡也。霍亂轉筋。舌卷陰卵入腹者。肝血涸也。中熱咽乾。善溺。心煩甚。則舌卷。卵上縮者。厥陰終也。皆不可治。實漢卿云。一人無故舌縮短。不能言。余用白芥子末醋調敷頸項下。即時能言。再服清脾降火藥。復用紫雪丹塗之。愈。陳遠公云。一人舌縮入喉。嚙不能言語者。乃寒氣結於胸腹。乾用人參三錢。白木五錢。肉桂一錢。清水煎服。其舌自舒。此二證一由心脾痰滯結熱。一由心脾虛寒。各有區別。故其治法亦一涼一溫。可不慎乎。

第六節 吐弄

脾主舌本。脾熱則吐舌弄舌。舌伸長而收緩者。為吐舌。乃心脾積熱。水不上濟。舌微出口外。而即收者。為弄舌。屬心脾虧損。兼有微熱。若心火亢盛。腎陰不能上制。所以舌往外舒。肝火助熾。風主動搖。胃熱相煽。舌難存放。故舌如蛇舐。左右上下伸縮動搖。謂之弄舌。小兒總微論云。弄舌者。其證

有二。一者心熱。心繫舌。本熱則舌本乾澀而緊。故時吐弄舒緩之。二者脾熱。脾絡連舌。亦乾澀而緊。時吐弄舒緩之。皆欲飲水。因心熱發渴。脾熱則津液耗。二證雖引飲相似。惟心熱面赤。睡即口中氣熱。時時煩躁。喜冷咬牙。治宜清心。經之熱脾熱者。身面微黃。大便稠硬赤黃色。治宜微導之。不可用涼藥。又不可用下法。若誤下之。則脾胃虛津液耗。又加五心煩熱。面黃肌瘦。變為疳也。馮楚瞻曰。凡舌出長而收緩者。名曰舒舌。微露即收。舌乾腫澀者。名曰弄舌。又曰弄舌者是心。脾結熱。舌絡微緊。時時舒舌。宜瀉黃散徐徐服之。若大病後弄舌者。大出舌如蛇。舐伸縮動搖。唇焦舌乾煩躁。便穢。名曰弄舌。心脾熱也。慎齋用黃連湯。緩緩與服。凡弄舌搖頭者。癇病也。病人喜揚目吐舌者。羊癇也。

第十一章 辨舌之質本

質者舌肉也。本者舌本也。經云。唇舌者。肌肉之本也。平人察舌本即知其脾之氣血。故無苔則審舌之本。色有苔則憑舌之苔也。皆無苔之謂也。如舌質生點刺。舌生瓣暈。舌生星斑。舌生裂紋。及舌中凹。如剝去。及舌生凹。

塊舌苔之直橫皆燥熱傷陰育腸有燥矢久留不去其證多險茲將各狀彙辨如下。

第一節 點刺

苔點四而起療者集毒內伏也。凹而缺陷者藏形萎頓也。苔點如舄者內有蟲蝕也。若苔現桡柳紋隱隱有點者亦屬蟲蝕也。皆宜祛積殺蟲亦有紅舌中更有紅點如蟲碎之狀者熱毒熾甚也。宜苦寒清泄之。若舌絳碎而有黃腐點者此溫熱邪火蘊久不宣蒸腐氣血化為淤濁葉氏云舌絳而有碎點白黃者當生疳也。黃連金汁皆可用。即此症也。滿舌紅點墳起者心火燔灼也。宜即清之。若舌紫腫而起大紅點者乃熱毒乘心以導赤加犀連金汁。舌紅而有紅點者營熱甚也。苔白而帶黑點者亦胃熱也。舌苔青藍雜色如斑如點者此疫癘穢邪也。舌本不紅苔滑者為虛寒舌本赤而乾燥者為實熱面赤舌紅舌邊有一點紫泡如黃豆大或舌邊缺曲如鋸齒者在左屬肝膽者重在右者輕在中間者更輕舌赤起紫泡者心經熱極也。又有舌根白苔板厚如水泡形而兩邊現紅肉兩點者是下

焦寒水甚結。真陽不宣也。如舌黑而灰。或黃而發泡。生蟲蝕腐爛。雖為濕熱。亦屬肝傷。俱為危候。
舌常有刺也。無刺者。氣衰也。刺大者。邪氣實。刺微者。正氣虛。葉天士云。舌上生芒刺者。皆上焦熱極也。當用青布拭冷薄荷水揩之。即去者。輕旋即生者。險矣。章虛谷云。凡舌生芒刺者。苔必焦黃或黑。無苔者。舌必深絳。其苔白或淡黃者。胃無大熱。必無芒刺。或舌尖或舌邊有赤小瘰。是營熱鬱結。當開泄氣分。以通營清熱也。如白滑灰刺。如濕潤刮之即淨。為真寒。假熱。乾厚刮不淨。是脾胃濕熱。困心。肺裏症。熱極也。白苔黑刺。滿舌者。如刮之黑刺。即淨。光潤不乾。渴不多飲。在雜病為真寒。假熱。若刮之不淨。乾燥粗濇。乃表經昏熱。極傳入陽明裏症。始有此舌。又有白苔滿佈。中有硃砂點子者。是暑疫失解。抑鬱心陽。宜涼透開泄之。如厚黃苔燥刺。或邊黃中心焦黑起刺。臍腹脹滿硬痛。乃陽明裏症也。若純紅鮮紅起刺。此胆火熾。營分熱。即用犀角。知丹等清解之。如舌尖獨赤起刺。心火上炎之故。犀角合導赤散以涼散之。若舌紅極而有黃黑芒刺者。熱毒入府也。

調胃承氣湯下之。若舌起紅紫刺，心經極熱而又受疫邪薰蒸而發也。若舌尖灰黑乾燥起刺，是得病後如常飲食乃熱極津枯宿食不消也，宜調胃承氣湯下之。若黑而燥刺，是熱邪已入太陰，宜清火解毒，津液枯竭宜甘露飲。黃而生芒刺黑點者，為熱勢極，黃而瓣裂者，為胃液乾下證尤急也。舌中紅赤點目黃頭汗小便不利者，將發黃也。

第二節 辨暈

苔起瓣暈由藏府實火薰蒸見於溫濕瘟疫等病為多。辨則黑色為多，暈則灰黑為多。辨則一二辨尚輕，三四辨已重，六七辨極重而難治。石室秘錄云：凡舌見黃苔而隔一瓣一瓣者，乃邪濕已入大腸，即用大黃茵陳下之。若舌黃而濕中有花瓣形者，熱入胃府，邪毒甚也。石頑云：極黃而瓣裂者，為胃液乾枯，宜增液湯即下之。亦有黑苔生芒刺及燥裂紋隔瓣者，先用青布蘸薄荷湯拭潤，以生薑切平擦之，擦去隔瓣，看下瓣底舌質紅者可治，宜即下之。若舌質俱黑為不治矣。舌黑腐爛者，心腎俱絕，更不治。暈則一暈尚輕，二暈則重，三暈必死，亦有橫紋二三層者，與此相同，宜急瀉。

火解。毒急下存陰。服至灰暈紋退淨。則氣津血液漸復。可愈。凡灰色苔起深黑重暈者。溫熱疫毒傳徧三陰也。熱毒傳內一次。舌增灰暈一層。最危之症。急用涼膈散大承氣湯等下之。凡舌有純灰色。中間獨兩暈黑者。亦瘟疫熱毒將入腎也。亦有舌根淡紅。中有紅暈一團。而弦又純黑者。乃心包絡蘊熱後受邪火二火相逼。故現此舌。宜即下之。亦有舌邊黑暈二重。而中心紅者。乃陽明熱毒傳厥陰心胞。亦當急下。若舌苔上見圓暈分二三色者。乃燥熱內結。燥糞不下之候。其證必險。

第三節 星斑

星者較點大也。亦屬藏府血分熱也。凡純紅舌而有深紅星。乃藏府血分皆熱也。燥火疫毒及實熱症。誤用溫燥藥。皆有之。吳坤安云。舌現紅星。此因熱毒乘心。外證必神昏詁語。宜用苦寒急瀉。其陰狂亂者。非川連金汁不解。石頑云。紅舌中起紅星。心包火炎也。消膈散主之。若舌淡紅尖起紫色。蓓蕾星點。乃熱毒中心血也。時疫酒濕梅毒等證。皆有之。宜犀角大青銀翹金汁等解之。舌紅而起白星點者。乃心火有邪也。若紅舌上起白星。

點如珍珠者。乃火極水化之象。較之紫赤黃苔上芒刺者。更重。瘟疫多見。此舌即宜解毒清泄。亦有冬月傷寒。白苔嘔惡。誤用白虎。以致脈伏舌苔。成圓圈如白豹紋者。用正氣散。加薑桂數服愈。若舌紅而有黑星點者。乃胃熱已極。將發癰疹之證。大抵舌上星點鼓起者。皆心火胃熱也。在兩旁主肝胆熱。在尖主心熱。淡而陷下者。胃虛也。在小兒為有滯有蟲。正義云。凡紅舌中見紫斑者。將發斑也。宜元參升麻湯。斑已見。宜化斑湯。舌淡紅中見紅赤斑點。將發黃也。章虛谷云。舌紅極有紫斑及紅斑。如徧身發斑者。陽毒入心。宜人參白虎湯加犀連。若舌渾紫滿舌有紅斑。為酒毒內蘊。濕中生熱。宜化斑湯。消斑清黛飲。石頑云。舌紫中有紅斑。或紫而乾黃紫而短縮。俱宜涼膈散下之。何報之云。若酒毒內蘊。舌必深紫而赤。或乾涸若淡紫而帶青滑。則為寒證矣。須辨。若白苔黑斑。舌如刮之。即淨者。為濕熱微也。刮不淨者。為藏府皆實。熱陰液欲竭也。即以苦寒合甘寒救陰。舌見紫斑。身疼惡寒發熱。腮赤者。將發斑也。

第四節 裂紋

平人之舌無紋也。有紋者血衰也。紋少紋淺者衰之微。紋多紋深者衰之甚。舌生橫裂者素體陰虧也。舌生裂紋如冰片紋者老年陰虛常見之象也。淡白舌有髮紋滿佈者乃脾虛濕侵也。舌紅露黑紋數條而苔滑者水乘火位寒證也。舌淡紅中見紫黑筋數條肝經寒證也。全舌絳色無苔或有橫直鱗紋而短小者陰虛液涸也。舌現藍紋者在傷寒為胃氣衰微在雜病為寒物積滯中宮碎裂者血痕傷跡也。舌衄與抓傷當辨。凡有傷痕血跡者必問曾經抓挖否。不可見有血而使認為枯證也。如裂紋出血者血液灼枯也。此因內熱失治邪火熾甚者有之。宜急下存陰。如舌尖出血乃手少陰心經邪熱壅盛所致。宜三黃瀉心加犀角治之。凡舌見裂紋斷紋如人字川字文字及裂如直槽之類雖多屬胃燥液涸而實熱內逼者亦有之。急宜涼瀉清火中有裂紋者多屬胃氣中虛忌用寒涼宜補陰益氣間有本無裂紋經下後反見人字紋者此為腎氣凌心宜納氣益腎。若舌根高起紫黑如莖中露人字紋深廣者胃有積也。若舌紅而開裂紋如人字者乃邪初入心宜石膏黃連以解之。

陳香軒治一農人傷寒數日寒熱交作自汗如雨脈虛神倦舌

白滑分兩岐。如刀割。已任偏。有陰症。誤服涼藥。古見人字。陰證。候。用涼藥。舌赤。亦現人字。紋如舌。軒醫案是也。舌紅潤。而有黑紋。為厥陰之寒。候若舌純紅。乾燥。中露黑紋。兩三條。為火極似水。一帶純黑者。俱不可治。舌黃。如有虎斑紋者。為氣血兩燔之候。急宜清泄之。舌紅赤。苔膩厚。而裂紋者。藏府實熱也。即宜苦寒泄熱。如無苔無點。而裂紋者。陰虛火炎也。宜苦寒兼育陰。舌紅極。而裂紋燥熱入肝也。宜清涼兼下。凡舌絳光燥。裂紋為陰液大傷。但裂不光。為胃陰不足。痰熱凝結。若舌色絳紅。邊尖破碎。舌有血痕。而痛者。此陰液大虧。心火上熾也。宜費氏大澤湯。西洋參生冬。龜版。丹皮。柏子仁。茯神。蛤粉。石膏。虛心。竹茹。藕汁。主之。舌大赤裂。大渴引飲者。上消之證也。

第五節 凸凹

凡舌起燥而凸者。多見溫毒時疫症。多腸胃集毒。內伏急宜涼瀉。速攻其毒。若凹陷而有缺點者。有虛有實。實者。舌間先起糜點。糜脫去。則現凹點。虛者。由胃陰中竭。氣盛則凸。氣陷則凹。餘如微點性潰。潰則舌上乳頭縮小。成凹。亦有舌生瘡。久蝕成穴。屢服涼劑不效。用黑錫丹以鎮浮陽而得。

瘡。舌生瘡者。上焦熱也。舌生瘡。裂破引唇。揭赤者。心藏熱也。舌黑中爛。四
陷者。不治。舌中剝蝕。邊有膩苔者。濕痰停積也。更有紅點坑爛。凸似蟲蝕
草者。乃水不濟火。熱毒熾甚也。

第六節 直橫

合病。舌則直分。二三路者。以表裏分。中間為裏。兩邊為表。左主肝脾。右主
脾胃。併病。舌則橫分。兩三截者。以三焦分。尖為上焦。中為中焦。根為下焦。
再辨其顏色。可以決其寒熱虛實也。如傷寒邪入胃經。則白苔中黃。邪中
少陰。則白中變黑。若滿舌一色為一經症。邊與中間兩色俱傳經證。若從
根至尖直分兩路者。是合病與夾陰寒證舌也。合病則白中兼兩路黃。夾
陰則白中兼兩路黑。潤及灰色也。若從根至尖橫分兩三截者。是併病。舌
也。合病者。一邪而傷兩經也。或雖由此經傳彼經。而仍是寒邪。謂兩經合
病於一邪也。併病者。此經寒邪。蘊為彼經熱病。或一經而有寒熱之二病。
謂兩邪合併於一身也。故尖白根黃。尖白根黑。為併病。以上下焦分。若半
苔灰滑者。為半表半裏證。白苔多而滑者。黃黑苔少者。表證多也。尚宜

和解。若黃黑苔多而白苔少。或生芒刺黑點乾燥者。裏證多也。必下無疑。雖中心黃黑而潤邊仍白者。此表證未盡。風寒尚未全化熱也。傷寒則大柴胡湯而解之。溫熱時疫則涼膈散。或白虎合承氣攻下之。張石頑曰。中間一路舌質潤苔黑燥兩邊或黃或白者。此因素有畜血正氣內虛邪氣外實。黃則調胃承氣邊白則大柴胡湯。若中間一路黑滑薄苔兩邊白滑。此表裏俱虛胃中雖有留結。急宜附子湯溫之。凡黑苔為凶。因心氣為痰血所阻。故見此舌。邪氣內潰更神速矣。

第十二章 辨舌之神氣

通俗傷寒論曰。舌色如硃柿。或如錦面。或如去膜腰子。或飲棗如栗子肉。或乾枯細長。而有直紋透舌尖者。病皆不治。更有舌質已枯。生氣將絕。而舌質上面反罩一層苔色。潔白似雪花片。呆白似莖腐渣。或如嚼碎飯子。眇白兼青枯白而起糜點。視其舌邊舌底必皆乾晦枯痿。一無神氣。乃舌質之壞。臟氣絕也。病必不治。張景岳云。黑舌連地。灰黯無神。此其本原已絕。死無疑矣。若舌心焦黑。質地紅活。未必皆為死證。陽實者清其胃火。火

退自愈。亦有元氣大損而陰邪獨見者。其舌色黃黑。真火涸竭者。其舌亦乾焦。此腎中水火俱虧。原非實熱之證。但察其神氣脈色。自有虛實可憑。而從補從清。反如水炭矣。故凡焦黑乾澀者。尚有非實火之證。再若青黑少神。而潤滑不燥者。則無非水乘火位虛寒證也。若誤認為火。苦寒一投。則餘燼隨滅矣。凡見此者。但詳求脈證。神氣以定寒熱虛實。亦不可以其焦黑斷熱。言清火也。茲將舌之神氣分淡濃深淺榮枯老嫩為四節。臚舉如左。

第一節 淡 濃

舌色本紅。淡紅者血虛也。淡紅無苔。反微似黃白。苔者氣燥不化液也。淡紅兼青者。血分虛寒也。婦人子宮冷者。舌色亦多青。胎初死腹中。舌亦見淡青。若平素有痰。必有舌苔。其心虛血少者。舌色多淡紅。或淡晦無神。邪陷多危。若舌質淡紅無苔者。熱初入陰分也。紅而濃者。氣不化津也。舌質淡紅無苔。中有直溝如刀背印成者。陰津元氣皆虛也。舌淡白者。氣分寒有水。白而有髮紋者。多濕。淡白而青者。寒深。淡黑者。氣血虛寒。紅之濃者。

絳也。舌尖絳者。心火上炎也。舌根絳者。血熱內燥也。通絳無苔。反似有苔。粘膩者。血熱又挾穢濁也。若絳而無苔。亦屬陰虛。更有病後絳舌。如鏡發亮而光。或舌底噬乾而不飲冷。此腎水虧極也。唐烈三云。大紅舌。色無苔者。是心火之色浮越於外。盛極將衰。欲化灰也。若舌色純紅。必腎氣素虛之人。無他症。而忽現此舌者。宜用附子引火歸原。又有瘟疫將發之時。舌現純紅。乃熱蓄於內。而病將發也。不問何經。用透頂清神散治之。若絳而深紫。而乾晦者。肝腎內竭也。紫而濃者。熱傷陰液也。紫潤而暗者。中腕瘀也。紫而專黑者。絡瘀化毒。血液枯涸也。舌本無苔。隱隱若摻煙煤者。若兼之煩渴。乃平素胃燥。舌也吸煙體多有之。不渴而肢冷也。為陰症。舌光黑苔者。腎水凌心也。

第二節 深淺

諸色深者邪實。諸色淺者正虛。赤為熱。赤之深者實。熱赤之淺者虛。熱青為寒。青之深者實。寒青之淺者虛。寒舌明潤。而或赤。或青。則生枯暗之淺者。雖病輕而當死。舌赤者。心之正色也。赤者。火之色也。乾紅。火之煙也。赤

黑相雜。則為紫色。水剋火也。火少甚。則舌尖起刺。火之熾也。火亢甚。則舌中焦刺。深赤者。為太過。若硃紅。喜熱。熱飲者。為龍雷之火。上炎也。淺紅者。為不及。深而紫者。血分熱。深青者。瘀血疼痛。深赤而黑者。熱極。深黃膩厚者。大熱也。淺黃膩薄者。微熱也。劉吉人云。又有似白非白。如畫工以胭脂調粉者。為雪青色。亦有深淺二種。深者如雪。青抗紛色。此乃暑熱二邪已入血分之候。淺者如雪。青湖綢色。此乃熱邪入營初候。此皆類似薄白。但舌微點者。故以雪青色名之。為邪熱入血分必由之。如舌質深紅。如紅蘿蔔。苔但人多以白苔視之。多誤作寒治。故特提出。如舌質深紅。如紅蘿蔔。乾有鹽霜者。此乃熱邪深入。久留。候服攻燥之藥。胃陰大傷之候。

第三節 榮枯

榮者。有光彩也。凡病皆吉。枯者。無精神也。凡病皆凶。榮潤則津足。乾枯則津乏。榮者。謂有神。神也者。靈動精爽。紅活鮮明。得之則生。失之則死。明潤而有血色者。生。枯暗而無血色者。死。凡舌質有光有體。不論黃白灰黑。刮之而裏面紅潤。神氣榮華者。諸病皆吉。若舌質無光無體。不拘有苔無苔。視之裏面枯晦。神氣全無者。諸病皆凶。凡病初起。舌即乾者。津竭可知。病

久而舌猶潤者。胃氣尚存。望之若乾。捫之却潤。其色鮮紅者。濕熱蒸濁也。色紫而暗者。瘀血內蓄也。望之若潤。捫之却燥。其苔白厚者。氣濁痰凝也。苔白而薄者。氣虛傷津也。

第四節 老嫩

凡舌質堅。飲而蒼老。不論苔色白黃灰黑。病多屬實。舌質浮胖兼嬌嫩。不拘苔色灰黑黃白。病多屬虛。舌圓大。碎嫩。其質紅潤者。皆屬心經虛熱。病尚可治。舌枯小。捲短。其質焦紫者。皆屬肝腎陰涸。病多速死。若舌本無苔。而舌皮光薄。且紅白柔嫩。宛如新生。望之若有津。唾抹之燥涸殆甚者。此因妄汗。吐下。走亡血液所致。雖不板硬。亦死不治。若舌紅色柔嫩。望之似潤。而實燥乾者。數行汗下。津液告竭也。病多不治。如淡紅嫩紅。白中帶紅。是溫邪之輕證。初起微寒。繼則發熱不已。口渴甚者是也。宜柴苓梔翹等清解之。舌心絳乾而老。乃胃熱上燥。心營宜清。心胃舌尖絳乾。乃心火上炎。宜導赤散以瀉其府。餘如黃苔亦有老嫩之不同。劉吉人云。老黃色為胃陽旺盛之候。若厚腐堆起。此胃中飲食消化腐濁之氣上達之候。為濕

溫化熱之始。濕熱傳入陽明之候。黃如炒枳。壳色為胃。陽盛極。陽亢陰虛。之候。胃氣欲傷。胃汁乾槁。故苔色如枳壳。炒過狀。以其苔色乾枯不潤澤也。嫩黃色者。由白而變為黃。乃胃陽初醒之吉兆也。為飲食消化腐濁初生也。牙黃色者。為胃中腐濁之氣始升也。牙黃無孔。謂之膩苔。中焦有痰也。稜心紙色苔。雖黃而兼灰青。此傷風初候。或陽明抑鬱。則苔無正色。當舒氣化鬱。黃如粟米顆粒分明。此謂胃陽太旺。胃熱之候。黃如蠟。數濕溫痰滯之候。

第十三章 辨舌之津液

夫腎主津液。內藏府。經繫舌本。外應病症。故察津液之潤燥。可知胃氣之盛衰。察津液之滑濇。可知病氣之寒熱。其他如腐膩。可辨津液與濕濁。糙粘可辨穢濁與痰涎。此四者。為察津液之要綱。茲別列如下。

第一節 潤燥

滋潤者。其常。燥濇者。其變。潤澤為津液。未傷燥濇為津液。已耗。濕症舌潤。熱症舌燥。此理之常也。舌色紅潤。屬表。屬陰。屬寒。屬虛。舌燥。有苔。屬裏。屬

陽屬熱。屬實。無論潤燥。大抵有苔垢者。濕病為多。無苔垢者。熱病為多。然亦有濕邪傳入血分。氣不化津。而反燥者。如熱症傳入血分。而舌反潤。亦有誤用燥藥。津液被劫。逼迫而上。胃陰不能下濟。舌反潤者。何報之云。凡脾胃有痰飲水血。則舌多不露燥象。不可誤認為寒也。凡舌苔不燥。自覺悶極者。為脾濕盛也。張石頑云。脾胃有痰飲水血者。舌多不燥。不可因其不燥而延緩時日。致誤也。若陰虛夾食。亦黃而不燥。總宜即下。但下法微有分別耳。凡發熱內夾痰血者。舌心多黑潤。不可誤作陰症治。凡舌絳而潤。為虛熱。舌絳而燥。為實熱。舌絳而光亮。為陰液不足。舌無苔而乾燥者。腎藏不足。津液虛極也。舌中心黑厚而乾燥者。謂之焙舌。邪傳少陰。熱甚津枯也。口乾舌燥而渴者。少陰病也。舌上苔。津液乾燥。毒邪傳裏也。舌白者。陽氣虛不能化津。上潤也。白而乾者。津液已枯。雖有表邪。宜作裏治。舌黃燥。下利不渴。胸中實。下不止者。死證也。腹滿口乾。舌燥者。腸間有水氣也。如潤滑。黃色苔者。為太陰寒化也。焦燥不渴者。陰液枯槁也。舌苔黃燥。若足冷。脉沉。非純陽症。切忌硝磺。無病舌紅而潤。偶見紅心點者。將欲發。

黃也。凡乾燥之舌。皆屬熱毒亢甚。胃陰欲竭之勢。切忌溫燥。淡滲傷陰之品。必須以存津為先。若燥而垢者。痰毒甚也。燥而黃者。胃熱極也。燥而黑者。熱極而陰竭也。若全舌黃黑積滯。或乾焦皸裂芒刺者。實熱也。宜清涼之。苔黑而燥。為痰熱結胸。苔黑而潤。為虛寒夾濕。灰黑苔為濕食停滯。若初病發熱胸悶。偏舌黑色而潤。外無險惡情狀。此胸膈素有伏痰也。即用薤白桂枝半夏一劑。黑苔即退。或不用桂枝。即枳殼桔梗亦效。唐烈三云。凡舌黑如淡墨。不分燥潤。總屬腎水尅心火。陰盛陽衰之候。宜溫補之法。若久病舌起煙煤。為胃虛液涸。亦有舌無苔而有如煙煤隱隱者。不渴肢寒如口渴煩熱而燥者。平時胃燥也。不可攻之。若燥者宜甘寒益胃。若不渴肢冷而潤者。知夾陰病也。宜甘溫扶中。若黑燥而中心厚苔者。為脾燥腎竭。急以鹹苦下之。若舌黑望之雖燥而生刺。但渴不多飲。或不渴其邊或有白滑。其舌本淡而潤者。亦屬真寒假熱。治宜溫補。其舌心並無黑苔而舌根有黑苔而燥者。熱在下焦也。宜即下之。若舌本無苔。惟舌尖黑燥為心火自焚。不可救也。若全舌燥苔由舌邊漸漸潤至舌心者。為病退佳。

兆大抵辨舌之法。不論黃白灰黑。先宜區分燥潤。及刮試堅鬆。以定胃腸津液之虛實。若無苔而舌色變幻多屬心腎虛證。或肝膽風火證。甚則藏府絕證。

第二節 滑濇

滑者。津足。捫之而濕。濇者。津乏。捫之且澀。滑為寒。寒有上下內外之分。濇為熱。熱有表裏虛實之辨。滑苔者。主寒。主濕。也有因外寒而滑者。有因內寒而滑者。全舌淡白滑嫩。無點無縫。無餘苔者。虛寒痰凝也。如邪初入裏。全舌白滑而浮膩者。寒滯中宮。胃陽衰也。若全舌白而有點花。辨裂積沙等苔者。真熱假寒也。古苔刮不淨。底色却隱紅。多刮欲嘔。重刮則沙。白滑者。風寒濕也。滑而膩者。濕與痰也。滑膩而厚者。濕痰與寒也。惟薄白如無。則虛寒也。但滑膩不白者。寒濕與痰也。兩條滑膩者。非內停濕食。即痰飲停胃也。白浮滑薄苔刮去即還者。太陽表症受寒邪也。白浮滑而帶膩。帶漲刮之有淨有不淨者。邪在半表半裏少陽症也。王肯堂云。如舌上滑苔者。不可下。是邪未全化熱。猶帶表寒故也。及其邪傳裏為熱。則舌上

苔之不滑而滑。滑也。舌上白苔而膩滑。故逆短氣者。痰飲也。飲而口中
津液。舌上苔滑者。肺寒也。舌上無苔而冷滑者。少陰中寒也。藏結舌上白
苔滑者。難治也。舌色淡紅苔薄而滑者。內寒也。舌色深紅苔厚而滑者。外
寒也。苔黃而滑。目黃頭汗。齊頸而還。小便不利者。必發黃也。舌黑而滑者。
水極似火也。黑舌俱係危證。惟冷而滑如淡墨然者。乃無根虛火。可以化
痰降火治之。若黃苔光滑。乃無形濕熱中虛之象。

滑為熱。苔薄而滑。舌淡紅者。虛熱也。苔厚而滑。舌深赤者。實熱也。苔白而
滑。熱漸入裏也。苔轉黃膩。深入胃也。舌白粗滑。兼有朱點。罅裂紋之苔。粗
則不光澤。朱點者。顯其藏府有白乾膠焦燥滿苔。刮不脫。或脫而不淨者。
熱。罅裂紋多。因候服溫藥之故。有白乾膠焦燥滿苔。刮不脫。或脫而不淨者。
刮去垢泥。後底子仍留污質。膩滑不見鮮紅。皆裏熱結實也。又有其白苔
在舌如面上。傅粉刮之多垢。其白色與舌為兩物。是實熱也。成無己云。舌
上白膜白滑如苔。甚則或燥澀黃黑。是邪熱淺深之別也。若舌苔乾滑如
雪者。脾熱也。舌赤明潤苔厚燥滑者。形氣俱有餘。舌淡紅枯暗苔薄
冷滑者。形氣俱不足。舌乾口渴苔不滑而滑者。邪傳厥陰也。嘉約翰

云大抵初起白苔而後乾燥或粗濇或硬漸變黑色者重也更有血枯而津液不清及不能改換戾氣則遺毒而致病者舌亦乾濇此險症也餘如溫暑之證其舌紅乾內藏發熱及瘡痘者其舌亦多乾濇總之口乾者舌汁少也由此而推而舌乾濇者即知五藏內津液少也凡病舌先乾而後漸潤者輕舌先潤而後乾枯者重

第三節 腐膩

腐者無跡揩之即去為正氣將欲化邪膩者有形揩之不去為穢濁盤踞中宮劉吉人云腐與膩不同腐者如腐渣如腐筋如豆腐堆鋪者其邊厚為陽有餘能鼓胃中腐化濁氣上升故有此象膩者則中心稍厚其邊則薄無毛孔無顆粒如以光滑之物刮刮一過者亦有刮而不脫滿積而乾而舌本尚單一層黏涎此謂厚膩之常苔為陽氣被陰邪所抑必有濁濕痰飲食積瘀血頑痰為病宜宣化一為陽氣所餘一為陽氣被抑蓋厚腐之苔無寒症由胃陽上蒸濁氣上達故苔腐厚忌用溫燥宣化之劑尤忌發表宜清降導下或中有直槽氣虛不能運化之故宜補氣不得因苔色

尚白而溫表之宜燥之犯之必變灰暗不可不知也厚腐雖由胃中腐濁
上泛然尤有膿腐霉腐之別如舌上生膿腐苔白帶淡紅粘厚如瘡膿凡
內癰多現此苔肺癰及下疳結毒多白腐胃癰多黃腐肝癰多灰紫腐若
霉腐滿舌生白衣為霉苔或生糜點如飯子樣謂之口糜此由胃體腐敗
津液悉化為濁腐蒸騰而上循食道上泛於咽喉繼則滿舌直至唇齒上
下顎皆有糜點其病必不治矣上參通論傷寒論醫原云此因胃腎陰虛中無砥

柱濕熱用事混合薰蒸證屬不治

苔黃而膩為痰熱濕熱黃膩而垢為濕痰初結府氣不利及食滯滑厚而
膩為熱未盛結未定宜清下之黃腐苔如豆渣炒黃堆鋪者下證也白滑
而膩者濕濁與痰也滑膩厚者濕痰與寒也滑膩不白為濕痰兩條滑膩
非內停濕食即痰飲停胃舌苔黑而濕滑者臟結證也劉吉人云黃苔無
孔而膩水黃舌如雞子黃白相間染成之狀此黃而潤滑之苔為痰飲停
積溫濕正候或為濕熱病而有水飲者或熱傷胃陰誤服燥藥變生此苔
者宜以脈參斷

第四節 糙粘

糙者穢濁也。粘者痰涎也。苔白如糙，石糙手者，此燥傷胃汁，不能潤舌，腎氣不能上達之候，亦有清氣被抑，不能生津者。如舌苔黃黑相間，如鍋焦黃色，摸之刺手，看之不澤，如胃中津液焦灼，舌乾口燥之候，然亦有陽氣為陰邪所阻，不能上蒸，而化為津液者。當以脈證分別斷之。凡黃苔有質地而起，濁腐而粘者，邪已結裏，黃濁愈甚，則入裏愈深，熱邪愈結，焦黃則熱甚，宜下之。平人舌上有有粘黑苔垢，拭之不淨，經久不退，且口甜氣穢，便是胃脘發癰之候，宜涼膈散下之。若津液如常，口不燥渴，身發熱而苔白滑，追寒化熱，則舌苔不滑而枯，以熱耗津液，糙者津液已燥也。若舌燥苔漸厚，是邪熱入胃，挾濁飲而化火也。此時已不辨滋味矣。追厚苔而轉黃粘，邪熱化火，已入陽明胃府。若熱甚，失治，津液漸枯，則舌苔黑色，胃火已甚也。若擦去厚苔，而舌底紅色者，火灼津虧也。此皆表邪傳裏，由津液多少之變也。

第十四章 辨舌之苔垢

苔者。如地上之草。根從下。生垢者。如地上浮垢。刷之即去。無根者。表分濁氣所聚。其病淺。有根者。邪氣內結。其病深。有根之舌。又當辨其無病常苔。及病時所變。有無食物。觸染與苔之偏全。與厚薄。偏者。邪結一藏。全者。苔全鋪滿舌也。有虛有實。厚者。邪重。薄者。邪輕。及化退先後。鬱滯內結。然後參以脉證。則寒熱立判。虛實可辨。茲將各節列舉於左。

第一節 常變

常者。舌苔始終一色。不拘白黃灰黑。即有厚薄滑濡乾潤濃淡之不同。總屬常苔。變者。如苔色一日數變。或由白而黃。由白變黃。以嫩黃色為順。或由黃而黑。或乍有乍無。乍赤乍黑者。皆為變苔。感變緩變者。吉。暴變驟變者。凶。欲知其變。先察其常。如平人無病常苔。宜舌地淡紅。舌苔微白。隱紅。須要紅潤。內充。白苔不厚。或畧厚有底。然皆乾濕得中。斯為無病之苔。乃火藏金內之象也。所謂變者。有因感觸而變。有因得病而變者。有因病中誤藥而變。感觸及因病而變者。如陰虛火旺之人。平時舌質淡紅。無苔。偶因用力過度。或行路太急。則舌質驟變深紅。或常舌淡紅。素不飲酒。而強飲至醉。則舌

亦變深紅。甚則紅紫。或平時舌淡紅無苔。在早起。食物未進之前。亦有淡薄白苔。一層食後仍退者。亦有平時苔潤。在卧時口不緊閉。則醒覺後舌必乾燥。因腎系蒸騰之氣液隨口開而外出。故舌乾燥也。亦有在惹厭之時。舌小而尖。痰阻胸膈之時。舌胖短而潤。在暈絕並停呼吸之時。舌之熱度減少。在霍亂吐瀉時。舌之熱度更極少。並其呼吸亦稀。在熱病熱退後。再用涼降藥太過。舌色先青而後黑潤而冷。呼吸氣亦稀。而寒新病血足者。色或鮮紅。久病血枯者。色必淡白。周雪樵云。血熱而多。則舌色紅。血寒而少。則舌色淡。此皆余之經驗也。利濟外乘云。無病之舌。形色各有不同。有常清潔者。有稍生苔層者。有鮮紅者。有淡白色者。或為緊而尖。或為鬆而軟。並有牙印者。或當伸出之時潤而軟弱。或收束緊時而成尖鋒。此因無病時各有稟體之不同。故舌質亦異也。其他如常人胃氣現於舌上。亦必有淡白薄苔。一經感寒。白苔必滑。舌質淡紅。傷暑傷熱。舌質必紅。即或質上有苔垢。亦必薄白。然亦有無病常見白厚苔者。多裏滯脾虛濕勝也。有病而苔不顯者。多中虧胃枯液涸也。病本無苔而忽有者。胃濁上泛。

也。病本有苔而忽無者。腎陰將絕也。苔之變色。亦有因誤藥而致者。如唐笠三云。常人舌上必有薄白苔垢。俗醫誤用消導藥。以致光赤無苔。必須調養胃氣。至漸能思食。則白苔亦漸生。余常見久病厚苔滿舌者。一用消攻藥。忽然退去。光而且燥。乃胃氣漸絕之徵。劉吉人云。如白如銀色者。謂光亮似銀。此熱症誤補之變苔也。白如旱煙灰色者。不論潤燥皆熱症。誤燥之變苔也。白如銀錠底者。謂有如銀錠底式。此因熱病誤補。誤燥。津液已傷。元氣欲陷。邪將深入之候也。白如腐渣堆積者。此因熱病誤燥。腐濁積滯胃中。欲作下症也。如中心開裂。則為虛極。反似實症之候。宜補氣養胃。更參脈症分別之。又如婦人病傷寒。舌最易生黑苔。不得遽以為凶。若內有瘀血。舌即轉黑。雖有內熱而不遽生芒刺。若瘀血兼挾痰水。則苔灰黑。有煙癰之人。苔亦常帶灰黑。糙刺。此非內有真熱。乃肺胃津傷耳。凡見灰黑之苔。無硬刺者。必須兼用行血。若火症熱甚。現此苔。必有神昏譫語。灼熱便利。症狀無寒熱者。必胸膈有一塊結熱。內煩而夜不安眠也。

第二節 觸染

林慎庵云。凡臨症欲視病人舌苔。必須禁飲湯水。余謂亦有未然。若灼熱液涸之人。舌乾焦黑。糙舌縮口內無津。必須先潤以湯水。其口能開。舌可舒伸。苔之燥潤。糙粘。須以指摸為準。若舌本紅白。偶食酸甜等物。皆能染成黑色。非因病而生也。又如食枇杷白苔。則成黃色。食橄欖則成黑色。然染成之色。必潤而不燥。刮之即淨。如虛寒舌潤能染。若舌苔乾燥。實熱之證。亦不染也。章虛谷云。有黃白苔垢。而食酸味。其色即黑。尤當辨其潤而不燥。又如燈下看黃苔。亦似白色。凡吸煙之人。無病常見燥苔。一經染病。不拘白苔黃苔。必兼灰黑。或兼裂紋。故臨診之時。先須問其吸煙與否。常苔染苔。斯可攸分。爰吸煙之人。上焦皆燥。痰中焦皆積滯。下焦則寒濕也。其熱在府。其虛在藏。且脈象便尿。亦與常人不同。雖然。我民國政府煙禁森嚴。吸食之人。漸次絕迹。然於診斷上。仍須備具一格耳。餘如因受事物感觸。舌亦變色。宜參前節常變互攷。

第三節 全偏

全者。苔鋪滿地也。為濕痰滯中偏者。其苔半佈也。有偏內偏外偏左偏右。

之分。凡偏外者。外有苔而內無也。邪雖入裏而尤未深也。而胃氣先匱。偏內者。內有苔而外無也。裏邪雖減。胃滯依然。而腸積尚存。及素有痰飲者。亦多此苔。偏左滑苔為藏結。邪併入藏。最為難治。偏右滑苔為病在肌。肉為邪在表。表半裏再看苔色。以分表裏。白色多表證。宜和解。黃黑灰色多。及生芒刺黑點裂紋。皆裏熱已結。宜和解兼下。又有從根至尖直分二三條為合病。從根至尖橫分二三截為併病。已見前橫直中。茲不再辨。又如邊厚中薄。或中道無苔者。陰虛血虛也。中道一線深陷極窄如隙者。胃痿也。舌根高起。累累如莖中。路人字紋深廣者。胃有積也。舌中小舌者。傳變危象也。舌有中道一條。或拇指大黑潤浮苔兩邊。或黃或白者。兩感證也。石頑曰凡舌苔半黃半黑。或半黃半白。或中燥邊滑。或尖乾根潤。皆為傳變之邪。寒熱不和之候。舌有根黑而尖帶紅者。乃腎中熱邪未散也。舌根黑而尖白者。乃胃火來腎也。舌根黑而尖黃者。乃邪熱將傳腎也。舌純紅而尖黑者。乃腎虛心火來乘也。舌中心紅暈而四圍邊傍純黑者。乃君相二火夫騰急。用大黃重加生地而救之。舌中心灰黑而四邊微紅者。乃邪結大腸也。

下之。則愈。不應。是腎水枯槁。又能潤之。推送舌外。紅而內黑也。此火極似水也。亦宜下之。又如內黑而外白。內黑而外黃。皆前證也。與上同治。十中可愈五六。惟舌中淡黑而外或淡紅。外或淡白。內或淡黃者。較前稍輕。俱可前法減制治之。十中可痊七八也。李挺云。舌黑有數種。有四邊紅而中灰黑。成路者。失下也。有黑圈者。過經未解也。有黑尖者。虛煩也。有舌見黃而中有黑至尖。或雜黑點者。熱毒深也。有弦紅心黑。或白苔中見黑點者。表未解也。有根黑尖黃。脈滑者。可下之。脈浮者。可汗之。有尖黑而有亂紋。脈滑實者。急下之。脈數無力者。必發渴而死。此皆論偏苔舌也。若全舌光滑。無苔者。虛寒也。有苔者。微熱也。滿舌俱白。隱隱黑色者。大虛大寒也。有苔散堆滿舌。如雪鬆厚滿邊者。胃氣絕。心火自焚也。如全舌淡白。兼微紅。無苔垢者。無病之舌也。若瘟疫見此舌。上必有煙霧。白色蓋滿。外必有發熱。惡寒等證也。若全舌苔白。起砂。四圍肉色紫紅者。即苔白為濕。過熱伏之。溫邪伏於膜原者。宜達原以透邪。若四圍肉色膩者。為白膩舌。為中宮濕阻。氣滯與食積相搏。宜芳淡兼消導。若黃苔見於全舌者。為藏府俱熱。

見於某部。即某經之熱也。若舌無苔。全舌黃如金色者。藏氣交絕也。

第四節 薄厚

苔垢薄者。形氣不足。苔垢厚者。病氣有餘。苔薄者。表邪初見。苔厚者。裏滯已深。白而苔薄者。寒邪在表。或氣鬱不舒。薄白無苔。為虛寒。白而苔厚者。為中脫。素寒或濕痰不化。薄黃為熱。薄黃而滑。表猶未罷。熱未傷津。苔黃而厚。濕熱內滯。黃苔有根地而濁者。邪已入裏。黃濁愈深入裏。愈深。熱邪愈結。若望之似有薄苔。一刮即淨。全無苔迹者。血虛也。一片厚苔。或黃或白。如濕粉所塗。兩邊不能漸勻。漸薄者。胃絕也。若白厚粉濕滑膩。苔刮稍淨。而又積如面粉。發水形者。裏寒濕滯也。凡舌苔初則粗白。漸厚而膩。是寒邪入胃。挾濁飲而欲化火也。迨變黑則胃火已甚也。或乾而燥裂。則毒火更甚也。若苔厚漸退。而舌底紅色者。火灼水虧也。平人舌中常有薄苔者。胃中之生氣也。診家直訣云。凡舌苔以勻薄有根為吉。白而厚者。濕中熱也。忽厚忽薄者。在輕病為肺氣有權。在困病為腎氣將熄也。劉吉人云。舌苔薄白。如米飲敷舌者。此傷寒中寒之初候也。如無表症。為飲停膈上。

也。如白而滑潤。如稠白。莖漿數舌者。傷寒中寒濕邪。痰飲等候也。若舌薄白。不潤澤。舌質不甚紅者。傷燥表證也。白而厚如豆腐腦鋪舌者。痰熱症也。亦有如白豆腐筋堆舌者。謂白苔厚而有孔。如豆腐者。熱有孔者。曰筋。謂有二三條白者。餘則紅色。或圓或長。此胃熱痰滯腐濁積聚。誤燥當下。不下之候。過此不下。則無下症可見矣。若白而疎如米粉。鋪紅者。傷寒傷暑初傳之候也。白如粟米成顆粒者。此熱邪在氣分也。

第五節 化退

醫級云。苔隨食化者。中虛之候。因朝起未食。則舌苔食後則苔退。又如舌苔忽剝蝕而糙乾。為陰虛剝蝕。邊仍有膩苔。為濕痰剝換。由尖及內。症可漸平。四圍傍退中留。胃敗變至。劉吉人云。苔之真退真化。真退必先由化而後退。假如苔由厚而退。薄由板而生。孔由密而漸疎。疎由有而漸無。由舌根外達至舌尖。由尖而漸變疏薄。乃裏滯減少。是為真退。由退而後生薄白新苔。乃胃氣漸復。穀氣漸進之吉兆。若驟然退去不復生新苔。或如駢去斑斑駢駢存留。如豆腐屑鋪舌上。束一點。西一點。散離而不連續。皆逆

象也。皆因誤用攻伐消導之藥。或誤表之故。胃氣胃液均被傷殘。故現此候。若滿舌厚苔。忽然退去。舌底仍留污質膩澀。或見硃點。或有髮紋者。是為假退。二三日間。即續生厚苔。亦有滿舌厚苔。中間駁落一瓣。或有鏤紋。或有凹點。底見紅燥者。須防液脫中竭。若厚苔忽然退去。舌光而燥者。此胃氣漸絕也。病多凶危。假如風溫之邪。首傷肺經氣分。故舌多無苔。即有黃白苔。亦薄而滑。漸次傳裏。與胃府糟粕相為搏結。苔方由薄而厚。由白而黃。而黑而燥。其象皆板滯。不宜迨下。後苔始腐。腐者宣鬆而不板實之象。由腐而退。漸生浮薄新苔。一層乃為病邪解盡。

第六節 滯鬱

凡食滯於中宮。則舌現灰白。滯積甚。則黃厚。灰白宜消運。黃厚宜攻下。食消則苔必自退。邪鬱於血分。則舌紅。鬱甚則舌紫。紫而枯燥者。血鬱熱甚也。紫而滑潤者。寒鬱血瘀也。若舌本紅紫雜現。而色不勻者。營血瘀滯也。鬱於氣分者。則舌苔薄白。濕而不浮。苔如地生之草。胃氣和調。苔必升浮。中氣鬱滯。苔必緊閉也。陽為陰鬱。則舌青。升陽則青退。陰竭則舌光亮。陰

枯多死。

第十五章 辨舌之顏色

馬良伯云。舌根心脾腎三臟之陰。司腸胃傳化之變。外淫內傷。臟腑失和。則舌上生苔。故白苔者。病在表。黃苔者。病在裏。灰黑苔者。病在腎。苔色由白而黃。由黃而黑者。病日進。苔色由黑而黃。由黃而白者。病日退。吳坤安云。白苔。肺經。黃苔。胃經。黑苔。脾經。絳苔。心經。鮮紅。胆經。紫色。腎經。焦紫起刺。肝經。青滑。肝經。李繼文云。凡病在太陽。太陰。舌白入胃。則苔黃厚。入三陰。則舌灰黃。或黑。虛人舌多裂紋。津液少。舌光赤。無苔。癆病。壞病。舌起白浮點。此皆一定之顏色也。其他如黑與黃間。紅與紫呈。白與黃雜。紅與黑形。此兼經互呈。猶當鑑別。茲分類條辨於后。

第一節 白苔肺經 (候衛分氣分之表邪也)

吳坤安曰。肺主胃。主氣。主皮毛。風寒先入皮毛。內應乎肺。又太陽經亦主一身之表。故肺家之邪。即可以候太陽之表。仲景麻黃湯亦散肺分之邪也。舌無苔而潤。或微白。薄。風寒在表。故無苔。而或薄白。者。風寒也。外症必惡寒發熱。

而口不渴。宜溫散之。舌苔白而燥刺者溫邪也。外症初必微寒。繼即發熱不已。此邪在乎太陰肺經。宜涼散之。忌足經辛溫藥。舌白而黏膩者濕邪在於氣分也。外症必發熱。頭重身痛。而口不渴。宜解肌去濕。如桂枝秦艽羌活紫蘇二陳二苓之類。肺分雖兼太陽。惟寒邪可用足經辛溫藥。若風濕入肺。症見發熱口渴。咳嗽喉痛。舌苔白燥。或白兼邊紅。治宜輕清涼解。肺經如焦梔豆豉桑葉杏仁括蕁皮象貝前胡薄荷蘇子黃芩桔梗之類。凡風寒濕初中皮腠。則苔白薄。當疏散之。寒濕本陰邪。白為涼象。故白苔滑者風寒與濕也。白滑而膩者濕與痰也。滑黏而厚者濕痰與寒也。但滑膩不白者濕與痰也。兩條滑膩者非內停濕食。即痰飲停胃。亦宜溫化。白苔黏膩。吐出濁厚涎沫。而口甜者為脾熱濕聚。當用佩蘭葉菴滑通草芳淡而化之。舌白不燥。或黃白相兼。或灰白不渴。此濕熱鬱而未達。或素多痰飲。雖中脘痞痛。亦不可攻。宜用開肺化濁。舌苔白膩。胸膈悶痛。心煩乾嘔。時欲飲水。水入則吐。此熱因飲鬱。宜辛淡化飲。舌苔薄白而乾者為肺津已傷。宜用清潤之品。如麥冬銀花露鮮蘆根等。

白而燥者。肺陰亡也。宜參冬花粉元參之類。白厚而乾燥者。此胃燥氣傷也。宜加甘草於滋潤藥中。使之甘守津還之意。舌苔燥如白砂者。此溫邪過重。宜急下之。白燥而厚者。調胃承氣下之。苔白底絳為濕遏熱伏。防其就乾。當先泄濕透熱。再從裏透外。則變潤矣。初病舌就乾如神不昏。急加養正透邪之藥。神已昏。則已內墮。脈沉腕悶。則為痰阻於中。而液不上潮。補益未可投也。苔如驗者。胃中宿滯挾濁穢而鬱伏。當急急開泄。否則閉結中焦。不能從膜原遠出矣。苔白不燥。而口中自覺黏膩者。濕漸化熱也。宜用厚樸、檳榔等苦辛微溫之。苔白不燥。而口中苦渴者。邪已化熱也。宜用淡滲、苦降、微涼之。苔白不燥。而渴喜熱飲者。邪已化熱而痰飲內盛也。宜用清熱而蠲飲。初病舌苔白燥。症見發熱口渴。咳嗽喉痛者。風溫入肺也。宜輕清涼解。肺經如桑葉、杏仁、刮薑皮。象貝、前胡、焦梔、桔梗之類。忌用辛溫。苔白滑而脈右緩者。穢濕著裏。邪阻氣分也。宜草果、查肉、神麴以運脾陽。白苔漸退而舌心反見裂紋者。此濕熱已轉燥矣。苔白滑而光亮無津者。此濕蘊津傷之候。勿投香燥。苔白而

滑厚者。寒飲積聚。膈上又臟結症也。白浮滑薄。其苔刮之即還者。太陽表分受寒邪也。白浮滑而帶膩。帶脹。刮之有淨有不淨者。傷寒邪在半表半裏也。全舌白苔浮膩。浮脹漸積而乾微厚。刮去浮面。其底仍有者。寒邪欲化火也。苔白厚粉濕滑膩。刮稍淨而又積如面粉。發水形者。裏寒濕滯也。用草葉以醒脾陽。則地氣上蒸。天氣之白苔可除。滿舌苔白乾膠焦燥。刮不脫。或脫不淨者。為裏熱結實也。舌起白苔如雪花片者。此俗名雪花苔。為脾冷而閉也。不治。舌與滿口生白衣如霉苔。或生糜點者。胃體腐敗也。多死。

粉白實熱。馬良伯云。舌厚膩如積粉者。為粉色。舌苔舊說並以為白苔其實粉之與白一寒一熱。殆水火之不同道。溫病熱病瘟疫時行。並外感穢惡不正之氣。內蓄伏寒伏熱之勢。邪熱瀰漫三焦充滿。每見此舌與熱在陽經者異。與腑熱燥實者亦異。治宜清涼泄熱。粉白乾燥者。則急宜大黃黃連瀉心湯等。甚或硝黃下之。切忌拘執舊說。視為白苔則大誤矣。又有舌正赤苔如積粉不滑。外證若煩熱發渴。亦當以白虎清

內熱也。又脾胃有水飲者。舌多不燥不可誤認為寒證也。

全白虛寒 王晉三云。戊午歲之疫。舌苔白者居多。傷寒臟結症。舌上白苔滑者難治。戒之不可攻。而舌鑑白苔十九症。皆用汗下辛熱之法。余閱歷多年。未有能治之者。夫白苔雖有白滑、白屑、白粉之異。原其義皆由熱勝寒。復火勝水。復熱極反兼勝己之化也。用炮薑附子。則白苔厚而液燥。用芩連。則手足冷而陽脫。余尋思舌為心之外候。其色當赤。白為肺之色。反加心火之上。是侮其所勝。顯係寒邪入肺。鬱蒸見於舌。是衛實營虛。乃以大劑生薑汁泄衛。肉桂通營。人參南棗當歸助營衛之正氣。服之皆應手而愈。名曰薑桂湯。生薑汁三錢。肉桂二錢。四分。人參三錢。當歸二錢。四分。南棗三枚。右水二鐘。煎八分。沖薑汁。分三服。

隨時服之。宗仲景心營肺衛立方也。○按溫熱症初起。舌白。瘟疫症舌白。如粉而滑。四邊色紫絳者。乃疫邪初入。暮原未歸胃府。當即與透解如前條。粉白症是也。此方不可誤投。治法彙曰。脾熱則舌滑而苔。脾閉則白苔如雪。陳準齋云。二句不論內傷外感。皆以脾熱閉論。大抵當以症象參脈互斷之。不可專執舌苔。

沈堯封云。項腫如飽。按之熱痛。目赤如血。而足冷便泄。人事清明。六脈細數。右手尤軟。畧按卽空。堯封云。此虛陽上攻也。唇上黑痕一條。如乾焦狀。舌苔白如傅粉。舌尖亦白。不赤。是皆虛寒。確據沉便泄足冷。脈濡斷非風火。若是風火。必痞悶煩熱。燥渴不安。豈有外腫如此。而內裏安貼如平人者乎。○按此卽喻氏濁陰從胸上入。卽咽喉腫痺。舌脹睛突。從背上入。卽頸項粗大。頭項如冰。渾身青紫而死之類也。末白辨症。尤為精切不易。最眩人者。在熱痛目赤。若非此著。雖足冷便瀉。脈濡不空。猶未能決為真寒也。右二條錄之。以反覆探察白苔之實熱虛寒也。因證狀疑似難明。故特列專條以申辨之。

白兼黃。凡白苔由白轉黃者。風熱從大化也。治宜清泄。有苔而黃白者。熱滯胃脫也。宜枳實厚朴。元明粉之類。舌苔白中帶黃。或微黃而薄者。邪初入陽明也。如兼微惡寒。猶帶表症也。宜涼散之。舌苔由白而黃者。白苔主表。黃苔主裏。但看舌苔帶一分白。病亦帶一分表。必苔純黃無白。邪方離表而入裏。苔黃白相兼。而脫悶者。外邪未解而

裏先結也。宜輕苦微辛。如杏寇桔橘等以宣氣滯。舌夫白根黃不甚乾而短縮不能伸出者痰挾宿食也。宜下之。

白兼紅。凡舌苔先白後紅者溫邪從口鼻吸入上焦心肺先受邪先入氣分而後入營分也。白中帶紅外症初起微寒繼即發熱不已口渴者此濕邪之輕症也。宜荅梔翹赤等清解之。紅中兼有白苔者更感非時之寒也。舌白無苔而兼淡紅者肺胃虛寒也。苔白底紅脈形弦細者陰虛而挾濕熱也。四邊色紅中心乾或白燥外症煩渴煩熱者乃上焦氣熱燥津宜急散無形之熱此非邪入血分勿用血分藥。左半邊光紅右半邊白苔濕滑如水晶粉團之色者此肝營被劫而痰濁又變於胃也。

白兼絳。凡舌苔白而底色絳者濕熱自氣分傷營也。及濕遏熱伏也。當先泄濕透熱防其即乾也。從裏而透於表則變潤矣。舌苔白膩底絳尖紅者濕遏熱伏之徵也。色絳而白苔滿佈者肺胃熱也。宜清肅肺胃。若兼神氣昏瞶者伏痰內盛也。宜兼開其痰熱。舌底絳望之黏膩。

獨舌心有苔白厚如豆大一瓣者伏暑內挾痰飲也。深絳而苔白厚膩者溫邪入營而兼伏濕也。

白兼灰 舌白滑灰者寒濕也。灰白不濁者寒兼痰濕也。為陽氣不化陰邪壅滯不可亂投苦寒滑泄以傷陽。從根至尖白中直紋兩條灰色而潤者濕熱兼夾陰寒食也。舌白半邊苔灰而滑者傷寒半表半裏症也。

白兼黑 凡白苔帶黑點或苔見黑紋而黏膩者太陰氣分之濕也。宜行濕和脾。黑苔望之雖燥而生刺但渴不多飲或不渴或邊有白苔其舌本淡紅而潤者假熱也。治宜溫補。全黑由淡白忽然轉色其間無變黃之一境望之似焦黑芒刺乾裂刮之必淨濕之必潤外證唇白不紅為寒結在臟真寒假熱也。從根至尖白中直紋兩條黑潤者夾陰寒症也。尖白根黑者傷寒半表半裏也。

白兼青 凡舌色純白兼青者中焦生氣已絕也不治。

白兼黃紅 凡絳色中兼黃白苔者為熱初傳營分氣分之邪未盡也。泄

衛透營兩和之

白兼黃黑。凡白苔變黃。由黃變黑。刮之不脫。濕之不潤者。為寒邪傳裏。化大熱極傷陰也。甚則芒刺乾焦。蟬裂。宜用苦寒以瀉陽。急下以救陰。中間一拇指大黑潤浮苔。兩邊或黃或白者。兩感症也。由白苔漸黃而灰黑者。傳經症也。或生刺點燥裂。不拘在根在尖。皆宜急下。若苔黃黑白雜見。或中燥邊滑。或尖乾根潤。皆併病合病。寒熱不和之候。白兼灰黑。凡白苔而帶灰黑。更兼黏膩浮滑者。此太陰在經之濕邪。是從雨霧中得之。宜解肌滲濕。如五苓加羌防之類。白兼絳紫。凡苔白如粉而滑。四邊色紫絳者。瘟疫病初入膜原未歸胃府也。急宜透解。勿使傳入。而為險症也。

第二節 黃苔胃經（候陽明裏症之熱邪也）

陽明燥金從土化。故黃色應胃。蓋白苔主表。黃苔主裏。太陽主表。陽明主裏。故黃苔專主陽明裏症。辨症之法。但看舌苔帶一分白。病亦帶一分表。必純黃。無白邪方離表入裏。

如見舌苔白中帶黃。或微黃而薄。是邪初入陽明。猶帶表症。微寒惡寒。宜涼散之。如苔黃而燥。外症不惡寒。反寒熱。是傷寒外邪初入陽明之裏。或溫熱內邪欲出陽明之表。斯時胃家熱而未實。宜梔豉白虎之類。清之可也。如厚黃燥刺。或邊黃中心焦黑起刺。臍腹脹滿硬痛。乃陽明裏症也。宜承氣湯下之。若嗜酒之人。濕熱內著。從飲食中得之。苔必厚黃黏膩。痞滿不飢。嘔吐不納。惟瀉心湯最效。川連、乾薑、赤苓、半夏、枳實、茵陳、通草之類。舌黃或渴。當用陷胸瀉心。若光滑者。乃無形濕熱。已有中虛之象。大忌前法。其腹或滿或脹或痛。此邪已入裏。表症必無。或十之一二。亦須驗之於舌。或黃甚。或如沉香色。或如灰黃色。或老黃色。或中有斷紋。皆當下之。如小承氣湯。加檳榔、青皮、枳實、元明粉、生首烏等。若未見此舌。不宜用此法。舌中苔黃而薄者。脾熱也。舌中苔厚而黃者。胃微熱也。黃苔不甚厚而滑者。表猶未罷。熱未傷津。猶可清熱透表。黃薄而乾者。邪雖去而津受傷也。宜甘寒輕劑養之。苔或黃或濁而有地。並不光滑。并脛中痛。或痞脹者。邪已入裏。當用苦辛泄之。以其入腹近也。或黃或濁。

而光滑者。此無形濕熱也。祇宜開泄橫疏。如杏菴橘桔等味。老黃色或中有斷紋。而臍以上之大腹。或滿或脹或痛者。邪已入裏也。當下之。舌中有黃燥苔者。腸中有燥矢也。然腹無硬痛之狀。祇宜養陰潤燥。不可妄用下法。舌苔黃而脉沉實者。邪積聚於陽明也。平素多黃苔者。其人必胃熱黃苔刮之潔淨。光明見淡紅潤澤底者。為無病矣。黃苔刮之仍留粗澀垢膩如薄漿糊一層。或竟不脫者。均熱證也。淺黃膩薄者。微熱也。乾澀深黃厚膩者。大熱也。老黃芒刺焦裂者。熱極也。全舌黃苔者。臟腑俱熱也。黃苔滑厚而膩者。熱未成結未定也。冬時未可遽攻。夏月伏陰在內裏熱即熾。而苔不燥。即當用下。黃燥而生芒刺。中心辨裂者。熱結甚也。當速下以存其陰。

黃兼紅。凡熱時。舌色乾紅。熱退。舌色黃膩者。為濕遏熱熾。將燥未燥也。又陰液已傷。而濕熱猶盛也。四邊色紅。中心乾或黃。并煩渴煩熱者。乃上焦氣熱燥。津急用涼隔散。散其無形之熱。勿用血藥。黃兼絳。凡苔黃不甚厚。而舌絳者。熱初入營。邪結未深也。尚可清熱以

辛開之藥。從表透發。

黃兼灰 凡舌先灰滑後黃燥。大便堅結。為濕久生熱。熱必傷陰也。

黃兼黑 凡舌苔黃中帶黑而浮滑而黏膩者。太陰濕熱內結。宜利濕清

熱。邊黃中心焦黑起刺。外症兼臍腹脹滿硬痛者。陽明裏症也。宜下

之。舌芒刺焦裂老黃夾黑色苔者。裏熱極也。亦宜下之。舌燥苔黃

中黑通尖下利臭水者。腸胃腐敗也。十不救一。舌苔老黃甚則黑者

黑水色也。大極而似水也。

黃兼紅黑 凡舌反赤為黃反黃為黑者。乃熱極反兼水化至危之候也。

紅中兼黃黑有芒刺者。邪熱入府也。黃赤兼黑者。此名微醬色。乃

臟腑本熱而夾有宿食也。且內熱久鬱者。夾食中暑者。夾食傷寒傳太

陰者。皆有之。

黃兼青紫 凡苔黃厚而舌中青紫者。陰寒夾食也。甚則碎裂口燥而舌

不乾。宜斟酌溫下之。

第三節

紅色胆經

(候少陽內發之溫邪也)

少陽相火從大也。故紅色應胆。少陽以木火為用。溫邪內發。必借少陽為出路。乃同氣之應也。如淡紅嫩紅。白中帶紅。是溫邪之輕者。初起微寒。繼則發熱不已。口渴甚者。是也。宜柴、芩、梔、翹等清解之。如純紅鮮紅起刺。此胆火熾而營分熱急。宜犀角、翹、丹等清解之。如不解。此溫邪伏於少陰而發於少陽之表也。症非輕渺。速宜重加鮮生地、麥冬、元參之類以滋少陰之水。而少陽之火自解矣。大忌風藥。凡風溫瘟疫等症。如舌苔鮮紅者。當從手少陰治。或從手厥陰。心包絡施治。亦卽是治心。如舌尖獨赤起刺。心火上炎之故。犀角合導赤散以瀉之。舌尖紅而出血者。心經邪熱壅盛所致。亦宜清之。舌尖赤者。心熱也。尖赤而起芒刺者。心熱甚也。舌邊色赤者。肝熱也。甚則起芒刺者。肝熱極也。舌形胖嫩而色淡紅。外症見躁擾不安。六脈遲微。或動氣內發。腹寒畏冷。或初起吐利手足逆冷。或格陽躁狂。六脈洪數無根者。為腎氣大虧。坎中火衰也。宜益火之源。更衣後舌苔去而見淡紅有神者。佳兆也。淡紅無神。或乾而色不榮者。為胃津傷而氣不化液也。當用炙甘草湯。不可用寒涼藥。紅嫩如新

生望之似潤而燥涸殆甚者為妄行汗下以致津液內竭也多不治舌
乾紅知饑善納者水虧陽亢土燥於中也宜投鹹苦寒劑舌心乾紅者
為陰傷也宜用甘寒平素舌多紅赤者其人必營虛全舌淡紅不淺
不深者為無病平人之常苔也全舌無苔色淺紅者氣血虛也全舌
無苔色赤紅者臟腑俱熱也全舌純紅而有黑小點者臟腑皆熱極也
舌色鮮紅無苔點舌底無津舌面無液者陰虛火炎也舌色灼紅無
苔點而膠乾者陰虛水涸也舌色灼紅無苔點而有裂紋者陰虛火炎
也舌紅中有裂紋如人字形者心火燔灼熱毒炎上也紅舌中有紅
點如蟲碎之狀者熱毒熾甚也舌紅碎痛者肝家風火炎炎之勢漸迫
心君也舌光如硃紅柿者君火上炎也又相火下熾引動君火皆危險
之候也

紅兼灰 凡舌紅中夾兩條灰色者濕熱兼夾寒食也

紅兼紫 凡全舌無苔色紫紅瘀紅者臟腑熱極也中時疫者有之誤服
溫補者亦有之

紅兼青。凡舌淡紅帶青者，血分虛寒也。婦人子宮冷者，常有之。久痢虛極者，亦有之。

第四節 絳色心經（候營分血分之溫熱也）

凡邪熱傳營，舌色必絳。絳深紅色也。心主營主血，舌苔絳燥，邪已入營中。宜清絡中之熱，血分之火忌用氣分藥。馬良伯云：滿舌明紅，並無他苔者，為絳色。心之本色也。舌絳而潤，為虛熱；舌絳而乾，為實熱。絳而起刺，為熱甚絳，而光嫩為陰液不足，絳光燥裂為陰液大傷。凡溫病熱病、瘟疫傷寒、邪熱內傳三焦、薰灼心包，先受熱蒸，則本臟之色見，故治宜清心、存陰、化熱。章虛谷曰：熱入營分，舌色必絳。風熱無濕者，無苔；或有苔亦薄，熱兼濕者，必有濁苔而多痰也。然濕在表分者，亦無苔，或有苔亦薄，其脈象必細澀也。溫邪從口鼻吸入，上焦心肺先受，如舌苔先白後紅者，邪先入氣分，後入營分也。如初起舌即絳色者，邪不入氣分而入營分也。宜清解營分之熱，如犀角、鮮地、丹皮、元參之類。凡初傳絳色中兼黃白色，氣分之邪未盡也。泄衛透營兩和可也。白苔邪在氣分，宜解表；忌清裏。絳苔邪在

營分宜清熱忌發汗。絲純鮮色者包絡受病也。宜犀角鮮生地連翹鬱金鮮菖蒲等清泄之。若平素心虛有痰外熱一陷裏絡就閉有痰者必有舌苔心虛血少者舌色多不鮮赤或淡晦無神邪陷多危而難治。若邪火盛而色赤宜牛黃丸痰濕盛而有垢濁之苔者宜至寶丹以開其閉。再邪已入營則舌色絳胃火燦液則中心乾者乃心胃火燔劫燦津液宜鮮生地犀角黃連石膏等以清營熱而救胃津。或白虎湯加犀地竹葉蓮心黃連亦妙。若乾絳延及舌尖者為津乾火盛宜玉女煎再加西洋參花粉蔗漿梨汁。舌尖絳獨乾者此心火上炎其熱在氣分者必渴以氣熱燦津也熱在血分其津雖耗其氣不熱故口乾而不渴也宜導赤散加童便治之。舌絳赤外症耳聾目赤者為溫病從少陽發出也宜犀角鮮大青梔翅鮮地丹皮之類以解木火之鬱大忌汗散。舌赤無苔其證神昏內閉此係濕熱傷陰宜犀角鮮地銀梔蒿鬱蘆根梨汁竹瀝薑汁等。絳而光亮者胃陰亡也急用甘涼濡潤之品如炙甘草湯去薑桂加蔗漿石斛飴糖。舌絳而上有黏膩似苔非苔者中扶穢濁之氣急加芳香逐之。

舌絳望之若乾捫之原有津液者此津虧而濕熱薰蒸將成濁痰蒙蔽
心胞也。舌絳而苔滑澤者溫邪入營而平素有痰也。絳而抵齒難伸
出口者痰阻舌根有內風也。舌絳無苔無點光亮如鏡或半舌薄小而
有直紋或有泛漲而似膠非膠或無津液而咽乾帶澀不等紅光不活絳
色難名者水涸火炎陰虛已極也。舌絳無苔乾枯紅長而有直紋透舌
尖者心氣內絕也必死。絳舌者因實熱症誤補溫補灼傷真陰或誤服
滋補膩澀酸斂膠黏實熱引入陰分俾鬱火耗燥真陰致現此舌而為陰
虛難療矣。舌雖絳而不鮮乾枯而痿者腎陰涸也急以阿膠雞子黃生
地天冬等救之緩則恐涸極無救矣。病後絳舌如鏡光亮或舌底啞乾
而不飲冷者腎水虧極也宜急救其津液否則立涸矣。舌大獨紅絳者
心營暗熾也宜犀羚鮮石斛鮮生地等。舌根絳者血熱內燥也。全舌
無苔色深紅者氣血熱也。舌肉絳者邪居血分也。舌絳不渴夜甚者
邪入營也。無苔而紅絳者熱傷血分也宜丹皮地黃麥冬元參等。舌
色絳而潤者虛熱也。舌色絳而乾者實熱也。絳而起刺者熱甚也。

絳而有黃白碎點者將生疳也。絳而光者陰液不足也。滿舌紅紫色而無苔者兩色合而成絳腎虛也。

第五節 灰色脾經（候三陰之寒熱也）

灰色苔者即黑苔之輕也。如以青黃和入黑中則為灰色也。當與黑苔同治為痰水注於脈中致微絲血管停阻而瘀而呈斯苔然有直中傳經之殊蓋傳經熱邪始自白苔而黃由黃而灰或生芒刺黑點紋裂乾燥不拘在根在尖俱宜攻下泄熱。舌灰而潤並無苔垢更不變別色始病即見非由白黃漸變者為夾食中寒及停飲蓄血症當用消用補用燥用攻因症而治。又有屢經汗下而灰黑不退或滋潤或不潤亦不燥者脈必虛微無力此因汗下太過傷陰使然急宜救陰津因不得用硝黃亦不可用薑附。灰色即黑之輕也與黑同治兼有表者雙解散下利者解毒湯內實者承氣湯但少陰寒症亦見灰色見在一二日無苔而冷滑是也四逆湯主之下利者理中湯。舌中尖見灰色者外症消渴氣上衝心飢不欲食食則吐衄乃傷寒邪入厥陰也宜烏梅丸若雜病見此舌為實熱裏症。

則宜大承氣湯與白虎湯合用。全舌純灰無苔而少津者火邪直中三陰也。宜三黃白虎大承氣並用。舌苔灰色重暈者為溫病熱毒傳遍三陰也。急去表藥用涼膈散合承氣以下之。舌灰唇焦者中焦有濁積也。舌灰目黃者濕中生熱也。舌灰齒燥其脈細澀若無身已不熱者此火過呈炭須大劑補陰宜熟地西參麥冬阿膠龜版雞子黃等不必寒涼以其病已無熱也。無苔而有如烟煤隱隱并不渴肢寒而潤者挾陰病也。宜甘溫扶中。無苔如烟煤隱隱口渴煩熱者平時胃氣燥也。宜甘寒益胃。久病舌起烟煤者胃虛液涸也。凡舌見灰色者病皆非輕均裏症無表症有實熱症無虛寒症有邪熱傳裏症有時疫流行症鬱積停胸症蓄血如狂症其症不一治法不外寒涼攻下寒涼以救真陰攻下以除穢毒在當用之時不得以此言為戕伐焉。

第六節

黑色脾經

(候太陰濕土之寒熱也)

太陰濕土所主而水就濕故脾家見症每每舌現黑色。有始病即舌心黑色非由白黃變化舌轉瘦小者為真臟中寒此寒水凌心腎氣外現急

宜用溫。稍緩則誤事。有中黑而枯，並無積苔，邊亦不絳，或畧有微刺者，為津血燥症，急宜養陰生津。誤用攻下，或溫經皆必死。夏月中暑，多有黑苔，為濕痰鬱熱，亦有黑滑膩厚舌，又不可與傳經症同論。有苔黑腐爛者，為心腎俱絕。舌黑而捲縮者，乃肝絕，皆不治。若黑薄而潤滑者，可治。如苔灰黑而滑者，此寒水侮土，太陰中寒症也。外症腹痛吐利，手足指冷，六脈沉細，宜理中湯主之，甚加附子。若雜症而現黑滑苔者，必是濕飲傷脾，宜溫中和脾，逐飲治之。若黑而燥刺，是陽症，注入太陰之熱邪，宜清大解毒，兼陽明治。如屢清不解，腹無痞滿硬痛之症者，不可妄投承氣，是胃中津液乾涸，少陰腎水不支，宜大小甘露飲主之。如舌苔黑刺大，便閉結，臍腹硬滿耕痛，此燥矢為患也。承氣湯下之，仍從陽明治。若黑而堅，斂焦刺如荔子形者，乃陽亢陰竭，胃汁腎液俱涸也，不治。不得已用大劑滋陰清熱之法，藥勿間斷。間有生者，以上吳坤安辨黑舌法也。凡舌苔由白而黃，由黃而焦，或枯黑燥裂，其舌邊胖大，舌底滑潤者，甚有舌底亦燥而絕無津液，其糙刺如沙皮，斂束如荔子者，皆因勞傷脾肺氣虛。

發熱誤用發散益虛益熱復用寒冷重陰內逼以致虛火上炎所以白上加黃黃上加焦而枯黑燥裂也大劑參附養榮湯不時灌服多有得生者更有其舌以一黑色一屬寒水侮土一屬腎氣凌心蓋寒水侮土者其黑色正聚於舌中條陰甚於內逼陽於外外假熱內真寒格陽症也宜附子理中湯腎氣凌心者其黑色直底於舌大然未有不胖且嫩者乾燥滑潤在所不拘條陰盛於下逼陽於上上假熱而下真寒戴陽症也宜人參八味湯若是實大症則其形必堅斂其色必蒼老而萬無胖嫩者耳此一虛二寒症皆驗舌所必知為楊雲峯之言也黑苔舌有水竭津枯一候不宜涼藥宜重用壯水之劑世多習而不察率投苦寒遺人天殃殊不知脈虛數或微細胸腹無脹滿日多錯語舌雖焦黑乾枯腫而生刺乃真水衰竭水不制火使然大禁涼劑以大劑生料六味地黃湯飲之虛寒者苔黑而鬆加桂附五味子則焦黑刺腫渙若冰釋此余所親驗故看黑苔苔須分燥潤及刮之堅鬆以定虛實寒熱為要法此即林慎庵之法也凡黑苔有寒熱之分辨別不精死生立判汪苓友謂舌苔雖黑必冷滑無芒

刺斯為陰症無疑。誠扼要之言也。舒馳遠傷寒集註云：黑苔、乾刺為二症。一為陽明熱結陰津立亡法，主大黃芒硝急奪其陽以救其陰。陰回則津回，一為少陰中寒真陽癰漫不能薰騰津液以致乾燥起刺法，主附子泡薑急驅其陰以回其陽。陽回則津回，據此則黑苔、冷滑者必無陽症而黑苔、乾刺者有陽症復有陰症矣。臨證者可不慎歟？苔黑而口黏淡者當從太陰脾濕治，不可便泥腎氣凌心也。其因亦不僅虛寒實熱伏痰挾血而已也。舌中苔厚而黑燥者胃大熱也。舌心有黑燥苔者腸中有燥糞也。然腹無硬痛之狀只宜養陰潤燥不可妄用下法治之。舌中心焦黑者腎陰涸心胃火熾也。宜犀角地黃湯清之。舌中苔黑燥而連牙牀唇口俱黑者胃將蒸爛非生大黃等大劑不能救也。然以舌燥不燥為別黑而不燥者非是。舌根黑苔而燥者熱在下焦也。舌本無苔惟尖黑燥者為心火自焚不可救藥。黑苔焦枯者火熾水竭也不治。中黑無苔而舌底乾燥有小點紋者胃經實熱非六氣侵擾也。宜白虎三黃等中黑無苔而舌底濕嫩光滑無點紋者胃經虛寒也。宜理中溫之。初病

偏舌色黑而潤發熱胸悶外無險惡情狀者此胸膈素有伏痰也宜用蘇
 白括萸桂枝半夏即退或去桂枝用枳壳桔梗亦效舌黑濕滑無苔無
 朱點無芒刺無蟬裂刮之明淨如水浸猪腰有淡淡融融之形外症口不
 苦唇不燥者為臟腑極寒也全黑無苔而底紋粗澀乾焦刮之不淨者
 熱極也全黑無苔而無點無蟬裂乾燥少津光亮似鏡者即絳舌之變
 陰虛腎水涸也孕婦亦有之宜大劑甘寒全黑無苔有點有蟬乾燥無
 津澀指如銼者極實熱症也宜大劑苦寒黑色暗淡無苔無點無蟬非
 濕非乾似亮不亮者陽虛而氣血兩虧也久病見之不吉舌淡黑如淡
 墨乃腎虛火炎為無根之火也黑舌燥裂芒刺隔瓣者津液焦灼少陰
 真水垂涸最為凶象用新青布蘸薄荷湯濕潤揩去刺瓣舌質色紅者可
 治急攻下其熱滯若刺瓣下仍黑色者則腎陰已竭臟色全露不治苔
 黑腐爛者心腎俱絕也不治舌黑而卷縮者肝絕也亦不治舌黑咽
 燥煩渴不寐者熱入心營而血液受劫也
 黑兼灰傷寒已經汗解而見舌灰黑者此有宿食未消或又傷飲食

熱邪復盛之故也。以調胃承氣湯下之。若雜病裏熱見此舌。宜大承氣湯重加黃連。淡灰轉黑者。傷腐脾胃也。不治。

黑兼青。平素舌常如水黑青色者。其人多虛寒。若因跌仆而舌青黑者。瘀血內蓄也。因痘疹而舌青黑者。疫毒內陷也。因癰疽而舌青黑者。毒氣內攻也。因中寒而舌青黑者。邪氣入臟也。因發斑而舌青黑者。胃爛也。因痢疾而舌青黑者。胃腐敗也。

第七節 紫色腎經（候少陰本臟之虛邪也）

少陰君火從火化。故紫色應腎。六經惟腎無實症。故仲景於少陰症中。揭出脉微細但欲寐為主病。示正氣之虛也。如見舌形紫而乾澀。口渴唇燥。外見少陰症者。此腎陰不足。坎中水虧。宜壯水為主。六味飲一陰煎之類。如兼譫語神昏。又當從手少陰治。微清痰火。如生地。丹參。茯苓。川貝。菖蒲。鉤藤。天竺黃之類。如舌形胖嫩而色淡紅者。外症必見煩躁不寧。六脉遲微。或動氣內發。腹寒畏冷。或初起吐利。手足逆冷。或格陽躁狂。六脈洪數無根。此腎氣大虧。坎中火衰。宜益火之原。人參。八味湯主之。舌形

紫燥唇焦齒黑。二便俱閉。此為陰中兼陽。可兼陽明以治。凡舌形圓大
胖嫩皆屬足少陰虛症。不拘傷寒雜症。如見舌色紫如豬肝。枯晦絕無
津液者。此腎液已涸。痢疾見此苔胃陰已竭。必死。傷寒更衣後舌苔頻
去。而見紫色如豬肝者。此元氣下泄。胃陰已絕。不治。如舌苔去而見淡紅
有神者佳。上錄吳坤馬良伯云。紫如豬肝色。上罩浮滑苔者。邪熱傳裏
表邪未淨也。既不可下。又不可表。治宜清中以解外。若全舌紫光暗並
無浮苔者。陽極似陰也。多不可救。急下之間。有得生者。若酒後中寒及
痰熱鬱久者。往往亦見紫色苔。葉桂云。熱傳營血。其人素有痰。陽宿血
在胸膈中。挾熱而搏。其舌色必紫而暗。暗即捫之。潮濕不乾。以涼膈散加
入散血之品。如琥珀丹。參桃仁丹皮等。不爾。瘀血與熱為伍。阻遏正氣。遂
變如狂發狂之證。乃其人胸膈中素有虛瘀。與熱相搏。宜犀地丹皮丹參
赤芍。鬱金花粉桃仁藕汁等味涼血化痰。若晦而乾者。精血已枯。邪熱
乘之。故為難治。紫而腫大者。酒毒攻心也。於應用藥中。急加黃連以清
之。深紫而乾酒者。酒毒內蘊也。紫如去膜豬腰者。危險之候也。舌

飲束如荔子肉而絕無津液者亦危險之候也

紫兼紅 周微之曰紅紫二舌均指舌質言之固無紅苔亦斷無紫苔其有見紫苔者必舌面已腐或兼微黑苔與赤紅相映而然也 舌紫腫大而生大紅點者熱毒乘心也用導赤散加犀角黃連金汁治之或稍加大黃

紫兼青 淡紫而帶青滑者寒症也或為直中陰經症治宜用溫 淡紫帶青而濕潤又絳青黑筋者寒邪直中三陰經其身涼四肢厥冷脉沉緩或沉弦宜四逆湯理中湯小腹痛甚者回陽急救湯若舌不濕潤而乾枯乃是實熱 青紫無苔多水滑潤而瘦小者傷寒直中腎肝陰經吳茱萸湯四逆湯溫之 紫舌中心帶青或灰黑下症復急者熱傷血分也宜微下之

紫兼藍 淡紫轉藍者邪毒攻心也不治

第八節 焦紫肝經 (候厥陰陽毒之危症也)

厥陰風木從火化故焦紫應肝 舌苔焦紫起刺如楊梅狀者此陽邪熱

毒已入肝藏之險症也。大便閉者，更衣丸下之。金汁，人中黃之類，大清大解之。舌苔兩傍有紅紫點者，肝臟伏毒也。大齒之症，急用犀角尖、人中黃透之解之。

第九節

青滑肝經

（候厥陰陰毒之危症也）

肝屬木，故青色應肝。舌苔青滑，乃陰寒之象，急宜四逆、吳茱萸溫之。外症若見面青唇紫、囊縮厥逆、筋急直視等症者，厥陰敗症也，不治。凡舌苔紫焦如刺、厥陰熱毒難治。青滑厥陰寒邪，吳茱萸溫之即愈。舌邊色青者，有瘀血鬱阻也。有熱者用赤芍、生瓦楞、壳竹茹等治之。舌青口燥，漱水不欲嚥，唇痿胸滿，無寒熱，脉微大來遲，腹不滿，其人自言滿者，內有瘀血也。產母舌青而面赤者，子已死於腹中也。古方用黑神散下之，或平胃散加芒硝下之，更穩。孕婦面舌俱青者，母子俱死。

第十節

藍色肝經

（候肝臟之本色也）

藍者，綠與青碧相合，猶染色之三藍也。馬良伯云：有苔滑中見藍色，苔者肝藏本色也。邪熱傳入厥陰，陰液受傷，臟色外見，深而滿舌者，法在不

治有微藍而不滿舌者。法宜平肝熄風。化毒舊法主用薑桂。邪熱鴟張。肝陰焦灼。逼其本臟之色外現。再用薑桂。是抱薪救火也。瘟疫及濕溫熱鬱不解。亦有此舌。感受不正之氣。蒸熱不解也。治宜芳香清泄。滿舌滑膩。中見藍色者。濕痰飲為陰邪化熱之候。法宜清化。藍色苔者。濕熱鬱蒸也。舌見藍色者。肺氣已絕。肝木獨盛。來侵土位也。微藍者。肺氣猶在。可生深藍者。必死。宜大劑補肺脾而制肝木也。藍色有苔者。臟腑尚能生苔。雖傷未甚。猶可醫治。光藍無苔者。不論何脈。皆屬氣血極虧。勢必殞命。孕婦舌見純藍者。胎死腹中也。宜即下之。周徵之曰。余嘗見癰厥及胃氣久痛者。舌體全藍。此亦瘀血在胃。肝氣不舒也。故青黑藍絳皆謂之濁。皆竭血分。須辨寒熱燥濕及痰血宿食。燥屎癰塊而治之。總以鬆動血分為主。

辨舌指南卷三

鄞縣曹赤電炳章撰述

紹興周炳堉越銘參校

第三編 辨舌證治

第十六章 仲景察舌辨證法

白苔 傷寒論曰。陽明病。腸下硬滿。不大便而嘔。舌上白苔者。可與小承氣湯。上焦得通。津液得下。胃氣因和。身濺然而汗出。解也。病如結胸狀。而飲食如故。時時下利。寸脈浮。關脈小。細沉緊。名曰臟結。舌上白苔滑者。難治。臟結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上苔滑者。不可攻也。成無己曰。邪氣在表者。舌上則無苔。及邪氣傳裏。津液結搏。則舌上生苔也。寒邪初傳。未全成熱。或在半表半裏。或邪氣客於胸中者。皆舌苔白而滑也。經云。舌上如苔者。以丹田有熱。胸中有寒。邪初傳入裏者也。陽明病。腸下鞭滿。不大便而嘔。舌上白苔者。可與小柴胡湯。是邪氣在半表半裏者也。陽明病。若下之。則胃中空虛。客氣動膈。心中懊惱。舌上苔。

梔子豉湯主之。是邪客於胸中者也。臟結宜若可下。舌上苔滑者則云不可攻也。是邪未全成熱。猶帶表寒故也。及其邪傳為熱。則舌之苔不滑而澀也。

乾燥 太陽病。重發汗而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡時小有潮熱。從心上至少腹鞭滿而痛。不可近者。大陷胸湯主之。傷寒病。若下後七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。金匱要略云。肺中寒者。兩臂不舉。舌本燥。喜太息。胃中痛。不得轉側。食則吐而汗出也。腹滿口舌乾燥。比腸間有水氣。已椒蘆黃圓主之。消渴病。渴欲飲水。口乾舌燥者。白虎加人參湯主之。病人胸滿唇痿。舌青。口渴。但欲漱水不欲嚥。無寒熱。脈微大。來遲。腹不滿。其人言我滿。為有瘀血。成無己曰。經云。傷寒七八日不解。熱結在裏。表裏俱熱。時時惡風。大渴。舌上乾燥而煩。欲飲水數升者。白虎加人參湯主之。是熱耗津液而滑者。已乾也。若熱聚於胃。則舌為之黃。是熱已深也。

黃苔 金匱要畧云。病者腹滿。按之不痛。為虛痛者。為實。可下之。舌黃未下者。下之黃自去。成無己曰。舌黃未下者。下之黃自去。若舌上黑者。又為熱之極也。黃帝鍼經云。熱病口乾舌黑者死。以心為君主之官。開竅於舌。黑為腎色。見於心部。心者火。腎者水。邪熱已極。鬼賊相刑。故知必死。觀其口舌。亦可知其逆順矣。

第十七章 胡玉海察舌辨證法

頭痛身熱惡寒。脈浮滑。陽明太陽。

身熱口燥。脈弦滑。陽明少陽。

身熱舌苔白。脈洪滑。正陽陽明。

舌苔微黃。正陽陽明。

舌苔前白後黃。正陽陽明。按是上寒下熱。外寒內熱。

前黃後白。正陽陽明。按是上脫化熱。而中焦有水飲。

四圍白。中間黃。正陽陽明。

白帶灰色。陽明將入太陰。

白帶有路。陽明太陰。

微白燥黃色。陽明太陰。

粉白微紅。陽明少陽。

無白微桃紅。陽明少陰。

前半紅後半白。少陽太陰。

前半紅後半黃。少陰太陰。

前半黃後半黑。陽明太陰。

前半黃後半赤。太陰少陰。

前半黃後半紫。太陰厥陰。

純黑色。太陰。

純黃色。太陰。

黃分八字。陽明太陰。

一邊黃一邊白。陽明太陰。

一邊黑一邊黃。陽明太陰。

焦黑。太陰。

潤黑。太陰。

花黃灰黑。陽明太陰。

純紅鏡面。太陰。其形色光如漆桌。如光而不濕。舌下華池。皆乾者重。宜細審之。

舌厚如三箇厚。少陰。

舌潤如三箇潤。少陰。

舌圓。少陰。

舌平無尖。少陰。按舊謂舌邊缺如銘齒者死。

白苔有一點點紅。陽明少陽。

白苔有一點點黑。陽明太陰。

白苔有一點點黃。正陽陽明。

尖紅後赤。少陰少陽。

尖赤後紫。少陰少陽。

以上三十五法。乃辨症之大畧。餘照此類推之可也。

廣東福建浙江江蘇揚州分野。魚鹽海濱之地。腸胃脆薄。氣盛血熱。所以風邪一客。卽病。頭雖痛。不如斧斲。項雖強。尚可轉側。背雖牽制。尚可動搖。風邪入胃。肺則凝塞。所以一日為風。二日為熱。三日為火。熱甚之故。熱與風火相搏。凝寒成毒。此毒。胃主肌。脾主肉。不在肉而在肌。肌毛竅之內也。故點點然如斑之狀。如疹之形。紅色鮮明。一日三潮。三日九潮。故毒必三日。雖不治。亦疎散也。脈左寸浮。右關滑。氣口大。無有正傷寒也。故太陽經雖病不病。此陽明之正病也。謂之陽明太陽。舌苔白。一日不口渴。二日不大便。至三四五六日。大便秘。則腠理開。汗出而解。如陽明第四日血熱成毒。不能發。越毒鬱在中。腠理不開。鬱遏邪熱。則傳入少陽。一日口渴。左關洪大。右關洪滑。右寸氣口閉遏。此肺經熱邪沖遏。氣道不舒。斑在肌。腠血凝在皮。少陰雖然受熱。而未嘗著病。二日目赤。舌苔紅。耳鳴。左關脈洪大。而數。此熱甚邪勝也。第三日謔語。不能眠。右關洪滑而實。四日斑出。則少解。斑不出。狂叫不安。右關滑實有力。左關脈洪數微弦。左尺脈虛大。此邪氣將入於裏。第五日耳聾。不欲眠。起坐不休。謔語欲狂。此斑毒不得發。越

口乾消水。舌苔紅黃色。邪尚未曾傳裏也。舌苔紅紫色。將入於脾。右關弦。右關實。乙木怒極。熱鬱之甚。耳聾。腎之火閉也。斑毒出於胸項脊背。此陽邪有餘。隱於胸項脊背。此陽毒將陷入陰分。六日大便解。邪氣得下。斑必發出。六日不解。火氣閉於幽門。小便短濇。毒反薰胃。肺閉。大腸熱。目直視。不欲見人。脉數。舌焦。邪傳太陰。目黃。面黃。此風勝濕鬱。第七日耳聾。口渴。目黃。兩頰黃赤。舌苔焦。脈與六日同。此病尚在陽分未除。邪雖入裏。猶可挽回。少陽不得解。邪傳入裏。流入太陰。脾經。一日右關洪大而軟。左關弦勁。左寸閉。此熱邪客於色絡。神昏氣短。白珠紅。肺經鬱抑。斑毒則頸項上見者紅色。兩頰無有。心胸不見。季脇有微點。腹上點點紅色。手臂前俱有紅色。舌苔黃黑。雖然傳裏。陽證未除。二日右寸見弦脉。風邪客於肺。將發白斑。氣促者死。鼻煽者死。耳聾者生。面頰紅者生。閉目不欲見者生。魚口鴉聲者死。第三日右關數。左寸不見。右尺洪大。此邪熱客於腎。唇紫。舌焦黑。目直視。不欲見人。此毒鬱於小腸。燥真不得下。斑隱於肉內。怒狂叫罵者生。口渴消水者生。小便不滋潤者死。第四日左寸閉。左關弦。左尺洪大。

右關虛軟。右寸見芤脉。右尺不見。血熱在中焦。斑見藍色。第五日左右手
關脉不見。兩尺洪大。聲嘶欲哭。斑鬱不得發。越目黃。身黃者死。第六日尺
寸俱無。兩關弦緊。舌苔濕滑。此大甚感寒。頭涼。舌苔燥裂。仍以火論。或陽
明第五日斑發不透。邪毒不入少陽。竟入太陰。此非越經傳也。或飲食所
傷。或藥餌所誤。太陰一二日季脇痛。下痢。左關弦軟。右關弦長。氣口脉洪
尺脉大口渴甚。嘴唇乾。舌燥。神氣清。舌苔黃厚。黑灰色。第三日舌根黑中
黃。尖白。目赤。面青。左關脉數。右關滑大有力。肺脉大。兩尺脉閉。頭面有斑。
頸項無斑。胸背有斑。肚腹無斑。此陽氣不得發越。陰氣凝塞。太陰四日左
三部閉。右關軟。肺脉大。尺脉洪。口渴甚。目紅。面赤。鼻青。唇黑者死。伏斑下
陷。太陰五日。尺寸俱浮。右關芤。左關緊。時作寒戰。頭痛。目赤。鼻黑。舌青。唇
紫者也。斑毒乘於肝。非傳厥陰。邪中厥陰也。太陰之脉利於無力。邪入於
脾。氣盛血熱。流於四肢。分布百體。貫注於心。心神失司。其權是以相火之
邪甚熾。心神與相火失位。則一身無所主矣。故四肢百骸俱痛。腹滿。口乾。
舌黃。舌黑。唇燥。五臟與大小腸膀胱三焦皆受其制。脉之細小者。胃氣不

傷脉之滑。大者胃氣已壞。胃主納穀。脾主消穀。胃主受納。脾主轉輸。胃之受納在於肺。脾之轉輸在乎肝。在上者為痰。在下者為糟粕。膈氣實則痰滯於膈中。心氣熱則糟粕滯於小腸。渴欲飲冷者。膈氣熱也。飲水不小便者。肺葉焦也。肺氣盛者。則大腸之道不行。夫邪在陰分。不利見陽脉。病在陽分。不利見陰脉。太陰之病。利於細小。虛軟。不利於洪大。滑實。通其經絡。導其閉塞。毋使風木成邪。致人九竅不通而死。太陰之脈。非獨取右關。左寸左關右尺皆可概見也。獨肺居華蓋。肺氣凝滯。更利於細小。不利於實大。與正傷寒之病。傳入太陰。皆脉大者病進。病小者病退。有力者病進。無力者病退。滑實者病進。虛軟者病退。緊實者病進。弛軟者病退。洪數者病進。細軟者病退。如病之外現。目紅面紅。舌紅唇紅。手足搖動。坐立不寧。舌苔焦黑。此毒邪熾甚。脉見細小。此皆有胃氣。不可謂不治也。如目青面青。唇青舌白。脉見微細者。毒氣下陷。將出汗而死矣。太陰病。面赤目赤。唇紫舌黑。兩關見數脉者。危。見促脉者死。面白目赤。鼻青唇青。舌苔灰色。左尺右關見緊脉者死。目赤面黃。鼻塌唇青。右寸見數脉。關部見弦脉。兩尺不

應者死。神氣如常。舌苔微黑。兩關見革脉者死。舌黃。目青。面白。唇白。脉見微弱。手足厥冷。身發白斑者死。舌光如鏡。目紅面青。兩關洪大。兩尺洪數。兩寸不應。毒陷下焦。頸項斑不出者死。舌上芒刺。苔色灰黑。腹胸脹滿。渴甚不欲飲水。右寸見弦。右關見軟。左關見濡。結胸者死。舌尖平。季脇痛。舌苔焦黑。時下清水。口渴不欲飲湯水。左尺見結。右寸見代。右關見牢。熱結小腸死。舌苔黃白。點點紅紫。唇青面白。目赤。左關見軟。右關見牢。肺脉不應者死。舌苔厚白。上灰黑色。脾部乾燥。唇紅目赤。左關見軟。右關沉實。兩寸不應。頸項發白斑者死。舌苔紅紫。目赤面黃。唇乾胸滿。神氣昏沉。手足厥冷。右關不應。左關弦緊。左尺空大。斑毒陷下者死。舌焦圓厚。華池乾燥。唇焦齒黑。目紅面赤。神氣昏憤。脉見細小。頻叫不知人者死。知人者可生。大便頻解。不知人者死。大便頻解。漸知人者可生。舌不出口。發戰者死。大便解後。舌不潤轉者死。不治。大便解後。神氣條清。舌雖潤。即出汗者死。大便解後。脉見獨大。必定血從口鼻出。急服更衣散一服。使肝分得涼。藏血可生。如遲吐血必死。夫病至太陰。死證已多。若傳入少陰。則邪甚正衰。危

者十九。死者亦多。傳入厥陰。則風木成邪。九竅將閉。不必細論矣。
凡舌紅面赤。而兩手見陰脈。或脈來搖擺無根。恍惚難憑。舌邊肝膽部位。
有一點點紅泡。或紫泡。如黃豆大者。此熱毒歸藏。或舌邊缺如鋸齒者。皆
不治之證。在左肝膽位者重。在右者輕。在中間者更輕。察其脈可救者須
救之。

第十八章 吳坤安察舌辨證歌

六淫感症有真傳。臨證先將舌苔看。察色分經兼手足。營衛表裏辨何難。
白苔主表。黃苔主裏。裏足經之邪。分表裏治之。白苔主衛。絳苔主營。手經之邪。分心營肺衛治之。却仙根評。

凡診傷寒當先察舌之形色。分別足經手經。衛分營分。在表在裏。再參
脈證施治。無不獲效。若拘定足六經治病。非但無效。且病亦鮮有合乎

六經者。

白肺絳心黃屬胃。紅為膽大黑脾經少陰。紫色兼圓厚焦紫肝陽陰又青。
此條統論手經足經以舌形色辨之。却仙根評。

此以形色分六經。兼心肺兩手經。足六經不言太陽者。以太陽初感舌

未生苔也。故凡臨證見舌無苔而潤。或微白而薄。即是太陽。若黃苔。陽明。紅色。少陽。黑苔。太陰。紫色。少陰。焦紫。厥陰。陽邪。青滑。厥陰。陰邪。太陽與肺

同主表邪尚在表故舌無苔而或薄白即仙根評

表白裏黃分。汗下絳營白。衛治分。歧次將。津液探消息。澤潤無傷。澀已虧。

白苔屬表。當汗。黃苔屬裏。當下。絳苔營分之熱。宜清忌表。白苔衛分之邪。宜汗忌清。治法天淵。再以舌之燥潤。驗其津液之存亡。不拘何色。但以潤澤為津液未傷。燥濇為津液已耗。熱病以存津液為主。故宜深察白為肺衛。仍兼氣絳主心。營血後看白內兼黃。仍氣熱。邊紅中白。肺津乾。凡外邪之入。先到衛分。不解。然後入氣分。而營分不解。然後入血分。白內兼黃。仍屬氣分之熱。不可用營分藥。白苔邊紅。此溫邪入肺。灼乾肺津。不可辛溫過表。清輕涼散為當。

衛邪可汗。宜開肺。氣分宜清。猛汗難入。營透熱。羚羊。犀。妙到血未清。地。與。丹。凡舌苔白潤而薄。邪在衛分。可汗開肺。即是開太陽。如麻黃羌活之類。如苔白而厚。或兼乾。是邪已到氣分。只宜解肌清熱。如葛根。防風。連翹。

蟬蛻薄荷之類。不可用辛溫猛汗也。若寒邪化熱。過衛入營。或溫邪吸入。竟入營分。則舌苔紅絳而燥。惟羚羊為妙品。以能透熱於營中也。邪在營分不解。漸入血分。則發熱不已。宜清血分之熱。鮮生地。丹皮之類。白黃氣分流連。久尚冀戰汗。透重關。舌絳仍兼黃白色。透營泄衛。兩和間。凡舌苔白中帶黃。日數雖多。其邪尚在氣分。流連可冀戰汗而解。若舌紅絳中仍帶黃白等色。是邪在營衛之間。當用犀羚以透營分之熱。荆防以泄衛分之邪。兩解以和之可也。此條是泄衛透營之要法。惟荆防不如薄荷連翹之穩。即仙根評白而薄。潤風寒重。溫散何防。液不乾燥。薄白苔津已少。只宜涼解。肺家寒此辨風寒與風熱治法不同。凡風寒初入太陽。則舌無苔。或生苔白潤而薄。此寒邪重。津液不虧。辛溫汗之可也。如白苔雖薄而燥。或舌邊舌尖帶紅。此風熱之邪。傷於氣分。病在手太陰肺經。津液已少。不可過沃。只宜輕清涼解氣分。如前胡。蘇子。杏仁。連翹。黃芩。薄荷。桔梗。淡竹葉之類。苔若純黃。無白色。表邪入裏。胃家乾更驗。老黃中斷裂。腹中滿痛下之安。舌苔純黃無白。邪入胃經。熱而未實。宜白虎等湯。請熱涼潤。若黃斷裂。熱入胃府而燥實。症必腹滿堅痛。故可下之。即仙根評

凡治病先要辨清營衛表裏。上文辨營衛。此論表裏。然表症即屬衛分。故此專論裏症。○傷寒由表入裏。故舌苔先白後黃。至純黃無白。邪已離表入裏。即仲景所云胃家實也。然舌苔雖黃而未至焦老裂紋起刺。大便雖閉而未至痞滿鞭痛。尚屬胃家熱而未實。宜清不宜攻。必再驗其舌形黃厚焦老。中心裂紋。或起刺。腹中鞭滿脹痛。方用承氣下之。則安。○舌中心屬胃。凡腸中有燥矢。舌中心必有黃燥黑燥等苔。若腹無鞭滿耕痛之狀。亦只須養陰潤燥。不可妄用承氣攻之。二條論外邪以

裏推舌燥有津虧邪實之不

太陰腹滿苔黏膩蒼樸陳苓濕桔開黃燥還兼胸痞滿瀉心陷胸二方裁

濕邪結於太陰。症必胸腹滿悶。濕阻氣機。宜以苦溫開之。若痰熱濕邪。於心下而痞痛者。邪滯中宮。宜瀉心陷胸。以開痞滯。痰。即仙根評。

陽明實滿舌苔老黃燥裂太陰濕滿舌苔白而黏膩陽明實滿滿及臍

下少腹太陰濕滿滿在心下胃口此數句辨症確切。當濕邪結於太陰。

則胸腹滿悶宜苦溫以開之蒼樸二陳二苓之類若黃苔而燥胸中痞

滿此陽邪結於心下按之痛者熱痰固結也小陷胸法嘔惡溺澀者濕

熱內結也。瀉心法。

微黃黏膩。兼無渴。苦泄。休投開泄。安熱未傷。津黃薄滑。猶堪清熱透肌。端病有外邪未解。而裏先結者。如舌苔黏膩微黃。口不渴飲。而胸中滿悶。是也。此濕邪結於氣分。宜白菴橘紅杏仁鬱金枳殼桔梗之類。開泄氣分。使邪仍從肺衛而出。則解矣。不可用瀉心苦泄之法。逼邪入裏。○黃苔雖主裏。如苔薄而滑者。是熱邪尚在氣分。津液未亡。不妨用柴葛芩翹。或桅鼓翹荷之類。輕清泄熱。以透表邪。亦可外達肌分而解也。

濕留氣分。治黏膩小溲如淋。更快。聯濕結中焦。因痞滿。樸陳苦溫泄之。安此以黏膩舌苔為濕邪之驗。白而黏膩者。寒濕黃而黏膩者。濕熱。更驗其小便不利。大便反快。為濕邪痞滿。乃濕邪結於中焦。宜厚樸蒼朮二苓二陳之類。苦溫以開泄之。若舌黃黏膩。痞滿嘔惡。大小便俱不利。此濕熱結於中焦。宜瀉心法之類。苦辛寒以開泄之。

上焦濕滯。身潮熱。氣分宣通。病自痊。濕自外來。肌表著秦艽蘇桂解肌。先凡看舌苔。或白或微黃而黏膩。不渴者。總屬濕邪。但濕自內出。恒結於

中焦而成痞滿。若濕自外來。上焦氣分受之。每見潮熱自汗。醫者表之不解。清之不應。不知熱自濕中來。只要宣通氣分。如淡豆豉。茯苓皮。滑石。半夏。豬苓。米仁。廣皮。白朮。黃芩之類。氣分濕走。熱自止矣。若冒雨霧濕邪留於太陰衛分。之表發熱自汗不解。口不渴飲。身雖熱不欲去衣。被舌苔灰白黏膩。宜桂枝秦艽紫蘇茯苓皮。二陳薑皮之類。解肌和表。濕邪自去。

濕熱久蒸成內著。厚黃嘔吐。瀉心權。若兼身目金黃色。五苓。梔柏。共茵煎。濕熱內著。從飲食中得之。嗜酒人多此苔。必厚黃黏膩痞滿不飢嘔吐。不納。惟瀉心最效。川連。乾薑。赤苓。半夏。枳實。茵陳。通草之類。濕熱內結。若誤治必致成疸。宜五苓加茵陳。梔柏之類。

舌絳須知營分熱。犀角。丹地。解之安。若兼鮮澤。純紅色。胞絡邪干。菖鬱。搗素有火。痰成內閉。西黃。竺貝。可加餐。

舌絳為邪入營中。宜泄營透熱。故用犀角以透營分之熱。邪翹。丹鮮地以清營分之熱。邪入心胞絡。則神昏內閉。須加廣鬱。金石菖蒲以開。

之若兼有大痰。必致痰潮內閉。更當加西黃川貝。竺黃竹瀝之類。清火豁痰。

心承胃灼。中心絳。清胃清心。勢必殘君火。上炎。夫獨赤犀兼導。赤瀉之安。如黃苔中心絳者。心受胃火蒸灼也。於清胃藥中加清心藥。如石膏川也。其勢必孤矣。如舌刺獨赤。起刺心火上炎之故。犀角合導赤散以瀉之。

若見邊紅中燥白。上焦氣熱血無干。但清膈上無形勢。滋膩如投却疾難涼。膈散去芒硝。大黃加石膏。能清膈上無形客熱。其邪不在血分。妄投滋膩必增病矣。舌苔邊紅中心燥白。乃上焦氣分無形之熱。其邪不在血分。切勿妄投滋膩。血分之藥宜輕清涼解為治。即

仙根評

絳舌上浮。黏膩質暑兼濕穢。欲蒸痰恐傍內閉。芳香逐犀珀蒼蒲滑鬱金。

暑蒸濕濁則成痰。暑濕兼穢。恐蒙閉心胞。故用菖蒲鬱金。藉其芳香逐穢。犀角以透營分。暑邪琥珀滑石清暑利濕。古絳黏膩上浮。暑濕穢蒸痰濁蒙閉心胞也。急用芳香

香逐穢。宜竅滌痰之法。痰多可用西黃天竺黃之屬。即仙根評

白苔絳底因何故熱因濕伏透之難熱毒乘心紅點重黃連金汁亂狂安

舌苔白底絳者熱因濕邪遏伏宜泄濕以透熱如犀角滑石茯苓皮豬

苓米仁茵陳黃柏之類若濕溫症舌現紅星點點此熱毒乘心必神昏

譫語宜苦寒之品治之狂亂者非黃連金汁不解如無金汁以人中黃

代之黃連清心火

舌絳碎生黃白點熱淫濕蠱欲生疳古名狐惑皆同此雜症傷寒仔細探

舌碎絳而有黃白腐點者此濕熱邪毒蘊久不宣蒸腐氣血化為痰濁

得風木之氣化而成蟲也根上即仙狐惑即牙疳下疳之古名也近時惟

以疳名之牙疳即惑也蝕咽腐齲脫牙穿腮破唇下疳即狐也蝕爛肛

陰由傷餘毒與濕蠱為害若胃強能食能任苦寒重藥者可治○按狐

惑蟲症也上唇有瘡蟲食其臟兼咽爛名惑下唇有瘡蟲食其肝兼聲

啞名狐面色乍白乍黑乍赤惡聞食氣清志默默此其候也此參準繩

言相同又云狐惑蟲病也感當作蠱看其上唇內生瘡如粟啞與金匱之

快懷而痛此蟲在上部則聲啞甘草瀉心湯蝕於下部則

咽是也金匱食於上部則聲啞甘草瀉心湯蝕於下部則

咽乾苦參湯洗之蝕於肛者雄黃薰之即仙根評

舌絳不鮮枯更萎腎陰已涸救之難紫而枯晦潤肝腎紅澤而光胃液乾舌形紫晦如紫肝色絕無津液者為枯舌形斂縮伸不過齒為痿此肝腎已敗不治若舌色紅澤而光其色鮮明者屬胃陰乾涸猶可滋養胃陰甘涼純靜之品主之如鮮生地鮮石斛蔗漿梨汁之類

黃厚方知邪入裏黑兼燥刺熱彌深屢清不解知何故大燥津亡急救陰舌苔黑燥為陽明之熱腹無痞滿硬痛非承氣症只宜清解若清之不應是腸中燥火與熱邪固結胃土過燥腎水不支胃中陰液已乾宜大

小甘露飲以救胃汁陰液充溢陽邪自解二便自通

黑滑太陰寒水侮腹疼吐利理中宜更兼黏膩形浮胖伏飲凝痰開逐之舌苔黑滑為太陰之寒所謂寒水侮土理中症也若兼黏膩浮胖是濕痰寒飲伏於太陰當用溫藥和脾如二陳厚樸薑汁合五苓之類開之逐之痰飲自去

舌見邊黃中黑膩熱蒸脾濕痞難禁吐嘔便閉因傷酒開泄中焦有瀉心胃熱蒸脾濕則舌黃中帶黑膩中焦痞滿嘔吐小便不利嗜酒人多此

症

舌苔邊黃。中心黑膩。是胃熱蒸動脾濕。蘊結中宮。以致痞滿嘔吐。便閉。用瀉心湯。開泄中焦。即仙根評。

寒濕常乘氣分中。風兼二氣自從同。重將黃白形中取。得訣纔將脉症痛

寒濕二氣都入氣分。風兼寒濕亦入氣分。風兼溫熱或入氣分。或入營分矣。氣分之邪。於舌苔之黃白取之。營分之邪。於舌苔之紅絳取之。得

此要訣。再將脉症兼參。病無遁形。

溫邪暑熱走營中。兼入太陰氣分同。吸受心營并肺衛。暑溫挾濕衛營通

溫暑二氣常入營分。兼入氣分。蓋溫暑都從口鼻吸入。則上焦先受。故

或入心營。或入肺衛。或先衛後營。惟濕邪常走氣分。必暑挾濕。濕挾暑

則三焦營衛通入矣。

傷寒入裏陽明主。熱病陽明初便纏。先白後黃寒化熱。純黃少白熱蒸然

太陽主表。陽明主裏。傷寒由表達裏。故在表屬太陽。入裏即入陽明。府

病熱病自內發外。借陽明為出路。故初起即在陽明。但看舌苔先白後

黃者。傷寒由表達裏。寒化為熱也。若初起純黃少白。或黃色燥刺。是病

發於陽明。由裏出表。熱勢蒸燃內盛也。更參外症。初起惡寒發熱為傷

寒。壯熱無寒為熱病。

熱病無寒。惟壯熱。黃芩。梔。豉。古今傳惡寒發熱。傷寒症發汗散寒表劑。先

凡溫熱之症。不可發汗。如仲景陽明病之梔。豉。湯。少陽病之黃芩。湯。皆

可通治。此條亦伏氣所發之熱病。切不可平溫發汗。宜用梔。豉。黃芩。等

少陽溫病。從何斷。舌絳。須知木火然。目赤耳聾。身熱甚。梔。豉。犀。角。壯。丹。先

凡溫病熱病。皆純熱無寒。熱病發於陽明。溫病發於少陽。當從何法斷

之。但看舌苔黃燥。為陽明熱病。絳赤。為少陽溫病。溫病宜用犀角。梔。豉。

鮮地。丹皮之類。以解木火之鬱。大忌汗散。舌絳赤。外證耳聾目赤。者是

解木火之鬱。與傷寒少陽症之可用。

若。是溫邪。從上受。竅中吸入。肺先傳。芩。翹。梔。豉。桑。葉。杏。氣燥加膏。肺分先

邪入心。營。同。膽。治。再加元參。鬱。蒼。鮮。

溫邪從內發者。以少陽胆經治之。若因天時晴燥太過。其氣從口鼻吸

入。則上焦心肺受邪。舌苔白燥。邊紅。治在氣分。舌色鮮紅。治在營分。營

分與少陽胆經同法。亦用犀角。丹皮。鮮生地之類。再加元參。麥冬。廣鬱。

金鮮菖蒲以清心開竅也。春時溫邪從口鼻吸入受而即發舌苔不燥而絳邪入心營也。治與少陽胆經同肺也。從肺衛氣分治之。若舌鮮紅

法。加入清心開竅之品。即仙根評

寒溫二氣前辦暑濕相循病必纏溫病已陳黏膩舌只將暑症再提傳

上文論傷寒溫病以下言暑邪濕溫即評

暑傷氣分苔因白渴飲煩嘔咳喘連身熱脈虛胸又滿無形氣分熱宜宣

姜皮貝杏通芩滑梳豉翹心竹葉煎或見咳紅荷葉汁痞加樸菴鬱金川

卻仙根云此條暑傷氣分治從肺衛如肺氣鬱則暑邪逆入營中故咳

紅。

暑入心營舌絳紅神呆似寐耳如聾溺淋汗出原非鮮失治邪干心主宮

犀滑翅丹元地覓銀花竹葉石膏同欲成內閉多昏昧再入牛黃即奏功

暑熱之邪上蒙清竅則耳聾不與少陽同例忌用柴胡乘於胞絡則神

昏宜清心開閉凡邪在手經忌足經藥。凡溫熱暑邪由口鼻吸入受邪在手經從三焦立法忌用足經藥

此與治傷寒分別處也。即仙根評

暑濕合邪空竅觸三焦受病勢瀰漫腕悶頭脹多嘔惡腹痛還防瘧痢

不

梔。豉。杏。仁。芩。半。樸。銀。花。滑。石。鬱。紅。安。

暑邪扶濕。從口鼻空竅觸入。則三焦氣分受病。頭脹。腕悶。嘔惡。此邪初入見症。其勢尚輕。故只用梔豉等。以清宣氣分。餘如鮮。杷。杷。葉。通。草。淡。竹。葉。之。類。亦。可。加。入。○暑熱之邪。留於膜原。則變瘧。入於腸胃。則成痢。治宜隨症加減。

濕。溫。氣。分。流。連。久。舌。赤。中。黃。燥。刺。乾。咯。血。毋。庸。滋。膩。入。耳。聾。莫。作。三。陽。看。三。焦。並。治。通。筈。杏。金。汁。銀。花。膏。滑。寒。若。得。疹。痧。肌。肉。透。再。清。痰。大。養。陰。安。凡。暑。濕。合。邪。輕。則。氣。分。微。結。重。則。三。焦。俱。病。清。解。不。應。卽。屬。濕。溫。重。症。肺。氣。不。得。宣。暢。則。釀。成。膿。血。濕。熱。上。蒙。清。竅。則。耳。聾。無。聞。治。當。急。清。三。焦。氣。分。一。鬆。則。疹。痧。得。以。外。達。再。議。清。火。清。痰。漸。入。養。陰。之。品。

苔。形。粉。白。四。邊。紅。疫。入。膜。原。勢。最。雄。急。用。達。原。加。引。藥。一。兼。黃。黑。下。忽。忽。凡。時。症。初。起。苔。形。粉。白。而。厚。四。邊。紅。絳。者。此。疫。症。也。邪。在。膜。原。其。勢。最。雄。頃。刻。傳。變。診。家。不。可。輕。視。吳。又。可。用。達。原。飲。加。引。經。表。藥。透。之。達。之。如。兼。太。陽。加。羌。活。陽。明。加。葛。根。少。陽。加。柴。胡。如。舌。變。黃。燥。色。乃。疫。邪。入。

胃加大黃下之。如變黑色入裏尤深。用承氣下之。痘勢甚者。其舌一日三變。由白變黃。由黃變黑。當速下之。

若見鮮紅純絳色。痘傳包絡。及營中清邪解毒。銀犀妙。菖蒲鬱金。黃溫暑通濕。疫一症。治分兩途。但看舌苔白而黃。黃而黑者。痘邪自表達裏。汗之下之可也。如見舌苔鮮紅絳色。此痘邪入於營分。及包絡之間。汗下兩禁。惟宜清營解毒。逐穢開閉。如犀角。銀花。菖蒲。鬱金。西黃金汁。人中黃之類。與溫熱暑症治法相通。

溫邪時疫多斑疹。臨證須知提透。宜疹屬肺家風熱。斑因胃熱發。如茲卻仙根云。此條溫暑斑疹。與傷寒發斑不同。疹屬肺經風熱。斑是胃家伏熱。時疫斑疹兼有毒氣。均宜提透清解熱毒。

疹斑色白。鬆肌表血熱。如丹犀莫遲。舌白。荆防翹薄。力。舌紅。切忌葛升。醫疹斑發於氣分。其色淡紅而白者。舌苔亦白。宜葛根。防風。蟬衣。荆芥。連翹。薄荷。牛蒡等。鬆肌達表。若見赤斑。丹疹。邪在營分。血分。舌必絳。赤。宜犀角。連翹。鮮生地。人中黃。淨銀花等。透營解毒。大忌升葛。足經之藥。

仙印

根云。白疹邪在氣分。舌白淡紅。宜鬆肌透表。從肺清透。紅疹邪在營分。舌苔絳赤。宜清營宣透。

凡屬正虛。苔嫩薄。淡紅微白。補休遲。厚黃膩白。邪中蘊。診者須知清解。宜不拘虛寒雜症。正氣虛者。其舌苔必嬌嫩而薄。或淡紅或微白。皆可投補。若見黃而白。厚而膩。總屬內邪未清。不可遽進補藥。

即仙根云。此條憑舌苔以驗其虛實。分別宜清宜補之總訣。

又云。以上三十九歌。皆察舌辨症之要法。語語的傳。可謂時病金針矣。後學當熟讀之。

第十九章 察舌辨症之鑑別

蓋心之本脉繫於舌根。脾之絡脉繫於舌傍。肝脉循陰器絡於舌本。腎之津液出於舌端。分布五臟。心實主之。故舌者內通五臟。外繫經絡。上達腦府神經。下應外腎二便。有病與否。皆可於此決之。如虛實寒熱真假陰陽順逆生死等項。由斯辨之。亦能審其病之宜補宜瀉。因溫因涼。是真是假。屬陰屬陽。察其順逆。以定生死。因內藏之病。無不顯現於舌也。茲就上述各舉於後。

第一節 虛實

邪氣盛則實。正氣奪則虛。舌色深赤。邪氣實。舌色淡紅。正氣虛。舌深赤。苔薄而滑者。正勝邪。舌淡紅。苔厚而濇者。邪勝正。不知病之屬實者。其舌必堅。斂而蒼老。病屬虛者。其舌必浮胖而嬌嫩。正氣虛者。其舌苔必嬌嫩而薄。或淡紅。或微白。皆可輕補。若見苔黃而白厚。而膩。總屬內邪未清。不可投補。又實熱之證。全舌必有黃黑苔。積滯乾焦。皴裂芒刺等苔。陰虛之症。全舌必絳色。無苔。雖有橫直。罅紋。而舌則短小不等。若全舌無苔。有津濕而光滑。或其苔白色。與舌為一。刮之不起。垢膩口唇必潤澤無縫。淡白透明。是虛寒也。如純熟白舌。光滑無苔。乃臟腑氣血皆虛寒也。故白薄而淡。及白而嫩滑者。為虛。舌無苔垢而色變者。虛也。舌白無苔而明淡。外症熱者。胃虛也。舌白唇白。或流血過多。或脾有虛病也。舌苔黃濁者。為實。若兼白相兼間有淡灰者。為虛。黃厚糙刺者。為實。黃薄光滑者。為虛。章虛谷云。凡苔薄舌本赤者。為營熱。若淡而不紅者。為心脾氣血素虛。雖有黃苔。亦必不甚厚。此辨本元之虛實。邪氣之輕重也。又如黑苔有芒刺者。為實。黑

如烟煤隱隱而光滑者為虛。吳貞曰：舌黑而潤滑者，屬腎虛也。若舌淡黑如淡墨，一殷乃腎虛火炎為無根之火。若滿舌紅紫無苔，亦屬腎虛。王士雄云：凡黑苔虛寒證，其舌色必潤而不紫赤，更有陰虛而黑者，苔不甚燥，口不甚渴，其舌本甚赤，或舌心雖黑，無甚苔垢，舌本枯而不甚赤，證雖煩渴，便閉，腹無滿痛，神不甚昏，俱宜壯水滋腎，不可以為陽虛也。更有病後絳舌如鏡發亮而光，或舌底嗑乾而不飲冷，此亦腎水虧極也。周微之曰：若舌中忽一塊如境，無苔而深紅者，此脾胃包絡津液太虧，潤漑不用也。亦有瘀血在於胃中，無病或病愈而見此苔者，宜疏消瘀積，不得徒滋津液。按舌細如魚子者，心與命門真火所鼓，若包絡有凝痰，命門有伏冷，則舌面時忽生一塊，光平如鏡，若舌如泥色者，為脾腎虛極也。

第二節 寒熱

舌上無刺而津潤者，中寒也。舌上青黑無刺而津潤者，中寒也。舌無苔而冷滑者，少陰之寒證也。舌黑少神而潤滑者，虛寒也。舌灰黑無苔，脈沉者，寒中三陰也。舌黑無苔而燥者，津液受傷，虛陽上越也。若脾胃虛寒，則舌

白無苔而潤。甚者連口唇面色俱痿白者。此因泄瀉。或受濕。脾無火也。若苔黃厚。而舌中青紫。甚則碎裂口燥。而舌不乾者。此夾陰寒症也。宜溫下之。張三錫云。白苔屬寒。外症煩躁。欲坐卧于泥水中者。乃陰火逼其無根失守之火。而然。脉大不鼓。皆從陰症治。若不大燥嘔吐。從陰症夾食治之。脾熱者。舌中苔黃而薄。心熱者。舌尖必赤。甚或起芒刺。肝熱者。邊赤。或有芒刺。其舌苔厚而黃者。胃微熱也。舌中苔厚而黑燥者。胃大熱也。黑燥如中心。厚者。胃濁邪熱乾結也。章虛谷云。凡現黃苔浮薄色淡者。其熱在肺。尚未入胃。胃熱則苔厚而色深。或苔薄而舌本赤者。營熱也。極紅紫如豬肝色者。為火灼胃爛死證也。醫鏡云。赤為熱。深黃為濕熱。食滯黃薄為濕寒。水飲灰白為脾陰虛寒。紫黑為熱極。或脾胃有瘀血。伏痰滿舌黑苔而生大刺。乾燥底紅者。實熱也。舌生芒刺者。結熱甚也。舌變棕黑色者。亦熱甚也。又有舌色乾黃。刮之不淨。為熱甚也。淺黃膩白者。微熱也。乾濇深黃厚膩者。大熱也。芒刺老黃。圻裂者。熱極也。潤白為寒。若白色如碱。或白如膩粉。為實熱也。粉白乾燥。為實熱更甚也。如舌由黃而黑。或腫或起焦刺。

或卷短堅硬黑而芒刺皆實熱也。如黑而兼青黑而濡滑黑而柔軟皆寒症也。又如陰寒舌黑苔必濕冷而滑不燥不渴脉必沉細證必足冷當以四逆湯溫之。

第三節 真假

真者有迹刮之底色不去。假者無形一刮底色全無。如白苔黃邊舌刮之見淡紅潤澤之底為微邪也。若底留粗濇垢膩如薄燒腐一層者是內熱也。再刮之仍不淨是脾胃真熱假寒也。黃色真熱如白苔上起黑刺刮之黑刺即淨光潤不乾亦為真寒假熱之症。若白苔黑根而且乾厚刮之黑厚無津燥苔口渴消水者真熱假寒也。亦有食枇杷則苔黃食橄欖則舌黑然染成黑苔則刮之即見本色。凡見黑苔先以指甲刮之真者刮之不去。假者一刮即去。凡舌須有地質堅斂蒼老不拘苔色黃白灰黑由舌中延及舌邊指之不去刮之不淨底仍粗濇黏膩是為有根之真苔。中必多滯舌無地質浮胖嬌嫩不論苔白黃灰黑滿布舌中不及舌邊指之即去。

刮之即淨底亦淡紅潤澤不見垢膩是為無根之假苔裏必大虛若清晨苔色滿佈飲食後苔即脫去舌質圓浮胖嫩者亦為假苔活人心法云凡以手捫舌滑而軟者病屬陰粗而燥者病屬陽尚是然虛寒者舌固滑而軟而邪初傳裏及真熱假寒者亦間有滑軟之舌其鑑別臚舉於左

虛寒症 必全舌淡白滑嫩無餘苔無點無痱縫

邪初傳裏症 全舌白滑而有浮膩苔

真熱假寒症 全舌色白而有點花痱裂積沙各實苔不等而舌面之苔刮亦不淨底色且隱紅多刮欲嘔若重刮之沙點傍或出血少許此真熱證也宜慎辨之以上為滑軟之別

實熱症及邪熱入陰經症 實熱症全舌必有或黃或黑積滯乾焦痱裂芒刺等厚胎若鬆浮而不及邊沿一輕擦即脫淨舌底必淡白而不紅或淡紅而舌圓大胖嫩為邪熱入陰經

真寒假熱症 全舌亦或黑苔乾焦裂紋芒刺厚苔惟用生薑切平輕擦即脫淨舌底必淡白而不紅或口呼渴而不喜飲水者為真寒也若用

生薑擦之而苔堅不退。或口極渴而飲水多者。是實熱甚也。
陰虛水涸症。全舌必絳色。無苔。或有橫直罅紋。而舌短小。不等。

第四節 陰陽

凡察舌以手拭舌。滑而軟者。病屬陰。粗而燥者。病屬陽。陰虛陽盛者。其舌必乾。陽虛陰盛者。其舌必滑。陰虛陽盛而大旺者。其舌必乾。而燥。陽虛陰盛而大衰者。其舌必滑。而濕。舌苔有剝落。不生者。為心陰不足。心陽有餘。或胃陰將涸。舌無苔。結成乾赤。光皮似煨熟豬腎。乃陽中伏陰也。凡舌無苔。有因誤下。濕陷於裏。阻遏氣機。使命門之真陽不得上達。蒸騰腐化。而反無苔也。

第五節 順逆

舌苔有由白而黃。由黃而黑者。順症也。有由白而灰。由灰而黑。不由黃轉黑者。此謂之黑陷。苔逆症也。此因誤用溫燥之藥過多之故。難得挽救。其由黃而黑者。乃陽明熱結之故。潤下得法。胃府炭氣得以外出也。故曰順症也。若黃轉黑。枯者。真陰將絕也。遵經云。舌上有苔者。必自潤而燥。自滑

而濇由白而黃由黃而黑甚至焦枯或生芒刺此用藥不當邪氣傳裏由淺入深之逆證也。劉吉人云。苔黃為正。白次之。無論何症。若用藥當皆由白而黃。由黃而退。由退而復生新薄白苔。此為全愈順象也。若用藥不當則由黃而白。由白而灰。由灰而黑。由苔變死苔。此逆象也。若驟退驟無不由漸而退。此陷象也。如夏月人病黑苔。是時氣興邪火內外炎熾。尚有可生。如冬月黑苔厚刺。正不勝邪。必難治也。若傷寒初起二三日即見黑苔。心腎之氣敗絕。內臟真色外現。又如舌全黑而不見赤色者。是水來滅火。皆必死之症。若白苔中心漸黑者。乃邪熱傳裏。紅色上漸漸有黑心者。乃濕熱瘟疫傳變壞病將至也。大抵尖黑猶輕。根黑最重也。

第六節 生死

生死之決於脉者。前賢垂訓明且備矣。然驗之於舌。則尤顯而易見也。茲將舌所經驗之危症。彙錄於下。唇青舌黑。如去膜猪腰者。為亡津液不治之症也。舌如鏡面者。古鑑云。舌色紅光滑柔嫩無津者是也。良由汗下太過。元津耗傷。宜大劑生津散救之。尚可復生也。舌如硃紅柿者。舌糙刺如砂皮而乾枯燥裂者。舌飲束如荔子壳而

絕無津液者。舌如烘糕者。舌本強直轉動不活而語言蹇澀者。以上皆危候也。然危候雖見而執診者胸有灼見虛實寒熱之綱領猶可生也。如舌見白苔如雪花片者脾冷而閉也。如全舌竟無苔久病胃氣絕也。如舌因誤服苓連而現人字紋者。如舌卷而囊縮者。以上各證見一必死。然敗象雖見凡吾輩亦宜百不一治之症當作萬有一生之望竭力挽救修短雖有定數然返之吾心可告無罪也。其他如舌忽變棕黑色者熱病將死也。舌焦乾黑而脉代者死證也。疳病耳邊有青脉舌上有焦點者不治也。疳病口渴飲水不止舌黑者死證也。舌見藍色者肺氣傷也微可治深必死。舌短卷痿軟枯小者危。舌淡灰轉黑淡紫轉藍邪毒攻心已甚而傷腐脾胃者危不治。舌黑爛而頻欲蓋必爛至根而死。舌底乾燥不拘苔色黃白如豆腐渣者或如蟹碎飯子者皆死。此俗名飯花苔。舌與滿口生白衣如霉苔或生糜點胃體腐敗也多死。舌乾晦枯痿而無神者必死。舌絳無苔乾枯細長而有直紋透舌尖者心氣內絕也。舌燥苔黃中黑通夫利下臭水者胃腸腐敗也。

十不救一。舌。饒。白。兼。青。此。中。焦。生。氣。已。絕。也。多。死。若。孕。婦。面。舌。俱。青。母。子。俱。死。舌。黃。全。舌。見。薑。黃。色。苔。及。淡。松。花。色。苔。皆。津。枯。液。涸。而。冷。陽。衰。胃。敗。之。徵。亦。多。不。治。舌。邊。缺。陷。如。鋸。齒。者。內。藏。已。虛。憊。亦。不。治。也。

第二十章 舌病證治之鑑別

千金方云。舌重十兩。長七寸。廣二寸半。善用機衡。能調五味。遵經云。手少陰通舌本。足少陰挾舌本。足厥陰絡舌本。足太陰連舌本。散舌下。舌本在下。舌尖在上。舌中為內。舌邊為外。左病應左。右病應右。舌膜由三焦膜理直達胃腸。舌本由經絡直通心脾腎。故凡舌之偶生疾患。如腫瘡。疔癰。重木。疔。菌。黃。血。及。二。強。瘡。癰。痺。麻。齒。短。等。病。皆。由。藏。府。風。毒。邪。熱。搏。於。血。氣。隨。其。虛。實。發。現。於。舌。著。而。生。病。猶。當。分。其。舌。之。體。質。病。與。舌。之。功。用。病。為。二。種。如。心。脾。熱。壅。為。腫。舌。舌。根。粗。大。木。悶。而。硬。為。木。舌。舌。根。腫。脹。為。重。舌。風。濕。相。搏。則。舌。生。瘡。或。為。癰。脾。熱。則。生。黃。心。火。上。炎。則。生。疔。或。生。菌。肝。壅。則。出。血。為。舌。衄。惟。舌。斷。由。於。外。傷。非。發。自。內。也。此。皆。舌。之。體。質。病。也。餘。如。心。之。本。脉。繫。於。舌。根。脾。之。絡。脉。繫。於。舌。傍。故。主。舌。強。舌。縱。肝。脉。循。陰。器。絡。

舌本故為舌痺舌麻舌短七情氣鬱則舌不能言為舌瘡少陰厥氣逆上為齧舌此皆舌之功用病也茲條舉兩類於后

(甲) 舌之體質病

第一節 腫舌

舌腫一症皆由心火旺盛逼血挾痰上壅所致內必煩躁悶亂甚則不能出聲有舌卒腫如猪胞者有腫硬如木石者有脹塞滿口不能通聲者有舌下形如蜈蚣形或如卧蠶形者皆宜急將腫突處砭去其血仍用釜底煤以鹽醋調厚傅之得效方云舌卒腫如猪胞者以針刺舌下兩傍大脉血出即消切勿刺中央總脉誤刺則血不止而死若誤刺以銅筋火燒烙之或醋調百草霜塗之須臾自消或用冰片分一火硝分各礞砂分各青黛膽礬各三分蠶蠶分五共為末吹之即愈三因方云凡舌腫舌下如有喋蟲狀形如蜈蚣卧蠶有頭尾其頭小白可燒鐵烙烙頭上即消不急治能殺人張戴人云一老人身熱數月舌根腫起和舌尖亦腫腫至滿口比原舌大三倍用鉗針磨令鋒極尖輕輕砭之日砭八九次出血約一二盞痛減腫消此

亦心火旺極之候。如舌腫滿口，不能出聲，由心脾之火併結於舌。宜蒲黃

散。蒲黃海螵蛸等分為末。搽之。蒲黃性寒，能清瘀涼血，即愈。如暴腫如豬肝狀，滿口不

能出聲者，亦宜醋調釜底墨塗舌下，脫即更傳。如舌腫咽生瘰肉而痛者，

宜秤錘燒紅，淬醋一盞飲之。如舌下忽然高腫起核，名舌墊者，宜荊荷湯。

荊芥防風薄荷白芷姜黃連鮮生地香附煎湯服之。如口唇腫痛，狀若無皮，或發熱作渴，

此屬脾胃虛熱，宜清熱補氣湯。當歸鮮金銀烏元參破麥冬五味子竹葉

煎服。如不應加炮姜。三四分如眼如烟觸體倦，少食，午後益甚，此屬陰血虛

寒，宜清熱補血湯。皮四物湯加元參知母黃柏丹如舌腫由於酒客膏粱積

熱，如盛上焦痰實者，宜涼膈散清瀉之。如七情所鬱，舌脹滿不得息，宜舒

鬱清上焦。外用生川烏生南星乾姜等分為末，醋調手足心。又有痰包亦

如腫舌，乃痰飲乘火流行，凝注舌下，結而胞腫，綿軟不硬，有妨言語甚則

塞令滿口疼痛不安，用錐針對包上撚之，如鑽破出稀痰，如雞子清稠黏

不斷，拭淨，用冰硼散。梅冰片一分，煨硼砂五錢。末搽之內服二陳湯加苓

連薄荷牙皂。若痰包破後復發者，宜清金如聖散。方見萬春若舌上痰核乃

痰氣結於舌上。作痛強硬者。用細針點破出血水。亦用冰硼散吹之。若飛絲入口。間亦生泡腫。用嫩蘇葉細嚼。白湯送下。

第二節 木舌

凡舌不能轉掉。腫而不柔和者。名曰木舌。先有風寒傷於心脾。熱壅生痰。以致舌腫粗大。漸漸硬塞。滿口氣不得吐。如木之不和軟者。然其外證憎

寒壯熱。齒浮腫痛。不急治。即脹塞殺人。內服宜黃連湯。川連鮮生地歸尾

角薄荷生甘草水煎食後服。外以針日砭八九次。令出血二三蓋。自然腫消痛減。再用

龍腦破毒散。淡牙硝二錢。上青黛。麝香各一分。共研極細末。指蘸擦患處

即瘥。或用硼砂末。以生薑片蘸搽。少時即消。又有一症舌腫生舌根下。狀

如白裏。有紫筋。不能速愈。初起不疼。不發寒熱。漸漸腫大。速治可愈。皆由

憂鬱所發。實漢卿曰。木舌證。硬如穿山甲。見人舌做一拳。外證憎寒壯熱。

語言蹇澀。此心經受熱。治法以小刀點紫黑處。出紫黑血。蓋許。內服外搽。

治法同前。又有舌上有白苔結。硬必作木舌。藥味不得入者。指拭潔淨。用

竹刀刮舌。然後用藥。凡肝經熱甚。舌亦木硬。張百憲云。舌忽脹大。腫硬。脹

塞滿口。卽時氣絕。名曰雲舌。用膽礬不拘多少。新瓦上煨紅。放地上。俟冷。研細。擦舌立愈。竇漢卿云。此證因心經熱毒。或因酒後溫床厚被。以致熱氣攻心。故令舌脹而紫。急吹導痰開關散。吐去風痰。急用三稜針刺舌下金津玉液二穴。及刺乳蛾破出血痰。接用龍腦破毒散。前見井水調成膏。細嚥。卽吐惡血自愈。

第三節

重舌

附蓮花舌

重脣

重齦

重舌乃舌下生一小舌。其色鮮紅。外證頰下浮腫。有硬核。此因心經熱毒。或由心經過鬱。憂思過度。心脾鬱而生熱。其狀附舌下而近舌根。形如舌而微短小。當以針刺點患處。上出惡血。內服黃連瀉心湯。或一味黃連湯。外吹用冰硼散。方見腫舌搽之。或用紫雪丹。青柴煨。研。砂。元。明。粉。各三錢。梅冰一錢。麝香五分。研極末。搽舌下。流出毒涎。或用牙皂炒一錢。元明粉三分。研細。搽之。涎出自消。蓮花舌是舌下生三小舌。其狀如蓮花之形。皆由思慮太過。心火上炎。或酒後當風取涼。以致風痰相搏而成。此候急用清涼解毒湯加減服之外。以針刺出惡血。以竹瀝調黃柏末塗之。顧練江云。蓮花舌男婦多。因思慮過度。每

生此舌。若因循日久。以致潰爛腐穢。舌頭一爛。外殼雖存。其中如爛魚腐。腸相似。切不可用升降藥吹搽。偶一誤用。即血出如泉。至穿腮腐。根百不一生。重膠其有者。頰裏及上膠生一瘡。形如楊梅。謂之重膠。外證無寒熱。但作事煩心。先以甘桔湯重加焦梔。後服黃連解毒湯。外用冰硼散吹之。不宜用刀。或常以紫雪丹前方見噙化。重齧其著於齒齦上下者。名曰重齧。宜砭刺出血。用烏犀膏錢白梅少許。好酒一合。全前藥攪勻。令入參二入喉中。蘸點喉中。以出盡頑痰為度。外以天南星散生南星去皮。用醋調塗男左女右腳心。厚皮紙貼。如乾再用醋潤。凡治重舌。用陳醋一碗。五靈脂兩入銅杓內。煎三沸為度。離火用筋攪之。沫平再煎。俟冷。將醋少許頻含。待涎沫滿口。即吐。勿嚥下。外用牙皂四五支。去皮弦炙焦。荆芥錢二共為末。以米醋調塗腫處。即消。又以蛇脫燒灰研極細。少許傅之。

第四節 舌菌

心法名舌疳。由心脾毒大所致。其證最惡。初起如莖。次則如菌。頭大蒂小。其色紅紫。疼痛異常。甚則紅爛無皮。朝輕暮重。輕則用塘雞屎和冰片塗。

上蓋用蒲黃末。或蜘蛛絲纏緊。忍痛自落。若落後出血。用蒲黃末。或百草霜。烏梅末。銅絲。搽上皆止。重而急者。用北庭丹。番人。中白。殿各五。分。瓦。錢。用。銀。管子。二。個。將。藥。裝。在。罐。內。將。口。封。固。用。鹽。泥。固。濟。以。炭。火。煨。候。候。三。柱。香。為。度。候。冷。開。罐。將。藥。取。出。再。加。冰。片。麝。香。各。一。分。共。研。極。細。香。候。以磁針刺破舌菌。用丹少許點。再以蒲黃末蓋之。自然消縮而愈。若失治。則焮腫突如泛蓮。或如大木耳。或如雞冠。舌本短縮。將妨客言。語飲食時。流臭涎。再因怒氣上沖。忽然崩裂。血出不止。久久延及項領。腫如結核。堅硬。骨痛。皮色如常。頂軟色黯。破後時流臭水。腐如爛綿。其證雖破。堅硬腫痛。仍前不退。此為綿潰。甚至透舌穿腮。湯水漏出。是以名療癰風也。內服湯藥。宜用導赤湯。加川連。焦桅。重則解毒湯。加焦桅。犀角。鮮地。外治或用錦地羅。蘸醋磨敷。自古治法雖多。然此證治愈者。十不得一。

第五節 舌黃

奎光曰。舌黃乃舌生黃腫疼痛。亦屬心脾之火。先用冰片散搽之內服涼心清熱。如元參升麻湯治之。又如舌生黃腫至滿口。以蛇脫一張。含舌下。即消。

第六節 舌疔

心法云。舌疔者。乃心脾火毒。舌生紫泡。其形似莖。堅硬。寒熱疼痛。應心而起。宜用蟾酥丸含放舌下。隨化隨嚥。或再服三丸。以解內毒。甚者以銀針刺之。內服黃連解毒湯。甚則犀角地黃湯。兼搽紫雪丹。余師愚云。若舌上發疔。或紅或紫。大如馬乳。小如櫻桃。三五不等。流膿出血。宜甘露飲。溫方見鮮增石膏。犀角連翹。加銀花。金汁水。重清心火。舌上成坑。愈後自平。舌上宜搽錫類散。

第七節 舌癰

奎元曰。舌癰初起。舌紅而腫大。心經火盛。地角亦紅。初起用金丹碧丹。方見瘍醫大千金煎。藥用黃連。焦山梔。犀角連翹。木通。生地。丹皮。生甘草。麥冬。赤芍。水煎服。

第八節 舌瘡

舌瘡。有心熱火毒。上炎而生者。有下虛陰火上浮而生者。若口中生瘡。於舌上吐出在外。寸餘上結成黃靨。難以食物。此熱毒在心也。用冰片一分。

入蚌口內。立化為水。乃以鷺翎數掃其上。立刻收入。外服清火涼心之藥。亦有舌上病瘡。久蝕成穴。屢服涼劑不效。後服黑錫丹漸愈。此因下虛上實之證。即遠公所云下焦元虛不降。投養正丹遂愈是也。竇夢麟云。舌上生瘡如黃粟。外證口張憎寒。亦宜先用蚌水。或田螺水漱淨。然後吹藥。如冰硼散。紫雪散皆可用之。

第九節 舌衄

凡舌上出血。名曰舌衄。多由心脾熱甚。逼血妄行。若舌上無故出血如線不止。乃血熱上溢。心苗宜用犀角地黄黃連瀉心湯選用。外以槐花炒研細末。乾摻之。或出血竅如簪孔者。以杜赤苳一升煎取汁一杯。不拘時服。外亦用槐花末摻之。或用露蜂房頂上實處一兩。川貝母四錢。蘆薈三錢。為細末。蜜為丸。雷丸大。每含一丸。若舌上出血如泉者。乃心火旺極。血不藏經也。宜用六味地黃湯加炒懷牛膝。槐花。外摻用文蛤散。五倍子炒白膠香牡蠣粉每用少許摻患處。或燒熱烙鐵烙孔上亦止。有因肝熱血上壅而衄者。先用木賊草四錢煎濃汁漱口。外摻炒蒲黃末即止。沈金鰲云。如

舌忽然腫硬如石。血出如湧泉者。宜蒲黃散。方見腫舌上。亦有硬腫痛流血者。宜涼血清脾飲。犀角地黃湯。凡紅尖舌出血。乃心經熱毒壅盛。心火不藏。妄行而濺。用三黃瀉心湯。如犀角。翹柏。正義云。舌紅而出血如衄。為熱傷心。胞。犀角地黃湯主之。慎菴將前方加蒲黃。川連。更妙。大抵病心經熱極者。多舌出血。有病愈而血仍不止者。用煨人中白一錢。冰片五厘。研細末。搽之。即止。

第十節 舌斷

秘錄云。偶含刀在口。割斷舌頭已垂落而未斷者。用雞子白外軟皮袋住舌頭。以破棺丹。花粉三錢。赤芍二錢。黃粉白芷各一兩。為末。以蜜調塗舌根斷血。却以蜜調黃蠟稀稠得所。敷在雞子皮上。常勤添敷。三日舌接住。方去雞子皮。只用蜜蠟勤敷。七日全安。愈後舌硬。以白雞冠血點之。即軟。林醫若舌斷重生。用活蟹一只。炙乾為末。每用二錢。同乳香沒藥各二錢五分。敷之。即生肉。若穿斷舌。心血出不止。以鴛翎蘸米醋頻刷斷處。其血即止。仍用蒲黃杏仁。研砂少許。為末。蜜調成膏。含化而安。以若舌頭被人咬去。即用黑鉛水銀炒

成沙子。寒水石、輕粉、礪砂為細末。先以乳香、沒藥煎水噙口中止痛。抹上藥。即長全有效。四

(乙) 舌之功用病

第一節 舌強

舌強者。舌質堅硬。不能運動。語言不清之謂也。則第九對腦筋功用有欠缺之因。當察其所因之故。方有治法。內經謂舌強不能言者。足少陰之病也。如卒中風則舌強不能言。神不清。大概用小續命湯。寒用理中湯。熱用甘桔湯。加防風、枳殼、黃芩。如風寒濕痰舌強不能語者。用礬石散。心等分桂末。每一錢。按舌下。或正舌藥。痰熱舌強。壅腫或短。外治亦用礬石散。或牙皂末按舌下。內服甘露飲。加化痰藥。或牛黃散。方見醫書或用蛇脫境。全鑿等分。為末。敷之。風熱舌強不能言。奄忽不知人。喉中噫噫然有聲。發其汗。身轉軟者。生汗不出。身直者。七日死。若咽噤不能言。邪結於舌根者。死不治。舌卷不能言者。亦死。小兒撮口。臍風。舌亦強直者。死證也。若舌硬外生膜衣。用犀黃、硃砂。各一分元精石。錢二共為末。將舌夫刺出紫血。用此藥搽之。

第二節 舌瘡

舌瘡者。中風而舌不轉運。舌強不能言者是也。馮楚瞻曰。足四經之脉皆止於舌。邪中其經。則痰涎閉其脉道。舌不能轉運而為之瘡矣。有喉瘡者。勞嗽失音。即喉嚨聲啞是也。故喉瘡者。喉中之聲嘶。而舌本能言。舌瘡者。舌本不能言。而喉中之聲音如故。中風而舌瘡者。舌與喉俱病。而音不能發於會厭也。有因外感實火。上炎則暴瘡。有因內傷心。肺。腎以致壅塞上竅。而為瘡。有因氣血兩虛。不能上榮。則舌機不動。亦為瘡。有因腎虛而氣不歸原。不能上接清陽之氣。而為瘡。然中風不語之症。有六。有失音不語者。有神昏不語者。有口噤不語者。有舌強不語者。有舌縱語塞不語者。有舌麻語塞不語者。可不詳辨歟。

第三節 舌痺

舌痺者。強而麻也。乃心緒煩擾。憂思暴怒。氣凝痰火。而或用荊芥雄黃。各分。木通煎湯調下。有痰壅舌麻痺者。宜生礬研末。搽之。或牙皂末搽之。若舌蹇語聲遲重者。脾竅在舌。濕邪阻竅也。亦有舌無故常自痺者。由心血

第四節 舌麻

舌麻者。血虛也。麻木而伸不出者。內風挾痰也。若舌麻木連口。延及嘴角。頭面。證見嘔吐痰涎者。痰多氣滯也。有因風依於木。木鬱則化風。肝風震動而舌麻也。亦有因五志過極。陽亢陰衰。風從火出而舌麻也。皆宜柔潤養血熄風挾痰者。兼豁痰宣痰。

第五節 舌縱

涎下者多唾也。經云：飲食者皆入於胃，胃中有熱則蟲動，蟲動則胃緩，胃緩則廉泉開。廉泉開故涎下。補足少陰。若口角流涎不止，口眼歪邪，手足痿軟，宜神龜滋陰丸。龜版四兩，川柏炒，知母炒，枸杞子各二兩，五味子、連黃芩、金各七錢五分，僵蚕羌活、天麻各五錢，製川烏二錢共為末。薑汁糊為丸。若舌縱語塞不語者，用薄荷油一滴和白蜜姜汁搽之。若流涎不止，喜笑舌瘡，脉洪大，用荅連、蘗梔、蒼朮、半夏、竹瀝、薑汁服五日。涎止笑息，凡流涎者，息然流出也。氣虛則舌縱而

麻

第六節 舌嚙

經云。此厥氣逆上。脉氣皆至也。少陰氣至則嚙舌。少陽氣至則嚙頰。陽明氣至則嚙唇。視主病者則補之。宜東垣復氣湯。柴胡歸身各六分羌活黃芩各七分白英花五朵去心人參防風陳皮李仁桃仁各五分蔓荊子三分後下黃耆草薹各一錢再下川柏川連枳壳生地川芎北細辛各三分主之。此方專治咬頰咬唇咬舌及舌根強硬如神。若舌黑而頻嚙者必爛至根而死也。舌色灰黑時時自欲嚙舌者少陰氣逆之死證也。

第七節 舌吐

舌吐長不能收者名曰陽強。舌短縮不能言者名曰陰強。陽強之證如仲景言傷寒熱病後犯房事得病為陰。陽易舌出數寸而死。如醫說言傷寒熱病愈後不能調攝舌出寸餘累日不收必以梅冰為末搽舌上應手而縮。須用多方效。吳崑云舌出者熱實於內而欲吐舌泄氣也不能入者邪氣久居舌強而不柔和也。以冰片辛熱而氣清香可以利竅。可以柔筋。可以泄氣。故得之而舌即入矣。若熱病舌腫舒出口外以蓖麻子油蘸紙作燃燒烟薰之。吳崑云此心脾熱勝則腫也。木犀云蓖麻主浮腫惡氣取油薰之。葉主風腫不仁搗熟敷之則其能解風腫內熱也。明矣。然用

烟亦有妙義。烟乃輕清之物。一入於口。呼吸。醫通云。舌暴腫出。口用芭豆霜。分以紙撚捲之。納入鼻中。舌亦即收。此亦取其辛烈開竅散火引毒流散之意。與小兒口疳貼顙同法。李挺云。一婦因產子受驚。舌出不收。醫以硃砂敷其舌。今仍作產子狀。以兩女扶掖之。乃於壁外擲瓦盆於地作聲。聲聞而舌即收矣。經云。舌者。心之苗。因產心驚。夢寐驚。一人中蜈蚣毒。亦舌出口外寸餘。他醫以前各法治。皆不效。李挺命取雞冠血塗之。使人持銅鏡立其後。擲鏡於地。聲大而騰。病者愕顧而舌收矣。張果醫說云。人有中仙茅毒。舌脹出口外。漸大與唇齊。因以小刀剪之。隨破隨合。剪至百數。始有血一滴出。曰可救矣。隨煮大黃。樸硝。錢各五與服。外以藥慘之。應時消縮。此火盛性淫之人。過服仙茅之害也。

第八節 舌短

舌短者。有生就與因病之別。種類甚多。已詳辨於第十章第五節舒縮條下。此不重辨。特列之以備一格耳。

第二十一章 辨舌病之治療法

舌病治法。內服外塗。皆已詳於前。茲摘錄經驗單方。及針灸法。導引法。條列於后。以俾參攷合用。

第一節

舌上生芒刺燥澀。或如楊梅刺者。皆熱結甚也。宜用生薑切厚片。蘸蜜。於舌上揩之。陶華云。傷寒舌上生苔。不拘滑白黃黑。用井華水浸青布片洗淨後。用生薑切作片。時時浸水刮之。輕者其苔自退。重者難退。必須大下之後。津液還。而苔自退矣。

舌生瘡。或白苔乾澀如雪。語言不清。薄荷自然汁。和白蜜等分。調勻。傳之良。又方如生薑蜜水。揩洗後。用硃砂雄黃。硼砂。麝各少許。為末。傳亦良。三四方內有結熱而舌生紅粟點。宜竹瀝調寒水石末。搽之。導舌生芒刺。

結熱甚者也。若舌生紅粟。以紫雪和竹瀝塗之。門入

若勞心人。舌生瘡。宜琥珀犀角塗之。門入

脾熱則舌苔乾澀如雪。宜冰梅丸。黃柏薄荷。研碎等分。冰片含化。

心熱。則舌裂而瘡。無論重木舌。宜三黃丸末。水調貼脚心。又用白礬大黃。

撲硝擦漱。又醋調五靈脂末。烏賊骨薄黃塗之。服清肝經實熱之藥。

舌瘡由虛陽上浮者。吳茱萸醋炒乾薑炮各五錢木鱉去壳研末。每用五分。水調納

臍中。外紙貼蓋。醫殺

舌腫塞滿口。不能飲食。用真蒲黃一味。頻刷舌上。甚則加乾薑末從治之。

若能服藥。卽以一味川連煎濃汁呷之。以瀉心火。醫通方

舌腫滿不得息。因七情所鬱。宜烏梅薑末貼兩足心。

舌腫脹出口。硼砂為末。生薑片蘸藥揩腫處。卽退。目細

重舌腫脹。因怒氣而得者。取鐵銹鎖燒紅。打下銹研末。水調錢一噙嚥。

木舌腫脹。因痰氣壅閉者。用生川烏尖芭豆研細。醋塗調刷。涎出卽愈。

木舌腫滿。不治殺人。蚯蚓一條。以鹽化水塗之。良久漸消。聖惠方

懸雍舌腫。咽生瘰肉。羊蹄草煮汁熱含。冷吐之。同上

小兒重舌。用三稜針于舌下紫筋刺出血。卽愈。又用竹瀝調蒲黃末敷舌。

立效。幼幼近編

舌上生瘡。用羊腰骨中髓和胡粉塗之。聖惠方

口舌生瘡。爛久不瘥。用薔薇根濃煎汁。稍稍含漱。溫含冷吐。卽效。冬聚夏

取莖葉用。草木

重腫出血如泉。海螵蛸蒲黃各等分研末。并華水調敷。

舌硬出血不止。取刺薊汁和酒服。乾者為末。冷水服。普濟

舌硬出血。取木賊草煎湯漱之愈。聖惠方

舌縮口噤。以生艾搗敷之。乾艾浸溼亦可。聖濟總錄

飛絲入口。致舌間生泡。取蘇葉嚼白湯送下。立效。丹溪

第二節 舌病針灸法

東垣云。廉泉一穴。一名舌本。在領下結喉上。治舌下腫難言。舌縱涎出口

噤。舌根急縮。下食難。刺瘡論云。舌下兩脉者。廉泉也。刺禁論云。刺舌下脉

太過。血不止。為瘡。刺節真邪論云。取廉泉穴。血變而止。以明宜出血。禁用

針。或問取廉泉二說不同。一說取領下結喉上。一說舌下兩脉。何者為當。答

曰。舌本者。乃舌根蒂也。若取舌下兩脉。是舌梢也。舌標也。此法誤也。當取

頷下者為當。此舌根也。況足陽明之脉。根於厲兌。結於廉泉。頷下乃足陽
陽明之所行也。若取舌下兩脉。非足陽明經也。戊與癸合。廉泉足少陰也。
治涎下解云。胃中熱上溢。廉泉開。故涎下。當出血。瀉胃中熱。又知非舌下
兩脉也。頷下。結喉上者為准矣。張論云。廉泉玉英者。津液之道路也。按針
經云。少陽結於廉泉。今曰陽明者誤也。景岳云。廉泉治舌下腫。口瘡。舌縱。
舌根急縮。金津玉液二穴刺出血。

舌下腫難言。舌縱。喝戾不端。通谷主之。

經甲乙千金主廉泉然谷。

舌下腫難言。舌縱。涎出。主陰谷。

舌下腫難言。口瘡。舌縱。涎出。及舌根急縮。廉泉針三分。得氣即瀉。灸三壯。

舌腫脹甚。先刺舌尖。或舌上。或舌傍出血。唯舌下廉泉穴禁針。

萬病回春

舌卒腫。滿口。溢出。如吹猪肚。胞氣息不得通。須臾不治殺人。急以指刮破。

舌兩邊去汁即愈。或以鉞刀決兩邊破之。再以瘡膏敷之。

又方。刺舌下兩邊大脉出血。勿使刺著舌下中央脉。血出不止。如上治不
愈。或血出數升。則燒鐵篦令赤。慰瘡數過。以絕血也。得效方云。舌腫如猪

胞以針刺舌下兩傍大脉。血出即消。切勿刺中央脉。血出不止則死。急以銅筋火燒烙之。或醋調百草霜塗之。須臾自消。

凡舌腫。舌下必有禁蟲。狀如螻蛄。卧驚。有頭有尾。少白可燒鐵烙。烙頭上即消。

厥口僻失。欠下牙痛。頰腫惡寒。口不收。舌不能言。不得嚼。大迎主之。

舌急則啞門。舌緩則風府。

舌緩涎下。頰悶。取足少陰。

舌緩瘡不能言。舌急語難。主風府。舌上黃。身熱。主魚際。

舌本痛。主中衝。俠舌。縫脉青。主天突。舌乾。脇痛。主尺澤。

重舌。刺舌柱以鉗針。舌本出血。取扶突。大鍾竅陰。

舌捲口乾。心煩悶。主關衝。舌捲不能言。主復溜。

舌捲。獨取手少陽絡。筋經云。邪客手少陰之絡。令人喉痺。舌捲口乾。心煩。

臂外廉痛。手不及頭。刺手中指次指爪甲上。去端如韭葉。各一痛。又云。手。

陽明之筋。其病支痛。轉筋。舌捲。治在燭針。劫刺以知為度。以痛為輸是也。

凡治重舌木舌紫舌脹等疾。腫脹疼痛硬強不語。又兼舌根并兩齒合徑盡處作腫。痰肉塗塞。口噤難開。俱用此法刺之。用粗綿針紫在箸頭上。在患處點刺出血。紅紫毒輕。紫黑毒重。患甚者數十點皆可。血盡溫湯漱之。甚者金鎖匙。輕者冰硼散。搽患上。流去熱涎。內服涼膈散。醫學綱目

第二節 舌病導引法

重舌擦法。重舌急證。用指去爪。先於舌下筋上擦至根。漸深深擦入。如此三次。又用指蘸水。取項後燕窠上小坑中筋。自上赴下。至小屈深深擦入。亦三次。小兒若飲乳勝前。則病去矣。得效方

舌下重舌。先用患處推散。腎水升至舌下洗之。推開肺經。呵而吸之。保生秘要

彩圖辨舌指南卷四目錄

第四編 辨舌各論

第二十二章 白苔類診斷鑑別法

白苔舌總論一

白苔舌證治圖說計三十四舌

微白薄苔舌 第一

微白滑苔舌 第三

乾厚白苔舌 第五

左邊白苔舌 第七

白苔黃心舌 第九

白苔雙黃舌 第十一

白苔黑根舌 第十三

白苔黑點舌 第十五

白苔畧厚舌 第二

厚白滑苔舌 第四

淡白透明舌 第六

右邊白苔舌 第八

白苔黃邊舌 第十

半白滑半黑黃舌 第十二

白苔雙黑舌 第十四

白苔黑斑舌 第十六

白苔黑刺舌 第十七

白苔黃尖灰刺舌 第十八

白尖中灰根黃舌 第十九

白苔雙灰舌 第二十

白苔尖紅舌 第二十一

白苔中紅舌 第二十二

白尖紅根舌 第二十三

根白尖紅舌 第二十四

白尖中紅根黑舌 第二十五

白苔沿淡紅舌 第二十六

白苔紅點舌 第二十七

純熟白苔舌 第二十八

偏白苔舌 第二十九

白苔積粉舌 第三十

白苔燥裂舌 第三十一

白苔乾硬舌 第三十二

珍珠白泡舌 第三十三

孕婦傷寒舌 第三十四

第二十三章 黃苔類診斷鑑別法

黃苔舌總論二

黃苔舌證治圖說計二十五舌

初病微黃舌 第三十五

久病微黃舌 第三十六

微黃不滑舌 第三十七

深黃尚滑舌 第三十八

純黃微乾舌 第三十九

黃尖舌 第四十一

黃尖白根舌 第四十三

黃根白尖短縮舌 第四十五

黃苔黑心舌 第四十七

黃尖黑根舌 第四十九

紅心黃滑舌 第五十一

黃苔灰尖舌 第五十三

黃苔黑點舌 第五十五

黃苔夾瓣舌 第五十七

孕婦黃苔舌 第五十九

第二十四章 黑舌類診斷鑑別法

黑色舌總論三

黑色舌證治圖說計三十二舌

黃乾舌 第四十

根中漸黃舌 第四十二

白尖黃根舌 第四十四

黃大脹滿舌 第四十六

黃苔中黑通尖舌 第四十八

根淡紅微黑尖黃舌 第五十

雙黃沉香色舌 第五十二

黃苔灰根舌 第五十四

黃苔黑斑舌 第五十六

黃苔黑刺舌 第五十八

純黑舌第六十

純黃黑苔舌第六十二

黑燥厚心舌第六十四

中黑無苔枯瘦舌第六十六

白滑黑心舌第六十八

白苔夫根黑舌第七十

沿白黑心舌第七十二

黑苔灰紋舌第七十四

黑苔瓣底紅舌第七十六

滿黑刺底紅舌第七十八

紅邊黑心滑舌第八十

裏黑舌第八十二

裏圈舌第八十四

紅根黑尖舌第八十六

全黑無苔舌第六十一

中心黑苔舌第六十三

中黑無苔乾燥舌第六十五

黑乾短舌第六十七

乾白黑心舌第六十九

邊白中黑滑舌第七十一

通尖乾黑邊白舌第七十三

黑苔瓣底黑舌第七十五

滿黑刺底黑舌第七十七

弦紅中微黑舌第七十九

邊紅通尖黑乾舌第八十一

中焙舌第八十三

紅舌黑尖舌第八十五

紅尖黑根舌第八十七

紅中淡黑舌第八十八
黑爛自齧舌第九十

紅中焦黑舌第八十九
孕婦黑苔舌第九十一



圖彩
辨舌指南卷四目錄

終

辨舌指南彩圖刊誤表

第十三圖

白苔黑根舌

至根漸漸而黑。非如圖中舌根黑色如截。

第十五圖

白苔黑點舌

紅太色

第十八圖

白苔尖灰刺舌

白苔下多一黃字。尖灰色誤黃色。

第二十四圖

根白尖紅舌

根白色誤黃色。

第四十九圖

黃尖黑根舌

根舌心淡黃。至根漸漸而黑。

第五十七圖

黃苔隔瓣舌

黃苔隔瓣舌形。非黑點。花。

第七十七圖

滿黑刺點紅舌

紅舌非黑起刺。撥開刺底淺紅。如圖中舌質淡紅。

第一百另圖

灰苔黑滑點舌

字誤底。

第一百另八圖

紅中微黃滑舌

根字誤。

辨舌指南圖

白色舌總圖一

圖舌邊黃苔白




(十第)

圖舌苔白邊左




(七第)

圖舌苔薄白微




(一第)

圖舌黃雙苔白




(一十第)

圖舌苔白邊右



(八第)

圖舌苔滑白厚



(四第)

圖舌黃黑半滑白半



(二十第)

圖舌心黃苔白



(九第)

圖舌苔明透白淡



(六第)

圖舌紅中苔白



(二十二第)

圖舌黃根灰中尖苔白



(九十第)

圖舌斑黑苔白



(六十第)

圖舌根黑苔白




(三十第)

圖舌根紅尖苔白



(三十二第)

圖舌灰雙苔白



(十二第)

圖舌刺黑苔白



(七十第)

圖舌黑雙苔白



(四十第)

圖舌紅尖苔白根




(四十二第)

圖舌紅尖苔白



(一十二第)

圖舌刺灰尖黃苔白



(八十第)

圖舌點黑苔白



(五十第)

黃色舌總圖二

圖舌黃微病初



(五十三第)

圖舌滑尚黃深



(八十三第)

圖舌乾黃



(十四第)

圖舌裂燥苔白 圖舌黑根紅中夾白



(一十三第)



(五十二第)

圖舌硬乾苔白



(二十三第)

圖舌點紅苔白



(七十二第)

圖舌泡白珠珍



(三十三第)

圖舌粉積苔白



(十三第)

圖舌黃尖黑微紅淡根 圖舌心黑苔黃 圖舌根黃尖白 圖舌尖黃



(十五第)



(七十四第)




(四十四第)



(一十四第)

圖舌滑黃心紅 圖舌尖通黑中苔黃 圖舌縮短尖白根黃 圖舌黃漸中根



(一十五第)



(八十四第)



(五十四第)



(二十四第)

圖舌色香沉雙黃 圖舌根黑尖黃 圖舌滿脹大黃 圖舌根白尖黃



(二十五第)



(九十四第)



(六十四第)



(三十四第)

黑色舌總圖三

圖舌黑純




(十六第)

圖舌苔無黑全



(一十六第)

圖舌苔黑心中



(三十六第)

圖舌斑黑苔黃




(六十五第)

圖舌尖灰苔黃



(二十五第)

圖舌瓣火苔黃



(七十五第)

圖舌根灰苔黃



(四十五第)

圖舌刺黑苔黃



(八十五第)

圖舌點黑苔黃



(五十五第)

圖舌黑底辨苔黑



(五十七第)

圖舌心黑白沿



(二十七第)

圖舌心黑白乾



(九十六第)

圖舌瘦枯苔無黑中



(六十六第)

圖舌紅底辨苔黑



(六十七第)

圖舌白邊黑乾尖通



(三十七第)

圖舌黑根尖苔白



(十七第)

圖舌短乾黑



(七十六第)

圖舌黑底刺黑滿



(七十七第)

圖舌紋灰苔黑



(四十七第)

圖舌苔滑黑中白邊



(一十七第)

圖舌心黑滑白



(八十六第)

圖舌根黑尖紅



(七十八第)

圖舌圈裏



(四十八第)

圖舌乾黑尖通紅邊



(一十八第)

圖舌紅底刺黑滿




(八十七第)

圖舌黑淡中紅




(八十八第)

圖舌尖黑舌紅



(五十八第)

圖舌黑裏



(二十八第)

圖舌黑微中紅弦



(九十七第)

圖舌蜜自爛黑



(十九第)

圖舌尖黑根紅



(六十八第)

圖舌焙中



(三十八第)

圖舌苔滑心黑邊紅



(十八第)

彩圖 辨舌指南卷四

鄞縣 曹赤電炳章撰述

紹興 周炳堉越銘參校

第四編 辨舌各論

第二十二章 白苔類診斷鑑別法

白苔總論一

〔舌鑑〕舌乃心苗。心屬火。其色赤。心居肺內。肺屬金。其色白。故當舌地淡紅。舌苔微白而紅。必紅潤內充。白苔微不厚。或畧厚。有花然。皆乾濕得中。不滑不燥。斯為無病之苔。乃火藏金內之象也。一經傷寒。白苔必滑。傷溫傷熱。紅光必外露矣。是以傷寒苟能盡解其所傷之邪。而不脫其苔。本來之白。此善能使邪正分局。元津元氣無傷焉。其溫病熱病之舌。亦必使紅色漸斂。漸淡。白苔漸有漸生。此邪始得分越。而元陰日漸內充也。當知紅乃藏氣所蘊。所發白為津液所佈。所結耳。夫傷寒邪犯皮毛。舌上先有白沫。繼則白涎。白滑。再後則白屑。白砂。甚則白泡。白疳。有

舌中舌尖舌根之不同見寒邪入裏之淺深微甚即元氣之厚薄邪熱之輕重從此可測矣蓋舌固心之苗其色本當赤今反見白苔滑甚者是大火不制金乃水來尅火之象故稱大病其寒鬱毛膚毛竅不得疎通陽氣不得外發故惡寒發熱在太陽時頭痛身疼項背強腰脊痛至陽明經則有白屑滿舌證雖煩躁脉如浮緊猶當汗之係少陽者白苔不滑小柴胡湯和之胃虛白苔滑甚者理中湯加桂枝托之邊白中黃大柴胡小承氣分輕重下之白苔亦有死症者即水來尅火之賊邪也其溫病熱病實由火燔金傷元陰告匱劇症藏氣安危皆關驗舌虛實寒熱之機一一分別圖論於左

辨正

白色為寒表證有之裏證有之而虛者實者寒者熱者皆有之

色苔辨病較難凡白色亦可以辨傷寒其類不一白浮滑薄其苔刮去即還者太陽表證受寒邪也白浮滑而帶膩帶漲刮之有淨有不淨者邪在少陽症半表半裏也全舌白苔浮漲浮膩漸積漸乾微厚而刮不脫者謂刮去浮而寒邪欲化火也辨傷寒舌大約如此

傷寒有黃苔黑苔分論於後若雜

白苔證治圖說

病之人舌白嫩滑刮之明淨者裏虛寒也。無苔有津濕而光滑其白色是
虛寒也。口唇白厚粉濕滑膩苔刮稍淨而又積如麵粉發水形者裏寒。必潤澤無絕
濕滯也。舌白粗濇兼有朱點有罅裂紋之苔。其粗濇則不光滑澤朱點則因
誤服溫藥之故。白乾膠焦燥滿苔刮不脫或脫而不淨者。刮去垢泥後底子仍
皆裏熱結實也。此舌頗多其苔在舌比之面上薄粉刮
寒古相反。當認明此苔由淺而深將黃若白苔夾變別色見於某部即。未黃或竟黑變者不可用溫補之藥也
是某經病重凡表裏寒熱虛實症皆同。其色或白或黃與及或濕或燥
即可知其病之輕重也。如舌苔有白而濕潤而厚者此必身發微熱而。非大熱也。至若舌白唇白則恐流血過多或因久病或因病後身虛所致
也。其他小兒之病舌上每有白衣內傷者身體弱極其舌亦有白衣。以顯微鏡照之見其形不能直達而上故有暫白之時
飲食抑遏胃中正氣不能直達而上故有暫白之時。凡病初起體溫
多停滯不化而口腔起酸腐敗之味。若因消化器有妨礙又食物過。如病有內熱使口腔津液失其滋潤之味而發之
因病有內熱使口腔津液失其滋潤之味而發之。分必之口涎必腐敗則舌起白色濁膩苔若因傳染病之毒素滯至口
白苔如積粉此象黃國材法也。

微白薄苔舌 第一

〔圖說〕中根微白。邊尖淡紅。苔光滑有津。

〔舌鑑〕此無病之舌。元氣元津不厚。故見此苔。

〔辨正〕此脾胃寒。而心膽虛也。無病人見此舌。可勿藥。裏虛症有此舌。宜

投溫補。若初感寒邪在太陽。頭痛身熱。惡寒無汗。脉浮緊。而見此舌。宜

溫散表藥。凡感邪尚淺者。多未顯於舌。必執此為傷寒之舌。則謬。凡風寒初

入表發。則舌無苔。或生苔亦白潤而薄。雖有發熱惡寒。而口必不渴。此風寒之邪。雖重。而津液不虧。宜辛溫汗之可也。

白苔畧厚舌 第二 無圖

〔圖說〕中根白。苔滑。厚有花。舌尖紅。舌邊淡紅。

〔舌鑑〕此苔不但無病。乃元津元氣充厚。故見此舌。

〔辨正〕此脾胃微寒。而心經熱也。無病人有此苔。可勿藥。

薄白滑苔舌 第三 無圖

〔圖說〕中根苔薄白。而滑。尖深紅。或淡紅。

〔舌鑑〕此太陽裡症舌。二三日未得汗。致邪熱深入丹田。急宜汗解。或太

陽與少陽合病。宜柴胡桂枝湯汗之。若舌白苔滑有津。尖淡紅。為寒邪初入太陽。頭痛身熱惡寒。宜香蘇飲。羌活湯發散之。

〔辨正〕此脾胃微寒。而心經熱也。若偏於脾胃寒濕。則舌白滑濕而多津。宜用辛溫表散之。若偏於心經熱重。則舌深紅少津。宜用清涼藥。若初感熱邪。在太陽則頭痛身熱無汗。眩暈口乾。鼻氣熱者。宜用辛涼散邪。得汗自愈。此係初感邪。未見於舌也。不可拘定白舌為寒。誤用溫散。舌鑑泥二三日傷寒未曾汗。太陽與少陽合病。方有是舌。則謬甚。凡白舌而燥。或舌邊舌尖帶紅。此風熱之邪。傷於氣分。病在手太陰肺經。只宜輕清涼解氣分。如前胡、胡蘇子、杏仁、連翹、黃芩、薄荷、竹葉之類。若白苔邊去深紅少津。是溫邪入肺。灼乾肺津。不可辛溫過表。宜清輕涼散為當。

厚白滑苔舌 第四

〔圖說〕中根白厚滑苔。邊尖淡紅。

〔舌鑑〕病三四日。其邪只在太陽。舌純白而厚。却不乾燥。證發熱頭疼。脈浮緊不渴。仍須汗解而愈。

〔辨正〕此脾胃有寒濕也。衣裏證皆有之。傷寒邪在太陽。口不乾。舌不燥。

頭痛發熱。無汗惡寒。身痛脉浮緊者。宜麻黃湯發汗自愈。凡表症兩若

雜病裏症。宜茯苓白朮。若舌厚白不滑無津而燥

藥。舌鑑治法亦合。僅言表證。是若舌厚白不滑無津而燥

并薄荷連翹之類。不可用辛溫發汗也。及裏證。凡氣宜解肌清熱。如葛根劑

乾厚白苔舌 第五 無圖

〔圖說〕中根乾白苔厚無砂邊不紅。

〔舌鑑〕病四五日未汗。熱深微渴。過飲生冷。停積在內。營熱胃冷。故發熱。

煩躁厥冷。苔白乾厚滿口。白屑四逆散。加生薑淡豆豉。○脉理正義云。

舌見白苔而乾厚者。此太陽熱病。過服寒劑。或誤飲冷水。抑遏其熱而

致也。先以薑桂散其寒。而後以香蘇飲汗之。張石頑云。白厚滑苔為胃

虛寒。飲結聚膈上之候。每於十三四日過經改變。不可泛視也。

〔辨正〕此脾胃熱滯也。裏證宜三仙丹。黃芩。川椒。枳實。加鮮石斛山查麥芽等。若

傷寒表證見此舌。是邪熱在少陽。其證多口苦耳聾。發熱煩躁。四肢逆

冷。寒熱往來。宜小柴胡湯。舌鑑說營熱胃冷未合。若舌苔白厚而乾燥者。此胃氣傷也。而

濁結不能化。當先養津。而後降濁。若苔薄而乾者。肺津傷也。必用輕清之品。方能達肺。如參冬蘆根汁之類。若初病舌即乾。是津氣素竭也。急當養正。畧佐達邪。若初起舌乾。脉滑腕悶。乃痰阻於中。液不上潮。宜宣肺順氣。清熱化痰。未可投補也。

淡白透明苔舌 第六

〔圖說〕全舌明淨無苔。淡白濕亮。間或稍有白浮。脞似苔且非苔也。

〔舌鑑〕年高胃弱。雖有風寒。不能變熱。或誤服湯藥。傷其胃氣。故無苔而

舌淡白通明也。補中益氣湯加鹽水炒益智醋炒升柴。

〔辨正〕不論老幼見此舌。即是虛寒。宜補中益氣湯加薑桂附。如風寒傷

寒證。均無此舌。此舌為虛寒之本色。若感寒邪者。必有薄浮滑苔。故云

傷寒無此舌。正義云。舌白無苔而明淡。外症熱。胃虛也。凡言苔者。有垢

無苔。俗名鏡面舌。多見於老弱久病之人。是津液枯竭之候。余常用大劑生脉散合六味地黃湯治之。因而得生者多矣。

左邊白苔舌 第七

〔圖說〕全舌淡紅。薄白苔。惟左邊中。截至根。白苔偏厚。

〔舌鑑〕此藏結之症。邪并入臟。最難療治。若屬陽症。口渴腹脹喜冷者。宜

承氣湯下之。若陰結口渴。而不喜飲冷。胸中痞滿者。宜濟川煎。當歸 蒼

升麻、澤瀉、枳殼、

〔辨正〕云。舌鑑治法是也。

右邊白苔舌 第八

〔圖說〕全舌淡紅薄白苔。惟右邊中截至根白苔偏厚。

〔舌鑑〕此舌病在肌肉。邪在半表半裏。必往來寒熱。宜小柴胡湯和解之。

〔辨正〕舌鑑之說是也。或加茯苓。有咳嗽引脇下痛。而見此舌。宜小青龙湯。夏月自利多汗。宜人參白朮湯。

白苔黃心舌 第九

〔圖說〕全舌白苔。中心黃苔。仍潤滑者。熱輕。老黃兼黑者。熱重。

〔舌鑑〕太陽初傳陽明府病。舌微黃。仍潤。再宜汗之。苔燥腹痛。葛根湯加

大黃下之。發熱嘔吐煩躁。大柴胡湯加減下之。亦有下淡黃水沫無稀

糞者。大承氣湯下之。

〔辨正〕此舌傷寒傳至陽明也。若微黃而滑潤。仍當汗解。宜葛根湯。若苔

焦口渴煩躁。譫語燒熱。宜白虎三黃等湯。若苔燥大便閉。宜大柴胡湯。

柴胡大黃枳殼半夏。赤芍黃芩生薑大棗。若雜病裏症見此舌中黃。刮不淨者。脾胃實熱也。

宜白虎三黃。大黃酌用。若中間黃苔。一刮即明淨。餘苔俱白色。不紅而多津濕潤者。則為寒證。宜分經辨準。用辛溫藥。舌鑑未盡善。正義云。凡中微黃者。此太陽陽明合病也。如太陽未罷。雙解散。太陽已罷。選承氣下之。張石頑云。若舌苔中心黃黑。而邊白滑潤者。表證未盡。風寒尚未化熱也。傷寒則大柴胡湯解之。溫熱時疫。則涼膈散。或白虎合承氣湯攻下之。

白苔黃邊舌 第十

〔圖說〕中根白滑。邊黃薄滑苔。

〔舌鑑〕舌中白。邊黃。此裏寒外熱。兼惡寒者必泄瀉。五苓散加薑豉。惡熱者。敗毒散加葛根木香。

〔辨正〕白苔黃邊舌。如刮之淨者。無病人也。所謂淨者。必須清潔光明。見

垢膩。如腐漿一層者。刮不脫。或不淨者。是脾胃真熱。假寒。白色是假寒。為不淨。即是內熱。

心肺膀胱肝為陽火逼迫。邪熱腎火而移熱於大腸也。其為病多咳痛

心胸熱。小便濇。大便或結或泄。或瀉紅白痢。熱極則脾縮不靈。故亦瀉不等。宜生石

膏知母三黃花粉竹茹等藥。小便濇者。宜木通車前三黃等藥。大便結

或泄者。宜調胃承氣湯下之。紅白痢者。宜芩連治痢湯。舌鑑拘於白為

寒誤也。

白苔雙黃舌 第十一

〔圖說〕白苔中央兩條黃色苔。然必不如圖之整齊。

〔舌鑑〕此陽明裏證夾溫舌也。邪熱上薰。土色上溢。故令雙黃。脈長煩躁。惡寒轉矢氣者。大柴胡湯下之。或用調胃承氣湯。

〔辨正〕治傷寒以前說是也。若別證見此舌。是脾胃熱而諸經無病。宜用生大黃、三黃、枳殼、厚樸等藥治之。

半白滑半黑黃舌 第十二

〔圖說〕半邊白苔。半邊或黑或老黃苔。不拘或左或右。

〔舌鑑〕此舌皆寒邪結熱在臟也。黃連湯加附子。淡豉結在咽者。不能語言。宜生脈散去五味。加葱白。合四逆湯。十中可救一二。

〔辨正〕家訓云。歷見此舌。依此等治法。十無一生。白滑無苔。舌虛寒體也。感寒邪者。色亦如此。若半邊有黃黑苔。則寒邪已傳裏。鬱結在臟。久而化火矣。當舍其白滑。急治其標。看某邊色。見老黃或黑者。即從黃黑邊。

治左黃黑者邪火逼肝也。宜用胡黃連、羚羊角、犀角、青蒿、山梔、石膏、知母等藥。右黃黑者邪火逼膽也。宜龍胆草、青蒿、柴胡、石膏、知母、三黃等品。黃黑苔不論結左右喉痛不能言語者宜山豆根、石膏、知母、三黃、大黃、桔梗、甘草等藥對病施治。瞑眩乃瘳。見此舌能知治法可保萬全。正義有舌上白苔或左或右而餘見黃黑外證下利痛引少腹者熱結也。熱甚者桂枝大黃湯下之無熱者用真武湯。下中可救一二也。

白舌黑根苔 第十三

圖說 舌苔白漸黑至根者非如圖式中根之黑白如截也。

舌鑑 舌黑根中尖苔白者為火被水尅之象。雖下亦難見功。

辨正 若黑根無積膩白苔薄滑刮之即淨。舌上多津口不渴或渴而不

消水者真寒假熱也。宜十全大補湯救補湯加減不次急投黑根自退病即愈。若黑根積膩粗濇白苔乾厚刮之不淨無津燥苔口渴消水者真熱假寒也。宜十全大補湯救補湯加減不次急投黑根漸退疾乃瘳。舌鑑泥於火被水尅之象固甚謬甚。

白苔雙黑舌 第十四

〔圖說〕黑苔兩輪佈於白苔中。

〔舌鑑〕乃太陽少陽之邪併入胃府。中氣衰竭。水反上海。故手足厥冷。胸

中結痛。理中湯瀉心湯合用。如邪結在舌根。不能言者。不治。

〔辨正〕此舌乃寒邪入裏。化火熱逼脾胃也。實熱雜證皆有之。宜白虎湯去粳米甘草。加大黃治之。舌鑑用理中湯。醫家多如此誤人不少。宜慎之。

白苔黑點舌 第十五

〔圖說〕全舌白苔中見黑點是也。

〔舌鑑〕此少陽陽明也。有表者。涼膈散合小柴胡湯。裏症已具。調胃承氣

湯。身有斑者。從斑治。用化斑湯。

〔辨正〕凡傷寒白苔中黑小點。亂生。尚有表症者。其病來之雖惡。宜用涼

膈微表之。連翹。焦梔。桃仁。大黃。甘草。薄荷。白芍。芍藥。茯苓。竹葉。表退即當下。用調胃承氣湯。舌鑑

說是也。

白苔黑斑舌 第十六

〔圖說〕白苔中黑斑滿布。

〔舌鑑〕此苔為火伏水乘。即是水來尅火。涼膈散加炮薑附子炭下之。十中可救一二。

〔辨正〕白苔黑斑。舌如刮之。即淨者。微濕熱也。宜瀉濕清熱。若刮不淨者。

底子膩滿
燥乾枯

十二經皆實熱。陽火燒陰。將竭也。皆裏證。無表證。不論傷寒。

傳裏及諸病證。見此舌者。宜十全苦寒救補湯加減。不次急服。至黑斑退盡方愈。舌鑑指白中斑點。謂水尅火。僅能十救一二。謬甚。

白苔黑刺舌 第十七

〔圖說〕白苔上滿生黑芒刺。

〔舌鑑〕白苔中生滿乾黑芒刺。乃少陽不解熱鬱。陽明府也。其證不惡寒。反惡熱。脈實者有宿食。大柴胡湯加芒硝急下。然亦多危證也。

〔辨正〕白苔滿黑乾刺舌。如刮之。黑刺即淨。光潤不乾。口渴而消水不多。身灼熱。欲剝衣滾地者。在雜病為真寒。假熱之裏症。甘溫除大熱法加減。甘溫救補湯治之愈。若刮之不淨。乾燥粗濇。乃十二經皆熱極。不獨

傷寒傳陽明裏症。始有此舌也。舌鑑謂其證不惡寒而惡熱者。大柴胡湯加芒硝急下之。遵傷寒舌鑑不錯。今人惑於時書。偏說謂芒硝等藥不可輕服。見有此舌。不敢急投。或限以一日一劑。誤人多矣。能辨舌利害者。凡各病裏症。見此舌。即以十全苦寒救補湯。生石膏。知母。黃芩。黃連。黃柏。大黃。芒硝。川楝。枳實。犀角。不次急救。服至黑刺退淨為止。履險不必如夷。

白苔尖灰刺舌 第十八

〔圖說〕白滑苔尖微黃。而有灰刺。（圖上白苔下多一黃字）

〔舌鑑〕夾食傷寒。胃冷膈熱。脉長者。小承氣加黃芩。淡豉。脉弦者死。

〔辨正〕如濕潤刮之。即淨者。真寒假熱也。表裏證均有。宜辛溫燥濕。若乾

厚刮。不淨者。是脾胃為濕熱所困。心肺熱極裏證也。宜苦寒藥。若傷寒

見此舌而乾厚者。亦邪熱入裏。熱逼心肺矣。不必論脉之長短。即用大

承氣湯。不次即下。以灰刺退淨為止。十不失一。若服藥限於一日一劑。

則非救急之法。舌鑑指為陽明兼少陽舌。脉弦數者死。拘定舊法。不能

急瀉裏熱。宜其死也。脉理正義云。舌見白苔。去微有刺者。此少陽陽明也。表未罷者。柴葛湯。表已罷者。承氣下之。津潤者。

生。乾枯
者死

白苔尖中灰根黃舌 第十九

〔圖說〕全舌白尖中兼灰根黃色

〔舌鑑〕此太陽經濕熱併於陽明也。舌根黃潤面黃目黃小便黃宜茵陳

蒿湯加淡豆豉紫背浮萍。

〔辨正〕此舌太陽經濕熱併於陽明也。如根黃色間白目黃小便黃者宜茵陳蒿湯加減。如舌鑑之說是也。

白苔雙灰舌 第二十

〔圖說〕全舌白苔雙路灰色。

〔舌鑑〕此傷寒夾冷食舌。七八日後見此舌而有津者可治。枳實理中湯

一逆本理中加淡豉葱白無津者不治。如乾厚見裏症者下之得瀉後次日灰色去者生。

〔辨正〕白苔雙灰舌。如滑潤一刮即亮淨者中寒鬱滯也。宜薑桂附厚樸春砂香附等藥。如乾厚無津刮不淨者乃傷寒化火鬱熱攻裏也。宜大

承氣急下。灰色退淨乃愈。舌鑑云。無津者不治。非也。

白苔尖紅舌 第二十一

〔圖說〕滿舌白苔而尖色鮮紅。

〔舌鑑〕此乃熱邪內盛而復感客寒入少陽經也。小柴胡湯加淡豆豉。

〔辨正〕若舌根白。舌尖紅。濕漸化熱。餘濕猶滯。宜辛泄佐清熱。如蔻仁。半夏。豆卷。連翹。菖蒲。焦梔。予萊。豆衣。六一散。若舌邊尖紅。中心燥白。乃上焦氣分。無形之熱。其邪不在血分。切勿妄投滋膩血分之藥。宜輕清涼解為治。

白苔中紅舌 第二十二

〔圖說〕白苔舌中輪紅。尖亦兼白。

〔舌鑑〕此太陽經初傷寒邪之舌。乃元津內虧。亦有少陽受寒。經血素虛。

而鬱熱俱不能解者。均宜小柴胡湯。去半夏。加淡豆豉。又云。有汗者解肌。無汗者發汗。

〔辨正〕白苔中紅。舌太陽經初傳也。無汗發汗。有汗解肌。亦有在少陽者。

小柴胡湯加減治之。舌鑑之說是也。

白苔尖紅根舌 第二十三

〔圖說〕舌尖苔白根裏紅潤

〔舌鑑〕此邪居半表半裏經血內虧而鬱熱不解小柴胡湯去半夏加淡

豆豉

〔辨正〕白尖紅根舌邪在半表半裏也其證寒熱往來耳聾口苦脚痛脉

浮弦小柴胡湯和解之舌鑑之說是也

根白苔尖紅舌 第二十四

〔圖說〕舌尖紅根苔白厚與二十一舌不同

〔舌鑑〕此表邪不解而遏熱不化故惡寒身熱頭疼者汗之不惡寒身熱

煩渴者此邪在太陽之裏五苓散主之

〔辨正〕舌紅尖是本色白苔為表邪白浮薄如惡寒頭痛身熱宜汗之不

惡寒身熱頭痛煩渴者太陽表證也宜五苓散兩解之舌鑑尚是若表

證初起往往不顯於舌若白苔厚膩則又為裏熱證也

薛生白云舌根白舌尖紅為濕

〔圖說〕舌尖中心紅。舌根灰黑。

〔舌鑑〕為少陽邪熱傳府熱極而傷冷飲也。如水停津液固結而渴者。五苓散。自汗而渴者。白虎湯。下痢而渴者。解毒湯。如黑根多。白尖少。中不甚紅者。難治。

〔辨正〕白尖中紅黑根舌。如舌尖白而根灰黑少者。乃少陽邪熱傳腑熱極而傷冷飲也。照舌鑑治法甚。是若黑根多。白尖少。中鮮紅或不甚紅而乾澀者。宜大承氣湯。不次急投黑根退淨乃愈。

白苔弦淡紅舌 第二十六 無圖

〔圖說〕全舌白苔。邊沿淡紅。

〔舌鑑〕白苔薄白沿紅。在表證為邪初入。裏丹田有熱。胸中有寒。乃少陽半表半裏證。宜小柴胡湯。梔子豉湯。

〔辨正〕舌鑑治法甚善。凡邪在半表半裏者。多宜散表防裏。若裏症見此

舌。即白苔一剝。乃寒結脾胃也。宜理中湯。

白苔紅點舌 第二十七

〔圖說〕

白苔滿布不滑中有硃砂紅點

〔舌鑑〕

此暑疫失解抑鬱心陽故見此舌宜青蒿石斛飲汗之痧疫舌亦

如之脉孔濇有別宜清涼至寶飲

〔辨正〕

此舌暑熱入營表邪未解宜清營熱泄暑邪

純熟白苔舌 第二十八 無圖

〔圖說〕

白苔老極如煮熟相似到底不變厚如物裹舌者

〔舌鑑〕

此舌多心氣絕而肺之真臟色見也因食瓜果水冷水冷物胃氣先

傷陽氣不得發越所致為必死之候急用枳實理中問有生者

〔辨正〕

純熟白舌乃氣血兩虛藏府皆寒極也宜十全甘溫救補湯加薑

附桂不次急投至白色生活淡轉紅為乃愈若用藥遲疑虛寒過度急難治

傷寒證無此舌如舌鑑謂冷食停滯用枳實理中湯必致十無一生所

見多矣

偏白舌 第二十九 無圖

〔圖說〕全舌光白無苔。

〔舌鑑〕全舌光白為虛寒也。如淡白兼微紅無苔則無病人也。若瘟疫見此舌則舌上必有煙霧白色蓋滿而有惡寒發熱胸脘不清或嘔吐頭痛身痛日晡煩熱口臭難聞等證宜以十全苦寒救補湯急救之。非表症也。舌鑑云疫邪在表用達原飲。黃芩、柳、川、一錢、生、甘草、八分。二劑安者或是白滑苔舌則可否則謬蓋辨色未明惜然施治而偶中者也。

白苔積粉舌 第三十

〔圖說〕白苔厚膩如積粉邊沿紅者。

〔舌鑑〕此瘟疫初犯膜原舌宜達原飲見三陽表症隨經加柴胡葛根羌活見裏症加大黃。

〔辨正〕吳坤安云凡時疫初起苔形粉白而厚四邊紅絳者此疫症初入膜原未歸胃府其勢最雄頃刻傳變吳又可用達原飲加引經表藥透之達之如兼太陽加羌活陽明加葛根少陽加柴胡○章虛谷云瘟疫白苔如積粉之厚其穢濁重也若舌本紅絳則邪熱為濁所閉故當急

急透解。此五疫中之濕疫。又可主以達原飲。○梁特巖云。倘舌白如積粉。遍布滑而不黃者。乃寒滯也。宜溫中行滯。表症無此舌。舌鑑云。邪在胃家。又三陽表症。用柴葛羌活湯。裏症加大黃俱謬。○余師愚云。疫症苔如膩粉。此火極水化。誤認為寒。妄投溫燥。病反增劇。其苔愈厚。精液愈耗。水不上升。二火煎熬。變白為黑。其堅如鐵。其厚如甲。言語不清。非舌短也。宜甘露消毒飲。增石膏元參犀連知翹。加花粉等味。

白苔燥裂舌 第三十一

〔圖說〕舌苔白厚甚燥而裂。

〔舌鑑〕傷寒胸中有寒。丹田有熱。所以心煩。舌白。因過汗傷營血。不能上榮於舌。故滿舌無津。燥裂。胃無實結。上薰。故舌不黃黑也。宜小柴胡湯加芒硝微利之。脉不沉數。急宜清熱養津。

〔辨正〕白苔燥裂。舌舌鑑用小柴胡加芒硝微利之。此說似是而非。此方罕效。白苔燥裂。多因誤服溫補。灼傷真陰所致。非傷寒過汗所致也。無黃黑色者。真陰將枯竭。舌上無津。苔已乾燥。故不能變顯他色。藏府有

逼壞處。故舌形。鱗裂也。治宜大承氣湯。合增液湯。急下以救其陰。歷試良效。

白苔乾硬舌 第三十二

〔圖說〕白苔乾硬舌。有似砂皮。或燥如白砂。

〔舌鑑〕白苔乾硬舌。一名冰晶苔。凡厚白苔。本不能變黃色。若此苔當其白時。津液已乾。燥邪雖入胃。不能變黃。宜即下之。然白苔潤澤者。邪在膜原也。邪微苔亦微。邪毒既盛。苔如積粉滿布。此時未敢遽下。而苔色不變。口渴喜飲冷者。宜服三消飲。即達原飲。加大黃。次早即顯黃色。苔梁氏辨正亦云如是。

〔辨正〕石芾南云。其有初起白苔。即燥如白砂者。亦名白砂苔。此溫燥之邪過重。宜速下之。佐以甘涼救液。亦有苔至黑而不燥者。或黃黑苔中有一二條白者。或舌前雖燥。舌根苔白厚者。皆夾濕夾痰飲之故。亦有苔雖黃色。澆薄無地質者。胃陰虛故也。

珍珠白泡舌 第三十三

〔圖說〕舌質紅或紫起粉白薄苔間雜白泡如珍珠

〔舌鑑〕舌上白泡如珍珠乃火極水化之象較之紫赤黃黑古人謂之芒刺者更重宜甘露消毒飲增石膏犀連元參連翹加花粉銀花金汁水之類亦有舌見白苔組成欄圈子者曾見冬月傷寒嘔惡誤服白虎湯脉伏舌苔成圈如白豹紋用正氣散加肉桂丁香炮薑數服愈

孕婦白苔舌 第三十四 無圖

〔圖說〕孕婦白苔與前各條鑑別無異然必須兼察面色

〔舌鑑〕孕婦初傷於寒即見面赤舌苔白滑發熱惡寒當微汗以解其表如誤與涼劑則腠理密秘而邪氣漫無解期甚則入裏必厥逆吐利而死

〔辨正〕孕婦傷寒白舌初傷於寒身熱頭痛無汗兩臉鼻氣俱熱脉浮舌

上白浮滑者宜溫散太陽表藥得汗則愈若無表邪而有白浮滑苔或

白嫩無苔濕潤者則裏虛寒也宜溫中之藥

退則安不然恐邪傳經如八九月胎受邪熱致令不安恐有墮墜之驚

日發熱多食冷水瓜菜冷物致令陽極變陰雖有煩躁而手足厥逆當先治厥逆為重以溫中之藥加減治之則安若見煩躁用清涼則危殆也又一孕婦傷寒症愈火病頭面腫大而痛甚難禁余用三黃俱酒浸煮罷粘子薄荷白芷石膏四劑全安

第二十三章 黃苔類診斷鑑別法

黃苔總論二

〔舌鑑〕黃苔者裏證也。傷寒初病無此舌。邪傳少陽亦無此舌。直至陽明府實。胃中火盛。或邪遏胃虛。土氣洋溢。均能見此。初起微黃不滑。次則深黃。苔尚滑。甚則乾黃焦黃也。種種不同。當分輕重治之。夫微黃不滑者。火初入胃。宜清解。梔子豉湯主之。深黃苔尚滑者。乃邪鬱胃。虛熱迫於胃。而土氣洋溢也。宜汗解。葛根解肌湯。乾黃邪雖外解。火實內熾。宜白虎湯。焦黃土燥。火炎陰液告竭。宜急下。調胃承氣湯。若濕熱發黃。則目黃如金。身黃如橘。茵陳蒿湯分利之。至蓄血發黃。在上焦。犀角地黃湯中焦。桃仁承氣湯下焦。代抵當湯。然必大熱不解。大渴飲水。或漱水不欲嚥。及便秘譫語。痞結自利。或小腹滿硬。小便不利。大便反黑。臍下作痛。此血瘀證也。見血必愈。不可與飲冷水。飲之必死。方可議清議下。

若胃虛黃色外溢。又當補中。而佐以和解。大抵舌黃證雖重劇。脈長。是中氣有權。為可治。如黃中見黑。脈急弦細。為水土無氣。必不可治矣。

〔辨正〕黃舌苔。表裏實熱證有之。表裏虛寒證則無。刮之明淨。即為無病。

必煩清光。明見淡紅。潤刮之不淨。均是熱證。刮後仍留粗澀垢膩。澤之底。凡言淨者。皆仿此。

竟刮不淺黃膩薄者。微熱也。乾澀深黃膩厚者。大熱也。芒刺焦裂。老黃或夾灰黑色者。極熱也。黃苔見於全舌。為藏府俱熱。見於某部。即是某

經之熱。表裏證均如此。辨乃不易之理也。表證風火暑燥。皆有黃舌。惟

傷寒邪在太陽少陽時。均無黃苔。待邪傳陽明府。其舌必黃。初淺久深

甚則老黃。或夾變灰黑。其證多大熱大渴。或無汗。或自汗。諸語痞結。咽水不等。以舌脈

相較。審證無誤。皆邪火裏逼實熱裏結。諸危證其脈往往伏代散亂奇

怪難憑。則當含脈憑舌。專經急治。斯為盡善。若泥於火乘土位。故有黃

苔之說。迂執誤人矣。凡舌苔淡黃為正色。虛病黃苔必嫩而潤。實病黃

苔必粗而燥。黃苔有因病熱漸重。而口涎為病。毒

變壞。酸素減少。炭氣堆積。致滿口穢濁。故苔厚而黃。如化學之酸味。

然。活則色黃。亦有因胆汁不能出清。肝液困在血裏。而舌現黃色也。

黃苔證治圖說

初病微黃色舌 第三十五

〔圖說〕舌邊淡紅。中根淡黃而潤滑。

〔舌鑑〕初病舌微黃者。此表邪將罷而入裏也。雙解散主之。表未罷者小

柴胡湯合天水散。表已罷者。大柴胡湯下之。

〔辨正〕傷寒初病大汗。謂當用表散之時。大誤未表也。表邪入裏見此舌者。每發譫語。宜

並用雙解散。防風。荆芥。連翹。麻黃。薄荷。川芎。當歸。白芍。白朮。山梔。黃芩。石膏。桔梗。甘草。滑石。解表兼解裏。調氣復和血。故曰雙解。

解毒湯。汗下兼行。舌鑑之說亦是。若熱邪內傳入深。及雜病裏症見此

舌。均為實熱。宜白虎三黃等湯治之。

久病微黃舌 第三十六 無圖

〔圖說〕舌微黃而不甚燥。

〔舌鑑〕表邪失汗。而初傳於裏也。用大柴胡湯。身目俱黃者。茵陳蒿湯。

〔辨正〕日久微黃舌。如傷寒表病未罷者。宜小柴胡湯合益元散。若微黃

而兼膩者。宜大柴胡湯下之。若身目俱黃者。熱濕也。宜茵陳蒿湯。表裏

並除。舌鑑是也。如雜病裏症見此舌者。均為實熱。如黃色一刮極淨者。

為無病。可以勿藥。張石頑云。黃而滑者。為熱未盛。結當未定。不可即得已。大柴胡湯微利之。若在夏。日一見黃苔。便宜潤下。以夏月伏陰在內。多有下證。最急而苔不燥者。不可泥也。若苔黃薄而滑者。是熱邪尚在氣分。津液未亡。宜用柴葛。芩。朮。梔。豉。薤。白。荷之類。輕清泄熱。以透表邪。從肌分而解。

微黃不滑舌 第三十七 無圖

〔圖說〕白中帶黃。或微黃而薄。苔不滑。邊尖仍淡紅。

〔舌鑑〕少陽症罷。初見陽明裏症。故苔變黃色。不燥。兼矢氣者。大柴胡湯

倍半夏以下之。若舌見黃苔而濇者。此必初白苔而變黃。正陽陽明也。

大承氣湯下之。下後黃不退者死。身有黃者。茵陳大黃湯。

〔辨正〕白苔變微黃。舌傷寒表邪。失於汗解。初傳陽明。寒邪已化火。其證

多大熱大渴。宜竹葉白虎湯。從陽明經發汗清解之自愈。此邪在半表

半裏。不可驟下。如舌鑑急下之。必致陷胸矣。如全舌皆變黃而苔濇。則

宜大承氣湯下之。吳坤安云。如見舌苔白中帶黃。或微黃而薄。是邪初

口不渴。飲而胸中滿悶者。此濕邪結於氣分。宜白蘆根湯。若微黃而薄。是邪初
亮枯梗之屬。開泄氣分。使邪仍從肺衛而出。則解矣。不可用瀉心。若世
之法。通邪入裏。凡舌苔粘膩。口不渴。為濕邪之證。據白而結膩者。寒
濕。黃而結膩者。濕熱。更驗其小便不利。大便反快。為濕邪。痞滿結於中

焦宜蒼模二苓二陳之類苦溫以開泄之若舌黃黏膩痞悶嘔噦大小便俱不利此濕熱結於中焦宜瀉心法之類苦辛寒以開泄之可也

深黃尚滑舌 第三十八

〔圖說〕苔色深黃而滑邊尖淡白微紅

〔舌鑑〕邪熱失汗迫於中宮故見此舌急宜涼解以發泄之不致斑黃狂亂耳

〔辨正〕凡舌見黃滑苔外症身目俱黃小便亦黃宜用茵陳梔子湯如便

閉加大黃下之辨舌舌見黃苔而滑者此身已發黃茵陳梔子湯茵陳五

苓散正義黃滑而濕者為熱未盛結當未定不可便攻頑石黃苔不甚厚而

滑者熱未傷津猶可清熱透表苔雖薄而乾者邪雖去而津受傷也苦

重之藥當禁宜甘寒輕劑可也葉天士

純黃微乾舌 第三十九 無圖

〔圖說〕全舌純黃微乾少津

〔舌鑑〕舌見黃苔胃熱迫於內黃色見於舌火灼津乾急宜調胃承氣湯

下之勿令變黑致危耳舌辨云舌見純黃苔胃熱已極宜急下之通惡由黃老變黑色為惡症調胃承氣湯下之○張

石頌云。苔黃厚而燥者。為熱已盛。下之無疑。厚苔漸透而底見紅色。如豬肝者。火灼水虧。津液枯竭也。

〔辨正〕純黃微乾舌。傷寒傳經至陽明府。寒邪已化火。故舌中尤黃。其證

多大熱大渴。謔語不等。宜白虎湯。不次急投。至黃苔漸退乃愈。如雜病

裏症見此舌者。是藏府皆熱。極宜三黃承氣酌用。吳坤安以舌苔黃而裏症見此舌者。是藏府皆熱。極宜三黃承氣酌用。

急熱。是傷寒外邪初入陽明之裏。或濕熱內邪。欲出陽明之表。斯時胃家熱而未實。宜梔白虎湯清之可也。又云苔雖黃而未至焦老裂紋起刺。大便雖閉而未至痞滿腹痛。尚屬胃家熱而未實。宜清不宜攻。必再驗其舌形黃厚焦老。中心裂紋。或起刺。腹中鞭滿脹痛。方用承氣下之。則安。

黃乾舌 第四十

〔圖說〕全舌乾黃

〔舌鑑〕舌見乾黃裏熱已極。急下勿緩。下後脉靜身涼者生。反大熱而喘

脉躁者死。正義云。舌中心黃苔者。此太陽陽明也。必作煩渴嘔吐之證。兼有表者。兼有裏者。五苓散合益元散。表證已罷。調胃承氣

之湯下

〔辨正〕黃乾舌。全舌乾黃。藏府均大熱。有病皆屬裏證。不論傷寒雜證見

此舌。即為實熱。宜十全苦寒救補湯。不次急投。雖大熱喘煩頻瀉。亦不

辨舌指南

卷四 第二十三章 黃苔類診法 十五

慮以服至黃退色潤為愈。十無一失。舌鑑云。下後脉靜者生。大熱喘煩者死。是未知舍脉憑舌之法。又不敢連用苦寒。何以望生。

黃尖舌 第四十一

〔圖說〕中根淡紅。舌尖苔黃。

〔舌鑑〕舌尖苔黃。此熱邪傳入胃府而元陰素虧也。調胃承氣湯加人參。

生地。脉浮惡寒。表未盡解。大柴胡加生地人參。正義云。黃苔在尖者。此太陽合陽明也。表未罷。

有雙解散。表證已罷者。調胃承氣湯。其根紅者為太陽。其根白者為少陽。其根黑者死候也。

〔辨正〕黃尖舌。邪熱初傳胃府也。宜調胃承氣湯。大黃。芒硝。甘草。如脉浮惡寒。表

證未盡。則宜大柴胡湯兩解之。舌鑑是。

根中漸黃舌 第四十二

〔圖說〕根中漸黃。邊尖白滑厚苔。

〔舌鑑〕根中漸黃。舌外有白厚苔。熱邪傳膜原也。舌根漸黃。至中央。邪初

入胃也。如有疫症。已傳三陽。宜達原飲。如胸膈滿痛。大渴煩躁者。伏邪內攻也。宜急用三消飲下之。如既下後。大便燥結。又難再攻者。宜清燥

養榮湯

知母。花粉。當歸。白芍。陳皮。地黃汁。甘草。燈心。痼為熱病。暴戾之。後。餘邪未盡。陰血未復。不可遽補。致生異症。凡陰枯血滿者。宜

用此

或承氣養榮湯

即小承氣加知母。當歸。白芍。生。地。治伏邪未盡。攻補而難者。

如痰壅不清胸悶

腸脹者宜萸貝養榮湯

知母。花粉。當歸。白芍。生。地。治小承氣加知母。當歸。白芍。生。地。如痰壅不清胸悶。

〔辨正〕舌鑑治法甚是

黃尖白根舌

第四十三

〔圖說〕

黃尖中根白厚

〔舌鑑〕

舌根白尖黃者其色倒見反乎尋常必少陽邪熱傳入陽明府也

陽明證多者大柴胡湯少陽證多者小柴胡湯若讖語煩躁調胃承氣

湯少和之

〔辨正〕

黃尖白根舌傷寒少陽胆經傳陽明府病也若陽明證多者宜大

柴胡湯少陽證多者宜小柴胡湯如讖語煩躁內熱者宜調胃承氣湯

前說是也

白尖黃根舌

第四十四

〔圖說〕

舌尖白舌根黃苔

〔舌鑑〕凡尖白根黃。乃表邪將解。而裏熱盛也。天水散涼膈散合用。如陽

明無汗。小便不利。心中懊懣者。必發黃。茵陳蒿湯。

〔辨正〕舌鑑治法。亦是如大便難。胸中悶。睡時多夢者。裏證實熱也。宜調

胃承氣湯。又云如傷寒見尖白根黃。為表證未罷。宜先解表熱。然後攻

裏。如大便塞者。宜涼膈散。小便濇者。宜四苓散。合益元散。加木通是也。

若雜病見此舌。屬實熱裏症。宜分經審病。用苦寒藥。古辨云。黃根白尖。乃合病有之。是太陽表證。傳入陽明裏證。循經而傳也。如有表邪一分。必須解表。必待表邪盡。方可攻裏也。正義云。根黃尖白。表少裏多。宜天水一涼膈二合服之。脈弦者。防風通聖散。又云。舌上黃苔在根者。此邪傳太陽也。身有黃者。茵陳大黃湯。身無黃者。涼膈散加硝黃。其尖白者。桂枝大黃湯。小便濇者。五苓散。合六一散。加木通。生薑汁。其說亦是。

黃根白尖短縮舌 第四十五

〔圖說〕舌根黃。中心紅。尖色白。短縮不能伸出口外。

〔舌鑑〕根黃尖白。短縮不能伸出。但多譫妄煩亂。此痰挾宿食。佔據中宮。

大承氣湯。加生薑半夏治之。

〔辨正〕若黃根白尖短縮而硬。不燥不滑。但不能伸出口。不渴。其證多譫。

語煩亂。乃痰挾宿食。佔據中宮。大承氣湯加薑汁半夏。前法是也。若黃根白尖。中紅赤者。表少裏多也。宜涼膈散。

黃大脹滿舌 第四十六

〔圖說〕舌黃脹大滿口。

〔舌鑑〕舌黃脹大。乃陽明胃經濕熱蘊結不消也。身黃便閉。口渴煩躁。茵

陳蒿湯。小便不利無熱者。四苓散加茵陳。梔子黃連治之。

〔辨正〕黃大脹滿舌。乃陽明胃經濕熱上乘心位也。致令人眼黃身黃。身

熱便閉。口渴煩躁。茵陳蒿湯。茵陳先煎。梔子大黃後入。若小便不利而發黃者。宜四

苓散。白朮。茯苓。澤瀉。加茵陳。梔子黃連木通。如舌鑑是也。如大便自利而發

黃者。宜茵陳梔子連湯治之。如無上各證。而發熱煩躁。胸中滿悶。困倦不

安者。宜大承氣湯。葉天士云。若神清。清裏。舌脹大。不能出口者。此脾濕胃熱。鬱極化風。釀痰。而毒延口也。用大黃磨入。當用

劑內。則舌張自消矣。

黃苔黑心舌 第四十七

〔圖說〕全舌黃苔。中心黑滑或通尖。

〔舌鑑〕舌黃而有黑滑心者。陽明裏熱甚也。雖不乾燥亦當下。下後身

涼脉淨者生。大熱不止脉躁者死。若黃苔中心黑膩。是胃熱蒸動脾濕。結中宮以致痞悶嘔吐便閉用瀉

心湯開泄中焦嗜酒人多此症。此亦舌鑑說也。

〔辨正〕黃苔黑滑舌其黑滑在中者均陽明胃裏症宜白虎湯加三黃不

次急投至舌淨而止如大便閉則加大黃舌鑑謂下後身涼脉靜者生

大熱脉躁者死若舍舌執脉以判生死實因閱歷未深欺已欺人耳。

〔下同〕

正義云舌中心起黑苔者此陽明瘟也。以大承氣湯下之津滑者生。乾瀉者死。未傷飲食可治。脉沉微者難治。若黑色淺淡而有表證。雙解散加解毒湯。吳坤安曰。舌中心屬胃。凡腸中有燥矢。舌心必有黃燥黑燥等苔。若腹無穀滿耕痛之狀。亦須養陰潤燥。不可妄用

承氣攻之

黃苔中黑通尖舌 第四十八

〔圖說〕全舌黃苔從中至尖皆黑色

〔舌鑑〕黃苔從中至尖通黑者乃火土燥而熱毒最深也。兩感傷寒必死

惡寒甚者亦死。如不惡寒口燥咽乾而下利臭水者可用調胃承氣湯

下之。十中可救四五。口乾齒燥形脫者不治。

〔辨正〕黃苔中黑通尖舌。乃心肺脾胃腎大腸小腸均熱極也。皆裏症。無表症。若兩感傷寒見此舌。則邪已入陰矣。治法與實熱證同。若昏愒或惡寒或不惡寒。口乾苦。齒燥咽乾。頭面自汗如珠。出至頸而止。大小便閉。下利臭水。六脉怪奇伏代。各證若見此舌。醫書俱云不治。然用十全苦寒救補湯。分為三黃白虎湯。大承氣湯。白虎湯。三劑。分三則循環連服。不次急投。如約二點鐘內。三劑各飲一服。至黑苔退淨乃愈。此舌多為危病。能對症用藥。十可救七。舌鑑用調胃承氣湯。又不急投。十中恐難救一。

黃尖黑根舌 第四十九

〔圖說〕舌尖黃。中根皆黑。黃少黑多。

〔舌鑑〕尖黃少根黑多。雖無惡證惡脉。誠恐暴變一時。以胃氣竭絕故耳。

舌辨云。根黑多而尖黃少。為心胃無氣。雖無熱候。脉雖有力。恐暴變一時耳。

〔辨正〕黃尖黑根舌。黑處多而尖尚黃。是各經皆極熱而心經尚未甚極。也不論何病。皆屬裏症。即用苦寒救補湯。分單間服。另以大承氣。另為一單。不次急投。以服至黑根退淨為準。病即愈。若畏用苦寒。雖胃氣未竭。亦必轉瞬。

而絕也。如舌鑑之迂。甘心坐視。見死不救矣。

根淡紅尖黃舌 第五十

〔圖說〕舌根淡紅。中灰黃。尖嫩黃。苔滑膩。

〔舌鑑〕舌根紅尖黃者。乃濕熱乘於心位也。傷寒裏症初受。其證身熱燥

渴。便閉。大柴胡湯主之。溫熱初病。亦有此舌。涼膈散解毒湯酌治之。

〔辨正〕黃尖紅根舌。溫熱初病。多有此舌。宜涼膈散。連翹。大黃。芒硝。甘草。黃柏。黃芩。等消息之。

解毒湯。黃連。黃芩。黃柏。黃梔。等消息之。舌鑑之說是也。

紅心黃滑舌 第五十一

〔圖說〕舌根黃滑。中淡紅。尖紅赤。

〔舌鑑〕濕熱內盛。陽明胃府受病。故舌根微黃。頭汗小便難者。茵陳蒿湯

加梔子香豉。

〔辨正〕中紅根微黃滑苔。傷寒邪傳陽明胃府。宜白虎湯。若頭汗身涼小

便難者。宜茵陳蒿湯加梔子。舌鑑之說是也。若無病人見此舌。為藏府

微熱。可以勿藥。倘有病發。勿投溫補。

黃變沉香色舌 第五十二

〔圖說〕舌苔老黃而兼灰焦燥之狀似沉香之色。

〔舌鑑〕黃變沉香色。老黃焦燥之狀也。若胸滿熱甚。則全舌將變黑生芒。

刺邪毒最深。宜三消飲。加重大黃。或以大承氣下之。後酌用養榮諸湯。

〔辨正〕吳坤安云。舌苔老黃燥裂。即為陽明實滿。滿及臍下。少腹若舌。

苔白而粘膩。為太陰濕滿。滿在心下。胃口太陰濕滿。宜苦溫開之。蒼樸。

二陳。二苓之類。陽明實滿。按之痛者。熱痰固結也。小陷胸湯主之。嘔惡。

溺瀉者。濕熱內積也。宜瀉心法。石蒂南云。若舌如沉香色。或黃黑而。

燥。脉沉實而小甚者。沉微似伏。四肢發厥。或渴喜熱飲。此皆裏氣不通。

酌用三承氣湯下之。陰傷者加鮮生地。元參。鮮蘆根之類。速下其邪。即。

所以存津液也。必得苔退。脉靜身涼。舌之兩傍生白薄新苔。方為邪盡。

黃苔灰尖舌 第五十三

〔圖說〕舌根黃。中淡紅。尖灰色。

〔舌鑑〕舌乃心位。今見根黃。尖灰。是胃土來侮心火。不吐不利。心煩而渴。

者乃胃中有鬱熱邪火甚則上乘客位或渴甚有轉矢氣者調胃承氣湯加黃連下之乃安

〔辨正〕舌鑑治法亦是因舌尖屬心灰色在尖故兼清心吳坤安云黃苔中心絳者心受胃火蒸灼也於清胃藥中加清心之品其勢必孤矣

黃苔灰根舌 第五十四

〔圖說〕舌根灰色而中尖黃滑

〔舌鑑〕舌根灰色而尖黃雖比黑根稍輕再過二三日亦黑根也難治無煩躁直視脉沉有力者宜大柴胡加減治之如煩躁直視宜大承氣湯下之

〔辨正〕舌鑑治法甚是惟祇舉一端耳

黃苔黑點舌 第五十五

〔圖說〕全舌黃苔上間生黑點

〔舌鑑〕黃苔黑點舌乃藏府俱熱也宜先投調胃承氣湯後進雙解散

〔辨正〕黃苔黑點為藏府實熱也如傷寒傳裏化火或感暑熱邪逼裏及

雜病實熱裏症。皆有此舌。均宜白虎湯與大承氣湯間服。不次即投。候黑點退淨方愈。舌鑑治法。尚非妥當。

黃苔黑斑舌 第五十六

〔圖說〕全舌黃燥。間生黑斑無津。

〔舌鑑〕黃苔中亂生黑斑者。必大渴譫語。身不發斑。大承氣湯下之。如脉瀉譫語。循衣摸牀。身黃斑黑者。俱不治。下出稀黑糞者死。見黃糞者生。

正義云。舌見黃苔而中有斑者。此身有斑也。化斑湯合解毒湯治之。無斑者。大承氣湯下之。次進和解散。十中可救四五。

〔辨正〕黃苔黑斑舌。在雜病為藏府實熱。在傷寒為邪傳陽明。轉入三陰。其證或大熱大渴。譫語狂亂。口燥咽乾。循衣摸牀。身熱黃黑斑不等。醫書多云不治。如見此舌。即用十全苦寒救補湯。倍加生石膏。限定時刻。不次急投。服至黃黑苔漸退。則病立愈。舌鑑治法未週到。

黃苔隔瓣舌 第五十七

〔圖說〕舌黃乾濇。中隔有花瓣形。

〔舌鑑〕舌黃乾濇。而有隔瓣者。乃邪熱入胃。毒結已深。煩躁而渴者。大承

氣湯。發黃者。茵陳蒿湯。古辨加大黃下之。少腹痛。小便利者。有瘀血也。抵當湯。

結胸。頭汗。大陷胸湯。水在兩脇。作痛。十棗湯。

〔辨正〕黃苔。生。辨舌。苔黃而澀。中有花。辨形者。熱入胃府。邪毒深矣。心火

煩渴。宜大承氣湯。急下之。身黃如橘。目黃如金者。宜茵陳蒿湯。如下焦

蓄血者。宜桃仁抵當湯。熱在下焦。少腹鞭滿。瘀血在裏。小便自利。屎鞭

如狂。善忘。諸症。宜通瘀湯。大黃生地。歸尾。桃仁。牙。山甲。元明粉。蘇桂心。蓄血在脇。內腫脹者。

宜十棗湯。大黃。芍藥。醋炒。甘遂。麝香。大棗。先煮。蠶蠟。結胸甚者。宜大陷胸湯。傷寒當表而誤下之。脇痛。煩躁。

心下。鞭痛者。為結胸。方用大黃。芒硝。甘遂。先煮。大黃。有瘀血者。宜大黃瀉心湯。舌鑑盡善。方。皆須諸

重刺。勿妄用。須熱。於傷寒隨症詳審。

黃苔黑刺舌 第五十八

〔圖說〕全舌老黃。苔中有黑刺。

〔舌鑑〕舌苔老黃。極中有黑刺者。由失汗。邪陷毒結已深。急用調胃承氣

下之。十中可保一二。

〔辨正〕黃苔黑刺舌。乃藏府熱極也。在雜病為實熱裏結。在傷寒為邪已

傳。裏。不論何病。均宜白虎湯。及大承氣湯。循環間服。至苔刺退淨。乃愈。

舌鑑用調胃承氣。僅微下之。不敢連投苦寒。藏府必壞。遠巡亦是誤人。

吳中安曰。如厚黃燥刺。或邊黃中心焦黑起刺。臍腹脹滿硬痛。乃陽明裏症也。承氣湯下之。○葉天士曰。舌上生芒刺者。皆上焦熱極也。章虛谷云。凡舌生芒刺者。苔必焦黃。或黑無苔者。舌必深絳。其苔白或淡黃者。胃無大熱。必無芒刺。或舌尖或兩邊有赤小瘰。是營熱鬱結。當開泄氣分。以通營清熱也。上焦熱極者。宜涼膈散主之。秦皇士云。凡渴不消。水。脘滑不數。亦有舌苔生刺者。多是表邪執食。用保和湯加竹瀝。萊菔汁。或施歧湯加枳實並効。若以寒涼抑鬱。則語語發狂。愈甚。甚則口噤不語矣。亦不可不知也。

孕婦黃苔舌 第五十九 無圖

〔圖說〕孕婦黃苔。燥潤老嫩。同前看法。然必須參合面色。

〔舌鑑〕孕婦傷寒發熱不惡寒。舌苔黃。此邪入陽明。表裏俱熱。當清解以

泄其熱。熱解而胎自安矣。○孕婦面赤舌黃。一二月是表症。當汗之。若

蘇等藥。輕表出汗則安。如五六月見裏症時。無凶證。當微利之。庶免熱

邪傷胎之患。若面色俱黃。此失於發汗。濕熱入裏所致。當用清熱利水

藥。

〔辨正〕孕婦傷寒黃苔。舌邪已化火。宜白虎湯。急服則愈。若稍遲疑。恐即

傳三陰傷寒治法。男女無殊。若非傷寒。即為裏熱。宜白虎三黃。審證酌用。

第二十四章 黑苔類診斷鑑別法

黑苔總論

〔舌鑑〕傷寒五七日。舌見黑苔者。最為危候。熱在表無此舌。如兩感一二日間。偶見黑舌。此心腎之氣敗絕於內。藏色外見於舌。黑獨見而赤不見者。水能滅火。為必死也。若白苔上漸漸中心黑者。是傷寒邪熱傳裏之候。紅舌上漸漸有黑心者。乃濕熱疫癘傳變壞症將至也。蓋舌色本赤。今反見黑者。是水來尅火。水極似火。火過炭黑之理。然有純黑有黑暈。有芒刺。不隔瓣。更有瓣底紅。瓣底黑之不同。舌苔雖黑。苔底色紅。外證雖危。尚可救治。大抵尖黑。猶輕。根黑最重。如全黑而舌底亦黑者。雖有神丹。亦難救治也。〔辨正〕凡舌苔見黑色。病必不輕。寒熱虛實各證皆有之。均屬裏症。無表證也。在傷寒病寒邪傳裏化火。則舌苔變黑。自舌中黑起。延及根尖者。多自根尖黑起者。少熱甚。則芒刺乾焦。皴裂。其初必由白苔變黃。由黃

變黑。甚至刮之不脫。濕之不潤者。熱極傷陰也。病重脉亂。舍脉憑舌。宜
 用苦寒。以瀉陽急。下以救真陰。在雜病見黑苔。皆因實熱傳裏也。亦惟
 連瀉熾火。毋使枯竭。若虛寒而舌黑者。則必濕滑無苔。多津。口不苦。唇
 不燥。無朱點。無芒刺。無罅裂。刮之明淨如水。浸猪腰有淡淡融融之形。
 是臟腑極寒之舌也。宜用十全辛溫救補湯。亦有真寒假熱證。而見黑
 舌者。其舌必全黑而不分經。且必由淡白之時。忽然轉黑。其初無變黃
 之一境。約畧望之似有焦黑芒刺。乾裂之狀。然刮之必淨。濕之必潤。環
 唇皆白。而不紅。焦寒結在臟也。其證亦周身大熱。煩躁。惡衣被。與實熱
 邪火證相似。實則中宮寒極。陽氣盡發於外也。口大渴。喜飲冷水。且不
 多。與實熱諸證畧異。外假熱。內極寒也。患此假證之人。必煩亂昏沉。六
 脉必遲弱無力。大便結。常欲下而不下。宜甘溫救補湯。更有腎陰水虧。
 而舌黑者。頗似寒舌之光亮無苔。又似熱舌之焦乾無津。宜六味地黃
 湯加減。即投。然陰虛內陽之舌。若腎虛絕。則舌黑過尖。言歸於命。別無
 治法。

一舌色全黑。當即辨死。而有透延未死者。非藏府熱極。即為極寒。尚留
 一線生機。苟能辨準。且可不死。亦有煙應舌黑。與誤食物而染黑。

看法當比平常病人之黑舌。減二等推算。○按舌現黑色者。因肺不能改。挾炭氣。漸侵營分而入血分。黑色者。血分大燥。瘀濁之征也。若燥硬而隱隱見紫者。是因血分受熱蒸灼。以致血絡中被酸素燃燒。故出炭酸二空質於舌上。故舌呈黑色之苔。薰蒸日久。則血敗壞。故舌質亦黑。為不治症也。若舌柔潤隱隱淡黑者。水飲結而氣不流行。以致血瘀也。若苔燥黑為熱邪深入少陰。陰液全乾。血瘀氣濁。發見枯滯之死色也。

黑苔證治圖說三

純黑苔舌 第六十

圖說 全舌純黑。有潤有燥。

舌鑑 全舌黑苔。火極似水也。藏氣已絕也。脉必代結。一二日必死。

辨正 滿黑舌。凡舌色純黑。本為陰絕。當即死。而有遲延未死者。非臟腑

極熱。即為極寒。尚留一線生機。苟能辨準寒熱。却可不死。如全黑無苔。而底紋粗濇乾焦。刮之不淨者。極熱也。不論何證何脉。皆宜十全苦寒救補湯。數倍生石膏。急投必愈。如全黑無苔。而底紋嫩滑濕潤如浸水腰子。淡淡融融。洗之不改色者。極寒也。不論何證何脉。宜十全辛溫救補湯。重加薑桂。急投可愈。舌鑑有謂水來尅火。百無一生。則迂甚矣。

純黑無苔舌 第六十一

〔圖說〕全黑無苔無點刺

〔舌鑑〕全舌無苔而中心淡黑冷而滑者少陰寒證也。四逆湯主之。

〔辨正〕全黑無苔舌如無點無鱗濕滑多如水浸腰子淡淡融融者極虛

寒也。宜十全辛溫救補湯如無點無鱗乾燥少津光亮似錢者即絳舌

之變陰虛腎水涸也。妊娠者亦有之。宜十全甘寒救補湯。生地。麥冬。天

參。北沙參。山藥。丹皮。地骨皮。澤瀉。加減酌用。如有點有鱗乾燥無津。濇指如銹者。極實

熱也。宜十全苦寒救補湯。數倍生石膏。不次急投。服至黑色轉紅。則痊

如黑色暗淡無苔無點無鱗非濕非乾似亮不亮者陽虛氣血虧也。久

病見之不吉。宜十全甘溫救補湯。凡見此舌皆危證也。寒熱虛實務當

詳辨。稍有不明便易取禍。

純黃黑苔舌 第六十二 無圖

〔圖說〕純黃舌質滿黑苔垢滑潤者

〔舌鑑〕舌黃而苔黑滑者陽明裏證全也。宜下之。下後身涼脉靜者生。仍

大熱煩躁者死也。

〔辨正〕

純黃黑苔。舌乃實熱已極。逼傷真陰也。不論何病何脉。均裏病。無

氣血不舒。脉多伏亂。難憑。確見其舌純黃兼黑苔厚乾澀。刮不淨。明謂底子不清。潔光

之色。

或刮不脫者。即用破格三黃白虎湯。黃芩。黃連。黃柏。生石膏。知母。破格重用也。與大承

氣湯。大黃。芒硝。枳實。樛實。循環間服。不次即投。服至黑苔退淨則愈。

〔圖說〕

邊黃白色。中心黑苔。

〔舌鑑〕

中心黑苔。舌若身熱。溲澀短便閉者。宜承氣湯酌下之。

〔辨正〕

中心黑苔。舌若刮之即淨。濕潤多津者。真寒假熱也。治宜十全辛

溫救補湯。不次急投。至舌色不黑。則病愈。若刮之不淨。乾焦膩厚者。脾

胃熱極也。不論何症何脉。宜破格苦寒救補湯。加石膏。不次急投。服至

黑淨。則愈。舌鑑但知用承氣下之。而不兼涼脾胃。勢難全愈也。

黑燥厚心苔。舌。第六十四無圖

〔圖說〕

舌中心黑厚苔乾燥。而邊尖紅色。

〔舌鑑〕

中心黑厚乾燥。邊紅者。此邪熱灼燥。津液枯槁之候。宜生脉散合

黃連解毒湯黃龍湯以下之。

〔辨正〕中心黑厚苔。舌苔燥厚。脾胃熱極也。宜破格三黃白虎大承氣湯。

相間連服至黑淨乃愈。舌鑑用生脉散合黃連解毒湯。雖無大誤。然病

難愈。吳坤安曰。舌苔黑燥。為陽明之熱。腹無痞滿硬痛。非承氣症。只宜清解。若清之不應。是腸中有燥矢。與熱固結。胃土過燥。腎水不支。

胃中陰液已乾。宜大小甘露飲以救胃。汁。陰液充溢。陽邪自解。二便自通也。

中黑無苔乾燥舌 第六十五 無圖

〔圖說〕舌黑無苔。邊紅乾燥。

〔舌鑑〕此津液受傷而虛火用事也。脉必細數。證必昏沉。急宜生脉散合

附子理中湯主之。

〔辨正〕中黑無苔乾燥舌。此舌宜詳辨。如中黑無苔而舌底乾燥。有小點

紋可見者。乃胃經實熱。並無六氣侵擾也。宜破格白虎三黃湯治之。如

中黑無苔而舌底濕嫩光滑。無苔無點紋者。乃胃經虛寒。亦非六氣所

擾也。宜附子理中湯加肉桂黃耆治之。舌鑑不辨寒熱。專用生脉散合

附子理中湯。誤人不少。

中黑無苔枯瘦舌 第六十六

〔圖說〕

舌形枯瘦質不甚赤色黑無苔

〔舌鑑〕

傷寒八九日過汗津枯血燥舌黑無苔而枯瘦大便五六日不行腹中不硬滿神昏不得卧或時呢喃歎息者灸甘草湯減桂加當歸知母主之

〔辨正〕

舌鑑治法是也。若雜病裏症見此舌者乃脾胃素熱而又誤服溫補辛燥藥傷其真陰也。宜大承氣湯下之。○張石頑曰中黑而枯或畧有微刺色雖黑而中無積苔舌形枯瘦舌質而不甚赤其證煩渴耳聾身熱不止大便五六日或十餘日不行腹不硬滿按之不痛神識不昏晝夜不得睡稍睡或呢喃一二句或常笑或歎息此為津枯血燥之候急宜灸甘草湯或生料六味地黃丸換生地合生脉散加桂滋其化源庶可獲生誤與承氣必死誤與四逆亦死亦有直中少陰真寒始病不發熱舌心便黑色非由黃白而變黑其苔雖黑而滑舌亦瘦小此真臟寒外證必厥冷昏沉自利嘔吐脉沉遲四逆附子輩急溫之稍緩則不

救。○吳坤安云。若苔黑而堅。斂焦刺。如荔子形者。乃陽亢陰竭。胃汁腎液俱竭。也不治。

黑乾短舌 第六十七

〔圖說〕舌乾焦黑短縮。

〔舌鑑〕黑乾短舌。乃手厥陰三焦足厥陰肝經二經熱勢已深。至危症也。

或食鬱熱極。舌腫所致。宜急大承氣湯。舌辨加下之。服後糞黃熱退則

生。糞黑熱不止者。雖下亦死。

〔辨正〕黑乾短舌。舌鑑謂厥陰熱極。或食填中脘。腫脹所致。急用大承氣

下之。所論甚是。又云十中可救一二。服後糞黃熱退則生。否則死者。此

識見未透。僅知試用承氣。而不敢多投。若能連服十中必能救八九也。

白滑黑心舌 第六十八

〔圖說〕邊白苔中心黑苔。

〔舌鑑〕白苔中黑為表邪入裏之候。若太陽不解。大熱譫語。承氣等加淡

豉鮮生地。下之。倘食復發熱不止。下利者死。

〔辨正〕白滑苔黑心舌。若刮之即淨而濕潤者。真寒。假熱舌也。宜十全辛

溫救補湯。

附子。乾薑。肉桂。半夏。豆蔻。川椒。丁香。藿香。

若刮不淨而膩澀粗燥者。實熱裏症也。

宜平陽清裏湯。

生石膏。知母。黃芩。黃連。黃柏。犀角。羚羊。生甘草。

表邪入裏者。亦有之大熱譫語。

或食復發熱不止者。皆宜十全苦寒救補湯加減。不次急投。

凡言不次急投者。皆

當循環連進。此余歷代家傳經驗者也。服至黑苔退淨為準。遲疑難治。

乾白黑心舌 第六十九

〔圖說〕舌心燥黑。邊乾白。無神。

〔舌鑑〕舌苔邊白。中心乾黑。太陽汗出。不徹熱已入府也。頭汗者。可下之。

調胃承氣湯。少加淡豉。多加鮮生地。二三日未汗者死。

〔辨正〕乾白苔黑心舌。其黑苔濕潤。一刮即淨者。裏症真寒。假熱舌也。當

以十全甘溫救補湯。

人參。黃耆。白朮。大熟。川芎。歸身。鹿茸。白芍。茯神。甘草。

若乾黑刮不淨。是傷寒

邪已化火。傳陽明胃腑症。常發熱譫語。口乾渴。不惡寒。或自汗從頭面出。至頸而止者。不等。宜白虎湯。不次急服。至黑苔漸退。週身出汗。透徹。燒退即愈矣。倘服白虎數劑。而中苔仍乾黑。燒熱未退。大便閉結。繼以

大承氣湯間用破格白虎三黃湯。不次急投。必俟乾者濕。黑者退。則病愈。若不明利害。偏執臆斷之書。忌用苦寒。自誤其生。別無補救之法。如舌鑑云二三日未汗。有此舌必死。皆因臨證少。未能憑舌求治耳。辨傷寒舌。必拘幾日見某色。是食古不化。以耳為目。誤已誤人矣。

白苔根黑舌 第七十

〔圖說〕中邊白苔。尖根黑苔。

〔舌鑑〕根尖俱黑。而舌中尚白者。金水交。衰火土氣絕於內也。傷寒得之。雖無舌證。終不可治。

〔辨正〕白苔。尖根俱黑。舌乾厚。刮不淨者。乃心腎熱極。脾胃真熱假寒也。其證多發熱譫語。呃逆乾嘔。食物即吐。昏迷似睡。而却非睡。惟十全苦寒救補湯。不次急投。勿稍遲緩。黑色退淨方愈。舌鑑謂金水太過。火土氣絕。乃臨證少。治法窮之論也。

邊白中黑滑苔舌 第七十一

〔圖說〕中黑滑。邊尖白滑。

〔舌鑑〕舌中心黑滑。舌邊尖白滑。此表裏虛寒夾濕相搏之候。脉必微弱。

證必畏冷。附子理中湯溫之。夏月過食生冷。而見此舌。則宜大順冷香二方選用。○張石頑云。黑而滑潤。或邊白者。必夾寒食。古法用大順散。然不若理中合小陷胸湯最當。若挾痰者。多見灰色之苔。多由邪熱。關及血分。致此。餘如蓄血一證。亦有寒有熱。亦辨於苔之燥潤也。

〔辨正〕中黑邊白滑舌。舌鑑謂表裏俱虛。寒脉必遲弱。外證畏寒。附子理

中湯。人參白朮附子乾薑甘草夏月過食生冷。而見此舌者。則酌用大順散。肉桂杏仁乾薑

甘草治虛寒人夏月過食生冷香散生附片。華萊仁。橘紅。然此舌必當慎辨。若黑

色潤澤光滑無苔。刮之平靜者。是寒也。可遵舌鑑治之。若黑苔微厚粗

膩。雖滑而刮之不淨。口苦外無寒證。脉非遲弱者。則是實熱。宜用清涼

脾胃藥。寒熱之判。勢如冰炭。吳坤安云。如白苔而兼灰黑色。更有黏膩

得之宜解肌滲瀉五苓散加羌防之類。如陰在經之濕邪。是從雨霧中

現黑滑苔者。必是濕飲傷脾。宜溫中和脾逐飲治之。

〔圖說〕

弦邊白燥。中根黑苔。

〔辨正〕

弦白黑心舌。在傷寒為邪入陽明化火已久。熱逼太陰。少陰也。宜破格白虎湯。及大承氣湯輪服。不次急投。黑心退淨則愈。在雜病為實熱證。如吐血者。宜三黃白虎湯加犀角。大便閉者。宜大承氣湯。大熱大渴者。宜白虎湯。若據於弦白為寒。而不用苦寒藥。則無救法。舌鑑用五苓散大謬。凡寒證。舌底光滑濕潤。刮之明淨。無點罅紋者是也。

通尖乾黑邊白舌

第七十三

〔圖說〕

兩邊白燥厚苔。中心黑乾通尖。

〔舌鑑〕

兩感是少陰先傷。一二日間便見中黑邊白厚苔者。雖用黑膏湯合調胃承氣湯。恐終無濟於病矣。○正義云。此少陰瘟也。五六日見之。大柴胡湯涼膈散下之。無下證者。竹葉石膏湯。又云。舌尖白二分。根黑一分。外證身熱惡寒。曾飲水者。五苓散。自汗渴者。白虎湯。下利者。解毒湯。

〔辨正〕

通尖黑乾邊白舌。是藏府實熱。獨盛火燥煩躁。薰蒸濕氣。故邊白也。其證多大熱大渴。譫語煩躁。便閉咽乾不等。宜白虎湯。大承氣湯合

用連服以黑退為度。如舌鑑指為陰陽兩感傷寒用大羌活湯。羌活獨活。細辛。知母。生地。防己。黃芩。黃連。蒼朮。白朮。川芎。及冲和靈寶飲。即大羌活湯。去獨活。防己。黃連。蒼朮。白朮。加柴葛。白芷。石膏。誤人多矣。蓋拘定白黑判陰陽而不知黑舌均裏症無表症。况既乾而通尖裏急已極尚可雜投驅風燥藥乎。

黑苔灰紋舌 第七十四

〔圖說〕中心黑兩畔起灰紋重暈者

〔舌鑑〕中黑灰紋舌若脉實者急用大承氣湯下之。若脉浮渴飲水者涼膈散十人可救一二。

〔辨正〕前人治法不過如斯而已。實則見此舌不論何證何脉用十全苦

寒救補湯不次急投服至黑灰退淨則立愈。非臨症多者不知其妙也。

亦有淡灰色中起深黑重暈者為瘟疫熱毒攻裏急用涼膈散。雙解散等。清中逐邪。舌辨云。灰黑重暈舌乃邪毒傳於手足少陰經也。宜即下之。解毒湯用大黃酒浸。猛芒硝量輕重大小治之。

黑苔辨底黑舌 第七十五

〔圖說〕全舌黑苔撥開辨底黑色

〔舌鑑〕

凡黑苔、黑底、黑者，不可用藥。雖無惡候，脉必暴絕，死不可救。

〔辨正〕

黑苔、黑底、黑舌，此乃藏府實熱已極，或因六氣之燥火侵淫，或因

百藥之燥火逼迫，燥火與陽火病入素有實火曰陽火，虛火曰陰火是也交戰於中，薰蒸於

上而成。此舌猶之當暑炎熱，土木生菌，惟大雨時行，即自銷滅。可知舌

有黑，非大寒涼藥斷難起死回生。此證多熱，大渴口開，吹氣或絞腸

痛絕，或頭眼脹痛求死，或口噤不言，或渾身發臭難聞，或卒然仆地，不

省人事，雙目直視不等。不論見何怪脉，舍脉憑舌。看黑，辨尚未數滿，仍

可救治。急用十全苦寒救補湯。生石膏八兩，知母六錢，川柏四錢，黃芩半斤，犀角四錢。四倍石膏

或分為三黃白虎湯，及大承氣湯，分二罐主之。不拘時刻，不次即投。凡言不次急投，皆不限定劑數，須輪流急灌。服

至黑，辨退淨。舌底漸紅，則病愈。知此法者，雖危不死。倘不明利害，忌服

苦寒，或不敢多服，必死無疑。別無救法也。如舌鑑云：見此舌，不可用藥。

雖無惡候，脉必暴絕不治。此拘於切脉，無知妄斷。醫家卸肩之積習耳。

黑苔、黑底、紅舌 第七十六

〔圖說〕

舌根淡紅，全舌黑苔，尖、底色紅。

〔舌鑑〕黃苔失治久而變黑乃實熱亢極之候而又未經服藥肆意飲食而脉亦伏目閉口閉譫語或自語如伏脉男見左女見右主脉者宜大承氣湯下之燥糞必黑虵蟲必死醫見此舌必擬而視之辨底紅者生辨底黑者死

〔辨正〕黑苔辨底紅舌藏府熱甚灼血燥津也多因實熱人誤服溫藥燥藥逼傷陰血故辨底見淡紅其證口閉目閉煩躁譫語狂妄便閉不等勿論脉之伏代怪奇即用破格三黃白虎湯加犀角與大承氣湯循環間服不次急投黑辨脫淨方愈若舌鑑僅以承氣下之而不敢重用苦寒急涼血分知其一而不知其二安能救人乎

滿黑刺底黑舌 第七十七

〔圖說〕滿舌黑苔刺芒刺底肉色亦黑

〔舌鑑〕滿黑舌起刺芒刺底亦黑凡見此舌不必辨其何脉何經雖無惡候必死不治

〔辨正〕刺底黑舌刮開芒刺底下舌色俱黑也用 第七十五 黑苔辨底黑舌

苦寒急救之法。尚有可醫。舌鑑謂不必辨其何經何脉。雖無惡候。必死勿治。此固醫家糖飾之常法。然病家往往見重證。安於必死。執定勿用。苦寒亦足以釀成時醫之惡習也。

滿黑刺底紅舌 第七十八

〔圖說〕

滿舌黑苔乾燥。而生大刺。揉之如鯊魚皮。觸手而响。撥開黑刺。辨

底紅者。

〔舌鑑〕

滿黑燥苔起刺。撥開刺底紅者。心神尚在下之。可生。凡肥盛多濕

熱人。感冒發熱。痞脹悶亂。一見此舌。急用大陷胸丸攻下之。後與小陷胸湯調理。○舌辨云。下之熱退脉靜者生。

〔辨正〕

滿黑刺底紅舌。全舌黑苔乾燥。而生大刺。手揉之有聲。掘開刺底

尚見紅色。不論何病。皆裏證。藏府熱極。宜合用破格三黃白虎湯大承氣湯。不次急投。以黑刺退淨為止。病必愈。舌鑑但知以大陷胸湯下之。而不知寒涼急投。其黑刺必不退。倘能十救一二。亦幸事也。

弦紅中微黑舌 第七十九

〔圖說〕

舌心淡黑邊沿淡紅多津

〔舌鑑〕

弦紅中微黑舌外淡紅淡黑者惡風則表證未罷用解毒湯雙解

散各半以微汗之汗罷即下之下後熱不退者不治

〔辨正〕

舌鑑治法甚是如結胸煩躁目直視者宜大陷胸湯及大承氣間

服舌鑑云不治者非也

紅邊黑心滑苔舌 第八十

〔圖說〕

舌心黑滑有津邊紅潤不燥

〔舌鑑〕

紅邊中黑滑舌必表熱裏寒證見譫語者因邪在表時未曾服藥

不戒飲食冷物結滯於胃而相搏也虛人黃龍湯去樸硝加乾薑或枳

實理中湯合小陷胸湯壯實者備急丸熱下之夏月中喝亦多此舌以

人參白虎湯主之○林慎菴云此等舌屬大虛之候宜合脉證審慎而

施也

〔辨正〕

紅邊中黑滑舌是脾胃肝胆俱熱而夾有濕邪也若傷寒證見譫

語者為初傳陽明宜白虎湯發汗自愈大渴大熱則倍用之舌鑑謂冷

食結滯。虛人用黃龍湯。即大承氣加黨參。甘草。當歸。桔梗。薑。棗。邪熱傳

結熱利症。非內寒而利也。宜壯實人用備急丸。巴豆霜一錢。乾薑三錢。此名

此湯。若年已衰老者去芒硝。壯實人用備急丸。巴豆霜一錢。乾薑三錢。此名

糊為丸。如豆大。夏月中喝者。用人參白虎湯。三法雖不甚謬。然難見效。

○吳坤安云。若全舌黑滑。為太陰之寒。理中症也。若兼粘膩浮胖。是濕

痰。寒飲伏於太陰。當用溫藥和脾。如二陳厚樸薑汁合五苓之類。開之

逐之。痰飲自去。舌辨云。若邊紅中黑而津滑者。必諸語。因寒傷於營。營

因而食勝。內外俱傷。輕而變重。重而致此。急下之。再不可食。如犯之。不可救也。

邊紅通尖黑乾舌。第八十一

〔圖說〕舌邊紅。中心黑乾通尖。

〔舌鑑〕瘟疫內熾。宿食不消。故乾黑通尖而邊紅也。急下一二次。稍解再

下之。以平為期。

〔辨正〕邊紅通尖黑乾舌。藏府實熱而心。肺脾胃尤亟也。傷寒傳少陰證。

燥暑中少陰證。瘟疫症雜病實熱皆有之。不論何病何脉。宜十全苦寒

救補湯。不次連服。則必愈。舌鑑急下再下。以平為期是也。

裏黑舌 第八十二

〔圖說〕外見純紅色。內有乾硬黑色。如小長舌形。甚則其上有刺。

〔舌鑑〕裏黑舌。外見紅色。內有乾硬黑苔。似小長舌。其上有刺者。熱毒成。熾為實熱。堅結大腸。急用調胃承氣湯下之。

〔辨正〕舌鑑治法。雖是。然不如用白虎湯大承氣湯。相間連服。必愈。○張石頑云。亦有因中暑誤認外感。而加溫覆。多致中黑。邊極紅。而潤。脉必虛大。急用白虎湯清之。虛者加人參竹葉。如更誤認陰寒。而與熱藥。必致煩躁不救也。夏月中暑。多有黑舌。黑而中乾者。白虎無疑。

中焙舌 第八十三

〔圖說〕舌色純紅。中心黑厚而乾。形似小舌。

〔舌鑑〕舌苔中心黑厚而乾。形如小舌。邊畔純紅。名中焙舌。乃邪熱結裏。心火熾甚。宜涼膈散。大柴胡湯。○又云。此舌為熱盛津枯之候。急用生脉散。合黃連解毒湯以解之。林慎菴以甘露飲。加人參黃連。或生料人參固本丸。加牛膝。元參。知母。地骨皮。

〔辨正〕張三錫云。余常見外感扶內傷。宿食重而結於心。下者五六日舌漸黃。或中乾厚而邊潤。名中焙舌。此則裏熱尚淺。若全舌乾。無論黃黑皆屬裏症。分輕重下之。若曾經下。或屢下不減。乃宿滯結於中宮也。診其脉之虛實。及中氣何如。實者潤而下之。虛者神氣不足。當生津固中。氣有用生脉對解毒湯而愈者。有用附子理中湯冷服而愈者。一則陰極似陽。一則陽極似陰。不可不辨而正之。

裏圈舌 第八十四

〔圖說〕

舌根至中淡紅。中夾紅暈。而尖沿皆純黑。

〔舌鑑〕

裏圈舌。淡紅中有紅暈。而絃又純黑。乃心包絡蘊熱復受邪火侵入二火相逼。故顯此舌。宜大承氣湯下之。

〔辨正〕

舌鑑治法甚是。炳章按此包絡熱甚。宜清包絡之熱。如犀角連翹

鮮生地黑元參合承氣下之。則更妥當。

黑尖紅舌 第八十五

〔圖說〕

中根紅。舌尖黑。而有紫黑刺。

〔舌鑑〕瘟疫汗後食復而見紅尖紫黑刺證甚危殆急宜梔子枳實豉湯加大黃下之刮去芒刺不復生者安再生則更危

〔辨正〕紅尖紫黑刺舌乃心經極熱而又受邪薰蒸也宜大承氣湯加黃連錢五連翹錢三急服則愈舌鑑用枳實梔子豉湯加大黃雖下而不甚涼芒刺再生又不敢連投安得不危

紅根黑尖舌 第八十六

〔圖說〕舌中根紅而尖黑燥

〔舌鑑〕舌本紅而尖黑者足少陰濕熱乘於手太陰也竹葉石膏湯

〔辨正〕紅內黑尖舌為藏府皆熱而心經尤熱也傷寒邪火逼手少陰濕

熱直中手少陰誤服補心藥心血熱者有之宜大承氣湯加川連錢三連

翹黃芩黃柏錢各二服至黑尖退淨則愈舌鑑謂足少陰濕熱來手太陰

用竹葉石膏湯未妥

紅尖黑根舌 第八十七

〔圖說〕中尖純紅舌根黑色或灰黑

〔舌鑑〕瘟疫二三日。舌根黑色。熱邪熾甚而宿食不消也。涼膈雙解散下之。至四五日。火極似水。漸變深黑。少陰腎氣已絕。下亦無濟矣。若邪結咽噤。目瞑脉絕。油汗者。一日夜必死。

〔辨正〕紅尖黑根。舌心腎火熾。脾胃受困也。傷寒邪入陰分。瘟疫毒中陰經。實熱鬱傷陰分。皆有之。不論何證何脉。用大承氣湯急下以去其毒。用三黃白虎急涼以救其陰。二方連環服至黑退則愈。舌鑑治法未善。彼謂瘟疫二三日可微下之。四日後舌變深黑。下無濟矣。若邪結於咽。目瞑脉絕油汗者。一二日死。蓋微下則不能去毒。僅一下之而不間大涼藥。則不能挽回已傷之陰。又偶爾嘗試。無膽無識。安得不死耶。

紅中淡黑舌 第八十八

〔圖說〕紅舌中見淡黑心。苔滑潤者。

〔舌鑑〕乃溫熱發於太陽也。如有表症惡寒。雙解散合解毒湯微微汗之。

汗罷急下。若結胸煩躁直視者不治。章虛谷云。紅中有黑苔者。熱毒入少陰也。大承氣合白虎湯治之。

〔辨正〕紅中淡黑舌。藏府實熱也。不論何病何脉。皆裏證。傷寒傳裏大發。

燒熱。結胸煩躁。二便閉。雙目直視。或疫毒中三陰。均有此舌。宜十全苦寒救補湯。不次急投。舌淨必愈。舌鑑說先汗後下。又以結胸為不治。殊未當也。

紅中焦黑心舌 第八十九 無圖

〔圖說〕舌紅色中。有焦黑厚苔。形如小舌。

〔舌鑑〕乃瘟疫之毒。內結於胃。火極反兼水化也。宜涼膈散。若黑而乾硬。指甲剔之有聲。急用調胃承氣湯下之。遲則不救。

〔辨正〕紅中焦黑舌。藏府俱熱而脾胃尤熱也。誤服補劑。及中時疫者有之。不論何脉。皆屬裏證。宜十全苦寒救補湯。倍加生石膏。不次急投。勿稍遲疑。以服至焦黑退淨為準。則必愈。舌鑑近是尚嫌姑息。

黑爛自嚙舌 第九十

〔圖說〕舌苔黑爛。頻欲自嚙。

〔舌鑑〕乃心腎火灼。無以自安也。必爛至舌根而死。切勿用藥。

者死。舌黑。不治。舌黑。白。無治。法也。

正義云。舌黑而中爛。

〔辨正〕黑爛自嚙舌。藏府極熱。兼受穢毒也。患梅楊瘡者多有之。他症罕見。宜三黃銀花承氣湯等劑。土茯苓作茶飲治。如不效。則將如舌鑑所云黑爛而頻欲自嚙。必爛至舌根而死也。


孕婦黑苔 第九十一 無圖

〔圖說〕孕婦舌黑有微黑深黑大不同。

〔舌鑑〕孕婦傷寒發熱。舌苔黑。此邪入少陰。熱傷胎元也。其子必死。當下死胎以救其母。○凡孕婦面舌俱黑。不必問其月數。子母俱死。面赤舌微黑者。還當保胎。如見灰黑。乃邪熱入子宮。其胎必不能固。若面赤者。為根本未傷。當急下以救其母。

〔辨正〕孕婦傷寒灰黑。舌乃熱逼三陰之候。不論傷寒傳陰。實火傷陰。必須苦寒急涼。宜三黃白虎湯。生大黃。元明粉。川樸。生枳殼等酌用。熱清則胎安。慎勿妄用安胎補藥。致益熱而胎上冲。舌鑑謂面舌俱黑。水大相刑。子母俱死。〔下畧〕云云。此皆醫家相傳粉飾之談耳。舌辨云。面赤

黑。還可保胎。如黑甚必墮。用并底泥固脾內。服清熱安胎藥。如黃芩。知母。竹茹。紫胡。梔子等藥治之。若胎安則穩。不然必墮也。 卷四終



彩圖辨舌指南卷五目錄

第二十五章 灰舌類診治斷鑑別法

灰色舌總論四

灰色舌證治圖說

計十四舌
附三舌

純灰色舌 第九十二

灰多黃少舌 第九十四

灰根中赤黃尖舌 第九十六

附灰暈微紅舌

灰中帶紫舌 第九十九

灰苔黑滑底舌 第一百〇一

灰尖乾刺舌 第一百〇三

附灰黑裂紋舌

附孕婦卷短舌

灰尖舌 第九十三

心灰弦黃舌 第九十五

灰色重暈舌 第九十七

灰黑沿紅舌 第九十八

灰中紅底舌 第一百

微灰生刺舌 第一百〇二

全灰乾刺舌 第一百〇四

灰短硬卷舌 第一百〇五

第二十六章 紅舌類診斷鑑別法

紅舌總論五

紅舌證治圖說計二十舌

純紅舌 第一百〇六

紅中微黃滑舌 第一百〇八

紅中黑斑舌 第一百一十

紅內紅星舌 第一百十二

紅內紫瘡舌 第一百十四

紅色人字紋舌 第一百十六

紅細枯長舌 第一百十八

紅銹舌 第一百二十

紅痿舌 第一百二十二

厥陰舌 第一百二十四

第二十七章 紫舌類診斷鑑別法

光紅柔嫩舌 第一百〇七

紅根黃尖舌 第一百〇九

紅內雙灰乾舌 第一百十一

紅內白泡舌 第一百十三

深紅蟲碎舌 第一百十五

紅尖出血舌 第一百十七

紅脹出口舌 第一百十九

紅戰舌 第一百二十一

紅硬舌 第一百二十三

孕婦純赤舌 第一百二十五

紫舌總論六

紫舌證治圖說計十三舌

純紫苔舌第一百二十六

紫上白苔舌第一百二十七

紫上黃苔濕潤舌第一百二十八 紫上黃苔乾燥舌第一百二十九

淡紫灰心苔舌第一百三十

淡紫帶青舌第一百三十一

淡紫青筋舌第一百三十二

紫中紅斑舌第一百三十三

紫上青腫乾焦舌第一百三十四

熟紫老乾舌第一百三十五

紫尖痞瘰舌第一百三十六

紫短舌第一百三十七

孕婦紫青舌第一百三十八

第二十八章 微醬色舌類診斷鑑別法

微醬色舌總論七

微醬色舌證治圖說計三舌

純微醬色舌第一百三十九

中微浮厚舌第一百四十

微黃色舌第一百四十一

第二十九章 藍色舌類診斷鑑別法

藍色舌總論八

藍色舌證治圖說計三舌 後附二舌

純藍色舌第一百四十二

藍紋色舌第一百四十三

葡萄瘟舌第一百四十四

附孕婦辨舌通論

附王文選跋語

彩圖辨舌指南卷五目錄

灰色舌總圖 四

圖舌苔紅沿黑灰 圖舌苔黃弦灰心 圖舌苔色灰純



(八十九第)




(五十九第)



(二十九第)

圖舌苔紫帶中灰 圖舌苔尖黃赤中根灰 圖舌苔尖灰



(九十九第)




(六十九第)



(三十九第)


圖舌底滑黑苔灰 圖舌苔暈重色灰 圖舌苔少黃多灰




(一百一第)



(七十九第)



(四十九第)



圖舌斑黑中紅



(十百一第)

圖舌紅純



(六百一第)

圖舌乾灰雙內紅



(一十百一第)

圖舌根黃微中紅



(八百一第)

圖舌星紅內紅



(二十百一第)

圖舌尖黃根紅



(九百一第)

圖舌苔刺生灰微



(二百一第)

圖舌苔刺乾尖灰



(三百一第)

圖舌卷硬短灰



(五百一第)

紅色舌總圖五

紫色舌總圖 六

圖舌口出服紅



(九十百一第)

圖舌紋字人色紅



(六十百一第)

圖舌泡白內紅




(三十百一第)

圖舌陰厥



(四廿百一第)

圖舌血出尖紅



(七十百一第)

圖舌瘡紫色紅



(四十百一第)

圖舌長枯細紅




(八十百一第)

圖舌碎蟲紅深



(五十百一第)

圖舌苔乾老紫熟



(五十三百一第)

圖舌苔筋青紫淡



(二十三百一第)

圖舌燥乾苔黃上紫



(九廿百一第)

圖舌苔紫純



(六廿百一第)

圖舌苔瘰癧尖紫



(六十三百一第)

圖舌斑紅中紫



(三十三百一第)

圖舌苔心灰紫淡



(十三百一第)

圖舌苔白上紫




(七廿百一第)

圖舌短紫



(七十三百一第)

圖舌苔焦乾腫青上紫



(四十三百一第)

圖舌苔青帶紫淡



(一十三百一第)

圖舌潤濕苔黃上紫



(八廿百一第)

藍色舌圖




(第一四百二十四)

藍色紋舌圖



(第一四百四十三)

葡萄舌瘰圖



(第一四百四十四)

藍色舌總圖八

純微色苔舌圖



(第一百三十九)

中微浮厚苔舌圖




(第一百四十四)

微黃色苔舌圖



(第一百四十一)

微醬色舌總圖七



彩圖 辨舌指南卷五

鄞縣 曹赤電炳章撰述

紹興 周炳堉越銘參校

第二十五章 灰舌類診斷鑑別法

灰舌總論四

〔舌鑑〕灰色舌苔有陰陽之異。寒熱之辨。直中陰濕。即時舌便灰色。而無積苔。熱傳三陰。必四五日表證罷而舌變灰色黑苔也。有在根在尖在中之分。亦有渾舌俱灰色者。大抵傳經熱症。則有灰黑乾苔。法當攻下泄熱以存其陰。若直中三陰。見灰色無苔之舌。又當溫經散寒以扶其陽。更有蓄血證。其人如狂。或瞑目譫語。亦有不狂不語。不知人事。而面黑舌灰者。當分輕重以治其血。切勿誤與冷水引領敗血入心而致不救也。

〔辨正〕灰色不列五色。乃色不正也。舌見灰色。病概非輕均裏症。無表症有實熱症。無虛寒症。有邪熱傳裏症。有時疫流行症。鬱積停胸症。蓄血

如狂證其證不一而治法不外寒涼攻下寒涼以救真陰攻下以除微
我舌鑑總論為熱傳三陰則有灰黑乾苔皆當攻下泄熱是也又謂直
中三陰見灰黑無苔者當溫經散寒此說甚謬蓋灰黑與淡黑色頗相
似惟灰則黑中帶紫淡則黑中帶白之殊耳若寒邪直中三陰者其舌
淡黑無苔宜溫經散寒如熱邪直中三陰者其舌灰黑無苔宜三黃白
虎大承氣湯並用連投失出入其害非輕故望舌者小心謹慎焉石
云灰黑舌者足三陰互病如以青黃和入黑中則為灰色也為痰水注
於脉中致血微停瘀也然有傳經直中之殊蓋傳經無邪始自白苔而
黃黃而灰黑或生芒刺黑點不拘在根在尖俱宜攻下泄熱也
之苔據化學原子分析之由炭尼酸與鐵在化合而呈此灰色苔也

灰苔證治圖說 計十四舌

純灰色舌 第九十二

圖說

全舌灰色或潤或燥

舌鑑

舌灰滑無苔者直中三陰而夾冷食也脉必沉細而遲不渴不煩
者附子理中四逆湯酌治之次日舌變灰中有微黃色者生如漸漸灰
黑乾縮者必死○吳坤安曰舌苔灰黑而滑潤此寒水侮土太陰中寒

症也。外症必腹痛吐利。手足指冷。六脉沉細。宜理中湯。甚則加附子。
〔辨正〕純灰舌。全舌無苔而少津者。乃火邪直中三陰證也。外證或煩渴。
或二便閉。或昏迷不省人事。脉必散亂沉細伏代不等。含脉憑舌。均屬
裏證。凡灰舌治宜三黃白虎大承氣並用。急連投服。至灰色轉黃。轉紅
為止。病則立愈。舌鑑專指為寒。用附子理中湯。四逆湯。安得不致漸漸
灰縮。乾黑而死乎。○張石頑云。凡直中三陰。始病無燥熱。便見灰色。舌
潤無苔。更不變別色。此必內挾寒食及冷痰水飲。或畜血如狂等證。當
隨證治之。又有感冒夾食。屢經汗下消導。二便已通。而舌上灰黑未退。
或濕潤。或雖不濕亦不乾燥者。不可因其濕誤認為寒。妄投薑附。亦不
可因其不潤誤與硝黃。此因汗下過傷津液。虛火上炎所致。其脉必虛
微少力。治宜救陰為急。雖無心悸脉代。亦當用炙甘草湯主之。內有生
地。阿膠。麻仁。麥冬之甘潤。可以滋陰潤燥。蓋陽邪亢盛。則用硝黃以救
陰。陰血枯涸。則宜生地以滋陰。可不辨乎。

灰尖舌 第九十三

〔圖說〕舌尖灰黑中漸漸紅至根

〔舌鑑〕已經汗解舌尖見灰色者宿食在胃口或又傷飲食熱邪盛腸於

內也調胃承氣湯下之此釜底抽薪法也

〔辨正〕灰黑尖舌傷寒已經汗解而見舌尖灰黑有宿食未消或又傷飲

食熱邪復盛之故也以調胃承氣下之舌鑑是也若雜病裏熱見此舌

宜大承氣湯重加黃連

灰多黃少舌 第九十四

〔圖說〕中尖灰多惟根黃色苔

〔舌鑑〕舌灰色而根黃乃熱傳厥陰腸熱盛而胃有食停也調胃承氣湯

下之苔去後發熱下利汗出不止者死正氣脫也

〔辨正〕灰黑根黃舌如苔厚乾燥刮之不淨者乃熱入厥陰藏府實熱而

脾胃之火尤熾也其證多胃有積滯二便閉發燒熱大渴消水自汗不

止出至頸以下不出者諸病急宜十全苦寒救補湯以收汗服至二便

利則熱渴自汗必止待舌色明淨則愈舌鑑謂傷寒六七日不利便發

熱而渴。汗出不止者。正氣脫必死。其說未盡然也。

心灰弦黃舌 第九十五

〔圖說〕舌心中根灰色。邊弦皆淡黃。

〔舌鑑〕灰舌中邊有微黃色者是陰。回陽復胃土有氣。卽宜調理。胃氣不可輕忽。否則不治。當隨現症治。中虛邪少者。補中益氣湯。加溫煖藥治之。

〔辨正〕心灰弦黃。舌藏府本熱。疫毒復中。脾胃也。宜三黃大承氣急下之。則愈。或傷寒證誤服補中藥。燥傷脾胃者。宜大柴胡湯下之。如下見黑糞。急以破格苦寒救補湯。不次急投。至舌淨必愈。舌鑑云。否則不治者。誤也。

灰根中赤黃尖舌 第九十六

〔圖說〕舌根灰色。中紅尖黃色。

〔舌鑑〕灰根黃尖中赤舌。乃腸胃燥熱。真水涸竭之候。必大渴。譫語五六日不大便。轉矢氣者。急下以存真陰。如溫病熱病惡寒脈浮者。涼膈散。

雙解散兩下之

〔辨正〕灰根黃芩中赤舌乃腸胃燥熱也。如大渴謔語五六日不大便者以大承氣湯急下之。如瘟疫證熱證惡寒脈浮者酌用涼膈散雙解散舌鑑之說是也。

灰色重暈舌 第九十七

〔圖說〕淡灰舌中起灰黑重暈一、二層或灰舌黑暈

〔舌鑑〕此瘟疫熱毒傳遍三陰也。熱毒傳內一次舌增灰暈一層最危之症急用涼膈散或雙解散黃連解毒湯大承氣湯酌用之一暈尚輕二暈為重三暈必死亦有橫紋二三層者與此重暈不殊。○舌辨云如有表邪先宜解表表邪盡宜再攻裏下黃蘗者生下黑蘗者危。

〔辨正〕舌鑑之論尚合理惟熱毒傳裏已深涼膈雙解二方嫌有表藥亦不宜解毒湯太輕大承氣僅能利下而不能涼透藏府之熱不如用十全苦寒救補湯四倍加生石膏不次急投服至灰暈退淨為止雖見二三重暈均能救治。

周激之云此由病久寒熱互結風有痰飲蓄與又新加停滯也若因內傳一次即見一重於理難通或新

或傷寒化熱。傷食傷飲。多傷一次。即增一重。又有灰舌黑暈舌。乃熱毒中藏府大氣交攻。故令舌灰色。內兼黑暈。為時疫熱毒。內中脾胃逼及於腎。多見此舌。傷寒救治失宜。邪陷厥陰。亦有此舌。不論何證。何脉。將十全苦寒救補湯。分為二劑。先服大承氣湯。後服三黃白虎湯等藥。循環急投。至黑暈灰苔漸退。則愈。若用酒泡大黃。舊說有則誤矣。凡實熱及疫症。宜用大生黃。專瀉陽明之熱。治陰虛證。宜酒浸九蒸。九晒之。熱大黃。治傷寒證。宜酒洗大黃。以一大。治陰虛證。宜酒浸。失其生氣。疑而不走。潤而不涼。投之實熱。必將陽分之病。引入陰分。更難治也。

附灰暈微紅舌

〔圖說〕

舌邊圍灰黑暈。中心有紅暈者。

〔舌鑑〕

此邪熱入心胞之候。灼燥血分也。脉必數大。證必昏妄。宜涼膈散承氣湯下之。○正義云。舌苔黑暈二重。而中心紅者。陽明傳厥。陰熱入

心胞也。大承氣湯下之。

〔辨正〕

凡黑舌。偶有寒者。紅舌。則無寒證。故黑暈間紅。可斷為熱也。

灰黑沿紅舌 第九十八

〔圖說〕

舌心灰黑邊沿與尖皆紅。

〔舌鑑〕

此乃傷寒化火傳入陽明而逼太陽宜承氣湯下三四次方退若

五六次下之不退者不治。

〔辨正〕

灰黑沿紅舌乃脾胃實火鬱結不得流通也傷寒化火傳入陽明

而逼太陽者亦有之不論何證何脉大承氣湯不次急投服至灰黑色

退淨則必愈舌鑑云三四次下之方退若五六次下之不退不治者此

未澈底明白之談也。

灰中帶紫舌 第九十九

〔圖說〕

邊圓淡灰中根淡紫。

〔舌鑑〕

舌邊灰色舌中淡紫時時自嚙其舌尖為夾陰症也乃少陰厥氣

上逆不自知其痛苦也不治。

〔辨正〕

淡灰中紫舌瘟疫中藏者居多傷寒邪傳手少陰熱逼心營者亦

有之其症多卒然倒地不省人事或狂妄昏迷或疾呼大叫或自嚙舌

尖或拍胸嗟恨不等治宜三黃瀉心湯加黃柏連翹木香甘草不次急

投服至舌色漸淨則必愈。若稍涉遲疑則淡灰轉黑淡紫轉藍為邪毒攻心已甚而傷腐脾胃則不治矣。舌鑑云自鑿舌尖少陰厥氣逆上非藥可治者。蓋誤於遲疑耳。

灰中紅底舌 第一百 無圖

【圖說】全舌紅底中央灰色

【舌鑑】凡灰色見舌中央而消渴氣上衝心飢不欲食食即吐蛇者此熱傳厥陰寒傷胃口之候烏梅丸主之。○舌辨云下之利不止六七日來又當入府胃虛客熱飢不欲食蛔聞食則出而吐年壯者生老弱者恐不治也。

【辨正】灰中舌乃傷寒症熱邪轉入厥陰舌中央灰色其證消渴氣上衝

心飢不欲食食則吐蛇者宜烏梅丸。烏梅細辛乾薑當歸黃連附子川椒桂枝人參黃柏此丸能治寒病舌鑑是也。若雜病見此舌為實熱裏症宜大承氣與白虎湯合用。

灰苔黑滑點舌 第一百零一

【圖說】舌淡灰色中間有滑苔點子四五點深黑如墨汁

舌鑑 此邪熱傳裏內夾宿食不化也。大柴胡湯加乾薑芒硝少許下之。

舌辨云。余見一人有此舌。墨滑數點。余用大柴胡湯加減下之。次早則舌滑俱無。而見少微紅色。後調理而愈。

辨正 灰中黑滑舌。淡淡灰色中。間有滑苔四五點。如墨汁。此熱邪傳裏而腹有宿食未化。宜大柴胡湯。舌鑑是也。

微灰生刺舌 第一百零二

圖說 全舌微灰燥生芒刺。

舌鑑 此乃疫邪實熱中脾胃也。宜三消飲。老人生脉散主之。

辨正 微灰生刺舌。乃疫邪中脾胃居多。或實熱人誤服溫補辛燥藥所

致。不論老少。何證何脉。見此舌者。即宜十全苦寒救補湯分兩劑。先大

後三黃。不次急投。至苔刺退淨。乃愈。舌鑑用三消飲。則兼有表藥。屬舌色

白虎。證不宜表藥。如羌活溫藥。檳榔草果薑朮。老人用生脉散。子甘補酸。熱

葛柴胡溫燥皆忌。解邪不皆誤。不可從也。

灰尖乾刺舌 第一百零三

圖說 舌尖灰黑乾燥有刺。

〔舌鑑〕此乃熱極津枯得病後又加飲食之故是宿食不消也雖證見耳聾脇痛發熱口苦不得用小柴胡必用大柴胡湯或調胃承氣湯下之或解毒湯加消導藥方可取效

〔辨正〕如舌鑑治法甚是

全灰乾刺舌 第一百零四 無圖

〔圖說〕全舌灰黑滿生乾刺

〔舌鑑〕灰黑舌中又有乾刺滿舌而見咽乾口燥喘滿昏妄乃邪熱結於手足少陰腎水涸極之候不下必死調胃承氣下之又云然必待其轉矢氣者方可下若下之早令人小便難

〔辨正〕灰黑乾刺舌傷寒邪傳少陰口燥咽乾證偶見此舌宜大氣承湯下之或藏府實熱已極煩燥大渴胸中脹滿肉痛飲食不進一食即吐常作乾嘔等症宜十全苦寒救補湯不次即投服至灰黑色退淨則愈舌鑑必待其轉矢氣乃下之遲疑誤人矣傷寒陽明篇云少陰與承氣湯可攻之彼以熱邪初傳陽明故用探試之法今見灰黑舌且有乾刺是熱邪已結陰分無可疑矣若灰黑舌起裂紋者

血液灼枯也。內熱失治邪大毒熾者有之。宜增液承氣湯。鮮生地。黑元

寶生錦急下以救真陰則裂紋自平。

附灰黑裂紋舌 無圖

〔圖說〕灰黑苔乾燥滿舌裂紋

〔舌鑑〕舌見灰黑起裂紋是手足太陰二經邪毒至甚也。涼膈散調胃承

氣湯均可酌下。十中可救二三。下後渴不止熱不退者死。

〔辨正〕灰黑苔乾裂紋舌此藏府熱極又因誤食熱物或誤服溫補辛燥

藥灼傷真陰所致。凡裂紋者多因誤食溫燥之故。治宜破格十全苦寒救補湯。不次急

投服至灰黑色退紋裂自平則立愈。如舌鑑僅用涼膈散調胃承氣湯

下之熱不退則不敢再用寒涼遂歸於不治。姑息貽禍也。

灰短硬卷舌 第一百零五

〔圖說〕舌灰黑而燥卷短而硬

〔舌鑑辨正〕短硬或卷舌凡舌短由於生就者乃初生時將含口無關毒

天若因病縮短不能伸出者危證也。傷寒邪陷三陰及實熱證火逼三

陰皆能致舌短。不論何脉。當辨其苔色。如確是內熱。則宜大承氣湯急下以救其陰。若少陰自絕症。則不治。凡舌硬者。即重舌。木舌。腫舌。大舌。強舌之類。藏府俱熱而心經尤熱也。宜十全苦寒救補湯加羚羊角三錢不次急投則愈。

附孕婦卷短舌 無圖

〔圖說〕舌乾卷短。或黃黑刺裂。

〔舌鑑〕孕婦傷寒發熱至久。熱深熱極。舌乾卷短。或黃黑刺裂。乃裏證至急。不下則熱邪傷胎。下之則危在頃刻。如無識妄直視循衣撮空等危證。下之或可救十中之一二。

〔辨正〕孕婦卷短。舌面黑而舌乾卷短。或黃黑刺裂。乃傷寒化火傳足厥陰也。宜大承氣湯加元明粉急瀉之。則愈。舌鑑謂不瀉則熱邪傷胎。下之則危在頃刻。此見識未透耳。若明於醫者。除暴即以安良。無多疑慮。

第二十六章 紅舌類診斷鑑別法

紅舌總論五

〔舌鑑〕紅色者。舌之正色也。舌屬南方火。其色本當紅。第紅光外露不能

內藏斯為有病之舌。夫紅舌是少陰伏熱蓄於心胃。乃自裏而達於表也。仲景云。冬傷於寒。至春變為溫病。至夏變為熱病。故舌本煊紅。而面色亦赤。至溫疫之候。一方之內。老幼皆相似者。舌亦正赤。而加以積苔也。如或失治。則蘊熱內蒸。豈但舌赤而已。必舌瘡。疳腐。細長短病。斯劇矣。然病有輕重。舌有微甚。且舌有根。尖中下左右種種之不同。皆蘊毒蘊熱之所化。以見病之淺深。輕重有殊。治法亦各不相侔。當清化者。內解其毒。宜攻下者。搜滌其邪。縱使元陰元氣無傷。庶不失中和之治。若論攻邪無過達源解毒。梔子淡豉三黃石膏大小承氣皆是。至於養正。又須滋陰養營。六味七味保元左歸。生脉無疑矣。

〔辨正〕全舌淡紅不淺不深者。平人也。有所偏則為病。表裏虛實熱症。皆有紅舌。惟寒證無此舌。如全舌無苔。色淺紅者。氣血虛也。色深紅者。氣血熱也。色赤紅者。藏府俱熱也。色紫紅者。藏府熱極也。中時疫者。有之誤服溫補者。有之色鮮紅。無苔無點。無津。津出無液。液出者。陰虛大炎也。有若不能生苔。論色灼紅。無苔無點。而膠乾者。陰虛水涸也。色絳

紅無苔無點光亮如錢或半舌薄小而有直紋或有泛漲而似膠非膠或無津液而咽乾帶瀉不等紅光不活絳色難名如猪腰將腐水涸火炎陰虛已極也瘦人多火偏於實熱醫者拘於外貌輒指為虛誤服溫補灼傷真陰或誤服滋補名酸為滋陰降火實則膩滯俾鬱火漸耗真陰亦絳舌而為陰虛難療矣其初必有黃苔醫者不知久之內傷已甚不誤服補藥通成也不論病狀如何見絳色舌則不吉舌鑑引仲景云冬傷於寒春變為溫病至夏變為熱病故舌紅面赤此專言瘟疫與傷寒也而紅舌各病實非瘟疫傷寒所可賅括勿泥古以致誤

紅舌證治圖說計二十舌

純紅舌 第一百零六

〔圖說〕紅赤如瘀血之色不雜他苔

〔舌鑑〕乃溫熱內蓄自裏而達於表也宜敗毒散去防風加淡豆豉葱白

或葛根解肌湯炳章按暑證多見此舌宜鮮地梔梔豆豉黃連

〔辨正〕純紅舌非純而不雜即瘀血之色也藏府極熱者中時疫者誤服

溫補者。皆有之。宜三黃白虎湯加連翹。或大小承氣湯等藥。酌用。此舌亦有表證者。則兩臉周身必發熱。頭暈目眩。乍寒乍熱。脉浮數。邪熱在太陽也。宜用薄荷。荊芥。葛根。竹葉。生甘草等。以涼散表邪。不可遽用寒涼攻下。舌鑑專指表證。用人參敗毒散。人參。羌活。獨活。柴胡。前胡。桔梗。枳殼。茯苓。甘草。守家訓。不敢妄用人參。柴胡。以升燥少陽經。及羌獨活。逼燥諸經。必須風邪深入方可用。若熱邪在太陽。用之適引邪入他經。

光紅柔嫩舌 第一百零七 無圖

圖說

全舌鮮紅柔嫩。光而無津液。或謂鏡面舌。

舌鑑

舌色光紅。柔嫩無津。良由汗下太過。元精耗極。於內宜生脉保元。

清補

之為甚。行汗下。津液竭也。多不新生。望之似潤。而燥涸殆甚。更有

病後絳舌。如錢發亮而光。或舌底咽乾。而不飲涼。此腎虧已極。宜大劑

六味地黃湯投之。以救其津液。凡少陰虛證。舌形必圓大。胖嫩。吳坤安

躁擾不寧。六脉洪數。或動氣內發。腹寒畏冷。或初起吐利。手足逆冷。必見

辨正

紅嫩無津舌。全舌鮮紅柔嫩。而無津液。望之似潤。而舌燥涸者。乃

陰虛火旺也。宜十全甘寒救補湯常服之。舊說用生脉散人參三白湯。

人參洋芩茯苓。醫家積弊。誤人不少。五味白芍酸鉅人參燥肺。苓求薑

白朮白芍薑棗。愈旺真水。若舌絳而光亮者。胃陰亡也。急用甘寒濡潤之品。如炙甘草

益虧矣。湯去薑桂。加鮮石斛。蔗漿麥冬。葉天士云。舌淡紅無色者。或乾而色不

炙甘草。湯不可用寒涼藥。章虛谷云。淡紅無色。心脾氣血虛也。更宜

乾而色不榮。胃中津氣亦亡也。故不可用苦寒之藥。以炙甘草湯養營

血。以通經脉。其薛生白云。舌光如鏡。外證口大渴。胸悶欲絕。乾嘔不止

邪。自可漸去矣。此乃胃液受劫。胆火上衝。宜西瓜汁。金汁水。鮮生地汁。甘蔗汁。磨服木

香鬱金。香附。烏藥等味。耗其津液。故舌先無苔。寧津枯。非濁壅。胸悶欲

絕者。肝胆氣上逆也。故以諸汁滋胃液。辛香散逆氣。凡治

陰虛氣滯者。可以仿此用藥。此證近時甚多。特附錄之。

圖說 紅中微黃滑石 第一百零八

舌鑑 淡紅舌中見黃滑薄苔。紅中微黃滑舌。乃傷寒五七日。舌中見黃苔。則為陽明證。熱勢初

盛也。如脉沉實。譫語。雖苔滑。亦宜大柴胡湯。若苔乾燥者。內邪熱盛也。

急以大承氣湯下之。

〔辨正〕

凡傷寒見此舌。舌鑑治法甚是。如無病人有此舌。是藏府本熱而飲食復留濕熱也。行動即消。化可勿用藥。○吳坤安云。若舌質絳黏膩苔上浮。暑濕釀蒸痰濁蒙閉心包也。急用芳香逐穢宣竅。滌痰之品。如西黃至寶丹。鮮菖蒲。天竺黃。川貝母之類。若舌絳中仍帶黃白等苔。是邪在營衛之間。當用犀羚以透營熱。荆薄以散衛分表邪。兩解以和之。可也。○章虛谷云。若其舌四邊紅而不絳。中兼黃白苔而渴。此熱不在血難散。若舌絳望之若乾。以手捫之。原有津液。此津虧濕熱薰蒸。胃中濁氣成痰。蒙閉心包。宜用宣竅。滌痰等法。若舌苔白底色絳者。熱被濕遏。不得外透也。用犀角滑石等藥。以泄濕透熱。

〔圖說〕

紅根黃根舌 第一百零九
舌根紅赤。尖苔黃色。

〔舌鑑〕

乃濕熱上乘心位。溫熱初起。多見此舌。宜銀翹散涼膈散酌治之。

〔辨正〕

舌鑑法甚是。當再與黃苔類第四十五十一舌參看。

〔圖說〕

紅中黑斑舌 第一百十
全舌純紅。中有小黑斑點。

〔舌鑑〕

乃瘟疫熱毒陷於陽明也。熱極則斑黃狂亂。身上亦有紅紫斑者。解毒湯合調胃承氣湯急下之。遲則不救。○正義云。舌紅而中見紫斑者。將發斑也。元參升麻葛根湯。斑已見者。化斑湯。舌淡紅而中見紅赤點者。將發黃也。茵陳五苓湯。

〔辨正〕

生斑舌全舌純紅而有小黑斑點者。藏府皆熱也。傷寒邪傳陽明府失治以致邪火逼入三陰證。或疫毒直中三陰證。或實熱人誤用辛溫藥燥傷三陰證。均有之。不論老少。何病何脉。見此舌。即宜十全苦寒救補湯倍加犀角尖連服必愈。正義用元參升麻葛根湯及化斑湯。

人參生甘草膏誤人多矣。非陰火何可用元參。非表證何可用升麻。葛根知母生甘草受其誤矣。○章虛谷云。舌紅極而有紫斑及紅點。且週身亦發斑。此陽毒入心。人參白虎湯加犀角黃連治之。吳坤安云。若週身亦見斑。而身上亦見赤斑。丹疹者。此邪在營分。血分。舌質亦必絳赤。宜犀角鮮大青連翹鮮生地人中黃銀花等透營解毒。大忌升葛足經之藥。若斑疹發於氣分。其色淡紅而白者。名曰白痧。其舌苔亦白。宜葛根防風。蟬衣。荆芥。連翹。薄荷。牛蒡等。鬆肌達表。此斑疹各證治法也。

〔圖說〕

紅內雙灰乾舌 第一百十一
全舌紅色兩畔夾兩路紅灰苔

〔舌鑑〕乃疫熱內熾夾宿食不化也。故身熱譫語脉滑者一下即安如脉

瀉下

黑糞者死。張石頑云紅中夾兩路灰色苔者溫熱而未寒食也涼膈散加消導藥一二味。

〔辨正〕

紅中雙灰乾舌乃臟府皆熱而脾胃亢也。傷寒邪入胃府發熱

譫語循衣摸床神昏撮空者有此舌實熱人飲食鬱結者亦有之不論

何脉宜十全苦寒救補湯分二劑。先大承氣湯不次急投循環速服將

黑糞下淨則愈。舌鑑謂下黑糞者死。謬甚。

紅內紅星舌 第一百十二

〔圖說〕

純紅舌中滿布深紅紅星如珠鼓起

〔舌鑑〕

純紅舌中紅星滿布如瘡如瘰乃溫熱傷於心脾也。盒而將欲發

黃宜茵陳蒿湯合五苓散主之。石頑云紅舌中紅珠鼓起如紅星者心包絡之大上炎也涼膈散主之。

〔辨正〕

紅星舌乃藏府血分皆熱也。中燥火者中疫毒者實熱人誤服溫

補者皆有之其病多大熱大渴心胸脹滿皮膚燥癢日夜不能眠大便

閉小便便瀉不等宜十全苦寒救補湯急投則愈。舌鑑指為傷寒將發黃

用茵陳蒿湯合五苓散誤也。按熱毒傳裏茵陳蒿湯不濟事五苓散內有苓朮肉桂皆不宜於熱症。吳中安云

濕溫症舌現紅星點者此熱毒乘心必神昏譫語宜苦寒之品清之狂亂者非川連金汁水不解

紅內白泡舌 第一百十三

圖說

舌紅短而起白泡

舌鑑

口瘡舌短而起白泡聲啞咽乾煩燥者乃瘟疫強汗傷其津液傷寒未汗過熱傷經瘟疫黃連犀角湯清之傷寒三黃石膏湯汗之

舌紅短起白泡者大氣燔灼也因浮淺不入血絡故起白泡宜三黃石膏湯去麻黃

辨正

舌鑑治法亦是

紅內紫瘡舌 第一百十四

圖說

純紅舌上起紫色瘡

舌鑑

瘟疫多此舌乃疫毒上薰肺胃受病故煩躁作渴咳嗽多痰宜解毒湯並益元散加元參薄荷尺無脈者必死戰慄者亦死

者此心經熱毒也黃連瀉心湯張石頑云紅舌起紫瘡者此大氣鬱伏也宜解毒湯

辨正

紅色紫瘡舌瘡在肺經位者乃時疫毒中心肺或楊梅毒注心

肺皆有之宜十全苦寒救補湯倍加生石膏黃連不次急投至瘡平則

愈。舌鑑謂疫氣煩渴或咳。用解毒湯並益元散加元參薄荷。此時非大
驅毒非白虎不能救陰解毒益元散輕不濟事元參為陰分尺脈無則
涼藥病屬陽大。而反瀉陰大。則無益有損。薄荷亦不對症。

死。病重脈亂。當皆不明治法之論也。

深紅蟲碎舌 第一百十五

〔圖說〕深紅舌中更有紅點坑爛如蟲蝕之狀

〔舌鑑〕乃水大不能既濟熱毒熾盛於中也。不拘日數宜小承氣湯下之。
不退調胃承氣湯下之。○正義云舌紅而碎爛如蟲蝕者少陰瘟毒也。
小承氣湯二三下可愈。○張石頑曰紅苔紅點坑爛者濕熱入脾也。小
承氣湯加苓連半夏。

〔辨正〕蟲碎舌紅舌中更有紅點如蟲碎之狀者熱毒熾盛也。宜小承氣
湯下之不退再用大承氣湯下之舌鑑之說是也。然不如將十全苦寒
救補湯分為大承氣三黃白虎等二劑循環連服以舌淨為度。○吳坤
安云舌絳碎而有黃白腐點者此濕熱邪毒蘊久不宣蒸腐氣血化為
瘀濁得風木之氣化而成蟲也。葉桂曰舌絳而有碎點黃白者當生疳

也。黃連、金汁皆可加入。

紅色人字紋舌 第一百十六

〔圖說〕深紅舌中有裂紋如人字，川字、叉字者。

〔舌鑑〕相火上乘君位，致令舌紅燥而紋裂作痛也。宜黃連解毒湯加麥

冬以寒潤之。紅極而紋裂者，燥熱入肝也。大承氣加柴胡、白芍，甚則加

芩、連。如舌色赤紅，苔厚膩而裂紋者，藏府實熱也。宜十全苦寒救補湯。

炎也。黃連解毒湯加麥冬可也。舌深紅而破裂如人字紋者，乃陽明熱

毒薰蒸於膈上，傳熱於少陰也。涼膈散加白蜜以潤之。如內實腹脹

口渴而轉矢氣者，大承氣湯合解毒湯下之。若舌淡紅而破裂如川字

紋者，外症神昏自利，用導赤散加黃連，後再用生脈散加黃連、棗仁。

〔辨正〕人裂舌，紅色中有裂紋如人字者，君火燔灼，熱毒炎上，故發裂也。

如渴甚躁熱者，宜大承湯下之。舌鑑亦是。然不論白、黃、紅、黑各舌，若中

有裂紋如川字、叉字，人字不等，或裂直槽者，多有實熱。人誤服溫補藥

以致熱火在臟腑相爭，大承氣雖能下毒，而未能涼心腸，胃宜以白虎

湯與承氣循環服。不知者以為太重。實則力求周密之策也。凡治實熱內逼之症。皆宜如此。

紅尖出血舌 第一百十七

〔圖說〕全舌紅。絳色。舌尖出血如濺。

〔舌鑑〕邪熱內逼。心藏心血不藏。故舌尖出血如濺也。宜犀角地黃湯加

大黃黃連治之。正義云。舌紅而出血如細。此熱傷心胞也。犀角地黃湯或四生丸。林慎庵將前方再加黃連蒲黃炭更效。

〔辨正〕紅尖出血。舌乃手少陰心經邪熱壅所致。宜三黃瀉心湯加川柏

連翹生地。錢各三。真犀角尖。錢四。不次急投。則愈。舌鑑論證尚合。用藥嫌雜。

如犀角地黃湯。黑犀角。鮮生地。西赤芍。粉丹。各一。內之丹皮辛溫上升。皆於邪盛時不宜。

紅細枯長舌 第一百十八

〔圖說〕舌色乾紅。枯而細長。

〔舌鑑〕乃少陰之氣絕於內。石頑云。乾紅舌。忽而不上於舌也。雖無危症。瘦而長。為心絕也。

脈若衰絕。朝夕恐難保矣。吳坤安云。舌形紫晦如猪肝。色絕無津液者。為枯不治。

〔辨正〕紅細枯長舌。如絳紅無苔。乾枯紅長而有直紋透舌尖者。此陰虧

已甚。手少陰之氣已絕於內，不能上通舌根，故不顯苔也。命絕難治，即
為數行而大亦若赤紫紅色，中間尚帶顯苔，膩者不黃黑，雖有直紋透夫亦
為臟府實熱症。陰虛不作宜三黃白虎大承氣湯合投可愈。倘用二地二冬
入陰分即辨之詳慎，方不誤人。

紅脹出口舌 第一百十九

〔圖說〕舌紅長大脹出口外，不銛者。

〔舌鑑〕乃熱毒乘心，舌本弛長也。內服三黃瀉心湯，外用銀針砭去惡血。

從舌之脾經部位輕以出毒，若誤治傷筋絡則血出不止，亦足誤人。以梅冰片和人中黃末摻於舌上即愈。

〔辨正〕舌鑑治法甚善，如不針則合用大承氣三黃瀉心湯，不次急投必

大瀉頻瀉乃愈。

紅銛舌 第一百二十 無圖

〔圖說〕全舌紫紅頻出口外，銛至鼻尖上下，或口角左右。

〔舌鑑〕乃熱傷心藏熱極生風，舌故動搖銛出時弄不止也。急用解毒湯。

加鮮生地。效則生。不效則死。○正義云。舌紅而吐弄者。此熱在心脾也。安神湯主之。

〔辨正〕紅。銛。舌。天行。燥。火。時。疫。症。多。有。之。全。舌。必。紫。而。兼。瘀。藏。府。為。疫。毒。內。攻。逼。迫。心。經。所。以。舌。長。出。口。外。時。弄。不。止。或。銛。上。下。唇。左。右。口。角。或。銛。至。鼻。尖。不。等。宜。十。全。苦。寒。救。補。湯。倍。加。川。連。生。石。膏。不。次。即。投。至。舌。收。回。乃。愈。知。治。法。者。可。以。十。全。否。則。十。無。一。生。舌。鑑。用。解。毒。湯。加。生。地。必。不。效。也。

紅戰舌 第一百二十一 無圖

〔圖說〕全舌深紅。或淡紅。蠕蠕動於口中。

〔舌鑑〕此因汗多亡陽。心陽不振。故漏風心悸。而舌戰也。宜十全大補湯。

大建中湯酌用。正義云。舌淡紅而戰動。難言者。此心脾虛也。汗多亡陽者。有之。應用方中。多加人參可救。

〔辨正〕紅戰舌。顫掉不安。蠕蠕微動也。深紅赤紅而戰者。宜三黃石膏等。

湯。紫紅瘀紅而戰者。宜三黃白虎大承氣湯。淡紅而戰者。宜十全大補

湯。虎參。白朮。茯苓。甘草。當歸。鮮紅。灼紅。而戰者。宜六味地黃湯。
黃耆。川芎。白芍。熟地。肉桂。鮮紅。灼紅。而戰者。宜六味地黃湯。
肉桂。鮮紅。灼紅。而戰者。宜六味地黃湯。
肉桂。鮮紅。灼紅。而戰者。宜六味地黃湯。

棟藥。茯苓。澤瀉。此舌虛火實火皆有之。誤治即壞。舌鑑指為汗多亡陽。或漏風所致。且不詳辨。而概用溫補。謬也。

紅痿舌 第一百二十二 無圖

〔圖說〕舌本痿軟不能舉動。色淡紅。深紅。赤紅。灼紅。不等。故不能列圖。

〔舌鑑〕舌本痿軟不能轉動。此心藏受傷。心氣不振也。當參脈證施治。然

亦十難救一也。○正義云。紅而痿軟不能言者。此心脾虛極。或有痰也。死不治。張石頑云。舌痿不能轉動者。肝絕也。不治。

〔辨正〕痿者軟而不能動也。淡紅痿者宜補氣血。深紅痿者宜涼氣血。赤

紅痿者宜清涼藏府。紫紅痿者宜寒涼藏府。並攻瀉之。鮮紅灼紅痿者

宜滋陰降火。惟絳紅痿者為陰虧已極。無藥可救。舌鑑但云紅痿不治

而不分類。謬甚。葉天士云。其有雖絳而不鮮。乾枯而痿者。腎陰涸也。

急以阿膠。雞子黃。天冬。生地等救之。緩則恐涸疾而無救矣。○吳坤安

云。舌形。欽。縮。伸。不過齒。紫絳不鮮者。為痿。為肝腎陰液枯涸。而敗。若舌

色紅絳而光。其色鮮明者。屬胃陰乾涸。猶可滋養胃陰。如鮮生地。鮮石

鮮大青葉蕉漿梨汁之類

紅硬舌 第一百二十三 無圖

〔圖說〕全舌深紅或紫紅舌根強硬不語

〔舌鑑〕邪結咽喉舌根強硬失音不語死證也脉若有神外無危證者急

用清心降火兼去風痰藥亦有得生者○正義云舌紅而強硬失音者死候也有痰者舌必灰胖而硬宜胆星橘紅半夏菖蒲竹茹主之內實者可下之大抵溫熱暑邪舌硬不語屬下證為多雜證不語同中風治用黃耆防風湯或人參湯加竹瀝

〔辨正〕紅硬舌藏府實熱已極又為燥火浸淫或誤服溫藥則舌根強硬不能言語或時痰直中三陰者亦有之均裏証實熱無表証虛寒症宜十全苦寒救補湯不次急投必愈若舌尖能動而舌根胖硬不能言語此痰阻舌根有內風上逆也宜開降豁痰中加辛涼鹹潤以熄內風也脾腎之脉皆連舌本亦有脾腎氣敗而舌短硬不能伸者其形貌面色亦必枯瘁多為死證也

厥陰舌 第一百二十四

圖說 全舌純紅或紫紅內有黑絲紋滿布

舌鑑 厥陰舌舊圖全舌純紅或紫紅內有黑絲紋環其後方正而不達邊余以為凡舌色純紅兼顯黑絲必非寒證當是熱氣結於足少陰宜用寒涼藥舌鑑指為陰毒中厥陰以理中四逆湯溫之未知合否寒涼之判吉凶所繁余未見此舌不敢妄斷請識者辨之參辨正

孕婦純赤舌 第一百二十五 無圖

圖說 全舌純赤若有兼色當參前各證看法

舌鑑 孕婦傷寒濕熱而見面舌俱赤宜隨證汗下子母無虞若傷寒面色既白而舌赤者母氣素虛宜溫中如薑桂等溫煖藥治之桂不墜胎安常所言是也若面黑舌赤亦非吉兆若臨分娩則子得生而母當殞也五六箇月之胎豈能生乎亦必同死○舌辨云母面白如膏舌赤似珠此心熱乘肺熱雖在裏因初感寒邪尚輕宜小柴胡湯加減以平其熱若面黃舌赤者面黃有淺深舌赤有輕重言感邪之多少也宜清熱

安胎。如黃芩、白朮、梔子等藥治之則安。

〔辨正〕孕婦純赤舌。凡孕婦發溫，舌色純赤，此陰血素虛，少陰伏熱外發，藏府俱熱也。必發斑，當養陰泄熱以安胎。實熱盛者，宜三黃白虎湯並投。則子母俱安。萬無可慮。舌鑑泥定傷寒，又指面白為氣虛而投薑桂，竊慮如火益熱，有損無益，豈可不辨乎。

第二十七章 紫舌類診斷鑑別法

紫舌總論 六

〔舌鑑〕紫色舌苔者，乃酒後傷寒也。或由大醉露卧，當風取涼，或涼飲停積不散，或已病仍飲不節，或感冒不即解散，妄用薑蔥發汗，汗雖出而酒熱留於心胞，伏於經絡，血氣不能上榮於舌。或酒後雄飲冰水，致令酒之餘毒衝行經絡，酒味入心，汗雖已出，心包絡內還有酒毒不盡，皆能令舌現紫色。且又有微白苔膜也。苔之初結，舌之根尖左右長短厚薄之變，紅黃白黑之色，涎滑乾焦之異，刺癢隔瓣之殊，種種不同，當參脉證調治之。

周激之云：推其所以皆由寒氣束於肌表，酒力不能外行而內積於胃，無包絡也。

〔辨正〕紫見全舌藏府皆熱極也。紫之微甚亦熱毒之微甚也。見於舌之某部。卽某經之鬱熱也。傷寒邪化火者。中時疫者。內熱薰蒸者。誤服溫補者。酒食濕滯者。皆有紫舌。有表裏實熱症。無虛寒症。若淡紫中夾別色。則亦有虛寒矣。凡辨舌無苔。則論舌之本色。有苔。則憑舌之見色。參之望問。以判表裏寒熱虛實之真假。雖不中不遠矣。余數十年來。但知有紫色舌。未聞有紫苔。舌但見紫。舌為各種熱症。未聞概屬酒後傷寒。舌鑑專指酒後傷寒。未免拘執。

紫舌證治圖說 計十三舌

純紫苔舌 第一百二十六

〔圖說〕全舌渾紫色。上無浮苔。

〔舌鑑〕舌見渾紫色者。乃酒後傷寒舌也。或傷寒在表。不用藥。而以葱酒發汗。或未汗。又飲燒酒。取汗。致令酒毒入心。心含酒毒。故舌見紫色。況汗未盡。邪熱至甚。又加酒毒。愈助其熱。宜升麻葛根湯加石膏滑石。治之。解酒毒。又解其表也。若心中煩。或懊憹不安者。梔子豉湯主之。否則

發斑。身有斑者。黃連化斑湯。加葛根青黛。

〔辨正〕舌鑑治法尚是。然紫舌。非專屬傷寒也。如傷寒寒邪化火。或中時疫毒。或誤服溫補藥。或內熱鬱結。諸症皆有之。均宜十全苦寒救補湯急服。

紫上白苔舌 第一百二十七

〔圖說〕全舌紫色。中心白苔上罩。

〔舌鑑〕舌紫而中心見白滑苔者。此醉後傷寒。或誤飲冷酒停積不散。亦令人頭痛。身熱惡寒。是酒毒在太陽也。有表者。葛根湯加生石膏。或兼服葛花解醒湯皆治之。舌辨用麻黃葛根湯以取汗。

〔辨正〕紫上白滑舌。此藏府本熱。或因感冒時邪。身熱惡寒頭痛者。宜紫蘇薄荷荊芥甘草等輕表之。若白苔不滑而厚膩則實熱內蓄也。如無表證。宜苦寒清裏藥。舌鑑謂酒後感寒。或誤飲冷酒所致。亦令人身熱頭痛惡寒。隨證解表可也。

紫上黃苔濕潤舌 第一百二十八

〔圖說〕

外淡青紫色。中有黃滑濕潤苔。

〔舌鑑〕

此食填胃。口寒傷太陰也。心下必痛。小承氣湯。加附子。或黃龍湯。

主之。○張石頑云。若舌質青紫。苔且黃厚。甚則裂紋。但覺口燥。舌仍不。

乾者。此陰證夾食也。周激之云。青紫是有瘀血。非陰證。濕是邪蘊結。深陷於血分也。脉或沉細而伏。

或虛大而濇。按其心下。或臍傍硬痛。此結痰與瘀血相挾。而間有矢氣。

者。即宜大承氣。另煎生附子佐大黃下之。若脉虛者。黃龍湯主之。熱極。

煩躁者。更加鮮生地。麥冬。夏月尤宜。若冬時陰證夾食。夾痰瘀者。舌上。

苔黃。必不燥。宜附子理中。合承氣下之。時常矢氣。非有宿食燥矣。即為。

氣脫之候。不可救藥也。總之凡中宮有痰飲水血者。舌多不燥。不可因。

其不燥而延緩時日致誤也。

〔辨正〕

紫上黃苔。濕潤舌。外淡青紫色。而中有苔。濕潤而滑。此食傷太陽。

也。脉必沉細。而心下臍傍按之必硬痛。或轉矢氣者。小承氣加附子。或。

黃龍湯。舌鑑尚是。而石頑治法更備。余意熱邪既已深入。無須溫以附。

子。表以桔梗。補以參。薑棗。原本專指傷寒證之傷寒者。若雜病裏症有。

黃苔必熱宜下而兼涼

紫上黃苔乾燥舌 第一百二十九

〔圖說〕外紫乾色中有黃燥苔

〔舌鑑〕乃嗜酒食辛之人又傷寒邪至四五日舌紫上積乾黃苔者是濕火內盛宜大承氣湯加芩連葛根如表證未盡用大柴胡湯如邪在半表半裏其舌色微黃者必有脇痛耳聾止可用小柴胡湯內少加鮮生地之類

〔辨正〕紫上黃苔乾燥舌乃藏府素熱脾胃尤甚或嗜酒積熱或燥火入裏或誤服溫補所致皆實熱裏證宜十全苦寒救補湯對證加減連服則愈舌鑑用大承氣湯近是用大柴胡湯則非也

淡紫灰心舌 第一百三十

〔圖說〕外邊皆淡紫舌心帶灰或青黑不燥

〔舌鑑〕淡紫舌中心生薄青紫苔或略帶灰黑而不燥不濕此濕中生熱熱傷血分也下證復急者犀角地黄湯加酒大黃微利之

〔辨正〕淡紫灰心舌。或青黑不燥不濕者。為傷寒邪傷血分。雖有下證。只宜犀角地黄湯。犀角。鮮生地。丹皮。赤芍。加酒洗大黃微利之。舌鑑近是。

淡紫帶青舌 第一百三十一

〔圖說〕全舌淡紫帶青滑潤無苔。舌質瘦小。

〔舌鑑〕舌色青滑。乃直中腎肝陰證。陰寒之象。急宜吳茱萸湯。四逆湯溫之。再加化痰之品。外證若見面青唇紫。男子囊縮。婦人乳縮。厥逆筋急。直視等症。厥陰敗症也。不治。

〔辨正〕淡紫帶青舌。青紫無苔。多津滑潤而瘦小。為傷寒直中腎肝陰證。

宜吳茱萸湯。吳茱萸。人參。薑棗。治胃氣虛寒。中夾寒飲者效。四逆湯溫之。舌鑑是也。肝色青。腎色黑。相合而見於舌。變化紫晦者。腎肝色泛也。此舌雖無邪熱。亦必難治。

淡紫青筋舌 第一百三十二

〔圖說〕舌淡紫中帶兩路青黑筋而潤者。

〔舌鑑〕此寒邪直中厥陰真寒證也。外證必身涼四肢厥冷。脉沉面青。宜理中四逆二湯。並加葛花治之。脉沉面黑者不治。

〔辨正〕淡紫青筋舌。舌淡紫帶青而濕潤。又絳青黑筋者。乃寒邪直中陰經也。必身涼四肢厥冷。脉沉緩或沉弦。宜四逆湯理中湯。小腹痛甚者。宜回陽救急湯。即四逆連中。又加肉桂。半夏五味子。茯苓陳皮。舌鑑之說是也。若舌不濕潤而乾枯。則是實熱。宜用涼潤之劑。乾何報之曰。酒毒內蘊。舌必深紫而赤。或乾澀。若淡紫而帶青滑。則為寒證。其須辨。

紫中紅斑舌 第一百三十三

〔圖說〕舌渾紫而有紅斑滿舌者

〔舌鑑〕舌渾紫色而上滿舌紅斑。或渾身亦發出赤斑者。此酒毒內蘊濕中生火之證也。宜化斑湯。或三黃解毒湯加青黛葛根。有下證者。涼膈散。或消斑青黛飲主之。吳坤安云。舌苔兩傍有紅紫點者。肝藏伏毒也。急用犀角尖。鮮大青。人中黃。透之解之。

〔辨正〕舌鑑治法亦是。惟消斑青黛飲。青黛。川連。石膏。犀角。柴胡。人參。甘草。知母。山梔。元參。生地。薑棗。加醋。

一匙。和服。大便實者。去人參。加大黃。此陶節庵方。之人參元參生地。柴胡薑棗醋七味。皆與陽火實熱裏證不當除去。乃效。若泥古亦足誤人。張石頑云。若紫中有紅斑。或紫而乾黃。紫而短。

縮。俱宜涼膈散主之。

紫上青腫乾焦舌 第一百三十四

〔圖說〕舌邊紫而中心赤腫或青腫

〔舌鑑〕紫上赤腫乾焦舌。乃是陽明受邪。或已下後。即食酒肉。邪熱復聚。

所致。若赤腫青潤。大柴胡湯微利之。若煩躁厥逆。脉伏。先用枳實理中

湯。即理中湯加枳實茯苓。次用小承氣湯下之。或加荊連葛花亦佳。

〔辨正〕舌鑑是指傷寒證之寒食結胸也。若雜病見此舌。乃脾胃實熱已

極。不論何脉。將十全苦寒救補湯分兩劑。三黃白承氣湯。二循環急投服

至赤腫消盡則必愈。過於遲疑。勢必誤人。凡舌忽然紫腫作疼。不能言

黃飛鹽各二錢。飛月石。薄荷。僵蚕。各一錢。煨皂。卷錢半。共研極細末。頻頻吹之。吐去涎痰。遂愈。

熟紫老乾舌 第一百三十五

〔圖說〕舌全紫乾老。如煮熟猪肝者。即死肝色也。

〔舌鑑〕乃濕熱傳入厥陰。胃氣不化。陽極似陰也。其外證必厥冷脉必沉

滑。陽脉不達。急宜當歸四逆湯加酒浸大黃。桃仁下之。然多不救。周

當歸四逆。尚嫌近補。大黃又嫌泄。此

〔辨正〕熱紫老乾舌乃藏府熱極。又因邪熱傳厥陰也。惟有十全苦寒救補湯分劑連投。先服大承氣湯。次服三黃白虎湯。加犀角。夫等藥。服至舌色嫩淨則愈。遲疑則不治。舌鑑明知是熱邪傳陰。而仍用當歸四逆湯之溫補。謬極。

紫尖痞瘰舌 第一百三十六

〔圖說〕舌色淡紫。尖生痞瘰。

〔舌鑑〕感寒後不戒酒食。或醉飽後感寒。遇熱於裏。血氣不得流通。而見咳嗽生痰。煩躁不寧。舌色淡紫。尖生痞瘰。乃酒毒傷胆。咳痰傷胃所致也。宜小柴胡湯加葛花滑石鮮生地赤芍治之。

〔辨正〕紫尖痞瘰舌乃熱毒中心血也。時疫酒濕梅毒等症皆有之。宜三黃犀角連翹銀花生大黃鮮大青葉各三錢治之。舌鑑謂傷寒不戒酒食所致殊未當也。若舌苔焦紫起刺如楊梅狀者。此陽邪熱入肝藏險症也。大便閉者。急以更衣丸下。金汁水。人中黃類之。

紫短舌 第一百三十七

〔圖說〕全舌色紫。短而圓。

〔舌鑑〕

紫短舌。乃食滯。津虧。熱傳厥陰也。而筋脉攣縮。五六日問至危困。

恐邪毒又遺於脾土。即用大承氣湯下之。下後熱退脉靜。舌舒者生。不

然難治。

正義云。舌紫且腫厚者。此酒毒而又飲冷。壅壓其熱也。外證煩躁四逆。先進以理中丸。微其在上之寒。次以承氣湯下之。微有

脈者可治。

〔辨正〕

紫短舌。色紫短而團圓。乃食滯中宮。又熱傳厥陰也。急以大承氣

湯下之。舌鑑尚是。又云。下後熱退脉靜。舌柔和者生。否則死。是不知舍

脉憑舌之治法也。余意必當下淨其積涼透其熱。以十全苦寒救補湯

分兩劑。循環急投。若偶爾嘗試。遲疑誤人。

孕婦紫青舌

第一百三十八

無圖

〔圖說〕

全舌紫色帶青。不雜他色。

〔舌鑑〕

孕婦傷寒面赤舌紫。乃感寒頭痛。身熱腰脊強惡寒。脉浮而緊。此

寒邪在表。當發太陽經之汗。即安。若誤用葱酒發汗。一二次致令酒毒

逼內傳經。則煩燥懊懷。宜梔子豉湯。不然則發斑矣。若不發熱。但惡寒

乃酒毒內傳。寒邪直中陰證。兼夾冷食者。舌必淡紫帶青。恐胎損腹中。

枳實理中湯加味治之。如面赤舌青。母雖無妨。子殞腹內宜卽下死胎。用平胃散加芒硝下之。或用元明粉三錢研末童便送下。或天花粉三錢為末。長流水調送下。胎卽出也。或用黑龍丹研灌。皆能下死胎於俄頃也。

〔辨正〕孕婦紫舌。傷寒無此舌。其或有者。乃熱體誤投溫補。胞胎受熱上衝所致。宜用三黃解毒湯。誤藥則母子俱危。紫青為熱。若青紫則為寒。辨之宜慎。舌鑑謂傷寒夾食非也。

第二十八章 徽醬色舌類診斷鑑別法

徽醬舌總論七

〔舌鑑〕徽醬色苔者。為黃赤兼黑之色。如物經久雨。青黑而曰徽色是也。乃夾食傷寒而復夾濕熱。胃氣不化薰蒸於舌。故見此象也。傷之輕者苔色薄。雖腹中疼痛不止。下利惡寒者。可用桂枝湯加枳樸橘半。痛甚便閉不通者。加姜汁煮大黃。因冷食不消。加乾薑厚樸草蔻。甚則調胃承氣湯。加炮薑下之。其苔色厚而腹痛甚。服藥不應者。必危。要知徽醬

色。乃老黃兼黑色。釀成食填太陰。鬱遏不得發越。久愈而成醬色也。確是土邪。剋水。水精不獲上榮。故口齒燥唇乾焦下利。大渴不能多飲。如胃氣絕。脉結代者死。雖應下奪。鮮有克愈者。○正義云。舌生厚苔而如黴色者。此夾食傷寒也。色淡者生。色濃者死。下之得通者生。不得通者死。周澂之曰。此卽沉香色也。總是血瘀氣濁所致。濕熱夾痰亦常有之。不僅夾食也。黴音梅。

〔辨正〕黴醬色者。有黃赤兼黑之狀。乃藏府本熱而夾有宿食也。凡內熱久鬱者。夾食中暑者。夾食傷寒傳太陰者。皆有之。凡見此舌。不論何症。何脉。皆屬裏證。實熱症。無表證虛寒證。舌鑑謂苔薄用桂枝湯加枳橘半夏苔色厚為土邪剋水。鮮有得愈者。皆謬說也。

黴醬色舌證治圖說計三舌

純黴醬色舌 第一百三十九

〔圖說〕

全舌黃赤兼黑之色。如沉香色。

〔舌鑑〕

舌見黴醬色。乃飲食填塞於胃。復為寒邪鬱遏。內熱不得外泄。濕

氣薰蒸。食而變。成此色也。其脉必沉緊。瀆數。其人必煩躁。腹痛。五七日下之不通者。必死。太陰少陰氣絕也。

〔辨正〕純微醬色舌。為實熱。蒸胃為宿食。困脾傷寒傳陰中。暑躁煩腹痛。瀉利或閉結。大渴大熱。皆有此舌。不論老少。何病何脉。宜十全苦寒救補湯連服而愈。舌鑑謂下之不通必死。駭人誤人。

中微浮厚舌 第一百四十

〔圖說〕全舌灰黑兼紫。中微厚苔如醬餅。浮於舌中。

〔舌鑑〕乃食結中宮濕滯不化之象。如脉有胃氣不現結代。嘴不尖。齒不燥。不下利者。揩去舌苔。不再長者。可用枳實理中湯加薑汁炒川連。若舌苔揩去復長。仍前者。必難救也。

〔辨正〕中微浮厚苔。乃宿食在中。鬱久內熱。胃傷脾困也。或刮不淨而頃刻復生者。不論何證何脉。宜十全苦寒救補湯分三劑。先大承氣湯吹循環急服。則愈。舌鑑用枳實理中湯加薑炒川連。此治寒實結胸者。與此舌不對。

微黃色舌 第一百四十一

〔圖說〕舌微色中有黃苔者。

〔舌鑑〕此乃濕熱之物鬱滯中宮也。二陳湯加枳實黃連。若苔乾焦黃更

加酒大黃下之。

〔辨正〕微黃色黃苔舌全舌微色中有黃苔實熱鬱結顯然可見宜大承

氣連服。舌鑑謂二陳加枳實黃連恐未必效也。

第二十九章 藍色舌類診斷鑑別法

藍色舌總論八

〔舌鑑〕藍色者肝藏之純色也。因無胃氣而發見於外也。如傷寒日久屢

經汗下失於調理致胃氣傷極精微不能上奉而心火無氣胃失其所

依而肺亦乏其生氣則肝寡於畏反假濁污之氣以上乘膈中而胃皖

之陽和頻失故純藍之色見於舌上也。明是肺肝相併心脾氣絕之候

是以必死。正義云舌見藍色者為肺氣絕。肝大獨盛來侵土位也。如舌色微藍或略見藍紋者脉

不沉瀋。因正氣絕不勻也。脉猶可溫胃強脾調肝益肺十中可救其一。脉微

弦者。氣能至而血阻。為藏氣未絕。可治。用小柴胡湯加肉桂炮姜主之。
若純藍色現。確是肝木獨旺。胃失陽和。雖無劇證。必死無疑。至葡萄瘟。
瘦。其舌色青藍。或兼紫兼醬。乃是病邪致然。非若傷寒之藍舌。必關藏
氣為死候矣。宜併參合之。

〔辨正〕藍者。綠與青碧相合。猶染色之三藍也。舌見藍色。而尚能生苔者。

藏府。雖傷未甚。猶可醫治。若光藍無苔者。不論何脉。皆屬氣血極虧。勢

難延年。舌鑑泥於五行。肺肝相併。心脾氣絕。不分有苔無苔。概云不治。

亦管窺之見耳。馬良伯云。有微藍而不滿舌者。法宜平肝。總風化毒。舌

本藏之色外見。再用薑桂。是抱薪救火也。瘟疫及濕溫。熱鬱不解。亦有

此舌。治宜芳香清泄。濕痰飲症。亦有舌滿滑膩。中見藍色者。為陰邪

化熱之候。法宜清化。周激之曰。余常見痢厥及胃氣久痛者。舌體全

藍。此亦瘀血在胃。肝氣不舒也。故青黑藍絳。皆謂之濁。皆竭血。分須辨

寒熱燥濕。及痰血宿食。燥屎。癰塊而治之。總以鬆動血分為主。

藍色舌證治圖說 計三舌
純藍色舌 第一百四十二
全舌純藍如染布三藍之色。

〔舌鑑〕舌見純藍乃中土氣衰胃陽將絕之候見之則百不一生矣
〔辨正〕純藍色舌凡病舌見藍光無苔者不治若藍色而有苔者心肝脾
脾胃為陽火內攻熱傷氣分以致經不行血也其證有癲狂大熱大渴
哭笑怒罵提胸驚怪不等宜十全苦寒救補湯倍生石膏黃連急服則
愈若孕婦舌見藍色者胎死腹中也宜下之

藍紋舌 第一百四十三

〔圖說〕全舌微藍如散花五分調和之色也上有藍色之紋

〔舌鑑〕舌見藍紋乃胃土氣衰肝氣相乘之候小柴胡湯去黃芩加炮薑
桑葉若寒物積滯中宮急宜附子理中湯或大建中湯

〔辨正〕藍紋舌有藍色之紋也在傷寒為胃氣衰微小柴胡湯去黃芩加

炮薑若因寒食積滯者宜附子理中湯或大建中湯黃耆當歸桂心芍

附子薑棗急救舌鑑之法尚合

葡萄瘟舌 第一百四十四

〔圖說〕全舌微藍中兼青兼紫兼黃兼醬等具有五色雜呈

〔舌鑑〕葡萄瘟、疫、乃瘟病中之一。原雜病氣。屍氣與雜氣蘊釀而成。其舌或青、或紫、或醬、或黃、或藍。猶可按法治之。

〔辨正〕口舌起泡如葡萄。并有青、黃、紫、黑、綠色。罩於舌上。唇腫咽痛。口穢噴人。臂斑或藍、或紫、或起紫泡。甚則心胸亦見灼熱。神昏便閉。溲短。徹夜不寐。脉形細數而瀉。此痰阻上焦。熱伏營分。氣機鬱結。熱毒上湧也。宜急用鮮生地、鮮大青葉、黑元參、人中黃、焦山梔、連翹、紫草、天花粉、金銀花、竹茹、枇杷葉、夏枯草、薔薇根、海蜇、煎湯調神犀丹等味為劑。不次急投。服至舌本轉赤。舌苔轉黃。泡平腫消為止。外以紫雪丹塗口舌紫泡上。并用錫類散吹喉。

附孕婦辨舌通論

妊娠傷寒邪入經絡。舌苔漸生。輕則子煩。重則母傷。枝損果必墜。母傷胎必傾。母子安危當驗於舌。舌青面赤。子死母活。舌赤面青。母死子活。舌面俱赤。子母皆活。舌辨云。舌灰是傷寒裏症。熱入子宮。恐胎不固。宜小柴胡湯加白朮、苧麻根等藥。內解邪熱。外固胎元。若面黑舌藍。主子在胎將

死。因母傷寒後已過經失於調理。致令如此。恐二命皆難保也。

梁特巖云。余家訓望舌分經。察色辨苔。但求於表裏寒熱虛實。詳審明確。即得治法要領。初無男婦老少之殊。亦無妊娠傷寒之異名也。治孕婦勿誤用損胎之藥。然亦不能妄用保胎藥。以助火而擾胎。夫表有感邪必發散之。裏有虛寒必溫補之。倘裏有實熱。留之為害。亦必攻瀉之。內經所謂有故無損也。有故者。有病也。宜用重藥。時適對其病。則病當之。而無害也。黃元明粉等藥。以去大熱而不傷胎也。如孕婦或有黃黑舌厚苔膩芒刺大便閉者。亦可酌用。生大說。因踵為之辯。不敢人云亦云。將錯就錯。舊論謂邪入經絡。輕則母傷。重則子安。色敗則斃。面青舌青者。子死。母活。面舌俱青者。出沫。有母子俱死。亦有面舌皆白而母子俱死者。蓋色不澤也。

梁玉瑜云。以上一百四十四舌。傷寒雜病皆有之。大半為重病不常見者。其輕病常見之舌。分經別色。辨其表裏。及某經寒熱虛實。不必拘定圖說。庶能隨機應變。虛則衛母。實則泄子。急則治標。緩則治本。審病用藥。以平為期。補瀉溫涼。無或軒輊。本書後附古案新案諸條。力言用補藥。保全黑舌。不可枚舉。命意偏重溫補。是但知甘溫為補。而不知當用

苦寒之時。雖瀉亦補也。原本又論燕都王生黑舌。既用甘溫大劑。復用冷水一二斗。妄治而愈。彼亦不知其故。輒歸功於溫補。以余觀之。安知非熱病。而得力於冷水乎。總之黑舌有實熱。有虛寒。區別之法。已詳總論。若不將病源認明在先。而以探試俸中之藥。味表彰於後。斷定某藥可治某舌。鮮不傳誤。

附錄王文選傷寒舌鑑拔云。以手拭舌。滑而軟者。病屬陰。粗而燥者。病屬陽。胸喜熱物者。病屬陰。胸喜冷飲者。病屬陽。病在陰者。宜溫。宜散在陽者。宜解。宜下。數語尚是。然閱者若固執鮮通。必多遺誤。何也。虛寒者。舌固滑而軟。邪初傳裏者。真熱假寒者。亦間有滑軟之舌。實熱者。與邪入陰者。舌固粗而燥。陰虛水涸者。真寒假熱者。亦或有粗燥之舌。其別異處。虛寒證。必全舌色淡白。滑嫩無點。無罅。無餘苔。邪初傳裏證。全舌白滑。而有浮膩苔。寒滯積中者。舌亦相類。惟問所因。以辨證耳。真熱假寒證。必全舌色白。而有點花。罅裂。積沙。各實苔。不等。乾嘔。重刮不淨。底色却隱紅。多刮欲嘔。或感。人。宜慎辨之。以別真寒假熱證。全舌亦或有黑色。乾焦。罅裂。芒刺。厚苔。惟上為滑。軟。舌之別。真寒假熱證。全舌亦或有黑色。乾焦。罅裂。芒刺。厚苔。惟

用老生薑切平。輕擦即脫淨。舌底必淡白。而不紅。或口呼渴。而不多飲水。者也。若用薑擦之。而苔堅不退。或口極渴。而飲水實熱者。與邪火入陰之證。全舌必有或黃或黑。積滯乾焦。蟬裂芒刺等苔。陰虛水涸者。全舌必絳色。無苔。或有橫直。罅紋。而舌短小不等。以上為粗至若胸喜熱物者。不必定屬虛寒。胸喜冷飲者。不必定屬實熱。真寒假熱者。胸亦喜冷飲。又當別之。舌色舌苔。參之望聞問切。以窮其變。

辨證諸條。輒言用苦寒重劑。不次急投。蓋察舌色苔狀。與病證毫無疑義。確知急病不可緩治。必神速方能奏功。苟逡巡退縮。拘於一劑一日。勢必貽誤。古所謂藥到病除者。謂用藥已到勝病之分量。病方能痊。到者藥力之到也。或數劑而到。或數十百劑方到。非入口即愈也。此中消息。惟閱歷深者知之。若心氣粗浮。察舌不準。審證未確。遽執余說。妄投重劑。又將致禍。所謂辨舌者。小心謹慎。於表裏寒熱虛實六字。鑒別至當。庶幾經權正變。悉合中庸。余恪遵家訓。用自攝養。非欲與世爭長。過承垂詢。不敢人云亦云。聲佈愚忱。遑問知我罪我。

彩圖辨舌指南卷六目錄

第五編 雜論方案

第三十章 辨舌雜論補遺

傷寒辨舌總論一

舌病之原三

舌色辨五

舌苔辨寒熱七

溫熱辨舌心法九

第三十一章 察舌辨證之醫案

(一) 黑苔醫案八則

(二) 紫泡舌醫案二則

(三) 藍色舌醫案二則

(四) 舌腫醫案五則

傷寒辨舌秘法二

舌苔辨四

辨舌法六

舌色辨吉凶八

舌質舌苔辨十

(一) 紅舌醫案二則

(二) 人字紋舌醫案二則

(三) 舌強醫案四則

(四) 舌出醫案四則

(九)舌縮醫案 一則

(十)舌爛醫案 三則

(十一)舌痛醫案 一則

(十二)舌斷醫案 二則

第三十二章 辨舌證治要方

第一節 發表之劑 二十方

香蘇飲

加味香蘇飲

參蘇飲

大羌活湯

冲和靈寶飲

紫葛解肌湯

葛根湯

升麻葛根湯

柴胡桂枝湯

人參敗毒散

藿香正氣散

小續命湯

香薷飲 七方

銀翹散

葱豉湯

桅豉湯

元參升麻湯

化斑湯

人參化斑湯

黃連化斑湯

消斑青黛飲

葱豉白虎湯

第二節

攻裏之劑 二十方

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

白虎承氣湯

增液承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

桃仁抵當湯

養榮承氣湯

小陷胸湯

大陷胸湯

更衣丸

備急丸

新加黃龍湯

半夏瀉心湯

第三節

小柴胡湯

三消飲

小甘露飲

梁氏三仙湯

第四節

二陳湯

六一散

黃芩湯

茵陳蒿湯

第五節

十棗湯

針苦寒救補湯

濟州煎

和解之劑

方十六

柴胡湯

防風通聖散

甘露消毒丹

四逆散

化利之劑

方十三

三仁湯

平胃散加芒硝湯

黃連湯

附子湯

清涼之劑

方十九

已椒蘆黃丸

三黃瀉心湯

陶氏黃龍湯

大黃黃連瀉心湯

大柴胡湯

增損雙解散

清瘟敗毒飲

柴胡桂薑湯

達原飲

甘露飲

升陽散火湯

甘桔湯

四苓散

五苓散

導赤散

芩連治痢湯

黃耆防風湯

三黃湯又名湯

涼膈散

三黃白虎湯

犀角地黄湯方二

西黃至寶丹

第六節

理中湯

吳茱萸湯

冷香飲子

第七節

全十甘溫救補湯

十全大補湯

參胡三白湯

六味地黃湯

黃連解毒湯

白虎湯

三黃石膏湯

犀角導赤散

局方紫雪丹

溫散之劑方十

枳實理中湯

大建中湯

全十辛溫救補湯

補益之劑方十七

參附養榮湯

歸脾湯

補中益氣湯

人參八味丸

平陽清裏湯

白虎加人參湯

清營湯

清涼至寶飲

葉氏神犀丹

四逆湯

烏梅丸

全十甘寒救補湯

竹葉白虎湯

黃連犀角湯

王定牛黃清心丸

回陽救急湯

大順散

薑貝養榮湯

人參三白湯

人參固本湯

增液湯

生脉散

清暑益氣湯

復脉湯

清燥養榮湯

局方黑錫丹

第八節

雜治之劑

九方

黑龍丹

黑神散

導痰開關散

錫類散

玉丹

碧丹


金丹

珠黃散

牛黃散

共計一百二十八方。凡專治之方。如前已錄證治下。茲不重錄。

圖辨舌指南卷六目錄終



彩圖辨舌指南卷六

鄞縣曹赤電炳章撰述

紹興 周炳堦越銘參校

第五編 雜論方案

第三十章 辨舌雜論補遺

本章專採諸家辨舌精論。能闡幽發微。故辨論不嫌其詳。以期推源尋流。互相參考。庶幾察舌用藥。能決死生於俄頃也。間有已見前卷各條者。未免偶有重複。惟前則東鱗西爪。未窺全斑。此皆摘錄全編。可無遺憾焉。

編述者誌

傷寒辨舌總論一

舌乃心之苗。心為君主之官。應南方赤色。甚者或燥或澀。或青或白。或黑是數者。熱氣淺深之謂。舌白者。肺金之色也。由寒水甚而致。火不能平。金則肺自甚。故色白也。舌青者。肝木之色也。由火甚而金不能平。木則肝自甚。故色青也。色青為寒者。訛也。仲景云。少陰病下利清穀。色青者。熱在

裏也。大承氣湯下之。舌黃者。由火盛則木必衰。所以一水不能制五火。而脾土自旺。故色黃也。舌紅為熱。心火之色也。或赤者。熱深甚也。舌黑亦言為熱者。由火熱過極。則兼水化。故色黑也。五色應五臟。固如此。教氏以舌白者。邪在表。未傳於裏也。舌白苔滑者。痛引陰。經名藏結也。舌之赤者。邪將入也。舌之紫者。邪毒之氣盛也。舌之紅點者。火亢極也。舌之燥裂者。熱深甚也。或有黑圈黑點者。水之萌發也。舌根黑者。水之將至也。舌心黑者。水之已至也。全舌黑者。水之體也。其死無疑。舌黃者。土之正色也。邪初入於胃。則本色微黃。發見舌黃白者。熱而大腸寒也。舌之通黃者。則胃實而大燥也。調胃承氣湯下之。黃自去矣。舌灰黑者。厥陰肝木相承。速用大承氣湯下之。可保五死一生。

舌乃心苗。心開竅於舌。心屬火。主熱象。離明人得病。初在表。則舌自紅。而無白苔等色。表邪入半表半裏之間。則舌色變為白苔。而滑見矣。切不可不明表症。故邪傳於裏。則舌必見黃苔。乃邪已入於胃。急宜下之。苔黃自去。而疾安矣。至此醫者。或誤用湯丸。失於遲下。其苔必黑。變症蜂起。遂為

難治。若見舌苔如漆黑之光者，十無一生。此心火自焚，與邪熱二火相攻。熱極則有兼化水象，故色從黑而應水化也。若乃藏府皆受邪毒，日深其證，必作熱症，急宜下之以去胸中之熱。否則其熱散入絡臟之中，鮮有不死者。譬如火之自炎，初則紅，過則薪為黑色炭矣。此亢則害，誠乃制之理是也。

右見救氏傷寒金鏡錄

傷寒辨舌秘法二

凡見舌係白苔邪火未甚也。用小柴胡湯解之。舌係黃色者，心熱也。可用黃連、梔子以涼之。凡見黃而帶灰色者，係胃熱也。可用石膏、知母以涼之。凡見黃而帶紅者，乃小腸膀胱熱也。可用梔子以清之。見舌紅而白者，肺熱也。用黃芩、蘇葉以解之。見舌黑而帶紅者，乃腎虛而挾邪也。用生地、元參、又入柴胡以和解之。見舌紅而有黑星者，乃胃熱極也。宜用石膏以辛涼之。元參、乾葛亦可。終不若石膏之妙。見舌紅而有白點者，乃心中有邪也。宜用柴胡、黃連以解之。心肝同治也。見紅舌而有紅點者，乃胃熱而帶濕也。須茵陳、五苓散以利之。蓋水濕必歸膀胱，以散邪。非肉桂不能引

入膀胱。但止可用一二分。不可多入。見舌白苔而帶黑點者。亦胃熱也。宜用石膏以涼之。見舌黃而有黑者。乃肝經實熱也。用柴胡梔子以解之。不使入裏。柴胡乃半表半裏之藥。不可不用也。見舌中白而外黃者。乃邪入大腸也。必須五苓散以分水。水分則瀉止矣。見舌中黃而外白者。乃邪在內。而非在外。邪在上而非下。止可加柴胡枳殼以和解。不可驟用大黃以輕下也。天水散加五苓散亦可。終不若柴胡枳殼直中病源。少加天水則更妥。或不用天水散。加五苓散亦可也。見根黃而光白者。亦胃熱而帶濕也。亦須用石膏為君。而少加利水之品。如猪苓澤瀉之味也。見舌黃而隔一辦一辦者。乃邪濕已入大腸。急用大黃茵陳下之。不必用抵當十棗湯也。若下之遲。則不得而用之。然須辨水與血之分。下水用十棗湯。下血用抵當湯。見舌有紅中如蟲蝕者。乃水未升而火上乘也。亦須用柴胡黃連以和解之。見舌紅而開裂如人字者。乃邪初入心。宜用黃連石膏以解之。見舌有根黑而尖帶紅者。乃腎中有邪。未散宜用柴胡梔子以解之。見舌根黑而尖白者。乃胃火乘腎。宜用石膏知母元參以解之。不必論其渴。

與不渴亦不必問其下利也。舌根黑而尖黃者亦邪將入腎。須急用大黃下之。然須辨其腹痛與否。若腹痛拒按者急下之。否則只用柴胡梔子以和解之。見舌純紅而尖獨黑者乃腎虛而邪火來乘也。不可用石膏湯。腎既虛而又用石膏是速之死也。當用元參一或二以救之。多有能生者。見舌有中心紅暈而四圍邊傍純黑者乃君相二火炎騰。急用大黃加生地兩許下而救之。十中可救五六。見舌有中央灰黑而四邊微紅者乃邪結於大腸也。下之則愈。不應則死。以腎水枯槁不能推送故潤之。此時又不可竟用熟地補腎之藥。蓋邪未散不可補。補則愈加脹急。適所以害之也。必邪下而後以生地滋之則可。然亦不可多用也。見舌有純灰色中間有兩暈黑者亦邪將入腎也。急用元參兩許少加柴胡治之。見舌有外紅而內黑者此火極似水也。急用柴胡梔子大黃枳實以和利之。若舌又見刺則火亢熱之極矣。尤須多加前藥。總之內黑而外白內黑而外黃皆前證也。與上同治。十中可得半生也。惟舌中淡黑而外或淡紅外或淡白內或淡黃者較前稍輕。俱可以前法治之。十中可愈八人。見舌有純紅而露黑

紋數條者。此大極似水也。一帶純黑。俱不可治。傷寒能知舌之驗法。便有把握。度不至臨證差誤耳。

黑色。陰寒而直中。腎經。舌黑。眼閉。下身盡黑。上身仍青。大便出。小便遺。

此更危急之證。余用救心湯。人參五兩。附子一枚。白朮八兩。肉桂一兩。用者少。則力不能勝任。以駕毒。若附桂之熱藥也。故必多。而後可。望其通達。上下。以盡祛週身之寒毒。若得大便止。而小便不遺。便有生機。再

藥。進一劑。則目開而舌黑亦退。而身黑身青俱盡解也。若服十中可救一二耳。

生刺。人有火盛之極。舌生芒刺。唇口開裂。大渴呼飲。雖非傷寒之證。所得

而患此病。即不身熱。亦去死不遠也。白虎湯亦可救。但過於太涼。恐傷胃

氣。往往有熱退而生變。仍歸於亡。故白虎湯不可輕投也。宜清涼散。先

二兩。麥冬一兩。甘菊五錢。白芥子生。地。車前子。各三錢。水煎服。

此方妙在元參。為君。以解上焦之燭。麥冬為臣。以解肺中之熱。甘菊青

萬。為佐。以消胃中之火。尤妙在車前子。白芥子。生。地。為使。或化痰。或涼

血。盡從膀胱以下。瀉其大熱之氣。是上下之間。無非清涼。而大熱自散。

燥裂。亡血之後。舌燥裂。不能飲食者死。蓋亡血自然無血。以生精。精涸

則津亦涸。必然之勢也。欲使口舌之乾者。重潤。必須使精血之竭者。重生。補精之方。六味丸最妙。然而六味丸單補腎中之精。而不能上補口舌之津也。雖補腎於下。亦能通津於上。然總覺緩不濟急。余今定一方。名上下相資湯。熟地。麥冬。各一兩。山萸肉。北沙參。當歸。懷牛膝。生玉竹。各五錢。人參。元參。各三錢。北五味子。二錢。車前子。一錢。水煎服。此方補腎為君。而兼以補肺之藥。子母相資。上下兼潤。精生而液亦生。血生而津亦生矣。安在危亡之證。不可慮再生耶。

乾腫。燥證。舌乾腫大。溺血。便血。不止。亦是死證。蓋感暑熱之毒。至秋而燥極。肺金清肅之令。不行。大小便熱極而齊。出血也。論理見血宜治血矣。然而治血。血偏不止。及至燥添。而不可救。吾不治血。而專治燥。方用兼潤丸。熟地。當歸。白芍。各一兩。元參。麥冬。北沙參。各二兩。生地。車前子。各五錢。地榆。三錢。水煎服。一劑減半。二劑血止。便有生機。此方純是補血妙品。惟用地榆以清火。車前子以利水。火清水利。不治血而血自治也。

右錄陳遠公石室秘錄

舌病之原三

心開竅於舌。舌者心之官也。心屬火。而火性升。其下降者。胃土右轉。金斂而水藏也。胃逆而肺金失斂。則火遂其炎上之性。而病見於舌。疼痛熱腫。

於是作矣。火之為性降則通暢升則壅鬱。鬱則苔生。舌苔者心液之凝結也。鬱於胃則苔黃。鬱於肺則苔白。火盛而金燥則舌苔內澀。火衰而金寒則舌苔白滑。火衰而土濕則舌苔黃滑。火盛而土燥則舌苔黃澀。五行之理旺則侮其所不勝衰則見侮於所勝。水者火之敵水勝而火負則苔黑而滑。水負而火勝則苔黑而澀。凡光滑滋潤者皆火衰而寒凝。凡芒刺焦裂者皆火盛而燥結也。心主言而言語之機關則在於舌。舌之屈伸上下者筋脉之柔和也。筋司於肝。肝氣鬱則筋脉短縮而舌卷不能言。靈樞經脉篇云足厥陰氣絕則筋急。筋者聚於陰器而脉絡於舌本。脉弗榮則筋急。筋急則引舌與卵。故唇青舌卷囊縮足太陰氣絕則脉不榮其唇舌脉不榮則舌萎人中滿。素問熱論少陰脉貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌乾而渴。足三陰之脉皆絡於舌。凡舌病之疼痛熱腫則責心火之升炎。若其滑澀燥濕攣縮弛長諸變當於各經求之也。

右錄黃坤載四聖心源

舌苔辨四

舌者心之官法應南方火本紅而澤傷寒邪氣在表者舌無苔及邪氣傳

裏津液相搏則舌生苔矣。明舌上苔滑者以丹。田有熱胸中有寒邪氣相傳入裏也。景仲寒變為熱者則舌上之苔不滑而澀是熱耗精液而滑者已乾也。若熱聚於胃則舌黃。金匱云舌黃者下之黃自去。若舌上黑色者又為熱之極也。靈樞曰熱病口乾舌黑則死。心開竅於舌黑為腎水之色。水火相刑故知必死。理明腎虛有火是為無根虛火舌色淡黑二三點用補腎降火之藥。凡舌黑俱係危症堆冷而滑如淡墨然者乃無根之火也。右錄

寶鑑

舌色辨五

舌為心之官本紅而澤。凡傷寒三四日以後舌上有苔必自潤而燥自滑而澀。由白而黃由黃而黑甚至焦乾或生芒刺皆邪氣內縛由淺入深之證也。故凡邪氣在表舌則無苔及其傳裏則津液乾燥而舌苔生矣。若邪猶未深其在半表半裏之間或邪氣客於胸中者其苔不黑不澀止宜小柴胡之屬以和之。若陽邪傳裏胃中有熱則舌苔不滑而澀宜梔子豉湯之屬以清之。若煩躁欲飲數升者白虎湯加人參之類主之。大都舌上黃

苔而焦澀者。胃府有邪熱也。或清之。或微下之。金匱曰。舌黃未下者。下之。黃自去。然必大便燥實。脉沉有力。而大渴者。方可下之。若微渴而脉不實。便不堅。苔不乾燥。芒刺者。不可下也。其有舌上黑苔而生芒刺者。則熱更深矣。宜涼膈承氣湯。大柴胡湯之屬。酌宜下之。若苔色雖黑滑而不澀者。便非實邪。亦非火證。非惟不可下。且不可清也。○按傷寒諸書。皆云心為君主之官。開竅於舌。心主火。腎主水。黑為水色。而見於心部。是為鬼邪。相刑。故知必死。此雖據理之談。然實有未必然者。夫五刑相制。難免無尅。此其所以為病。豈因尅為病。便為必死。第當察其根本何如也。如黑色連地而灰黯無神。此其本原已敗。死無疑矣。若舌心焦黑而質地紅活。未必皆為死證。陽實者。清其胃火。火退自愈。何慮之有。其有元氣大損而陰邪獨見者。其色亦黃黑。真水涸竭者。其舌亦乾焦。此腎中水火俱虧。原非實熱之證。欲辨此者。但察其形氣脉色。自有虛實。可辨而從補。從清。反如水炭矣。故凡以焦黑乾燥者。尚有非實非火之證。再若青黑少神而潤滑不燥者。則無非水乘火位虛寒證也。若認此為火而苦寒一投。則餘燼隨滅矣。

故凡見此者。但當詳求脉證。以虛實為主。不可因其焦黑而熱。言清火也。傷寒固爾。諸證亦然。右錄張景岳全書

辨舌法六

舌。尖。屬。心。舌。根。屬。腎。中。間。屬。脾。胃。兩。邊。屬。肝。胆。赤。為。熱。深。黃。為。濕。熱。食。滯。厚。白。為。濕。寒。水。飲。灰。白。為。極。虛。極。寒。紫。黑。為。熱。極。或。脾。胃。有。瘀。血。伏。痰。芒。刺。燥。裂。亦。為。熱。極。紅。紫。如。猪。肝。為。火。灼。胃。爛。死。證。也。錄醫鏡

舌。者。心。之。竅。凡。病。俱。現。於。舌。能。辨。其。色。證。自。顯。然。舌。尖。主。心。舌。中。主。脾。胃。舌。邊。主。肝。胆。舌。根。主。腎。假。如。津。液。如。常。口。不。燥。渴。雖。或。發。熱。尚。屬。表。症。若。舌。苔。粗。白。漸。厚。而。膩。是。寒。邪。入。胃。挾。濁。飲。而。欲。化。火。也。此。時。已。不。辨。滋。味。矣。宜。用。半。夏。藿。香。迨。厚。膩。而。轉。黃。色。邪。已。化。火。也。用。半。夏。黃。芩。若。熱。甚。失。治。則。變。黑。色。胃。火。甚。也。用。石。膏。半。夏。或。黑。而。燥。裂。則。無。半。夏。而。純。用。石。膏。知。母。麥。冬。花。粉。之。屬。以。潤。之。至。厚。苔。漸。退。而。舌。底。紅。色。者。火。灼。水。虧。也。用。鮮。生。地。麥。冬。石。斛。以。養。之。此。表。邪。之。傳。裏。者。也。其。有。脾。胃。虛。寒。者。則。舌。白。無。苔。而。潤。甚。者。連。唇。口。面。色。俱。痿。白。此。或。泄。瀉。或。受。濕。脾。無。火。力。速。宜。黨。

參焦朮。木香。茯苓。炙甘草。乾薑。大棗。以振之。虛甚欲脫者。加附子。肉桂。若脾熱者。舌中苔黃而薄。宜黃芩。心熱者。舌尖必赤。甚則起芒刺。宜連心麥冬。竹葉捲心。肝熱者。舌邊赤。或生芒刺。宜柴胡。黑山梔。其舌中苔厚而黃者。胃微熱也。用石斛。知母。花粉。麥冬之類。若舌中苔厚而黑燥者。胃大熱也。必用石膏。知母。如連牙床唇口俱黑。則胃將蒸爛矣。非石膏三四兩生大黃一兩。加金汁水。鮮生地汁。天冬。麥冬汁。銀花露。大劑投之。不能救也。此唯時疫發斑。及傷寒症中多有之。余嘗治一獨子。先後用石膏至十四斤餘。而斑始透。病始退。此其中全恃識力。再有舌黑而潤澤者。此係腎虛宜六味地黃湯。若滿舌紅紫色而無苔者。此名絳舌。亦屬腎氣虛。宜生熟地。天麥冬等。更有病後絳色。舌如錢發亮而光。或舌底咽乾而不飲。涼此腎氣虧極。宜大劑六味地黃湯投之。以救其津液。方不枯涸。右錄筆花苔因內熱致脾氣閉滯不行。飲食津液停積於內。故苔見於外。若脾氣不滯。則飲食運化。津液流通。雖熱甚。不必有苔也。古每於寒濕內盛者。往往黃而漸生白苔。始愈矣。舌青或青紫而冷滑者。為寒證。青紫而焦燥或脹大或卷。

縮者為熱證。寒甚亦必卷縮。筋脉得寒而收引也。然必不焦燥。凡舌強硬短縮及神昏妄語者不治。亦有痰病而舌本硬縮及神昏不語者。當以形證色脉參之。熱病舌本爛熱不止者死。傷寒陰陽易舌出數寸者死。乃按此

勞復非陰陽易也。右錄郭元峰脉如。

舌苔辨寒熱七

傷寒表裏輕重驗舌色辨苔垢亦得大半。今余分立白苔、黑苔、黃苔、燥苔、滑苔五者以為要。若舌色如常身雖大熱是表熱而裏未有熱也。但治其表如見白苔而滑邪在半表半裏未入於裏也。但宜和解。若見黃苔者熱在胃家。苔黃而乾裂者熱已入裏宜清裏熱。若有下症者可以下之。若見黑苔者有二條分別。黑而焦裂硬刺者裏熱已極火極似炭之苔也。黑而有水軟潤而滑者裏寒已甚水來尅火之寒苔也。以上五者驗舌之大節目也。然仍要看症切脉以參定之。

如舌上黑苔燥裂有刺此裏熱無疑矣。然或身痛或足冷或無汗或脉浮或脉伏仍從表症治之雖不可用辛溫之藥必宜辛涼散表然後清裏。若

過用清熱則表汗不出表邪不解

如舌上生苔口渴不能消水脉浮大不數用清熱之藥及加譫語神昏此

症多見不治以舌苔主裏熱渴宜消水脉宜沉數脉症相反故耳然余以

渴不消水脉滑不數擬以食滯用消導治之亦有生者自此而知表邪夾

食之症亦有舌苔生刺者也大凡察病人之舌沿邊缺陷如鋸齒狀者此

不治之症也以上錄秦皇士傷寒大白

然有苔黑屬寒者必舌無芒刺口有津液也即小便之赤白口中之潤燥

舌苔之滑濇亦皆因乎津液之榮枯未足憑以遽斷寒熱也故尤宜以脉

之有力無加細辨之總之醫家治病須隨機應變活潑潑地不可膠執一

方不可泥滯一藥不必以藥治病惟以藥治脉可也古今氣運不同舊方

新病何能符合只可讀其書廣其義考其方得其理潛心默究自得其神

即羅氏譬之拆舊料而改新屋務必工穩耳右錄顧錄江

舌色辨吉凶

在表則無苔按白苔亦屬表症在半表半裏苔白而滑在裏則黃苔熱甚則黑苔

芒刺不熱不渴黑苔有津為寒舌乃心苗紅為本色故吉黑為水色故凶
凡舌硬舌腫舌捲舌短舌強者十不救一二舌縮神昏脉脫者死不治夏
月黑苔可治冬月黑苔難醫黑苔刮不去易生刺裂者死○凡見舌苔以
井水浸青布擦淨舌苔以薄荷細末蜜調敷之吐舌者摻冰片末即收錄右

李士材傷寒括要

溫熱辨舌心法九

心開竅於舌脾之大絡係於舌本肝腎脉亦通舌本凡木舌重舌舌衄屬
心經燥熱舌菌舌墊舌腫大塞口屬脾經濕熱挾心火上壅舌本強硬為
熱兼痰若舌捲短痿軟枯小則肝腎陰涸而舌因無神氣矣溫病初起舌
苔白而少津者宜杏仁桔梗牛蒡之類辛潤以解搏束桑葉薑皮之類輕
清以解燥熱佐梔皮連翹之微苦微燥舌苔白而底絳濕遏熱伏也須防
變乾宜辛淡輕清泄濕透熱如三仁湯以蔻皮易蔻仁稍佐滑石淡竹葉
蘆根之類以清化之初病舌苔白燥而薄或黃燥而薄為胃腎陰虧其神
不昏者宜鮮生地元參麥冬等味以救陰分兩不宜過重銀花知母蘆根

竹葉等味以化邪。尤須加辛潤以透達。若神即昏者。加以開閉。如普濟丹。
清上丸。此二方無破開閉可用紫雪。遲則內閉外脫。不治。舌苔燥如白砂。
者。此溫邪過重。宜速下之。佐以甘涼救液。白燥而厚者。調胃承氣湯下之。
佐以清潤養陰。如鮮生地、元參、梨汁、蘆根之類。若白膩不燥。自覺悶極。口
甜。吐濁涎沫。宜加減正氣散。加佩蘭、神麴。若舌脹大不能出口。屬脾濕胃
熱鬱極。前法加大黃汁利之。舌白不燥。或黃白相兼。或灰白不渴。此濕熱
鬱而未達。或素多痰飲。雖中脘痞痛。亦不可攻。宜用開化。如杏、蔻、枳、桔、陳
皮、茯苓、通草之類。舌苔白膩。胸膈悶痛。心煩乾嘔。欲飲水。水入則吐。此熱
因飲鬱而生。宜辛涼化飲。如白芥子、細辛、通草、茯苓、豬苓、澤瀉、米仁、滑石。
竹葉、蘆根。如飲熱並重。舌苔黃膩。宜辛苦通降。佐以淡滲。如小陷胸湯。半
夏瀉心湯。去參、甘、大棗。以薑汁炒黃連、代乾薑。加通草、茯苓、薑皮、薤白等
味。黃芩、滑石湯。黃連、溫胆湯。均可選用。邪傳心胞。神昏譫煩。如舌苔黃膩。
仍屬氣分。濕熱內蒙。包絡宜半夏瀉心湯。小陷胸等湯。或用杏仁、白芥子。
薑汁炒川連、鹽水炒木通、連翹、滑石、淡竹葉、蘆根、薑皮之類。辛潤以通之。

鹹苦以降之。清。淡。以。泄。之。涼。膈。散。亦。可。間。用。甯。上。九。普。濟。丹。亦。效。若。舌。赤。無。苔。此。證。與。前。證。同。一。神。昏。而。虛。實。相。反。前。係。濕。熱。明。徵。此。係。傷。陰。確。據。神。昏。為。內。閉。之。象。閉。則。宜。開。心。宮。乃。虛。靈。之。所。虛。則。忌。實。宜。犀。角。鮮。生。地。連。翹。銀。花。鬱。金。鮮。石。菖。蒲。鮮。蘆。根。梨。汁。竹。瀝。少。和。薑。汁。緩。煎。熱。服。再。用。甯。上。九。普。濟。丹。開。閉。養。陰。地。黃。用。鮮。者。取。其。滑。利。少。和。薑。汁。涼。藥。熱。飲。取。其。流。連。此。即。陰。陽。開。闔。之。理。蘆。根。尤。宜。多。用。輕。清。甘。涼。兩。飲。金。水。又。能。泄。熱。化。濕。從。膀。胱。而。解。如。此。治。法。斷。無。不。效。之。理。最。忌。一。派。苦。寒。永。伏。陰。柔。濁。膩。今。時。習。俗。尤。誤。於。溫。病。傷。陰。之。說。不。知。氣。分。熱。鬱。燥。津。之。理。每。見。舌。絳。便。用。大。劑。陰。柔。是。濁。熱。已。過。上。焦。氣。分。又。用。濁。藥。兩。濁。相。合。逼。令。邪。氣。深。入。膏。肓。深。入。骨。髓。遂。成。固。結。不。解。之。勢。又。或。舌。苔。黃。膩。明。係。氣。分。濕。熱。薰。蒸。法。宜。辛。苦。開。化。乃。不。用。開。化。而。用。大。劑。涼。藥。亦。足。逼。令。邪。氣。深。伏。邪。伏。則。胃。氣。不。得。上。升。舌。苔。因。之。亦。伏。轉。成。舌。絳。無。苔。矣。若。舌。色。紫。暗。捫。之。濕。潤。乃。其。入。胸。膈。中。素。有。虛。痰。與。熱。相。搏。宜。鮮。生。地。犀。角。丹。皮。丹。參。赤。芍。鬱。金。花。粉。桃。仁。藕。汁。等。味。涼。血。化。痰。舌。紫。腫。大。或。生。大。紅。點。者。乃。熱。毒。乘。心。

用導赤犀角加黃連金汁治之或稍加大黃汁利之舌絳欲伸而抵齒難伸者此痰阻舌竅肝風內動宜於清化劑中加竹瀝薑汁膽星川貝等味以化熱痰切勿滋膩遏伏火邪其有因寒涼陰柔遏伏者往往愈清愈燥愈滋愈乾又宜甘平甘潤佐以辛潤透邪其津乃回若舌與滿口生白衣為霉苔或生糜點謂之口糜因其人胃腎陰虛中無砥柱濕熱用事混合薰蒸證屬難治酌用導赤犀角地黃之類服之舌心絳乾乃胃熱上燦心營宜清心胃舌尖絳乾乃心火上炎宜導赤以瀉其府舌絳而光亮絳而不鮮甚至乾晦痿枯者或淡而無色如猪腰樣者此胃肝腎陰枯極而舌無神氣者也急宜加減炙甘草湯加沙參玉竹鷄子黃生龜板等類甘平濡潤以救之黑為腎色苔黑燥而厚此胃腸邪結傷及腎陰宜大承氣湯鹹苦下之黑燥而不甚厚調胃承氣湯微利之或增液承氣湯潤下之若舌淡黑而津不滿者此腎虛無根之火上炎用復脈生脈輩救之舌苔黃厚脉息沉數中脘按之微痛大便不解或雖解無多或雖多而仍覺不爽宜於辛苦劑中兼用酒製大黃為丸緩化而行往往服一二次大解一次

再服再解。如此五七次。而邪始盡也。若舌如沉香色。或黃黑而燥。脉沉實而小。甚者。沉微似伏。四肢發厥。或渴喜熱飲。此皆裏氣不通之象。酌用三承氣湯下之。陰傷者。加鮮生地。元參。知母。蘆根之類足矣。蓋速下其邪。即所以存津液也。必得苔退。脉靜。身涼。舌之兩傍生出白薄苔。方為邪盡。一切外邪。伏邪。均係如此。

按此篇診舌之法。頗為精細。錄於石芾南醫原中。至於舌苔白燥。黃燥。黑燥。始用承氣湯下之。亦未盡善。余曾治溫病數人。往往數日不大便。燥糞已結。而舌苔始終滑潤。無舌苔可據者。要之余所遇者。其變石氏所論者其常也。知常知變。而後可與言醫。

舌質舌苔辨十

凡察舌。須分舌質。舌苔。舌質雖惡。舌質如常。胃氣濁惡而已。苔從舌裏生出。刮之不能全淨者。氣血尚能交紐。為有根也。

凡舌苔以勻薄有根為吉。白而厚者。濕中有熱也。忽厚忽薄者。在輕病為神氣有權。在困病為腎氣將熄。邊厚中黃。或中道無苔者。陰虛血虛也。中

道一線深陷極窄如隙者胃痿也。舌根高起累累如豆。中路人字紋深廣者。胃有積也。舌上星點赤而鼓起者胃熱也。在兩旁主肝熱。在尖主心熱。淡而陷下者胃虛也。在小兒為有滯。有蟲望似有苔。一刮即淨。全無苔迹者。血虛也。一片厚苔或黃或白如濕粉所塗兩邊不能漸勻漸薄者胃絕也。

舌上津液如常邪尚在表見白苔而滑厚而膩是寒邪入胃矣。黃而厚者已化熱也。黃而燥者熱已盛也。厚苔漸退而底色紅如豬肝者火灼水虧津液將竭也。見黑苔有二如黑而焦裂硬刺者為火極似炭之熱苔如黑而有津軟潤而滑者為水來尅火之寒苔如連牙牀唇口俱黑者則胃將蒸爛矣。在時疫斑疹傷寒熱病多有之更有舌中忽一塊如錢無苔而深紅者此脾胃色絡津液大虧潤燥不周也。亦有瘀血在於胃中無病或病愈而見此苔者宜疏消瘀積不得徒滋津液。按舌面細如魚子者心與命門真火所鼓若色絡有凝痰

平命門有伏冷則舌面忽一塊光
溫熱初發便煩熱發渴舌正赤而多白苔如積粉者雖滑亦當以白虎清

內熱也。又中宮有水。飲者舌多不燥。不可誤認為寒證也。亦有虛熱者。舌心雖黑。或灰黑而無積苔。舌形枯瘦而不甚赤。其證煩渴耳聾。身熱不止。大便五六日。或十餘日不行。腹不硬滿。按之不痛。睡中或呢喃一二句。或帶笑。或歎息。此津枯血燥之虛熱也。宜大料六味湯。若誤與承氣必死矣。

此論濕熱也。

黑苔者血瘀也。灰苔者血瘀而挾痰水也。婦人傷寒時病最易生黑苔。不得遽以為玄。舊法黑苔以芒刺燥裂濕潤細膩分寒熱。余歷診瘀血苔黑。雖內熱而不遽起刺。有煙癰人苔易燥刺而非必內有真熱。不過肺胃津傷耳。凡見灰黑二苔。總宜兼用行血。其證寒熱甚者。必神昏譫語。無寒熱者。必胸肋有一塊結熱。內煩而夜不安眠也。若彊縮言語不利。或身重不能轉側。及一邊不能眠。乃玄。舌枯晦而起刺者。血燥熱結也。雖結黑壳猶有生者。平人胃中風有冷痰瘀血。舌上常見一塊。光平如鏡。又凡有痞積及心胃氣痛者。病時舌苔多見怪異。婦女尤甚。

以上摘錄周微之診家直訣

第三十一章 察舌辨證之醫案

一 黑苔醫案八則

薛立齋云。余昔留都時。地官主事鄭汝東妹壻。患傷寒。舌見全黑。院內醫士魯禧曰。當用附子理中湯。人咸驚駭而止。及其困甚。治棺。魯與其鄰。往復視之。謂用前藥。猶有生意。其家既待以死。拚而從之。數劑而愈。大抵舌黑之證。有火極似水者。即杜學士所謂薪為黑炭之意也。宜涼膈散之類。以瀉其陽。有水來尅火者。即魯醫士所療是也。宜理中湯以消陰翳。又須以老薑切平擦其舌。色稍退者可治。堅不退者不可治。

又弘治辛酉。金臺姜夢輝患傷寒。亦得黑苔。手足厥冷。吐逆不止。衆醫猶作火治。幾致危殆。判院吳仁齋用附子理中湯而愈。夫醫之為道。有是病。必有是藥。附子療寒。其效可數。奈何世皆以為必不可用之藥。甯視人之死而不救。不亦哀哉。凡用藥得宜。效應不爽。不可便謂為百無一生而棄之也。

張景岳云。余在燕都。嘗治一王生。患陰虛傷寒。年出三旬。而舌黑之甚。其芒刺乾裂。焦黑如炭。身熱便結。大渴喜冷。而脉則無力。神則昏沉。羣醫謂

陽證陰脉必死無疑。余察其形氣未脫。遂以甘溫壯水等藥大劑進之。以救其本。仍間用涼水以滋其標。蓋水為天一之精。涼能解熱耳。可助陰。非若苦寒傷氣者之比。故於津液乾燥陰虛便結而熱渴火盛之證。亦所不忌。由是水藥並進。前後凡用人參熟地各一二斤。附子肉桂各數兩。冷水亦一二斗。然後諸證漸退。飲食漸進。神氣俱復矣。但察其舌黑。則分毫不減。余甚疑之。莫得其解。再後數日。忽舌上脫一黑壳。而內則新肉燦然。始知其膚腠焦枯死而復活。使非大為滋補。安望再生。若此一證。特舉其甚者紀之。此外凡舌黑用補而得以保全者。蓋不可枚舉矣。所以凡診傷寒者。當以舌色辨表裏。以舌色辨寒熱。皆不可不知也。若以舌色辨虛實。則不能無誤。蓋實固能黑。以火盛而焦也。虛亦能黑。以水虧而枯也。若以舌黃。舌黑悉認為實。熱則陰虛之證。萬無一生矣。鏡上錄金

龔子才曰。一人舌青黑有刺。乃熱劇也。欲以舌貼土壁上。稍可良。由思慮過度。怒氣所得。為製一方。名清心散。服之即效。方用赤茯神。棗仁。麥冬。胡麻。仁。黃連。各一錢。遠志。五木通。連翹。各八分。甘草。分三。清水煎服。

舌辨云。一婦人症已危篤甚。其舌黑而厚。隔瓣。余掘開其舌底。有紅色。余曰。症雖危。可救。以大承氣湯加減。一劑則知。人二劑而安。

又云。一人有此舌。墨滑數點。用大柴胡湯加減下之。次早則舌滑俱無。而見稍微紅色。次調理而安。

又云。一孕婦傷寒症已愈。次病頭面腫大。痛甚難禁。余用三黃俱酒煮。牛蒡子。薄荷。白芷。防風。石膏。四劑全愈。

梁特巖云。余於辛卯七月。道出清江浦。見船戶數人。同染瘟疫。渾身發臭。不省人事。醫者俱云不治。置之岸上。徐俟其死。余目擊心憫。姑往診視。皆口開。吹氣。舌則黑苔黑瓣底。其親人向余求救。不忍袖手。即教以十全苦寒救補湯。生石膏加重四倍。循環急灌。一日夜連投多劑。病人陸續瀉出。極臭之紅黑糞甚多。次日黑中舌瓣漸退。復連服數劑。三日皆全愈。是時清江疫癘大作。未得治法。輒數日而死。有聞船戶之事者。羣來求治。切其脉。皆怪絕難憑。望其舌。竟皆黑瓣底。均以前法告之。其信者皆一二日即愈。其稍知醫書者。不肯多服苦寒。仍歸無救。余因稍有感胃。留住十日。以

一方救活四十九人。頗得仙方之譽。

王孟英治王氏婦。年七旬有三。風溫傷肺。頭暈目眩。舌縮無津。身痛肢厥。口乾不飲。昏昧鼻鼾。語言難出。寸脉大。症屬痰熱阻竅。先清氣分。邪熱杏仁。象貝。羚羊。花粉。嫩竹筴。桑葉。焦山梔。一服。症減肢和。但舌心黑而尖絳。乃心胃火燔。懼其入營。劫液。用鮮生地。犀角汁。元參。丹皮。麥冬。阿膠。蔗漿。梨汁。三服。色潤神甦。身涼脉靜。但大便未通。不嗜粥飲。乃灼熱傷陰。津液未復。繼與調養胃陰。兼佐醒脾。旬日霍然。

二 紅舌醫案二則

孟英治姚某。年未三旬。煙癮甚大。適伊母病溫而歿。勞瘁悲哀之際。復病溫邪。脇痛筋掣。氣逆痰多。壯熱神昏。莖縮自汗。醫皆束手。所親徐麗生囑其速。孟英視之。脉見芤數。舌絳無津。有陰虛陽越。熱熾液枯之險。况初發即爾。其根蒂之不堅可知。與犀。羚。元參。知母。壯水。熄風。旋蓉。揀實。鼠矢。石。英。潛。陽。鎮。逆。沙。參。麥。冬。石。解。玉。竹。益。元。充。津。花。粉。梔。子。銀。花。絲。瓜。絡。蠲。痰。清。熱。一劑。知。四劑。安。隨。以。大。劑。養。陰。而。愈。

又治姚令輿室素患喘嗽復病春溫醫知其本元久虧投以溫補瘕厥神昏耳聾謔語面赤舌絳痰喘不眠醫皆束手矣延孟英診之脉猶弦滑曰證雖危險生機未絕遽爾輕棄毋乃太忍與犀角羚羊元參沙參知母花粉石膏以清熱熄風救陰生液佐從蓉石英鱉魚甲金鈴旋覆貝母竹瀝以潛陽鎮逆通絡蠲痰三劑而平繼去犀鈴石膏加生地服旬日而愈

三 紫泡舌醫案二則

程杏軒治汪木工夏間寒熱嘔瀉自汗頭痛他醫與疏表和中藥嘔瀉止而發熱不退汗多口渴形倦懶言舌苔微黃而潤脉虛細用清暑益氣湯加減服一劑夜熱更甚譫狂不安次早復診脉更細舌苔色紫肉碎疑有血痕渴嗜飲冷此必熱邪內伏未透當舍脉從證改用白虎湯加鮮生地丹皮山梔黃芩竹葉燈芯服藥後週身汗出譫狂雖定神呆手足冰冷按脉至骨不見闔目不省人事知為熱厥舌形短而厚滿舌俱起紫泡大如葡萄并有青黃黑綠雜色罩於上後用紫雪丹蜜調塗舌上前方再加入犀角黃連元參以清熱金汁人中黃銀花萊菔以解毒另用冬雪水煎藥

厥回脉出。舌泡消。苔退。僅紫乾耳。再劑。熱淨。神清。舌色如常。是役也。程謂能審其陽證。似陰於后。未能察其實證。類虛於前。自咎學力未到。以初用清暑益氣湯之誤也。

王士雄治徐月巖令正年踰四旬。暮春患痰嗽發熱。醫者詢知病當沉後。於荆防發散中。加當歸。薑棗為方。服三劑。血隨痰溢。口舌起泡。如紫葡萄者八枚。下唇右角腫凸如拇指。大色如黑棗。咽痛碍飲。或云瓜瓢瘟。或云葡萄瘟。醫者望而却走。挽余往視。口穢噴人。頰頰如漆。舌紫苔色如靛。臂斑或黑或藍。洩若沸油。渴呢多汗。脉形細濇。數夜無眠。此仍陰分素虧。熱伏營分。氣機鬱結。痰阻上竅。詢其胸背斑已遍身。幸而血溢汗多。毒邪猶有出路。故不昏陷。令取錫類散吹喉。併以童溺藕汁梨汁頻灌。隨用元參丹參紫草花粉銀花焦桅連翹鮮石斛鮮大青竹茹枇杷葉夏枯草薔薇根海蛇煎調神犀丹兩劑。後舌本轉赤。苔色見黃。四劑後血止咽鬆。脉轉弦數。六劑便行。口穢始減。泡平而唇腫亦消。八劑嗽平而苔退。脉柔和。斑回而痕如黑漆。始改輕清善後徑愈。

四 人字紋舌醫案 二則

白苔亦有人字紋。如程杏軒治一農人。患傷寒數日。寒熱交作。自汗如雨。脈虛神倦。舌苔白滑。分開兩岐。宛如刀劃。考已任編有陰證誤服涼藥。舌見人字紋之語。先與六味回陽飲。繼進左右二歸飲。數劑。舌苔漸退而愈。黑苔亦有人字紋。如楊乘六治沈姓。外感症危甚。舌黑而枯。滿舌編裂。人字紋曰。脈不必診也。此腎氣凌心。八味症也。誤用芩連無救矣。踰日果歿。他如傷寒金鏡錄有裂紋如人字形者。因君火燔灼。熱毒炎上而發。用涼膈散治之。以上兩案。一則舌白。一則舌黑。皆用溫藥。尤當辨明脈證。分別治之。

五 藍舌醫案 二則

舌辨云。余治孫仁泉。傷寒後月餘。舌藍如靛。其斑亦藍。如大萍遍身。自服表劑不應。詢其故。曰。斑不赤。故表之。余曰。非表可治。三藏氣已絕矣。因心不能生脾。脾不能生肺。肺不能制肝。肝木猖獗。脾土受剋。則不食。四肢墮。脾痞。口不知味。余謂不治。果旬日而歿。

又云。渾藍舌者。乃病後失於調理。脾胃全無生氣也。必死。曩治一傷寒後。二十餘日。失於調理。恣意飲食。得此舌苔。胸微悶。脉微細。余不下藥。何也。蓋肝色純藍。而胃土無氣也。衆不信。翌日果死。

六 舌強醫案 四則

薛已治一婦人。善怒。舌本強。手臂麻。薛曰。舌本屬脾。被木剋制故耳。用六君子湯加柴胡。白芍治之。

又治鄭秋官過飲。舌本強。腫。語言不清。此脾虛濕熱。用補中益氣湯。加神麴。麥芽。乾葛。澤瀉。而愈。

又學士吳北川。過飲痰壅。舌本強。硬。服降火化痰藥。痰氣益甚。肢體不遂。薛作脾虛濕熱治之。而愈。

又一男子。舌下牽強。手指次指不仁。或大便閉結。或皮膚赤暈。薛曰。大腸之脉散舌下。此大腸血虛風熱。當用逍遙散。加槐角。秦艽治之。

七 舌腫醫案 五則

宋度宗欲賞花。一夜忽舌腫滿口。蔡御醫用蒲黃末等分。乾摻而愈。蓋舌

乃心之外候而手厥陰相火乃心之臣使蒲黃活血涼血得乾薑是陰陽

相濟也。

方隱

薛已曰。一膏梁之人患舌腫。數服皆消腫之藥。舌腫勢急。與刺舌尖。反兩傍出紫血杯許。腫消。二更服犀角地黃湯二劑。翌早復腫。脹。仍刺去紫血杯許。亦消一二。仍服前湯。良久舌大腫。又刺去黑血二杯許。腫漸消。忽寒熱作。嘔頭痛。作暈。脈浮洪。而數。此邪雖去。而元氣愈傷。與補中益氣湯。倍參耆歸朮。四劑而安。又數劑而愈。

張子和曰。南鄰朱老翁。年六十餘歲。身熱數日不已。舌根腫起。和舌尖亦腫。腫至滿口。比原舌大二倍。一外科以燔針刺其舌兩傍下廉泉穴。病勢轉凶。將至顛。戴人曰。血實者宜決之。以銚鍼磨令鋒極尖。輕砭之。日砭八九次。血出約一二盞。如此者三次。漸而血少。痛減。腫消。夫舌者心之外候也。心主血。則血出則愈。又曰。諸痛癢瘡皆屬心。火燔鍼艾火是何義也。一婦人木舌。脹其舌滿口。諸藥不愈。余用銚鍼小而銳者。砭之五七度。腫減。三日方平。計所出血幾至盈斗。

繆氏子。年十六歲。舌上重生小舌。腫不能言。不能食物。醫以刀割之。數以藥。閱時又生。屢治不痊。精力日憊。向余求藥。檢方書。用蛇脫燒灰。研末敷之。立愈。後不復發。

八 舌出醫案 四則

元順帝之長公主駙馬。剛噶勒藏慶王。因墜馬。得一奇疾。兩眼黑睛俱無。而舌出至胸。諸醫罔知所措。廣惠司卿聶濟爾。乃伊囉勒琨人也。嘗識此證。遂剪去之。頃間復生一舌。亦剪之。又於真舌兩邊。各去一指許。却塗以藥而愈。錄報耕錄

凌漢章治一男子。病後舌吐。凌兄亦知醫。謂曰。此病後近女。色太早也。舌者心之苗。腎水竭。不能制心火。病在陰虛。其穴在左股太陽。是當以陰攻陽。凌曰。然如其穴針之。舌吐如故。凌曰。此知瀉而不知補也。補數針。舌漸復如故。史明

何首庸治前鋒賴將軍。舌本腫出不能縮。入何曰。心氣亟熱也。如久則飲食不下而死矣。炙飲器灼之。腫消。再投以湯劑。立愈。雲南通志

古今醫統曰。王貺治一大賈。因失驚。舌伸出。遂不能收。經旬食不下。咽喉
羸已甚。國醫不能療。其家榜於市。曰有能者。酬千金。貺醫名未著。學且未
精。因檢鍼經。有鍼法治此疾。遂往治之。用鍼舌之底。抽針出。舌遂伸縮於
平時。

九 舌縮醫案一則

馮楚瞻治一人。無故舌縮不能言。用白芥子研末。醋調敷頸項下。即能言。
服清脾降火等湯。再用紫雪冰片散吹之而安。

十 舌爛醫案三則

先兄口舌糜爛。痰涎上壅。飲食如常。遇大風欲仆地。用補中益氣湯。及八
味丸即愈。間藥數日。仍作。每勞苦則痰盛。目赤。漱以冷水。舌稍愈。頃間舌
益甚。用附子片噙之。即愈。服前二藥。諸症方痊。薛氏醫案
工部徐檢齋。口舌生瘡。喜冷飲食。或咽喉作痛。大便秘結。此實熱也。上同
王孟英治段春木之室。爛喉。內外科治之束手。姚雪蕉孝廉薦孟英視之。
骨瘦如柴。肌熱如烙。韌痰阻於咽喉。不能咯吐。須以紙帛攪而曳之。患處

紅腫白腐。顰舌皆糜爛。米飲不沾。月事非期而至。按其脉左細數右弦滑。曰此陰虧之體。伏火之病。失於涼降。擾及於營。先以犀角地黄湯清營分。而調妄行之血。續與白虎湯加西洋參等。肅氣道而瀉燎原之火。外用錫類散掃痰腐而消惡毒。繼投甘潤藥。蠲餘熱而充津液。日以向安。月餘而起。

十一 舌痛醫案一則

仲侍御多思慮。舌作痛。用苦寒降火藥。發熱便血盜汗。口乾肢體日瘦。此脾氣虧損。血虛生熱。用加味歸脾湯而愈。薛己治驗

十二 舌斷醫案二則

有人自行被擗。穿斷舌心。血出不止。米醋用鷄翎刷所斷處。其血即止。仍用真蒲黃杏仁去皮。研砂少許。研為細末。煉蜜調藥。稀稠得所。嚙化而安。方得效

錢國賓治板橋李氏僕劉二。與租房之婦私。年餘不收其租。一日主人算賬無抵。劉二坐逼。婦恨將劉舌咬下二寸。延視根腫滿。湯水不下。製金瘡

藥用敗龜板燒烟帶黑色一兩血竭一錢冰片三分共末摻上血痛俱止腫尚未消其人昏厥不省夢關帝示以半紅半白雞豆子大藥一粒用無根水吞服即生矣。驚覺難言討筆書衆人方知自是其腫漸消可灌飲湯或薄粥其舌長完比前大小一樣日服參耆歸朮湯愈。

第三十二章 辨舌證治要方

察病於舌色較切脉更有把握蓋舌無隔膜且為心苗目視明澈勝於手揣病既察定然後立方用藥自必效如桴鼓茲就本書引用應備各方分列發表攻裏和解化利清涼溫散補益雜治為八節聊備參攷畧附主治效能於各方之下俾互相發明。

第一節 發表之劑

香蘇飲

生香附半錢

紫蘇葉二錢

陳皮半錢

生甘草七分

加薑蔥煎咳嗽加杏

仁桑皮有痰加半夏頭痛加川芎白芷傷風鼻塞頭昏加羌活荊芥

加味香蘇飲醫學悟心

即前方加秦艽、荆芥、川芎、蔓荊子。各一錢。

參蘇飲 治外感風寒、內積痰飲、虛熱、便血、表裏虛實兼治之劑。

西黨參 紫蘇葉 乾薑 前胡 半夏 茯苓 陳皮 生甘草

炒枳殼 桔梗 木香 加薑棗煎。外感多者去棗。加葱白。肺中有火

者去人參。加杏仁、桑葉。泄瀉者加篇豆、白朮。

大羌活湯

羌活 防風 獨活 細辛 防己 黃芩 黃連 蒼朮 白朮炒

生甘草 知母 川芎 生地黃 水兩碗。煎一碗服。

冲和靈寶飲

即前方去獨活、防己、黃連、蒼朮、知母。加柴胡、白芷、葛根、石膏。

柴葛解肌湯 治太陽陽明合病。頭痛、鼻乾、不眠、惡寒、無汗。

柴胡 葛根 羌活 白芷 黃芩 芍藥 桔梗 甘草 生石膏

加薑棗煎服。無汗惡寒甚者去黃芩。冬月加麻黃。春月少加。夏月加蘇

葉。

葛根湯 治頭項強痛。背強。脉浮無汗惡寒。兼治風寒在表而自利者。

葛根 麻黃 生薑 桂枝 芍藥 甘草 大棗 水煎服。

升麻葛根湯錢氏 治陽明表熱下利。兼治痘疹初發。

升麻 葛根 芍藥錢各二 炙甘草錢一 加生薑水煎服。

柴胡桂枝湯 治心腹卒痛。肝木乘脾土。

柴胡 黃芩 半夏 生甘草 芍藥 桂枝 大棗 生薑

人參敗毒散

人參 茯苓 枳殼 桔梗 前胡 柴胡 羌活 獨活 川芎各一錢

生甘草五錢 加生薑煎。煩熱口渴。加黃芩。本方加陳倉米名倉廩

散。治噤口痢。

藿香正氣散 治外感風寒。內傷飲食。憎寒壯熱。胸膈滿悶。

藿香 紫蘇葉 白芷 大腹皮 茯苓 白朮炒 陳皮 半夏麴

厚樸 桔梗 生甘草 加薑棗煎。

小續命湯 治中風喘邪不遂。語言澀蹇。及剛柔二瘓。亦治厥陰風濕。

防風

半錢

桂枝

麻黃

人參

酒芍

杏仁

川芎

黃芩

防己

甘草

各八分

附子

分四

加薑棗煎服

香薷飲

香薷

製川朴

扁豆衣

黃連香薷飲

即前方加黃連

五物香薷飲

即前方加茯苓

生甘草

六味香薷飲

即五物香薷飲加木瓜

十味香薷飲

即六味香薷飲加參耆陳木

二香散

即五味香薷飲合香蘇飲

藿薷湯

即三物香薷飲合藿香正氣湯

香葛湯

即三物香薷飲加葛根

銀翹散

平劑

金銀花

連翹壳

苦桔梗

蘇薄荷

竹葉

生甘草

淡豆豉

荊芥

牛蒡子

鮮葦根

水煎服

葱豉湯 治虛人風熱。伏氣發溫。及產後感冒。皆效。

葱白 握一 香豉 合三 水煎日三服。

梔豉湯 治汗下之後。正氣已虛。尚有痰涎滯氣凝結上焦。以此引吐。

梔子 枚十四 香豉 合四 水四升。先煮梔子得二升半。同豉煮取升半去滓。分為二服。得吐止後服。

元參升麻湯

黑元參 牛蒡子 綠升麻 殭蠶 連翹 防風 黃芩 黃連

桔梗 生甘草 水煎服。

化斑湯

犀角 鮮生地 黑元參 丹皮 生石膏 肥知母 鮮大青葉

生甘草 金銀花 水煎服。

人參化斑湯 即前方加人參。

黃連化斑湯 即前方加黃連。

消斑青黛飲

犀角 黃連 青黛 生石膏 知母 梔子 元參 鮮生地 紫
胡 人參 生甘草 薑朮 水煎服 加醋一匙冲
大便秘者。去人參。加大黃。
葱豉白虎湯

鮮葱白 枝三 淡豆豉 錢三 生石膏 錢四 知母 錢三 北細辛 分三 生甘草
分五 生粳米 錢三 水煎服。

第二節 攻裏之劑

大承氣湯 治陽明病。痞滿燥實。譫語煩渴。腹痛便閉。

大黃 酒浸 錢四 芒硝 錢二 川樸 薑製 錢四 枳實 錢二 水煎溫服。

小承氣湯 治陽明病。心腹痞滿。潮熱狂言而喘。

大黃 酒浸 錢三 厚樸 錢二 炒枳實 錢一 水煎溫服。

調胃承氣湯 治陽明病。不惡寒。反惡熱。大便閉。譫語者。

大黃 酒浸 錢三 芒硝 錢三 炙甘草 錢二 水煎溫服。

白虎承氣湯

大黃

錢三

芒硝

半錢

知母

錢三

甘草

半錢

生石膏

錢六

粳米

錢一

水煎

濕服

增液承氣湯

鮮生地

黑元參

麥冬

大黃

芒硝

水煎

濕服

桃仁承氣湯

治熱結膀胱

小便脹滿

大便黑

小便利

燥渴譫語

畜血發

熱如狂

及血瘀胃痛

腹痛脇痛

桃仁

五十粒

大黃

芒硝

甘草

桂枝

各二錢

水煎

濕服

抵當湯

治脉微而沉

反不結胸

其人如狂者

以熱在下焦

小腹當鞭滿

小便自利者

必有蓄血

令人善忘

所以然者

以太陽隨經瘀熱在裏故也

水蛭

三十箇猪脂熬黑

蟅蟲

三十箇去頭足翅

桃仁

二十枚去頭尖研

大黃

四兩

桃仁抵當湯

治熱在下焦

小腹硬滿

瘀血在裏

小便自利

屎鞭如狂善

忘等症

黃三錢

鮮生地

錢四

當歸尾

錢二

桃仁

錢三

炒穿甲

半錢

元明粉

半錢

搖桂心五分

水煎溫服

養榮承氣湯

大黃二酒浸錢

厚樸

枳實各一錢

知母

當歸

芍藥

鮮生地

各一錢

加薑煎

小陷胸湯

治痰熱塞胸

括萎實五錢

黃連半錢

半夏三錢

水煎溫服

大陷胸湯

煨甘遂一錢

生錦紋二錢

元明粉半錢

水煎溫服

更衣丸

蘆薈七錢

硃砂五錢

右藥研末滴燒酒為丸

備急丸

治熱邪暴死

巴豆霜一錢

乾薑三錢

大黃三錢

共為末糊丸如菜豆大

十棗湯

治水蓄積脇內腫脹者

莞花醋炒三錢

甘遂麴搜三錢

大戟蒸貼三錢

共研末棗肉煮爛為丸

已椒蘆黃丸 治腹滿口舌乾燥腸間有水氣

防已 川椒目 葶蘆子煮 大黃各等分

右四味為末蜜丸如梧子大先食飲服一九日三服口中有津液渴者加芒硝半兩

陶氏黃龍湯 治胃實失下虛極熱極循衣撮空不下必死者

人參半錢 熟地錢三 當歸錢二 大黃酒浸錢三 芒硝錢二 枳實錢二 厚樸

半錢 水煎溫服

新加黃龍湯

鮮生地錢五 人參半錢 生大黃錢三 芒硝錢一 元參錢五 生甘草錢二

麥冬連心錢五 當歸半錢 海參條二 薑汁匙六

水八杯煮取三杯先用一杯沖參汁分五薑汁二匙頓服之如腹中有響

聲轉矢氣者為欲便也

十全苦寒救補湯

生石膏研八兩 生知母去毛錢六 黃柏錢四 黃芩錢六 生大黃 元明粉

錢各三 製川樸錢一 生枳實半錢 黑犀角尖錢四 水煎溫服

三黃瀉心湯

大黃

錢三

小川連

錢一

青子芩

半錢

水煎溫服

大黃黃連瀉心湯

此瀉虛熱非瀉實熱也。

大黃

錢三

黃連

半錢

麻沸湯漬之。須臾後去滓。分溫再服。

半夏瀉心湯

半夏

錢三

黃芩

乾薑

炙甘草

人參

各二

黃連

兩一

大棗

十二枚

水一斗。煮取六升。去滓再煎。取三升。溫服一升。日三服。

濟川煎方

當歸

錢三

川芎

錢一

淡苳蓉

錢三

澤瀉

錢三

升麻

錢一

炒枳殼

錢一

清

煎服。

第三節 和解之劑

小柴胡湯

柴胡

錢三

黃芩

錢二

人參

炙甘草

各二錢

半夏

錢三

生薑

錢二

大棗

枚三

水煎溫服。

柴胡湯

柴胡

錢三

黃芩

錢一

陳皮

錢一

生甘草

錢一

大棗

枚二

小柴胡

用人參

半夏

今表實

故不用人參

無嘔吐

不加半夏

大柴胡湯

治表有寒熱

脇痛諸症

柴胡

錢四

薑半夏

半錢

黃芩

錢二

芍藥

錢一

生薑

錢二

大棗

枚一

枳實

炒一錢

大黃

酒浸

水煎

溫服

達原飲

枳榔

錢二

厚樸

錢一

草果仁

分五

知母

錢一

芍藥

錢一

甘草

分五

黃芩

錢一

錢

右水二鍾

煎八分

午後溫服

三消飲

枳榔

錢二

草果

分五

厚樸

錢一

白芍

錢一

甘草

錢一

知母

錢一

黃芩

錢一

大黃

錢一

葛根

錢一

羌活

錢一

柴胡

錢一

水煎

溫服

防風通聖散

治憎寒壯熱

二便秘澀

表裏俱熱

防風

荆芥

薄荷

麻黃

當歸

川芎

白芍

炒白朮

連翹

梔子 大黃酒浸 芒硝各五分 桔梗錢一 黃芩錢一 滑石錢三 甘草錢二
水煎服。

增損雙解散 此溫病時毒主方。

白殭蠶酒炒 錢三 蟬蛻枝十二 廣薑黃分七 防風錢一 薄荷葉錢一 荊芥

錢一 全當歸錢一 白芍錢一 黃連錢一 連翹一去心 錢一 梔子錢一 黃芩錢二

桔梗錢一 生石膏錢六 滑石錢三 生甘草錢一 大黃 芒硝各二 水

煎去滓。冲芒硝入蜜三匙。黃酒半酒杯 和勻冷服。

甘露飲

大生地錢三 鮮石斛錢三 淡天冬半錢 麥門冬錢二 生甘草分八 西茵

陳錢一 青子芩錢一 炒枳壳分八 枇杷葉錢三

先用熟地錢六 切絲泡取汁兩碗代水煎藥。

小甘露飲

鮮生地錢四 鮮石斛錢二 西茵陳錢一 黃芩 苦桔梗各一 焦梔子

錢一 升麻分三 水煎溫服。

甘露消毒丹 治濕溫時疫發熱倦怠胸悶腹脹肢痠咽腫斑疹身黃頤

腫口渴渴溺赤便閉吐瀉瘧痢淋濁瘡瘍等證但看病人舌苔淡白或厚

膩或乾黃者是暑濕疫熱之邪尚在氣分悉以此丹治之立效

飛滑石十五兩 綿茵陳十一兩 淡黃芩十兩 石菖蒲六兩 川貝母 木

通各五兩 藿香 射干 連翹 薄荷 白蔻仁各四兩

右藥晒燥生研為末每服三錢開水調服日二次或以神麴糊為丸如

彈子大開水化服亦可

清瘟敗毒飲

生石膏大劑四兩至八兩中劑二兩至 小生地大劑六錢至一兩中

二錢至四錢 烏犀角大劑六錢至一兩中劑二兩至 真川連大劑六錢至一兩中

一錢至四錢 焦山梔三錢 桔梗半錢 黃芩三錢 青連翹三錢 赤芍

二錢 白知母三錢 粉丹皮二錢 烏元參三錢 鮮竹葉五十片

先煮石膏數百沸後下諸藥犀角磨汁和服

加減法 頭面腫大加紫花地丁草五錢 生錦紋酒浸 赤腮頸腫加金

銀花錢二上青黛五紅絲繞目。眼光昏翳。加羚羊角半錢龍胆草分八滁菊

花錢三藏紅花五耳後腫痛。加大青葉半錢紫花地丁草錢四塔舌弄舌。

加木通錢一童便杯一冲。舌上白點如珍珠。加薔薇根錢五金汁水一兩。

舌上發疔。或紅或紫。甚則流膿出血。舌上成坑。加銀花露金汁水各一。

冲入。外以錫類珠黃散搽之。舌苔如膩粉。言語不清。加梨汁竹瀝西瓜

汁蕉根汁各一。舌衄齒衄鼻衄。加鮮茅根支五陳京墨汁童便各一。

氣粗呃逆。加鮮竹茹錢五鮮枇杷葉青皮一兩去毛抽筋煎湯代水。

氣粗胸滿。去地芍甘桔。加括婁仁錢六旋覆花錢三再用蘿蔔淡海蜇各四。

活水蘆根兩三煎湯代水。咽喉腫痛。加山豆根分八金汁水一兩。再以

生蘿蔔兩四西藏橄欖錢二安南子枝五煎湯代水。外以錫類散吹之。吹後漱

口淨。以玉霜梅含之。筋脉抽惕。甚則循衣摸牀撮空。加羚羊角半錢滁

菊花錢三龍胆草分八再以嫩桑枝兩二絲瓜絡個一煎湯代水。若氣實者。宜兼

通腑。加生錦紋錢三風化硝錢二小枳實錢二血虛者。兼養陰。加鮮金釵錢三熟

地露兩一童便杯一同冲。骨節煩疼。腰如被杖。加黃柏半錢木通錢一口穢

噴人加鮮佩蘭半錢野薷薇露金汁水雨各一冲。裏急後重或下惡垢或
下紫血似痢非痢加元明粉錢四青瀉葉錢一淨白蜜雨一煎湯代水。小便
混赤短瀉甚則血淋加滑石錢四琥珀末錢四冲。再以鮮茅根支五十鮮車前
草兩株杜牛膝錢五煎湯代水。按此十二經瀉火之大劑凡一切溫毒
熱疫表裏俱熱狂躁心煩口乾咽痛大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血熱
甚發斑頭痛如劈煩亂譫妄身熱肢冷舌刺唇焦上嘔下瀉六脉沉細
而數即用大劑沉而數者即用中劑浮大而數者即用小劑如斑一出
即加鮮大青葉錢二少佐升麻四五分引毒外透此內外化解濁降清升
之法得一治一得十治十此余師愚疫症一得之言也若六脉細數沉
伏面色青慘昏憤如迷四肢逆冷頭汗如雨其痛如劈腹內攪腸欲吐
不吐欲泄不泄男則仰卧女則覆卧搖頭鼓頤由熱毒深入厥陰血瘀
氣閉所致此為悶疫斃不終朝清瘟敗毒飲不可輕試治法宜急刺少
商曲池委中三穴以洩營分之毒灌以瓜霜紫雪丹八分至一錢清透
伏邪使其外達更以新加絳覆湯加來復丹錢半至二錢通其陰絡庶

可挽回。

升陽散火湯

人參 當歸 麥冬 柴胡 白朮 芍藥 甘草 茯苓 陳皮

黃芩 水煎溫服。

梁氏三仙湯

淡黃芩 製川樸 炒枳殼 清水煎服。

四逆散

柴胡分五 炙甘草分五 白芍藥半錢 炒枳實分八 水煎溫服。

柴胡桂薑湯

柴胡 生牡蠣錢各一 桂枝 乾薑 黃芩 甘草分各五 括萎仁錢一

清水煎服。

甘桔湯

桔梗 生甘草錢各一 水煎溫服。

鄒潤安曰。腎家邪熱。循經而上。肺不任受。遂相爭競。二三日邪熱未盛。

故可以甘草瀉火而愈。若不愈。是肺竅不利。氣不宣泄也。以桔梗開之。肺竅既通。氣遂宣泄。熱自透達矣。

第四節 化利之劑

二陳湯

薑半夏

錢二

白茯苓

錢半

陳皮

甘草

生薑

錢各一

水煎溫服。

三仁湯

苦杏仁

錢五

飛滑石

錢六

白通草

錢二

白蔻仁

錢二

製川樸

錢二

竹葉

錢二 生米仁

錢六 製半夏

錢五 甘瀾水

八碗。煮取三碗。每服一碗。日三服。

四苓散 治中風發熱。六七日不解而煩。有表裏證。渴欲飲水。水入則吐。

者。

焦白朮

浙茯苓

豬苓

澤瀉

為末。以白飲和服。

五苓散

即前方加官桂。

六一散

飛滑石

錢六

生甘草

錢一

研末和勻。

平胃散加芒硝湯

茅山蒼朮

五兩

製川樸

廣皮紅

各三錢

炙甘草

二兩

芒硝

一兩

為

末每服三錢水一盞薑一片同煎七分溫服

導赤散

鮮生地

木通

各三錢

甘草稍

淡竹葉

各一錢

水煎

溫服

黃芩湯

黃芩

三錢

炙甘草

白芍藥

各二兩

大棗

十二枚

水煎

溫服

黃連湯

治太陽傷寒胸中有熱胃中有邪腹痛嘔吐者

黃連

桂枝

人參

半夏

生甘草

大棗

生薑

水煎

溫服

芩連治痢湯

黃芩

黃連

炒枳殼

新會皮

製川樸

油當歸

歸尾

桃仁

泥

泥

麻子仁

水煎

溫服

黃耆防風湯

又名理氣防風湯

柴胡

升麻

黃耆

防風

陳皮

羌活

甘草

藁本

豆蔻

黃柏 水煎溫服。

茵陳蒿湯

茵陳蒿

錢六

梔子

枝十四

大黃

錢三

水一斗。先煮茵陳減六升。入梔子大黃煮取三升。去滓。溫分三服。小便當利。溺如皂角汁。狀色正赤。一宿腹減。病從小便去也。
徐洵漢云。先煮出。小便。

附子湯 治少陰病。身體疼。骨節痛。手足冷。脉沉者。

淡附片

錢一

茯苓

炒白朮

錢各三

人參

芍藥

錢各二

水煎溫服。

第五節 清涼之劑

三黃湯

金匱倍大黃

名瀉心湯

黃連

煮酒

黃芩

炒酒

大黃

等酒浸各

麻沸湯二升漬之。須臾絞去汁。

溫

本方去大黃。加黃柏等分煎。名金花湯。更加梔子。名梔子金花湯。

連即黃

湯為末。蜜丸。名金花丸。金花湯蜜丸。名三黃丸。加黃柏等分。滴水丸。名

大金花丸。

○張石頑云。金花湯止。芩連柏三味作丸。名三補金花丸。較

解毒

連解

湯多。梔子。作湯名解毒。更加大黃。則名大金花湯。湯丸雖異。功用則同。

黃連解毒湯
黃連 黃芩 黃柏 梔子各一錢 水煎冷服

平陽清裏湯

生石膏研 知母 黃芩 黃連 黃柏 黑犀角 羚羊角 生甘

草 清煎溫服

十全甘寒救補湯

鮮生地 黑元參 麥冬 天冬 生玉竹 北沙參 懷山藥 粉

丹皮 地骨皮 建澤瀉 水煎溫服

涼膈散又名連翹散

連翹四兩 大黃酒浸 芒硝 生甘草各二兩 黃芩 薄荷 梔子各一兩

為粗末。每服三五錢。加竹葉七片。水一碗半。煎一碗去渣。入白蜜一匙。

微煎溫服。與四物各半服。能和營泄熱。名雙和散。本事方加赤芍乾

葛。治諸熱累效。徐洵溪云。此湯中上二焦之火。即調胃承氣。加疏風清火之品也。

白虎湯

生石膏兩八

知母兩三

炙甘草兩一

粳米合三

水一斗。煮米熟湯成去滓一升。日三服。

白虎加人參湯 即前方加人參五錢 煮服同前法。

竹葉白虎湯

生石膏 知母 淡竹葉 水煎溫服

三黃白虎湯

黃連錢一 黃芩錢二 生梔子錢三 生石膏錢八 白知母錢三 生甘草錢八

粳米錢三 煎服同前法。

三黃石膏湯 一方無知母元參甘草加豆豉麻黃治表裏大熱脈洪長滑數者

黃連錢一 黃芩錢二 黃柏錢一 知母半錢 生石膏錢三 生梔子錢一 黑

元參錢二 生甘草七分 煎服同前法。

清營湯

犀角尖錢三 鮮生地錢五 黑元參錢三 麥冬錢三 丹參錢二 黃連五錢

金銀花

錢三

連翹

連心錢三

水八杯。煮取三杯。日三服。

黃連犀角湯

黃連 黃芩

焦山梔

川柏

鮮生地

黑犀角

丹皮

赤芍

水煎溫補

犀角地黃湯

治溫熱入絡。舌絳煩熱。八九日不解。得此湯立效。

黑犀角

汁磨

連翹

錢各三

生甘草

分五

水煎去滓服。

又方

黑犀角

鮮生地

西赤芍

粉丹皮

水煎沖入

犀角導赤散

黑犀角

鮮生地

連翹

生甘草

木通

淡竹葉

水煎溫服。

清涼至寶飲

薄荷

黑元參

花粉

焦山梔

丹皮

地骨皮

分等

細辛

半錢

水

二三鐘煎七分。稍冷服。

王定牛黃清心丸

西牛黃 上腰黃 黃連 黃芩 梔子 黑犀角 廣鬱金 辰砂

各一兩 珍珠粉 錢五 梅冰 麝香各二分

右藥各研極細淨末蜜丸每重一錢金箔為衣蠟封固

西黃至寶丹

生黑犀角 生玳瑁 琥珀 鏡面辰砂 研 上腰黃 研各一兩 西牛黃

錢五 梅冰片 研 麝香 研各一錢 安息香 一兩五錢酒研飛淨一兩 金箔

銀箔 研各五十片 上藥先將犀瑁為細末入餘藥研勻將安息膏重湯

煮凝成後入諸藥中和搗成丸如梧子大蠟護臨服剖開用人參湯化

下三九至五丸本事方有人參南星天竺黃

局方紫雪丹

飛滑石 生石膏 寒水石 各一斤 磁石 斤二 黃金 三斤 一本無黃

金以上並搗碎用水半斛煮至二斗去滓入下藥

羚羊角屑 犀角屑 青木香 沉香 各一斤 紫丁香 錢七 元參

升麻 各六兩 炙甘草 三兩 以上各藥再入前藥汁中煮取七升半去滓

入下藥 元明粉三斤 淡牙硝一斤 二味入前藥汁中微火上煎

柳木篋攪不住。俟有三升半。投入木盆中半日。欲凝。入下藥。

辰砂兩一 當門香錢四 二味入前藥中攪調令勻。瓷器收藏。藥成霜雪

而色紫。新汲水調下。雞峯方慈石滑石硝石祇用各十兩。丁泥木香各五兩。升麻六兩。朴硝二斤。麝香用三兩。六味同。

徐洄溪云。邪火毒火穿經入臟。無藥可治。此能消解。其效如神。

葉氏神犀丹 治溫熱暑疫諸邪。不即解散。耗液傷營。逆傳內陷。痙厥昏

狂。謔語發斑等證。但看病人舌色乾光。或紫絳。或乾硬。或黑苔。皆以此

丹救之。若初病即覺神情昏躁。而舌赤口乾者。是溫暑直入營分。酷暑

之時。陰虛之體。及新產婦人。患此最多。急須用此。多可挽回。

黑犀角磨汁 石菖蒲 黃芩各六兩 鮮生地斤二 金銀花楊汁一斤 金汁

水 連翹各十兩 板藍根兩九 淡豆豉兩八 黑元參兩七 天花粉 老

紫草各四兩 各生晒研忌用火炒 以犀角生地汁金汁水和搗為丸。切勿加

煮豆豉 每重三錢。涼開水化服。日二次。小兒減半。

第六節 溫散之劑

理中湯

子加附子名附
理中湯

人參 焦冬朮

炙甘草

乾薑錢各三

水煎溫服。嘔者冷服。

枳實理中湯

即理中湯加枳實錢半茯苓錢三

四逆湯

淡附子錢三

乾薑錢四

炙甘草錢二

水煮溫服。嘔者冷服。

回陽救急湯

淡附子錢半

淡乾薑錢三

炙甘草錢二

西黨參錢三

焦白朮錢三

浙茯苓

苓錢三

肉桂分五半夏錢三

五味子分五

新會皮錢半

水煎冷服

吳茱萸湯

治胃氣虛寒中有寒飲者

淡吳萸錢一

西黨參錢三

生薑片三

大棗枚三

水煎溫服

大建中湯

炙義著錢三

全當歸錢三

桂心分六

炒白芍錢三

西黨參錢三

炙甘草

半錢製半夏錢三

淡附片錢一

薑棗煎

烏梅丸 此丸又治寒痢

烏梅肉 細辛 乾薑 當歸 黃連 附子 川椒 桂枝 人參

黃柏 為末蜜丸

大順散

甘草半錢 乾薑一錢 杏仁三錢 肉桂心六分 水煎溫服

冷香飲子

淡附子 陳皮 草菓各一錢 炙甘草半錢 生薑五片 水煎冷服

王士雄云。此方與大順散皆治陰寒冷濕之氣。客於太少二陰而為霍亂吐下之方也。多由畏熱而浴冷卧風過啖冰瓜所致。乃暑月之中寒證。非病暑也。

十全辛溫救補湯

淡附片一錢 乾薑 肉桂心 白芷 薤白 木香各一錢 陳皮半錢 川椒

公丁香各六分 半夏三錢 藿香半錢 水煎溫服

第七節 補益之劑

十全甘溫救補湯

黃耆 人參 白朮 熟地 川芎 歸身 鹿茸 白芍炒 茯神

甘草 水煎溫服

參附養榮湯

西潞黨 淡附片 焦白朮 浙茯苓 炙義耆 全當歸 熟地

炒白芍 五味子 新會皮 遠志肉 肉桂心 加薑棗煎

清燥養榮湯 凡陰枯血燥者宜此湯

生地黃 全當歸 炒白芍 新會皮 肥知母 天花粉 生甘草

燈芯 水煎溫服

按疫為熱病。暴攻之後。餘邪未盡。陰血未復。不可遽補。致生異症。宜此

養榮湯。如痰中帶血。加藕節鮮茅根。

肥知母 天花粉 川貝母 瓜蒌霜 橘紅 炒白芍 全當歸

蘇子 生薑 水煎溫服

十全大補湯

大熟地

錢三

炒白芍

半錢

全當歸

半錢

川芎

肉桂

各五分

人參

白

木 茯苓

炙甘草

炙黃耆

各錢半

水煎溫服

歸脾湯

西潞黨

炒白朮

炙黃耆

全當歸

浙茯苓

遠志肉

各錢一

炙

甘草

炒棗仁

廣木香

龍眼肉

各錢五分

薑片

棗

各錢一

煎服

復脉湯

肉桂

炙甘草

各錢五分

大生地

錢三

麥冬

麻子仁

各錢二

阿膠

錢一

加薑棗煎

人參三白湯

西潞黨

錢二

炒白朮

浙茯苓

炒白芍

生薑

各錢三

大棗

枝三

水

煎溫服

參胡三白湯

即前方加柴胡

錢三

補中益氣湯

清炙耆

陳皮

人參

當歸

炒白朮

各錢一

升麻

柴胡

炙甘

草各五分 水煎溫服

清暑益氣湯

西黨參 清炙耆 炒白朮 廣皮 神麴 澤瀉各五分 蒼朮 升

麻錢各一 麥冬 炙甘草 葛根 當歸 黃柏各二分 青皮二分

五味子粒九 水煎溫服

人參固本湯 治瘟疫虛極熱極。循衣撮空。不下必死者。下後神思稍甦。

續得肢體振寒。怔忡驚悸。如人將捕之狀。四肢厥逆。眩暈昏迷。項背強

直。此大虛之兆。將危之候也。此方救之。○按此等症。竟有至十日外。昏

迷不醒。四體冰冷。形如死人。而心口微動者。以附子理中。回陽漸甦。靜

養而愈。但不可多用久用耳。服後虛回即止服。

西黨參 生地錢各二 熟地錢三 炒白芍錢半 天冬 麥冬 五味子

知母 炙甘草 陳皮錢各一 水煎微溫服

六味地黃湯

大熟地 炒萸肉 浙茯苓 丹皮 懷山藥 建澤瀉 水煎溫服

人參八味湯 即六味湯加西黨參附子肉桂

生脉散

北沙參 錢三

破麥冬 錢二

五味子 分三

水煎溫服

增液湯

大生地 錢八

破麥冬 錢四

黑元參 錢六

水煎溫服

局方黑錫丹

黑錫 錢 硫黃 各三兩同炒結砂研至無聲為度

胡蘆芭

沉香

熟附子

桂心 各五

大茴香 錢 破故紙 肉豆蔻 金鈴子 核去 木香 各一兩

右藥研末酒煮麵糊為丸如梧桐子陰乾以布袋擦令光澤

第八節 雜治之劑

黑龍丹 又名琥珀

治產難胞衣不下血迷血暈不省人事一切危急惡

候垂死者但灌藥得下無不全活亦治產後疑難等症

大熟地 全當歸

五靈脂

川芎

良薑

各二兩切片入砂鍋內紙筋鹽泥固濟火煨過

百草霜 兩一

硫黃

乳香 錢各二

琥珀

化莖石

錢各一

右藥共研細末。醋糊為丸。如彈子大。每用一二丸。炭火煨紅。投入生薑自然汁中。浸碎。以童便調灌下。

黑神散

一名烏金散
又名玉桂散

治產難及熱病胎死腹中。或因跌仆。或從高墜下。

或房室驚搖。或臨產驚動太早。觸犯禁忌。或產時未至。經血先下。惡露已盡。致血乾胎死。身冷不能出。

熟地

焙乾

蒲黃 當歸

交趾桂

白芍

炮薑

甘草

各一兩 小

黑豆

炒二兩

百草霜

錢五

右為末。每日二錢。米醋半合。許沸湯六七分。寢起溫服。疑似之間。且進佛手散。酒水合煎。二三探之。若未死。子母俱安。若已死。服立便逐下。

〔方攷〕查局方黑神散。無百草霜。用童便酒各半調服二錢。良方黑

神散。有蒲黃炮附子

兩半

簡易方黑神散。止用百草霜一味。又一方。

加乳香血竭。亦名黑神散。

綱目用熟地

斤一

生薑

斤半

同炒乾為末。

烏梅湯下二錢。為治產後血塊痛之黑神散。俱各有證治。錄此以別黑

神散之方不一。聊備參攷。

導痰開關散

治頑痰毒涎上壅。牙關緊閉。用此吹入喉關。能引痰吐出。

土牛膝根汁晒粉五錢

牙皂五錢去皮

炒殭蠶三錢

枯礬二錢五分

共研

細用

錫類散

治爛喉時證。及乳蛾牙疳。口舌腐爛。凡屬外淫為患。諸藥不效。

者吹入患處。頻死可活。

象牙屑焙

珍珠各三分

飛青黛六分

梅冰片一分

壁錢二十一箇即泥壁蟻子窠

西牛黃

人指甲男病用女甲。女病用男甲。須分別。各五厘。

右研極細末。密裝磁瓶內。勿使泄氣。

玉丹

將明礬如指頭大者入罐內。放桴炭火上溶化。以筋試看罐底無塊時。

隨投火硝

如礬一兩。下硝三錢。為則。下礬砂亦每礬一兩。少頃又投。明礬化盡。又下硝。

礬如前法。逐層投完。待罐口鋪地如饅頭樣。方用武火煉至乾枯。用淨

瓦覆罐口。一時取起。將研細牛黃少許。用水五六匙調和。以匙挑滴丹

上。將罐仍入火內烘乾。即取起。連罐覆淨地上。以紙襯地上。用瓦蓋七

日。收貯聽用。

碧丹 碧丹消痰清熱解毒祛風。

玉丹三分配百草霜匙半研勻入燈芯灰一厘甘草末匙三蘇荷薄末分三右藥

研極細。然後入好冰片六厘再研勻。入小磁研內。勿泄氣。此丹宜臨用含。不可日多。

金丹 功主消腫出痰。並牙齦腫舌穿牙疔毒。專用此丹治之。

提淨牙硝八分生蒲黃末分四共研細。次下殭蠶末分一牙皂角末分一

研成淡黃色。加梅冰片分一再研此藥。可以久留冰片。臨用時加更佳。如

證重者。本方再加牛黃。喉腫及喉風。倍加殭蠶牙皂。

蓋碧丹消痰清熱解毒祛風。固為良劑。尚屬平緩。不如金丹消腫毒除

風熱。開喉閉。出痰涎。最為神效。但喉證初起。金丹不宜多用。因其能直

透入內。且善走散。初起若多用之。恐輕證不勝藥力。反扞格難入也。凡

喉症及單雙蛾。只用碧丹。其他重證。金碧兼之。須分先後多寡。初起碧

丹九金丹一吹五管。後碧丹八金丹二。再吹碧丹七金丹三。如證重者。

碧丹金丹格用至三五次。後痰涎必上湧。然後金丹六碧丹四。將管直

入喉中。重吹一次。隨收出管。即弔出痰。竟用金丹。八碧丹。亦可。

珠黃散

珠粉

分二

牛黃

分二

川貝母

分六

辰砂

分二

共研極細末

牛黃散

治重舌。木舌。腫舌。心脾火甚者。

西牛黃

人參

大黃

炒

炙甘草

各五錢

茯苓

七錢五分

全當歸

長

砂

麝香

各二分

共為末

每服

五錢


沸湯調服

彩圖辨舌指南卷六終

辨舌指南

卷六 第三十二章 證治要方

三十四



《辨舌指南》校勘

目 录

頁	上下	行	字	校	勘
一	上	十二			脱一节目：第三节 味觉之错觉
二	下	十	五		「辨舌」之下漏一「质」字
三	下	九			「黑色脾经」应改为「絳色心经」
四	上	三			「焦紫肝经」应改为「黑色脾经」
	下	十二			「絳色心经」应改为「焦紫肝经」
	上	十四			「色」字应改为「苔」字
	下	十四			「色」字应改为「舌」字
	上	七			「舌」字上漏一「霉」字
	下	七			
二	上	十三			「舌」字当是「苔」字之误
	下	四			「心」字应改为「新」字
	上	三			
	下	四			
	上	十三			
	下	九			

卷一 緒 言

頁	四二	第一編
上下	上 下	
行	七 一 三	
字	倒二 十一 倒四	
校勘	「佟」字当是「仅」字之誤 「舌」字当是「苔」字之誤 「醬」字上漏一「霽」字	第一編
四 六 八 七 十 十一 十二	下 下 下 上 下 下 下	
七 五 十 九 五 十一 三	十四 倒六 六 十一 四 七 十四 一—六 八—十 十七—廿四	
	「法」字疑是「液」字之誤 「甘」字上，「无」字下，中間似漏一「论」字 「授」字应改为「受」字 「之」字应改为「及」字 「吐」字应改为「味」字 「授」字应改为「受」字 「癆」字，本草纲目作「病」字 「素問应象大论」应为「素問阴阳应象大论」 「心主言」句，素問阴阳应象大论无考，有心 「在声为笑」，难经四十九难有「入心为言」 「手少阴之别，系舌本」句，出灵枢经脉篇	

十四				十三			
上		下		上			
三	十一	四	一	三	十四	五	四
倒一—三	十三—十五	倒七	四—十	倒五—七	六—十五	一—八	一—五 十一—十三
「当曲頰入系舌本」句，出灵枢经筋篇，引入此处，与上下文不联属，衍文，似应去 「为」字，证治准绳作「于」字 「末」字，证治准绳作「脉」字 「脾」字，似为「脉」字之误 「足阳明」三字，衍文，似应去 「藏象篇」应改为「灵枢邪气藏府病形篇」				「手少阴之筋」，经筋篇作「手少阳之筋」 「经络篇」应为「脉度篇」 「心病则舌卷短，颧赤」句，出灵枢五阅五使篇 「经络篇」应为「经脉篇」 「疾病篇」无考 「舌纵涎下烦惋，取足少阴」句，出灵枢寒热病篇 「胃热」，灵枢口问篇作「胃缓」 「足太阴之正，贯古中。经水篇云」十二字，衍文，似应去			

三
三—六

一—四

十

十一

十二

七

七—九

三—十三

「形色簡摩」应为「形色外診簡摩」，下同。
第三行至第六行，节录形色外診簡摩之文，有乖原义，原文云：「前人之论舌診詳矣，而只论舌苔，不论舌质，非不论舌质也，混苔与质而不分也。夫舌为心窍，其伸缩展转，则筋之所为，肝之用也；其尖上红粒，细于粟者，心气挾命門真火而鼓起者也；其正面白而软刺，如毫毛者，肺气挾命門真火而生出者也。至于苔，乃胃气之所熏蒸，五藏皆禀气于胃，故可借以診五藏之寒热虚实也。若推其专义，必当以舌苔主六府，以舌质主五藏。舌苔可刮而去者，气分之事，属于六府；不可刮，即渐侵血分，内连于藏矣。舌质有变，全属血分与五藏之事」。

「当」字上，医門棒喝有一「又」字

「吴坤安」应为「石希南」，下文所引，出于医原。

「胃蒸脾湿上潮而生，故曰苔」二句，医原作

頁	上下	行	字	校勘
廿一	下	六	十六—十九	「脾胃津液上潮而生」一句，下文「平人」二字上有一「故」字 「或舌尖边……之常苔也」，医原作「或舌中有紅路一条，或舌尖舌边多紅点，此平人舌苔之大較也」 「微絲血脰」四字，形色外診蘭摩作「細絡」二字 「若血敗凝於于中，而舌必強硬而死也，故察舌之吉凶」三句，疑筆誤，形色外診蘭摩作「故治病必察舌苔，而察病之吉凶」二句 「中」字，医門棒喝作「气」字 若「舌絳而光亮……濡潤以救之」出医原。 「濡潤」二字上，医原有「甘平」二字 「生苔」二字下，医門棒喝有「而略現白垢」一句 「仍」字，形色外診蘭摩作「仅」字 「飲」字，形色外診蘭摩作「因」字
廿	下	二—三		
	下	九—十		

九	十四—十五	「初病」二字，形色外診簡摩（见脉如文注）作「往往」
十一	四	「反」字，形色外診簡摩（见医原文注）作「淨」字
十二	八	「脉象」二字下，形色外診簡摩有「右关独见」四字
十二	十二	「郭元峰脉如」小注，应为正文，并宜加一「云」字
十三	十五—廿六	「苔亦有内热閉滯致脾气不行」二句，形色外診簡摩引脉如文作「苔因内热，致脾气閉滯不行」
十三	三—十	「停积于胃，故舌生苔」句，形色外診簡摩作「停积于内，故苔见于外」
三	八	「为」字，形色外診簡摩作「或」字
五	二	「月」字，形色外診簡摩作「日」字
下 十三—十四		引馬良伯文，自「凡风寒湿……盖温暑病」，与原文有乖，原文云：「风寒湿初中皮毛也，则为白苔，寒湿本阴邪，白为凉象，故苔色
廿二	上	

頁	上下	行	字	校	勘

頁	
上下	
行	
字	
校勘	

八

上

十一

倒五

十一

倒五

十二

十八

十三

四
十六—十七

十八

九

上下

七五

十四

倒四—八

十

上

九一

倒三
十四

「板」字当去，伤寒绪论板字連在上句

「即」字，为「急」字之誤

「紋」字，伤寒绪论作「分」字

「去」字，伤寒绪论作「起」字

「看」字下，伤寒绪论有一「刺」字

「即」字，伤寒绪论作「急」字

「舌黑」伤寒绪论作「黑苔」

「即」字，为「急」字之誤

「章虚谷」应为「张石頑」，下文所引出伤寒

绪论

「紫斑及紅斑」五字，伤寒绪论作「紫黑斑」

三字

「如」字，伤寒绪论作「及」字

「徧」字，应为「編」字

小注「丹皮」、「石膏」，医醇賸义作「丹

参」、「石斛」，并无「竹叶」

十三	十二	十一
下	上	下 上
四	十 八 七 九 三 二	一 十三 十 九 十四
一	倒七 倒十 倒七 倒六 三 四 倒二 一—七	一 十二 倒九 倒一—三 四 二 十六—廿
「苔」字上，空白处似漏一「截」字 「或」字，通俗伤寒论作「光」字 「腰子」二字上，通俗伤寒论有一「猪」字 「采子肉」，通俗伤寒论作「荔枝壳」 「細」字，通俗伤寒论作「紅」字 「之」字，通俗伤寒论作「已」字 「其古色黄黑」句，景岳全书作「其色亦黄黑」 「火」字，景岳全书作「水」字 「神」字，景岳全书作「形」字 「火」字上，景岳全书有一「非」字 「燥」字，感症宝筏无 「而」字上，感症宝筏尚有一「紫」字 「专」字，疑为「转」字之误 「若」字，感症宝筏作「多」字 「苔者，肾水凌心也」，感症宝筏作「无苔而潤者，虚寒积水也」 「生」字，察古辨症新法作「升」字		

頁

上下

行

字

校

勘

十三

下

五

倒九

「明」字，察古辨症新法作「气」字

十四

上

二

二

「腎」字，为「胃」字之誤

十五

上

二

七

「血」字，察古辨症新法作「气」字

十六

上

八

倒六

「心」字，疑为「星」字之誤

十七

下

一

六

「滑」字，似应为「且」字

十八

上

一

七—九

「腐」字「膩」字上，察古辨症新法均有一

十九

下

十

倒十

「厚」字

二十

下

一

倒四

「膩」字上，察古辨症新法尚有「若厚」二字

二十一

下

一

倒四

「滿」字，通俗伤寒论作「漸」字

二十二

下

一

倒四

「所」字，察古辨症新法作「有」字

二十三

下

一

七

「宜」字，为「宣」字之誤

二十四

上

四

六

「舌」字，察古辨症新法作「苔」字

二十五

上

四

八

「湿」字，察古辨症新法作「溫」字

二十六

上

四

十一

「如」字，为「为」字之誤

二十七

上

四

十四

「感」字疑有誤

二十八

下

十

倒四

「变」字，伤寒绪论作「并」字

卅二	卅一	卅	廿八	廿五	廿三	廿二	廿一	廿
上 下	上 下	上 下	上	上	下	上 下	上 下	上 下
十 三 七	二 十 六	一 十	五 十一	一 七	五 五	十三	一	一
十三	五 倒八	二 倒十	七 倒十一	三	三 十二	倒四	十三	四
「又」字，为「不」字之誤	「热也」二字上，診家直訣有一「有」字	「寒」字，察舌辨症新法作「热」字	「湿」字，感症宝筏作「温」字	「远」字，为「达」字之誤	「还」字，为「退」字之誤	「伏」字，匠悟作「化」字	「湿」字，为「温」字之誤	「变」字，为「恋」字之誤
「也」字，感症宝筏作「化」字	「凡」字，感症宝筏作「又」字	「因」字，为「固」字之誤	「阴也」二字下，感症宝筏尚有一段文字：	「或煩渴，或二便秘，或昏迷不省人事，脉則	散乱沉細伏代不等，舍脉凭舌，均屬里症」。	「症」字，感症宝筏作「经」字	「以」字，为「同」字之誤	「日」字，四診抉微作「口」字

頁	上下	行	字	校	勘
卅二 卅三 卅四 卅五	下 下 上 上	三 十二 三 八 十一 十三 十	倒一 倒四—五 八 倒三 十六 七 六	「泡」字，应为「炮」字 「烦躁」，感症宝筏作「躁扰」 「已涸」二字下，感症宝筏有「不治」二字 「阳」字，温热论作「伤」字 「虚」字，医源作「宿」字 「苔」字，医悟作「舌」字 「竭」字，形色外診簡摩作「涉」字	
卷三 第三編					
上 下	五 十三 十	倒二 十四 倒三 倒一 六 倒二	「小承气湯」，伤寒论作「小柴胡湯」 「半里」二字上，伤寒明理论有「或在」二字 「舌」字下，伤寒明理论有一「上」字 「舌上苔」下，伤寒明理论有一「者」字 「上」字，伤寒论作「下」字 「病」字，伤寒论作「若吐」二字		

二		三		四		五	
下		上		下		上	
七	十	八	一	十二	一	十二	一
四	七	八	四	二	二	十四	二
倒八	倒一	八	八	倒三	一	倒七	倒四
十五	倒一	二	二	十五	倒三	倒八	倒四
倒八	倒一	二	二	十五	倒三	倒八	倒四
「肺」字，金匱要略作「肝」字	「渴」字，金匱要略作「燥」字	「阴」字，伤寒第一书作「阳」字；形色外診 簡摩引此作「阴」字	「鋤」字，形色外診簡摩作「鋸」字	「江苏」，形色外診簡摩作「江南」	「火」字，形色外診簡摩作「邪」字	「能」字，形色外診簡摩作「欲」字	「右」字，形色外診簡摩作「左」字
「关脉」上，形色外診簡摩有一「寸」字	「也」字，形色外診簡摩作「死」字	「体」字，形色外診簡摩作「骸」字	「司」字，形色外診簡摩作「专」字	中有两「輸」字，形色外診簡摩均作「濡字」	「部」字，形色外診簡摩作「脉」字	「右」字，形色外診簡摩作「左」字	「牢」字，形色外診簡摩作「濇」字
「目赤」二字下，形色外診簡摩尚有「面白」，							

頁	五 六 七 八 九
上下	上 下 上 下 上 下
行	十三 三 十三 七 一 七 八 十 十一 八 五
字	六 五 廿 廿 一 一 三 十一 倒 十三 廿 五 十二 九
校勘	两尺不应」六字 「独」字，形色外診簡摩作「狂」字。 「紅泡或」三字，形色外診簡摩无 「或舌边缺如鋸齒者，皆」九字，形色外診簡摩无 「苔」字，感症宝筏作「洪」字 「未」字，感症宝筏作「惟」字 「蟬蛻」感症宝筏无此味 「泄」字，感症宝筏作「散」字 「防」字，感症宝筏作「妨」字 「寒」字，感症宝筏作「安」字 「桔」字，感症宝筏作「結」字 「湿」字，感症宝筏作「溫」字 「治」字，感症宝筏作「苔」字 「更」字，感症宝筏作「便」字 「刺」字，感症宝筏作「尖」字

十二			十一			十		
上			下			上		
下	上	下	上	下	上	下	上	下
四	七	六	一	十一	一	二	七	十二
一	倒九	倒三	倒八	倒二	十一	倒一	倒四	倒一
						十六		
						二一三		
						十一		
						廿一		

「势」字，感症宝筏作「热」字	「移」字，感症宝筏作「油」字	「由伤」二字下，伤寒指掌有一个「寒」字	「清」字，伤寒指掌作「情」字	「火」字，感症宝筏作「矢」字	「重」字，伤寒指掌作「舌」字	「痛」字，感症宝筏作「通」字	「入」字，感症宝筏作「属」字	「先」字，感症宝筏作「鲜」字	「先」字，感症宝筏作「宣」字	「参」字，伤寒指掌作「麦」字	「不」字，感症宝筏作「白」字	「鲜」字，伤寒指掌作「解」字	第一行末了，伤寒指掌有「郁金橘红」小注四字
「三」字，感症宝筏作「少」字	「肉」字，伤寒指掌作「内」字	「湿」字，伤寒指掌作「瘟」字，感症宝筏作											

頁	
上下	
行	
字	
校勘	「溫」字 「知」字，伤寒指掌作「如」字 「虛」字，感症宝筏作「伤」字 第六行之下，感症宝筏尚有一歌：三十九歌皆要訣，伏邪新感一希明，金針綉出凭君看，敢告同人仔細評。 「兼」字，疑为「黃」字之誤 「厚」字，医門棒喝无 「舌細」二字，似应改为「舌上細粒」四字 「阴」字，疑有誤 「枯」字，望診遵经作「乾」字 「如豆」句上，感症宝筏有一「形」字 「皆津枯液涸而冷」句，四診抉微作「皆津潤而冷」 「胃」字，四診抉微作「土」字 「骨」字，应为「帶」字

廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	
上	上	上	下	上	下
七	三	四	三	四	九
十二	十三	十四	三	十四	九
十六	倒二—三	八	十一—十二	倒七	倒六—七
「其証」二字，中国医学大辞典引文作「外皮」 「名」字上，中国医学大辞典引文有一「又字」 「廉泉开」三字，灵枢口问篇无 「息」字，似是「忽」字之誤 「此厥气逆上，脉气皆至也」二句，灵枢口问篇作「此厥逆走上，脉气聾至也」 「今」字，应为「令」字 第一节下脱一节目：「舌病簡效方」 「重」字，似为「舌」字之誤 「少白」二字，三因方作「头小白」三字 「緩」字，灵枢寒热病篇作「纵」字 「筋经云」应为「素問繆刺论云」 「阴」字应为「阳」字 「又云」应为「经筋云」 「支痛」下，经筋篇有一「及」字 「舌卷」二字，经筋篇无					

頁	上下	行	字	校	勘
廿七	下	五	二	「二」字，应为「三」字	

卷四 目录

二	上	倒	三个「舌」字，均应为「苔」字
十二、十三	十四		

卷四 第四編

一	上	下	倒	
七	八	九	十一	十二
十三	十一	十二	十七	廿
			十四	十四
			倒八	十八
「白」字下，徐灵胎舌鉴总论有一「必」字 「苔」字，舌鉴总论作「舌」字 「是以」二字下，舌鉴总论有「凡治」二字 「此邪」二字下，舌鉴总论有一「热」字 「分」字，舌鉴总论作「外」字 「之苗」二字下，舌鉴总论尚有「心属南方火」五字 「毛」字，舌鉴总论作「皮」字				

頁	上下	行	字	校勘
十五	上	十六	九—十二	「兼有表者」句，重复衍文，应去 「传入」二字，伤寒舌鉴作「初传」 小注「则服」二字，应倒乙为「服则」 「下之」二字下，四诊抉微引正义文尚有三句：「若见小黑点，是邪将入藏也，调胃承气汤下之」。 「胁」字，伤寒论作「膈」字 「热」字上，舌鉴总论有一「邪」字 「钱」字，应为「镜」字 「手厥阴三焦」句，疑有誤，伤寒舌鉴无 「手」「足」及「三焦」「肝经」等字 「舌」字，伤寒舌鉴作「膜」字 「肿」字，伤寒舌鉴作「膜」字 「大熟」之下，应加一「地」字 「太过」二字，与舌鉴作「交衰」者不符，疑有誤
十八	上	五	十一—十二	
廿	上	八	倒四—六	
廿一	下	七	倒五	
廿三	上	四	倒五	
廿五	上	五	八—十二	
廿六	下	十一	倒三—四	

卷五

廿七
廿九

下 上 下
四 十一 十一

十三
倒五
倒二
六
十六

「若挾痰者」以下，是周澂之补注之文。
「多」字，形色外診簡摩作「总」字
「热」字，形色外診簡摩作「气」字
「热」字，四診挾微引正义文作「痛」字
「属」字，四診挾微作「有」字

一 二 三 四

上 下 下 下 上
五 六 九 二 一
十四

倒九
八—九
十一
倒二—三
四—六
倒八
八—十

「湿」字，伤寒舌鉴作「经」字
「黑苔」二字，伤寒舌鉴无
「黑点」二字下，伤寒绪论尚有「纹裂干燥」四字
「盛膈」二字，伤寒舌鉴作「复盛」。或「膈于」二字倒乙为「于膈」，则与上下文亦通。
「两下之」句疑有誤，伤寒舌鉴作「迭用」
「风有」二字上，形色外診簡摩有一「或」字
「大生黄」应为「生大黄」

頁	六 七 八 九 十 十一
上下	上 下 上 下 上 下 上 下 上 下
行	十一 七 一 十 十一 倒五 倒六 倒一 九 三十 三八
字	十八 十三 九 五 倒七 六 六 四 倒三 十六 九 二 三 二 一 三—四
校勘	「肉」字疑有誤 「纵」字，舌鑑总论作「总」字 「钱」字，应为「鏡」字 「甚」字，伤寒緒论作「妄」字 「三白湯」三字上，伤寒緒论有「人參」二字 「钱」字，应为「鏡」字 「石」字，应为「舌」字 「根」字，应为「尖」字 「紅」字，疑衍文，似可去 「溫」字，伤寒舌鑑作「湿」字 「岑」字，应为「苓」字 「内」字，伤寒舌鑑作「短」字 「絡」字，形色外診簡摩作「脉」字。此下两句是周澂之的补注。 「内」字，伤寒舌鑑作「色」字 「調胃」二字，伤寒舌鑑作「大」字

頁	上下	行	字	校勘
十九 廿	下 上	七 一	倒五—六 倒四	「咳痰」二字，伤寒舌鉴作「味浓」 「問」字，当是「間」字之誤 「雨」字，当是「而」字之誤 「此舌」句下，医悟原文尚有二句：「感受不正之气，蒸热不解也」。 「竭」字，形色外診蘭摩作「涉」字 「轻則子殞，重則母伤」句，伤寒舌鉴作「轻則母病，重則子伤」。 「于舌」二字下，伤寒舌鉴尚有四句：「面以候母，舌以候子，色泽则安，色败则毙」。 「舌面」二字下，漏「俱青，母子皆死，舌面」八字 「損」字，应为「殞」字 「青」字，应为「赤」字
廿二	下	十	二	
廿三	下	十一 十二	倒五 十三—廿	
廿四	上	六 九	四 九	

卷六 第五編

一		二		三		四	
下	上	下	上	下	上	下	上
十一	一	三	四	九	十	四	一
十六	九	十九	一	倒四	倒五	六	倒八
倒六	倒六	倒六	倒六	倒六	倒六	倒六	倒六
「致」字，伤寒金鏡录作「制」字	「木」字，伤寒金鏡录作「水」字	「則」字下，伤寒金鏡录有一「反」字	「经」字，伤寒金鏡录作「筋」字	「大」字下，伤寒金鏡录有一「肠」字	「五死」二字上，伤寒金鏡录有一「但」字	「誠」字，伤寒金鏡录作「承」字	「苏叶」，石室秘錄作「荷叶」
「黑」字，石室秘錄作「紅」字	「光」字，石室秘錄作「尖」字	「枳实」二字，石室秘錄作「之柴」	「水藏」二字下，四圣心源有一「之」字	「胃」字，四圣心源作「土」字	「肺」字，四圣心源作「金」字	「内」字，四圣心源作「白」字	

十 十				九				八 七							
十一															
上 上 下				上				下				上 上			
十二 十一 十四 五				十三 六				六 四 三				十二 十一 十二 二			
四 倒六 一 一				十 四 倒七				三 四 三				十一 十五 六 三			

「及」字，形色外診簡摩引文作「而」字
 「少津者」句下，医源尚有一段文字：「燥热
 伤肺津也，宜轻清泄热，为其上者上之也」。
 「微燥」二字下，医源尚有一段文字：「以燥
 属金，微苦能胜之也」。
 「透热」二字下，医源尚有一句：「不使湿邪
 遏热为要」。
 「温」字下，医源有「燥之」二字
 「润」字，医源作「滑」字
 「郁极」二字下，医源尚有一句：「毒延于
 口」。
 「飲」字疑有誤
 「入」字，医源作「人」字
 「虚」字，医源作「宿」字
 「为」字，医源作「如」字
 「神」字，診家直訣作「肺」字
 「結」字，診家直訣作「极」字
 「生者」二字下，診家直訣尚有「光平如鏡，

頁	上下	行	字	校勘
十一	下	二	六 倒七	乃凶「六」字 「昔」字，景岳全书作「在」字 「吐」字，景岳全书作「吃」字 「有」字，景岳全书作「用」字 末了小注「上录金鏡录」，应为「上录景岳全书」
十二	上	十一	三 十一—十四	「十全」二字上，感症宝筏有一「用」字 「黑中舌辨」应为「舌中黑辨」 「壬」字，应为「士」字 「編」字，应为「徧」字 「編」字，应为「徧」字 「蒲黄」下，似漏一味「干姜」 「于」字，疑为「如」字之誤
十四	上	四	二	
十五	下	五	十八 倒三	
十六	上	十四	十九 倒一	武进 丁光迪 校勘