

金匱要略方論



36



样 本 库

論方略要匱金

述 景 仲 張 漢

集 校 王 任 夏

人民卫生出版社

一九六三年·北京

53413

出版說明

本書是据商务印書館 1955 年出版的《新編金匱要略方論》排印的。

原本系用《叢書集成》旧版重印，而《集成》本原据《古今医統正脈全書》本排版。商务印書館在重印之前，复据《医統》本，并参考明万历趙开美本及涵芬樓藏明刊本，予以校对。属于排印錯誤的，均加改正；凡与各本互有出入的，于校勘后記列表說明。

現在，我們又进行了标点，整理了目录，以便于讀者閱讀參考。

人 民 卫 生 出 版 社

1963 年 1 月

金匱要略方論序

張仲景爲《傷寒雜病論》合十六卷，今世但傳《傷寒論》十卷，雜病未見其書，或于諸家方中載其一二矣。翰林學士王洙在館閣日，于蠹簡中得仲景《金匱玉函要略方》三卷：上則辨傷寒，中則論雜病，下則載其方，并序婦人，乃錄而傳之士流，才數家耳。嘗以對方証對者，施之于人，其效若神。然而或有証而无方，或有方而无証，救疾治病其有未備。國家詔儒臣校正醫書，臣奇先校定《傷寒論》，次校定《金匱玉函經》，今又校成此書，仍以逐方次于証候之下，使倉卒之際，便于檢用也。又采散在諸家之方，附于逐篇之末，以廣其法。以其傷寒文多節略，故斷自雜病以下，終于飲食禁忌，凡二十五篇，除重複合二百六十二方，勒成上、中、下三卷，依旧名曰：《金匱方論》。臣奇嘗讀《魏志·華佗傳》云：出書一卷曰：“此書可以活人。”每觀華佗凡所療病，多尚奇怪，不合聖人之經。臣奇謂活人者，必仲景之書也。大哉！炎農聖法，屬我盛旦，恭惟主上不承大統，撫育元元，頒行方書，拯濟疾苦，使和氣盈溢，而萬物莫不尽和矣。

太子右贊善大夫臣高保衡、尙書都官員外郎臣孫奇、尙書司封郎中充秘閣校理臣林億等傳上。

大明應天徐鉉謹按：《文獻通考》二百三十二卷中《金匱玉函經》八卷條下，晁氏曰：漢張仲景撰，晉王叔和集。設答問雜病形証脈理，參以療治之方，仁宗朝王洙得于館中，用之甚效，合二百六十二方。据此，并前林序云依旧名曰：《金匱方論》，則王洙館中所得；名曰：《金匱玉函要略方》，系五代時改名耳。所以《通考》只云：《金匱玉函經》也。是《金匱玉函經》元時已無矣。夫《金匱玉函經》八卷，東漢張仲景祖書名也。《金匱方論》三卷，《傷寒論》十卷，似西晉王叔和選集撰次后，俗傳書名也。若《金匱玉函要略方》，五代及宋相沿書名也。今單名《金匱要略》而去其“玉函”二字，愈遠而愈失其真矣。又據皇甫謐《甲乙》云：仲景論廣伊尹湯液，用之多驗；王叔和撰次仲景選論甚精，指事施用，即今俗所分《傷寒論》、《金匱要略》是也。孫真人《千金》云：江南諸師，秘仲景傷寒方法不傳，是叔和選論，思邈亦未曾研也。惟文潞公《藥准》云：仲景為羣方之祖。宋奉議《活人書》云：古人治傷寒有法，治雜病有方，葛稚川作《肘后》，孫真人作《千金》，陶隱居作《集驗》，玄晏先生作《甲乙》，其論傷寒治法者，長沙太守一人而已。華佗指張長沙《傷寒論》為“活人書”，昔人又以“金匱玉函”名之，其重于世如此。然其言雅，非精于經絡，不能曉會。若孫思邈則未能詳仲景之用心者，是宋時才分《傷寒論》、《金匱要略》為二書也。成聊攝《明理論》云：自古諸方歷歲浸遠，難可考評，惟仲

景之方，最为众方之祖。是以仲景本伊尹之法，伊尹本神农之經，医軼之中，特为樞要，参今法古，不越毫末，乃大圣之所作也。刘河間《原病式》云：自黄帝之后二千五百有余年，有仲景方論一十六卷，使后之学者有可依据，文亦玄奥，以致今之学者尚为难焉。故今人所习，皆近代方論而已，但究其末而不求其本。唯近世朱奉議多得其意，遂以本仲景之論，而兼諸書之說，作《活人書》。其言直，其类辯，使后学者易为寻檢施行，故今之用者多矣。据河間十六卷之言，比时仲景書尚未分伤寒、杂病为二門也。或《金匱玉函經》八卷，坊間分作十六卷，亦未可知。故东垣《内外伤辯惑論》曰：易張先生云：仲景药为万世法，号羣方之祖，治杂病若神，后之医者，宗《內經》法，学仲景心，可以为师矣。王海藏《此事难知》云：余讀医書几十載矣，所仰慕者，仲景一書为尤。然讀之未易洞达其趣，欲得一师指之，遍國中无有能知者。故于《医壘元戎》云：折中湯液，万世不易之法，当以仲景为祖。又云：《金匱玉函要略》、《伤寒論》皆張仲景祖神农、法伊尹、体箕子而作也。唐宋以来，如孫思邈、葛稚川、朱奉議、王朝奉輩，其余名医虽多，皆不出仲景書。又湯液本草于孫、葛、朱、王外，添王叔和、范汪、胡洽、錢仲阳、成无己、陈无擇云，其議論方定，增減变易，千狀万态，无有一毫不出于仲景者；洁古張元素、其子張璧、东垣李明之，皆祖張仲景湯液，惜乎世莫有能知者。又云：仲景广湯液为大法，晋宋以来号

名醫者，皆出于此。又按丹溪《局方發揮》或問曰：仲景治傷寒一百一十三方，治雜病《金匱要略》二十有三門，何也？答曰：仲景諸方，實萬世醫門之規矩准繩也。后之欲為方圓平直者，必于是而取則焉。曰：《要略》之方，果足用乎？曰：天地氣化無窮，人身之病亦變化無窮，仲景之書載道者也。醫之良者，引例推類，可謂無窮之應用。借令略有加減修合，終難踰越矩度。又曰：圓機活法，《內經》具舉，與經意合者，仲景書也。仲景因病以制方，局方制藥以俟病，據數家說，是元末及我國朝初醫家方分傷寒、雜病為二家也。只因聊攝七十八歲撰成《明理論》，八十歲時注完《傷寒論》，未暇注《金匱論》，所以俗醫分為二門，致今時眾口一辭，謂仲景能治傷寒而不能療雜証也。冤哉！余素慨《金匱方論》與《傷寒論》睽離孤處，及《注解傷寒論》又《明理論》乖散失羣，已近五百年。因謀諸新安師古吳君校壽一梓，成濟睽而得會遇，庶業醫者，弗致得此失彼，各自專門為粗陋，又冀華劍復合，昌鏡再圓，天作之合云爾。

萬曆戊戌孟夏吉日匿迹市隱逸人謹識。

大明应天徐鎔按：林億序云：二十五篇，除重复，合二百六十二方，于是就古本、新本篇下所注之数，通計之止得二百四十六，然果实菜谷篇下古本、新本俱闕注数，恐校正时序数如此。篇注如彼，忽略脱誤也。并此脱落一十二首，亦仅得二百五十八耳！較之犹欠四首及数目录，亦二百五十八。其中重出者一十六方，脱落者一十九方，若腹滿証大承气湯，宿食証却云見前。瘧病中水气篇防己黃芪湯，附方后却云見风湿中，乃卷內之重也。因去之。湿証中白朮附子湯，中风篇朮附湯、八味圓，妇人杂病篇腎气圓，品味分兩虽同，方名則異。因存之。其厚朴三物湯、厚朴大黃湯、小承气湯，方名虽異，药味并同，分兩参差，神妙莫測，非叔和不能集，仲景不能述，又非今世医者所能驟而窺也，因贊之。若黃連粉、梨蘆甘草湯、附子湯、阳旦湯、膠姜湯，卷注云虽未見，則照杏子湯目录而补之。苦参湯，卷中未注未見，恐校正时誤脱也。因取龐安时及《千金》等而补附遺。若麻黃杏仁薏苡甘草等湯一十三方，則据卷中所有而添目录，以实除重复，合二百六十二方之数也。其寒疝附方烏头湯注云：方見上。上系烏头煎、烏头桂枝湯，若烏头湯載在中风篇，因未覩《外台》，只得存其疑也。痰飲篇及妇人杂病篇小青龍湯，并云見肺癰中，乃是小青龍加石膏湯也。其小青龍湯方，則見咳嗽中。若五勞斷齒等証形狀病源，間采《巢氏病源》，另为一篇，附于卷末，以便初学私淑集注之意也。或曰：林億等校勘，脱誤重复，焉能为有？余

曰：《活人書》奉議公之手筆也，方尙重复，况此論校者非一人，正者非一手，仲景沒而微言絕，虽有《病源》、《千金》，辭愈煩而理愈晦，正医道如縷之秋也。奈校方論時，医学才开，胸中无主，又且术业素異，居养不同，或执己私，失于商較，焉知不无差訛哉！余今億度于千載之后，聊附鄙語，以俟明哲更为正之。若篇注論几首，脉証几条，台头高下，有圈无圈，則仍旧本所書云。

时万历乙酉夏至日識。

金匱要略方論目錄

卷上	1
臟腑經絡先後病脈証第一	1
痿濕喝病脈証第二	4
栝樓桂枝湯(4) 葛根湯(5) 大承氣湯(5) 麻黃加 朮湯(6) 麻黃杏仁薏苡甘草湯(6) 防己黃芪湯(7) 桂枝附子湯(7) 白朮附子湯(7) 甘草附子湯(7) 白虎人參湯(8) 一物瓜蒂湯(8)	
百合狐惑陰陽毒病証治第三	8
百合知母湯(9) 滑石代赭湯(9) 百合鴉子湯(9) 百合地黃湯(10) 百合洗方(10) 栝樓牡蠣散(10) 百 合滑石散(10) 甘草瀉心湯(11) 苦參湯(11) 雄黃熏 方(11) 赤小豆當歸散(11) 升麻鳖甲湯(11)	
痺病脈証并治第四	12
鳖甲煎丸(12) 白虎加桂枝湯(13) 蜀漆散(13)	
附方	13
牡蠣湯(13) 柴胡去半夏加栝樓湯(13) 柴胡桂姜 湯(14)	
中風歷節病脈証并治第五	14
侯氏黑散(14) 風引湯(15) 防己地黃湯(15) 頭風摩 散(15) 桂枝芍藥知母湯(16) 烏頭湯(16) 矾石湯(16)	
附方	17
續命湯(17) 三黃湯(17) 朮附湯(17) 八味丸(17) 越婢加朮湯(18)	
血痹虛勞病脈証并治第六	18
黃芪桂枝五物湯(18) 桂枝加龍骨牡蠣湯(19) 天雄	

散(19) 小建中湯(20) 黃芪建中湯(20) 薯蕷圓(20)	
酸棗湯(21) 大黃蠶虫圓(21)	
附方·····	21
炙甘草湯(21) 獼肝散(21)	
肺痿肺癰咳嗽上氣病脈證治第七·····	22
甘草干姜湯(22) 射干麻黃湯(23) 皂莢丸(23) 厚朴	
麻黃湯(23) 澤漆湯(23) 麥門冬湯(24) 葶藶大棗瀉	
肺湯(24) 桔梗湯(24) 越婢加半夏湯(24) 小青龍加	
石膏湯(25)	
附方·····	25
甘草湯(25) 生姜甘草湯(25) 桂枝去芍藥加皂莢	
湯(25) 桔梗白散(25) 葶藶湯(26)	
奔豚氣病脈證治第八·····	26
奔豚湯(26) 桂枝加桂湯(27) 茯苓桂枝甘草大棗	
湯(27)	
胸痹心痛短氣病脈證治第九·····	27
栝樓薤白白酒湯(28) 栝樓薤白半夏湯(28) 枳實薤白	
桂枝湯(28) 人參湯(28) 茯苓杏仁甘草湯(28) 橘皮	
枳實生姜湯(29) 薏苡附子散(29) 桂枝生姜枳實	
湯(29) 赤石脂圓(29) 九痛圓(29)	
腹滿寒疝宿食病脈證治第十·····	30
厚朴七物湯(30) 附子粳米湯(31) 厚朴三物湯(31)	
大柴胡湯(31) 大建中湯(31) 大黃附子湯(32) 赤	
圓(32) 烏頭煎(32) 當歸生姜羊肉湯(32) 烏頭桂枝	
湯(33) 桂枝湯(33)	
附方·····	33
柴胡桂枝湯(33) 走馬湯(34) 瓜蒂散(34)	
卷中·····	35
五臟風寒積聚病脈證并治第十一·····	35

麻子仁丸(36) 甘草干姜茯苓白朮湯(36)	
痰飲咳嗽病脈証并治第十二	37
茯苓桂枝白朮甘草方(38) 甘遂半夏湯(38) 十棗湯(39) 大青龍湯(39) 小青龍湯(39) 木防己湯(40) 木防己加茯苓芒硝湯(40) 澤瀉湯(40) 厚朴大黃湯(40) 小半夏湯(40) 防己椒目葶藶大黃圓(40) 小半夏加茯苓湯(41) 五苓散(41)	
附方	41
茯苓飲(41) 桂苓五味甘草湯(42) 苓甘五味姜辛湯(42) 桂苓五味甘草去桂加干姜細辛半夏湯(42) 苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯(43) 苓甘五味加姜辛半夏大黃湯(43) 小半夏茯苓湯(43)	
消渴小便利淋病脈証并治第十三	43
文蛤散(44) 栝樓瞿麥圓(44) 蒲灰散(44) 滑石白魚散(45) 茯苓戎鹽湯(45) 豬苓湯(45)	
水氣病脈証并治第十四	45
越婢湯(48) 防己茯苓湯(48) 甘草麻黃湯(48) 麻黃附子湯(49) 杏子湯(49) 黃芪芍藥桂枝苦酒湯(49) 桂枝加黃芪湯(50) 桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯(50) 枳朮湯(50)	
黃疸病脈証并治第十五	51
茵陳蒿湯(52) 硝石矾石散(52) 梔子大黃湯(53) 豬膏發煎(53) 茵陳五苓散(53) 大黃硝石湯(53)	
附方	54
麻黃醇酒湯(54)	
驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈証治第十六	54
桂枝救逆湯(55) 半夏麻黃圓(55) 柏叶湯(55) 黃土湯(55) 瀉心湯(56)	
嘔吐噦下利病脈証治第十七	56

茱萸湯(56) 半夏瀉心湯(57) 黃芩加半夏生薑湯(57)
猪苓散(57) 四逆湯(57) 小柴胡湯(58) 大半夏湯(58)
大黃甘草湯(58) 茯苓澤瀉湯(58) 文蛤湯(59) 半夏
干姜散(59) 生薑半夏湯(59) 橘皮湯(59) 橘皮竹茹
湯(59) 桂枝湯(60) 小承氣湯(61) 桃花湯(61) 白
頭翁湯(61) 梔子豉湯(61) 通脈四逆湯(62) 紫參
湯(62) 訶梨勒散(62)

附方……………62

黃芩湯(62)

瘡瘍腸痛浸淫病脈証并治第十八……………63

薏苡附子敗醬散(63) 大黃牡丹湯(63) 王不留行
散(64) 排膿散(64) 排膿湯(64) 黃連粉(64)

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘虫病脈証治第十九……65

藜蘆甘草湯(65) 鵝屎白散(65) 蜘蛛散(65) 甘草粉
蜜湯(65) 烏梅圓(66)

卷下……………67

婦人妊娠病脈証并治第二十……………67

桂枝茯苓丸(67) 附子湯(67) 芎歸膠艾湯(68) 當
歸芍藥散(68) 干姜人參半夏丸(68) 當歸貝母苦參
丸(68) 葵子茯苓散(68) 當歸散(69) 白朮散(69)

婦人產后病脈証治第二十一……………69

枳實芍藥散(70) 下瘀血湯(70) 陽旦湯(71) 竹葉
湯(71) 竹皮大圓(71) 白頭翁加甘草阿膠湯(71)

附方……………71

三物黃芩湯(72) 內補當歸建中湯(72)

婦人雜病脈証并治第二十二……………72

半夏厚朴湯(73) 甘草小麥大棗湯(73) 溫經湯(74)
土瓜根散(74) 旋復花湯(75) 膠姜湯(75) 大黃甘遂
湯(75) 抵當湯(75) 礪石丸(75) 紅藍花酒(76) 腎

氣悶(76) 蛇床子散(76) 銀牙湯(77) 小兒疳虫蝕齒方(77)

雜方第二十三……………77

四時加減柴胡飲子(77) 長罪訶梨勒圓(78) 三物备急丸(78) 紫石寒食散(78) 救卒死方共五方(78) 救卒死而壯熱者方(79) 救卒死而目閉者方(79) 救卒死而张口反折者方(79) 救卒死而四肢不收失便者方(79) 救小兒卒死而吐利不知是何病方(79) 治尸蹇方共二方(79) 救卒死客忤方二方(79) 救自縊死方(80) 療中暈方(80) 救溺死方(81) 治馬墜及一切筋骨損方(81)

禽兽鱼虫禁忌并治第二十四……………81

治自死六畜肉中毒方(82) 治食郁肉漏脯中毒方(82) 治黍米中藏干脯食之中毒方(83) 治食生肉中毒方(83) 治六畜鳥兽肝中毒方(83) 治馬肝毒中人未死方二方(83) 治食馬肉中毒欲死方二方(83) 治噉蛇牛肉食之欲死方三方(84) 治食牛肉中毒方(84) 治食犬肉不消成病方(84) 治食鳥兽中筋肉毒方(85) 治食鱸不化成瘕病方二方(86) 治食魚后食毒两种煩亂方(86) 治食鱖鯪魚中毒方(86) 治食鱗中毒方二方(86)

果实菜谷禁忌并治第二十五……………87

治食諸果中毒方(87) 治食諸菌中毒悶亂欲死方(87) 治食楓柱菌而哭不止方(87) 治誤食野芋煩毒欲死方(87) 治誤食蜀椒閉口者方(87) 食躁或躁方(89) 治誤食鈎物杀人解之方(89) 治誤食水苳蓉中毒方(89) 治食芹菜中龙精毒方(89) 治食苦瓠中毒方(89) 治凡飲食中毒方共二方(90) 食食食多不消心腹堅滿治之方(90) 通除諸毒藥(90)

卷 上

脏腑經絡先后病脈証第一

论十三首 脉証二条

問曰：上工治未病，何也？師曰：夫治未病者，見肝之病，知肝傳脾，當先實脾，⁴四季脾王不受邪，即勿補之。⁵中⁶工不曉相傳，見肝之病，不解實脾，惟治肝也。夫肝之病，補用酸，助用焦苦，益用甘味之藥調之。酸入肝，焦苦入心，甘入脾，脾能傷腎；腎氣微弱，則水不行；水不行，則心火氣盛則傷肺；肺被傷，則金氣不行；金氣不行，則肝氣盛，則肝自愈，此治肝補脾之要妙也。肝虛則用此法，實則不在用之。經曰：虛虛實實；補不足，損有余。是其義也。余藏準此。

2. 夫人稟五常，因風氣而生長，風氣雖能生萬物，亦能害萬物。如水能浮舟，亦能覆舟。若五臟元貞通暢，⁷人即安和，⁸客氣邪風，中人多死。千般疾難，不越三條：一者，經絡受邪，入臟腑為內所因也；二者，四肢九竅，血脈相傳，壅塞不通，為外皮膚所中也；三者，房室金刃，蟲獸所傷，以凡詳之，病由都盡。若人能養慎，不令邪風干⁹忤經絡，適中經絡，未流傳臟腑，即醫治之，四肢才覺重滯，即導引吐納，針灸膏摩，勿令九竅閉塞。更能無犯王法，禽獸災傷，房室勿令竭之，服食節

其冷、热、苦、酸、辛、甘，不遺形体有衰，病則无由入其腠理。腠者，是三焦通会元貞之处，为血气所注；理者，是皮肤臟腑之文理也。

問曰：病人有气色見于面部，願聞其說。師曰：鼻头色青，腹中痛，苦冷者死——云：腹中冷苦痛者死。鼻头色微黑者，有水气；色黄者，胸上有寒；色白者，亡血也。設微赤非时者死。其目正圓者病，不治。又色青为痛，色黑为劳，色赤为风，色黄者便难，色鮮明者有留飲。

師曰：病人語声寂然，喜驚呼者，骨节間病，語声喑喑然不彻者，心膈間病；語声啾啾然細而長者，头中病——作痛。

師曰：息搖肩者，心中坚；息引胸中上气者咳；息張口短气者，肺痿唾沫。

師曰：吸而微数，其病在中焦，实也，当下之即愈，虛者不治。在上焦者，其吸促；在下焦者，其吸远。此皆难治。呼吸动摇振振者，不治。

師曰：寸口脉动者，因其王时而动，假令肝王色青，四时各隨其色。肝色青而反色白，非其时色脉，皆当病。

問曰：有未至而至，有至而不至，有至而不去，有至而太过，何謂也？師曰：冬至之后，甲子夜半少阳起，少阳之时阳始生，天得温和。以未得甲子，天因温和，此为未至而至也；以得甲子而天未温和，为至而不至也；以得甲子而天大寒不解，此为至而不去也；以得甲子而天温如盛夏五六月时，此为至而太过也。

师曰：病人脉浮者在前，其病在表；浮者在后，其病在里。腰痛背强不能行，必短气而极也。

問曰：經云：厥阳独行何謂也？师曰：此为有阳无阴，故称厥阳。

問曰：寸脉沉大而滑，沉則为实，滑則为气。实气相搏，血气入臟即死，入腑即愈，此为卒厥。何謂也？师曰：唇口青，身冷，为入臟即死；如身和，汗自出，为入腑即愈。

問曰：脉脫入臟即死，入腑即愈，何謂也？师曰：非为一病，百病皆然。譬如浸淫瘡，从口起流向四肢者，可治；从四肢流来入口者，不可治；病在外者，可治；入里者，即死。

問曰：阳病十八何謂也？师曰：头痛、项、腰、脊、臂、脚掣痛。阴病十八何謂也？师曰：咳、上气、喘、噎、咽、腸鳴脹滿、心痛拘急。五臟病各有十八，合为九十病；人又有六微；微有十八病，合为一百八病，五劳、七伤、六极、妇人三十六病，不在其中。清邪居上，濁邪居下，大邪中表，小邪中里，繫飪之邪，从口入者，宿食也。五邪中人，各有法度，风中于前，寒中于暮，湿伤于下，霧伤于上，风令脉浮，寒令脉急，霧伤皮肤，湿流关节，食伤脾胃，极寒伤經，极热伤絡。

問曰：病有急当救里、救表者，何謂也？师曰：病，医下之，續得下利清谷不止，身体疼痛者，急当救里，后身体疼痛，清便自調者，急当救表也。

夫病痼疾，加以卒病，当先治其卒病，后乃治其痼。

疾也。

师曰：五臟病各有得者愈；五臟病各有所惡，各隨其所不喜者为病。病者素不应食，而反暴思之，必发热也。

夫諸病在藏欲攻之，当隨其所得而攻之，如渴者与猪苓湯，余皆仿此。

痙濕暍病脈証第二

论一首 脉証十二条 方十一首

太阳病，发热无汗，反惡寒者，名曰剛痙。一作瘧，余同太阳病，发热汗出，而不惡寒，名曰柔痙。太阳病，发热脉沉而細者，名曰痙，为难治。太阳病，发汗太多，因致痙。夫风病下之則痙，复发汗必拘急。瘡家虽身疼痛，不可发汗，汗出則痙。

病者，身热足寒，頸項强急，惡寒，时头热，面赤目赤，独头动摇，卒口噤，背反張者，痙病也。若发其汗者，寒湿相得，其表益虛，即惡寒甚，发其汗已，其脉如蛇一云：其脉澹澹。暴腹脹大者，为欲解，脉如故；反伏弦者痙。夫痙脉，按之紧如弦，直上下行一作：筑筑而弦。

《脉經》云：痙家其脉伏紧，直上下。

痙病有灸瘡，难治。

太阳病，其証备，身体强，几几然脉反沉迟，此为痙。栝蒌桂枝湯主之。

〔栝蒌桂枝湯〕方

栝蒌根二两 桂枝三两 芍药三两 甘草二两 生
姜三两 大枣十二枚

右六味，以水九升，煮取三升，分温三服，取微汗。
汗不出，食顷啜热粥发。

太阳病，无汗，而小便反少，气上冲胸，口噤不得
語，欲作刚痙，葛根湯主之。

〔葛根湯〕方

葛根四两 麻黄三两，去节 桂二两，去皮 芍药二两
甘草二两，炙 生姜三两 大枣十二枚

右七味，咀咬，以水一斗，先煮麻黄葛根減二升，
去沫，內諸药，煮取三升，去滓，温服一升，复取微似
汗，不須啜粥。余如桂枝湯法將息及禁忌。

痙为病一本痙字上有剛字，胸滿口噤，卧不着席，脚攣
急，必齮齒，可与大承气湯。

〔大承气湯〕方

大黃四两，酒洗 厚朴半斤，炙，去皮 枳实五枚，炙
芒硝二合

右四味，以水一斗，先煮二物取五升，去滓；內大
黃煮取二升，去滓；內芒硝，更上火微一二沸，分温再
服，得下止服。

太阳病，关节疼痛而煩，脉沉而細一作緩者，此名
湿痺。《玉函》云：中湿。湿痺之候，小便不利，大便秘，但
当利其小便。 湿家之为病，一身尽疼一云：疼煩，发热
身色如熏黃也。 湿家，其人但头汗出，背强欲得被
复向火，若下之早則噦，或胸滿小便不利，一云利。舌上

如胎者，以丹田有热，胸上有寒，渴欲得飲而不能飲，則口燥煩也。 湿家，下之，額上汗出，微喘，小便利——云不利者死；若下利不止者亦死。 风湿相搏，一身尽疼痛，法当汗出而解，值天阴雨不止，医云：此可发汗。汗之病不愈者，何也？盖发其汗，汗大出者，但风气去，湿气在，是故不愈也。若治风湿者，发其汗，但微微似欲出汗者，风湿俱去也。 湿家病，身疼发热，面黄而喘，头痛鼻塞而煩，其脉大，自能飲食，腹中和无病，病在头中寒湿，故鼻塞，内葯鼻中則愈。《脉經》云：病人喘。而无“湿家病”以下至“而喘”十三字。 湿家，身煩疼，可与麻黄加朮湯发其汗为宜，慎不可以火攻之。

〔麻黄加朮湯〕方

麻黄三两，去节 桂枝二两，去皮 甘草一两，炙 杏仁七十个，去皮尖 白朮四两

右五味，以水九升先煮麻黄，減二升，去上沫，内諸葯煮取二升半，去滓，温服八合，复取微似汗。

病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，名风湿。此病伤于汗出当风，或久伤取冷所致也。可与麻黄杏仁薏苡甘草湯。

〔麻黄杏仁薏苡甘草湯〕方

麻黄去节，半两，湯泡 甘草一两，炙 薏苡仁半两 杏仁十个，去皮尖，炒

右剉麻豆大，每服四錢，水一盞半，煮八分，去滓温服，有微汗避风。

风湿脉浮，身重汗出惡风者，防己黃芪湯主之。

〔防己黃芪湯〕方

防己一兩 甘草半兩，炒 白朮七錢半 黃芪一兩一分，去芦

右剉麻豆大，每抄五錢七，生姜四片，大棗一枚，水盞半，煎八分，去滓溫服，良久再服。喘者加麻黃半兩，胃中不和者加芍藥三分，氣上沖者加桂枝三分，下有陳寒者加細辛三分。服後當如蟲行皮中，從腰下如冰，後坐被上，又以一被繞腰下，溫令微汗，差。

傷寒八九日，風濕相搏，身體疼煩，不能自轉側，不嘔不渴，脈浮虛而澀者，桂枝附子湯主之；若大便堅，小便自利者，去桂加白朮湯主之。

〔桂枝附子湯〕方

桂枝四兩，去皮 生姜三兩，切 附子三枚，炮去皮，破八片 甘草二兩，炙 大棗十二枚，擘

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，分溫三服。

〔白朮附子湯〕方

白朮二兩 附子一枚半，炮去皮 甘草一兩，炙 生姜一兩半，切 大棗六枚

右五味，以水三升，煮取一升，去滓，分溫三服。一服覺身癢，半日許再服，三服都盡，其人如冒狀，勿怪，即是朮附并走皮中，逐水氣未得除故耳。

風濕相搏，骨節疼煩，掣痛不得屈伸，近之則痛劇，汗出短氣，小便不利，惡風不欲去衣，或身微腫者，甘草附子湯主之。

〔甘草附子湯〕方

甘草二兩，炙 附子一枚，炮去皮 白朮二兩 桂枝四兩 去皮

右四味，以水六升，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服，初服得微汗則解。能食汗出復煩者，服五合。恐一升多者，服六七合為妙。

太陽中暈，發熱惡寒，身重而疼痛，其脈弦細芤遲，小便已，洒洒然毛聳，手足逆冷，小有勞，身即熱，口前干板齒燥，若發其汗，則其惡寒甚；加溫針則發熱甚；數下之則淋甚。

太陽中熱者，暈是也，汗出惡寒，身熱而渴，白虎加人參湯主之。

〔白虎人參湯〕方

知母六兩 石膏一斤，碎 甘草二兩 粳米六合 人參三兩

右五味，以水一斗，煮米熟湯成，去滓，溫服一升，日三服。

太陽中暈，身熱疼重，而脈微弱，此以夏月傷冷水，水行皮中所致也。一物瓜蒂湯主之。

〔一物瓜蒂湯〕方

瓜蒂二七個

右剉，以水一升，煮取五合，去滓頓服。

百合狐惑陰陽毒病証治第三

論一首 証三條 方十二首

論曰：百合病者，百脈一宗，悉致其病也。意欲

食复不能食，常默然，欲卧不能卧，欲行不能行，飲食或有美时，或有不用聞食臭时，如寒无寒，如热无热，口苦小便赤，諸药不能治，得药則剧吐利，如有神灵者，身形如和，其脉微数，每溺时头痛者，六十日乃愈；若溺时头不痛，淅然者，四十日愈；若溺快然，但头眩者，二十日愈。其証或未病而預見，或病四五日而出，或病二十日或一月微見者，各隨証治之。

百合病发汗后者，百合知母湯主之。

〔百合知母湯〕方

百合七枚，擘 知母三兩，切

右先以水洗百合，漬一宿，当白沫出去其水，更以泉水二升，煎取一升，去滓；別以泉水二升煎知母，取一升去滓；后合和煎取一升五合，分温再服。

百合病下之后者，滑石代赭湯主之。

〔滑石代赭湯〕方

百合七枚，擘 滑石三兩，碎綿裹 代赭石如彈丸大一枚，碎綿裹

右先以水洗百合，漬一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升煎取一升，去滓；別以泉水二升煎滑石、代赭，取一升去滓，后合和重煎取一升五合，分温服。

百合病吐之后者，用后方主之。

〔百合鷄子湯〕方

百合七枚，擘 鷄子黃一枚

右先以水洗百合，漬一宿，当白沫出，去其水，更以泉水二升煎取一升，去滓，內鷄子黃，攪勻煎五分，

溫服。

百合病不經吐下發汗，病形如初者，百合地黃湯主之。

〔百合地黃湯〕方

百合七枚，擘 生地黃汁一升

右以水洗百合漬一宿，當白沫出，去其水，更以泉水二升煎取一升，去滓，內地黃汁煎取一升五合，分溫再服，中病勿更服，大便常如漆。

百合病一月不解，變成渴者，百合洗方主之。

〔百合洗〕方

右以百合一升，以水一斗漬之一宿，以洗身，洗已，食煮餅，勿以鹽豉也。

百合病渴不差者，栝樓牡蠣散主之。

〔栝樓牡蠣散〕方

栝樓根 牡蠣熬，等分

右為細末，飲服方寸匕，日三服。

百合病變發熱者一作：發寒熱，百合滑石散主之。

〔百合滑石散〕方

百合一兩，炙 滑石三兩

右為散，飲服方寸匕，日三服，當微利者止服，熱則除。

百合病見于陰者，以陽法救之；見于陽者，以陰法救之。見陽攻陰，復發其汗，此為逆；見陰攻陽乃復下之，此亦為逆。

狐惑之為病，狀如傷寒，默默欲眠，目不得閉，卧

起不安。蝕于喉为惑，蝕于阴为狐，不欲飲食，惡聞食臭，其面目乍赤、乍黑、乍白，蝕于上部則声喝一作：哑，甘草泻心湯主之。

〔甘草泻心湯〕方

甘草_{四两} 黄芩 人参 干姜_{各三两} 黄连_{一两} 大枣_{十二枚} 半夏_{半升}

右七味，水一斗，煮取六升，去滓，再煎温服一升，日三服。

蝕于下部則咽干，苦参湯洗之。

蝕于肛者，雄黄熏之。

雄黄

右一味为末，筒瓦二枚合之，燒向肛熏之。

《脉經》云：病人或从呼吸上蝕其咽，或从下焦蝕其肛阴。蝕上为惑，蝕下为狐，狐惑病者，猪苓散主之。

病者脉数，无热微煩，默默但欲卧，汗出。初得之三四日，目赤如鳩眼，七八日目四眦一本此有黄字黑；若能食者，膿已成也。赤小豆当归散主之。

〔赤小豆当归散〕方

赤小豆_{三升}，浸令芽出，晒干 当归

右二味，杵为散，漿水服方寸匕，日三服。

阳毒之为病，面赤斑斑如錦文，咽喉痛，唾膿血。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲湯主之。

阴毒之为病，面目青，身痛如被杖，咽喉痛。五日可治，七日不可治，升麻鳖甲湯去雄黄蜀椒主之。

〔升麻鳖甲湯〕方

升麻二兩 當歸一兩 蜀椒炒去汗，一兩 甘草二兩
鰲甲手指大一片，炙 雄黃半兩，研

右六味，以水四升煮取一升，頓服之，老小再服。
取汗。

《肘后》、《千金方》：陽毒用升麻湯 无鰲甲有桂；陰毒用甘草湯，
无雄黃

瘧病脈証并治第四

証二條 方六首

師曰：瘧脈自弦，弦數者多熱，弦迟者多寒，弦小
緊者下之差，弦迟者可溫之，弦緊者可發汗、針灸也。
浮大者可吐之，弦數者風發也。以飲食消息止之。

病瘧，以月一日發，當以十五日愈；設不差，當月
盡解；如其不差，當云何？師曰：此結為癰瘕，名曰瘧
母，急治之，宜鰲甲煎圓。

〔鰲甲煎圓〕方

鰲甲十一分，炙 烏扇三分，燒 黃芩三分 柴胡六分
鼠婦三分，熬 干姜三分 大黃三分 芍藥五分 桂枝三分
葶藶一分，熬 石韋三分，去毛 厚朴三分 牡丹五分，去心
瞿麥二分 紫葳三分 半夏一分 人參一分 廔虫五分，熬
阿膠三分，炙 蜂窠四分，炙 赤消十二分 蜣螂六分，熬
桃仁二分

右二十三味，為末，取煨炆下灰一斗，清酒一斛五
斗，浸灰，候酒盡一半，着鰲甲于中，煮令泛爛如膠漆，

絞取汁，內諸藥，煎為丸如梧子大，空心服七丸，日三服。

《千金方》用鱉甲十二片，又有海藻三分，大戟一分，廬虫五分，无鼠妇、赤消二味，以鱉甲煎和諸藥為丸。

師曰：陰氣孤絕，陽氣獨發，則熱而少氣煩冤，手足熱而欲嘔，名曰瘧瘧。若但熱不寒者，邪氣內藏于心，外舍分肉之間，令人消鑠肌肉。

溫瘧者，其脈如平，身無寒但熱，骨節疼痛，時嘔，白虎加桂枝湯主之。

〔白虎加桂枝湯〕方

知母六兩 甘草二兩，炙 石膏一斤 粳米二合 桂
去皮，三兩

右剉，每五錢，水一盞半，煎至八分，去滓，溫服，汗出愈。

瘧多寒者，名曰牡瘧，蜀漆散主之。

〔蜀漆散〕方

蜀漆洗去腥 云母燒二日夜 龍骨等分

右三味，作為散，未發前以漿水服半錢。溫瘧加蜀漆半分，臨發時服一錢匕。一方云母作云實

附《外台秘要》方：

〔牡蠣湯〕 治牡瘧。

牡蠣四兩，熬 麻黃去節，四兩 甘草二兩 蜀漆三兩

右四味，以水八升先煮蜀漆、麻黃，去上沫，得六升，內諸藥煮取二升，溫服一升。若吐，則勿更服。

〔柴胡去半夏加栝樓湯〕 治瘧病發渴者，亦治勞

瘧。

柴胡八兩 人參 黃芩 甘草各三兩 栝樓根四兩
生姜二兩 大棗十二枚

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日二服。

〔柴胡桂姜湯〕 治瘧寒多微有熱，或但寒不熱。

服一劑如神

柴胡半斤 桂枝三兩，去皮 干姜二兩 栝樓根四兩
黃芩三兩 牡蠣二兩，熬 甘草二兩，炙

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。初服微煩，復服汗出便愈。

中風歷節病脈証并治第五

論一首 脈証三條 方十二首

夫風之為病，當半身不遂，或但臂不遂者，此為痺。脈微而數，中風使然。寸口脈浮而緊，緊則為寒，浮則為虛，寒虛相搏，邪在皮膚。浮者血虛，絡脉空虛，賊邪不瀉，或左或右，邪氣反緩，正氣即急，正氣引邪，喎僻不遂。邪在于絡，肌膚不仁；邪在于經，即重不勝；邪入于府，即不識人；邪入于藏，舌即難言，口吐涎。

〔侯氏黑散〕 治大風，四肢煩重，心中惡寒不足者。◀外台▶治風癱

菊花四十分 白朮十分 細辛三分 茯苓三分 牡蠣

三分 桔梗八分 防风十分 人参三分 矾石三分 黄芩
五分 当归三分 干姜三分 芎藭三分 桂枝三分

右十四味，杵为散，酒服方寸匕，日一服。初服二十日，温酒调服，禁一切鱼肉大蒜，常宜冷食，六十日止，即药积在腹中不下也，热食即下矣，冷食自能助药力。

寸口脉迟而缓，迟则为寒，缓则为虚。荣缓则为亡血，卫缓则为中风。邪气中经，则身痒而瘾疹，心气不足，邪气入中，则胸满而短气。

〔风引汤〕 除热瘫瘤。

大黄 干姜 龙骨各四两 桂枝三两 甘草 牡蛎
各二两 寒水石 滑石 赤石脂 白石脂 紫石英
石膏各六两

右十二味，杵，粗筛，以韋囊盛之。取三指撮，并花水三升，煮三沸，温服一升。治大人风引，少小惊痫瘈瘲，日数十发，医所不疗除热方。巢氏云：脚气宜风引汤

〔防己地黄汤〕 治病如狂状妄行，独语不休，无寒热，其脉浮。

防己一分 桂枝三分 防风三分 甘草一分

右四味，以酒一杯，渍之一宿，绞取汁；生地黄二斤咬咀，蒸之如斗米饭久；以铜器盛其汁，更绞地黄汁，和分再服。

〔头风摩散〕方

大附子一枚，炮 盐等分

右二味为散，沐了，以方寸匕，已摩痰上，令药力

行。

寸口脉沉而弱，沉即主骨，弱即主筋，沉即为肾，弱即为肝，汗出入水中。如水伤心，历节黄汗出，故曰历节。趺阳脉浮而过滑，则谷气实，浮则汗自出。

少阴脉浮而弱，弱则血不足，浮则为风，风血相搏，即疼痛如掣。

盛人脉涩小，短气血汗出，历节疼，不可屈伸，此皆饮酒汗出当风所致。

诸肢节疼痛，身体羸羸，脚肿如脱，头眩短气，温温欲吐，桂枝芍药知母汤主之。

〔桂枝芍药知母汤〕方

桂枝四两 芍药三两 甘草二两 麻黄二两 生姜五两 白朮五两 知母四两 防风四两 附子二两，炮

右九味，以水七升，煮取二升，温服七合，日三服。

味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄。咸则伤骨，骨伤则痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰断泄。荣气不通，卫不独行，荣卫俱微，三焦无所御，四属断绝，身体羸瘦，独足肿大，黄汗出，胫冷，假令发热，便为历节也。

病历节不可屈伸，疼痛，乌头汤主之。

〔乌头汤〕方 治脚气疼痛，不可屈伸。

麻黄 芍药 黄芪各三两 甘草炙 川乌五枚，咬咀，以蜜二升，煎取一升，即出乌头

右五味，咬咀四味，以水三升，煮取一升，去滓，内蜜煎中，更煎之，服七合，不知，尽服之。

〔矾石汤〕 治脚气冲心。

矾石二两

右一味，以漿水一斗五升，煎三五沸，浸脚良。

附方：

《古今录驗》〔續命湯〕 治中风痲，身体不能自收，口不能言，冒昧不知痛处，或拘急不得轉側。姚云：与大續命同。兼治妇人产后去血者，及老人小儿

麻黃 桂枝 当归 人参 石膏 干姜 甘草各三兩 芎藭 杏仁四十枚

右九味，以水一斗，煮取四升，温服一升，当小汗，薄复脊，憑几坐，汗出則愈，不汗更服，无所禁，勿当风。并治但伏不得卧，咳逆上气，面目浮腫。

《千金》〔三黃湯〕 治中风手足拘急，百节疼痛，煩热心乱，惡寒，經日不欲飲食。

麻黃五分 独活四分 細辛二分 黃芪二分 黃芩三分

右五味，以水六升，煮取二升，分温三服。一服小汗，二服大汗。心热加大黃二分，腹滿加枳实一枚，气逆加人参三分，悸加牡蛎三分，渴加栝楼根三分，先有寒加附子一枚。

《近效方》〔朮附湯〕 治风虚头重眩，苦极，不知食味，暖肌补中，益精气。

白朮二兩 附子一枚半，炮去皮 甘草一兩，炙

右三味，剉，每五錢匕，姜五片，棗一枚，水盪半，煎七分，去滓温服。

〔崔氏八味丸〕 治脚气上入，少腹不仁。

干地黄八两 山茱萸 薯蓣各四两 澤瀉 茯苓
牡丹皮各三两 桂枝 附子炮，各一两

右八味，末之，煉蜜和丸梧子大，酒下十五丸，日再服。

《千金方》〔越婢加朮湯〕 治肉极，热則身体津脫，腠理开，汗大泄，厉风气，下焦脚弱。

麻黄六两 石膏半斤 生姜二两 甘草二两 白朮四两 大枣十五枚

右六味，以水六升，先煮麻黄，去上沫，内諸药，煮取三升，分温三服。惡风加附子一枚，炮。

血痹虚劳病脉証并治第六

论一首 脉証九条 方九首

問曰：血痹病从何得之？师曰：夫尊榮人骨弱肌肤盛，重因疲劳汗出，卧不时动摇，加被微风遂得之。但以脉自微澀，在寸口关上小紧，宜針引阳气，令脉和、紧去則愈。

血痹，阴阳俱微，寸口关上微，尺中小紧，外証身体不仁，如风痹狀，黄芪桂枝五物湯主之。

〔黄芪桂枝五物湯〕方

黄芪三两 芍药三两 桂枝三两 生姜六两 大枣十二枚

右五味，以水六升，煮取二升，温服七合，日三服。
一方有人参

夫男子平人，脉大为劳，极虚亦为劳。

男子面色薄者，主渴及亡血，卒喘悸，脉浮者里虚也。男子脉虚沉弦，无寒热，短气，里急，小便不利，面色白，时目瞑兼衄，少腹满，此为劳使之然。劳之为病，其脉浮大，手足烦，春夏剧，秋冬瘳，阴寒精自出，酸削不能行。

男子脉浮弱而涩，为无子，精气清冷一作：冷。夫失精家，少腹弦急，阴头寒，目眩一作目眶痛发落，脉极虚芤迟，为清谷亡血失精；脉得诸芤动微紧，男子失精，女子梦交，桂枝龙骨牡蛎汤主之。

〔桂枝加龙骨牡蛎汤〕方《小品》云：虚弱浮热汗出者，除桂加白薇附子各三分，故曰二加龙骨汤

桂枝 芍药 生姜各三两 甘草二两 大枣十二枚
龙骨 牡蛎各三两

右七味，以水七升，煮取三升，分温三服。

〔天雄散〕方

天雄三两，炮 白朮八两 桂枝六两 龙骨三两

右四味，杵为散，酒服半钱匕，日三服，不知，稍增之。

男子平人，脉虚弱细微者，喜盗汗也。

人年五六十，其病脉大者，痹侠背行，若肠鸣，马刀侠癭者，皆为劳得之。脉沉小迟，名脱气，其人疾行则喘喝，手足逆寒，腹满，甚则溇泄，食不消化也。脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，虚寒相搏，此名为革。妇人则半产漏下，男子则亡血

失精。

虛勞里急，悸，衄，腹中痛，夢失精，四肢痠疼，手足煩熱，咽干口燥，小建中湯主之。

〔小建中湯〕方

桂枝三兩，去皮 甘草三兩，炙 大棗十二枚 芍藥六兩 生薑三兩 膠飴一升

右六味，以水七升，煮取三升，去滓，內膠飴，更上微火消解，溫服一升，日三服。嘔家不可用建中湯，以甜故也。

《千金》療男女因積冷氣滯，或大病後不復常，若四肢沉重，骨肉痠疼，吸吸少氣，行動喘乏，胸滿氣急，腰背強痛，心中虛悸，咽干唇燥，面赤少色，或飲食無味，肋肋腹脹，頭重不舉，多臥少起，甚者積年，輕者百日，漸致瘦弱，五藏氣竭，則難可復常，六脈俱不足，虛寒乏氣，少腹拘急，羸瘠百病，名曰黃芪建中湯，又有人參二兩。

虛勞里急，諸不足，黃芪建中湯主之。于小建中湯內加黃芪一兩半，余依上法。氣短胸滿者，加生薑，腹滿者，去棗加茯苓一兩半，及療肺虛損不足，補氣加半夏三兩。

虛勞腰痛，少腹拘急，小便不利者，八味腎氣圓主之。方見婦人雜病中。

虛勞諸不足，風氣百疾，薯蕷圓主之。

〔薯蕷丸〕方

薯蕷三十斤 當歸 桂枝 麴 干地黄 豆黃卷各十分 甘草二十八分 人參七分 芎藭 芍藥 白朮 麥門冬 杏仁各六分 柴胡 桔梗 茯苓各五分 阿膠七分 干姜三分 白飲二分 防風六分 大棗百枚，為膏

右二十一味，末之，煉蜜和丸如彈子大，空腹酒服一丸，一百丸為劑。

虛勞虛煩，不得眠，酸棗湯主之。

〔酸棗湯〕方

酸棗仁二升 甘草一兩 知母二兩 茯苓二兩 芎藭二兩 深師有生姜二兩

右五味，以水八升，煮酸棗仁得六升，內諸藥煮取三升，分溫三服。

五勞虛極，羸瘦腹滿，不能飲食，食傷、忧伤、飲傷、房室傷、飢傷、勞傷、經絡榮衛氣傷，內有干血，肌甲錯，兩目黯黑，緩中補虛，大黃蟄虫丸主之。

〔大黃蟄虫丸〕方

大黃十分，蒸 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 芍藥四兩 干地黄十兩 干漆一兩 蟄虫一升 水蛭百枚 蛭螬一升 蟄虫半升

右十二味，末之，煉蜜和丸小豆大，酒飲服五丸，日三服。

附方：

《千金翼》〔炙甘草湯〕一云：復脈湯 治虛勞不足，汗出而悶，脈結悸，行動如常，不出百日，危急者十一日死。

甘草四兩，炙 桂枝 生姜各三兩 麥門冬半升 麻仁半升 人參 阿膠各二兩 大棗三十枚 生地黄一斤

右九味，以酒七升、水八升，先煮八味，取三升，去滓，內膠消盡，溫服一升，日三服。

《肘后》〔獼肝散〕 治冷勞，又主鬼疰一門相染。

獼肝一具，炙干末之，水服方寸匕，日三服。

肺痿肺癰咳嗽上氣病脈証治第七

論三首 脈証四條 方十五首

問曰：熱在上焦者，因咳為肺痿，肺痿之病，從何得之？師曰：或從汗出，或從嘔吐，或從消渴，小便利數，或從便難，又被快藥下利，重亡津液，故得之。曰：寸口脈數，其人咳，口中反有濁唾涎沫者何？師曰：為肺痿之病。若口中辟辟燥，咳即胸中隱隱痛，脈反滑數，此為肺癰。咳唾膿血，脈數虛者為肺痿，數實者為肺癰。

問曰：病咳逆，脈之，何以知此為肺癰？當有膿血，吐之則死？其脈何類？師曰：寸口脈微而數，微則為風，數則為熱；微則汗出，數則惡寒。風中于卫，呼吸不入；熱過於榮，吸而不出；風傷皮毛，熱傷血脈；風舍于肺，其人則咳，口干喘滿，咽燥不渴，多唾濁沫，時時振寒。熱之所過，血為之凝滯，畜結癰膿，吐如米粥。始萌可掇，膿成則死。

上氣，面浮腫，肩息，其脈浮大，不治；又加利，尤甚。上氣，喘而躁者，屬肺脹，欲作風水，發汗則愈。

肺痿吐涎沫而不咳者，其人不渴，必遺尿、小便數。所以然者，以上虛不能制下故也。此為肺中冷，必眩、多涎唾，甘草干姜湯以溫之。若服湯已渴者，屬消渴。

〔甘草干姜湯〕方

甘草四兩，炙 干姜二兩，炮

右咬咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分溫再服。

咳而上氣，喉中水雞聲，射干麻黃湯主之。

〔射干麻黃湯〕方

射干十三枚 一法三兩 麻黃四兩 生姜四兩 細辛
紫苑 款冬花各三兩 五味子半升 大棗七枚 半夏大者
洗，八枚 一法半升

右九味，以水一斗二升，先煮麻黃兩沸，去上沫，
內諸藥煮取三升，分溫三服。

咳逆上氣，時時唾濁，但坐不得眠，皂莢圓主之。

〔皂莢丸〕方

皂莢八兩，刮去皮，用酥炙

右一味，末之，蜜丸梧子大，以棗膏和湯服三丸，
日三、夜一服。

咳而脈浮者，厚朴麻黃湯主之。

〔厚朴麻黃湯〕方

厚朴五兩 麻黃四兩 石膏如鴉子大 杏仁半升 半
夏半升 干姜二兩 細辛二兩 小麥一升 五味子半升

右九味，以水一斗二升，先煮小麥熟，去滓，內諸
藥煮取三升，溫服一升，日三服。

脈沉者，澤漆湯主之。

〔澤漆湯〕方

半夏半升 紫參五兩 一作紫苑 澤漆三斤，以東流水五
斗煮取一斗五升 生姜五兩 白朮五兩 甘草 黃芩 人

参 桂枝各三两

右九味，咬咀，内澤漆汁中煮取五升，温服五合，至夜尽。

人逆上气，咽喉不利，止逆下气者，麦門冬湯主之。

〔麦門冬湯〕方

麦門冬七升 半夏一升 人参二两 甘草二两 粳米三合 大棗十二枚

右六味，以水一斗二升，煮取六升，温服一升，日三、夜一服。

肺癰喘不得卧，葶藶大棗泻肺湯主之。

〔葶藶大棗泻肺湯〕方

葶藶熬令黄色，捣丸如彈子大 大棗十二枚

右先以水三升，煮棗取二升，去棗内葶藶，煮取一升，頓服。

咳而胸滿，振寒，脉数，咽干不渴，时出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，为肺癰，桔梗湯主之。

〔桔梗湯〕方亦治血痹

桔梗一两 甘草二两

右二味，以水三升，煮取一升，分温再服，則吐膿血也。

咳而上气，此为肺脹，其人喘，目如脫狀，脉浮大者，越婢加半夏湯主之。

〔越婢加半夏湯〕方

麻黄六两 石膏半斤 生姜三两 大棗十五枚 甘草

二兩 半夏半升

右六味，以水六升先煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取三升，分溫三服。

肺脹咳而上氣，煩躁而喘，脈浮者，心下有水，小青龙加石膏湯主之。

〔小青龙加石膏湯〕方《千金》証治同，外更加肺下痛引缺盆
麻黃 芍藥 桂枝 細辛 甘草 干姜各三兩 五味子 半夏各半升 石膏二兩

右九味，以水一斗，先煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取三升，強人服一升，羸者減之，日三服，小兒服四合。

附方：

《外台》〔炙甘草湯〕 治肺痿涎唾多，心中溫溫液液者。方見虛勞中

《千金》〔甘草湯〕

甘草

右一味，以水三升煮減半，分溫三服。

《千金》〔生姜甘草湯〕 治肺痿咳唾，涎沫不止，咽燥而渴。

生姜五兩 人參三兩 甘草四兩 大棗十五枚

右四味，以水七升，煮取三升，分溫三服。

《千金》〔桂枝去芍藥加皂莢湯〕 治肺痿吐涎沫。

桂枝 生姜各三兩 甘草二兩 大棗十枚 皂莢一枚，去皮子，炙焦

右五味，以水七升，微微火煮取三升，分溫三服。

《外台》〔桔梗白散〕 治咳而胸滿，振寒，脈數，咽

干不渴，时出濁唾腥臭，久久吐膿如米粥者，为肺癰。

桔梗 貝母各三分 巴豆一分，去皮，熬研如脂

右三味，为散，强人飲服半錢匕，羸者減之。病在膈上者，吐膿血；膈下者瀉出；若下多不止，飲冷水一杯則定。

《千金》〔葦莖湯〕 治咳有微熱，煩滿，胸中甲錯，是为肺癰。

葦莖二升 薏苡仁半升 桃仁五十枚 瓜瓣半升

右四味，以水一斗，先煮葦莖得五升，去滓，內諸藥，煮取二升，服一升，再服，当吐如膿。

肺癰胸滿脹，一身面目浮腫，鼻塞清涕出，不聞香臭酸辛，咳逆上氣，喘鳴迫塞，葶藶大棗瀉肺湯主之。

方見上。三日一劑，可至三四劑，此先服小青龍湯一劑乃進，小青龍方見咳嗽門中

奔豚氣病脈証治第八

論二首 方三首

師曰：病有奔豚，有吐膿，有驚怖，有火邪，此四部病，皆从驚發得之。 師曰：奔豚病从少腹起，上冲咽喉，发作欲死，复还止，皆从驚恐得之。

奔豚，氣上冲胸，腹痛，往来寒熱，奔豚湯主之。

〔奔豚湯〕方

甘草 芍藥 當歸各二兩 半夏四兩 黃芩二兩 生
葛五兩 芍藥二兩 生姜四兩 甘李根白皮一升

右九味，以水二斗，煮取五升，溫服一升，日三、夜一服。

发汗后，燒針令其汗，針处被寒，核起而赤者，必发黃脉，气从少腹上至心，灸其核上各一壯，与桂枝加桂湯主之。

〔桂枝加桂湯〕方

桂枝五兩 芍藥三兩 甘草二兩，炙 生姜三兩 大棗十二枚

右五味，以水七升，微火煮取三升，去滓，溫服一升。

发汗后，臍下悸者，欲作黃脉，茯苓桂枝甘草大棗湯主之。

〔茯苓桂枝甘草大棗湯〕方

茯苓半斤 甘草二兩，炙 大棗十五枚 桂枝四兩

右四味，以甘瀾水一斗，先煮茯苓，減二升，內諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升，日三服。甘瀾水法，取水二斗置大盆內，以杓揚之，水上有珠子五六千顆相逐，取用之

胸痹心痛短气病脈証治第九

论一首 証一首 方十首

师曰：夫脉当取太过不及，阳微阴弦，即胸痹而痛，所以然者，責其极虚也。今阳虚知在上焦，所以胸痹心痛者，以其阴弦故也。平人，无寒热，短气不足以息者，实也。

胸痹之病，喘息咳唾，胸背痛，短气，寸口脉沉而迟，关上小紧数，栝楼薤白白酒汤主之。

〔栝楼薤白白酒汤〕方

栝楼实一枚，捣 薤白半斤 白酒七升

右三味，同煮取二升，分温再服。

胸痹，不得卧，心痛彻背者，栝楼薤白半夏汤主之。

〔栝楼薤白半夏汤〕方

栝楼实一枚，捣 薤白三两 半夏半斤 白酒一斗

右四味，同煮取四升，温服一升，日三服。

胸痹，心中痞气，气结在胸，胸满，胁下逆抢心，枳实薤白桂枝汤主之，人参汤亦主之。

〔枳实薤白桂枝汤〕方

枳实四枚 厚朴四两 薤白半斤 桂枝一两 栝楼实一枚，捣

右五味，以水五升，先煮枳实、厚朴，取二升，去滓，内诸药，煮数沸，分温三服。

〔人参汤〕方

人参 甘草 干姜 白朮各三两

右四味，以水八升，煮取三升，温服一升，日三服。

胸痹，胸中气塞、短气，茯苓杏仁甘草汤主之，橘枳姜汤亦主之。

〔茯苓杏仁甘草汤〕方

茯苓三两 杏仁五十个 甘草一两

右三味，以水一斗，煮取五升，温服一升，日三服，

不差更服。

〔橘皮枳实生姜湯〕方

橘皮一斤 枳实三两 生姜半斤

右三味，以水五升，煮取二升，分温再服。《肘后》、

《千金》云：治胸痹，胸中幅幅如满，噎塞习习如痒，喉中涩燥唾沫

胸痹緩急者，薏苡人附子散主之。

〔薏苡附子散〕方

薏苡仁十五两 大附子十枚，炮

右二味，杵为散，服方寸匕，日三服。

心中痞，諸逆心悬痛，桂枝生姜枳实湯主之。

〔桂枝生姜枳实湯〕方

桂枝 生姜各三两 枳实五枚

右三味，以水六升，煮取三升，分温三服。

心痛彻背，背痛彻心，烏头赤石脂圓主之。

〔赤石脂丸〕方

蜀椒一两 一法二分 烏头一分，炮 附子半两，炮 一法一分 干姜一两 一法一分 赤石脂一两 一法二分

右五味，末之，蜜丸如梧子大，先食服一丸，日三服，不知，稍加服。

〔九痛丸〕 治九种心痛

附子三两，炮 生狼牙一两，炙香 巴豆一两，去皮心，熬研如脂 人参 干姜 吳茱萸各一两

右六味，末之，煉蜜丸如梧子大，酒下，强人初服三丸，日三服；弱者二丸。兼治卒中惡，腹脹痛，口不能言。又治連年积冷，流注心胸痛，并冷冲上气，落馬

墜車血疾等，皆主之。忌口如常法。

腹滿寒疝宿食病脈証治第十

論一首 脈証十六條 方十三首

趺陽脈微弦，法當腹滿，不滿者必便難，兩脇疼痛，此虛寒從下上也。當以溫藥服之。

病者腹滿，按之不痛為虛，痛者為實，可下之。舌黃未下者，下之黃自去。腹滿時減，復如故，此為寒，當與溫藥。

病者痿黃，躁而不渴，胸中寒實而利不止者，死。寸口脈弦者，即脇下拘急而痛，其人噦噦惡寒也。

夫中寒家喜欠，其人清涕出，發熱色和者，善噦。中寒，其人下利，以里虛也，欲噦不能，此人肚中寒。——云痛

大瘦人繞臍痛，必有風冷，谷氣不行，而反下之，其氣必沖，不沖者，心下則痞。

病腹滿，發熱十日，脈浮而數，飲食如故，厚朴七物湯主之。

〔厚朴七物湯〕方

厚朴半斤 甘草 大黃各三兩 大棗十枚 枳實五枚
桂枝二兩 生姜五兩

右七味，以水一斗，煮取四升，溫服八合，日三服。嘔者加半夏五合，下利去大黃，寒多者加生姜至半斤。

腹中寒氣，雷鳴切痛，胸脇逆滿，嘔吐，附子粳米

湯主之。

〔附子粳米湯〕方

附子一枚，炮 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚 粳米半升

右五味，以水八升，煮米熟湯成，去滓，溫服一升，日三服。

痛而閉者，厚朴三物湯主之。

〔厚朴三物湯〕方

厚朴八兩 大黃四兩 枳實五枚

右三味，以水一斗二升，先煮二味，取五升，內大黃煮取三升，溫服一升，以利為度。

按之心下滿痛者，此為實也，當下之，宜大柴胡湯。

〔大柴胡湯〕方

柴胡半斤 黃芩三兩 芍藥三兩 半夏半升，洗 枳實四枚，炙 大黃二兩 大棗十二枚 生姜五兩

右八味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎溫服一升，日三服。

腹滿不減，減不足言，當須下之，宜大承氣湯。

〔大承氣湯〕方見前瘧病中

心胸中大寒痛，嘔不能飲食，腹中寒，上冲皮起，出見有頭足，上下痛而不可觸近，大建中湯主之。

〔大建中湯〕方

蜀椒二合，去汗 干姜四兩 人參二兩

右三味，以水四升，煮取二升，去滓，內膠飴一升，

微火煎取一升半，分温再服，如一炊顷，可飲粥二升，后更服，当一日食糜，温复之。

脉下偏痛，发热，其脉紧弦，此寒也，以温药下之。宜大黃附子湯。

〔大黃附子湯〕方

大黃三兩 附子三枚，炮 細辛二兩

右三味，以水五升，煮取二升，分温三服；若强人煮取二升半，分温三服，服后如人行四五里，进一服。

寒气厥逆，赤白主之。

〔赤丸〕方

茯苓四兩 半夏四兩洗 一方用桂 烏头二兩，炮 細辛一兩 《千金》作人參

右四味，末之，內真朱为色，煉蜜丸如麻子大，先食酒飲下三丸，日再夜一服，不知，稍增之，以知为度。

腹痛，脉弦而紧，弦則卫气不行，即惡寒；紧則不欲食，邪正相搏，即为寒疝。寒疝遶臍痛，若发則白津出，手足厥冷，其脉沉紧者，大烏头煎主之。

〔烏头煎〕方

烏头大者五枚，熬去皮，不咬咀

右以水三升，煮取一升，去滓，內蜜二升，煎令水气尽，取二升，强人服七合，弱人服五合。不差，明日更服，不可一日再服。

寒疝，腹中痛及胁痛里急者，当归生姜羊肉湯主之。

〔当归生姜羊肉湯〕方

当归三兩 生姜五兩 羊肉一斤

右三味，以水八升，煮取三升，溫服七合，日三服。
若寒多者，加生姜成一斤；痛多而嘔者，加橘皮二兩，
白朮一兩。加生姜者，亦加水五升，煮取三升二合服
之。

寒疝，腹中痛，逆冷，手足不仁，若身疼痛，灸刺諸
藥不能治，抵當烏頭桂枝湯主之。

〔烏頭桂枝湯〕方

烏頭

右一味，以蜜二斤，煎減半，去滓，以桂枝湯五合
解之，令得一升后，初服二合，不知，即服三合，又不
知，復加至五合。其知者如醉狀，得吐者為中病。

〔桂枝湯〕方

桂枝三兩、去皮 芍藥三兩 甘草二兩、炙 生姜三兩
大棗十二枚

右五味，剉，以水七升，微火煮取三升，去滓。

其脈數而緊，乃弦，狀如弓弦，按之不移。脈數弦
者，當下其寒；脈緊大而遲者，必心下堅；脈大而緊者，
陽中有陰，可下之。

附方：

《外台》〔烏頭湯〕治寒疝腹中絞痛，賊風入攻五
臟，拘急不得轉側，發作有時，使人陰縮，手足厥逆。方
見上

《外台》〔柴胡桂枝湯〕方 治心腹卒中痛者。

柴胡四兩 黃芩 人參 芍藥 桂枝 生姜各一兩

半 甘草一两 半夏二合半 大棗六枚

右九味，以水六升，煮取三升，溫服一升，日三服。

《外台》〔走馬湯〕 治中惡心痛腹脹，大便不通。

巴豆二枚，去皮心熬 杏仁二枚

右二味，以綿纏撻令碎，熱湯二合，捻取白汁，飲之當下，老小量之。通治飛尸鬼击病。

問曰：人病有宿食，何以別之？師曰：寸口脉浮而大，按之反澀，尺中亦微而澀，故知有宿食，大承氣湯主之。脉數而滑者實也，此有宿食，下之愈，宜大承氣湯。下利不欲食者，有宿食也，當下之，宜大承氣湯。

〔大承氣湯〕方見前痙病中

宿食在上脘，當吐之，宜瓜蒂散。

〔瓜蒂散〕方

瓜蒂一分，熬黃 赤小豆一分，煮

右二味，杵為散，以香豉七合煮取汁，和散一錢匕，溫服之，不吐者，少加之，以快吐為度而止。亡血及虛者，不可与之

脉緊如轉索無常者，有宿食也。脉緊，頭痛風寒，腹中有宿食不化也。一云：寸口脉緊

卷 中

五脏风寒积聚病脉証并治第十一

论二首 脉証十七条 方二首

肺中风者，口燥而喘，身运而重，冒而腫脹。肺中寒，吐濁涕。肺死藏，浮之虛，按之弱如葱叶，下无根者死。

肝中风者，头目瞤，兩脇痛，行常僵，令人嗜甘。肝中寒者，兩臂不举，舌本燥，喜太息，胸中痛，不得轉側，食則吐而汗出也。《脉經》、《千金》云：时盜汗咳，食已吐其汁。肝死藏，浮之弱，按之如索不来，或曲如蛇行者死。肝著，其人常欲蹈其胸上，先未苦时，但欲飲热，旋复花湯主之。臣亿等校諸本旋复花湯，皆同

心中风者，翕翕发热，不能起，心中飢，食即嘔吐。心中寒者，其人苦病心如啖蒜狀，剧者心痛彻背，背痛彻心，譬如蠱注，其脉浮者，自吐乃愈。心伤者，其人劳倦即头面赤而下重，心中痛而自煩，发热，当臍跳，其脉弦，此为心藏伤所致也。心死藏，浮之实，如丸豆，按之益躁疾者死。邪哭使魂魄不安者，血气少也。血气少者，属于心，心气虛者，其人則畏，合目欲眠，梦远行而精神离散，魂魄妄行。阴气衰者为癰，阳气衰者为狂。

脾中风者，翕翕发热，形如醉人，腹中煩重，皮目瞤瞤而短气。脾死藏，浮之大坚，按之如复杯，洁洁状如搖者死。臣亿等計五藏各有中风中寒，今脾只載中风，腎中风、中寒俱不載者，以古文簡乱极多，去古既远，无文可以补綴也。

趺阳脉浮而涩，浮則胃气强，涩則小便数，浮涩相搏，大便則坚，其脾为約，麻子仁圓主之。

〔麻子仁丸〕方

麻子仁二升 芍药半斤 枳实一斤 大黄一斤 厚朴一尺 杏仁一升

右六味，末之，煉蜜和丸梧子大，飲服十丸，日三，以知为度。

腎著之病，其人身体重，腰中冷，如坐水中，形如水状，反不渴，小便自利，飲食如故，病屬下焦，身劳汗出，衣一作表。里冷湿，久久得之，腰以下冷痛，腹重如帶五千錢，甘姜苓朮湯主之。

〔甘草干姜茯苓白朮湯〕方

甘草 白朮各二两 干姜 茯苓各四两

右四味，以水五升，煮取三升，分温三服，腰中即温。

腎死藏，浮之坚，按之乱如轉丸，益下入尺中者死。

問曰：三焦竭部，上焦竭善噫，何謂也？師曰：上焦受中焦，气未和，不能消谷，故能噫耳；下焦竭，即遺溺失便，其气不和，不能自禁制，不須治，久則愈。

師曰：热在上焦者，因咳为肺痿；热在中焦者，則

为坚；热在下焦者，则尿血，亦令淋秘不通。大腸有寒者，多鶩溏；有热者，便腸垢；小腸有寒者，其人下重便血，有热者必痔。

問曰：病有积、有聚、有癰气，何謂也？師曰：积者藏病也，終不移；聚者府病也，发作有时，展轉痛移，为可治；癰气者脉下痛，按之則愈，复发，为癰气。諸积大法：脉来細而附骨者，乃积也。寸口积在胸中；微出寸口，积在喉中；关上积在臍傍；上关上，积在心下；微下关，积在少腹。尺中，积在气冲；脉出左，积在左；脉出右，积在右；脉兩出，积在中央，各以其部处之。

痰飲咳嗽病脈証并治第十二

论一首 脉証二十一条 方十九首

問曰：夫飲有四，何謂也？師曰：有痰飲，有懸飲，有溢飲，有支飲。

問曰：四飲何以为異？師曰：其人素盛今瘦，水走腸間，漑漑有聲，謂之痰飲；飲后水流在肋下，咳唾引痛，謂之懸飲；飲水流行，归于四肢，当汗出而不汗出，身体疼重，謂之溢飲；咳逆倚息，气短不得卧，其形如腫，謂之支飲。

水在心，心下堅筑，短气，惡水，不欲飲。 水在肺，吐涎沫，欲飲水。 水在脾，少气身重。 水在肝，肋下支滿，噯而痛。 水在腎，心下悸。

夫心下有留飲，其人背寒，冷如水大。 留飲者，

脇下痛引缺盆，咳嗽則輒已一作：轉甚。胸中有留飲，其人短氣而渴，四肢歷節痛，脈沉者，有留飲。膈上病痰，滿喘咳吐，發則寒熱，背痛腰疼，目泣自出，其人振振身潤劇，必有伏飲。

夫病人飲水多，必暴喘滿，凡食少飲多，水停心下，甚者則悸，微者短氣。脈雙弦者寒也，皆大下后喜虛；脈偏弦者飲也。肺飲不弦，但苦喘短氣。支飲亦喘而不能卧，加短氣，其脈平也。病痰飲者，當以溫藥和之。

心下有痰飲，胸脇支滿，目眩，苓桂朮甘湯主之。

〔茯苓桂枝白朮甘草方〕

茯苓四兩 桂枝 白朮各三兩 甘草二兩

右四味，以水六升，煮取三升，分溫三服，小便則利。

夫短氣有微飲，當从小便去之，苓桂朮甘湯主之。

方見上腎氣丸亦主之。方見婦人雜病中

病者脈伏，其人欲自利，利反快，雖利，心下續堅滿，此為留飲，欲去故也。甘遂半夏湯主之。

〔甘遂半夏湯〕方

甘遂大者，三枚 半夏十二枚 以水一升煮取半升，去滓
芍藥五枚 甘草如指大一枚，炙 一本作无

右四味，以水二升，煮取半升，去滓，以蜜半升，和藥汁煎取八合，頓服之。

脈浮而細滑，傷飲。脈弦數，有寒飲，冬夏難治。脈沉而弦者，懸飲內痛；病懸飲者，十棗湯主

之。

〔十棗湯〕方

芫花熬 甘遂 大戟各等分

右三味，搗篩，以水一升五合，先煮肥大棗十枚，取八合，去滓，內葯末，強人服一錢匕，羸人服半錢，平旦溫服之，不下者，明日更加半錢，得快之後，糜粥自養。

病溢飲者，當發其汗，大青龍湯主之，小青龍湯亦主之。

〔大青龍湯〕方

麻黃六兩，去節 桂枝二兩，去皮 甘草二兩，炙 杏仁四十個，去皮尖 生姜三兩 大棗十二枚 石膏如鴨子大，碎

右七味，以水九升，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸葯，煮取三升，去滓，溫服一升，取微似汗，汗多者溫粉粉之。

〔小青龍湯〕方

麻黃去節，三兩 芍葯三兩 五味子半升 干姜三兩 甘草三兩，炙 細辛三兩 桂枝三兩，去皮 半夏半升，湯洗

右八味，以水一斗，先煮麻黃，減二升，去上沫，內諸葯，煮取三升，去滓，溫服一升。

膈間支飲，其人喘滿，心下痞堅，面色黧黑，其脈沉緊，得之數十日，醫吐下之不愈，木防己湯主之；虛者即愈，實者三日復發，復與不愈者，宜木防己湯去石膏加茯苓芒硝湯主之。

〔木防己湯〕方

木防己三兩 石膏十二枚，鷄子大 桂枝二兩 人參

四兩

右四味，以水六升，煮取二升，分溫再服。

〔木防己加茯苓芒硝湯〕方

木防己 桂枝各二兩 人參 芒硝三合 茯苓各四兩

右五味，以水六升，煮取二升，去滓，內芒硝，再微煎，分溫再服，微利則愈。

心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之。

〔澤瀉湯〕方

澤瀉五兩 白朮二兩

右二味，以水二升，煮取一升，分溫再服。

支飲胸滿者，厚朴大黃湯主之。

〔厚朴大黃湯〕方

厚朴一尺 大黃六兩 枳實四枚

右三味，以水五升，煮取二升，分溫再服。

支飲不得息，葶藶大棗瀉肺湯主之。方見肺癰中

嘔家本渴，渴者為欲解，今反不渴，心下有支飲故也。小半夏湯主之。《千金》云：小半夏加茯苓湯。

〔小半夏湯〕方

半夏一升 生姜半斤

右二味，以水七升，煮取一升半，分溫再服。

腹滿口舌乾燥，此陽間有水氣，己椒藶黃圓主之。

〔防己椒目葶藶大黃圓〕方

防己 椒目 葶藶熬 大黃各一兩

右四味，末之，蜜丸如梧子大，先食飲服一丸，日三服，稍增，口中有津液，渴者加芒硝半兩。

卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，半夏加茯苓湯主之。

〔小半夏加茯苓湯〕方

半夏一升 生姜半斤 茯苓三兩 一法四兩

右三味，以水七升，煮取一升五合，分溫再服。

假令瘦人，臍下有悸，吐涎沫而顛眩，此水也。五苓散主之。

〔五苓散〕方

澤瀉一兩一分 猪苓三分，去皮 茯苓三分 白朮三分 桂二分，去皮

右五味，為末，白飲服方寸匕，日三服，多飲暖水，汗出愈。

附方：

《外台》〔茯苓飲〕 治心胸中有停痰宿水，自吐出水后，心胸間虛，氣滿不能食，消痰氣，令能食。

茯苓 人參 白朮各三兩 枳實二兩 橘皮二兩半 生姜四兩

右六味，水六升，煮取一升八合，分溫三服，如人行八九里進之。

咳家其脈弦，為有水，十棗湯主之。方見上

夫有支飲家，咳煩，胸中痛者，不卒死，至一百日或一歲，宜十棗湯。方見上

久咳數歲，其脈弱者可治，實大數者死，其脈虛者

必苦冒，其人本有支飲在胸中故也，治屬飲家。

咳逆倚息，不得卧，小青龙湯主之。方見上

青龙湯下已，多唾口燥，寸脉沉，尺脉微，手足厥逆，气从小腹上冲胸咽，手足痹，其面翁然如醉狀，因复下流阴股，小便难，时复冒者，与茯苓桂枝五味甘草湯，治其气冲。

〔桂苓五味甘草湯〕方

茯苓四两 桂枝四两，去皮 甘草炙，三两 五味子半升

右四味，以水八升，煮取三升，去滓，分温三服。

冲气即低，而反更咳，胸滿者，用桂苓五味甘草湯，去桂加干姜、細辛，以治其咳滿。

〔苓甘五味姜辛湯〕方

茯苓四两 甘草 干姜 細辛各三两 五味半升

右五味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

咳滿即止，而更复渴，冲气复发者，以細辛、干姜为热药也；服之当遂渴，而渴反止者，为支飲也；支飲者，法当冒，冒者必嘔，嘔者复内半夏，以去其水。

〔桂苓五味甘草去桂加干姜細辛半夏湯〕方

茯苓四两 甘草 細辛 干姜各二两 五味子 半夏各半升

右六味，以水八升，煮取三升，去滓，温服半升，日三。

水去嘔止，其人形腫者，加杏仁主之；其証应内麻

黃，以其人遂癰，故不內之。若逆而內之者，必厥。所以然者，以其人血虛，麻黃發其陽故也。

〔苓甘五味加姜辛半夏杏仁湯〕方

茯苓四兩 甘草三兩 五味半升 干姜三兩 細辛三兩 半夏半升 杏仁半升，去皮尖

右七味，以水一斗，煮取三升，去滓溫服半升，日三。

若面熱如醉，此為胃熱，上沖熏其面，加大黃以利之。

〔苓甘五味加姜辛半杏大黃湯〕方

茯苓四兩 甘草三兩 五味半升 干姜三兩 細辛三兩 半夏半升 杏仁半升 大黃三兩

右八味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服半升，日三。

先渴後嘔，為水停心下，此屬飲家，小半夏茯苓湯主之。方見上

消渴小便利淋病脈証并治第十三

脈証九條 方六首

厥陰之為病，消渴，氣上沖心，心中疼熱，飢而不欲食，食即吐蛔，下之不肯止。寸口脈浮而遲，浮即為虛，遲即為勞，虛則衛氣不足，勞則榮氣竭。趺陽脈浮而數，浮即為氣，數即消谷而大堅，一作緊 氣盛則洩數，洩數即堅，堅數相搏，即為消渴。

男子消渴，小便反多，以飲一斗，小便一斗，腎氣圓主之。方見妇人杂病中

脉浮小便不利，微热消渴者，宜利小便，发汗，五苓散主之。

渴欲飲水，水入則吐者，名曰水逆，五苓散主之。方見上 渴欲飲水不止者，文蛤散主之。

〔文蛤散〕方

文蛤五兩

右一味，杵为散，以沸湯五合，和服方寸匕。

淋之为病，小便如粟狀，小腹弦急，痛引臍中。

跌阳脉数，胃中有热，即消谷引食，大便必坚，小便即数。

淋家不可发汗，发汗則必便血。

小便不利者，有水气，其人苦渴，栝楼瞿麥圓主之。

〔栝楼瞿麥丸〕方

栝楼根二兩 茯苓 薯蕷各三兩 附子一枚，炮 瞿麥一兩

右五味，末之，煉蜜丸梧子大，飲服三丸，日三服，不知，增至七八丸，以小便利，腹中温为知。

小便不利，蒲灰散主之，滑石白魚散、茯苓戎盐湯并主之。

〔蒲灰散〕方

蒲灰七分 滑石三分

右二味，杵为散，飲服方寸匕，日三服。

〔滑石白魚散〕方

滑石二分 乱发二分，燒 白魚二分

右三味，杵为散，飲服半錢匕，日三服。

〔茯苓戎盐湯〕方

茯苓半斤 白朮二两 戎盐彈丸大一枚

右三味……。

渴欲飲水，口干舌燥者，白朮加人参湯主之。方見
中喝中 脉浮发热，渴欲飲水，小便不利者，猪苓湯主之。

〔猪苓湯〕方

猪苓去皮 茯苓 阿膠 滑石 澤泻各一两

右五味，以水四升，先煮四味，取二升，去滓，內膠
洋消，溫服七合，日三服。

水气病脈証并治第十四

论七首 脉証五条 方九首

师曰：病有风水，有皮水，有正水，有石水，有黄汗。风水其脉自浮，外証骨节疼痛，惡风；皮水其脉亦浮，外証胛腫，按之沒指，不惡风，其腹如鼓，不渴，当发其汗，正水其脉沉迟，外証自喘；石水其脉自沉，外証腹滿不喘，黄汗其脉沉迟，身发热，胸滿，四肢头面腫，久不愈，必致癰膿。

脉浮而洪，浮則为风，洪則为气。风气相搏，风强則为隱疹，身体为痒，痒为泄风，久为痼癰；气强則为水，难以俯仰。风气相击，身体洪腫，汗出乃愈，惡风

則虛，此為風水；不惡風者，小便通利，上焦有寒，其口多涎，此為黃汗。

寸口脈沉滑者，中有水氣，面目腫大，有熱，名曰風水；視人之目裹上微攣，如蚕新卧起狀，其頸脈動，时时咳，按其手足上陷而不起者，風水。

太陽病，脈浮而緊，法當骨節疼痛，反不疼，身體反重而酸，其人不渴，汗出即愈，此為風水。惡寒者，此為極虛，發汗得之。渴而不惡寒者，此為皮水。身腫而冷，狀如周痹，胸中窒，不能食，反聚痛，暮躁不得眠，此為黃汗，痛在骨節。咳而喘，不渴者，此為脾脹，其狀如腫，發汗即愈。然諸病此者，渴而下利，小便數者，皆不可發汗。

里水者，一身面目黃腫，其脈沉，小便不利，故令病水，假如小便自利，此亡津液，故令渴也，越婢加朮湯主之。方見中風

趺陽脈當伏，今反緊，本自有寒，疝、瘕腹中痛，醫反下之，下之即胸滿短氣。趺陽脈當伏，今反數，本自有熱，消谷，小便數，今反不利，此欲作水。

寸口脈浮而遲，浮脈則熱，遲脈則潛，熱潛相搏，名曰沈；趺陽脈浮而數，浮脈即熱，數脈即止，熱止相搏，名曰伏；沉伏相搏，名曰水；沉則絡脈虛，伏則小便難，虛難相搏，水走皮膚，即為水矣。寸口脈弦而緊，弦則衛氣不行，即惡寒，水不沾流，走于腸間。少陰脈緊而沉，緊則為痛，沉則為水，小便即難。脈得諸沉，當責有水，身體腫重，水病脈出者死。夫水病人，

目下有卧蚕，面目鲜泽，脉伏，其人消渴，病水腹大，小便不利，其脉沉绝者，有水，可下之。

問曰：病下利后，渴飲水，小便不利，腹滿因腫者，何也？答曰：此法当病水，若小便自利及汗出者，自当愈。

心水者，其身重而少气，不得卧，煩而躁，其人阴腫。肝水者，其腹大不能自轉側，胁下腹痛，时时津液微生，小便續通。肺水者，其身腫，小便难，时时鴨溇。脾水者，其腹大，四肢苦重，津液不生，但苦少气，小便难。腎水者，其腹大，臍腫，腰痛，不得溺，阴下湿如牛鼻上汗，其足逆冷，面反瘦。

師曰：諸有水者，腰以下腫，当利小便；腰以上腫，当发汗乃愈。

師曰：寸口脉沉而迟，沉則为水，迟則为寒，寒水相搏，趺阳脉伏，水谷不化，脾气衰則鶩溇，胃气衰則身腫；少阳脉卑，少阴脉細，男子則小便不利，妇人則經水不通，經为血，血不利則为水，名曰血分。

問曰：病者苦水，面目身体四肢皆腫，小便不利，脉之不言水，反言胸中痛；气上冲咽，狀如炙肉，当微咳喘。审如师言，其脉何类？師曰：寸口脉沉而紧；沉为水，紧为寒，沉紧相搏，結在关元，始时当微，年盛不覺。阳衰之后，榮卫相干，阳損阴盛，結寒微动，腎气上冲，咽喉塞噎，胁下急痛。医以为留飲而大下之，气击不去，其病不除，后重吐之，胃家虚煩，咽燥欲飲水，小便不利，水谷不化，面目手足浮腫；又与葶藶圓

下水，当时如小差，食飲过度，腫复如前，胸脇苦痛，象若奔豚，其水揚溢，則浮咳喘逆。当先攻击卫气令止，乃治咳，咳止，其喘自差。先治新病，病当在后。

风水脉浮，身重汗出惡风者，防己黃芪湯主之，腹痛者加芍药。

防己黃芪湯方

方見濕病中

风水，惡风，一身悉腫，脉浮，不渴，續自汗出，无大热，越婢湯主之。

[越婢湯]方

麻黃六兩 石膏半斤 生姜三兩 甘草二兩 大棗十

五枚

右五味，以水六升，先煮麻黃，去上沫，內諸药，煮取三升，分温三服。

惡风者，加附子一枚，炮。

风水，加朮四兩。《古今录驗》

皮水为病，四肢腫，水气在皮肤中，四肢羸羸动者，防己茯苓湯主之。

[防己茯苓湯]方

防己三兩 黃芪三兩 桂枝三兩 茯苓六兩 甘草二兩

右五味，以水六升，煮取二升，分温三服。

里水，越婢加朮湯主之，甘草麻黃湯亦主之。

[越婢加朮湯]方

見上。于內加白朮四兩。又見中風中

[甘草麻黃湯]方

甘草二兩 麻黃四兩

右二味，以水五升，先煮麻黃，去上沫，內甘草，煮取三升，溫服一升，重復汗出，不汗再服，慎風寒。

水之為病，其脈沉小，屬少陰；浮者為風，無水虛脹者為氣，水發其汗即已，脈沉者宜麻黃附子湯，浮者宜杏子湯。

〔麻黃附子湯〕方

麻黃三兩 甘草二兩 附子一枚，炮

右三味，以水七升，先煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取二升半，溫服八分，日三服。

〔杏子湯〕方 未見。恐是麻黃杏仁甘草石膏湯

厥而皮水者，蒲灰散主之。方見消渴中

問曰：黃汗之為病，身體腫一作：重，發熱汗出而渴，狀如風水，汗沾衣，色正黃如藥汁，脈自沉，何從得之？師曰：以汗出入水中浴，水從汗孔入得之，宜芪芍桂酒湯主之。

〔黃芪芍藥桂枝苦酒湯〕方

黃芪五兩 芍藥三兩 桂枝三兩

右三味，以苦酒一升，水七升，相和煮取三升，溫服一升，當心煩服，至六七日乃解。若心煩不止者，以苦酒阻故也。一方用美酒醴代苦酒

黃汗之病，兩脛自冷，假令發熱，此屬歷節；食已汗出，又身常暮臥盜汗出者，此榮氣也；若汗出已，反發熱者，久久其身必甲錯；發熱不止者，必生惡瘡；若身重汗出已，輒輕者，久久必身瞶，瞶即胸中痛，又從腰以上必汗出，下無汗，腰髀弛痛，如有物在皮中狀，

劇者不能食，身疼重，煩躁，小便不利，此為黃汗，桂枝加黃芪湯主之。

〔桂枝加黃芪湯〕方

桂枝 芍藥各二兩 甘草二兩 生姜三兩 大棗十二枚 黃芪二兩

右六味，以水八升，煮取三升，溫服一升，須臾，飲熱稀粥一升余，以助藥力，溫復取微汗，若不汗更服。

師曰：寸口脈遲而澀，遲則為寒，澀為血不足；趺陽脈微而遲，微則為氣，遲則為寒，寒氣不足，則手足逆冷，手足逆冷，則榮衛不利，榮衛不利，則腹滿脇鳴相逐；氣轉膀胱，榮衛俱勞；陽氣不通，即身冷，陰氣不通即骨疼；陽前通則惡寒，陰前通則痺不仁，陰陽相得，其氣乃行，大氣一轉，其氣乃散，實則失氣，虛則遺溺，名曰氣分。

氣分，心下堅，大如盤，邊如旋杯，水飲所作，桂枝去芍加麻辛附子湯主之。

〔桂枝去芍藥加麻黃細辛附子湯〕方

桂枝三兩 生姜三兩 甘草二兩 大棗十二枚 麻黃細辛各二兩 附子一枚，炮

右七味，以水七升，煮麻黃，去上沫，內諸藥，煮取二升，分溫三服，當汗出，如虫行皮中即愈。

心下堅，大如盤，邊如旋盤，水飲所作，枳朮湯主之。

〔枳朮湯〕方

枳實七枚 白朮二兩

右二味，以水五升，煮取三升，分温三服，腹中软，即当散也。

附方：

《外台》〔防己黄芪汤〕 治风水，脉浮为在表，其人或头汗出，表无他病，病者但下重，从腰以上为和，腰以下当肿及阴，难以屈伸。方见风湿中

黄疸病脉证并治第十五

论二首 脉证十四条 方七首

寸口脉浮而缓，浮则为风，缓则为痹，痹非中风；四肢苦烦，脾色必黄，瘀热以行。 趺阳脉紧而数，数则为热，热则消谷，紧则为寒，食即为满。尺脉浮为伤肾，趺阳脉紧为伤脾。风寒相搏，食谷即眩，谷气不消，胃中苦浊，浊气下流，小便不通，阴被其寒，热流膀胱，身体尽黄，名曰谷疸。额上黑，微汗出，手足中热，薄暮即发，膀胱急，小便自利，名曰女劳疸，腹如水状，不治。心中懊憹而热，不能食，时欲吐，名曰酒疸。

阳明病脉迟者，食难用饱，饱则发烦，头眩，小便必难，此欲作谷疸；虽下之，腹满如故，所以然者，脉迟故也。

夫病酒黄疸，必小便不利，其候心中热，足下热，是其证也。 酒黄疸者，或无热，靖言了，腹满，欲吐，鼻燥，其脉浮者先吐之，沉弦者先下之。 酒疸，心中热欲吐者，吐之愈。 酒疸下之，久久为黑疸，目青面

黑，心中如啖蒜齏狀，大便正黑，皮肤爪之不仁，其脉浮弱，虽黑微黄，故知之。

师曰：病黄疸，发热煩喘，胸滿口燥者，以病发时，火劫其汗，兩热所得，然黄家所得，从湿得之。一身尽发热，而黄，肚热，热在里，当下之。脉沉，渴欲飲水，小便不利者，皆发黄。腹滿，舌痿黄，躁不得睡，屬黄家舌痿疑作身痿。黄疸之病，当以十八日为期，治之十日以上瘥，反剧为难治。疸而渴者，其疸难治；疸而不渴者，其疸可治。发于阴部，其人必嘔；阳部，其人振寒而发热也。

谷疸之为病，寒热不食，食即头眩，心胸不安，久久发黄，为谷疸。茵陈蒿湯主之。

〔茵陈蒿湯〕方

茵陈蒿六两 梔子十四枚 大黄二两

右三味，以水一斗，先煮茵陈，減六升，内二味煮取三升，去滓，分温三服，小便当利，尿如皂角汁狀，色正赤，一宿腹減，黄从小便去也。

黄家，日晡所发热，而反惡寒，此为女劳得之。膀胱急，少腹滿，身尽黄，額上黑，足下热，因作黑疸。其腹胀如水狀，大便必黑，时溲，此女劳之病，非水也。腹滿者难治。硝石矾石散主之。

〔硝石矾石散〕方

硝石 矾石燒，等分

右二味，为散，以大麦粥汁和服方寸匕，日三服。病隨大小便去，小便正黄，大便正黑，是候也。

酒黃疸，心中懊懣，或熱痛，梔子大黃湯主之。

〔梔子大黃湯〕方

梔子十四枚 大黃一兩 枳實五枚 豉一升

右四味，以水六升，煮取二升，分溫三服。

諸病黃家，但利其小便，假令脈浮，當以汗解之，
宜桂枝加黃芪湯主之。方見水氣病中

諸黃豬膏發煎主之。

〔豬膏發煎〕方

豬膏半斤 亂髮如鴉子大三枚

右二味，和膏中煎之，發消藥成，分再服，病从小便出。

黃疸病，茵陳五苓散主之 一本云：茵陳湯及五苓散并主之。

〔茵陳五苓散〕方

茵陳蒿末十分 五苓散五分 方見痰飲中

右二味和，先食飲方寸匕，日三服。

黃疸，腹滿，小便不利而赤，自汗出，此為表和里實，當下之，宜大黃硝石湯。

〔大黃硝石湯〕方

大黃 黃蘗 硝石各四兩 梔子十五枚

右四味，以水六升，煮取二升，去滓，內硝更煮，取一升，頓服。

黃疸病，小便色不變，欲自利，腹滿而喘，不可除熱，熱除必噦；噦者，小半夏湯主之。方見痰飲中

諸黃，腹痛而嘔者，宜柴胡湯。必小柴胡湯。方見嘔吐

中

男子黃，小便自利，當與虛勞小建中湯。方見虛勞中
附方：

〔瓜蒂湯〕 治諸黃。方見噎病中

《千金》〔麻黃醇酒湯〕 治黃疸。

麻黃三兩

右一味，以美清酒五升，煮取二升半，頓服盡。冬
月用酒，春月用水煮之。

驚悸吐衄下血胸滿瘀血病脈証治第十六

脈証十二條 方五首

寸口脈動而弱，動即為驚，弱則為悸。

師曰：尺脈浮，目睛暈黃，衄未止，暈黃去目睛慧
了，知衄今止。又曰：從春至夏衄者太陽，從秋至
冬衄者陽明。衄家不可汗，汗出必額上陷，脈緊急，
直視不能胸，不得眠。病人面無血色，無寒熱，脈沉
弦者衄；浮弱，手按之絕者，下血；煩咳者，必吐血。
夫吐血，咳逆上氣，其脈數而有熱，不得卧者死。夫
酒客咳者，必致吐血，此因極飲過度所致也。

寸口脈弦而大，弦則為減，大則為芤，減則為寒，
芤則為虛，寒虛相擊，此名曰革，婦人則半產漏下，男
子則亡血。亡血不可發其表，汗出則寒栗而振。
病入胸滿，唇痿，舌青，口燥，但欲嗽水，不欲咽，無寒
熱，脈微大來遲，腹不滿，其人言我滿，為有瘀血。病

者如热状，煩滿，口干燥而渴，其脉反无热，此为阴伏，是瘀血也，当下之。

火邪者，桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤主之。

〔桂枝救逆汤〕方

桂枝三两，去皮 甘草二两，炙 生姜三两 牡蛎五两，熬 龙骨四两 大枣十二枚 蜀漆三两，洗去腥

右为末，以水一斗二升，先煮蜀漆，减二升，内诸药，煮取三升，去滓，温服一升。

心下悸者，半夏麻黄丸主之。

〔半夏麻黄丸〕方

半夏 麻黄等分

右二味，末之，炼蜜和丸小豆大，饮服三丸，日三服。

吐血不止者，柏叶汤主之。

〔柏叶汤〕方

柏叶 干姜各三两 艾三把

右三味，以水五升，取马通汁一升合煮，取一升，分温再服。

下血，先便后血，此远血也，黄土汤主之。

〔黄土汤〕方亦主吐血、衄血

甘草 干地黄 白朮 附子炮 阿胶 黄芩各三两
灶中黄土半斤

右七味，以水八升，煮取三升，分温二服。

下血，先血后便，此近血也，赤小豆当归散主之。

方見狐惑中 心氣不足，吐血、衄血，瀉心湯主之。

〔瀉心湯〕方 亦治霍亂

大黃二兩 黃連 黃芩各一兩

右三味，以水三升，煮取一升，頓服之。

嘔吐下利病脈証治第十七

論一首 脈証二十七條 方二十三首

夫嘔家有癰膿，不可治嘔，膿盡自愈。先嘔却渴者，此為欲解；先渴却嘔者，為水停心下，此屬飲家；嘔家本渴，今反不渴者，以心下有支飲故也，此屬支飲。

問曰：病人脈數，數為熱，當消谷引食，而反吐者何也？師曰：以發其汗，令陽微膈氣虛，脈乃數，數為客熱，不能消谷，胃中虛冷故也。脈弦者虛也，胃氣無余，朝食暮吐，變為胃反；寒在於上，醫反下之，今脈反弦，故名曰虛。寸口脈微而數，微則無氣，無氣則榮虛，榮虛則血不足，血不足則胸中冷。趺陽脈浮而澀，浮則為虛，澀則傷脾，脾傷則不磨，朝食暮吐，暮食朝吐，宿谷不化，名曰胃反。脈緊而澀，其病難治。

病人欲吐者，不可下之。

噦而腹滿，視其前後，知何部不利，利之即愈。

嘔而胸滿者，茱萸湯主之。

〔茱萸湯〕方

吳茱萸一升 人參三兩 生薑六兩 大棗十二枚

右四味，以水五升，煮取三升，溫服七合，日三服。

干嘔，吐涎沫，頭痛者，茱萸湯主之。方見上
嘔而腸鳴，心下痞者，半夏瀉心湯主之。

〔半夏瀉心湯〕方

半夏半斤洗 黃芩 干姜 人參各三兩 黃連一兩
大棗十二枚 甘草三兩，炙

右七味，以水一斗，煮取六升，去滓，再煮取三升，
溫服一升，日三服。

干嘔而利者，黃芩加半夏生姜湯主之。

〔黃芩加半夏生姜湯〕方

黃芩三兩 甘草二兩，炙 芍藥一兩 半夏半升 生
姜三兩 大棗十二枚

右六味，以水一斗，煮取三升，去滓，溫服一升，日
再、夜一服。

諸嘔吐，谷不得下者，小半夏湯主之。方見痰飲中

嘔吐而病在膈上，后思水者解，急与之。思水者，
豬苓散主之。

〔豬苓散〕方

豬苓 茯苓 白朮各等分

右三味，杵為散，飲服方寸匕，日三服。

嘔而脈弱，小便復利，身有微熱，見厥者，難治。四
逆湯主之。

〔四逆湯〕方

附子一枚，生用 干姜一兩半 甘草二兩，炙

右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再
服。強人可大附子一枚，干姜三兩。

嘔而发热者，小柴胡湯主之。

[小柴胡湯]方

柴胡半斤 黃芩三两 人參三两 甘草三两 半夏半升 生姜三两 大棗十二枚

右七味，以水一斗二升，煮取六升，去滓，再煎取三升，溫服一升，日三服。

胃反嘔吐者，大半夏湯主之。《千金》云：治胃反，不受食，食入即吐。《外台》云：治嘔，心下痞硬者

[大半夏湯]方

半夏二升，洗完用 人參三两 白蜜一升

右三味，以水一斗二升，和蜜揚之二百四十遍，煮藥取二升半，溫服一升，余分再服。

食已即吐者，大黃甘草湯主之。《外台》方又治吐水

[大黃甘草湯]方

大黃四兩 甘草一兩

右二味，以水三升，煮取一升，分溫再服。

胃反，吐而渴，欲飲水者，茯苓澤瀉湯主之。

[茯苓澤瀉湯]方 《外台》治消渴脈絕，胃反吐食之者，有小麥一升

茯苓半斤 澤瀉四兩 甘草二兩 桂枝二兩 白朮三兩 生姜四兩

右六味，以水一斗，煮取三升，內澤瀉再煮取二升半，溫服八合，日三服。

吐后渴欲得水而貪飲者，文蛤湯主之。兼主微風脈緊，頭痛。

〔文蛤湯〕方

文蛤五兩 麻黃 甘草 生姜各三兩 石膏五兩 杏仁五十個 大棗十二枚

右七味，以水六升，煮取二升，溫服一升，汗出即愈。

干嘔吐逆，吐涎沫，半夏干姜散主之。

〔半夏干姜散〕方

半夏 干姜各等分

右二味，杵為散，取方寸匕，漿水一升半，煎取七合，頓服之。

病人胸中似喘不喘，似嘔不嘔，似噦不噦，徹心中憤憤然無奈者，生姜半夏湯主之。

〔生姜半夏湯〕方

半夏半升 生姜汁一升

右二味，以水三升，煮半夏取二升，內生姜汁，煮取一升半，小冷分四服，日三、夜一服，止，停后服。

干嘔，噦，若手足厥者，橘皮湯主之。

〔橘皮湯〕方

橘皮四兩 生姜半斤

右二味，以水七升，煮取三升，溫服一升，下咽即愈。

噦逆者，橘皮竹茹湯主之。

〔橘皮竹茹湯〕方

橘皮二斤 竹茹二升 大棗三十枚 生姜半斤 甘草

五兩 人參一兩

右六味，以水一斗，煮取三升，温服一升，日三服。

夫六府气絕于外者，手足寒，上气脚縮，五藏气絕于內者，利不禁，下甚者，手足不仁。下利脉沉弦者，下重；脉大者，为未止；脉微弱数者，为欲自止，虽发热不死。下利，手足厥冷，无脉者，灸之不温，若脉不还，反微喘者死。少阴負趺阳者，为順也。下利，有微热而渴，脉弱者，今自愈。下利脉数，有微热汗出，今自愈；設脉緊，为未解。下利，脉数而渴者，今自愈；設不差，必清膿血，以有热故也。下利，脉反弦，发热身汗者，自愈。下利气者，当利其小便。下利，寸脉反浮数，尺中自涩者，必清膿血。下利清谷，不可攻其表，汗出必脹滿。下利，脉沉而迟，其人面少赤，身有微热，下利清谷者，必郁冒汗出而解，病人必微厥，所以然者，其面戴阳，下虛故也。下利后脉絕，手足厥冷，晷时脉还，手足温者生，脉不还者死。下利，腹脹滿，身体疼痛者，先温其里，乃攻其表。温里宜四逆湯，攻表宜桂枝湯。

〔四逆湯〕方 方見上

〔桂枝湯〕方

桂枝三兩，去皮 芍藥三兩 甘草三兩，炙 生姜三兩
大棗十二枚

右五味，咬咀，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服一升，服已，須臾啜稀粥一升，以助藥力，温复令一时許，遍身𦛖𦛖微似有汗者益佳，不可令如水淋漓，若一服汗出病差，停后服。

下利三部脉皆平，按之心下坚者，急下之，宜大承气湯。下利脉迟而滑者，实也，利未欲止，急下之，宜大承气湯。下利，脉反滑者，当有所去，下乃愈，宜大承气湯。下利已差，至其年月日时复发者，以病不尽故也，当下之，宜大承气湯。

〔大承气湯〕方 見瘧病中

下利譫語者，有燥屎也，小承气湯主之。

〔小承气湯〕方

大黃四兩 厚朴三兩，炙 枳实大者三枚，炙

右三味，以水四升，煮取一升二合，去滓，分温二服，得利則止。

下利便膿血者，桃花湯主之。

〔桃花湯〕方

赤石脂一斤，一半剉，一半篩末 干姜一兩 粳米一升

右三味，以水七升，煮米令熟，去滓，温七合，內赤石脂末方寸匕，日三服，若一服愈，余勿服。热利下重者，白头翁湯主之。

〔白头翁湯〕方

白头翁三兩 黃連 黃蘗 秦皮各三兩

右四味，以水七升，煮取二升，去滓，温服一升，不愈更服。

下利后，更煩，按之心下濡者，为虚煩也，梔子豉湯主之。

〔梔子豉湯〕方

梔子十四枚 香豉四合，綿裹

右二味，以水四升，先煮梔子，得二升半，內豉煮取一升半，去滓，分二服，溫進一服，得吐則止。

下利清谷，里寒外熱，汗出而厥者，通脈四逆湯主之。

〔通脈四逆湯〕方

附子大者一枚，生用 干姜三兩，強人可四兩 甘草二兩，炙

右三味，以水三升，煮取一升二合，去滓，分溫再服。

下利肺痛，紫參湯主之。

〔紫參湯〕方

紫參半斤 甘草三兩

右二味，以水五升，先煮紫參取二升，內甘草煮取一升半，分溫三服。疑非仲景方

氣利，訶梨勒散主之。

〔訶梨勒散〕方

訶梨勒十枚，煨

右一味，為散，粥飲和，頓服。疑非仲景方

附方：

《千金翼》〔小承氣湯〕治大便不通，噯，數譫語。

方見上

《外台》〔黃芩湯〕治干嘔下利。

黃芩 人參 干姜各二兩 桂枝一兩 大棗十二枚

半夏半升

右六味，以水七升，煮取三升，溫分三服。

瘕癰腸癰浸淫病脈証并治第十八

论一首 脉証三条 方六首

諸浮數脉，应当发热，而反洒淅惡寒，若有痛處，当发其癰。

師曰：諸癰腫欲知有膿、无膿，以手掩腫上熱者，为有膿；不熱者，为无膿。

腸癰之为病，其身甲錯，腹皮急，按之濡如腫狀，腹无積聚，身无熱，脉數，此为腸内有癰膿，薏苡附子敗醬散主之。

〔薏苡附子敗醬散〕方

薏苡仁十分 附子二分 敗醬五分

右三味，杵为末，取方寸匕，以水二升，煎減半，頓服，小便当下。

腸癰者，少腹腫痞，按之即痛，如淋，小便自調，时发热，自汗出，复惡寒。其脉迟緊者，膿未成，可下之，当有血；脉洪數者，膿已成，不可下也，大黃牡丹湯主之。

〔大黃牡丹湯〕方

大黃四兩 牡丹一兩 桃仁五十个 瓜子半升 芒硝三合

右五味，以水六升，煮取一升，去滓，內芒硝，再煎沸，頓服之，有膿当下，如无膿，当下血。

問曰：寸口脉浮微而澀，法当亡血，若汗出，設不

汗者云何？答曰：若身有瘡，被刀斧所傷，亡血故也。

病金瘡，王不留行散主之。

〔王不留行散〕方

王不留行十分 八月八日采 蒴藋細叶十分 七月七日采
桑東南根白皮十分 三月三日采 甘草十八分 川椒三分，除
目及閉口，去汗 黃芩二分 干姜二分 芍藥二分 厚朴二
分

右九味，桑根皮以上三味燒灰存性，勿令灰過，各別杵篩，合治之為散，服方寸匕，小瘡即粉之，大瘡但服之，產後亦可服。如風寒，桑東根勿取之，前三物皆陰干百日。

〔排膿散〕方

枳實十六枚 芍藥六分 桔梗二分

右三味，杵為散，取雞子黃一枚，以藥散與雞黃相等，揉和令相得，飲和服之，日一服。

〔排膿湯〕方

甘草二兩 桔梗三兩 生姜一兩 大棗十枚

右四味，以水三升，煮取一升，溫服五合，日再服。

浸淫瘡，從口流向四支者，可治；從四支流來入口者，不可治。

浸淫瘡，黃連粉主之。方未見

跌蹶手指臂肿轉筋阴狐疝蚘虫 病脈証治第十九

论一首 脉証一条 方五首

师曰：病跌蹶，其人但能前，不能却，刺腠入二寸，此太阳經伤也。

病人常以手指臂腫动，此人身体瞶瞶者，藜蘆甘草湯主之。

〔藜蘆甘草湯〕方未見

轉筋之为病，其人臂脚直，脉上下行，微弦，轉筋入腹者，鸡屎白散主之。

〔鸡屎白散〕方

鸡屎白

右一味，为散，取方寸匕，以水六合，和温服。

阴狐疝气者，偏有小大，时时上下，蜘蛛散主之。

〔蜘蛛散〕方

蜘蛛十四枚，熬焦 桂枝半两

右二味，为散，取八分一匕，飲和服，日再服，蜜圓亦可。

問曰：病腹痛有虫，其脉何以別之？师曰：腹中痛，其脉当沉，若弦反洪大，故有蚘虫。

蚘虫之为病，令人吐涎，心痛发作有时，毒藥不止，甘草粉蜜湯主之。

〔甘草粉蜜湯〕方

甘草二两 粉一两重 蜜四两

右三味，以水三升，先煮甘草取二升，去滓，内粉蜜，攪令和，煎如薄粥，温服一升，差即止。

虬厥者，当吐虬，令病者静而复时烦，此为藏寒，虬上入膈，故烦；须臾复止，得食而嘔，又烦者，虬闻食臭出，其人当自吐虬。

虬厥者，烏梅圓主之。

〔烏梅圓〕方

烏梅三百个 細辛六两 干姜十两 黃連一斤 当归
四两 附子六两，炮 川椒四两，去汗 桂枝六两 人參
黃蘗各六两

右十味，異搗篩，合治之，以苦酒漬烏梅一宿，去核，蒸之五升米下，飯熟搗成泥，和藥令相得，内臼中，与蜜杵二千下，圓如梧子大，先食飲服十圓，日三服，稍加至二十圓。禁生、冷、滑、臭等食。

卷 下

妇人妊娠病脈証并治第二十

証三条 方九首

师曰：妇人得平脉，阴脉小弱，其人渴，不能食，无寒热，名妊娠，桂枝湯主之。方見利中于法六十日当有此証，設有医治逆者，却一月，加吐下者，則絕之。

妇人宿有癥病，經断未及三月，而得漏下不止，胎动在臍上者，为癥病害。妊娠六月动者，前三月經水利时，胎也。下血者，后断三月衃也。所以血不止者，其癥不去故也，当下其癥，桂枝茯苓圓主之。

〔桂枝茯苓丸〕方

桂枝 茯苓 牡丹去心 桃仁去皮尖、熬 芍药各等分

右五味，末之，煉蜜和丸如兔屎大，每日食前服一丸，不知，加至三丸。

妇人怀娠六七月，脉弦发热，其胎愈脹，腹痛惡寒者，少腹如扇，所以然者，子藏开故也，当以附子湯温其藏。方未見

师曰：妇人漏下者；有半产后因續下血都不絕者；有妊娠下血者，假令妊娠腹中痛，为胞阻，膠艾湯主之。

〔芎归膠艾湯〕方 一方加干姜一两。胡洽治妇人胞动无干姜

芎藭 阿膠 甘草各二两 艾叶 当归各三两 芍

药四两 干地黄

右七味，以水五升，清酒三升，合煮取三升，去滓，
内膠令消尽，温服一升，日三服，不差更作。

妇人怀娠腹中疝痛，当归芍药散主之。

〔当归芍药散〕方

当归三两 芍药一斤 茯苓四两 白朮四两 泽泻半

斤 芎藭半斤 一作三两

右六味，杵为散，取方寸匕，酒和，日三服。

妊娠嘔吐不止，干姜人参半夏丸主之。

〔干姜人参半夏丸〕方

干姜 人参各一两 半夏二两

右三味，末之，以生姜汁糊为丸如梧子大，飲服十
丸，日三服。

妊娠小便难，飲食如故，当归貝母苦参丸主之。

〔当归貝母苦参丸〕方 男子加滑石半两

当归 貝母 苦参各四两

右三味，末之，煉蜜丸如小豆大，飲服三丸，加至
十丸。

妊娠有水气，身重，小便不利，洒淅惡寒，起即头
眩，葵子茯苓散主之。

〔葵子茯苓散〕方

葵子一斤 茯苓三两

右二味，杵为散，飲服方寸匕，日三服，小便利則

愈。

妇人妊娠，宜常服当归散主之。

〔当归散〕方

当归 黄芩 芍药 芎藭各一斤 白朮半斤

右五味，杵为散，酒饮服方寸匕，日再服。妊娠常服，即易产，胎无苦疾，产后百病悉主之。

妊娠养胎，白朮散主之。

〔白朮散〕方 见《外台》

白朮 芎藭 蜀椒三分，去汗 牡蛎

右四味，杵为散，酒服一钱匕，日三服，夜一服。但苦痛加芍药；心下毒痛倍加芎藭；心烦吐痛不能食，加细辛一两，半夏大者二十枚，服之后，更以醋浆水服之；若嘔，以醋浆水服之，复不解者，小麦汁服之；已后渴者，大麦粥服之。病虽愈，服之勿置。

妇人伤胎怀身，腹满不得小便，从腰以下重，如有水气状，怀身七月，太阴当养不养，此心气实，当刺泻劳宫及关元，小便微利则愈。见《玉函》

妇人产后病脉证治第二十一

论一首 证六条 方八首

问曰：新产妇人有三病，一者病痙，二者病郁冒，三者大便难，何谓也？师曰：新产血虚，多汗出，喜中风，故令病痙；亡血复汗，寒多，故令郁冒；亡津液胃燥，故大便难。产妇郁冒，其脉微弱，嘔不能食，大便

反坚，但头汗出，所以然者，血虚而厥，厥而必冒，冒家欲解，必大汗出，以血虚下厥，孤阳上出，故头汗出。所以产妇喜汗出者，亡阴血虚，阳气独盛，故当汗出，阴阳乃复。大便坚，嘔不能食，小柴胡汤主之。方见呕吐中

病解能食，七八日更发热者，此为胃实，大承气汤主之。见辨病中

产后腹中病痛，当归生姜羊肉汤主之。并治腹中寒疝，虚劳不足。

〔当归生姜羊肉汤〕方 见寒病中

产后腹痛，烦满不得卧，枳实芍药散主之。

〔枳实芍药散〕方

枳实烧令黑，勿大过 芍药等分

右二味，杵为散，服方寸匕，日三服，并主癰脓，以麦粥下之。

师曰：产妇腹痛，法当以枳实芍药散，假令不愈者，此为腹中有干血着脐下，宜下瘀血汤主之。亦主经水不利。

〔下瘀血汤〕方

大黄三两 桃仁二十枚 蟅虫二十枚，熬，去足

右三味，末之，炼蜜和为四丸，以酒一升，煎一丸，取六合，顿服之，新血下如豚肝。

产后七八日，无太阳证，少腹坚痛，此恶露不尽，不大便，烦躁发热，切脉微实，再倍发热，日晡时烦躁者，不食，食则谵语，至夜即愈，宜大承气汤主之。热在

里，結在膀胱也。見痙病中

产后风，續之数十日不解，头微痛惡寒，时时有热，心下悶，干嘔汗出，虽久，阳旦証續在耳，可与阳旦湯。即桂枝湯。方見下利中

产后中风，发热，面正赤，喘而头痛，竹叶湯主之。

〔竹叶湯〕方

竹叶一把 葛根三两 防风一两 桔梗 桂枝 人参 甘草各一两 附子一枚，炮 大枣十五枚 生姜五两

右十味，以水一斗，煮取二升半，分温三服，温复使汗出。頸項强，用大附子一枚，破之如豆大，前药搗去沫，嘔者，加半夏半升洗。

妇人乳中虚，煩乱，嘔逆，安中益气，竹皮大圓主之。

〔竹皮大丸〕方

生竹茹二分 石膏二分 桂枝一分 甘草七分 白薇一分

右五味，末之，棗肉和丸彈子大，以飲服一丸，日三、夜二服。有热者，倍白薇；煩喘者，加柏实一分。

产后下利虚极，白头翁加甘草阿膠湯主之。

〔白头翁加甘草阿膠湯〕方

白头翁 甘草 阿膠各二两 秦皮 黃連 蘖皮各三两

右六味，以水七升，煮取二升半，内膠令消尽，分温三服。

附方：

《千金》〔三物黃芩湯〕 治婦人在草蓐自發露得風。四肢苦煩熱，頭痛者，與小柴胡湯；頭不痛但煩者，此湯主之。

黃芩一兩 苦參二兩 干地黄四兩

右三味，以水六升，煮取二升，溫服一升，多吐下虫。

《千金》〔內補當歸建中湯〕 治婦人產後虛羸不足，腹中刺痛不止，吸吸少氣，或苦少腹中急，摩痛引腰背，不能食飲。產後一月日，得服四五劑為善，令人強壯宜。

當歸四兩 桂枝三兩 芍藥六兩 生姜三兩 甘草二兩 大棗十二枚

右六味，以水一斗，煮取三升，分溫三服，一日令盡。若大虛，加飴糖六兩，湯成內之，于火上暖令飴消，若去血過多，崩傷內衄不止，加地黄六兩，阿膠二兩，合八味，湯成內阿膠，若无當歸，以芎藭代之，若无生姜，以干姜代之。

婦人雜病脈証并治第二十二

論一首 脈証合十四條 方十四首

婦人中风七八日，續來寒熱，發作有時，經水適斷，此為熱入血室。其血必結，故使如瘧狀，發作有時，小柴胡湯主之。方見嘔吐中

婦人傷寒發熱，經水適來，晝日明了，暮則譫語，

如見鬼狀者，此為熱入血室。治之無犯胃氣及上二焦，必自愈。

婦人中风，發熱惡寒，經水適來，得七八日，熱除，脈遲，身涼和，胸脇滿，如結胸狀，譫語者，此為熱入血室也，當刺期門，隨其處而取之。

陽明病，下血譫語者，此為熱入血室，但頭汗出，當刺期門，隨其處而瀉之。澀然汗出者愈。

婦人咽中如有炙臠，半夏厚朴湯主之。

〔半夏厚朴湯〕方 《千金》作胸滿心下堅，咽中帖帖如有炙肉，吐之不出，吞之不下

半夏一升 厚朴三兩 茯苓四兩 生姜五兩 干蘇葉二兩

右五味，以水七升，煮取四升，分溫四服，日三、夜一服。

婦人藏躁，喜悲傷，欲哭象，如神靈所作，數欠伸，甘麥大棗湯主之。

〔甘草小麥大棗湯〕方

甘草三兩 小麥一升 大棗十枚

右三味，以水六升，煮取三升，溫分三服，亦補脾氣。

婦人吐涎沫，醫反下之，心下即痞，當先治其吐涎沫，小青龍湯主之。涎沫止，乃治痞，瀉心湯主之。

〔小青龍湯〕方 見肺癰中

〔瀉心湯〕方 見驚悸中

婦人之病，因虛積冷結氣，為諸經水斷絕，至有歷

年血寒，积結胞門。寒伤經絡，凝坚在上，嘔吐涎唾，久成肺癰，形体損分；在中盤結，繞臍寒疝，或兩脇疼痛，与藏相連，或結热中，痛在关元，脉数无痞，肌若魚鱗，时著男子，非止女身；在下未多，經候不勻，令阴掣痛，少腹惡寒，或引腰脊，下根气街，气冲急痛，膝脛疼痛，奄忽眩冒，狀如厥癰，或有忧慘，悲伤多嗔，此皆帶下，非有鬼神。久則羸瘦，脉虛多寒，三十六病，千变万端，审脉阴阳，虛实緊弦，行其針药，治危得安，其虽同病，脉各異源，子当辯記，勿謂不然。

問曰：妇人年五十，所病下利数十日不止，暮即发热，少腹里急，腹滿，手掌煩热，唇口干燥，何也？师曰：此病屬帶下。何以故？曾經半产，瘀血在少腹不去。何以知之？其証唇口干燥，故知之。当以温經湯主之。

〔温經湯〕方

吳茱萸三兩 当归 芍药 各二兩 人参 桂枝 阿膠 牡丹皮去心 生姜 甘草各二兩 半夏半升 麥門冬一升，去心

右十二味，以水一斗，煮取三升，分温三服。亦主妇人少腹寒，久不受胎，兼取崩中去血，或月水来过多，及至期不来。

帶下經水不利，少腹滿痛，經一月再見者，土瓜根散主之。

〔土瓜根散〕方阴癰腫亦主之

土瓜根 芍药 桂枝 麤虫各三分

右四味，杵为散，酒服方寸匕，日三服。

寸口脉弦而大，弦则为减，大则为芤，减则为寒，芤则为虚，寒虚相搏，此名曰革。妇人则半产漏下，旋复花汤主之。

〔旋复花汤〕方

旋复花三两 葱十四茎 新绛少许

右三味，以水三升，煮取一升，顿服之。

妇人陷经漏下，黑不解，胶姜汤主之。臣亿等校诸本无胶姜汤方，想是妊娠中胶艾汤

妇人少腹满，如敦状，小便微难而不渴，生后者，此为水与血，俱结在血室也，大黄甘遂汤主之。

〔大黄甘遂汤〕方

大黄四两 甘遂二两 阿胶二两

右三味，以水三升，煮取一升，顿服之，其血当下。

妇人经水不利下，抵当汤主之。亦治男子膀胱满急有瘀血者

〔抵当汤〕方

水蛭三十个，熬 虻虫三十枚，熬，去翅足 桃仁二十个，去皮尖 大黄三两，酒浸

右四味，为末，以水五升，煮取三升，去滓，温服一升。

妇人经水闭不利，藏坚癖不止，中有干血，下白物，矾石丸主之。

〔矾石丸〕方

矾石三分，烧 杏仁一分

右二味，末之，煉蜜和丸棗核大，內藏中，劇者再內之。

婦人六十二種風，及腹中血氣刺痛，紅藍花酒主之。

〔紅藍花酒〕方疑非仲景方

紅藍花一兩

右一味，以酒一大升，煎減半，頓服一半，未止再服。

婦人腹中諸疾痛，當歸芍藥散主之。

〔當歸芍藥散〕方 見前妊娠中

婦人腹中痛，小建中湯主之。

〔小建中湯〕方 見前虛勞中

問曰：婦人病，飲食如故，煩熱不得臥，而反倚息者，何也？師曰：此名轉胞，不得溺也。以胞系了戾，故致此病，但利小便則愈，宜腎氣丸主之。

〔腎氣丸〕方

干地黄八兩 薯蕷四兩 山茱萸四兩 澤瀉三兩 茯苓三兩 牡丹皮三兩 桂枝 附子炮，各一兩

右八味，末之，煉蜜和丸梧子大，酒下十五丸，加至二十五丸，日再服。

〔蛇床子散〕方 溫陰中坐藥。

蛇床子仁

右一味，末之，以白粉少許，和合相得，如棗大，綿裹內之，自然溫。

少陰脈滑而數者，陰中即生瘡，陰中蝕瘡爛者，狼

牙湯洗之。

〔狼牙湯〕方

狼牙三兩

右一味，以水四升，煮取半升，以綿纏筋如繭，浸湯瀝陰中，日四遍。

胃氣下泄，陰吹而正噎，此谷氣之實也，膏發煎導之。

〔膏發煎〕方 見黃疸中

〔小兒疳蟲蝕齒〕方 疑非仲景方

雄黃 葶藶

右二味，末之，取臘日豬脂，熔，以槐枝綿裹頭四五枚，點藥烙之。

雜方第二十三

論一首 証一條 方二十二首

退五藏虛熱，〔四時加減柴胡飲子〕方

冬三月加：柴胡八分 白朮八分 大腹檳榔四枚，并皮子用 陳皮五分 生姜五分 桔梗七分

春三月加：枳實 減：白朮 共六味。

夏三月加：生姜三分 枳實五分 甘草三分 共八味。

秋三月加：陳皮三分 共六味。

右各咬咀，分為三貼，一貼以水三升，煮取二升，分溫三服，如人行四五里進一服。如四體壅，添甘草少許，每貼分作三小貼，每小貼以水一升，煮取七合，

温服，再合滓为一服，重煮都成四服。疑非仲景方

〔長服訶梨勒丸〕方疑非仲景方

訶梨勒 陈皮 厚朴各三两

右三味，末之，煉蜜丸如梧子大，酒飲服二十丸，加至三十丸。

〔三物备急丸〕方 見《千金》司空裴秀为散用亦可。先和成汁，乃傾口中，令从齿間得入，至良驗

大黃一两 干姜一两 巴豆一两，去皮心，熬，外研如脂

右药各須精新，先搗大黃、干姜为末，研巴豆內中，合治一千杵，用为散，蜜和丸亦佳，密器中貯之，莫令歇。主心腹諸卒暴百病。若中恶客忤，心腹脹滿，卒痛如錐刺，气急口噤，停尸卒死者，以暖水若酒服大豆許三四丸，或不下，捧头起，灌令下咽，須臾当差，如未差，更与三丸，当腹中鳴，即吐下便差。若口噤，亦須折齒灌之。

治伤寒令愈不复，〔紫石寒食散〕方 見《千金翼》

紫石英 白石英 赤石脂 鍾乳礞煉 栝楼根 防风 桔梗 文蛤 鬼臼各十分 太一余粮十分，燒干姜 附子炮去皮 桂枝去皮，各四分

右十三味，杵为散，酒服方寸匕。

〔救卒死方〕

薤搗汁灌鼻中。

又方：

雄鸡冠割取血，管吹內鼻中。

猪脂如鸡子大，苦酒一升煮沸灌喉中。

鸡肝及血涂面上，以灰圍四旁，立起。

大豆二七粒，以鸡子白并酒和，尽以吞之。

〔救卒死而壯热者方〕

硃石半斤，以水一斗半煮消，以漬脚令沒踝。

〔救卒死而目閉者方〕

騎牛临面，搗薤汁灌耳中，吹皂莢末鼻中，立效。

〔救卒死而張口反折者方〕

灸手足兩爪后十四壯了，飲以五毒諸膏散。有巴豆

者

〔救卒死而四肢不收失便者方〕

馬屎一升，水三斗，煮取二斗以洗之；又取牛洞糞糞也一升，温酒灌口中，灸心下一寸、臍上三寸、臍下四寸各一百壯，差。

〔救小兒卒死而吐利不知是何病方〕

狗屎一丸，絞取汁以灌之。无湿者，水煮干者取汁。

尸蹇脉动而无气，气閉不通，故靜而死也，治方脉証見上卷

菖蒲屑，内鼻兩孔中吹之，令人以桂屑着舌下。

又方：

剔取左角发方寸燒末，酒和，灌令入喉，立起。

〔救卒死客忤死还魂湯主之方〕

《千金方》云：主卒忤鬼击飞尸，諸奄忽气絕，无复觉，或已无脉，口禁拘不开，去齿下湯。湯下口不下者，分病人发左右，提掣肩引之。药下复增取一升，須臾立苏。

麻黃三兩，去節 一方四兩 杏仁去皮尖，七十个 甘草一兩，炙 《千金》用桂心二兩

右三味，以水八升，煮取三升，去滓，分令咽之。通治諸感忤。

又方：

韭根一把 烏梅二七个 吳茱萸半升，炒

右三味，以水一斗煮之，以病人櫛內中，三沸，櫛浮者生，沉者死。煮取三升，去滓，分飲之。

救自縊死，且至暮虽已冷，必可治；暮至旦，小难也，恐此当言忿气盛故也。然夏时夜短于晝，又热犹应可治。又云：心下若微温者，一日以上，犹可治之方

徐徐抱解，不得截繩，上下安被臥之。一人以脚踏其兩肩，手少挽其发常弦弦勿縱之；一人以手按据胸上，数动之；一人摩捋臂脛屈伸之，若已僵，但渐渐强屈之，并按其腹。如此一炊頃，气從口出，呼吸眼开，而犹引按莫置，亦勿若劳之，須臾，可少桂湯及粥清含与之，令濡喉，渐渐能咽，及稍止。若向令兩人以管吹其兩耳，采好。此法最善，无不活也。

〔凡中喝死，不可使得冷，得冷便死，疗之方〕

屈草帶，繞喝人臍，使三兩人溺其中，令温。亦可用热泥和屈草，亦可扣瓦碗底按及車缸以着喝人，取令溺，須得流去，此謂道路穷，卒无湯，当令溺其中，欲使多人溺，取令温若湯，便可与之，不可泥及車缸，恐此物冷，喝既在夏月，得热泥土、暖車缸，亦可用也。

〔救溺死方〕

取灶中灰兩石余，以埋人，從頭至足，水出七孔，即活。

右疔自縊溺喝之法，并出自張仲景为之，其意殊絕，殆非常情所及，本草所能关，实救人之大术矣。伤寒家数有喝病，非此遇热之喝。見《外台》、《肘后》目

〔治馬墜及一切筋骨損方〕 見《肘后》方

大黃一兩，切浸湯成下 緋帛如手大，燒灰 乱发如鴉子大，燒灰用 久用炊單布一尺，燒灰 敗蒲一握三寸 桃仁四十九个，去皮尖熬 甘草如中指節，炙剉

右七味，以童子小便量多少煎湯成，內酒一大盞，次下大黃，去滓，分溫三服。先剉敗蒲席半領，煎湯浴，衣被蓋復，斯須通利數行，痛楚立差。利及浴水赤，勿怪，即瘀血也。

禽獸魚虫禁忌并治第二十四

論辯二首 合九十法 方二十一首

凡飲食滋味，以養于生，食之有妨，反能為害，自非服藥煉液，焉能不飲食乎？切見時人，不閑調攝，疾病競起，若不因食而生，苟全其生，須知切忌者矣。所食之味，有與病相宜，有與身為害，若得宜則益體，害則成疾，以此致危，例皆難療。凡煮藥飲汁，以解毒者，虽云救急，不可熱飲，諸毒病得熱更甚，宜冷飲之。

肝病禁辛，心病禁咸，脾病禁酸，肺病禁苦，腎病

禁甘；春不食肝，夏不食心，秋不食肺，冬不食腎，四季不食脾。辯曰：春不食肝者，為肝氣王，脾氣敗，若食肝，則又補肝，脾氣敗尤甚，不可救。又肝王之時，不可以死氣入肝，恐傷魂也。若非王時即虛，以肝補之佳，余藏准此。

凡肝臟自不可輕噉。自死者彌甚。凡心皆為神識所舍，勿食之，使人來生復其報對矣。凡肉及肝，落地不著坐土者，不可食之。豬肉落水浮者，不可食。諸肉及魚，若狗不食，鳥不啄者，不可食。諸肉不干，火炙不動，見水自動者，不可食之。肉中有如朱點者，不可食之。六畜肉熱血不斷者，不可食之。父母及身本命肉，食之令人神魂不安。食肥肉及熱羹，不得飲冷水。諸五藏及魚，投地尘土不污者，不可食之。穢飯、餒肉、臭魚，食之皆傷人。自死肉，口閉者，不可食之。六畜自死，皆疫死，則有毒，不可食之。獸自死，北首及伏地者，食之殺人。食生肉，飽飲乳，變成白虫一作：血蟲。疫死牛肉，食之令病洞下，亦致堅積，宜利藥下之。脯臟米甕中，有毒，及經夏食之，發腎病。

〔治自死六畜肉中毒方〕

黃蘗屑，搗服方寸匕。

〔治食郁肉漏脯中毒方〕 郁肉，密器蓋之隔宿者是也。漏脯，茅屋漏下沾着者是也。

燒犬屎，酒服方寸匕，每服人乳汁亦良。飲生韭汁三升，亦得。

〔治黍米中藏干脯食之中毒方〕

大豆，濃煮汁飲數升即解。亦治狸肉漏脯等毒。

〔治食生肉中毒方〕

掘地深三尺，取其下土三升，以水五升煮數沸，澄清汁，飲一升，即愈。

〔治六畜鳥獸肝中毒方〕

水浸豆豉，絞取汁，服數升愈。

馬脚无夜眼者，不可食之。食酸馬肉，不飲酒，則殺人。馬肉不可熟食，傷人心。馬鞍下肉，食之殺人。白馬黑頭者，不可食之。白馬青蹄者，不可食之。馬肉、豬肉共食，飽醉臥，大忌。駢、馬肉合豬肉食之，成霍亂。馬肝及毛，不可妄食，中毒害人。

〔治馬肝毒中人未死方〕

雄鼠屎二七粒，末之，水和服，日再服。屎尖者是又方

人垢，取方寸匕，服之佳。

〔治食馬肉中毒欲死方〕

香豉二兩 杏仁三兩

右二味，蒸一食頃熟，杵之服，日再服。

又方：

煮蘆根汁飲之良。

疫死牛，或目赤，或黃，食之大忌。牛肉共豬肉食之，必作寸白虫。青牛腸，不可合犬肉食之。牛肺從三月至五月，其中有虫如馬尾，割去勿食，食則損

人。牛、羊、猪肉，皆不得以楮木、桑木蒸炙，食之令人腹内生虫。噉蛇牛肉殺人。何以知之？噉蛇者，毛发向后順者是也。

〔治噉蛇牛肉食之欲死方〕

飲人乳汁一升，立愈。

又方：

以泔洗头，飲一升愈。

牛肚細切，以水一斗，煮取一升，暖飲之，大汗出者愈。

〔治食牛肉中毒方〕

甘草煮汁飲之，即解。

羊肉其有宿熱者，不可食之。羊肉不可共生魚、酪食之，害人。羊蹄甲中有珠子白者，名羊懸筋，食之令人癩。白羊黑頭，食其腦，作腸癰。羊肝共生椒食之，破人五藏。猪肉共羊肝和食之，令人心悶。猪肉以生胡荽同食，爛人臍。猪脂不可合梅子食之。猪肉和葵食之，少氣。鹿人不可和蒲白作羹，食之發惡瘡。麋脂及梅李子，若妊婦食之，令子青盲，男子傷精。蠶肉不可合蝦及生菜、梅、李果食之，皆病人。癩疾人不可食熊肉，令終身不愈。白犬自死，不出舌者，食之害人。食狗鼠余，令人發癩瘡。

〔治食犬肉不消，心下堅，或腹脹，口干大渴，心急發熱，妄語如狂，或洞下方〕

杏仁一升，合皮熟研用

以沸湯三升，和取汁，分三服，利下肉片，大驗。

妇人妊娠，不可食兔肉、山羊肉，及蟹、鸡、鸭，令子无声音。兔肉不可合白鸡肉食之，令人面发黄。兔肉着干姜食之，成霍乱。凡鸟自死，口不闭，翅不合者，不可食之。诸禽肉，肝青者，食之杀人。鸡有六翮四距者，不可食之。乌鸡白首者，不可食之。鸡不可共葫蒜食之，滞气。一云：鸡子。山鸡不可合鸟兽肉食之。雉肉久食之，令人瘦。鸭卵不可合蟹肉食之。妇人妊娠，食雀肉，令子淫乱无耻。雀肉不可合李子食之。燕肉勿食，入水为蛟龙所噉。

〔鸟兽有中毒箭死者，其肉有毒，解之方〕

大豆，煮汁及盐汁服之解。

鱼头正白如连珠至脊上，食之杀人。鱼头中无腮者，不可食之，杀人。鱼无肠胆者，不可食之，三年阴不起，女子绝生。鱼头似有角者，不可食之。鱼目合者，不可食之。六甲日，勿食鳞甲之物。鱼不可合鸡肉食之。鱼不得合鸕鶿肉食之。鲤鱼鲙，不可合小豆藿食之；其子不可合猪肝食之，害人。鲤鱼不可合犬肉食之。鲢鱼不可合猴雉肉食之。一云不可合猪肝食。鲢鱼合鹿肉生食，令人筋甲缩。青鱼鲙，不可合生葫葵及生葵并麦中食之。鲭鲙不可合白犬血食之。龟肉不可合酒果子食之。蟹目凹陷者，及脐下有王字形者，不可食之。其肉不得合鸡、鸭子食之。龟、蟹肉不可合莧菜食之。蝦无须，及腹下通黑，煮之反白者，不可食之。食膾，饮乳酪，令人腹中生虫为瘕。

〔鯨食之，在心胸間不化，吐復不出，速下除之，久成癥病，治之方〕

橘皮一兩 大黃二兩 朴硝二兩

右三味，以水一大升，煮至小升，頓服即消。

〔食鯨多不消，結為癥病，治之方〕

馬鞭草

右一味，搗汁飲之。或以姜叶汁飲之一升，亦消。

又可服吐瀉吐之。

〔食魚后食毒，兩種煩亂，治之方〕

橘皮

濃煎汁服之，即解。

〔食鰕鱖魚中毒方〕

蘆根

煮汁服之，即解。

蟹目相向，足斑目赤者，不可食之。

〔食蟹中毒治之方〕

紫蘇

煮汁飲之三升。 紫蘇子搗汁飲之，亦良。

又方：

冬瓜汁飲二升，食冬瓜亦可。

凡蟹未遇霜，多毒，其熟者乃可食之。 蜘蛛落食中，有毒，勿食之。 凡蜂、蠅、虫、蟻等多集食上，食之致瘕。

果实菜谷禁忌并治第二十五

果子生食生瘡。果子落地經宿，虫蟻食之者，人大忌食之。生米停留多日有損处，食之伤人。桃子多食，令人热，仍不得入水浴，令人病淋瀝寒热病。杏酪不熟伤人。梅多食坏人齒。李不可多食，令人臃脹。林檎不可多食，令人百脉弱。橘柚多食，令人口爽，不知五味。梨不可多食，令人寒中，金瘡、产妇，亦不宜食。櫻桃、杏，多食伤筋骨。安石榴不可多食，損人肺。胡桃不可多食，令人动痰飲。生棗多食，令人热渴气脹，寒热羸瘦者，彌不可食，伤人。

〔食諸果中毒治之方〕

猪骨燒过

右一味，末之，水服方寸匕。亦治馬肝、漏脯等毒。

木耳赤色及仰生者，勿食。菌仰卷及赤色者，不可食。

〔食諸菌中毒，悶乱欲死，治之方〕

人糞汁飲一升，土漿飲一二升，大豆濃煮汁飲之，服諸吐利药，并解。

食楓柱菌而哭不止，治之以前方。

誤食野芋，煩毒欲死，治之以前方。其野芋根，山东人名魁芋。人种芋三年不收，亦成野芋，并杀人。

〔蜀椒閉口者有毒，誤食之，戟人咽喉，气病欲絕，

或吐下白沫，身体痹冷，急治之方]

肉桂煎汁飲之，多飲冷水一二升，或食蒜，或飲地漿，或濃煮豉汁飲之，并解。

正月勿食生葱，令人面生游风。 二月勿食蓼，伤人肾。 三月勿食小蒜，伤人志性。 四月、八月勿食胡荽，伤人神。 五月勿食韭，令人乏气力。 五月五日勿食一切生菜，发百病。 六月、七月勿食茱萸，伤神气。 八月、九月勿食姜，伤人神。 十月勿食椒，损人心，伤心脉。 十一月、十二月勿食薤，令人多涕唾。

四季勿食生葵，令人飲食不化，发百病，非但食中，药中皆不可用，深宜慎之。 时病差未健，食生菜，手足必腫。 夜食生菜，不利人。 十月勿食被霜生菜，令人面无光，目涩心痛，腰疼，或发心瘡，瘡发时，手足十指爪皆青，困委。 葱、韭初生芽者，食之伤人心气。 飲白酒食生韭，令人病增。 生葱不可共蜜食之，殺人。 独顆蒜，瀾忌。 棗合生葱食之，令人病。 生葱和雄鸡、雉、白犬肉食之，令人七窍經年流血。 食糖、蜜后四日內食生葱、韭，令人心痛。 夜食諸姜、蒜、葱等，伤人心。 蕪菁根，多食令人气脹。 薤不可共牛肉作羹，食之成瘕病，韭亦然。 蓴多病，动痔疾。 野苣不可同蜜食之，作內痔。 白苣不可共酪同食，作蠱虫。 黃瓜食之，发热病。 葵心不可食，伤人；叶尤冷，黃背赤莖者，勿食之。 胡荽久食之，令人多忘。 病人不可食胡荽及黃花菜。 芋不可多

食，动病。 妊婦食姜，令子余指。 蓼多食，发心痛。
蓼和生魚食之，令人奪氣，阴咳疼痛。 芥菜不可共兔
肉食之，成惡邪病。 小蒜多食，伤人心力。

〔食躁或躁方〕

豉

濃煮汁飲之。

〔鈎吻与芹菜相似，誤食之殺人，解之方〕〔时后〕云：

与茱萸食芹相似

齊范八兩

右一味，水六升，煮取二升，分溫二服。鈎吻生地傍
无他草，其莖有毛，以此別之

〔菜中有水蓂蓉，叶圓而光，有毒，誤食之，令人狂
乱，狀如中風，或吐血，治之方〕

甘草

煮汁服之，即解。

〔春秋二時，龙帶精入芹菜中，人偶食之為病。发
時手背腹滿，痛不可忍，各蛟龍病治之方〕

硬糖二三升

右一味，日兩度服之，吐出如蜥蜴三五枚，差。

〔食苦瓠中毒治之方〕

黎蘗

煮汁，數服之，解。

扁豆，寒熱者不可食之。 久食小豆，令人枯燥。
食大豆屑，忌噉猪肉。 大麥久食，令人作癰。 白黍
米不可同飴蜜食，亦不可合葵食之。 蕎麥面多食之，

令人发落。 盐多食，伤人肺。 食冷物，冰人齒。
食热物，勿飲冷水。 飲酒，食生蒼耳，令人心痛。
夏月大醉汗流，不得冷水洗着身，及使扇，即成病。
飲酒大忌灸腹背，令人腸結。 醉后勿飽食，发寒热。
飲酒食猪肉，臥秫稻穰中，則发黄。 食飴，多飲酒大忌。
凡水及酒，照見人影动者，不可飲之。 醋合酪食之，令人血癢。 食白米粥，勿食生蒼耳，成走痘。
食甜粥已，食盐即吐。 犀角筋攪飲食，沫出，及澆地墳起者，食之殺人。

〔飲食中毒，煩滿，治之方〕

苦參三兩 苦酒一升半

右二味，煮三沸，三上、三下服之，吐食出即差。
或以水煮亦得。

又方：

犀角湯亦佳。

〔貪食，食多不消，心腹堅滿痛，治之方〕

盐一升 水三升

右二味，煮令盐消，分三服，当吐出食，便差。

礬石生入腹，破人心肝，亦禁水。 商陆以水服，殺人。 葶藶子傅头瘡，药成入腦，殺人。 水銀入人耳，及六畜等，皆死，以金銀着耳边，水銀則吐。 苦練无子者，殺人。

凡諸毒，多是假毒以投，无知时宜煮甘草薺苳汁飲之。通除諸毒药。

附 遺

〔苦參湯〕方見麗安時《傷寒總論》 狐惑証。

苦參半斤 槐白皮 狼牙根各四兩
右剉，以水五升煎三升半，洗之。

〔赤小豆當歸散〕方見麗安時作一兩
當歸一兩 《千金》作三兩。

〔白虎加桂枝湯〕方見《千金》
粳米二合 《千金》作六合，是。

〔蜀漆散〕方

蜀漆麝 《傷寒論》及《本草》俱作洗，是。

〔續命湯〕方見《玉機微義》

川芎一兩

〔甘草湯〕方見《千金》 治肺痿涎唾多，出血，心中溫溫液液。

《千金翼》名溫液湯

甘草二兩

〔桂枝去芍藥加皂莢湯〕方見《千金》

大棗十五枚

〔赤圓〕方見《千金》

附子二兩 射罔如大棗，一兩 系六味。

〔烏頭桂枝湯〕方見《千金》

烏頭實中者五枚，除去角 蜜作一斤

〔茯苓戎鹽湯〕方

右三味。闕

〔膠艾湯〕方見《局方》

干地黄四兩

〔白朮散〕方見《局方》

白朮 芎藭各四分 牡蛎熬，二兩

〔小儿疳虫蚀齿方〕

雄黄關 葶蒴關

〔治尸蹶方〕

注脉证见上卷。即*第三叶問曰：寸口脉沉大而滑卒厥証一条，是也升合分兩：此经方剂，并按古法，锱铢分兩，与今不同。谓如吮咀者，即今之剉如麻豆大是也；云一升者，即今之大白盞也；云铢者，六铢为一分，即二錢半也，二十四铢为一兩也；云三兩者，即今之一兩；云二兩者，即今之六錢半也。料例大者，只合三分之一足矣。

* 第三叶系原医統本的真碼，今亦見3頁。

校勘后記

本书依原据排印的《古今医统正脉全书》本（简称医统本），参考明万历赵开美校刊《仲景全书》本（简称赵刊本）及涵芬楼藏明刊本（简称明刊本）校对。除排印的错误，均经改正，凡各书所载的脉证及处方有疑问处，则参证《脉经》、《伤寒论》及各方书，另于附表注明。

各书的用字，互有不同。如本书第12页第1行有：“蜀椒，炒，去汗，一两”，第13页第24行有：“蜀椒，二合，去汗”，第64页第5行有：“川椒……去汗”，第66页第10行有：“川椒，四两，去汗”，第69页第9行有：“蜀椒，三分，去汗”。这五处的“汗”字，医统本与赵刊本皆同，惟明刊本皆作“汁”，今本又有作“汗”的。按《本草纲目》蜀椒条引寇宗奭《本草衍义》说：“用秦椒、蜀椒，并微炒，使出汗，乘热入竹筒中，以槌捣去里面黄壳，取红用……”。又引邵真人《经验方》等皆有川椒须炒去汗。炒出汗的说法，或系因川椒含有水分，故须先炒，似应均从“汗”字。

又方内所列的药品，其单位名称和分量多少，各书也互有出入。如本书第57页黄芩加半夏生姜汤方，医统本作“芍药一两，半夏半升，生姜三两，大枣十二个”，赵刊本作“芍药二两，半夏半升，生姜三两，大枣十二枚”，明刊本作“芍药三两，半夏半斤，生姜四两，大枣二十枚”。第40页厚朴大黄汤方，医统本与赵刊本均作“枳实四枚”，而明刊本则作“枳实四两”。又如第53页梔子大黄汤方中的大黄，医统本及赵刊本均作“一两”，而明刊本作“二两”。第68页芎归胶艾汤方中，医统本及赵刊

本均作“清酒三升”，而明刊本作“清酒五升”等等，颇不一致，详见后表。

其它，通用的字如“藏”、“脏”，“贞”、“真”，“痺”、“痹”，“府”，“腑”，“圆”、“丸”，“少”、“小”，“姜”、“薑”，“甘”、“干”，“支”、“肢”，“余”、“餘”，“人”、“仁”，“大”、“太”，“藥”、“柏”等，则均仍旧。

本书据医统本排印，凡与各本互有出入的字句，列表于后，以备查考。

頁碼	行數	原 文	趙 刊 本	明 刊 本	附 注
序	12	故(斷)自雜病以下	故(所)目雜病以下	故(取)自雜病以下	
2	7	其目正圓者(病)不治	其目正圓者(瘡)不治	其目正圓者(瘡)不治	
5	10	右七味(咀咬)	右七味(咬咀)	同左	◀傷寒論▶作咬咀
"	"	以水(一斗)	以水(七升)	以水(一升)	
6	倒3	每服四錢	每服四錢(匕)	同左	
8	1	附子(一)枚	附子(二)枚	同左	
"	20	瓜蒂(二七)个	瓜蒂(二十)个	瓜蒂(二七)个	
10	倒7	滑石(三)兩	滑石(二)兩	滑石(三)兩	
11	6	半夏半(升)	同左	半夏半(斤)	
12	倒7	干姜(三分)	同左	干姜(二分)	
15	16	日數十(发)	日數十(后)	同左	
"	倒7	四藥分量均作(分)	四藥分量均作(錢)	同左	
"	倒1	已摩(疾)上	已摩(疾)上	同左	
18	倒10	重(困)疲勞汗出	重(困)疲勞汗出	同左	
19	倒6	(喜)盜汗也	(善)盜汗也	同左	
20	6	生姜(三)兩	生姜(二)兩	同左	◀傷寒論▶作三兩

頁碼	行數	原 文	趙 刊 本	明 刊 本	附 注
22	倒10	(多)唾洩沫	(時)作洩沫	同左	
28	11	胸痹心中痞 (氣)	胸痹心中痞 (留)	同左	
29	倒 1	并冷(冲)上氣	并冷(腫)上 氣	同左	
32	倒10	发則白(津)出	发則白(汗) 出	同左	
"	倒 9	其脉沉(緊)者	其脉沉(弦) 者	同左	
34	1	半夏(二合半)	同左	半夏二合	《伤寒論》二合 半
"	10	下利不(飲)食 者	下利不(飲) 食者	下利不(飲) 食者	
35	倒 4	如(丸)豆	如(麻)豆	同左	
37	倒 1	冷如(水)大	冷如(手)大	冷如(水)大	《脉經》作冷如 (手)大
39	5	取(八)合	取(九)合	同左	《伤寒論》作八 合
"	6	得快之后	得快(下)之 后	同左	《伤寒論》作 “得快下利后”
"	倒 8	五味子半(升)	同左	五味子半 (斤)	《伤寒論》作半 升
40	15	枳实四(枚)	同左	枳实四(兩)	
42	10	分(溫三)服	分(三溫)服	同左	
43	10	(苓)甘五味	(茯)甘五味	同左	
"	倒 4	食即吐(蛇)	食即吐	同左	
45	6	右三味	同左	同左	此处似有脫誤 四部備要本作 “先将茯苓白 朮煎成入戎盐 再煎分溫三 服”
49	13	色正黃如(藥) 汁	色正黃如 (藥)汁	同左	

頁碼	行數	原 文	趙 刊 本	明 刊 本	附 注
49	倒 4	此(榮)气也	此(勞)气也	同左	
51	倒 3	(靖)言了	(請)言了 (小)	(請)言了	
52	8	反(劇)为难治	反(极)为难治	同左	
53	3	大黃(一)两	同左	大黃(二)两	
54	倒12	(尺)脉浮	(夫)脉浮	同左	
"	倒 9	病人面无(血)色	病人面无色	同左	
57	10	芍药(一)两， 半夏半(升)， 生姜(三)两， 大枣(十二个)	芍药(二)两， 半夏半(升)， 生姜(三)两， 大枣(十二枚)	芍药(三)两， 半夏半(升)， 生姜(四)两， 大枣(二十枚)	《伤寒論》作芍药二两，半夏半升，生姜一两半，大枣十二枚
"	倒 3	附子(一枚)	同左	附子(七个)	
58	3	甘草(三)两， 半夏半(升)	甘草(三)两， 半夏半(升)	甘草(二)两， 半夏半(升)	《伤寒論》作甘草三两，半夏半升
"	12	煮(药)取二升半	煮取二升半	同左	
59	倒 2	橘皮二(斤)	同左	橘皮二(升)	
60	13	病人必微(厥)	病人必微(热)	同左	
61	9	厚朴(三)两	厚朴(二)两	同左	《伤寒論》作二两
"	14	赤石脂一(斤)	同左	赤石脂一(升)	《伤寒論》作一斤
"	16	热利(下重)者	热利(重下)者	同左	
62	8	煮取一升(二)合	同左	煮取一升(一)合	《伤寒論》作一升二合
"	倒 3	干姜各(二)两	干姜各(三)两	同左	
63	2	方(六)首	同左	方(五)首	

頁碼	行數	原 文	趙 刊 本	明 刊 本	附 注
63	倒 1	(法)当亡血	(然)当亡血	同左	
64	5—6	除(目)及閉口 (去汗)	除(目)及閉口 (者汗)	除(目)及閉口 (者汗)	
"	13	桔梗(二)分	同左	桔梗(一)分	
"	15	揉和令相得	同左	揉和以下缺	
68	4	清酒(三)升	同左	清酒(五)升	
69	4	芎藭各一(斤)	同左	芎藭各一 (兩)	
"	倒 5	方(八)首	同左	方(七)首	
70	6	大黃(三)兩	大黃(二)兩	同左	
72	5	以水(六)升	以水(八)升	同左	
"	倒 5	方十(四)首	同左	方十(三)首	
73	5	隨其(实)而取 之	同左	隨其(假)而 取之	◀脉經▶作“隨 其虛实而取 之”
"	倒 8	甘草(三)兩	同左	甘草(二)兩	
74	3	(痛)在关元	同左	(病)在关元	
76	14	以胞(系)了戾	同左	以胞(絲)了 戾	◀脉經▶作“以 胞系了戾”
"	倒 3	和(合)相得	和(令)相得	同左	
78	3	訶梨勒	訶梨勒(煨)	訶梨勒(燥)	
80	6	烏梅(二七個)	烏梅(二十 枚)	烏梅(二七 個)	
"	15	一人摩(捋)臂 脛屈伸之	同左	一人摩(拌) 臂脛屈伸之	
"	17	亦勿(若)勞之	亦勿(苦)勞 之	同左	
82	7	(勿)食之	同左	(切)食之	
"	13	投地坐(土)不 汚者	同左	投地坐(上) 不汚者	
83	12	馬肝及(毛)不 可妄食	同左	馬肝及(尾) 不可妄食	

頁碼	行數	原 文	趙 刊 本	明 刊 本	附 注
88	2	(多)飲冷水一 二升	飲冷水一二 升	无此一句	
"	倒 7	四日內食生葱 (韭)	四日內食生 葱(蒜)	同左	
89	8	与茱萸食(芹) 相似	同左	与 茱 萸 食 (芥)相似	
"	倒 2	食大豆(屑)	食大豆(等)	同左	
99	倒 1	通(除)諸毒藥	同左	通諸毒藥	

[General Information]

书名=金匱要略方论

SS号=10226436

封面

书名

前言

目录

卷上

脏腑经络先后病脉证第一

痉湿喝病脉证第二

栝楼桂枝汤

葛根汤

大承气汤

麻黄加术汤

麻黄杏仁薏苡甘草汤

防己黄芪汤

桂枝附子汤

白术附子汤

甘草附子汤

白虎人参汤

一物瓜蒂汤

百合狐惑阴阳毒病证治第三

百合知母汤

滑石代赭汤

百合鹑子汤

百合地黄汤

百合洗方

栝楼牡蛎散

百合滑石散

甘草泻心汤

苦参汤

雄黄熏方

赤小豆当归散

升麻鳖甲汤

疟病脉证并治第四

鳖甲煎丸

白虎加桂枝汤

蜀漆散

附方

牡蛎汤

柴胡去半夏加栝楼汤

柴胡桂姜汤

中风历节病脉证并治第五

侯氏黑散

风引汤

防己地黄汤

头风摩散

桂枝芍药知母汤

乌头汤

矾石汤

附方

续命汤

三黄汤

术附汤

八味丸

越婢加术渴

血痹虚劳病脉证并治第六

黄芪桂枝五物汤

桂枝加龙骨牡蛎汤

天雄散

小建中汤

黄芪建中汤

薯蓣圆

酸枣汤

大黄?虫圆

附方

炙甘草汤

獭肝散

肺痿肺痈咳嗽上气病脉证治第七

甘草干姜汤

射干麻黄汤

皂荚丸

厚朴麻黄汤

麻黄汤

泽漆汤

麦门冬汤

葶藶大枣泻肺汤

桔梗汤

越婢加半夏汤

小青龙加石膏汤

附方

甘草汤
生姜甘草汤
桂枝去芍药加皂荚汤
桔梗白散
葶茎汤

奔豚气病脉证治第八

奔豚汤
桂枝加桂汤
茯苓桂枝甘草大枣汤

胸痹心痛短气病脉证治第九

栝楼薤白白酒汤
栝楼薤白半夏汤
枳实薤白桂枝汤
人参汤
茯苓杏仁甘草汤
橘皮枳实生姜汤
薏苡附子散
桂枝生姜枳实汤
赤石脂圆
九痛圆

腹满寒疝宿食病脉证治第十

厚朴七物汤
附子粳米汤
厚朴三物汤
大柴胡汤
大建中汤

大黄附子汤
赤圆
乌头煎
当归生姜羊肉汤
乌头桂枝汤
桂枝汤

附方

柴胡桂枝汤
走马汤
瓜蒂散

卷中

五脏风寒积聚病脉证并治第十一

麻子仁丸
甘草干姜茯苓白术汤

痰饮咳嗽病脉证并治第十二

茯苓桂枝白术甘草方
甘遂半夏汤
十枣汤
大青龙汤
小青龙汤
木防己汤
木防己加茯苓芒硝汤
泽泻汤
厚朴大黄汤
小半夏汤
防己椒目葶藶大黄圆

小半夏加茯苓汤汤

五苓散

附方

茯苓饮

桂苓五味甘草汤

苓甘五味姜辛汤

桂苓五味甘草去桂加干姜细辛半夏汤

苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤

苓甘五味加姜辛半杏大黄汤

小半夏茯苓汤

消渴小便利淋病脉证并治第十三

文蛤散

栝楼瞿麦圆

蒲灰散

滑石白鱼散

茯苓戎盐汤

猪苓汤

水气病脉证并治第十四

越婢汤

防己茯苓汤

甘草麻黄汤

麻黄附子汤

杏子汤

黄芪芍药桂枝苦酒汤

桂枝加黄芪汤

桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤

枳术汤

黄疸病脉证并治第十五

茵陈蒿汤

硝石矾石散

梔子大黄汤

猪膏发煎

茵陈五苓散

大黄硝石汤

附方

麻黄醇酒汤

惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六

桂枝救逆汤

半夏麻黄圆

柏叶汤

黄土汤

泻心汤

呕吐噦下利病脉证治第十七

茱萸汤

半夏泻心汤

黄芩加半夏生姜汤

猪苓散

四逆汤

小柴胡汤

大半夏汤

大黄甘草汤

茯苓泽泻汤

交蛤汤
半夏干姜散
生姜半夏汤
橘皮汤
橘皮竹茹汤
桂枝汤
小承气汤
桃花汤
白头翁汤
梔子豉汤
通脉四逆汤
紫参汤
诃梨勒散

附方

黄芩汤

疮痈肠浸淫病脉证并治第十八

薏苡附子败酱散
大黄牡丹汤
王不留行散
排脓散
排脓汤
黄连粉

跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蚘虫病脉证治第十九

藜芦甘草汤
鸡屎白散
蜘蛛散

甘草粉蜜汤

乌梅圆

卷下

妇人妊娠病脉证并治第二十

桂枝茯苓丸

附子汤

芎归胶艾汤

当归药散

干姜人参半夏丸

当归贝母苦参丸

葵子茯苓散

当归散

白术散

妇人产后病脉证治第二十一

枳实芍药散

下瘀血汤

阳旦汤

竹叶汤

竹皮大圆

白头翁加甘草阿胶汤

附方

三物黄芩汤

内补当归建中汤

妇人杂病脉证并治第二十二

半夏厚朴汤

甘草小麦大枣汤

温经汤
土瓜根散
旋复花汤
胶姜汤
大黄甘遂汤
抵当汤
矾石丸
红蓝花酒
肾气圆
蛇床子散
狼牙汤
小儿疳虫蚀齿方

杂疗方第二十三

四时加减柴胡饮子
长?诃梨勒圆
三物备急丸
紫石寒食散
救卒死方共五方
救卒死而壮热者方
救卒死而目闭者方
救卒死而张口反折者方
救卒死而四肢不收失便者方
救小儿卒死而吐利不知是何病方
治尸蹙方共二方
救卒死客客忤方二方
救自缢死方

疗中暈方

救溺死方

治马坠及一切筋骨损方

禽兽鱼虫禁忌并治第二十四

治自死六畜肉中毒方

治食郁肉漏脯中毒方

治黍米中藏干脯食之中毒方

治食生肉中毒方

治六畜鸟兽肝中毒方

治马肝毒中人未死方二方

治食马肉中毒欲死方二方

治噉蛇牛肉食之欲死方三方

治食牛肉中毒方

治食大肉不消成病方

治食鸟兽中箭肉毒方

治食鲙不化成癥病方二方

治食鱼后食毒两种烦乱方

治食??鱼中毒方

治食蠨中毒方二方

果实菜谷禁忌并治第二十五

治食诸果中毒方

治食诸菌中毒闷乱欲死方

治贪枫柱菌而哭不止方

治误食野芋烦毒欲死方

治误食蜀椒闭口者方

食躁或躁方

治误食钩吻杀人解之方

治误食水蓼蓉中毒方

治食芹菜中龙精毒方

治食苦瓠中毒方

治凡饮食中毒方共二方

贪食食多不消心腹坚满治之方

通除诸毒药