

主 编

张庆伟 韩建涛 马晓昌

副 主 编

范思行 阎国杰 刘静宇 范若莉

审 订

建 中 振 中

编 委

(以下按姓氏笔画为序)

王洪亮 刘占国 刘守杰 陈 莉
张力超 郑万善

编 者

马晓昌	王洪亮	王松柏	王海燕	阎国杰
刘占国	刘守杰	刘静宇	刘静生	孙遂申
朱格才	李二平	李军武	陈 莉	张力超
何高潮	杨晓光	郑万善	张庆伟	范思行
范若莉	姚沛雨	庞国胜	赵宝娥	韩建涛

前 言

中药外治是以中医基本理论为指导，包括所有中草药制剂除口服之外，施于皮肤、孔窍、俞穴及病变局部等部位的各种治病方法，具有作用迅速，简、便、廉、验，易学易用，容易推广，使用安全，毒副作用少等特点，它不仅在外、骨伤、皮肤、五官、肛肠等科疾病的治疗方面显示了中医学的一大特色，而且对内、妇科病症也有显著疗效，尤其对老幼虚弱之体，攻补难施之时或不肯服药之人，不能服药之症，中药外治与内服有殊途同归、异曲同工之妙。

千余年来，古今医家在采用中药外治法治疗疾病的实践中，创制出了许多卓有实效的中药外治方剂，积累了十分丰富的经验。在我国现存最早的医学文献《五十二病方》中就记载有不少外治方药，其中仅敷方就达70余首。此后，《伤寒杂病论》、《刘涓子鬼遗方》、《千金方》以及《本草纲目》等著名医籍中都流传下了越来越多的中药外治验方。这些方剂对提高中医临床疗效起到了非常重要的作用。由于中药外治本身所具有的独到优势，因而在中医临床中一直受到很大重视。后世医家在继承前人经验的基础上，结合实践中的体会与研究成果，又不断改进和创造出了一些新的中药外治方剂，近十余年来出版的中医书刊中，更体现出了许多中药外治方剂的最新成果。如果把古代流传下来的、经临床反复验证确有实效的方剂，和现代临床研制、应用的经效验方汇集、精选、编辑成册，以供临床工作者应

用和研究时参考，这将是十分有意义的，鉴此，我们编写了这部《古今中药外治高效验方1000首》。

本书精选治疗临床各科常见病和疑难杂症之中药外治名验良方1000余首，并从实用出发，分科论病、以病为纲、以病统方加以归类，每方下按组成、功效、主治、用法、注意事项、来源等项编写，条理清晰，易于查检。

中药外治是一个值得重视的研究领域，对中药外治方剂的整理也仅是一次尝试，我们希望本书能对中药外治的研究及提高中药外治的临床疗效起到积极的作用。由于作者水平所限，书中难免有错谬之处，敬请读者指正。

编 者

1991年10月5日

目 录

第一章 常见急症

外感高热	(1)
胸痹心痛	(3)
中风	(5)
吐血	(7)
咯血	(8)
便血	(10)
尿血	(11)
鼻衄	(12)
舌衄	(14)
崩漏	(15)
厥脱	(16)
中暑	(18)
昏迷	(19)
关格	(21)
喘促	(23)
急性阑尾炎	(26)
急性肠梗阻	(28)
外伤疼痛	(30)
外伤出血	(33)
急喉风	(35)
流行性脑脊髓膜炎	(36)

流行性乙型脑炎.....	(39)
急性结膜炎.....	(40)
凝脂翳.....	(43)
黄液上冲.....	(46)

第二章 内 科

全

感冒.....	(48)
咳嗽.....	(51)
支气管哮喘.....	(52)
肺脓疡.....	(57)
肺结核.....	(58)
呕吐.....	(59)
噎膈.....	(61)
胃痛.....	(63)
胃下垂.....	(65)
腹痛.....	(67)
腹胀.....	(69)
腹泻.....	(70)
霍乱.....	(72)
便秘.....	(74)
慢性非特异性溃疡性结肠炎.....	(76)
痢疾.....	(78)
黄疸.....	(80)
胁痛.....	(82)
臌胀.....	(83)
积聚.....	(85)
头痛.....	(88)

眩暈	(91)
心悸	(93)
不寐	(94)
癲狂	(96)
癲病	(97)
失語	(98)
水腫	(99)
腰痛	(101)
癰閉	(103)
淋証	(105)
尿频	(106)
陽痿	(108)
陽強	(110)
遺精	(111)
陽縮	(114)
自汗	(115)
盜汗	(117)
麻木	(118)
癰証	(119)
虛勞	(123)
紅斑性肢痛病	(125)
雷諾氏病	(126)
痛風	(127)
三叉神經痛	(130)
高血壓病	(131)
面神經炎	(134)
面肌痙攣	(136)

坐骨神经痛·····	(137)
蛲虫病·····	(139)
癌性疼痛·····	(140)

第三章 外 科

疖·····	(142)
红丝疔·····	(144)
蛇头疔·····	(145)
疽·····	(147)
痈·····	(152)
脓疱·····	(155)
褥疮·····	(159)
丹毒·····	(160)
烧伤·····	(162)
瘰病·····	(165)
胆囊炎·····	(167)
胆石症·····	(169)
颈淋巴结核·····	(171)
直肠脱垂·····	(174)
痔疮·····	(177)
血栓闭塞性脉管炎·····	(179)
关节脓肿·····	(181)
腱鞘炎·····	(182)
腱鞘囊肿·····	(184)
急性乳腺炎·····	(186)
乳腺增生病·····	(189)
前列腺炎·····	(190)

尿路结石	(192)
肋软骨炎	(193)
鹤膝风	(194)
鞘膜积液	(195)

第四章 皮肤科

白癜风	(198)
银屑病	(199)
头癣	(202)
斑秃	(205)
粉刺	(206)
酒渣鼻	(208)
系统性红斑狼疮	(211)
疥疮	(212)
体、股癣	(215)
黄水疮	(217)
手癣	(219)
足癣	(221)
甲癣	(224)
花斑癣	(226)
脚湿气	(228)
痱子	(230)
带状疱疹	(231)
面部色斑	(233)
皮肤瘙痒症	(235)
冻疮	(237)
荨麻疹	(240)

神经性皮炎.....	(243)
阴部湿疹.....	(246)
扁平疣.....	(248)
传染性软疣.....	(251)
虱病.....	(252)
手足皲裂.....	(254)
夏季皮炎.....	(256)
鸡眼.....	(258)
剥脱性皮炎.....	(260)
狐臭.....	(261)
硬皮病.....	(262)
粘膜白斑.....	(265)
稻田皮炎.....	(266)
皮肤猪囊虫病.....	(268)
疱疹样皮炎.....	(268)
毛囊炎.....	(270)

第五章 骨伤科

骨折.....	(272)
颈椎病.....	(274)
肩关节周围炎.....	(275)
骨髓炎.....	(277)
足跟痛.....	(279)
损伤.....	(281)
伤筋.....	(283)
腰部急性扭挫伤.....	(284)

第六章 儿 科

鹅口疮	(286)
胎黄	(289)
泄泻	(290)
麻疹	(293)
水痘	(295)
百日咳	(296)
白喉	(298)
急性腮腺炎	(300)
遗尿	(302)
脑积水	(304)
小儿肺炎	(306)
夜啼	(308)
小儿麻痹症	(310)
小儿脐患	(311)
重舌	(313)
尿布皮炎	(315)
小儿湿疹	(317)
惊风	(318)
小儿佝偻病	(320)
囟陷	(321)
厌食	(323)
疳证	(324)
流涎	(326)
撮口	(327)

口吻疮.....	(329)
木舌.....	(330)

第七章 妇产科

痛经.....	(332)
闭经.....	(334)
月经不调.....	(336)
带下病.....	(339)
阴痒.....	(341)
阴蚀.....	(344)
胎位不正.....	(345)
胞衣不下.....	(346)
难产.....	(348)
产后血晕.....	(350)
缺乳.....	(351)
回乳.....	(352)
子宫颈炎.....	(353)
功能性子宫出血.....	(355)
妊娠呕吐.....	(356)
盆腔炎.....	(357)
阴道炎.....	(359)
滴虫性阴道炎.....	(361)
宫颈糜烂.....	(363)

第八章 五官科

中耳炎.....	(366)
耳鸣、耳聋.....	(368)

耳疔（耳疮）·····	（ 371 ）
旋耳疮·····	（ 373 ）
断耳疮·····	（ 375 ）
耳廓假性囊肿·····	（ 376 ）
耳胀、耳闭·····	（ 377 ）
鼻疔·····	（ 378 ）
鼻疳·····	（ 379 ）
鼻窦·····	（ 381 ）
鼻炎·····	（ 383 ）
急性鼻炎·····	（ 385 ）
过敏性鼻炎·····	（ 386 ）
萎缩性鼻炎·····	（ 389 ）
鼻旁窦炎·····	（ 391 ）
鼻息肉·····	（ 394 ）
急性扁桃体炎·····	（ 396 ）
慢性扁桃体炎·····	（ 399 ）
喉痛·····	（ 401 ）
慢性咽炎·····	（ 404 ）
失音·····	（ 406 ）
天行赤眼主翳·····	（ 408 ）
天行赤眼·····	（ 410 ）
角膜炎·····	（ 413 ）
麦粒肿·····	（ 415 ）
沙眼·····	（ 417 ）
胬肉攀睛·····	（ 420 ）
赤膜下垂·····	（ 422 ）
花翳白陷·····	（ 423 ）

牙痛	(425)
龋齿	(428)
牙齦	(430)
牙痛	(432)
骨槽风	(433)
牙齿动摇	(435)
口疮	(437)
口臭	(440)
口疳	(441)
唇疔	(443)
唇疮	(444)
紧唇	(445)
舌疮	(447)
面部疔疮	(448)
颜面肿痛	(450)
颌关节功能紊乱症	(452)
颞颌关节风湿症	(454)
颌骨瘤	(455)
甲状舌骨囊肿	(457)

第一章 常见急症

外感高热

本证以体温骤升达 39°C 以上，伴烦渴、脉数等为临床特征。多由接触感染疫毒之气，或被六淫之邪侵袭所致。无论病情发展属表属里、入气分血分，高热现象都是正气抗邪的表现。本证类似于西医学所指急性感染性疾病中的高热期。

方一

【组成】 葱白30克 生姜30克 胡荽30克 食盐6克

【用法】 上药捣如糊状，加白酒30毫升调匀，以纱布包之，擦涂前胸、后背、手心、足心、肘窝、肘窝等处，搓涂一遍后，令患者安卧、保暖，半小时后当出汗。

【主治】 外感高热（卫分热证）。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 大黄、山栀、僵蚕各4克 牛膝2克 细辛1克

【用法】 上药研细末，每次5~8克，米醋调如糊状，敷贴双涌泉穴，包扎固定4~6小时取下，不效可连用。

【主治】 外感高热证。据对76例高热患者使用，迅速降温效率达97.5%。

【来源】 陕西中医 1988；9（11）：503

方三

【组成】 生石膏30克 绿豆30克 生栀子仁20克

【用法】 上药研细末，用鸡蛋清调匀成糊状，分5份，分敷于足心、手心、前胸剑突下，包扎固定，热退后洗去。

【主治】 小儿壮热烦渴，神昏谵语。

【来源】 中国神奇外治法

方四

【组成】 石膏300克 桂枝20克 赤芍20克 甘草5克 麻黄6克

【用法】 先煎石膏粉30分钟，再入桂枝、赤芍、甘草，15分钟后再入麻黄，煎取300毫升药液，以每千克体重3毫升保留灌肠。

【主治】 小儿高热。2日内见效者达90%。

【来源】 中医药信息 1985；2：12

方五

【组成】 银花、连翘、板蓝根、蒲公英、丹皮、紫草各10～20克 石膏20～50克 黄芩5～15克 龙胆草5～10克

【用法】 水煎上药，每次用50～150毫升药液作高位保留灌肠。

【主治】 外感高热证。有效率达100%。

【加减】 咳喘加川贝、杏仁、前胡等；腹泻加葛根、

黄连；下痢脓血加白头翁、黄连、秦皮、红藤；惊厥加蜈蚣、天麻、石决明。

【来源】 四川中医 1988；6（6）：12

方六

【组成】燕子窝泥15克 田螺肉5个 吊扬尘30克 青黛0.3克

【用法】 上药共研捣匀，鸡蛋清调，敷脐，2小时后去掉。

【主治】 小儿高热（气分）证。

【来源】 农村常见疾病中医简易疗法

方七

【组成】 安宫牛黄丸1粒

【用法】 将药丸研碎，用40毫升温开水化开和匀，10岁以上的小儿1次保留灌肠，5~10岁的小儿取1/2量灌肠，5岁以下的小儿取1/3量灌肠。

【主治】 外感高热。

【来源】 温病条辨

胸痹心痛

胸痹是指胸部闷痛，甚则胸痛彻背，气短，喘息不得卧为主症的一种疾病。其病因多与寒邪内侵，饮食不当，情感失调，年老体虚等有关。又称“真心痛”、“厥心痛”。分别与西医的冠状动脉粥样硬化性心脏病、心肌梗塞引起的心绞痛、心包炎等疾病引起的心前区疼痛，以及肺部疾病、胸

膜炎、肋间神经痛等以胸痛为主症者相类似。

方一

【组成】 细辛 良姜 荜拔 檀香 冰片

【用法】 上药按现代科学方法制成药液，心绞痛发作时，按气雾剂雾化法操作常规，立即将药液喷至咽腔，若10分钟不缓解，可重复使用，至心绞痛缓解。

【主治】 胸痹。观察367例，3分钟内止痛有效率达47.6%~58.07%。

【来源】 中西医结合杂志 1981；1（1）：9

方二

【组成】 麝香 檀香 沉香 苏合香 龙脑香

【用法】 上药经现代科学方法提炼成精油。心绞痛发作时，将该药擦抹人中穴，作深呼吸，以吸其气味。大多在1~3分钟内可缓解，如不缓解10~15分钟后可重复使用，至疼痛缓解为止。

【主治】 胸痹。共观察150例，总有效率达92%。

【来源】 广东医学 1981；2（8）：48

方三

【组成】 桃仁、栀子各12克 炼蜜30克

【用法】 上2药碾末，加炼蜜调成糊状，摊敷在心前区，面积约7×15平方厘米，纱布敷盖，初用时每3日换1次，2次后7日换1次，6次为1疗程。

【主治】 胸痹。共观察50例，症状总有效率为88%，心电图总有效率为50%。

【来源】 中级医刊 1981; (4) : 19

方四

【组成】 云南白药0.5~1克 白酒或75%酒精适量

【用法】 云南白药以白酒或75%酒精调成糊状，外敷患处，用胶布或伤湿止痛膏固定。3日换1次，一般用1~2次，最多4次可愈。

【主治】 肋软骨炎。共观察17例，总有效率达100%。

【来源】 中级医刊 1987; (11) : 53

方五

【组成】 丹参10克 红花10克

【用法】 上药依法制成流浸膏，涂于布面上即可。心绞痛发作时，将药膏敷贴于患者心前区，每24小时更换1次，2周为1疗程。起效最快为12分钟，药效维持48小时。

【主治】 心绞痛。共观察100例，总有效率为97%。

【来源】 辽宁中医杂志 1984; 8(12) : 23

中 风

中风是以卒然昏仆，不省人事，伴有口眼喎斜，语言不利，半身不遂；或不经昏仆而仅以喎僻不遂为主证的一种疾病。亦称“卒中”。包括现代医学中的脑出血、脑血栓形成、脑栓塞、脑血管痉挛、蛛网膜下腔出血。

方一

【组成】 麝香1克 冰片5克 川牛膝15克 木瓜20克

樟脑50克 雄黄40克 桃仁15克 半夏6克

【用法】 上药共研细末，分30等份，另备大活络丸30粒，生姜末90克，每次用热米饭捶饼两个，每瓶上放药末1份，大活络丸1粒，生姜末3克，敷患侧上下肢各1穴位（上肢取肩髃、天泽，下肢取环跳、委中，交替使用）。晚敷早去，半月为1疗程。

【主治】 中风半身不遂。

【来源】 湖北中医杂志 1986；（6）：2

方二

【组成】 南星末1.5克 冰片少许

【用法】 上药和匀，以中指蘸药末揩齿，反复20~30次。

【主治】 中风口噤不开。

【来源】 杂病源流犀烛

方三

【组成】 端阳艾、硫磺、雄黄、全蝎、白花蛇、白芷乳香、没药、麝香、川乌、草乌等19味药物

【用法】 上药制成20×1.8平方厘米之药条，外用棉纸封糊，灸肩髃、曲池、足三里、太冲、合谷等穴，每穴15分钟，每日1次，14次为1疗程。

【主治】 中风肢体瘫痪。有效率为92.69%。

【来源】 陕西中医 1989；10（11）：516

吐 血

吐血是血从胃中经口吐出或呕出，血色多黯红，多夹有食物残渣，并常伴有脘胁胀闷疼痛的病证。多因胃中积热、或肝郁化火，脉络瘀滞，逆乘于胃，阳络损伤所致。主要见于西医之胃、十二指肠溃疡及肝硬化所致食管、胃底静脉曲张破裂所引起的上消化道出血，亦见于食管炎、急慢性胃炎、胃粘膜脱垂以及血液病、尿毒症、应激性溃疡等。

方一

【组成】 紫珠草、地稔根各150克

【用法】 上药水煎，浓缩500毫克，加防腐剂备用。用时插置胃管，经胃管注入冰冻至3~4℃的紫地汤800毫升于胃内，协助患者左右转动体位，使药液与胃各部充分接触，随后抽出，然后再将200毫升注入保留。观察24小时后，未再呕血，则改日服。视病情每月可用1~3次。

【主治】 上消化道大出血。治疗10例，9例成功，呕血均在1次药后停止。

【来源】 新中医 1985；（5）：24

方二

【组成】 生大黄30克 陈醋适量

【用法】 大黄研极细末，醋调成厚膏状备用。临证以膏敷脐，外盖纱布，胶布固定，每日1次，待脐发痒，吐血停止时可去掉，2天为1疗程。

【主治】 胃热吐血。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 生栀子15克 生大黄15克 陈米醋适量

【用法】 上二味研极细末，醋调成厚膏状备用。临证以膏敷脐，外露纱布，胶布固定，每日1次，待脐发痒，吐血止时可去掉。

【主治】 肝火犯胃之吐血。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方四

【组成】 白芷6克 黑山栀15克

【用法】 上药水煎后，用布包药渣趁热敷胸口。

【主治】 胃热吐血。

【来源】 中医外治法类编

咯 血

咯血又称嗽血，咳血。血自肺中，经气道咳嗽而出，或纯血鲜红、间挟泡沫，或痰血相兼，或痰中带血，均称为咯血。多由外邪犯肺，肺火上炎，阴虚火旺，或气不摄血等原因，以致肺络损伤，血液妄行，溢入气道而成。主要见于西医之肺结核、肺炎、支气管扩张、肺癌等肺部疾患以及二尖瓣狭窄、肺梗塞、血液病等。

方一

【组成】 肉桂3克 硫磺18克 冰片9克 大蒜1头

【用法】 先将前3味药研末，再用大蒜捣烂成泥调匀，敷双足涌泉穴，外敷纱布，胶布固定。每日1次，每次约2小时。

【主治】 咯血。结合内服药物，治疗重度咯血81例，痊愈72例；显效5例；有效2例；无效2例；总有效率为97.53%。

【来源】 浙江中医杂志 1989；24（3）：97

方二

【组成】 大小蓟各15克 柏叶9克 荷叶15克 茅根30克 茜草根9克 丹皮9克 棕皮9克 大黄15克 栀子9克 藕汁90克 莱菔汁90克 金沫汁15克

【用法】 将前10味药烧灰，然后用药汁调和，外贴膻中穴。每月1次，3日为1疗程。

【主治】 血热咯血。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 生大黄10克

【用法】 上药烘干，研末，用醋调成药膏，纱布包裹，敷神阙穴，纱布覆盖，胶布固定。每2~3天换药1次，3次为1疗程。

【主治】 血热咯血。

【来源】 中医外治法集要

方四

【组成】 广郁金适量

【用法】 加水磨汁，以丝绵蘸汁擦洗背部。每日2次，每次10分钟，3日为1疗程。

【主治】 肺结核之咯血。

【来源】 中医外治方药手册

便 血

便血，又称血便、下血、泻血、结阴等。凡血自大便而下，或血便夹杂而下，或先便后血，或先血后便，或单纯下血，均称便血。多因脾胃虚寒或胃肠积热，胃肠脉络受损，血液下渗肠道而致。现代医学之上、下消化道出血，亦可出现便血证候。另据血之清浊，又有肠风、脏毒之分。

方一

【组成】 大黄粉10克

【用法】 上药醋调糊状，敷脐，每日1~2次，2天为1疗程。

【主治】 便血。有效率为89%。

【来源】 辽宁中医杂志 1980；（11）：40

方二

【组成】 大生地64克 白芍、黄芩、黄柏、黑山栀、生甘草各32克 丹皮、犀角各15克

【用法】 上药用麻油500克熬汁，黄丹222克，石膏128克收膏，贴于脐，每日1次，3~5天为1疗程。

【主治】 胃热引起的便血。治疗有效率达99%。

【来源】 理论骈文

方三

【组成】 苦参10克 川连6克 白芨30克 锡类散2~4支 仙鹤草30克 地榆炭30克

【用法】 上药浓煎200毫升，于每晚8时病人解大便后作保留灌肠，每5~10分钟移动体位1次，10次为1疗程，疗程间隔2~3天。

【主治】 炎性肠病引起的便血。有效率达100%。

【来源】 黑龙江中医药 1989；（6）：18~19

方四

【组成】 无花果叶40克

【用法】 上药煎水1000毫升，乘热熏痔疮，待水温降至38℃时，淋洗患处，每日1次，5~10次为1疗程。

【主治】 痔疮下血。有效率达98%。

【来源】 丹溪心法

尿 血

尿血是小便中混有血液，甚至血块的一种病证。由于出血部位和出血量的多少不同，小便可呈淡红色、鲜红色和淡酱油色。主要是热迫肾与膀胱，损伤脉络或气虚不摄，血溢脉外所致。包括现代医学所指的尿路感染、肾小球肾炎、肾结核、泌尿系肿瘤以及全身性疾病，如血液病、结缔组织疾病、心血管疾病和某些抗凝药物影响等。

方一

【组成】 蒲黄150克 旱莲草600克 车前草150克

【用法】 上方加水煎煮15~20分钟，倒入大盆中，待水温40℃左右，沐洗少腹部，每日1次。

【主治】 热伤血络所致的尿血。

【来源】 中医外治法集要

方二

【组成】 小蓟、百草霜、香附、炒蒲黄各等量

【用法】 上药共为细末，用纱布蘸药末擦牙，并搽出血处，每日2~3次。

【主治】 九窍出血。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 甜蓼（愉悦蓼）1握

【用法】 用鲜全草1握，洗净泥土，捣烂如泥状，拌少许75%酒精或白酒，略放些细盐，做成饼贴脐上，以胶布或带子固定，干则再换，连续使用1个月。

【主治】 急性肾小球肾炎所致的尿血。

【来源】 安徽单验方选集

鼻 衄

鼻衄是指鼻部不因外伤而出血。多因风热犯肺、肺热上壅，或阳明热盛，胃热熏蒸，均可使火热之邪上循其络，迫

血妄行而致鼻衄。再如肝火亢盛、正气亏虚均可致鼻衄。现代医学中的高血压和动脉硬化、风湿热、某些急性传染病、白血病、再障、血小板减少性紫癜、尿毒症、维生素缺乏、药物中毒等均可出现鼻衄。

方一

【组成】 白芨、紫珠草各30克

【用法】 将上药煎成糊状，涂于玻璃片上，使干燥成薄膜，然后分成长方形小片，装入防潮瓶内备用。其粉附着力强，容易附着于出血处，脱落后可续用前法，直至衄止。

【主治】 各种鼻衄。

【来源】 耳鼻咽喉科学

3

方二

【组成】 大黄炭（生大黄，用火烧至七、八成）适量

【用法】 碾成细末，装瓶备用。用时以大黄炭末与温开水调匀，塞患者其患侧鼻孔。

【主治】 各种鼻衄。治愈30例鼻衄，其中有14例经长时间服中西药治疗无效。

【来源】 四川中医 1987；（12）：44

3

方三

【组成】 大蒜30克

【用法】 捣烂成泥，敷双足涌泉穴，以布包扎。每次3~4小时，1日或隔日1次。一般敷1小时，衄血即止。

【主治】 鼻衄。

【来源】 中医外治方药手册

舌 衄

舌衄亦称舌上出血、舌血或舌本出血，是指舌非外伤引起的出血，多因心火亢盛、肝火上冲，迫血妄行；或脾气虚损，摄血失常所导致。临床见于现代医学之血小板减少性紫癜、过敏性紫癜、白血病、再障、维生素缺乏症、某些感染性疾病、风湿病、高血压病、化学药品及药物中毒等。

方一

【组成】 乌贼骨30克 炒蒲黄15克

【用法】 上药均研细末混匀，涂舌患处。每日3次，3日为1疗程。

【主治】 舌衄。

【来源】 中医外治法简编

方二

【组成】 木贼草30克

【用法】 上药加水300毫升，煎汤漱口，每日数次，3日为1疗程。

【主治】 舌衄。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 五倍子30克

【用法】 用200毫升水煎煮五倍子，熬成浓汁，纱布浸湿紧塞口中。每次5分钟，每日3次，3日为1疗程。

【主治】 脾虚型舌衄。

【来源】 中医口腔科学概要

崩 漏

崩漏是指妇女不在行经期，阴道大量出血，或持续下血淋漓不断，也叫“崩中漏下”。一般以突然出血，来势急，血量多的叫“崩”；来势缓，血量少，淋漓不断的称为“漏”，但二者常相互转化，故概称“崩漏”。本病多因内伤七情，外感热邪，过食辛辣食物等因素，导致肝、脾、肾及冲任功能失调而发病。现代医学的“功能性子宫出血”属本病范围。

方一

【组成】 益智仁、沙苑子各20克 艾叶30克

【用法】 前2味药为末，以艾叶煎汁后调敷脐上，每6小时换药1次，5日为1疗程。

【主治】 崩漏下血。有效率达98%。

【来源】 中级医刊 1987；22（10）：44

方二

【组成】 红苋麻仁15克

【用法】 上药捣烂如泥，敷于百会穴，每日换药1次，直至血止。

【主治】 崩漏下血，有效率达90%。

【来源】 中国民间疗法

厥 脱

厥脱是指突然昏倒，不省人事，面色苍白，四肢厥冷，移时逐渐苏醒，不留后遗症为主要特征的一种疾病。本病的发生主要是由于一时性气机逆乱，升降失常，阴阳二气不相接续所致。起病暴急，病情危重，变化迅速，甚则危及生命。包括现代医学之休克、虚脱、昏厥、中暑、低血糖昏迷及精神性疾患（如癔病性昏迷）等。

方一

【组成】 醋 人参 黄芪 白术 附子

【用法】 速取醋入壶，置猛火炉上，用竹管一端插入壶嘴，一端对准患者口鼻熏之，并速配大剂人参、黄芪、白术、附子入于醋中煎熏，至神志苏醒。

【主治】 血厥。

【来源】 浙江中医杂志 1983；18（5）：203

方二

【组成】 长管状纸 清凉油

【用法】 用长管状纸捻，外涂清凉油，点燃后吹灭，使烟从另一端冒出，塞于鼻孔内，或将发烟端放于鼻下，用至患者神志清醒。

【主治】 暑厥实证，神昏较轻者。

【来源】 中医急症手册

方三

【组成】 小茴香 川椒 葱 姜 盐

【用法】 用小茴香、川椒以及葱、姜捣合一处，加盐炒热，放脐部熨之，或于脐孔中放少许麝香，以神清厥回为度。

【主治】 阳衰厥逆证。

【来源】 中国针灸 1982；2（6）：44

方四

【组成】 癞蛤蟆 雄黄

【用法】 将癞蛤蟆剖开腹部撒雄黄少许于其内，外敷脐部，每日更换1只，有条件者同时以河沙垫卧，用至回苏。

【主治】 暑厥。

【来源】 四川中医 1988；6（8）：25

方五

【组成】 葱白1握（连根须，不水洗） 麝香0.3克

【用法】 将葱白捣碎，再加入麝香，然后共捣烂如粘糊状。取药糊涂在患者肚脐上，以纱布包扎，再用电熨斗熨之，熨至患者手足汗出时。

【主治】 阴阳俱脱。

【来源】 中医药物贴脐疗法

中 暑

中暑是发生在夏季或高温作业时的一种急性病。在夏令暑热环境下,人体处于劳倦或饥饿状态时,元气亏虚,暑热乘虚而入,随体质的不同,或燔灼阳明或触犯心包,甚至导致阴阳离决。临床以壮热、烦渴、汗出、昏迷、肢厥为特征。现代医学亦称中暑。

方一

【组成】 鲜韭菜 或鹅不食草 或生姜

【用法】 捣烂取汁,滴入鼻内。每侧鼻孔滴入约5~7滴,15~17分钟1次,至患者苏醒为止。

【主治】 暑犯心包之中暑。

【来源】 中医内科急症证治

方二

【组成】 活蛤蟆1只

【用法】 将活蛤蟆剖开腹皮,然后,将剖腹的活蛤蟆直接敷在患者的肚脐上,外以纱布绷带固定之。2小时换1次,用至症状减轻或消失。

【主治】 暑入阳明之中暑。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方三

【组成】 火硝6克 朱砂9克(研细水飞) 麝香、冰片、炒草拨、白矾各1克 牛黄、食盐各0.3克 真金箔30张

【用法】 上药共为细末，入瓷瓶内，密封勿泄气。凡遇中暑挟痧证，挑取少许点眼角内。每日3~4次，用至神志苏醒或症状减轻后。

【主治】 神志昏迷无法服药之患者。

【来源】 中医内科临床治疗学

方四

【组成】 中成药清凉油1盒

【用法】 将清凉油半盒，填入患者脐孔中，用手轻轻按之。另用清凉油涂双侧太阳穴，并轻按穴位。一般敷药后半小时，症状逐渐消失。

【主治】 暑入阳明之中暑。

【来源】 中医药物贴脐疗法

昏 迷

一 昏迷是指元气、元阴耗竭，清窍失养，或因热陷心包，痰浊蒙蔽，痰热交阻，闭塞清窍的一种病证。临床表现以人事不省，神志不清，持续不醒为特征。包括祖国医学文献中所称的“神昏”、“昏愤”、“昏厥”、“谵妄”、“昏蒙”、“不省人事”、“不知与人言”、“昏不知人”等神志障碍症状。是病情危重的表现。现代医学的流行性乙型脑炎、流行性脑脊髓膜炎、败血症、中毒性肺炎、中毒性菌痢、脑卒中、肺原性脑病、心原性脑出血综合征、癫痫、肝病、糖尿病酸中毒、尿毒症以及药物、化学品中毒、电击、高温中暑等出现昏迷，均可参考此证辨证论治。

方一 通关散

【组成】 猪牙皂 细辛 薄荷 苦参 麝香

【用法】 上药研细末，每次0.3~0.6克，吸入鼻孔，取嚏则醒。

【主治】 痰闭。

【来源】 中医外治疗法

方二

【组成】 元胡4.5克 皂角、川芎各3克 藜芦1.5克 踯躅花0.6克

【用法】 上药共研细末，取少许搐鼻取嚏。

【主治】 热闭。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 牛心、党参、熟地、茯苓、黄芪、白术、当归、远志、枣仁、柏子仁、益智仁、麦冬、木鳖仁、半夏各32克 酒芍、五味子、陈皮、甘草各15克 黄连12克 肉桂6克 陈胆星24克 朱砂21克 生龙齿 郁金、菖蒲 各15克 麻油适量 黄丹少许

【用法】 先用麻油熬牛心去渣，入前20药，麻油熬，黄丹收，朱砂、龙齿（研末）、郁金、菖蒲搅匀，涂布上。贴于胸口处，1~2日换药1次，3次为1疗程。

【主治】 一切神志病。

【来源】 中药贴敷疗法

方四

【组成】 石菖蒲、相子叶各7片 生姜30克

【用法】 上药捣烂，酒炒敷胸，每日换1~2次，3~5日为1疗程。

【主治】 昏迷。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方五

【组成】 生石膏120克 肥知母、赤芍、丹皮、九节菖蒲、生大黄（后下）、生地、炙僵蚕各15克 双钩藤12克 炙全蝎3克

【用法】 上药浓煎至500毫升，直肠点滴，滴速30~50滴/分，每日1~2次，5日为1疗程。

【主治】 昏迷。共观察38例，总有效率达85%。

【注意】 需配合西药综合治疗。

【来源】 江苏中医杂志 1988；9（7）：12~13

关 格

小便不通名曰关，呕吐不止名曰格，小便不通与呕吐不止并见名曰关格。关格大多由脾阳亏损，肾阳衰微，阳不化水，水浊逗留，浊邪壅塞三焦，气化功能不得升降所致。本病类似于现代医学的泌尿系统疾病引起的慢性肾功能减退，多种疾病晚期引起的急性肾功能衰竭。另外，关格的另一含义为大便不通兼呕吐，不属本篇范围。

方一

【组成】 生大黄30克 附子、桂枝各20克 煅牡蛎60克 泽泻30克

【用法】 将上药浓煎200~300毫升，行高位保留灌肠。每日1~2次，每次保留1小时以上，一般10天为1疗程，休息5天后，可再继续1疗程。以每日泻便2~3次为佳。

【主治】 脾肾阳虚、浊邪上逆之关格。

【来源】 江苏中医杂志 1986；7（9）：18

方二

【组成】 生大黄、丹参、牵牛子（打碎）各30克 淡附片10克 全蝎6克

【用法】 将上药浓煎150毫升，加入砂炭银粉末3克，备用。保持药温37℃，高位保留灌肠。保留2小时左右。每日1次，20天为1疗程，一般治疗3个疗程。

【主治】 关格各型兼有血瘀表现者。

【来源】 安徽中医学院学报 1989；8（1）：27~28

方三

【组成】 玄参30克 麦冬30克 鲜生地60~120克 鲜茅根250~500克 大黄15~30克（后下） 元明粉12~15克（冲） 车前子（包）30克 通草9克 知母12克 黄柏12克

【用法】 上药水煎至200毫升，保留灌肠，轻者每次1剂，重者每次2剂，日2~4次，直至多尿期来临为止。

【主治】 关格之湿热壅盛者。

【加减】 腹满加枳实、厚朴；血尿加藕节、小蓟；尿膜（尿排出膜样组织）加篇蓄、瞿麦；血瘀加桃仁、丹皮；气壅加葶苈子、桑白皮；抽搐加羚羊角粉、钩藤；气虚加人参；神昏加安宫牛黄丸。

【注意】 （1）灌肠时须缓缓注入，以保留30分钟以上者效果较好。灌肠后保持病人排便3~4次；（2）对于梗阻性尿毒症、严重电解质紊乱和休克所致的肾前性尿毒症、氮质血症，应积极去除病因及诱因，予以恰当处理，不用灌肠法；（3）尿毒症终末期患者，最好不用；（4）慢性肾盂肾炎所致的尿毒症，在使用灌肠方的同时，应配合合理的抗炎治疗；（5）对并发尿毒症性肠炎者，应在严密观察下进行。

【来源】 中医杂志 1986；（10）：32

方四

【组成】 大黄15克 牡蛎50克 蒲公英30克 黄连10克

【用法】 将上药浓煎200~300毫升，行高位保留灌肠。每日1~2次，每次保留1小时以上，一般10天为1个疗程，休息5天后，再继续1个疗程。以每日泻便2~3次为佳。

【主治】 关格标实证。

【来源】 福建中医药 1989；20（6）：25

喘 促

喘促系热毒内陷，久病气竭或外伤气脱所致，以气息喘促，张口抬肩，昏厥痰壅，唇肢青紫等为特征。亦称为“喘

鸣”、“喘喝”、“喘息”、“上气”、“逆气”，它包括了现代医学中各种原因引起的呼吸困难，如急性感染和外伤所致的急性呼吸困难、急性呼吸窘迫综合征、急性呼吸衰竭、慢性呼吸衰竭和心力衰竭的喘促，以及肾脏、肝脏疾病所致的呼吸衰竭。

方一

【组成】 麻黄 杏仁 陈皮 半夏 桃仁

【用法】 喘促发作时，取上药浓煎剂10~20毫升，用棉签蘸药点擦定喘、肺俞、膻中穴、天突穴，擦后如30分钟无明显改善，可按上法再擦1次，药物作用可持续6小时，3日为1疗程。

【主治】 喘促。观察300多例，总有效率为92.05%。一般在10分钟内即可收效。

【来源】 健康报 1987年1月31日

方二

【组成】 山苍子

【用法】 塑料鼻塞浸入山苍子油后，喘促发作时，取出塞入一侧鼻孔，嘱病人略加深呼吸，时间为3分钟，起效后可再继续观察30分钟。

【主治】 喘促。共观察50例，即时平喘占88%，可持续30分钟以上。

【来源】 浙江中医杂志 1978；（1）：19

方三

【组成】 天南星、白芥子各30克 姜汁适量

【用法】 将前2味药打碎为末，过筛。取姜汁和药末调匀如糊状，取药糊分别涂布涌泉、中脘穴，干后另换，1日3~5次，3日为1疗程。

【主治】 痰浊壅盛之喘促。

【来源】 穴位贴药疗法

方四

【组成】 天雄、附子、川乌、官桂、桂枝、桂心、大腹皮、白檀香、木香、细辛、川椒、干姜等量 麻油适量 黄丹适量

【用法】 将上前12味药等量入适量麻油熬后去渣，再加适量黄丹成膏，发作时取肺俞穴敷之，5~8日1换，10日为1疗程。

【主治】 顽固性哮喘。

【来源】 中医内科急症证治

方五

【组成】 鱼腥草4000克 蒲公英4000克 葶苈子1500克 赤芍500克

【用法】 将鱼腥草蒸馏得芳香水500毫升，其药渣与蒲公英、葶苈子、赤芍同煎2次，煎液浓缩，醇液过滤，回收乙醇稀释至9500毫升，并与鱼腥草蒸馏渣混匀后灭菌。每次取100毫升，做直肠点滴，每分30滴，药液温度38~40℃，每日1~2次。7日为1疗程。

【主治】 热毒犯肺之喘促证。共观察42例，总效率为95%。

【来源】 上海中医药杂志 1988；5：27

急性阑尾炎

急性阑尾炎是以右下腹痛及右下腹局限而固定的压痛为主要临床表现的常见急腹症。本病右下腹痛多有转移性，伴有发热、恶心、呕吐，其右下腹腹肌紧张、固定性压痛和反跳痛是急性阑尾炎最常见又是最重要的体征。属祖国医学的“肠痈”范畴。

方一

【组成】 滑石粉6份 甘草粉1份

【用法】 将滑石粉与甘草粉混合拌匀备用，将药粉填满患者脐窝，外加五神膏覆盖，再加胶布固定。每天换药1次，7天为1疗程。

【主治】 急性阑尾炎初起。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方二

【组成】 生大黄30克 元明粉18克 丹皮18克 冬瓜仁18克 生苡仁30克 败酱草30克 紫花地丁24克 桃仁24克 蒲公英30克 乳香10克 没药10克 附子1.5克

【用法】 上药共入一纱布袋内，封袋口，置锅内加水4碗，文火煎30分钟，入白酒25克，离火，乘温取出，略挤去水，敷患处，每日数次，病愈止。

【主治】 阑尾炎成脓期。

【来源】 全国名老中医验方选集

方三

【组成】 姜黄5份 大黄5份 黄柏5份 陈皮3份 川朴3份 花粉10份 生南星3份 苍术3份 白芷5份 甘草3份

【用法】 上药按比例取适量研为细末，以醋（成人）或茶水（小儿）调成糊状，均匀涂布于肿块区皮肤，用薄膜塑料纸遮盖，以防干燥脱落或粘污衣服。干后另涂，一般敷3~5天即可。

【主治】 阑尾周围脓肿。

【来源】 实用中西医结合杂志 1989；（3）：49

方四

【组成】 大黄12克 丹皮12克 桃仁12克 冬瓜仁30克 芒硝10克

【用法】 将上方水煎，大黄后下，取液200毫升作保留灌肠，使药液到达下段肠腔。每日2次，病愈为止。

【主治】 急性阑尾炎。

【来源】 中医外科学

方五

【组成】 生附子1片

【用法】 生附子1片放患处，以葱、姜、蒜捣糊放附片上，艾灸之。如烂，用山上白色陈牛粪研末，用麻油调搽。

【主治】 产妇急性阑尾炎。

【注意】 切忌以凉药敷，此法宜慎用。

【来源】 中医外治法简编

急性肠梗阻

急性肠梗阻是由多种原因所致的肠道通过障碍，为常见急腹症之一。其临床主要症状为腹痛、呕吐、腹胀、停止排气和排便。本病与祖国医学的“关格”、“肠结”、“腹痛”等相类似。

方一

【组成】 苍术、油朴、陈皮、莱菔子、甘草、芒硝各10克 枳实15克

【用法】 上药加水500毫升，浓缩到300毫升，高压保留灌肠。如2小时症状不减，再煎200毫升低温高压灌肠，仍不泻下，症状不减者，间隔4小时1次，辅以强刺激足三里、天枢、内关、合谷穴，采用泻法。

【主治】 各型肠梗阻。

【加减】 体虚加黄芪12克，干姜10克；体实水停者加甘遂10克。

【来源】 四川中医 1985；（12）：46

方二

【组成】 大黄30克（后下） 枳实15克 厚朴15克 芒硝30克（后下） 莱菔子15克 黄芩15克

【用法】 上方加水1000毫升，煎至300毫升，灌肠前将芒硝放入药液中溶解，置于输液瓶中经肛管滴入，每分钟

80~110滴，1日1次，连续治疗3天。

【主治】 肠梗阻。共治疗78例，1剂有效者50例；2剂有效者22例；总有效率为92.3%。

【来源】 中西医结合杂志 1989；9（5）：282

方三

【组成】 麝香0.15~0.25克

【用法】 研末，直接置于神阙穴上，再用大于此穴之胶布一块外贴，然后点燃艾卷，隔布灸至肛门排出矢气为止。每日可灸2~3次，病愈为止。

【主治】 肠梗阻。

【注意】 凡脐部有湿疹、溃烂时忌敷。艾灸时以皮肤觉热为度，只有持续灸才能使药物充分发挥作用。

【来源】 陕西中医 1984；5（5）：39

方四

【组成】 丁香30~60克

【用法】 研成细末加75%酒精调和，对酒精过敏者，可用开水调和，敷于脐及脐周，直径约6~8厘米，纱布用塑料薄膜覆盖，周围胶布固定，以减少酒精挥发。每日2~3次，5天为1疗程。

【主治】 麻痹性肠梗阻。

【来源】 中医杂志 1988；（11）：55

方五

【组成】 大皂角500克 葛根600克

【用法】 将上药同放入石臼中捣烂，然后置于大锅

中，加水1担，熬煎1小时，倒入大缸中，再加冷水若干，使其温度适宜，搅匀，令患者坐浴3小时，大便即通，梗阻缓解。

【主治】 肠梗阻。

【来源】 常见病民间传统外治法

方六

【组成】 麝香0.3克 生姜、紫苏各120克 大葱 500克 陈醋250毫升 普通膏药或胶布1张

【用法】 麝香研细末，纳神阙穴，外盖普通膏药或胶布；再把生姜、紫苏研为细末，和大葱共捣一起，陈醋炒热，敷神阙及阿是穴。1日2~3次，7天为1疗程。

【主治】 单纯性肠梗阻。

【来源】 俞穴敷药疗法

方七

【组成】 细辛、皂角各适量

【用法】 将上2味药按3：7的比例，研细末，蜂蜜炼至滴水成珠，制成通便药条塞入肛门。一般半小时可见排便、排虫。

【主治】 蛔虫性肠梗阻。

【来源】 常见病中草药外治疗法

外伤疼痛

外伤疼痛是指外界各种因素刺激所引起的组织破坏和功能障碍所致的疼痛证候。本证常见于日常生活中，临床表现以疼痛为主，伴有功能障碍。与祖国医学中的气滞痛、瘀血

痛相类似。

方一

【组成】 泽兰叶12克 当归尾12克 细辛6克 羌活6克 薄荷6克

【用法】 用文火煎煮成600毫升，外加醋酸及70%酒精各30毫升即成。将煎好之药液盛入碗内，用特制之纱布球浸沾药水，于受伤或疼痛红肿部位摩擦，擦至皮肤出现大片潮红，局部充血，患者感到局部发热及舒服为止（一般10分钟左右），每日1~2次，一般15~25次为1疗程。

【主治】 外伤疼痛。

【注意】 （1）注意药液温度，应多加更换（不宜低于60℃或高于80℃）。（2）用药液摩擦时，注意不要使皮肤破损，防止感染。

【来源】 江西中医药 1960；（6）：21

方二

【组成】 四叶对、生川乌、生草乌、土细辛、甘松、山奈各10克 疯茄花9克 薄荷6克 红茴香15克

【用法】 将以上药物共研细粉浸在75%酒精或白酒5000毫升内，1~2周后，用棉球浸药水涂擦患处，1日3次，7天为1疗程。

【主治】 跌打损伤疼痛。

【来源】 浙江中医学院学报 1984；8（4）：31

方三

【组成】 生栀子、生大黄各等量

【用法】 上药共研为末，新伤调蜂蜜或鸡蛋清成糊状，外敷患处，范围大于肿痛面积，药厚约0.5厘米，再用纱布包扎，每日或隔日换药1次，病愈为止。对于陈旧性挫伤或宿伤，则用热酒调敷。

【主治】 外伤疼痛。

【注意】 患处有破伤者禁用。

【来源】 江苏中医 1965，（10）：23

方四

【组成】 生川乌、生草乌、生半夏、生南星各25克
生蒲黄、生栀子、生大黄、生黄柏各24克 制乳没、白芥子
当归、川芎、骨碎补、五加皮、片姜黄各15克 生附子、北
细辛、皂角刺、羌活、独活、广木香、紫丁香、甘松、山奈
麻黄各12克

【用法】 以上诸药共研成极细粉，储放在密封的瓶内备用。用时把药粉同医用凡士林或鸡蛋清或蜂蜜或菊花露调成软膏状置放在钵内候用。将调成的软膏，根据损伤的不同部位，均匀地平摊在纱布上，外敷在伤处，绷带包扎。每隔3~5天换药膏1次。

【主治】 跌打损伤、局部肿胀疼痛膏紫。

【来源】 浙江中医学院学报 1984；8（4）：30

方五

【组成】 生草乌、淀粉（或麦面粉）、干姜各15克
厚朴30克 白胡椒、食盐各5克 冰片3克

【用法】 将上药混合研极细末，加入适量75%酒精（或白酒）调成糊状，然后在炭火上加热，待不烫皮肤时，

用纱布包裹，贴敷于患处，绷带包扎，每周1次，一般连用3次即愈。

【主治】 跌打损伤、扭挫伤之肿痛。

【注意】 外敷时药物勿直接接触及皮肤，皮肤与药物之间要用2~3层纱布隔离，上药后如有剧痛，发热难以忍受者及时取下，孕妇及经期不宜采用。对有皮肤破损及容易过敏者禁用。本品剧毒，用后要深埋。

【来源】 四川中医 1986；（6）：30

外伤出血

外伤出血是指被锐利的刀、钉、针、玻璃、木刺等所伤，或被坚硬之物擦伤、打击伤而引起皮肤粘膜血管破裂出血。本证主要以出血为主。

方一

【组成】 鳝鱼血1杯 大蒜汁半杯 好墨汁1杯。

【用法】 鳝鱼血（无鲜的，干的亦可）及其它2味共合调匀，时时用鸭毛蘸擦患处，血止为止。

【主治】 外伤出血。

【来源】 全国名老中医验方选集

方二

【组成】 降香25克 五倍子30克 红花10克 白芨25克 血竭10克

【用法】 上药分别研为极细粉末，均匀混合，再置于100℃干燥箱中消毒备用。用时将药粉撒在伤口，布包固定

即可。

【主治】 外伤出血。

【来源】 常见病中草药外治疗法

方三

【组成】 甘草、鲜葱各适量

【用法】 煎汤，待凉后滤过去渣贮用，外用洗涤创口。

【主治】 创伤出血（消毒止痛）。

【来源】 常见病中草药外治疗法

方四

【组成】 （1）煅石膏粉 生乳香粉各30克 （2）广三七粉30克 黄柏粉30克

【用法】 将上二组药各拌匀，选用一种直接撒在出血部位，用绷带扎紧，经较长时间再揭去。

【主治】 外伤出血。

【来源】 中医简易外治法

方五

【组成】 蚕豆炒去壳

【用法】 取豆捣细和匀，蜡熔为膏，摊贴患处。

【主治】 扑打及金刃伤出血不止者，用之并收口如神。

【来源】 串雅外编

方六

【组成】 乳香3克 没药3克 轻粉6克 血竭4.5克
雄黄3克 麝香0.6克 儿茶3克 龙骨4.5克 梅片0.9克

【用法】 共研极细末，用时先以硼砂少许研末，用开水溶化，洗患处。洗净后，敷药末1薄层，外用油纸裹扎，每日换药1次。

【主治】 一切创伤出血。

【来源】 中医验方汇选

急喉风

急喉风是喉风的一种，因其发病迅速，病情危重而定名。多由风热邪毒、痰涎火毒，或疫疔之邪结聚于喉间所致。以咽喉红肿疼痛，呼吸困难，痰涎壅盛，语言难出，汤水难下为主要临床特点。如出现牙关紧急，口噤如锁者，名为锁喉风。本病类似西医的“急性喉梗阻”。

方一

【组成】 黄连3钱 蜜炙黄柏、蒲黄各2钱 青黛、芒硝、寒水石、儿茶、雄黄、硼砂、五倍子各1钱 漂朱砂、枯矾、铜绿、绿矾（煨）、薄荷、生甘草各5分 牛黄、冰片各3分 麝香1分

【用法】 诸药共研为末，临用时以薄荷汤、姜汁、白蜜调敷颈上。每日3~5次，病愈为止。

【主治】 急喉风。

【来源】 中医外治法简编

方二

【组成】 荆芥、防风、薄荷、银花、连翘、甘草各适量

【用法】 上药加水适量煎汤，频频含漱，病愈为止。

【主治】 急喉风。

【来源】 中医耳鼻喉科学

方三

【组成】 月石5钱 牙硝1两5钱 白僵蚕1钱（炒）
冰片2分

【用法】 上药共为细末，每用五分，以笔管吹入喉中，
日3~5次，病愈为止。

【主治】 急喉风。

【来源】 灵验良方汇编

方四

【组成】 木香、梅片、乳香、没药、血竭、元参、斑
蝥 全虫各等份

【用法】 诸药共为细末，炼蜜为丹，如芡实大，用时
捏作饼贴颌下对喉处，用小膏药盖好，待发泡去之。

【主治】 急喉风喉肿不能饮食，口噤不开者。

【来源】 祁州中医验方集锦

流行性脑脊髓膜炎

流行性脑脊髓膜炎（简称流脑）是由脑膜炎双球菌引起的急性呼吸道传染病。临床以发热、头痛、呕吐、瘀点、脑

膜刺激征阳性及脑脊液变化为主要特征。多发生于冬、春季，成人与儿童均可患病，但以儿童多见。本病属祖国医学温病中“春温”、“风温”等一类病证。又因可以流行成疫，故也有“瘟疫”之称。

方一

【组成】 黄柏、甘草各适量

【用法】 将上2味药煎剂保留灌肠，日2~3次，病愈止。

【主治】 流脑呕吐较剧者。

【来源】 浙江中医杂志 1986；（1）：30

方二

【组成】 野菊花500克

【用法】 先将采来的新鲜野菊花，用清水洗净，按1000克野菊花加水2000克的比例煎煮半小时，浓缩至1000克，即成50%煎液。采用雾化吸入法，成人每次2毫升，儿童减半，治疗带菌者每天1次，预防隔天1次。

【主治】 防治流行性脑膜炎。用雾化吸入法，3个月间共治疗带菌者78例，其中喷药1次痊愈者64例，占82.05%；2次治愈的5例，占6.41%；3次痊愈的9例，占11.53%。治愈率为100%。

【来源】 江西中医药 1959；（12）：12

方三

【组成】 煅皂矾末适量

【用法】 用皂矾置瓦片上加热煅红，研成细末，过筛备

用。吸入患者两鼻孔内，一般药入鼻1~3分钟后即见效。

【主治】 流行性脑脊髓膜炎。

【注意】 雄皂矾末吸入鼻孔后，有黄红色液体流出，即为药效，勿慌。

【来源】 江苏中医 1957；（3）：40

方四

【组成】 绿矾5份 硃砂1份

【用法】 将上2味合为细末拌匀，密贮瓶中。用时以消毒药棉包上药黄豆大1份，上端开口，塞在1侧鼻孔内，每小时换药1次，掉换时塞另一鼻孔，共用3次。塞后不久，即有喷嚏、鼻涕，最后有血水流出。

【主治】 流脑高热头痛、颈强、手足拘挛、呕吐、神昏。

【来源】 江西中医药 1985；增（2）：102

方五

【组成】 缸砂（即米漂人中白，晒干除杂物）一匙
煅尿浸石膏粉少许

【用法】 将缸砂临用时加尿浸石膏粉少许，长条摊在纱布上，包头（自前额至后脑），勿使药从纱布孔隙与皮肤接触，再用绷带固定。1~2日换药1次，7日为1疗程。

【主治】 流脑头痛、偏头痛。

【来源】 江西中医药 1985；增（2）：102

方六

【组成】 蚯蚓数条

【用法】 将蚯蚓捣烂加入白糖少许，敷患儿的囟门上，按囟门由印堂直上，入发际2寸，亦即囟会穴所在处，敷时将患者此处的头发剃去。

【主治】 流行性脑脊髓膜炎。

【来源】 江苏中医 1957；（3）：40

流行性乙型脑炎

流行性乙型脑炎（简称“乙脑”），是由乙型脑炎病毒引起的急性传染病。临床以高热、惊厥、嗜睡、昏迷及出现脑压增高、脑膜刺激征为特征。本病由蚊虫媒介而传播，发病有明显的季节性，多流行于夏季，以10岁以下小儿为多见。本病属祖国医学温病中“暑温”、“暑风”、“暑厥”等一类病证。

方一

【组成】 紫雪丹2克 鲜生地30克 大青叶30克 生石膏30克 石菖蒲9克

【用法】 将上方煎汤，肛灌给药，分3次将药液灌完，2周为1疗程。

【主治】 乙脑而见惊厥、昏迷。

【来源】 中西医结合杂志 1983；3（1）：42

方二

【组成】 控涎丹、生栀子各25克

【用法】 将上2味研末，加面粉100克，水适量做饼状，贴于胸部，日3～5次，直至病愈为止。

【主治】 乙脑而致热痰壅盛，呼吸困难等证。

【来源】 浙江中医药 1977；（3）：90

方三

【组成】 地龙5条 皂矾1.8克

【用法】 将地龙趁活加入皂矾1.8克，在瓷钵中研碎后，即用纱布橡膏固定，外敷囟会穴上，日3~5次，愈病止。

【主治】 乙脑高热不退、神昏不语。

【来源】 江苏中医 1961；（8）：封3

方四

【组成】 葱白、生姜各适量

【用法】 将上药捣烂敷关元穴，日3~5次，病愈止。

【主治】 乙脑而致尿闭。

【来源】 湖南医药杂志 1980；（3）：20

急性结膜炎

急性结膜炎是一种由细菌或病毒感染而引起的急性传染性眼病。其临床特点为睑、球结膜充血、水肿，粘液样分泌物增多。属中医学的“天行赤眼”、“暴风客热”等范畴。

方一

【组成】 明矾、胆矾、黄连、铜绿、归尾、防风、杏仁、红花各3克

【用法】 以上8味用稀白布包好放于大碗内，以开水

冲之，后再以白布蒙上。趁热熏之，稍温，将蒙布揭去，用净棉花拭洗，以冷为度，用完仍将药水放好，再用时即可冷洗。新症2~3次可好，日久多洗数次亦愈。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 河南验方集锦

方二

【组成】 杭菊花1钱 川黄连5分

【用法】 上药加天雨水约500公撮，浓煎至300公撮，以极细密的消毒纱布过滤，俟冷，即可使用。使用时将药液盛洗眼杯里，作洗眼用，每日4~6次。2~3天为1疗程。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 江苏中医 1957；（5）：39

方三

【组成】 枯矾末5分 冰片2分

【用法】 共研匀，上药加鸡蛋清，调如糊状，涂上、下眼睑。涂上以后，病人自觉局部凉快舒适，并且很快地干燥，粘着皮肤。每日3~5次，7日为1疗程。

【主治】 急性结膜炎伴有眼睑浮肿者。

【注意】 勿使药沾眼内。

【来源】 江苏中医 1957；（5）：39

方四

【组成】 黄连60克 姜黄15克 芒硝120克 牙皂30克

【用法】 共研细末，以蛋清、火葱汁、浓茶合调均匀。

敷太阳穴、两手心及双足心，如干，以茶水润湿。病愈为

止。

【主治】 火眼初起，头目疼痛。

【来源】 眼科集成

方五

【组成】 曾青120克 蔓荆子60克 白姜(炮) 防风各30克

【用法】 共研为末，每次以少许嚥鼻中，每日2~3次嚥之，病愈为止。

【主治】 怕日羞明，隐涩眵泪，或痒或痛。

【来源】 古今图书集成医部全录

方六

【组成】 黑豆1升

【用法】 分作10份，将软布各裹定，用沸水蘸过，乘热熨眼，互换使用，每次3遍入汤用。每日数次，病愈止。

【主治】 热毒风攻，眼赤痛并浮肿。

【来源】 普济方

方七

【组成】 鲤鱼胆7枚 黄连15克 大黄15克(捣碎为末)

【用法】 鱼胆汁与药末调和，以瓷瓶盛，于饭上蒸，饭熟为度，取出。如干，即入少许熟水，调如膏。用时涂于布上，贴眼睑，每日1~2次。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 太平圣惠局方

方八

【组成】 天竺黄 海螵蛸 月石各30克 朱砂 炉甘石（片子者佳，煨，童便淬7次；水飞）各25克

【用法】 上药共研细末，瓷瓶收贮，每数克，入冰片少许。点少许，每日4~5次。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 眼科外用中药与临床

方九

【组成】 大黄末、解毒子、木香各等份

【用法】 上药捣碎为粉，水调如膏，布上或纸上摊匀。用时贴眼脸上，频频换之。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 普济方

方十

【组成】 黄连15克 黄芩24克 黄柏30克 大黄60克 黄丹60克 薄荷120克

【用法】 共研成粉，用葱汁、浓茶水调成糊状，敷两侧太阳穴及眼眶。如干，以茶水调之。

【主治】 暴发火眼，红肿热痛。

【来源】 眼科集成

凝脂翳

凝脂翳是由风热毒邪或脏腑里热壅盛，上攻于目而引起

的眼科急重症。其临床特点为：黑睛中部生翳，色黄或白，状如凝脂覆盖，继而溃陷，常伴有黄液上冲，与现代医学之细菌性角膜溃疡相类似。

方一

【组成】 血竭、儿茶、山奈、自然铜、铜绿、五味子各6克

【用法】 上药煎汤过滤去渣，乘热熏洗患眼，每日3~5次，7天为1疗程。

【主治】 角膜溃疡。

【来源】 熏洗疗法

方二

【组成】 冰片1克 新鲜猪胆汁50毫升

【用法】 将冰片研末，入猪胆汁内溶解过滤，装入清洁瓶中高压消毒即成2%冰胆滴眼剂。使用时用消毒滴管吸药滴眼，每次用1~2滴，每日4~6次。用后将药放在阴凉处保存。8天为1疗程。

【主治】 凝脂翳。50例共70只患眼中，用此方法治愈68只。

【来源】 中西医结合杂志 1987；7（7）：402

方三

【组成】 荆芥、防风、银花、蒲公英、千里光、野菊花等量

【用法】 将上药煎水，澄清过滤，待温度适宜时，热敷患眼，1日3~5次，病愈为止。

【主治】 凝脂翳。

【来源】 中医诊疗常规

方四

【组成】 丁香、细辛、辛荑各3克 熟地30克

【用法】 将上药研细末，吸入健侧鼻中。1日3~5次，7天为1疗程。

【主治】 角膜溃疡早期。

【来源】 俞穴敷药疗法

方五

【组成】 石决明30克 樟脑3克 白矾3克

【用法】 石决明研成细末水飞，将上3味用人乳或炼乳成膏，涂在眼脸上，1日3~5次，10天为1疗程。

【主治】 凝脂翳。

【来源】 甘肃中医验方集锦

方六

【组成】 炒甲珠3克 细辛根3克 广丹3克 净轻粉1.5克 大梅片1.5克 元寸1.5克

【用法】 先将炒甲珠、细辛根、广丹研细粉，再将轻粉、大梅片、元寸掺入，放擂钵内擂粉，瓷罐收贮，罐口密封。左眼病者，吹右耳内；右眼病者，吹左耳内。1日3~5次，病愈为止。

【主治】 凝脂翳。

【来源】 江西省中医验方秘方集

黄液上冲

黄液上冲是由脾胃积热或肝胆蕴热，外感毒邪，烁灼黄仁神水而致脓液内聚的一种眼科急重症。临床上主要表现为：黑睛与黄仁之间积聚淡黄色脓液。本病多为凝脂翳、花翳白陷或瞳神紧小等眼病向深处扩散转变而来。与现代医学之前房积脓相当。

方一

【组成】 银花15克 菊花15克 蒲公英15克 紫花地丁15克 防风15克 荆芥15克 薄荷（后下）15克 生地15克 板蓝根15克 犬青叶15克

【用法】 煎汤趁热熏洗患眼约20分钟，每日2~4次，7天为1疗程。

【主治】 黄液上冲。

【来源】 中国中医秘方大全

方二

【组成】 曾青、秦皮、细辛、白芷、乳香、龙脑各0.3克 黄连、诃子、木香各30克

【用法】 共研为末，以水2碗，浸3日后，煎至1盏，滤渣取汁，再入蜜120克，同煎至膏状，盛瓷瓶中，勿令泄气。用之点眼，日3~4次，病愈止。

【主治】 黄液上冲。

【来源】 秘传眼科龙木论

方三

【组成】 白矾9克 硼砂6克 冰片1.5克

【用法】 共为细末，秋梨1个去皮核，捣涂之，日3~5次，病愈止。

【主治】 黄液上冲。

【来源】 眼科临症笔记

方四

【组成】 硝石3克 胆矾1.5克 明矾4.5克 食盐1.5克

【用法】 以文火煮，纳壶中，净藏于土中，约7日，瘀结如青冰，名夏冰。每用少许，融解为水，洗净眼目。

【主治】 黄液上冲。

【来源】 中医眼科历代方剂汇编

第二章 内 科

感 冒

感冒是感受风邪，出现鼻塞、流涕、喷嚏、咳嗽、头痛、恶寒、发热、全身不适等症状的一种疾病，为常见的外感病之一。现代医学的普通感冒、流行性感冒、病毒性及细菌性感染所引起的上呼吸道急性炎症，与中医学感冒或时行感冒相似。

方一

【组成】 麻黄 香薷各15克 板蓝根 公英各10克
桔梗12克

【用法】 上药共为细粉，每用1克。将药粉倒入肚脐中心，用一般胶布贴敷固定。一般一次即愈。

【主治】 感冒。治疗196例，治愈率98%。

【来源】 陕西中医 1990；（6）：270

方二

【组成】 胡椒 丁香各7粒

【用法】 上药碾碎，以葱白捣膏混和，涂两手心，合掌握定，夹于大腿内侧，温覆取汗则愈。

【主治】 风寒感冒初起。

【来源】 本草纲目

方三

【组成】 石膏300克 连翘30克 荆芥、薄荷各15克
芦根、赤芍各10克

【用法】 石膏先煎30分钟，加连翘、赤芍、芦根再煎10分钟，加荆芥、薄荷煎煮5分钟。共煎2次，煎成300毫升，过滤后加适量尼泊金备用，用量每千克体重3毫升，保留灌肠。药后30~60分钟出汗，60~180分钟热退明显。白细胞高者6小时后再给1剂，一般24小时体温正常。

【主治】 感冒高热（体温39℃以上），白细胞高者。

【注意】 体温38.5℃以下，多汗者，可单味石膏煎剂灌肠。

【来源】 新中医 1985；（1）：13

方四

【组成】 白芷末6克 姜汁适量

【用法】 以姜汁调匀白芷末，涂擦太阳穴，每日数次，每次20分钟。

【主治】 感冒初起风寒轻症。

【来源】 太平圣惠方

方五 实表膏

【组成】 羌活、防风、川芎、白芷、白术、黄芪、桂枝、白芍、甘草、柴胡、黄芩、半夏各15克

【用法】 上药麻油熬，黄丹收，贴心口。

【主治】 外感风邪，表虚自汗。

【加减】 去黄芪、白术、桂枝，加葱、姜各500克，麻

黄、苍术、杏仁各30克敷，治伤寒无汗。

【来源】 中医外治法类编

方六

【组成】 麻黄去节120克 柴胡30克 升麻、党参、当归各30克 赤芍、甘草各120克 朱砂、雄黄各45克

【用法】 上药麻油熬，黄丹收，贴臆中处。

【主治】 感冒。

【加减】 春夏加石膏、枳实，秋冬加细辛、桂枝各15克，石膏可重用。此方亦能发汗，伤寒汗后变为杂症，干霍乱亦可用。

【来源】 中医外治法类编

方七

【组成】 紫苏2000克 板蓝根200克 大青叶2000克 菊花2000克 鲜姜（取汁）2000克 樟脑100克 羊毛脂100克 蜂蜡100克 醋精300毫升 薄荷少许 凡士林10000克

【用法】 先将前四味药煎煮2次，过滤取滤液，将姜汁加入溶液中，浓缩成流浸膏，樟脑与薄荷溶化后，加入流浸膏中，醋精与基质混合后，加入流浸膏，搅匀，分装成盒。用时将此膏涂于鼻孔周围或鼻翼两侧，早晚各1次。根据当地疫情和气候变化，酌情增加数次。

【主治】 感冒。

【来源】 人民军医

咳 嗽

咳嗽是机体对侵入气道的病邪的保护性反应。古人以有声无痰称咳，有痰无声称嗽。临床上二者常并见，通称咳嗽。凡外感或内伤，导致肺气上逆，便致咳嗽。相当于西医所称急、慢性支气管炎，支气管扩张，感冒，部分肺炎等疾病。

方一

【组成】 白芥150克 甘遂50克 细辛35克 黄丹400克 植物油500克（以上熬膏） 白芥子350克 甘遂75克 冰片75克（研末）

【用法】 将药末置双侧肺俞穴上，如蚕豆大（约0.5克），再将膏药烘融后覆盖其上，稍加按压，胶布贴牢。3日换药1次，9日内换药3次为1疗程。

【主治】 老年慢性气管炎，治疗548例，总有效率89.78%。

【来源】 江西省老年慢性气管炎会议资料1971；6

方二

【组成】 胡椒7粒 桃仁10粒 杏仁4粒 梔子仁3克

【用法】 将上药共捣烂，以鸡蛋清调如糊状，取药糊适量，置于双足心涌泉穴，纱布盖，胶布固定。

【主治】 久咳兼见痰多、喘息者。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 鱼腥草 蒲公英 葶苈子 赤芍

【用法】 上药分别提取有效成份制成灭菌溶液。每次取100毫升作直肠点滴。30滴/分钟，药液温度38~40℃。每日1~2次。

【主治】 支气管炎合并肺部感染，总有效率95.2%。

【来源】 上海中医药杂志 1988; 5: 27

支气管哮喘

支气管哮喘是在支气管高反应状态下由变应原或其它因素引起的广泛气道狭窄的疾病，其临床特点为间歇发作，往往经治疗或自行缓解。属中医学的“哮喘”范畴。

方一

【组成】 射干12克 炙麻黄8克 法半夏10克 紫苑10克 细辛6克 款冬花10克 杏仁10克 五味子10克 苏子10克 橘红10克 生姜5片 炙甘草6克

【用法】 将上药放入有嘴壶中，加水煮沸，患者从壶嘴吸入蒸气雾，每日2~4次，每次15~20分钟。1日1剂，10日为1疗程。

【主治】 冷哮喘。

【注意】 雾吸时，可先在患者口鼻周围涂以凡士林，以防熏烫伤。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 麝香1~1.5克 大蒜30~60克

【用法】 于农历5月5日正午，让患者俯卧，用肥皂水、盐水分别清洁局部皮肤，先将麝香研为细末，均匀地撒在第七颈椎棘突至十二胸椎棘突（宽8分~1寸的脊背中线，即督脉的长方形区域），继将大蒜捣烂成泥状，覆盖于麝香上（大蒜的用量视患者年龄、体型及蒜头大小而定）。贴60~120分钟，将麝香和蒜泥取下。局部皮肤即充血，有的有烧灼疼痛感，少数并发水泡（敷2小时，多敷不会起水泡）。清洁局部，候干，涂以硼酸软膏，覆盖纱布，胶布固定。10~15天贴1次，连贴2次。大部分只敷1次即效。连贴3年可巩固疗效。

【主治】 支气管哮喘。

【注意】 （1）肺气肿、心脏病、心功能不全、哮喘合并上呼吸道感染患者禁用；（2）水泡形成后作常规处理，以防感染；（3）如需在原处继续治疗，须待皮肤愈合后才能进行；（4）麝香昂贵，可用人造麝香或冰片代替。

【来源】 陕西中医 1983；（3）：8

方三

【组成】 炙白芥子21克 元胡21克 甘遂12克 细辛12克

【用法】 取肺俞、心俞、膈俞等穴。将上药共研细末，装塑料袋备用，每次用上药1/3药面，加生姜汁调成糊状，分别摊在6块直径约5厘米的油纸或塑料布上，贴敷在上述穴位处，用胶布固定，一般贴4~6小时。如果贴后局部有

烧灼感或疼痛，可提前取下，若温热舒适或微痒，可多贴几小时，待药干燥后再取下。夏季入伏10天贴1次，即初伏、二伏、三伏各贴1次，共贴3次，一般连贴三年。哮喘发作期、缓解期均可使用。

【主治】 支气管哮喘。

【注意】 本法于正午时分，择晴天贴治效佳。贴药后不要过分活动，以免药物移动、脱落。个别病人有时局部起小水泡，一般不做处理，保持干燥可自然吸收。贴药当天禁食生冷、肥甘厚味及辛辣刺激之品，1岁以下小儿不宜贴治。

【来源】 新医药学杂志 1978；（5）：28

方四

【组成】 石菖蒲12克 葱白 3根 生姜30克 艾叶30克 椒目30克

【用法】 上药捣烂炒热，装入10×50平方厘米的布袋内，从肺俞穴处向下摩擦至膈俞部位，药冷后重新炒热，每次20～30分钟，早晚各1次，10次为1疗程。

【主治】 支气管哮喘（冷哮）。

【注意】 药包不可过热，谨防烫伤皮肤。

【来源】 中医外治方药手册

方五

【组成】 麻黄6克 半夏、桑白皮、五味子各10克 细辛12克（老、幼、体弱者酌减） 山海螺、夜交藤、胡颓子各20克 甘草3克

【用法】 上药加水800毫升，浓煎至200毫升，每晚8时作高位保留灌肠，连用5天为1疗程。

【主治】 支气管哮喘。

【来源】 浙江中医杂志 1985; (12): 535

方六

【组成】 细辛、牙皂各10克 王不留行6克 艾叶适量

【用法】 上药共研末，分为3份，每日1份，分两次放入竹筒中燃烟，患者上凑吸烟。

【主治】 支气管哮喘。

【注意】 (1)对烟熏刺激诱发的哮喘禁用；(2)对重度或哮喘持续状态慎用。

【来源】 中国民间疗法

方七

【组成】 生麻黄、白苏子、紫菀各9克 南星、半夏桔梗、川贝、细辛、杏仁、甘草各15克 生姜30克

【用法】 上药麻油熬，黄丹收，阿胶30克搅。贴肺俞。

【主治】 哮喘。

【来源】 中医外治法类编

方八

【组成】 川乌、白芨、云苓、草乌、乌药各30克 连翘、当归、白芷、木鳖子、官桂、赤芍、白薇各40克 牙皂、枣枝、桑枝、桃枝、柳枝、槐枝各25克

【用法】 上药用麻油1500克，浸药一宿，熬焦去渣，入飞黄丹500克，如麦色，急以桃柳棍2根，搅至滴水成珠，

入乳香、没药细末各20克，收膏摊成膏药，将膏药贴肺俞穴、风门穴，贴三伏九九，其病可以根治，神效。

【主治】 哮喘。

【来源】 中国膏药学

方九

【组成】 鹿茸100克 肉桂20克 防风150克 生绵黄花150克 党参150克 炮姜30克 酒炒黄花300克 苏叶20克 母丁香30克 附片100克 白术150克

【用法】 肉桂、丁香研末，余药用清水4000毫升浸一宿，次日入锅中煎，至水干后再将药倾入茶油2000克同煎，待药枯，用绢筛去净渣，再煎至滴水成球后，入黄丹275克，然后将肉桂、丁香米加入和匀，收膏摊布上，须25~30克重。贴背部第三节肺俞穴。

【主治】 老幼新旧哮喘。

【来源】 中医秘方验方汇编第一辑

方十

【组成】 天雄、附子、川乌各1枚 桂心、官桂、桂枝、细辛、干姜、川椒各60克

【用法】 将药浸入1000克麻油中数天，煎熬去渣，滤净再熬，徐下黄丹，不停地搅拌，滴水不散为度。用时将药摊于布上，冷哮喘咳，加麝香少许，贴肺俞、华盖、膻中穴。

【主治】 哮喘咳嗽，遇冷即发。

【来源】 古今名方

肺 脓 疡

本病又称肺脓肿，是多种病原菌引起的肺部感染。早期为化脓性炎症，继而形成脓肿。以高热、咳嗽、咳吐大量脓痰为特征。中医称之为肺痈。

方一

【组成】 竹沥20毫升 鱼腥草浸液20毫升 10%苦参液20毫升

【用法】 将药液置超声雾化器内吸入。1次20分钟，1日2次。

【主治】 肺脓疡。

【来源】 百病中医自我疗养丛书·肺脓肿

方二

【组成】 金银花25克 桔梗20克 半夏15克 麻黄15克 杏仁10克 黄芩15克

【用法】 上药共置水壶内煎沸，壶嘴近口鼻，吸入药蒸气。

【主治】 肺脓疡。

【来源】 百病中医自我疗养丛书·肺脓肿

方三

【组成】 (1)大蒜100克 芒硝50克；(2)大黄200克

【用法】 大蒜和芒硝混合，捣如泥。敷药时，下垫油

纱布2~4层，外敷肺俞穴及胸背部的阿是穴（湿性罗音区），1次2小时，胸背轮换敷，敷毕，去掉蒜泥糊，用温开水洗净蒜汁，再将（2）方敷上，即大黄研细粉，醋调成糊，敷于阿是区，8小时去掉，1日1次。

【主治】 热壅肺络证。

【来源】 中医外治法集要

肺 结 核

由结核杆菌引起的结核病中，最多见的就是肺结核，为一种慢性、缓发的传染病。中医称之为“肺癆”。

方一

【组成】 猫眼草 蟾蜍皮 木鳖子 独角莲 守宫
乳香 没药

【用法】 上药等量，共置香油中熬枯去渣，加黄丹收膏，待温加入麝香，摊纸上备用。将制成膏药放于火上烘软，外敷于结核病灶在前胸、后背体表的相应部位上，以及大椎、肺俞、膻中等穴。每3日换药1次，2个月为1疗程。

【主治】 肺结核。总有效率96.1%。

【来源】 山西中医 1989；5（4）：34

方二

【组成】 五倍子、辰砂各2克

【用法】 取五倍子、辰砂共研细粉，水调成糊状，涂于塑料薄膜上，敷于脐窝，胶布固定，24小时1次。

【主治】 肺结核（盗汗）。有敷率84.5%。

【来源】 浙江中医学院学报 1989; 13(3): 18

方三

【组成】 紫皮大蒜50克

【用治】 大蒜捣烂，蒜泥摊于玻璃瓶内，瓶口置于口鼻，吸其挥发气，每次1~2小时，1日2次。

【主治】 肺结核形成空洞者。

【来源】 新中医 1980; (4): 26

方四

【组成】 云母、焙硝、甘草各120克 槐枝、桑白皮、柳枝、侧柏叶、橘皮各60克 川椒、白芷、没药、赤芍、肉桂、当归、黄芪、血竭、菖蒲、白芨、川芎、白薇、木香、防风、厚朴、桔梗、柴胡、党参、苍术、黄芩、龙胆草、合欢皮、乳香、茯苓各15克

【用法】 上药麻油熬，黄丹收，加松香60克搅匀，贴患处。

【主治】 肺结核。

【来源】 中医外治法类编

呕 吐

呕吐是由于胃失和降，气逆于上，饮食和痰涎等胃内容物经由口而出的病证。吐常见于西医学中神经性呕吐，胃炎，幽门痉挛或梗阻，胆囊炎，胰腺炎，某些急性传染病等。

方一

【组成】 酒炒白芍9克 胡椒1.5克 葱白60克

【用法】 将前2味共研为末，葱白与上药共捣成膏，贴心窝（剑突下）。每日1次。

【主治】 呕吐。

【来源】 理渝骈文

方二

【组成】 胡椒10克 绿茶3克 酒曲2个 葱白20克

【用法】 将上药共捣烂成糊状，分别摊于4块直径3厘米的圆形塑料布或油纸上，敷贴于中脘、臌中、期门（双）穴处，外以胶布固定，每次敷贴6~12小时，每日1次。

【主治】 呕吐。治疗神经性呕吐7例，敷贴5次全部有效。其中敷贴1次治愈者2例，2次治愈者2例，3次治愈者¹例，5次后明显好转者2例。

【注意】 本品对皮肤有刺激性，敷贴后个别患者局部可出现丘疹、瘙痒，重复敷贴时可有轻微灼痛，停止贴敷可消失。

【来源】 中国灸法集萃

方三

【组成】 大黄、厚朴、枳实、芒硝各30克

【用法】 上药水煎，过滤，取浓汁400毫升，冷却至37℃为宜，每次200毫升，保留灌肠，20~30分钟，4小时后重复灌肠。

【主治】 呕吐。治疗20例，灌肠2次，有效率达

90%。

【加减】 若有虫积加使君子、槟榔、榧子；瘀毒加桃仁、丹皮、赤芍；湿热加黄连、黄柏、白头翁；痈脓加红藤、败酱草、丹皮；痰热加竹茹、半夏、胆星；火毒加黑丑、甘遂、大戟；寒实加附片、干姜、巴豆。

【来源】 新中医 1987；（2）：25

噎膈

噎膈是指饮食吞咽受阻，或食入即吐的病证，多因忧思郁怒、饮食所伤、寒温失宜、劳役所伤、脏气不和、气血瘀结填塞胸膈，结于心下，饮食难下，而为噎膈。大致包括西医之食管癌、贲门癌、贲门痉挛、食道憩室、食道神经官能症及食道炎等。

方一

【组成】 参三七、象贝、郁金各10克 川连5克

【用法】 上药共研细末，加炼蜜适量制成如枣核大丸，置口中噙化，每日4~5次，每次1丸。

【主治】 食道炎（灼癌、吞咽困难）。

【来源】 浙江中医杂志 1989；（2）：52

方二

【组成】 火麻仁 郁李仁各15克 桃仁10克 当归15克 黄芪30克 半枝莲15克 白花蛇舌草15克

【用法】 上药水煎，制成等渗等温溶液。首次使用方剂，最好用pH试纸试验，防止过酸。患者仰卧，头低脚

高，中药过滤液入输液瓶内，接导尿管，插入肛门约25厘米，胶布固定，调整滴数以无便意为度。

【主治】 晚期食管、贲门癌患者便秘30例，28例在2日内排便，其中5例食道完全梗阻症状缓解明显，可以进食，另2例因过度衰竭无效。

【来源】 中西医结合杂志 1984；4（1）：68

方三

【组成】 胆南星、瓦楞子各5克 白矾2克 枯矾 雄黄、牛黄、琥珀、乳香、没药、珍珠、白降丹各1.5克 白砒2.5克（剧毒） 麝香0.3克 青鱼胆2个

【用法】 贵重药及剧毒药另研，一般药品烘干，研为细末过筛，混和调匀，再研一遍，装瓶备用。取药粉适量，青鱼胆为丸如芥菜籽大，贴于上脘、中脘、膻中穴，外用胶布固定。2日换药1次，半月为1疗程，治愈为止。

【主治】 噎膈。

【来源】 中医外治法集要

方四

【组成】 杏仁去皮尖 香豉熬麴、干姜、吴萸、川椒各等份

【用法】 上药分炒去汗，共研为末，炼蜜和丸，用以擦胸，每日数次。

【主治】 噎膈反胃。

【来源】 中医外治法类编

胃 痛

胃痛，又称胃脘痛，是以胃脘部近心窝处经常疼痛为主症。胃痛的发生与饮食失调、情志刺激、劳累受寒、脾胃虚弱等诸因素有关。本病与西医学急、慢性胃炎，胃及十二指肠溃疡，胃痉挛，胃粘膜脱垂，胃神经官能症等相类似。

方一

【组成】 连须葱头30克 生姜15克

【用法】 将上二味共捣烂炒烫，装入布袋，热敷胃脘部，药袋冷即更换，每日2次，每次30分钟，或以疼痛缓解为度。

【主治】 寒性胃痛。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 肉桂50克 干姜50克 香附80克 良姜80克
草拔40克 木香40克 丁香15克 肉蔻30克 茯苓50克
附子30克

【用法】 将上药风干，研碎成粉，另将铁粉、木粉置容器内，加入催化剂，配成溶液，再将上述药物加入，搅拌均匀，装入布袋。将药包摩擦发热后敷在胃脘部，每日1换，7日为1疗程。一般需1~2个疗程，重者2~4个疗程。

【主治】 寒凝、气滞和脾胃虚寒型胃痛。

【来源】 河南中医 1988，（3）：23

方三

【组成】 鲜姜30克 香附15克

【用法】 将生姜捣烂，香附研成细粉，装茶杯或保温杯中，开水冲入，竹筷搅匀，用毛巾蘸药在胃脘部上下、左右轻轻摩擦20分钟，1天2次，3天为1疗程。

【主治】 阴虚胃痛。

【来源】 中医简易外治法

方四

【组成】 草拨 干姜各15克 甘松、山奈、细辛、肉桂、吴茱萸、白芷各10克 大茴香6克 艾叶30克

【用法】 以上诸药共研细末，用柔软的棉布40厘米，摺成20厘米见方的布兜，内铺一薄层棉花。将药均匀撒上，外层加一块塑料薄膜，然后用线密密缝好，防止药末堆积和漏出，日夜兜在胃脘部。一般于胃痛季节立冬开始，至第二年春分除去，药末1~2个月换1次。

【主治】 脾胃虚寒型胃痛。

【来源】 中医杂志 1981；22（8）：72

方五

【组成】 大黄10克（后下） 肉桂6克 吴茱萸10克 黄连10克 白芍30克 乌梅20克 枳实15克 乌药20克

【用法】 上药煎取200毫升，用导尿管经肠门灌入，保留灌肠40~60分钟，日1次，7天为1疗程，疗程间隔3天。一般需要1~2个疗程。

【主治】 阴虚、血瘀型胃痛。

【来源】 四川中医 1987, (2): 26

胃下垂

胃下垂是立位时胃下缘达盆腔、胃小弯弧线最低点降到髂嵴连线以下的病症。多见于体瘦、肌肉不发达者。病久者,可同时见到其它脏器下垂的现象。本病中出现的消化不良症状,中医分别称之为“胃脘痛”、“痞气”、“呃逆”等。

方一

【组成】 蓖麻子仁10克 升麻粉2克

【用法】 蓖麻子仁捣烂如泥,拌入升麻粉,制成直径2厘米、厚1厘米的圆药饼。剃去患者百会穴周围2厘米内头发,敷以升胃饼加以固定。患者仰卧,放松裤带,用灌有80℃热水的瓶子熨烫升胃饼30分钟,1日3次。每块药饼连用5天。10天为1疗程。

【主治】 胃下垂。治疗268例,痊愈105例,显效70例,好转78例,无效15例,总有效率为94.4%。

【来源】 上海中医药杂志 1987, (8): 8

方二

【组成】 附子24克 蓖麻子仁30克 五倍子18克

【用法】 上药共捣烂,敷于百会穴及剑突处鸠尾穴。

【主治】 胃下垂。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方三

【组成】 黄芪 升麻

【用法】 此二药制成100%注射液，行穴位注射，每穴1次3毫升，6次后停1天。穴位以足三里、胃俞、脾俞为主，交替使用。1月为1疗程。

【主治】 胃下垂。治疗142例，总有效率达96.7%。

【加减】 恶心呕吐加内关穴，上腹痛甚加中脘穴，下腹痛甚加三阴交穴，便秘加支沟穴。

【来源】 湖北中医杂志 1985；（2）：44

方四

【组成】 蓖麻子仁20克 五倍子10克

【用法】 上药共捣烂，纱布包裹，贴敷脐上。

【主治】 胃下垂。

【注意】 孕妇及吐血者忌用。

【来源】 中医外治法集要

方五

【组成】 三棱、莪术各15克 肉桂10克 陈艾45克
木香、草果、公丁香各10克 水仙子15克 红花15克 高良姜12克 砂仁6克

【用法】 上药共研末，用三尺布折成双层，内铺棉花，将药末铺于棉花中间，用线缝好，防止药末堆积和漏出。日夜兜在胃脘部，于胃痛易发季节开始使用，连用半年或至病愈。每月换药1次。

【主治】 胃下垂（肝胃不和型）。

【来源】 中医杂志 1961; (5): 36

腹 痛

腹痛是指胃脘部以下，耻骨以上部位发生的疼痛。引起腹痛的常见病因有情志刺激，饮食不节，寒温失调，虫积等。其基本病机为实邪内阻，气血壅滞，或气血亏虚，经脉失荣。腹痛大致包括现代医学的急、慢性胰腺炎，急慢性腹膜炎，急、慢性肠炎，肠痉挛，胃肠神经官能症等。

方一

【组成】 莱菔子120克（打碎） 生姜60克（切碎）
葱连根须500克（切碎） 白酒1杯

【用法】 上药上锅炒热，布包，遍熨腹部。一般先由上而下，由左至右，冷则易之。

【主治】 气滞腹痛。

【来源】 中医内科急症证治

方二

【组成】 川椒30克 乌梅30克

【用法】 上药炒熨痛处并热敷脐部。

【主治】 虫积腹痛。

【来源】 中医外治法类编

方三

【组成】 吴茱萸 小茴香各等份

【用法】 上方研细末，装瓶备用，成人每次取0.2~0.5

克，热酒调和，干湿适度，纳脐中，上用纱布覆盖，胶布固定。每日1次，以痛解为止。

【主治】 虚寒性腹痛。

【来源】 中国民间疗法

方四

【组成】 细辛、皂角各等份 蜂蜜适量

【用法】 上药共为末。蜂蜜炼制滴水成珠状，渗入药粉，按3：7混匀，制成条状，塞肛门。

【主治】 虫积腹痛。

【来源】 中医内科急症证治

方五

【组成】 桔矾6克 胡椒 每岁1粒 葱白5寸 大枣1枚

【用法】 前二味研末，大枣去核，葱白连须用，诸药混合，捣如膏。取药膏约5分硬币略大而稍厚，贴于神阙、天枢、关元穴，盖以纱布，胶布固定。每日1次。

【主治】 寒实腹痛。

【来源】 药物穴位敷贴疗法。

方六

【组成】 大黄10克（后下） 茵陈30克 枳实10克
黄芩10克 蒲公英15克 金钱草30克

【用法】 上药煎取200毫升，温度在38℃，按保留灌肠法操作，保留灌肠20分钟，可排水样便250毫升。

【主治】 食滞腹痛。

【来源】 四川中医 1985; (2): 26

方七

【组成】 吴茱萸、杜仲、蛇床子、五味子、陈皮各50克 木香、丁香各25克

【用法】 上药共为细末,每取药末25克,用生绢袋盛,以水3大碗煎数沸,乘热熏下部,通身淋浴,早晚两次熏洗。

【主治】 下焦虚冷,脐腹疼痛。

【来源】 医部全录

腹 胀

腹胀是指脘腹及脘腹以下的整个腹部,胀满而无疼痛的一种症状。多因饮食失节,起居失调,湿阻气滞,脾胃虚弱以及外伤、术后等原因引起。本病多见于西医学急、慢性胃炎,胃肠神经官能症,消化不良,腹腔手术后出现腹胀者。

方一

【组成】 生姜250克

【用法】 将鲜生姜捣碎,挤出姜汁,炒烫后装入布袋,热熨腹部。待凉后,兑入姜汁,再炒烫,复熨之。每日2~3次。

【主治】 腹胀。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 猪牙皂60克

【用法】 用1尺高煤炉1个,放炭烧着,将猪牙皂捣

开，不要太碎，放文火上烧烟。令患者将肛门对准烟上熏，约10~15分钟即有肠鸣声。如未见效，再依上法，上述剂量继续熏1~2次。

【主治】 便秘、肠梗阻、肠扭转所致的腹胀。

【来源】 新医学 1972；（2）：28

方三

【组成】 川朴、炒莱菔子、枳壳、桃仁、赤芍、大黄（后下）、芒硝（兑入）各15克

【用法】 上药加水煎至250毫升，盛入输液瓶内，每剂两煎，取液400~500毫升，兑入芒硝。病人取侧卧位，肛管插入肛门约10~20厘米深，以60~80滴/钟分滴入，滴完后安静平卧，至有便意即排便，若肛点后仍未排便（超过10小时），可再点滴1次，至通气排便止。

【主治】 术后腹胀。

【注意】 药液要新鲜配制，温度在38~40℃为宜。对完全性肠梗阻、妊娠、肛门直肠手术后、肛门感染或内痔出血的术后腹胀禁用，极度衰竭的病人慎用。

【来源】 中级医刊 1985；20（10）：53

腹 泻

腹泻，又称泄泻，是指排便次数增多，粪便稀薄，甚至如水样而言。多由湿邪所伤和内伤食滞所引起。其病变主要在肠、胃、脾。一年四季均可发病，多见于夏秋季节。本病包括西医学胃肠、肝胆、胰腺等某些病变引起的腹泄，如急性慢性肠炎、肠结核、胃肠神经官能症、食物中毒等症。

方一

【组成】 胡椒9克 麝香暖脐膏1张

【用法】 胡椒研粉末（风干或上热锅烘干后研），过筛。药末填满肚脐为度，或用鲜生姜调成汁膏状，外敷麝香暖脐膏。

【主治】 寒湿性腹泄。

【来源】 中医外治法集要

方二

【组成】 生姜30克 葱白30克

【用法】 生姜捣烂，葱白切断，加水300毫升，煮沸30~40分钟，乘热用食指蘸药液在患者的拇指及小指根部的掌面向外推擦3次，再向内关、手臂方向推擦各12次，叫做“关二扇门”，每人1~2次，连用2~3日或病愈为止。

【主治】 水泻。

【来源】 中国民间疗法

方三 明矾合剂

【组成】 明矾 苍术 苦参 槐花各15克 大黄10克

【用法】 上药水煎成250毫升，温度37℃。取其药液100~125毫升，保留灌肠，膝胸卧位，静卧半小时。早晚各1次，7~10日为1疗程。一般2~3个疗程即可收效，疗程间隔3天。

【主治】 腹泻。

【来源】 中西医结合杂志 1986；6（7）：421

方四

【组成】 肉果90克 木通200克 泽泻100克 猪苓100克 苍术100克 良姜100克 川朴100克 肉桂100克

【用法】 上药以香油2500克，炸枯去渣，章丹收膏后贴脐。

【主治】 腹泻。

【来源】 中国膏药学

方五

【组成】 当归、大茴香、小茴香、白芷各200克 肉桂、乳香、没药、木香、沉香、母丁香各100克 麝香15克

【用法】 上药共研细末。香油7500克加黄丹3200克收成膏。膏药基质每500克兑研成细料粉末25克。用时火化并贴脐上。

【主治】 腹泻，脐腹冷痛，泄泻久痢。

【注意】 忌食生冷。

【来源】 中药制剂手册。

霍 乱

霍乱是指夏秋之季，感受时行疫疠，疫毒随饮食而入，损伤脾胃，升降失司，清浊相干，临床表现以剧烈而频繁的吐泻、腹痛或不痛为特征的疾病。类似西医之霍乱、副霍乱、急性胃肠炎、细菌性食物中毒等病。有人将属于急性烈性传染病的前两者又称为真霍乱，以区别于后两病。

方一

【组成】 上肉桂0.3克 母丁香3.6克 硫磺1.5克
生香附3.5克 麝香1.2克

【用法】 上药共研细末，瓶贮传用。取3~10克填脐，外以纱布固定。填药1小时病情即缓解。

【主治】 霍乱。

【注意】 本方药性峻猛，切忌入口，体虚、小儿减半，孕妇忌用。

【来源】 中医外治法类编

方二

【组成】 食盐12克 吴萸30克

【用法】 上药炒热，包熨脐下，可使腹中热有汗，寒邪可散。每次10分钟，每日3次，3天为1疗程。

【主治】 寒霍乱。

【来源】 中医外治法类编

方三

【组成】 苍术、藿香、陈皮、半夏、青皮、桔梗、枳壳、苏叶、厚朴、甘草各15克 晚蚕砂60克 生姜、葱白各9克

【用法】 上药炒热后装布包内，热熨脐下。每日3次，3天为1疗程。

【主治】 霍乱吐泻，腹痛属寒性者。

【来源】 中医外治法类编

方四

【组成】 大蒜3瓣 黄蜡适量

【用法】 大蒜捣碎成泥，或加黄蜡，涂足心，外以纱布覆盖。每日1次，3次为1疗程。

【主治】 霍乱转筋。

【来源】 中医外治法简编

方五

【组成】 牛黄、麝香、珍珠、冰片、硼砂各1.5克
雄黄24克 火硝0.9克 姜粉1.5克

【用法】 可搐鼻取嚏，或温开水调服。每服0.3~0.6克。

【主治】 霍乱。

【来源】 古今名方

便秘

便秘是指大便秘结不通，排便困难而言。多由大肠传导功能失常，粪便在肠道停留过久，水分被吸收，造成粪质干燥、坚硬。相当于西医习惯性便秘、肠道炎症恢复期、手术后排便困难、产后排便困难、药物引起的便秘等。

方一

【组成】 火麻仁60克 大黄15克 郁李仁30克

【用法】 上药共研细末，文火炼蜜稠，和诸药，待冷却后搓成条状，如筷子盘粗细，长约3厘米，备用。用时，取

1粒，塞肛门内，每日2次。

【主治】 老年津枯便秘。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 蜗牛连壳5~6个 麝香0.15克

【用法】 将蜗牛捣烂，压成饼状。用温水清洗患者脐部，用75%酒精常规消毒；待脐部干后，把麝香研为细末，纳入脐中，再把蜗牛饼敷盖在麝香末上，上盖一层塑料薄膜，塑料薄膜上敷以纱布，用胶布固定。隔日1次。

【主治】 热结便秘。

【注意】 蜗牛必须选用活鲜品；蜗牛壳要捣碎，夏日可缩短敷脐时间。局部如有破溃感染，可涂以2%的龙胆紫。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 松节油适量 公丁香、上肉桂、檀香木、香白芷、续随子、丑牛子各30克 香三奈、广木香、北细辛、臭阿魏各20克 京三棱、蓬莪术各50克 生甘遂15克 川芎40克 樟脑块12克 黑胡椒10克 麝香5克

【用法】 先在脐孔四周之整个腹部，涂以松节油，采取徐缓柔和地按摩腹部法，按摩20分钟左右。然后将上药研制成细末，加凡士林或米糖调成软膏使用。敷以脐为中心之整个腹部，敷后可维持3天。

【主治】 由于药物引起的便秘、无矢气、腹胀、腹痛等症。

【来源】 新中医 1988；20（2）：34

方四

【组成】 芒硝、大黄、甘遂、牵牛子各等量。

【用法】 上药加水煎汤，量依据浴盆而定，待药液40℃时，淋浴全身。亦可煎取药液500毫升，沐浴前，把药液兑入温水中沐浴。每日2次。

【主治】 便秘。

【注意】 沐浴时，让药液不断流动，冲洗脐腹部，沐浴时间根据药浴水温而定，水凉出浴。

【来源】 中国民间疗法

慢性非特异性溃疡性结肠炎

本病是以溃疡为主的慢性结肠炎症。以腹泻、腹痛及粪便中挟有脓血粘液，并反复发作为特点。类属于中医所称“肠风”“肠癖”、“休息痢”等病证范围。

方一

【组成】 土大黄、苦参各30克 白芨、地榆炭、杜仲炭各10克

【用法】 上方以清水浸泡2小时，然后以文火煎取两遍药汁，将其浓缩成100毫升，每天保持浴肠1次，15日为1疗程。

【主治】 慢性非特异性溃疡性结肠炎。

【来源】 新中医 1986，（10）：37

方二

【组成】 石硫磺30克 枯矾30克 朱砂15克 母丁香10克 木香15克 独头蒜3枚（去皮） 生姜250克 芝麻油250毫升 黄丹120克

【用法】 将前6味药混合捣融如膏，搓丸如黄豆大。再将麻油入锅加热，放入生姜炸枯去姜，熬油至滴水成珠时，投入黄丹收膏。用时取药1丸，置于摊成的膏药中间，贴脾俞、大肠俞、神阙等穴，一穴1丸，3日1换。

【主治】 滑脱虚泻。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方三

【组成】 胡椒10粒 番木鳖3个（去壳生用） 枯矾10克 大蒜10瓣 米饭适量

【用法】 前三味药共碾细末，加入大蒜共捣至融烂，再如入米饭适量，捣匀如厚泥状，制成5分硬币大小圆饼，贴于脐孔上。纱布、胶布固定。隔日换药1次，至愈为止。

【主治】 慢性非特异性溃疡性结肠炎，久泻。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方四

【组成】 鲜葎草500克

【用法】 葎草洗净，加水2000毫升，煎至1500毫升，待温洗脚。每日早晚各1次，15日为1疗程。两疗程之间间隔5天。

【主治】 慢性非特异性溃疡性结肠炎。有效率98%。

痢 疾

痢疾是以大便次数增多、腹部疼痛、里急后重、下利赤白脓血便为特征。主要因湿热或疫毒外侵而起，亦可因七情内伤或食入秽浊，积滞肠中，传导失常所致。本病的症状特点，可见于现代医学的多种疾病，如急慢性细菌性痢疾、急慢性阿米巴肠病、慢性非特异性溃疡性结肠炎等。若临床表现与本病证候特点相符也可参照本病辨证治疗。

方一

【组成】 肉果30克 木通120克 泽泻60克 猪苓60克 苍术60克 良姜60克 厚朴60克 肉桂60克

【用法】 上药用香油2500毫升炸枯去渣，入黄丹熬搅收膏，贮于瓷器中备用。用时取适量，摊纸上（纱布），贴于脐中，外用胶布固定。每日1次，7~10次为1疗程。

【主治】 寒湿痢、虚寒痢。

【注意】 敷药时，若皮肤起泡、红肿、瘙痒过敏者禁用。

【来源】 中国膏药学

方二

【组成】 白术、厚朴、陈皮、甘草各32克 木香、槟榔各15克 桃仁、黄连、茯苓、党参、当归、生姜、发团各15克

【用法】 上药以香油2500毫升炸枯去渣，入黄丹熬搅

收膏，贮于瓷器中备用。用时取适量，平摊纱布（纸）上，贴于脐中，外用胶布固定。每日1次，7~10次为1疗程。

【主治】 噤口痢、疫毒痢。

【注意】 敷药时，若皮肤起泡、红肿、瘙痒过敏者禁用。

【来源】 理淪骈文

方三

【组成】 牙皂6克 细辛27克 大葱100克 田螺2个
神曲12克

【用法】 先将牙皂、细辛、神曲烘干，研为细末，再和大葱、田螺肉共捣成膏，用药膏适量，纱布包裹，压成饼状，敷神阙穴，然后用纱布覆盖，胶布固定，药干即换。病愈停用。

【主治】 噤口痢、湿热痢。

【来源】 中医外治法集要

方四

【组成】 苍术、藿香、陈皮、半夏、青皮、桔梗、枳壳、苏叶、厚朴、甘草各15克 生姜、葱白各9克 晚蚕砂60克

【用法】 将上药打碎和匀，炒烫后装入布袋，扎紧袋口，乘热将药袋置于神阙穴，药袋冷则更换，每日2次，每次30分钟，5~7天为1疗程。

【主治】 虚寒痢、寒湿痢。

【来源】 中国民间疗法

方五

【组成】 马齿苋60克 地锦草、凤尾草各30克

【用法】 用其煎液局部湿敷或用新鲜的捣烂外敷，亦可内服。

【主治】 痢疾。

【注意】 本方均用鲜品，若用干品则用量减半。但鲜品疗效优于干品。

【来源】 古今名方

黄 疸

黄疸，是以面、目、身肤熏黄，小溲黄赤为特征的疾患。多因时气疫毒、湿热、寒湿之邪侵袭，或酒食不节、劳倦内伤，以致肝、胆、脾、胃功能失调，寒湿阻遏、湿热蕴蒸以及气机郁滞，胆失疏泄，胆液渗于肌肤，而发为黄疸。本病与西医论述的黄疸含义相同，都是指出现巩膜及全身黄染的一类疾病。凡病毒性肝炎、肝硬化、胆石症、胆囊炎、钩端螺旋体病等，出现黄疸见症者，皆可参照本病治疗。

方一

【组成】 苦丁香、白胡椒、白丁香等份

【用法】 先将上药研为细末，装瓶备用，每日取少许，吹入鼻中，以流出黄水为度，每隔日1次，10次为1疗程，病愈停用。

【主治】 急性黄疸性肝炎、阳黄初期。

【注意】 吹药入鼻中时，可口含水，以防药物误入气

道。若用后刺激性强，使病情加重可停用。用药后，若鼻发干，可涂芝麻油以润之。

【来源】 常见病中草药外治疗法

方二

【组成】 紫皮大蒜3~5枚（或黄芥子粉2克） 益肝散（青黛4份 甜瓜蒂2份 冰片1克 茵陈末0.5克）

【用法】 上药共捣如泥，放玻璃皿内，倒拍于上臂三角肌上端皮肤上（相当于臂臑穴），再用绷带固定，24小时取下，皮肤上出现水泡。常规消毒后，将水泡中液体，用消毒后注射器吸出，涂1%的龙胆紫，加盖消毒纱布保护，胶布固定。一般3~5天愈合，每2~3周，治疗1次。每3次为1疗程。左右臂交替散贴，一般不超过2个疗程。每次应稍偏离上次原疤痕，一般治疗3次。未滿3次而肝功恢复正常者应停止治疗。

【主治】 急黄、阳黄证。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 砂仁30克 白糖50克 白矾10克 青背鲫鱼1条（连肠杂用）

【用法】 先把砂仁研为细末，过筛，然后将白矾、白糖、鲫鱼，共捣一起，纱布包裹，贴神阙、至阳穴。

【主治】 阳黄。

【来源】 中国民间疗法

方四

【组成】 茵陈、梔子、大黄、芒硝各30克 杏仁18克
常山、鳖甲、巴霜各12克 豆豉50克

【用法】 上药浓煎取汁，装瓶备用。用纱布或棉花蘸药汁，轻轻涂搽脐部，并炒药渣烫脐部。

【主治】 阳黄、急黄。

【来源】 理渝骈文

方五

【组成】 甜瓜蒂、秦艽各100克 青皮、紫草、黄芩
丹参各30克 铜绿15克 冰片6克

【用法】 除甜瓜蒂、冰片另研外，余药混合研粉，合并过60目筛，装入3×5平方厘米大小的薄膜塑料袋，每袋约15克，密封备用。取75%酒精或温开水将脐内污垢洗净拭干，将药粉倒入脐孔（神阙穴）约填满2/3，用4×4平方厘米菱形胶布贴封腹部，周围不可有空隙，否则药物漏出影响疗效。成人每次用量为0.15克左右，小孩每次0.1克，每48小时换药1次。病愈可停用。

【主治】 阴、阳黄证，谷丙转氨酶升高症。

【来源】 浙江中医药杂志 1978；（3），9

胁 痛

胁痛，即一侧或双侧胁部疼痛的症状，主要是肝胆疾病造成。多由肝气郁结，血瘀肝络，胆腑湿热，痰火内蕴等引起。可见于西医的多种疾病，如急、慢性肝炎，肝硬化早

期，肝脓肿，肝内寄生虫以及肝癌，急、慢性胆囊炎，胆石病，胆道蛔虫，肋间神经痛，肋软骨炎，部分脾机能亢进等病。

方一

【组成】 川芎12克 香附10克 柴胡6克 芍药6克 青皮6克 枳壳6克

【用法】 将上药研细，调拌麻油或其它辅料贴于胁肋痛处。或将药物敷于大包、期门、章门穴。

【主治】 胁痛。

【加减】 肝气郁结加夏枯草30克，钩藤12克，法罗海12克；血瘀停滞加鸡血藤20克，桃红6克，骨碎补12克；痰火内蕴加地龙20克，木香6克，穿山甲3克。

【来源】 中国民间敷药疗法 I

方二

【组成】 柴胡、香附、青皮、赤芍、丹皮、地骨皮 梔子、苍术、川芎、建曲、连翘 生地、甘草各15克

【用法】 上药煎汤，擦洗胁下痛处，1日2~4次。

【主治】 胁痛。

【来源】 理渝骈文

臌 胀

本病因腹部胀满膨隆而命名。以腹部胀满隆起、甚则腹壁青筋显露，肤色黄，下肢肿为临床特征。如下肢不甚肿，称单腹臌。多由黄疸、积聚失治，或感染血吸虫，使气血瘀积、水液停滯而成。相当于西医所称肝硬变病。

方一

【组成】 轻粉6克 巴豆霜12克 生硫磺3克

【用法】 上药研末，制药饼。以药饼一片铺脐上，外以纱布、胶布固定。敷药后自然泻下，泻五、六次后除去药，以温粥送服调养。

【主治】 臌胀，尤宜于寒湿证。

【来源】 穴敷疗法集方辑

方二

【组成】 大戟 甘遂 沉香 肉豆蔻 广木香各12克

【用法】 将上药共研细末以酒250毫升和匀，装入猪膀胱里，置于神阙穴，外盖塑料薄膜，以宽布带环扎固定，药酒干时再换新药。

【主治】 臌胀，尤适于气滞湿阻、阳虚水溢证。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 川椒100克 炙鳖甲15克 三棱15克 白术15克 阿胶15克

【用法】 上药共研细末，加白酒适量炒烫、装入布袋。置于神阙穴，上敷热水袋以保持温度。

【主治】 臌胀。适于肝肾阴虚、气滞血瘀等证。

【来源】 中国民间疗法

方四

【组成】 苍术 白术 香附 当归 苏梗 黄连 栀

子 枳实 山楂 木香 槟榔 赤苓 木通 泽泻 生姜各等分麻油熬，黄丹收膏。

【用法】 将制好的膏药贴于气海穴。

【主治】 臌胀。气滞湿阻型腹水。

【来源】 中医外治法简编

方五

【组成】 巴豆霜3克 轻粉1.5克

【用法】 上药和匀，用4~5层纱布包裹后置于脐上，外用胶布固定，经1~2小时感到局部有刺痒感即可取下，以防起泡。待水泻，若不泻再敷。

【主治】 肝硬化腹水所致的膨胀。

【来源】 内蒙古中草药新医疗法资料选编

方六

【组成】 真川白芥子1000克 穿山甲400克

【用法】 用桐油1000克入锅先熬半晌，次入穿山甲熬数沸，再入白芥子，俟爆止，滤去渣，入炒黑黄丹250克，收之，离火，再入麝香末200克，去火气7日。使用时摊开隔汤化之，不可用火，贴于患处。加阿魏200克更妙。

【主治】 臌胀。

【来源】 回生集

积 聚

本病以腹内结块，或胀或痛，消烁气血津液，损耗脏气为特征。多由正气先虚，脏腑失调，气机逆乱，导致气、

血、痰、浊蕴结腹内所致。古籍中的癥、瘕、癖、伏梁、息贲、肥气等病名皆属积聚范围。相当于西医所说腹内肿瘤、肝脾肿大、增生型肠结核、胃肠功能紊乱及不完全性肠梗阻等疾病。

方一

【组成】 红芥菜子约一酒杯 生姜汁浸一宿 麝香
3克 阿魏9克

【用法】 上药捣烂如膏，摊布上，贴患处，汗巾扎紧。

【主治】 积聚。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方二

【组成】 大黄、姜黄、黄柏、皮硝、芙蓉叶各50克
冰片、生南星、乳香、没药各20克 雄黄30克 天花粉
100克

【用法】 将药末醋调，敷于患处，隔日1次。

【主治】 积聚。

【来源】 浙江中医杂志 1983；（3）：20

方三

【组成】 阿魏、硼砂各31克

【用法】 上药共研细末，白酒适量调和，敷脐，上用
纱布覆盖，布带捆扎固定，3天换药1次。

【主治】 胁下之积。

【注意】 本法使用7天仍无效者，改用其它疗法。敷
脐后局部有痒感时停3~5天。有溃疡则停用。

【来源】 中国民间疗法

方四

【组成】 厚朴、枳实、生大黄、玄明粉、炒莱菔子、赤芍、当归、广木香各15克

【用法】 上药加水800毫升，煎至200毫升（大黄后下，玄明粉冲入），每日早晚各煎1次并作低位灌肠。

【主治】 积聚，粘连性肠梗阻。治疗有效率93.3%。

【来源】 浙江中医杂志 1987；22（2）：55

方五

【组成】 阿魏15克 木鳖子25克 三棱15克 白术15克 桃仁15克 红花15克 赤芍15克 丹参15克 乳香15克 没药15克 香油500克

【用法】 将上药炸焦，去渣，熬至滴水成珠，加樟丹300克熬成膏，每日50~100克，摊白布上，再以少许寸香、梅片研细放膏药中，贴患处。

【主治】 积聚。

【来源】 丹方精华

方六

【组成】 水红花子10克 生大黄5克 朴硝5克 山梔仁5克 石灰5克 酒酵1块（如鸡子大）

【用法】 上药共捣成膏。用时将布摊开，贴痞块上，再用汤瓶熨手帕勒之，3日后揭起，肉黑如墨者，是其效也。

【主治】 积聚，肝脾肿大。

【来源】 中国膏药学

方七

【组成】 大黄250克 皂角250克 生姜250克 生葱250克 大蒜25克

【用法】 共捣烂，水煎取汁去渣，再熬成膏，黑色为度，用时摊绢帛上，先刺患处，后贴膏药。

【主治】 积聚，肝脾肿大。

【来源】 中国膏药学。

头 痛

头痛是临床上常见的自觉症状。系指外感、内伤或杂病以头痛为主证者。凡风寒、湿热之邪外袭，或痰浊、瘀血阻滞致使经气逆上，或肝阳上扰清窍，或气虚清阳不升，血虚脑髓失荣等均可引起头痛，头痛剧烈，经久不愈，呈发作者又称头风。可见于现代医学内、外、神经、精神等各科疾病中。在内科临床上常遇到的头痛多见于感染性发热性疾病，高血压，颅内疾病，神经官能症，偏头痛等疾病中。

方一

【组成】 川芎 细辛 羌活 薄荷脑 茶叶 荆芥 桔梗 防风

【用法】 上药研细末，过80目筛，取药1小撮约0.1克，置头痛侧鼻孔前吸入，一般在4~6分钟可显效，用至痛止。

【主治】 风寒头痛。共观察496例，总有效率95%。

【来源】 中医杂志 1989；（8）：29

方二

【组成】 细辛、徐长卿、川芎各9克 蜈蚣、山奈各6克 冰片0.5克

【用法】 上药分别研成细末后和匀，用的确良或绸布1小块包药末少许，双鼻左右交替塞用，左侧头痛塞右侧鼻孔，右侧头痛塞左侧鼻孔。每日更换1~2次，上药1剂用完为1疗程。疗程间隔3~5日。

【主治】 头痛。共观察43例，总有效率为76.8%。

【注意】 ①避免精神刺激，勿过劳，保证睡眠充足；②忌烟酒、生冷辛辣食物；③复发者再用仍有效。

【来源】 陕西中医杂志 1987；8（6）：266

方三

【组成】 细辛、生石膏、花粉、白芷各6克

【用法】 上药共为细末，水和成丸如绿豆大小，左边痛塞右鼻孔内，右边痛塞左鼻孔内，见汗即愈。

【主治】 风、火、痰之头痛。

【来源】 上海中医药杂志 1982；（12）：17

方四

【组成】 川芎50克 白芷50克 炙远志50克 冰片7克

【用法】 上药共研细末，以绸布或的确良1小块，包少许药末，塞入鼻孔，右侧塞左鼻，左侧头痛塞右鼻，塞鼻3~5分钟后头痛即渐消失。复发时再用仍有效。

【主治】 偏头痛。

【来源】 中医杂志 1982, (2): 68

方五

【组成】 川芎15克 晚蚕砂30克 僵蚕20~30克 香白芷15克

【用法】 将中药共入沙锅内,加水5碗,煎至3碗,用厚纸将沙锅口糊封,并视疼痛部位大小,在盖纸中心开1孔,令患者痛位对准纸孔,满头痛者,头部对准砂锅口(两目紧闭或用手巾包之),上面覆盖1块大方手巾罩住头部,以热药气熏蒸,每日1剂,每剂2次,每次熏10~15分钟,7日为1疗程。

【主治】 头痛。共治疗39例,总效率为100%。

【来源】 浙江中医杂志 1981; 16(9): 394

方六

【组成】 青黛 黄连 决明子 黄芩 桑叶 当归 红花 生地 防风 苏叶 贝母各等份

【用法】 上药小磨油熬,黄丹十分之七、朱砂十分之一,用青黛收。临用掺黄菊花末,左侧痛贴右太阳穴,右则痛贴左太阳穴,全头痛双侧贴。

【主治】 头痛。

【来源】 中医外治法类编

方七

【组成】 荆芥穗12.5克 穿山甲7.5克 白芷12.5克 蝼蛄7.5克 干蝎5克 土虫5克 牙皂7.5克 冰片1.5克 (后兑) 僵蚕5克 薄荷2.5克

【用法】 上药共研细面，蜂蜜调匀，摊于布上备用，用时贴太阳穴上。

【主治】 头痛。

【来源】 慈禧光绪医方选

方八

【组成】 生乌头、生南星、生白附子各等份

【用法】 共研细末，每用30克，以葱白（连须）7茎，生姜15克，切碎捣如泥，入药末和匀，用软布包好蒸热，包在痛处，其效颇速，痛可缓解。

【主治】 偏头痛久治无效者。

【注意】 本方毒性剧烈，仅供外用，勿入口。

【来源】 古今名方

眩 晕

眩晕是目眩与头晕的总称。目眩即眼花或眼前发黑，视物模糊；头晕即感觉自身或外界景物旋转，站立不稳。二者常同时并见，故统称为“眩晕”。多属肝的病变。可由风、火、痰、虚等原因引起。眩晕可见于西医的多种疾病，如耳性眩晕、脑性眩晕及其某些颅内占位性疾病，感染性疾病及变态反应性疾病，癫痫，其它原因的眩晕，如高血压、低血压、阵发性心动过速、房室传导阻滞、贫血、中毒性眩晕、眼源性眩晕、头部外伤后眩晕、神经官能症，以眩晕为主要表现者。

方一

【组成】 生地

【用法】 用鲜生地塞一侧耳，眩晕消失即可。

【主治】 眩晕，气血亏虚。

【来源】 中医外治法简编

方二

【组成】 白芥子30克 胆南星15克 白矾15克 川芎10克 郁金10克 姜汁适量

【用法】 将前5味药研末，用生姜汁调和如膏状，把药膏贴在患者的脐孔上，外以纱布覆盖，胶布固定，每日换药1次，15天为1疗程。通常5~7天可奏效，连用1~2个月可防止复发。

【主治】 眩晕。适用于痰浊内蕴之证。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方三

【组成】 吴茱萸（胆汁拌制）100克 龙胆草50克 土硫磺20克 朱砂15克 明矾30克 小蓟根、叶适量。

【用法】 先将前5味药粉碎为末，过筛加入小蓟根、叶调和成糊，敷于神阙及双侧涌泉穴，每穴用10~15克，上盖纱布，胶布固定，2日换1次，1个月为1疗程，一般7~10天见效，2~3个疗程可愈。

【主治】 眩晕。

【来源】 穴位贴药疗法

心 悸

心悸是指病人自觉心中悸动，惊惕不安甚则不能自主的一种病证。它包括惊悸和怔忡。常与精神因素，心血不足，心阳衰弱，水饮内停，瘀血阻络有关。分别与各种心脏病所引起的心律失常，以及缺铁性贫血，再生障碍性贫血，甲状腺机能亢进，神经官能症等出现以心悸、心慌为主证者相似。

方一

【组成】 南星、川乌各半

【用法】 上药共为细末，用黄蜡融化推于手、足心。每日1次，晚敷晨取，10次为1疗程。

【主治】 心悸。

【来源】 中医外治法简编

方二

【组成】 硫磺6克 乳香、没药、松香、桂枝、杜仲枳壳、皂角、细辛、川芎、白芷、独活、穿山甲、雄黄、丁香、全蝎各3克 麝香3克 陈艾绒90克

【用法】 将前16味药物碾为细末，加麝香和上等陈艾绒和匀后搓成锥体，放于心俞、内关、神门穴点燃艾炷，徐徐按压附近穴位以减灼痛，当艾燃烧将尽、病人灼痛难忍时，急用先备的金属盒连压至火灭。

【主治】 心悸。

【来源】 新疆中医杂志 1988：（3）：34

方三

【组成】 青麻 麝香药酒

【用法】 将青麻搓成直径约0.5毫米的线绳，浸泡进麝香药酒中而成。以拇食二指持线的一端露出线平均1厘米，置煤油灯或酒精灯、蜡烛上点燃后移开，待线头呈红炭珠火（忌火苗）时，对准穴位，顺应腕力，拇指尖稳重而敏捷地将火线头点按耳穴位，心、小肠、交感穴上，按火灭即为1壮，灸处有轻微灼热感。每日1~2次，每次灸20~30分钟，10天为1疗程。每疗程间隔7天。

【主治】 心悸。

【来源】 耳穴疗法

不 寐

不寐，即“失眠”，是以失眠为主要表现的一种病证。不寐的证情不一，轻者入寐困难，或寐而不酣，时寐时醒，醒后不能再寐，严重者可整夜不能入寐。又称“不得眠”、“不得卧”、“目不瞑”。西医的神经官能症、更年期综合症及某些精神病早期见失眠诸证时，可按不寐辨证论治。

方一

【组成】 珍珠层粉 丹参粉 硫磺粉 冰片等量混匀

【用法】 取上药适量，纳入脐窝使与脐平，胶布固定即可。5~7天换敷1次。

【主治】 不寐。

【来源】 中国灸法集萃

方二

【组成】 吴茱萸9克 米醋适量

【用法】 吴茱萸研成细末，米醋调成糊状，敷于两足涌泉穴，盖以纱布，胶布固定。1日1次。

【主治】 心肾不交之不寐。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方三

【组成】 新青皮1块

【用法】 青皮置于柴火上烘热，趁热熨擦两眼之上下眼皮。每次进行20分钟左右，1日1次。

【主治】 不寐。

【注意】 新青皮洗净，以免脏物落入眼内。热熨时，青皮温度要适中。

【来源】 中国民间疗法

方四

【组成】 菊花100克 川芎400克 丹皮200克 白芷200克

【用法】 用洁净布缝制一枕头，装入上述中药。睡眠时以此为枕头。

【主治】 不寐。

【注意】 不适于癫痫患者。

【来源】 中医杂志 1980；（7）：45

癲 狂

癲与狂都是神志失常的疾病，癲证以语无伦次，忧郁痴呆为特征；狂证以狂躁粗暴，骂詈不避亲疏，哭笑妄言，喧扰不宁为特征。但两者往往交替出现，因此，两证有一定的联系，临床上常以癲狂并称之。本证以情感障碍为著者，类似于现代医学中的更年期精神病，躁狂抑郁性精神病；以思维障碍行为紊乱为著者，类似于精神分裂症等病。

方一

【组成】 牙皂6克 细辛6克 樟脑1.5克

【用法】 将上述3味药物混合研成细末，每次用3克，吹入两侧鼻孔，取嚏。吹鼻15分钟后开始呕吐痰涎，此时为起效之征。

【主治】 癲狂。尤以痰热蕴结者为佳。

【注意】 不可长期使用本法。连续使用1周后要休息2~3天。

【来源】 俞穴敷药疗法

方二

【组成】 生铁落30克 天冬15克 麦冬15克 知母12克 胆南星45克 橘红6克 远志6克 茯神6克 连翘6克 白茯苓6克 玄参6克 竹沥6克 石膏蒲3克

【用法】 先将生铁落研碎，加水煎煮半小时，然后去渣放入其余药物煎煮30分钟，取出药汁。加水再煎45分钟，滤出药汁，将两次药汁混合，分成两份，1次服1份，冲服朱

砂1.5克。1天2次。

【主治】 癫狂。

【来源】 中国民间疗法

癲 癇

癲癇是一组临床综合征，以在病程中有反复发作的神经元异常放电引起暂时性突发性大脑功能失常为特征。功能失常可表现为运动、感觉、意识、行为和植物神经等不同障碍，或兼有之。本病属于中医“痫证”范畴。

方一

【组成】 熟附子9克

【用法】 上药研细末，用面粉少许合做成饼，把饼放在气海穴上。并可用艾绒团灸数次。

【主治】 癲癇。

【来源】 常见病验方研究参考资料

方二

【组成】 丹参、麦冬、薄荷各60克、茯神、天麻、贝母、半夏、陈胆星、橘红各30克 郁金45克 明矾24克 远志21克 全蝎、僵蚕、甘草、牙皂各15克 朱砂15克 琥珀、犀角 雄黄各6克 石菖蒲90克

【用法】 上药共为末，姜汁、竹沥为丸，弹子大，临用以姜汁化开，擦胸。

【主治】 癲癇。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 马钱子（制）、僵蚕、胆南星、明矾各等分

【用法】 上药混合研为细末，再以青艾叶、鲜姜适量和诸药即成定痫糊，备用。治疗时取定糊5~10克，分别置于神阙和会阴穴，上置艾炷施灸。根据患者年龄，1岁灸1壮。每日灸治1次。

【主治】 癫痫。

【来源】 中国灸法集萃

失 语

由于各种原因完全或不完全失去语言功能者称为失语。失语可分为感觉性失语、混合性失语、运动性失语等，中医学中属于“喉痹”、“瘖痺”、“失音”等。

方一

【组成】 皂角10克 细辛5克

【用法】 将上药研成细末，取适量吸入鼻内。

【主治】 失语，瘖病失语。

【来源】 俞穴敷药疗法

方二

【组成】 玉蝴蝶10 石斛15克 桔梗10克 蝉衣10克 薄荷10克 菖蒲10克 麦冬10 玄参10克

【用法】 水煎上方，去渣取汁，令患者含漱。

【主治】 失语。

【来源】 河南省秘验单方集锦

方三

【组成】 清半夏10克 鸡蛋清10克 醋20克

【用法】 将鸡蛋打开一孔，将半夏塞于其中，火上焙之令熟，然后去壳加醋，令患者含。

【主治】 失语，虚火上炎型。

【来源】 金匱要略

水 肿

水肿是指水液泛滥肌肤，引起眼睑、头面四肢、腹背甚至全身浮肿的病证。《内经》称为“水”，《金匱要略》称为“水气”。包括现代医学的急慢性肾炎，充血性心力衰竭，肝硬变内分泌失调及营养障碍等疾病所出现的水肿。

方一

【组成】 蓖麻仁70粒 石蒜1个

【用法】 将上二味药共捣烂，敷于两足涌泉穴，外盖纱布，胶布固定，约8小时后取掉，每日1次，1周为1疗程。

【主治】 水肿，急慢性肾炎。

【注意】 敷贴上药物后，最好勿走动，以免药物移位。

【来源】 中医外治法

方二

【组成】 熟附子12克 生牡蛎25克 生大黄12克 芒

硝3克

【用法】 加水600毫升，将前3味中药煎煮成250毫升，再溶芒硝于其中，待冷却后保留灌肠。1日1次，7日为1疗程。

【主治】 水肿。慢性肾炎肾病。

【来源】 四川中医 1986；（10）：39

方三

【组成】 赤小豆750克

【用法】 加水1000毫升，文火煎煮赤小豆，待赤小豆熟透后，取出药液，温度适中后浸泡足、膝。

【主治】 水肿。

【来源】 中医外治法

方四

【组成】 麻黄、羌活、苍术、柴胡、紫苏梗、荆芥、防风、牛蒡子、忍冬藤、柳枝、葱白各适量

【用法】 加水煎煮上述药物，待药液适量后取出令其降至40℃时沐浴，汗出即可。每日1次。

【主治】 水肿。风邪袭表。

【注意】 沐浴时注意保暖，勿令感冒。

【来源】 中国民间疗法

方五

【组成】 土狗1个 轻粉0.7克

【用法】 将两味药物混合，研为细末，取少许吹入两侧鼻孔，黄水出尽为佳。

【主治】 水肿。

【来源】 中国民间疗法

方六

【组成】 商陆、大戟、甘遂各等份

【用法】 将上三味药物混合研为细末，每次取药末5~10克，撒布于神阙穴内，盖以纱布，胶布固定。每日换药1次。

【主治】 水肿。

【来源】 穴位贴药疗法

腰 痛

腰痛是指腰部的一侧或两侧的局部疼痛，由腰痛而引及小腹、股腠、尾部及其他部位的疼痛，亦属腰痛范畴。现代医学的肾炎、肾盂肾炎、肾结石、肾结核、肾下垂、肾积水以及风湿性脊柱炎、腰肌劳损、腰椎骨质增生、脊髓空洞症、腰部软组织急性扭伤等均可出现腰痛。

方一

【组成】 桃仁、红花、乳香、没药、五倍子（砸碎）黑豆各20克 赤芍15克 甘草15克 白酒30克

【用法】 每剂加水3000毫升，煎至一半，加入白酒趁热熏患处，待液温稍减，便可用毛巾浸液洗患处。在药尚有余热时停止熏洗，用干毛巾擦洗患处，一次熏洗30分钟，1剂药洗4次。

【主治】 腰痛，外伤或急性扭伤。

【注意】有皮损及化脓者禁用。

【来源】中医杂志 1986; (5): 30

方二

【组成】 参三七70克 三棱70克 红花120克 生川草乌各50克 归尾70克 樟脑120克 五加皮50克 木瓜50克 六轴子20 牛膝50克

【用法】 上药浸于70%酒精6000毫升中备用，使用时将上述药液涂搽患处，日2~3次。

【主治】 腰痛，腰部软组织损伤。

【来源】 中医杂志 1986; (6): 9

方三

【组成】 荆芥、防风、乳香、没药、白胡椒各60克 艾绒500克

【用法】 将上药研末拌匀，分为20份为1料，分别置于直径约3厘米的铁筒内捣实，以备应用。制一有手柄的灸具，高3厘米的双层铁片套圈，外圈直径8厘米，内圈7.5厘米，双圈底部夹持一层牛皮纸，然后将生姜泥、面粉、上等食醋适量调至糊状，均匀推于纸上，约0.2厘米厚，然后放1份药炷点燃，置患处上方，灸至焮红、微汗，能忍受为度。手持灸具之柄随温度的高低以调节与患处距离，每晚睡前1次，每次40~50分钟，连续20次为1疗程，未愈，间歇10日进行下一个疗程。

【主治】 腰痛，腰椎骨关节炎。

【来源】 中医杂志 1985; (1): 23

癃 闭

癃闭是指小便点滴难出，甚则闭塞不通的一种疾患。病变部位在膀胱和尿道。主要病机是三焦气化不利。而三焦之气化，又靠肺、脾、肾三脏来维持。若肺失肃降，脾失转输，肾失温煦均可引起癃闭。本病相当于西医学之各种原因引起的尿潴留及无尿症。如神经性尿闭。前列腺疾病、尿路肿瘤、尿道狭窄、尿路损伤，以及肾功能衰竭尿毒症期等。

方一

【组成】 食盐少量 葱白2根

【用法】 先将食盐炒熟，待凉后将食盐为细末，纳脐孔，上置葱饼（葱白捣成泥状，压成约0.3厘米厚），然后将艾炷压在葱饼上，锥尖朝上点燃，使火力由小到大慢慢深入，至脐部有灼热感时，再换灸1壮。待热气入腹难忍即有尿意。小便自解后，可隔日再灸1~2壮，以巩固疗效。

【主治】 癃闭，产后尿潴留。

【来源】 中西医结合杂志 1985，5（11）：692

方二

【组成】 独头蒜1个 梔子3枚 食盐少许

【用法】 将上药共捣烂，摊于纸或纱布上，敷贴脐上，每日或隔日1换。

【主治】 癃闭（湿热蕴积所致）。

【来源】 实用中医内科学

方三

【组成】 大黄 煅龙骨 煅牡蛎各15~30克 槐米30克 肉桂10克 锡类散2支

【用法】 上药加水，浓煎取汁150~200毫升，加锡类散2支，药温37~38℃，保留灌肠，每天1次，每次1~2小时，14天为1疗程，间歇1~2周，再进行下1个疗程或连续治疗4~8个疗程。

【主治】 癰闭。

【来源】 江苏中医杂志 1986；7（9）：11

方四

【组成】 紫草30克 红花10克 穿山甲10克 乳香、没药各5克

【用法】 上药共研细末，过120目筛，加凡士林调成糊状。患者取胸膝位，以1：1000新洁尔灭消毒会阴部3次，术者戴无菌手套。取药3~5克，捏为圆团状，蘸少许石蜡油或植物油，以食指将药团自肛门轻轻塞入，送至直肠前壁，涂于前列腺附近。嘱病人俯卧位休息30分钟，每日或隔日1次，10次为1疗程，疗程间隔3~5天。

【主治】 癰闭（前列腺增生肿大，排尿困难）。

【来源】 中级医刊 1988；23（2）：51

方五

【组成】 玄参、麦冬、车前子（包）各30克 鲜生地60~120克 鲜茅根250~500克 大黄（后下）15~30克 元明粉（冲）12~15克 通草9克 知母、黄柏各12克

【用法】 上药加水，煎药取汁200毫升，保留灌肠40～60分钟，每日2～4次。

【主治】 癃闭。若治流行性出血热少尿期，疗程可根据病情而定。治疗49例，痊愈41例，好转2例，总有效率为87.8%。

【来源】 中医杂志 1986；27（10）：32

方六

【组成】 党参30克 当归15克 川芎9克 柴胡9克
升麻9克

【用法】 上药熬膏贴肛门。

【主治】 老人、产妇气陷尿闭。

【来源】 中医外治法类编

淋 证

淋证以小便频数，急涩，淋漓不尽，小腹拘急，痛引脐中为特征。多由肾虚，膀胱湿热，气化失司，水道不利所致。根据主要临床表现，又可分为热淋、血淋、气淋、石淋、膏淋等。本病常见于西医学泌尿系感染，如尿道炎、膀胱炎、肾盂肾炎、膀胱结核、泌尿系结石、癌肿等。

方一

【组成】 虎杖根100克 乳香15克 琥珀10克 元寸1克

【用法】 以鲜虎杖根和诸药混合，捣融如膏（如无鲜虎杖根，可取干的粉碎为末，过筛，用葱白和诸药捣融如膏）

用)。选神阙、膀胱俞、肾俞穴。用时，取药膏如枣大一块，放于胶布中间，贴敷穴位，每穴1张，每日换药1次。

【主治】 淋病（石淋、血淋）。

【来源】 穴位贴药疗法

方二

【组成】 白豆蔻30克 砂仁30克 胡椒30克 川椒30克

【用法】 将上药共研为末，装入小布袋内，以好烧酒熬极滚热，冲入布袋内，即刻套上龟头熏之。每日1次。

【主治】 淋病。

【注意】 注意不要烫伤局部皮肤，热度以患者能耐受为度，初起热证勿用。

【来源】 理渝骈文

方三

【组成】 地榆250克

【用法】 地榆加水5000毫升浸泡30分钟，上锅煎煮20分钟，去渣，乘热沐浴腰腹部，每日1次。

【主治】 淋病（砂石淋）。

【来源】 理渝骈文

尿 频

尿频又称小便频数，是指小便次数增多，1日10次以上而言。多因肾气不固，或肺脾气虚，或肝郁气滞，引起水液排泄失常。可见于西医之神经性尿频，尿崩症等。

方一

【组成】 艾炷数壮

【用法】 主穴关元，配以中极、肾俞、太溪。先在关元穴铺一层大盐粒，然后将艾炷置盐上燃烧。每次灸3~5壮，每日1次，7次为1疗程，间隔3日再行第2疗程。也可用艾条施温和灸，以病人感到既发热又舒服为宜。

【主治】 尿频。治疗33例，有效率100%。

【来源】 针灸学报 1989；5（4）：32

方二

【组成】 丁香、肉桂各等份

【用法】 焙干上药，共研细末，过筛；黄酒或水调成膏，纱布包裹敷神阙穴。外用胶布固定。若寒甚，丁香、肉桂比例改为1：3。每日1次，5日为1疗程。

【主治】 尿频。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 5%当归注射液

【用法】 取单侧肾俞穴，每穴注入5%当归液0.3~0.5毫升，每日1次。

【主治】 尿频。半数病人3次内治愈。

【来源】 浙江中医杂志 1982；（1）：33

阳 痿

阳痿是男性生殖器痿弱不用、不能勃起，或勃起不坚、不能完成正常房事的一种病症。多因情志不遂、肝胆湿热、肾气亏虚等，致使宗筋弛纵所引起，是男科的常见病之一。多属现代医学中枢神经失调所致的性神经衰弱，与神经官能症往往互为因果，与精神因素关系密切。若某些慢性疾病表现以阳痿为主者，可参本病内容辨证论治。

方一

【组成】 五味子、炙黄芪各6克 硫磺3克 穿山甲2片 大附子1个 麝香0.3克

【用法】 上药共研为细末，放入250毫升白酒中，微火煮干，取出捣烂成膏。最后取麝香放入脐中，将上药膏敷在上面，包扎固定。3天取下，10天敷药一次。

【主治】 阳痿。虚证。

方二

【组成】 巴戟天10克 淫羊藿10克 阳起石12克 金樱子10克 葫芦巴10克 柴胡6克

【用法】 将上诸药共研细面，装入细长如带的布袋中，将药带系于小腹部。5~7天换药一次，3~5次为1疗程，一般都在1疗程中有效，继续第2疗程可痊愈。

【主治】 阳痿。

【注意】 治疗时，如出现局部皮肤瘙痒、疱疹等症状时，应暂停使用。在用此法治疗的同时，可配合其他疗法治疗。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 黑附子45克 穿山甲3克 硫磺6克 麝香0.1~0.3克

【用法】 把附子、穿山甲、硫磺、研为细末，过筛、加酒150毫升，调成稀糊状，倒入锅内，用文武火煎至酒干，取出药末，加麝香末调均匀，再研一遍，装瓶贮备。临证，取药末适量，用酒或蜜调成膏，制成黄豆大的药丸，放于纱布上，敷神阙穴，外用胶布固定。1~2日，换药1次，连敷10天为1疗程。

【主治】 阳痿。命门火衰。

【来源】 中医外治法集要

方四

【组成】 风仙花子15克 蟾酥3克 麝香0.1克 葱白适量

【用法】 风仙花子研为细末，过筛，加蟾酥、麝香调均匀，再研一遍，加大葱适量捣为丸，如黄豆大，阴干。临睡前，用药丸3粒，白酒化开，涂于神阙、曲骨、阴茎头上。每晚1次，直至病愈。

【主治】 阳痿。虚证，尤其命门火衰型。

【来源】 中医外治法集要

方五

【组成】 淫羊藿10克 巴戟天10克 芦巴子10克 泽泻10克 茯神12克 石菖蒲10克 柴胡10克 肉桂6克 附

子6克 山萸肉12克

【用法】 上药共研细末，将药粉铺在小腹部，然后盖上数层白布，再洒上酒和醋，点燃即可。若病人感觉热痛时，即用棉垫轻压，将火熄灭，约在1分钟后把热水袋放棉垫上保温，约隔4~5分钟，再加醋与酒精少许，重新点火，如此重复5~6次。每天治疗1次，10次为1疗程，病愈即停。

【主治】 阳痿。

【注意】 治疗前一切所用之物准备齐全，包括压火用的棉垫。嘱咐患者不要紧张与术者密切配合，治疗时不可乱动。术者要按照规程操作。酒精浓度不要很大，用量不要太多。以免发生烧伤及火灾。皮肤过敏者可改其它疗法。

【来源】 中国民间疗法

方六

【组成】 蛇床子末15克 菟丝子末15克

【用法】 上药和如泥涂曲骨穴，1日5次。

【主治】 阳痿。

【来源】 中医外治法类编

阳 强

阳强是指阴茎易举，甚则久举不衰的病症，又称强中或强阳不倒。

方一

【组成】 皮硝适量

【用法】 将皮硝敷在两手劳宫穴上，合掌，皮硝自然

熔化即可。每日2次。

【主治】 阳强（虚火妄动型）。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方二

【组成】 水蛭9条 麝香0.3克 苏合香1克

【用法】 先将水蛭阴干研末，再加入麝香、苏合香共研细末，入蜜少许调和成膏。用此膏擦左脚心（涌泉穴），阴茎即萎软。

【主治】 阳强。

【来源】 中国民间疗法

遗 精

遗精是不因性交而精液自行泄出的病证。多因肾虚封藏不固，或君相火旺、湿热下扰精室所致。其中有梦而遗精的名为“梦遗”；无梦而遗精，甚至清醒时精液流出的名为“滑精”，此为遗精的两种轻重不同的证候。现代医学的神经衰弱、前列腺炎、精囊炎等引起的遗精证，一般参考本病辨证施治。

方一

【组成】 当归、白芍、川芎、生地、麦冬、知母、黄柏、黄连、栀子、炮姜、山萸、煅牡蛎各等份

【用法】 上药烘干，共研细末，过筛，装瓶备用。用时取药粉适量，开水调成膏，纱布包裹，敷神阙穴（脐中）外，胶布固定。每日1次，一般5~10次可见效。

【主治】 遗精（阴虚火旺）。

【来源】 理渝骈文

方二

【组成】 葱子、韭菜子、肉桂、附子 各10克 龙骨4克 麝香0.3克

【用法】 将上药烘干，共研细末，过筛装瓶贮备。用时取药粉适量，开水调成膏，纱布包裹，敷神阙穴（脐中），外用胶布固定。每日1次，一般5~10次可见效。

【主治】 遗精（肾气不固）。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 金樱子10克 生牡蛎15克 芡实20克 莲子肉10克 益智仁10克 白蒺藜15克

【用法】 将诸药共研细面，装入细长如带的布袋中，用制成的药带，缚于腰间及下腹部。3~5天换药1次，5~7次为1疗程。每疗程不间断。

【主治】 遗精。

【注意】 若有皮肤过敏史，或局部有疱疹者，应暂停使用本法。同时也可配合其他疗法。

【来源】 中国民间疗法

方四

【组成】 川楝子、龙骨、牡蛎各等份

【用法】 将三味药等份，共研细末，掺入灸疮膏中，敷贴脐下1寸3分。每日贴1次，10次为1疗程（灸疮膏：川芎、当归、赤芍、白芷各60克，细辛、发团各30克，麻油

熬，铅粉收而成膏）。

【主治】 遗精（湿热型）。

【来源】 理瀹骈文

方五

【组成】 硫磺18克 母丁香15克 麝香3克 朱砂3克
独头蒜2枚

【用法】 前二味烘干，研为细末，过筛与麝香调匀，独蒜头共捣为丸如豆大，朱砂为衣，每用1丸，纳脐眼上，外贴红煨膏。在贴药处以热水袋加温，或红、紫外线照射，1次20～30分钟，1日1～2次（红煨膏：川椒90克，韭子、蛇床子、附子、肉桂各30克，独蒜500克，香油1000克，浸药熬，黄丹收而成）。

【主治】 遗精（尤其是虚证较明显者）。

【来源】 中医外治法类编

方六

【组成】 菟丝子、白茯苓、韭菜子、龙骨各等份

【用法】 上药麻油熬，黄丹收，贴肾俞。

【主治】 遗精。

【来源】 中医外治法类编

方七

【组成】 葱子、韭菜子、附子、肉桂、丝瓜仁各90克

【用法】 上药麻油熬、松香收，煨龙骨6克，麝香1分搅，狗皮摊贴气海穴。

【主治】 遗精。

阳 缩

阳缩，是以突然起病，阴茎内缩，伴少腹拘急、痛疼剧烈为特征的一种男科病。多因寒凝肝脉所致。古人多将阳缩、阴缩并称。由于妇女在某些特定条件下也可发生外阴及乳房内缩，故本篇以“阳缩”为名，以资区别。

方一

【组成】 大葱250克 生姜40克 胡椒15克 硫磺30克

【用法】 先将生姜、胡椒、硫磺研成细末，再与切碎的大葱共捣。敷于神阙及脐下丹田穴，其上再加热敷。

【主法】 阳缩（肾阳衰微型）。

【注意】 救治本病时，应当积极配合其它方法。

【来源】 俞穴敷药疗法

方二

【组成】 白胡椒3克 大蒜1头 食盐5克 冷米饭1团

【用法】 将上药共捣成泥，作饼敷于肚脐上，1小时后取下。每日1次。

【主治】 阳缩。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 生姜1块

【用法】 将生姜一端削尖，以纸包裹四层，水中浸湿，然后放在火灰中煨烤，待纸干后取出，去纸乘热以煨姜之尖端蘸上植物油插入肛门，生殖器即出。

【主治】 寒型阳缩。

【注意】 煨姜温度要适中。

【来源】 中医外治法

方四

【组成】 老姜60克

【用法】 捣碎，热酒敷肚脐下3寸（丹田穴）。

【主治】 阳缩。

【来源】 古今名方

自 汗

自汗是由于阴阳失调、营卫不和而致，临床以时时汗出，动则益甚为特征的一种病证。自汗，也可作为症状而伴见于其他疾病的过程中，在治疗原发病的基础上，也可参照本篇辨证论治。西医植物神经功能紊乱、甲亢及风湿热见自汗诸症时，可按自汗辨证施治。

方一

【组成】 五倍子、郁金各等份 蜂蜜适量

【用法】 将上药混合研为末，加入蜂蜜调和成膏，取适量药膏分别敷贴于涌泉、灵墟、神阙穴，盖以纱布，胶布固定，每日换药1次，7~10天为1疗程。

【主治】 自汗。

【来源】 穴位贴药疗法

方二

【组成】 郁金20克

【用法】 将郁金研成细末，临睡时，以蜜调涂两乳头上。

【主治】 自汗。

【来源】 中医外治法

方三

【组成】 五倍子20克

【用法】 上药研成细末，用洁净水调成糊状敷于脐窝，盖以纱布，胶布固定即可。

【主治】 自汗。

【来源】 本草纲目

方四

【组成】 旧蒲扇灰适量 滑石粉适量

【用法】 旧蒲扇烧灰和滑石粉扑在胸腹部。

【主治】 自汗。

【来源】 验方新编

方五

【组成】 五倍子

【用法】 五倍子末以津调或加枯矾涂脐上。

【主治】 自汗。

【来源】 中医外治法类编

盗 汗

盗汗是指因阴阳失调，腠理开阖异常而引起以睡中汗出，醒来即止为特征的一种病证。西医的植物神经功能紊乱、甲亢、结核病及风湿热见盗汗的，可按盗汗辨证施治。

方一

【组成】 郁金20克

【用法】 郁金研成细末，临床时用蜜调和涂于两乳头上。

【主治】 盗汗。

【来源】 濒湖集验方

方二

【组成】 五倍子10克

【用法】 上药研为细末，洁净水调成糊状，敷于脐窝，盖以纱布，胶布固定。每日换药1次。

【主治】 盗汗。

【来源】 本草纲目

方三

【组成】 五倍子15克 朱砂0.3克

【用法】 上药共研为细末，洁净水调成糊状，敷于脐窝，盖以纱布，胶布固定。每日换药1次。

【主治】 盗汗。

【来源】 河南省秘验单方集锦

麻 木

麻木是指由于经脉阻滞不利或经脉肌肤失荣而引起以人体四肢、肌肤的一种异常感觉为特征的病证。“麻”是指四肢肌肤有如虫行的感觉，“木”是指皮肤无痛痒知觉，按之不知、掐之不觉，临床常将其一并称为“麻木”。西医的多发性神经炎、皮神经炎、颈椎病及脑动脉硬化等见麻木者，可按麻木辨证施治。

方一

【组成】 马钱子粉1克 樟脑粉0.3克 膏药脂4克

【用法】 将上药加热调匀后涂于7×7平方厘米纱布上备用。用时将膏药烘软，贴在患侧耳垂前面神经干区域，4天换药1次，其间停止其它疗法。

【主治】 麻木，周围性面神经麻痹。

【来源】 江苏中医 1988；9（6）：31

方二

【组成】 斑蝥粉0.2克

【用法】 将斑蝥粉用清水调成膏，然后贴在病侧太阳穴处，局部发泡后刺破揩干渗出液，间隔2~3天再贴，直至痊愈。

【主治】 麻木。

【注意】 刺破水泡时要注意无菌操作。

【来源】 穴敷疗法聚镜

方三

【组成】 薄荷、艾叶、荆芥、前胡各15克

【用法】 将上4味药物加水1500毫升煎煮，药水煮沸后头面部用布遮盖，让热气熏患侧面部10分钟左右，汗出为止。待水降温后再用药水洗患侧头面部3分钟，每晚睡前1次。

【主治】 麻木，面神经麻痹。

【来源】 陕西中医 1988；（6）：36

方四

【组成】 鹅不食草10份 冰片1份

【用法】 加适量凉开水浸泡鹅不食草，使药透水尽，再加入冰片共研成稠膏状，装入瓶内备用。使用时用三层消毒纱布包裹少许塞入病侧鼻腔，24小时更换1次。

【主治】 麻木，面神经麻痹。

【来源】 中医杂志 1986；（4）：26

痹 证

痹证是因感受风寒湿热之邪引起的以肢体关节疼痛、酸楚、麻木、重着以及活动障碍为主要症状的病证。临床上具有渐进性或反复发作的特点。其病机主要是气血痹阻不通，筋脉关节失于濡养所致。与西医的风湿热、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、坐骨神经痛、骨质增生性疾病相类似。

方一

【组成】 荆芥100克 防风100克 苏叶50克 麻黄40

克 羌活100克 独活100克 秦艽60克 苍耳子50克 干姜100克 地龙80克 伸筋草40克 菖蒲根500克 葱白300克 细辛30克 苍术100克 川芎80克 白芷40克

【用法】 将上药置于锅中煎煮，并使其温度保持在45~55℃之间。以熏蒸患者的病变部位，每次可蒸0.5~1小时，7日为1疗程，一般均治疗2~3次，蒸时以大汗淋漓为度。

【主治】 痹证。

【注意】 熏蒸时为防止虚脱，可同时饮用糖水，并测血压、脉搏，蒸后需避风2~3日。凡孕妇或兼发热以及伴有高血压，肺心病者忌用。

【来源】 安徽医学 1988；（3）：50

方二

【组成】 桑枝500克 海桐皮60克 豨薟草100克 海风藤200克 络石藤200克 忍冬藤60克 鸡血藤60克

【用法】 诸药共研细末，纱布包扎好，加水煎煮，过滤去渣，乘热洗浴患肢。每日1次，每次约1小时，10日为1疗程。

【主治】 痹证（热痹证）。

【注意】 有皮肤溃疡、过敏者禁用，治疗热痹时，药液温度不宜太高，温凉为度。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 二乌各10克 茅术1克 当归10克 鸡血藤10克 独活6克 牛膝10克 木瓜12克 川芎12克 郁金6

克 生香附10克 细辛3克

【用法】 将上药放入3000毫升水中煮30~40分钟，用煎好的药乘热熏患部，以后将药汁倒出，用干净毛巾蘸药汁热敷患部。如此反复2~3次，每日早晚各1次，5~10天为1疗程。

【主治】 痹证。

【注意】 发烧病人及患热证皮肤发痒者，不宜使用。热敷前，尤其是直接热敷者，医生要用手试药液热度，避免烫伤皮肤。

【来源】 中医外治法

方四

【组成】 麻油240毫升 黄蜡75克 松香30克 黄丹30克 铜绿6克 轻粉3克 制乳没各9克

【用法】 先将麻油熬滚加黄蜡化开，次入松香，再下黄丹。与其它药研末加入，搅匀成膏备用。用时将膏薄摊患部，外加绷带固定。每日1次，5~7日为1疗程。

【主治】 痹证。

【注意】 皮肤过敏、溃疡者禁用，本方药物毒性大，勿口服。

【来源】 中国膏药学。

方六

【组成】 生川乌15克 生草乌15克 马钱子10克 酒白芍20克 透骨草15克 细辛10克 莪术15克 制乳没各15克 制南星12克 威灵仙15克 桑寄生15克 仙灵脾15克 皂刺15克

【用法】 根据辨证结果选定方药，视病患部位，面积大小按比例处方，选择合适的熏浴器具，将诸药研粗末，装入布袋内，用清水浸泡1小时左右，文火煎30分钟以上，先熏洗，再用药渣袋趁热外熨患部，将患病部位浸泡在药液中，要略加活动，幅度可逐渐增大，以利血脉的流行。每次熏浴热熨半小时，每天治疗1~2次，每剂药可使用2天。一般7~10天为1疗程。

【主治】 痹证。

【加减】 行痹加防风、羌活、独活；痛痹加桂枝、附子、海风藤；着痹加炒苍术、川朴、豨莶草、路路通、海桐皮；热痹加忍冬藤、络石藤、生地、黄柏等。

【注意】 药液及药渣袋的温度以患者能耐受为度，每次所用药液凉后可加热使用3~4次。皮肤破溃者禁用。

【来源】 北京中医 1988；（3）：45

方七

【组成】 川乌、附子、羌活、细辛、川芎、肉桂、川椒各30克

【用法】 上药醋拌湿布包，烘熨患处。

【主治】 风湿性关节炎

【来源】 中医外治法类编。

方八

【组成】 樟脑100克 雄黄10克 朱砂、冰片各5克
穿杨箭、一枝蒿、牙皂、细辛各2克 麝香0.3克

【用法】 将药分别研末，过筛（麝香除外），捻成一团，再用筷子在团球中心插一孔，将麝香放入，再捻成团，

炼紧成球备用。凡属表浅患部，如疥疮等，将球点燃明火闪疗之。痛于肌里者，将球点燃后再吹灭明火，随之于患部压灸之。重复做两次。

【主治】 痹证。

【注意】 每次只能灸压2次，过多则灼伤皮肤，体温在38℃以上者禁用。

【来源】 古今名方

虚 劳

虚劳又称虚损，是以脏腑亏损、气血阴阳不足为主要病机的多种慢性衰弱证候的总称。凡禀赋薄弱，素体不足，后天失养，烦劳过度，房事不节，大病失养及瘀血内结、新血不生者引起的虚损证均为虚劳。现代医学中的多种慢性或消耗性疾病，晚期均属本证范畴。

方一

【组成】 川乌、乳香、没药、续断各15克 明雄10克 朱砂15克 元寸0.5克

【用法】 诸药除元寸另研外，其余诸药混合粉碎为末，过筛。先取元寸三分之一，放入穴内，再取药末15克，撒布元寸上面，盖以槐皮，上放预制的艾绒炷，点燃灸之，至病人腹中作响，大便下涎物为止，2天1次。灸后只服米汤，食白粥，饮少量黄酒，以助药力，至愈为止。

【主治】 虚劳。

【来源】 穴位贴药疗法

方二

【组成】 黄柏末或附子末

【用法】 黄柏末以白水调，涂脐下，凡火盛不能用寒凉可用附子末以津调涂涌泉穴，引火归源。

【主治】 虚劳。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 五灵脂24克（生用） 青盐15克（生用）
乳香3克 没药3克 夜明砂6克（微炒） 地鼠粪9克（微炒）
葱头干者3克 木通9克 麝香少许

【用法】 上药为细末，水和莜面作圆圈，置脐上，将前药末以2钱放于脐内，用槐皮剪钱，放于药上，以艾灸之，每岁1壮。

【主治】 虚劳，气血虚衰。

【来源】 中国灸法集萃

方四

【组成】 五灵脂、白芥子、白鸽粪各30克 大蒜（去皮）30克 生甘草12克 元寸1克 白凤仙花连根叶1株 猪脊筋100克 醋适量

【用法】 先将醋放入锅内加热，入元寸融化，再将五灵脂、白鸽粪、白芥子、生甘草混合粉碎过筛，和猪脊筋、白凤仙花、大蒜、醋放在一起，捣融成膏。取药膏如蚕豆大，贴于肺俞、脾俞、肾俞、盲俞，覆以纱布，胶布固定，2天换药1次，半月1疗程，休息3天，再继续贴用。

【主治】 虚劳（肺肾阴虚）。

【来源】 穴位贴药疗法

红斑性肢痛病

红斑性肢痛病为一少见的阵发性血管扩张性疾病，多发生于手足，尤以两足为多见，以灼痛、潮红、发热、皮温升高为特征。本病多发生于中年以上人群，男女均可发生，预后不佳。

方一

【组成】 盐200克

【用法】 用1桶热水将盐化开，用热盐水泡脚，每晚1次，每次20分钟，3日为1疗程。

【主治】 红斑性肢痛。有效率92%。

【来源】 湖南中医杂志 1987；3（5）：24

方二

【组成】 罂撈藤50克

【用法】 罂撈藤为大戟科植物，取其鲜者，捣烂，敷于痛处，每日1次，3~5日为1疗程。

【主治】 红斑性肢痛。

【来源】 中医杂志 1985；26（4）：52

方三

【组成】 豨莶草30克 桂枝12克 归尾12克 大黄15克 蕲艾叶12克 防风12克 苍术12克 生姜皮15克

【用法】 上药煎汁，乘热浸洗患部，每次半小时，每日1次，5次为1疗程。

【主治】 红斑性肢痛。有效率98%。

【来源】 中医杂志 1988；（10）：57

方四

【组成】 茜草、大黄、大青叶各30克 红花、乳香、没药各18克

【用法】 上药煎汤，待凉后浸洗患肢30分钟，每日2~4次，5日为1疗程。

【主治】 红斑性肢痛病。治疗9例，经治6~28日后，痊愈7例，显效2例，总有效率100%。

【来源】 江苏中医 1988；9（11）：12

雷诺氏病

雷诺氏病是血管神经功能紊乱所引起的肢端小动脉痉挛性疾病，又称“肢端动脉痉挛病”。以阵发性四肢肢端（主要是手指）对称的间歇发作与紫绀为其临床特点，常为情绪激动或受寒所诱发。属中医“痹证”范畴。

方一

【组成】 川乌、草乌、细辛、三棱各25克 透骨草、肉桂、红花、苏木、桃仁各50克

【用法】 上方煎汤，先熏后洗，每次共20分钟，每日1剂，每日1次，10~15日为1疗程。

【主治】 雷诺氏病。观察9例，有效率100%。

【注意】 同时加内服中药，并可配合针灸治疗。

【来源】 浙江中医杂志 1988；23（2）：66

方二

【组成】 当归60克 白芷15克 紫草6克 甘草36克
血竭、轻粉各12克 白蜡60克 香油500克

【用治】 将前4味药放入香油内浸泡5天，再煎，过滤去渣，继加热熬油，至滴水成珠，再把血竭、白蜡放入油内溶化后，入轻粉搅成膏，加纱布条经高压蒸气灭菌后而成。每日或隔日换药1次，至愈为止。

【主治】 雷诺氏病，湿热型、脓液少的溃疡。

【注意】 同时加内服中药。

【来源】 浙江中医杂志 1988；23（2）：66

方三

【组成】 煅象皮、乳香、没药各6克 煅石膏12克
珍珠0.9克 血竭9克 冰片3克

【用法】 上药共研细末，扑于患肢坏疽处，每日1~2次，至愈合为止。

【主治】 雷诺氏病。

【来源】 浙江中医杂志 1988；23（2）：66

痛 风

痛风是嘌呤代谢障碍性疾病，血清尿酸水平升高，尿酸盐以结晶形式沉积于组织，表现有急、慢性痛风性关节炎，关节畸形，痛风石，肾结石和肾脏病变。本病95%是男性，

中年发病。女性多在绝经期后发病，症状轻。临床经历无症状期、急性关节炎期和慢性关节炎期。类似中医之痹证、历节病等。

方一

【组成】 樟木屑1斗半

【用法】 将上药置大桶内，桶边放一瓦登，以急流水一担煮沸泡之，桶内安一矮凳子，令人坐桶边，放足在桶内，以草围其外，勿令汤气入眼。每日洗足1次，每次1小时，7~10次为1疗程。

【主治】 痛风。

【来源】 证治准绳

方二

【组成】 当归20克 川芎60克 牛膝60克 红花30克 苏木100克 川断、狗脊、防风、独活、羌活各100克 乌蛇60克 鸡血藤150克 制乳没各20克 血竭、儿茶各60克

【用法】 上药水煎液倒入温度适宜的洗澡水中，浴身，1日1次，15~30天为1疗程。

【主治】 痛风。关节疼痛者，有效率100%。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 马钱子、生半夏、艾叶各20克 红花15克 王不留行40克 大黄、海桐皮各30克 葱须3根

【用法】 上药煎汤2000毫升，置于桶内，以热气熏蒸患部，待药液变温后，浸洗患处，每日2次，7天为1疗程。

【主治】 痛风。有效率100%。

【来源】 中医杂志 1990；31（4）：40

方四

【组成】 川乌、草乌、全当归、白芷、桂皮各15克
红花10克 白酒500毫升

【用法】 将上药浸于白酒500毫升中，24小时后去渣取酒，再加入10瓶风油精，摇匀后装入500毫升输液瓶中备用，用时外涂患处，每日3次，10天为1疗程。

【主治】 痛风。关节疼痛者，有效率100%。

【来源】 中医杂志 1990；（1）：41

方五

【组成】 芙蓉叶 生大黄 赤小豆各等份

【用法】 上药共研细末，按4：6之比例加入凡士林，调和为膏，敷于患处，每日1次，10次为1疗程。

【主治】 痛风。治疗34例，临床治愈26例，显效8例，有效率100%。

【来源】 江苏中医 1988；9（9）：20

方六

【组成】 生南星10克 生半夏10克 生川乌10克 生草乌10克 生白附子10克 生狼毒10克

【用法】 上药干燥，混合粉碎成细粉，过100目筛，混匀即可。用时外敷。

【主治】 痛风。

【注意】 有大毒，禁内服。

【来源】 精选八百外用验方

方七

【组成】 白花蛇1条 全虫、僵蚕、川乌、细辛、川羌、皂角、南星各25克 白附子40克 豨薟草50克

【用法】 用香油250克将药炸枯去渣，再兑白淀粉，凉后入麝香10克调匀收膏。用时外敷患处。

【主治】 痛风。

【来源】 慈禧光绪医方选议

三叉神经痛

三叉神经痛是指面部三叉神经支配区域反复发生阵发性短暂性剧烈疼痛，但无感觉缺失和运动障碍的痛症。属中医学的头痛、偏头痛、面痛范畴。

方一

【组成】 川乌头12克 草乌头12克 川椒15克 生麻黄15克 生半夏15克 生南星15克 片姜黄30克

【用法】 上药共研细末浸泡少量酒精中，2日后取涂患处，疼痛发作时随时涂抹，缓解后每日3次。

【主治】 三叉神经痛（瘀血阻滞型）。

【来源】 北京中医 1986；（6）：58

方二

【组成】 生乌头（川、草乌均可） 生南星 生白附子各等份

【用法】 上药共研细末，过筛，每30克药粉用大蒜50克，鲜生姜15克捣如泥，纱布包好蒸热，熨阿是穴及与患病神经走向有关的俞穴，每日2~3次，每次20~25分钟。

【主治】 三叉神经痛（寒瘀阻滞）。

【来源】 中医外治法集要

高血压病

高血压是指体循环动脉血压高于140/90毫米汞柱（19/12千帕），临床以血压增高为主要表现的一种疾病。属中医“眩晕”、“头痛”的范畴。

方一

【组成】 胆汁制吴茱萸500克 龙胆草醇提取物6克 硫磺50克 醋制白矾100克 朱砂50克 环戊甲噻嗪0.175克。

【用法】 将上药混合研末，每次用药粉0.2克左右，倒入肚脐窝内，覆盖棉球，外用胶布固定，每周更换1次，1个月为1疗程。

【主治】 高血压病Ⅰ~Ⅱ期。共观察116~302例，总有效率77.5%~88.4%。

【来源】 新中医 1981；（3）：33

方二

【组成】 吴茱萸30克 川芎30克 白芷30克

【用法】 将上药研细末，过筛，取药末15克，以脱脂

棉薄裹如小球状，填入脐孔内，用手向下压紧，外以纱布覆盖，胶布固定。每日换药1次，10天为1疗程。

【主治】 高血压病。共观察29例，总有效率89.3%。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方三

【组成】 桃仁、杏仁各12克 栀子3克 胡椒7粒 糯米14粒 鸡蛋清适量

【用法】 将前5味药物共捣烂加1个鸡蛋清调成糊状，分3次用。于每晚临睡前敷贴于足心涌泉穴，晨起除去不用，每夜1次，每日敷一足，两足交替敷贴，6次为1疗程。

【主治】 高血压病。

【注意】 3天测量1次血压，敷药处皮肤出现青紫色无妨。

【来源】 湖北中医杂志 1983；（2）：31

方四

【组成】 钩藤20克 冰片少许

【用法】 钩藤剪碎，布包冰片少许，放入盆内并加温水浴脚，每次30~45分钟，早晚各1次，10日为1疗程。

【主治】 高血压病。观察50例，总有效率82%。

【来源】 辽宁中医杂志 1990；（6）：45

方五

【组成】 磁石、石决明、党参、黄芪、当归、桑枝、枳壳、乌药、蔓荆子、白蒺藜、白芍、炒杜仲、牛膝各6克 独活18克

【用法】 水煎取汁，液泡双脚，每日1次，每次1小时，10日为1疗程。

【主治】 高血压病。

【来源】 四川中医 1988；6（3）：23

方六

【组成】 茺蔚子10~15克 桑树皮10~15克 桑叶10~15克

【用法】 上药煎汤1500毫升，稍凉至不烫脚时，倒入盆中，把双脚放入盆内浸泡半小时，一般泡后30分钟开始降压。1小时作用最强，维持4~6小时；浸泡1~2次后血压即恢复正常。

【主治】 高血压病。共治30例，有效率100%。

【来源】 江苏中医杂志 1983；（5）：53

方七

【组成】 吴茱萸500克（胆汁制） 龙胆草醇提取物6克 硫磺50克 白矾100克（醋制） 朱砂50克 环戊甲噻嗪0.175克。

【用法】 混合研为极细末备用。用药前，先将患者脐部用温水洗擦干净，每次用药粉约0.2克倒入肚脐内，覆盖棉球，外用胶布固定。每周换1次。

【主治】 原发性高血压病。

【来源】 古今名方

面神经炎

面神经炎是颞骨内面神经管内段的面神经之急性非化脓性炎症，造成病侧面部肌肉瘫痪和口眼歪斜的一种急性周围神经疾病。中医学的“歪嘴风”、“口眼歪斜”、“面瘫”与之类似。

方一

【组成】 鲜鳝鱼血 乳香末适量

【用法】 上药拌匀备用。涂敷患侧地仓、颊车、下关、颧髎、大迎、巨髎等穴，也可涂患侧全面部，1日1次，连用5~15次。

【主治】 面神经炎。治疗56例，总有效率为96%。

【来源】 浙江中医杂志 1982；（1）：37

方二

【组成】 马钱子粉1克 樟脑粉0.3克 膏药脂4克

【用法】 上述药物加热调匀后涂于7×7平方厘米膏药布备用，用时将膏药烘软后贴在患侧耳垂前面神经干区域，4天换药1次，4次为1个疗程。

【主治】 面神经炎。治疗100例，总有效率为100%。

【来源】 江苏中医 1988；（6）：31

方三

【组成】 斑蝥1~2个 巴豆2~3粒 麝香0.02克 鲜柳枝头（带叶3~5片）1枝 鲜生姜5~10克

【用法】 以上药物共捣如泥，贴于患侧下关穴或太阳穴及颊车穴。当贴药处有灼痛感时，即将药物除去，起水泡后用消毒针尖刺破。每隔7~10日贴药1次，一般1~3次痊愈。

【主治】 面神经炎。治疗70例，总有效率为97.3%。

【来源】 新中医 1985；（5）：34

方四

【组成】 鹅不食草10份 冰片1份

【用法】 上药研为细末，过筛（如鲜品捣烂），加冰片（另研细）调拌均匀，以药粉适量，包于纱布内，塞患侧鼻中24小时去掉，左右交替塞，至病愈止。

【主治】 面神经炎。

【来源】 中医杂志 1986；（4）：18

方五

【组成】 蓖麻子（去皮）25克 冰片3克

【用法】 上药共捣成膏，外敷患处。

【主治】 面神经炎，口眼歪斜。

【来源】 慈禧太后医方选议

方六

【组成】 蓖麻子100克（去壳）、妇人头发1团（如鸡子大） 上官粉100克 麻油200克

【用法】 先将蓖麻子、头发放入油内，用文火煎熬，以榆条搅之，药枯去渣，再将油入锅内熬至起烟为度，离火，将官粉放入油内收膏即可，用时将药膏摊布或纸上如银元大，贴太阳穴、颊车穴、地仓穴三处，左歪贴右，右歪贴

左，正则急去之。

【主治】 3个月内的口眼歪斜。

【来源】 山东中医验方汇编

方七

【组成】 白附子、蝎尾各15克 僵蚕30克

【用法】 上药共研为末，酒调涂患处。

【主治】 中风口眼喎斜。

【来源】 中医外治法类编

面肌痉挛

面肌痉挛是由某些已知（情绪激动、精神紧张、疲劳、寒冷、谈话过多）或未知的原因而引发的面部肌肉抽搐。在三叉神经痛或面神经炎后期，亦可并发本病，可参考本篇治疗。

方一

【组成】 胆南星8克 雄黄3克 醋芫花50克 黄芪30克 白胡椒1克

【用法】 上药共研细末，用水调湿敷脐，每次用0.3克，每周换药1次，连用至愈。

【主治】 面肌痉挛。

【来源】 浙江中医杂志 1982；（3）：131

方二

【组成】 天麻 全虫 僵蚕 防风 白芷 羌活 芥

穗各等量

【用法】 将上述药物碾成极细末，瓶贮密封备用。临时用时先以75%医用酒精消毒脐窝皮肤，趁湿倒入药末填满脐孔，外以胶布固封，每天换药1次。10次为1疗程。

【主治】 面肌痉挛。

【来源】 清代宫廷医话

方三

【组成】 胆南星8克 雄黄3克 醋芫花7克 黄芪 30克

【用法】 上药烘干，共研为细末，过筛，再喷入胡椒挥发油0.5毫升，用药粉250毫克，加入马钱子总碱0.1毫克，调均匀，酒或水调成膏，纱布包裹，敷神阙穴。再覆盖塑料薄膜、纱布，胶布固定。2~7天换1次。

【主治】 面肌痉挛。

【来源】 中医外治法集要

坐骨神经痛

坐骨神经痛是由坐骨神经本身或其邻近组织的病变所引起。临床上有真性、假性坐骨神经痛之分。属中医学“痹证”范畴。

方一

【组成】 蟾酥膏（蟾酥、细辛、丁香、雪上一枝蒿等药）

【用法】 取肝俞、肾俞、腰阳关、环跳、风市、委

中、梁丘、阳陵泉、承山、悬钟等穴为主，配合局部压痛点，分别顺序贴药，5~7天更换1次，4次1疗程，最多4个疗程。

【主治】 坐骨神经痛。治疗1192例，总有效率95.97%。

【来源】 中成药研究 1985；（5）：20

方二

【组成】 附子、海螵各20克 肉桂、川牛膝、大活血羌活、海桐皮、防风、当归、赤芍、杜仲、川断、川芎、乳香、没药、透骨草各25克 川椒、红花各15克 血竭5克

【用法】 上药共为粗末，加入桃仁泥25克，细盐19克，黄酒800毫升，拌匀，装纱布袋中，每晚把药袋放锅内蒸半小时，取出垫上干毛巾，熨患处，每次半小时，每剂连用7天，或换药至愈。

【主治】 坐骨神经痛（寒邪偏盛）。

【来源】 黑龙江中医药 1982；（1）：44

方三

【组成】 鲜生姜自然汁500克，明亮水胶120克

【用法】 上药文火同熬成稀膏，摊涂布上，临用时将研细的肉桂、细辛末掺于膏药中，外敷环跳、委中、承山三穴，每日换1次，连用5日痛消病愈。

【主治】 坐骨神经痛，痛痹。

【来源】 浙江中医杂志 1988；（8）：372

蛲虫病

蛲虫病是蛲虫寄生于人体所致的一种寄生虫病。蛲虫病的流行极广，在儿童集体机构中更易传播，10岁以下儿童感染率最高。本病属于祖国医学的“虫积”、“虫疳”等病范畴。

方一

【组成】 使君子 雷丸各等份

【用法】 先将使君子仁炒微黄，和雷丸同研细，装瓶备用。同时按年龄每岁1克，早晚分服。最大量1天不超过20克，连服7天为1个疗程。如不愈，隔1周后再用第二疗程。

【主治】 蛲虫病。

【加减】 内服本方的同时可用百部30克、乌梅15克，加水300毫升煎到100毫升去渣，每晚保留灌肠，7天为1个疗程。

【来源】 陈树森医疗经验集萃

方二

【组成】 百部10克 苦楝皮10克 槟榔10克 鹤虱10克

【用法】 煎服。同时也可将上药共研细末，装入胶囊，每晚睡前纳入肛门，每次1个，连用1周。

【主治】 蛲虫病。

【来源】 百病良方

方三

【组成】 槟榔30克

【用法】 击碎后加水500毫升，浸泡1夜，浓煎1小时，空腹一次服，连服2~3天。

【主治】 绕虫病。

【来源】 百病良方

癌性疼痛

癌性疼痛，顾名思义，它是指由于各种癌症所引起的疼痛证。疼痛，作为大多数癌症所伴见的症状，往往程度剧烈，成为危害患者的主要因素之一，所以，在此将其单列为一项，寻求其外治的有效手段。本病中西病名相同。

方一

【组成】 穿山甲末100克 乳香、没药各20克 鸡矢藤挥发油0.5毫升 冰片少许 乙醇500毫升

【用法】 将乳香、没药浸入乙醇液中20天备用。穿山甲100克研末，喷入乳香、没药醇浸液70毫升，烘干，再加入鸡矢藤挥发油0.5毫升，冰片少许，食醋调敷脐部，5~7天换1次。

【主治】 肝癌疼痛。一般应用2天后疼痛减轻，有效率达100%。

【来源】 辽宁中医杂志 1980；（11）：40

方二

【组成】 琥珀、天南星、黄连、蟾酥、樟脑、冰片、斑蝥、马钱子、丁香、大茴香、石菖蒲、威灵仙、山奈等

【用法】 上药共研，贴于疼痛部位，每日换药1次，可连用10~20天。

【主治】 癌性疼痛。有效率100%。

【来源】 奇难杂症新编

方三

【组成】 朱砂、乳香、没药各15克 冰片30克 500毫升米酒

【用法】 将朱砂、乳香、没药、冰片捣碎后放入盛有500毫升米酒的瓶内，密封浸泡2天，经沉淀后取少量澄清液装入小瓶内待用。使用时，用棉签或毛笔蘸药水涂于痛处，搽药范围应比疼痛部位范围略大些，稍干后再重复，连续3~4遍。一般用药10~15分钟疼痛消失或明显缓解，维持2~4小时，不等疼痛再发，可连续使用，次数不限。

【主治】 癌性疼痛。治疗21例，有效率100%。

【来源】 新中医 1990；（3）：37

第三章 外 科

疔

疔是发生在皮肤浅表部位的急性化脓性炎症。临床上以色红，灼热而疼痛，突起根浅，肿热局限，脓出即愈为特点。俗称“疔子”、“火疔”，有的地方叫“白头老”。现代医学认为疔是发生在皮肤单个毛囊皮脂腺及汗腺的急性化脓性炎症。

方一

【组成】 苍耳子虫100条 冰片1克

【用法】 将8~10月份采到的活苍耳子虫放入芝麻油中浸泡窒息致死。将50毫升麻油中入冰片1克，苍耳子虫100克左右，7天后即可用。将苍耳子虫一条或半条放在疔肿红肿隆起处；也可将苍耳子虫研成糊状，放在疔肿表面；若有空隙用沾有苍耳子虫浸油的小棉球填满，使苍耳子虫能与疔肿紧密接触。1日换药1次，7天1疗程。

【主治】 耳鼻疔肿。

【来源】 中西医结合杂志 1986；6（1）：47

方二

【组成】 鲜马齿苋5份 青黛1份

【用法】 上药洗净，放入石臼中捣成糊状加入青黛1份，研匀即成，将药物外敷患处，厚度1厘米左右，用纱布包扎，1~2小时换药1次，致肿消为止。

【主治】 疖肿。

【来源】 中医杂志 1985；26（4）：63

方三

【组成】 巴豆6克 生姜10克 大黄6克 桂圆20克

【用法】 上药捣烂后调拌面粉，塞于鼻孔中，左右交替，1日4次，3天1疗程。

【主治】 疖肿初期。

【来源】 中国民间敷药疗法

方四

【组成】 芫花15克 川椒15克 黄柏30克

【用法】 上方共研细末，装纱布袋内加水2.5~3千克，煮沸30分钟，用软毛巾蘸汤焗溃局部，1日2次，10次1疗程。

【主治】 发际疮。

【来源】 疖肿的中医调治

方五

【组成】 马齿苋200克 蒲公英200克 如意草200克 白矾20克

【用法】 上药共碾细末，装纱布袋内，加水2500~3000毫升，煮沸30分钟。用时以软毛巾蘸汤焗洗，或焗洗后加热水浸浴。

【主治】 疔肿。

【来源】 赵炳南临床经验集

方六

【组成】 松香15克 没药15克 樟丹5克 麝香0.1克
蓖麻油适量

【用法】 将油加热，放入樟丹搅匀，待凉搅入上药粉备用，用时外敷患处。

【主治】 疮疡各期。

【来源】 精选八百外治验方

方七

【组成】 紫草100克 当归250克 生地250克 姜黄250克 黄柏250克 冰片25克 凡士林2500克

【用法】 用凡士林油炸紫草、当归、生地、姜黄、黄柏去渣，再将冰片研细撒入，调匀成膏。外用贴疮口，每日1换。

【主治】 一切疮疡。

【来源】 精选八百外治验方

红 丝 疔

红丝疔是由于疔痈疔疮或皮肤破伤或情志抑郁引起热毒蕴郁，火毒炽盛，气血凝滞而于皮肤显见红丝呈向心性走窜的一种疾病。多见于四肢。本病相当于西医的急性淋巴管炎。

方一

【组成】 巴蕉树干1500克 石菖蒲（根连叶）100克

【用法】 上药水煎，以热气熏患处，待药液变温后，以液洗患处，每日2次，3~5次为1疗程。

【主治】 红丝疔。有效率达100%。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 鲜蒲公英120克 雄黄6克 冰片少许

【用法】 蒲公英用冷开水洗净，捣成泥状，雄黄及冰片研极细末，与蒲公英泥混合均匀，即成蒲黄膏（此膏保存时间不宜超过24小时，最好随用随制）。使用时，将此膏摊于牛皮纸上，敷于患处，每天换药1~2，3~5天为1疗程。

【主治】 红丝疔，有效率达100%。

【来源】 上海中医药杂志 1965；（4）：21

方三

【组成】 雄黄15克 冰片3克 川军15克

【用法】 上药共研细末，凡士林适量，调成膏状，敷于红线发源处，1日换药2次，3~5日为1疗程。

【主治】 红丝疔。此法治疗18例，全部有效。

【来源】 赤脚医生杂志 1976；（12）：20

蛇头疔

蛇头疔是指生于手指末端，如蛇头肿胀的疔毒。本病的

发生内因是由于脏腑积热，外因是手部外伤感染毒邪，而致火毒积聚，气血凝滞为患。西医的脓性指头炎相当于本病。

方一

【组成】 黄连65克

【用法】 黄连加水2000毫升，煮沸3次，每次15分钟，冷却备用，不去渣，不加防腐剂。其溶液呈深暗黄色，澄清透明，约1800毫升左右。用时将药液置于瓷杯内，浸泡患指，药液以浸没全部病灶为度。浸泡3小时后拭干，外敷黄连纱条，消毒纱布包扎，胶布固定。1日1次，疗程一般5~10天。

【主治】 蛇头疔。治疗37例，治愈率100%。

【来源】 中因医结合杂志 1987；7（1）：41

方二

【组成】 葱白2寸左右 红糖6克

【用法】 两药共捣烂，涂敷料上，包裹患处。2日1次，一般3~5次即可愈。

【主治】 蛇头疔。

【来源】 辽宁中医杂志 1980；（12）：42

方三

【组成】 完整辣椒1个 桐油适量

【用法】 将辣椒去蒂、仁，倒入适量的油，套在患指（趾）上，松紧合适地固定椒皮囊口，使油不外溢。如椒皮干可涂少量桐油，以保持油润，至愈。疗程4~8天。

【主治】 蛇头疔。

【来源】 中医杂志 1982, (7): 63

方四

【组成】 蒲公英15克 野菊花15克

【用法】 将上药加水2000毫升, 煎汁约1000毫升, 每日用此药液湿敷患处3~4次, 每次半小时。疗程3~5天。

【主治】 蛇头疔。

【来源】 上海中医药杂志 1983, (3): 33

方五

【组成】 鲜白蔹适量 醋适量

【用法】 将鲜白蔹切成薄片, 放入醋中浸泡备用。用时取白蔹片贴患处。2日1换, 疗程6~10天。

【主治】 蛇头疔初期。

【来源】 安徽单验方选集

疽

疽的含义, 是气血为毒邪阻滞而不行的意思。所谓“疽”, 包括两种性质不同的疾病, 一种是初起有头的, 称为“有头疽”, 大多属于阳证; 另一种是初起无头的, 称为“无头疽”, 大多属于阴证。前者相当于西医的“痈”, 后者因其病发部位不同而与西医的病名不同, 如附骨疽相当于化脓性骨髓炎, 脱骨疽相当于血栓闭塞性脉管炎等等。

方一

【组成】 川乌、草乌、独活、羌活、白芷、细辛、防风、血竭各30克 乳香、没药、公丁香、母丁香、赤芍、桃仁各36克 红花、木鳖、草麻仁、白芨、自然铜各39克 铁吊竿60克 当归90克 川三七21克 甘草15克 枫胶12克 松香500克 麻油250克

【用法】 先将麻油煮滚，再加入松香、枫胶，俟溶化搅匀，将前药23味研末，入油内搅匀成膏，外贴患处。可解毒化痰、温经通络。

【主治】 脱疽。

【来源】 福建中医药 1964；（6）：10

方二

【组成】 露蜂房120克 公丁香60克 草拔60克 细辛60克 百草霜60克

【用法】 研末，贮瓷瓶内备用。同时，取末10克，太乙药肉90克，加乳香、没药各1.5克，烱化拌匀，摊膏敷贴。

【主治】 附骨疽毒，湿痰流注，乳疽及一切白色漫肿之阴性肿疡。

【注意】 本方功在温经通络，行血散结，非属寒性肿疡者不宜使用。

【来源】 上海中医药杂志 1957；（1）：24

方三

【组成】 紫荆皮150克 独活90克 白芷90克 赤芍60克 石菖蒲45克

【用法】 上药晒干，研为细末，葱酒调敷患处。

【主治】 痈疽发背，阴阳不和，冷热瘀凝者。

【来源】 新中医 1954；（10）：21

方四

【组成】 野芋根1只

【用法】 用醋摩如糊状，涂抹患处。

【主治】 脑后疽（又名口疽），根盘红肿，弥漫项后，热肿痛剧，甚则寒热，头部剧痛。脑后疽初起时，涂后即消散。

【来源】 上海中医药杂志 1955；（10）：10

方五

【组成】 黄连粉65克

【用法】 上药加水2000毫升，煮沸3次，每次15分钟，冷却备用。用时将药液置于瓷杯中，浸泡患指。药液以浸没全部病灶为度，每日1次，每次1~3小时，浸浴毕，可视情况进行常规换药，直用至痊愈。

【主治】 指骨骨髓炎，治愈率100%。

【来源】 中西医结合杂志 1985；5（10）：604

方六

【组成】 壁虎30份 冰片1份

【用法】 壁虎研极细末灭菌30分钟后，加冰片（研末），根据窦道的大小、深度，用生理盐水浸泡的纱布蘸药植入窦道，每日1次，40天为1疗程。

【主治】 慢性化脓性骨髓炎。总有效率达98%。

【注意】 首次引流时须做常规病灶清除术。

【来源】 中医杂志 1986; 27(9): 40~41。

方七

【组成】 中麻Ⅰ号5毫升或中麻Ⅱ号3毫升(均为上海中药一厂生产,每支含量2毫克)。

【用法】 上药任意一种,配用氯丙嗪12.5~25毫克,可肌注、静注或静点,每日或1~2日1次,依病情和耐受力可连用2~17次。

【主治】 重症血栓闭塞性脉管炎,总有效率达86.7%,主要能戒除患者对镇痛麻醉剂的依赖性,且能使患肢皮温升高,行走距离延长,肿胀消退,疮面愈合加速。

【注意】 中麻后待其自然清醒,若出现烦躁明显,可注射催醒剂1毫克(上海中药一厂生产,每支含1毫克)。

【来源】 中西医结合杂志 1987; 7(6): 331~334

方八

【组成】 蟾酥6克 雄黄9克 枯矾、寒水石、铜绿、乳香、没药、胆矾、麝香各3克 朱砂9克 轻粉1.5克 蜗牛21个

【用法】 上药除蟾酥、蜗牛外,各研细末,然后将蜗牛研烂,再用蟾酥和研,放入各药和匀为丸,如绿豆大。外用,米醋烊化涂敷患处。

【主治】 疽。

【来源】 外科正宗

方九

【组成】 草乌30克 川芎30克 当归40克 赤芍40克
白芷40克 连翘40克 白芨40克 乌药40克 官桂40克 木
鳖子40克 柏柳20克 桃桑枣20克 一方加苦参、皂角各25
克

【用法】 诸药共为散，用麻油1000克浸一宿，用火熬
枯去渣，再熬滴水成珠时入黄丹600克，再入乳香、没药各
20克，用时外敷患处。

【主治】 各种疮疡。

【来源】 寿世保元。

方十

【组成】 草乌（炒） 干姜（煨）各90克 赤芍、白
芷 南星（煨）各30克 肉桂15克

【用法】 共研细末，热酒调敷。

【主治】 阴疽。

【来源】 古今名方

方十一

【组成】 芙蓉叶、大黄、五倍子各50克 月黄、明矾
各15克 冰片、麝香各1.5克

【用法】 研细末，以醋调敷患处。

【主治】 附骨疽。

【来源】 中国医学大辞典

痈

痈是发生于皮肉间多个相邻的毛囊和皮脂腺的急性化脓性感染。临床以红肿灼热，剧痛，迅速扩散，边界不清为特点。多见于身体虚弱，贫血或糖尿病等患者。中医也称为癰。

方一

【组成】 生葱 蜜糖各适量

【用法】 上药适量（因病灶大小而定），将上药捣烂如泥状，外敷患处，用敷料或绷带固定，1日1次，病愈为止或10天1疗程。

【主治】 痈肿。

【来源】 中药贴敷疗法

方二

【组成】 鲜生姜 陈艾绒各适量

【用法】 取陈艾绒用手指捏成底径 0.6×0.8 平方厘米，高1~1.2厘米的圆锥形艾炷。另用鲜生姜切成如硬币厚的薄片，先用75%酒精棉球消毒患处四周，然后将姜片放在患处正中，用湿纸满覆患处，先干者即是当灸之处，上置艾炷，点火灸之。灼热痛甚者可再垫一姜片，每次约灸3~7壮（每灸3壮，更换姜片1次），以痛者灸至不知痛，不痛者灸之知痛为度。灸后用毫针挑去上面粟粒样大小的白头或灸起的水泡，再敷以药膏。起病1~3天者，一般灸治1~3次即愈。

【主治】 痈肿。

【注意】 颜面部或已成脓者不宜灸治。

【来源】 中医杂志 1982; 23 (5) : 22

方三

【组成】 黄芩6克

【用法】 将晒干的黄芩切碎,放入500毫升水中,煎开20分钟过滤。然后放入无菌纱条浸泡3天,即得黄芩纱条敷料。将患处用双氧水消毒后,敷上黄芩纱条,再覆以消毒纱布,用胶布固定,1日2次,2天1疗程。

【主治】 痈肿的切开引流。经观察1000余例,有化脓病灶者,换药2~3次均愈合。

【来源】 中药贴敷疗法

方四

【组成】 黄升 血竭 明雄 冰片

【用法】 上方按1:1:2:4的比例混合后研成细粉末,装瓶内消毒后备用,将创面或脓肿切开排脓,常规清洁创面脓液,将药粉均匀撒在创面上。如颈背部、肩背部痈疮脓液不易洗净,可将药粉直接撒在脓液上,以药粉完全覆盖创面为度。再行包扎,1日1次,脓液多可1日2次。病愈为止。

【主治】 痈肿切开引流者。

【来源】 中西医结合杂志 1989; 9 (1) : 78

方五

【组成】 生地、土木鳖、元参、赤芍、大黄、白芷、当归各25克 乳香、没药各10克 阿魏5克 轻粉7.5克 血余1团 肉桂12.5克 黄丹325克

【用法】 先将药用麻油500克浸3~7日，熬枯去渣下血余，每净油500克加黄丹325克，不住搅起白烟下阿魏，次下乳香、没药、轻粉，倾入水中搅成一块。外贴患处。

【主治】 痈疽。

【来源】 外科正宗

方六

【组成】 煅灵磁石、炒全蝎各4.5克 穿山甲9克 公丁香、母丁香(炒黑)各3克 炙蜈蚣6克 炒僵蚕2克 蜘蛛7只(炒炭)

【用法】 研细末，加麝香1.5克，牛黄0.6克，冰片3克，研为极细末，和匀。每用少许撒患处，外贴膏药或用纱布橡皮膏固定。

【主治】 痈疽肿毒。

【来源】 中医外科诊疗学

方七

【组成】 龙骨、赤石脂、儿茶、血竭、乳香、没药各5克 轻粉2.5克 冰片1克

【用法】 取麻油100克，入当归25克，煎枯去渣，后入龙骨、赤石、儿茶、血竭4味，再煎一沸，再入乳香、没药，后入黄丹25克，待冷入冰片，摊贴备用，外敷患处。

【主治】 痈疽。

【来源】 公选良方

方八

【组成】 金银花30克 野菊花、蒲公英、紫花地丁各15克 天葵子9克

【用法】 水煎服。药渣可捣烂敷患部。

【主治】 疮疡痈疽。

【加减】 热重，加黄连、连翘；肿甚，加防风、蝉蜕；血热毒盛，加赤芍、丹皮、生地；治乳痈，加瓜蒌皮、浙贝母、蒲公英等。

【注意】 阴疽忌用。

【来源】 古今名方

膝 疮

膝疮，俗称“老烂脚”，是指小腿下部内外膝溃烂不易收敛的疾病。多因饮食失节，内生湿热，火阻经络或经久站立、负重，损伤脾气，湿邪蕴留，气滞血瘀或禀赋不足，脾胃素虚，气血虚少，气行不畅，瘀血阻滞，复因抓破虫咬，破损染毒而发。本病相当于西医的慢性下肢溃疡。

方一

【组成】 鲜桑根白皮 生石膏粉 生桐油各适量

【用法】 三味共捣烂，摊贴患处，大小视疮面而定，以覆盖患处为度，用绷带固定，每天换1次，疗程3~12天。

【主治】 小腿溃疡。治疗25例，治愈率100%。

【来源】 浙江中医杂志 1988；6（23）：254

方二

【组成】 桉叶适量

【用法】 桉叶洗净，加水适量，煎2小时后去渣 浓缩成糊剂备用。治疗时先用艾叶水（一味艾叶水煎）洗涤疮面后，涂搽桉叶糊剂，用纱布包扎，隔日换药1次，疗程8~14天。

【主治】 下肢溃疡。治疗16例，总有效率93.75%。

【来源】 浙江中医杂志 1985；（1）：20

方三

【组成】 鲜枸杞根250克

【用法】 将鲜枸杞根洗净泥沙，加水3000毫升，煎熬成2000毫升药液，倾入桶内，乘热熏蒸疮面，药汁降温后，反复清洗疮面，每次熏洗半小时左右，冬季适当缩短。熏洗完毕，待患肢凉干后，用宽胶布粘贴，以肉眼看不到疮面为度。1日1次，冬季隔日1次。疗程15~30天。熏洗后有短暂麻痛不适，活动十几分钟自蹇。

【主治】 下肢溃疡。

【来源】 浙江中医杂志 1985；（1）：20

方四

【组成】 鸡蛋10只

【用法】 将鸡蛋煮熟后去白，蛋黄放入小铁锅中用文火炒煎至油出，挑出蛋黄，并投入数小块纱布拌均匀备用。清疮后用蛋黄油纱条薄贴溃疡面并包扎，1日1次，疗程10~30天。开始几天尚可用炒黄的蛋黄末适量与油纱条共敷之。

治疗期间抬高患肢，换药前用红外线照射15分钟。

【主治】 小腿溃疡。治疗22例，总有效率90.91%。

【来源】 浙江中医杂志 1985；（9）：402

方五

【组成】 黄丹100克 没药、儿茶、血竭、朱砂、樟脑、水银各5克 麝香、冰片各0.5克 黄蜡、水牛油、猪油各50克

【用法】 上药研末，先化蜡入油和匀，再入药末搅匀备用，外敷患处。

【主治】 疔疮。

【来源】 证治准绳

方六

【组成】 麻油、柏油各125克 贯仲15克 象皮2.5克 血余一大团

【用法】 上药同煎发枯去渣，待滴水成珠时，下妙飞丹25克，再下朱砂、儿茶、轻粉、没药、川椒、樟脑各5克，乳香17.5克，血竭5克，共研细末搅匀，再下黄蜡12.5克，铅粉75克，熬膏备用，外敷患处。

【主治】 湿烂疔疮。

【来源】 公选良方

方七

【组成】 沥青50克 黄蜡、铜绿各10克 乳香、没药各5克

【用法】 将铜绿研细，香油调匀，将沥青、黄蜡入

内，加火化开后入铜绿、乳香、没药，备用。用时外敷患处。

【主治】 疔疮。

【来源】 卫生宝鉴

方八

【组成】 净轻粉25克 铅丹25克 真铜绿15克 炙乳香15克 炙没药15克（以上共为细末） 血余50克（净水洗清后晒干） 蜂蜡50克 香油100克

【用法】 取大勺一把，将香油100克倒入勺内，用炭火熔化。待开滚时，把血余缓缓倒入油中，并回旋搅拌。当血余炸至白丝状，油色变红时即捞。除去渣，将药锅离火，趁热撒下药末搅拌之。随把已切成小块的蜂蜡，边搅边入油内，待药油能滴水成珠，即可放置冷水中凝膏。用艾叶煎水或温开水洗净患处，敷本药膏适量。敷药后宜休息。一般7天左右即可收效。

【主治】 疔疮。

【注意】 治疗期间，忌食辛辣刺激食品，忌房事2~3月。

【来源】 古今名方

方九

【组成】 龙骨6克 乳香、没药各3克 血竭、轻粉各1.5克 阿魏0.6克 水飞净黄丹30克 生芝麻100克（捣末） 香油90克 冰片、麝香各0.3克

【用法】 前6味药共研细末，再以水飞净黄丹、生芝麻、香油共入锅内熬沸，即加入各药粉，临起锅时再加入冰

片、麝香搅匀，用甘草煮油纸两面，将药膏摊于其上。临用时以葱2条煎水，将疮面洗净，再用配合的内服药渣煎水洗疮口1次，后将膏药贴于患处。

【主治】 下肢顽面性溃疡。

【来源】 古今名方

褥 疮

褥疮为一种压迫性溃疡，是因局部长期受压，影响血液循环，致皮肤组织营养障碍，组织坏死。病变可累及皮肤、皮下组织，肌肉直至骨部，中医又称“席疮”。

方一

【组成】 当归30克 白芷12克 紫草6克 甘草18克 生地12克 象皮9克 轻粉6克 血竭花6克 五花龙骨9克

【用法】 取麻油500克煮沸后，将前6味药分别放入，以文火炸枯捞出，过滤后继用文火加热，再将后三味药研极细末过筛后加入文火之中搅匀，兑白蜡30克，凉后贴于纱布上，根据褥疮面大小外敷于疮面上。1日或隔日换药1次，1个月1疗程。

【主治】 褥疮。治疗80例，痊愈70例，好转9例，平均治愈时间24天，总有效率98.8%。

【来源】 中西医结合杂志 1987；7（1）：49

方二

【组成】 无花果树叶

【用法】 上药取适量，水煎后待汤冷，皮肤可耐受时

浸洗患处，1日2次，7天1疗程。

【主治】 褥疮。

【来源】 浙江中医杂志 1989；24（10）：477

方三

【组成】 干姜粉10克 生姜汁40毫升

【用法】 上药经高压灭菌后，取蛋清60毫升，生理盐水400毫升，和好搅匀，用纱布敷料在配好的溶液里浸泡后，取出敷于疮面，隔2~4小时换药1次或连续湿敷即可，10天1疗程。

【主治】 褥疮。

【来源】 新中医 1990；22（8）：18

丹 毒

丹毒多因血热内蕴，外染毒邪，或体表皮肤破伤，毒邪乘袭，外窜肌肤，内走营血而成。可发于身体任何部位，多见于腿胫、头面，如不根治，常可反复。本病中西医同名。

方一

【组成】 紫草片30克 黄连3克 冰片0.3克 茶油500克

【用法】 上药共研细末，用茶油调成糊状，外敷患处，每日2~3次，5~7天为1疗程。

【主治】 颜面丹毒。有效率100%。

【来源】 福建中医药 1985；16（5）：25

方二

【组成】 煅石膏30克 广丹1.5克 冰片0.3克

【用法】 上药共研细末，用麻油适量调成糊状，外敷患处，每日2~3次，5~7天为1疗程。

【主治】 下肢丹毒。有效率100%。

【来源】 福建中医药 1985；16（5）：25

方三

【组成】 鲜侧柏叶 鲜樟树叶 鲜松针各2两 生姜1两

【用法】 上药切碎煎汤，每晚乘热熏洗患肢，每日1次，7~10天为1疗程。

【主治】 丹毒已成大脚风者，有效率达89%。

【来源】 中医外科学

方四

【组成】 紫草25克 赤芍50克 当归100克 贯仲10克 升麻50克 白芷100克 荆芥穗25克 紫荆皮25克 草红花25克 儿茶25克 红曲25克 羌活25克 防风25克

【用法】 上药共研细末，用蜂蜜调和或荷叶煎水调和，外敷患处。

【主治】 慢性丹毒肿胀。

【来源】 赵炳南临床经验集

方五

【组成】 皮硝50克 樟丹50克 硫磺15克 雄精15克

轻粉5克

【用法】 上药共研细末，以油调和外敷患处。

【主治】 恶疮肿毒

【来源】 外科证治全书

烧 伤

烧伤是意外伤害之一。常因火焰、烈火、沸水、滚油等各种因素作用于人体而造成。确切地说应称为“灼热”。中医称为“烫火伤”或“火烧疮”。其伤害与预后都因烧伤面积和程度不同而有差异。

方一

【组成】 生石灰6克 生石膏6克 生大黄3克 生龙骨9克 梅片1.5克

【用法】 梅片另研细而，余药共研细，然后兑匀，以香油调成糊状，密封贮瓶备用。先用1%新洁尔灭溶液清创面，消毒擦干水分，将油膏敷于患处，1日2次，病愈为止。

【主治】 烧伤。

【注意】 面部烧伤敷用时，切忌将药物进入眼内。局部有水泡者常规消毒剪破水泡后再敷用。

【来源】 北京中医杂志 1983；（4）：64

方二

【组成】 生大黄30克 冰片15克 芝麻油100克

【用法】 先把大黄碾碎，过筛为细末，将芝麻油置小锅内，用文火烧沸，倒入大黄末搅拌，5分钟后取下，入冰

片。待凉装瓶备用。伤口以1%新洁尔灭消毒，剪去大水泡和剥脱皮肤，用生理盐水冲洗，湿棉球轻轻拭去伤面水分，再用干净毛笔搅匀药液，涂搽患处，4小时1次，致痂皮坚硬干燥时停止。

【主治】 烧伤初期未感染的Ⅰ～Ⅱ度或小面积Ⅲ度烧伤。

【注意】 焦痂溶解或痂下感染者忌用，创面不可包扎，以利干燥。

【来源】 中医杂志 1987；22（12）：41

方三

【组成】 黄柏5份 榆树皮10份 酸枣树皮2.5份

【用法】 将上药研成粗末，用80%酒精浸泡48～72小时，滤出备用。使用喉头喷雾器直接喷于伤口上，有水泡用消毒针挑破，每日喷2～3次，喷后待干再反复喷几次。用药后一般3～7天结痂，7～12天结痂脱落，疗程最短7天，最长17天。

【主治】 感染较重的伤口。治疗141例，治愈率达97.7%。

【来源】 中西医结合杂志 1986；5（6）：372

方四

【组成】 黄柏面50克 黄芩面50克 凡士林400克

【用法】 将上药调匀成膏备用。直接涂于皮肤上，或用软膏摊在纱布上，敷于患处。或加其他药粉作为软膏基质。

【主治】 烧伤。

【来源】 赵炳南临床经验集

方五

【组成】 紫草25克 黄连末10克 蜂蜡50克 豆油500克

【用法】 将豆油熬开放入紫草，枯后去渣，加入药末搅匀备用。用时涂于患处，每日1次。

【主治】 烧伤。

【来源】 精选八百外用验方

方六

【组成】 生地榆面30克 乳香粉20克 凡士林200克

【用法】 上药调匀成膏，涂纱布上外贴，或制成油纱条外用。

【主治】 I、II度烧伤。

【来源】 赵炳南临床经验集

方七

【组成】 紫草、黄柏各21克 制乳香、制没药各30克 白芷、丹皮、寒水石、生大黄各45克 当归60克 生地90克 芝麻油2500克 黄蜡500克

【用法】 除黄蜡外，将芝麻油与上药同煎熬至药性出，过滤去渣，将黄蜡切碎，渗入药油内，搅匀成膏。用时将药膏涂于消毒纱布上贴敷创面，包扎宜厚些，每天或隔天换1次。

【主治】 水、火烧伤，创面感染。

【来源】 新医药杂志 1976；（8）：20

方八

【组成】 苍术、黄柏、防己、木瓜、延胡索、郁金各30克 白芨60克 煅石膏粉、煅炉甘石粉各250克 麻油1000克

【用法】 将前七味浸于麻油24小时后，熬煎至焦为度，去渣后继续加热至滴水成珠，再加煅石膏、炉甘石粉，调匀，继续加热2~2.5小时，冷却后即成。

【主治】 中、小面积烧伤。

【来源】 创伤处理和更换敷料

方九

【组成】 麻油200克 罂粟花15朵（无花以壳代）

【用法】 罂粟花浸油内煎枯滤清，下白蜡15克，后下轻粉10克，搅匀备用。用时外敷患处。

【主治】 烧伤。

【来源】 外科正宗

瘰 病

瘰，俗称大脖子病，是中医学对颈前喉结两侧肿大疾病的总称，相当于西医甲状腺肿大的一类疾病。多因正气虚弱、外邪侵入，加入郁怒忧思过度，肝失条达，脾失健运致使气滞血瘀、湿痰凝聚于颈前而成瘰。或与生活地区水质有关。根据瘰的病因病理、临床表现、形态性质的不同，辨证分为气瘰、肉瘰、石瘰、筋瘰、血瘰五种。

方一

【组成】 华南胡椒全植株2份 野菊花叶1份

【用法】 上药同捣烂后加少许食盐再捣匀，按肿瘤大小取适量，隔水蒸热，待温度适中时敷患处，敷药宜稍厚，外用纱布固定。每天换药1次。本法亦可将药晒干磨成粉末，贮备候用，用时加一般咸度的热盐水调成水膏温敷。一般用药7天肿瘤可开始缩小，再继续用至二十余天，肿瘤基本消散。

【主治】 肉瘰气郁痰聚，郁久化火。

【注意】 一般敷药后局部有灼热感觉，如难于忍受，可暂时解开片刻后再敷上，可防止发生皮炎。本法治疗时同时服用消瘰汤。

【来源】 新中医 1980；（1）：7

方二

【组成】 五倍子（量不拘多少）

【用法】 上药放入砂锅内炒黄，冷却后研成末，晚上睡觉用米醋调成膏状敷于患处，次晨洗，7次为1疗程。

【主治】 瘰病气郁痰聚或郁久化火。

【来源】 四川中医 1989；（3）：25

方三

【组成】 威灵仙31克 冰片10克 当归20克 红花15克 川芎15克 丹参15克

电透器械用四川无线电系工厂（TJ）多用诊疗机电透组，电源为9伏（1号电池三对）。常用低频波60～300次/分钟。

【用法】 上药以75%酒精1500毫升浸泡5天，过滤即成。电透时以小棉球蘸取威灵仙、冰片活血化瘀浸液夹于两极铜夹上，然后在太冲、合谷、太渊、足三里、人迎、天应俞穴电透。一般5~20分钟左右，个别慢性病可延长至30分钟。15次为1疗程。

【主治】 瘰病气滞血瘀。

【注意】 电透时，先打开电源开关，再调好频率，输入电疗强度：由小到大、由弱到强。实证，电压宜大，时间稍长；虚证，电疗强度宜小，时间宜短。

【来源】 四川中医 1983；（5）：63

方四

【组成】 甘草（量自定） 芫花 大戟 甘遂等份

【用法】 上方甘草煎膏，以笔涂患部四围，3次后另用芫花、大戟、甘遂等份。研末醋调，另用笔涂患之中心，勿近甘草。次日缩小，复以甘草膏涂其中，将芫花、大戟、甘遂末涂其外，二药俱不可相近。日日互涂，自然缩愈。

【主治】 瘰病气郁痰聚。

【来源】 外科证治全书

胆 囊 炎

胆囊炎有急、慢性之分。它可以是原发的，即不伴有胆囊结石；也可以是继发的，即继胆囊结石而后发生胆囊炎。急性胆囊炎是由于胆囊管阻塞和细菌侵袭而引起的胆囊炎症，其临床特征为右上腹阵发性绞痛，伴有明显的腹肌强直和触痛。慢性胆囊炎常为急性胆囊炎的后遗症，或因胆固醇

的代谢紊乱而引起；它可以伴有或不伴有胆囊结石，临床上常有上腹部不适和消化不良，时或伴有急性发作。相当于中医学“胁痛”、“结胸”、“黄疸”等病证范围。

方一

【组成】 王不留行籽

【用法】 用耳穴探测仪检查，在耳穴压痛点上敷贴中药王不留行。每日或隔日1换，10次为1疗程。

【主治】 胆区疼痛。

【来源】 中医外科学

方二

【组成】 栀子10克 生军10克 芒硝10克 冰片1克 乳香3克

【用法】 上药共为细粉，为1次量。加蓖麻油30毫升，75%酒精10毫升，蜂蜜适量，调为糊状，敷于胆囊区。每天1次，每次可保持8~12小时，用至腹痛疼痛缓解而不拒按为止。一般外敷即觉舒适，数分钟后疼痛即开始减轻，在30~60分钟内疼痛减轻更为显著。

【主治】 肝胆湿热所致右胁上腹疼痛。

【注意】 本散外敷后，如使用较久，少数病人局部皮肤可起红色皮疹作痒，停药即可逐渐消失，一般不必作特殊处理。

【来源】 山东中医杂志 1984；（1）：22~23

方三

【组成】 大承气汤 或地胆头 穿心莲 银花藤

【用法】 上药任选一种，水煎约200毫升，温度以常人手背能耐受为宜。令病人取左侧卧位，抬高床尾，应用小号导尿管插入至乙状结肠为好（约30厘米），高位保留灌肠。灌肠高度以离床60厘米，每分钟50滴为宜。每日1次，7~10日1疗程。

【主治】 湿热型胆囊炎。

【来源】 新中医 1980；（4）：34~36

胆 石 症

胆石症是由于胆道内存在结石引起的症状，为胆道系统中最常见的病变。包括胆囊结石，胆总管结石及肝内胆管结石。在中医学中，属“结胸发黄”、“黄疸”、“胁痛”、“腹痛”等病证的范畴。

方一

【组成】 王不留行籽

【用法】 取耳穴胰、胆、肝、脾、胃、食道、贲门、内分泌、皮质下、交感、神门等。将王不留行粒放置在一块 0.6×0.8 平方厘米见方的橡皮胶中央，上述耳穴（单侧）分别各贴置一块，隔1~2天后撕去，贴另一耳穴，反复交替。每顿饭后用手轻轻揉按各穴，共20分钟左右，以加强刺激。治疗期间每天中午食脂肪餐，可吃油煎鸡蛋两个或其他高脂肪、高蛋白饮食。同时配服胆道排石汤：金钱草30~60克，茵陈20~30克，郁金10克，柴胡10~15克，枳壳10~15克，栀子10克，大黄6~10克（后下），甘草5克。每日煎服1剂。

取耳穴肝、胆、胰、耳迷根穴，每穴放1粒王不留行籽，

并在由胃、食道、口、三焦三穴连成的连线上，每条线放3粒王不留行籽，用胶布固定。每日早、中、晚饭后20分钟，用手在压籽的耳穴上依次按压20分钟。每3天换新籽1次，6次为1疗程。使用此法，不必配服胆道排石汤，一般也不必服硫酸镁。便秘严重者可配合服用33%硫酸镁20毫升，1日3次。或加用耳“便秘穴”。治疗期间可以吃高脂肪、高蛋白食物，以增加胆汁分泌，配合耳压法排石。

【主治】 胆石症。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 磁珠

【用法】 用0.5厘米见方的胶布固定磁珠（直径2毫米）在所取的耳穴上，取穴为肝、胆、胃、神门、交感、耳迷根、目。另外，有发热者加耳尖，便秘者加直肠下端。取穴方法参照《耳针》（南京部队某部耳针编写小组。耳针。上海人民出版社，1972年）及《耳针歌诀》（周志杰。耳针歌诀。陕西科学技术出版社，1985）两书定位取穴。嘱患者每日餐后即自行按压耳穴上的磁珠10~15分钟。用磁力治疗仪（由上海市空军第一医院研制）的磁头，直接刺激胆囊体表投影区（以B超定位为准），每次30分钟，隔日1次，同时两耳穴交替换珠，10次为1疗程。在治疗期间，配合食猪蹄、煎蛋等高脂食物，旨在促进其胆汁分泌、胆囊收缩、胆管扩张，以利胆石排出。并嘱患者淘洗大便，发现结石送医生鉴别。总疗程为30次，治疗结束后作B超复查，详细记录患者在治疗时的症状变化及排石情况。

【主治】 胆石症。

【来源】 辽宁中医杂志 1989, 13(12): 17~18

颈淋巴结核

颈淋巴结核指颈部结核性淋巴结炎。临床以淋巴结肿大，成串珠状，可动无疼痛为特点。多见于儿童及青年。相当于中医学之“瘰癧”。俗称“痄子颈”。

方一

【组成】 黄连20克 黄柏20克 煅石膏30克

【用法】 上药研细过100目筛，混匀装入容器备用。用时取药粉适量，用食醋（陈醋更好）调糊状，敷于患处及窦道内（敷药前彻底清创引流1~2天，以后每次换药也作清洗），加盖敷料即可。如渗出物多则调干糊，反之调稀糊，1~2天换药1次（视分泌物情况），连用至愈。平均治21天。

【主治】 已破溃的瘰癧。治2640例，治愈率达97.6%。总有效率100%。愈后3~5年内随访无复发。

【注意】 未破溃者可切开清除干酪样物质后直接用药，表浅瘰、创面新鲜、年老体弱者可免清创。

【来源】 人民军医 1988, (5): 30

方二

【组成】 当归15克 蜈蚣8条 地龙8条 檀香30克 广丹15克 明雄20克 轻粉10克 血竭8克 铜绿9克 桃仁30克 蓖麻仁50克

【用法】 先将胡桃仁、蓖麻仁入石臼中捣如泥，入檀香打匀，再入其余8味研为细面兑入，并加适量菜油，捣数

千捶成膏，装瓶备用，每次8克，摊布贴患处，3天换1次，3个月1疗程。

【主治】 颈淋巴结核已破溃者。治疗30例，痊愈27例，好转3例，总有效率100%。

【来源】 国医论坛 1990；5（23）：33

方三

【组成】 虎耳草30克 芭蕉根12克 猪苦胆1个 芥菜花20克

【用法】 将上药捣烂取汁，外涂搽患处，1日2次，1个月1疗程。

【主治】 颈淋巴结核后期。

【来源】 中国民间草药方

方四

【组成】 蟾酥、白胡椒、巴豆各15克 砒霜22克 红核11枚（去核） 葱白24克

【用法】 将蟾酥、白胡椒、巴豆、砒霜分别研粉和匀，入大枣、葱白共捣，制成400丸，晾干备用。取药丸10粒，用2层纱布包好，两端用线扎紧，一段留线约10厘米，将扎好的药丸慢慢塞入患侧鼻道，留线用胶布固定于鼻翼旁，每次塞8~10小时，2周1疗程。

【主治】 颈淋巴结核。治疗33例，治愈31例，总有效率达94%。

【来源】 中药贴敷疗法

方五

【组成】 轻粉、红粉、琥珀、血竭各15克 乳香75克
青黛15克 黄连50克 蜂蜡150克 香油500克 煅珍珠面
0.5克

【用法】 以上药物前8味共研细末待用，将香油置于火上见数开后，加入蜂蜡搅匀，离火冷却再加药粉，搅匀成膏。直接涂在疮面部位。

【主治】 淋巴结核。

【注意】 对汞过敏者慎用。

【来源】 赵炳南临床经验集

方六

【组成】 轻粉、红粉、琥珀粉、乳香粉、血竭粉各9克
煅珍珠粉 冰片各0.9克 蜂蜡30克 香油120克

【用法】 将油烧滚，加入蜂蜡，使其完全熔化，离火，然后将前5种药粉徐徐入油内溶匀，将要冷却时再兑入冰片、珍珠搅拌均匀成膏。贴敷患处。

【主治】 淋巴结核。

【注意】 对汞过敏者禁用。

【来源】 古今名方

方七

【组成】 海螵蛸100克 鸡内金100克 甲珠100克
儿茶50克 血竭100克 梅片150克 白芷50克 当归50克
象皮50克 乳香50克 没药50克 龙骨50克 申姜50克 珍珠5克 白蜡400克 麻油3000克

【用法】 先将麻油加热放入白蜡后溶化，候凉再将上药研细面撒入油内，后加入梅片成膏状。外用贴患处，每日换药1次。

【主治】 瘰癧溃破。

【来源】 精选八百外治验方

方八

【组成】 甘遂、南星、半夏各30克 麻黄、大戟、僵蚕各12克 白芥子15克 藤黄18克 朴硝21克

【用法】 前3味麻油熬，然后下后6味，黄丹收，贴患处。

【主治】 痰核。

【来源】 中医外治法类编

方九

【组成】 南星10克 银朱、血竭、硝石各15克 轻粉、乳香各10克 猫头骨1具 石炭50克

【用法】 上药共研细末。用时取药末适量，以陈醋调敷。

【主治】 瘰癧痰核结块，不分新久，但未溃破者。

【来源】 外科正宗

直肠脱垂

直肠脱垂是指直肠、肛管和乙状结肠下段的粘膜层或全层脱出于肛门外的疾病。常因小儿、老人体弱，妇女产后，久病体虚，久痢久泄，素患痔疾致直肠粘膜下层组织和肛门

括约肌松弛或直肠发育缺陷及支持组织松弛无力而发病。属于中医的“脱肛”、“截肠”等病证范畴。

方一

【组成】 蝉蜕适量

【用法】 将蝉蜕烘干研极细末，瓶装备用。用1%白矾水洗净脱肛部分，涂以香油，再涂上蝉蜕粉，缓缓将脱肛还纳，1日1次，疗程23~56日。

【主治】 小儿脱肛。治疗30例，治愈率100%。

【来源】 中成药研究 1989；（1）：20

方二

【组成】 鳖头适量

【用法】 将鳖头洗净焙干研细末过筛，高压消毒装瓶封闭备用，应用时让患儿便毕坐浴，取适量（约1枚鳖头的量）调香油制成糊状敷于肛门上，胶布简单固定，严重者应以手托送回或用提肛带托起。每日1次，10~15日1疗程，一般1疗程，必要时2~3个疗程。同时也可用鳖头粉每日0.5克~1克，分3次口服。

【主治】 小儿脱肛。治疗10例，总有效率达100%。

【来源】 中西医结合杂志 1989；（1）：20

方三

【组成】 石榴皮90克 五倍子30克 明矾15克

【用法】 将上药加水1000毫升，用文火煎煮30分钟，滤去药渣，趁热先熏后洗，同时将脱出的部分轻轻托上，每日早晚各1次，一般5~10天愈。

【主治】 脱肛。

【来源】 新医药杂志 1976; (1): 47

方四

【组成】 老枣树皮6克 石榴皮6克 明矾4.5克

【用法】 将上药加水500毫升煎至300毫升，待药液微温时，用脱脂棉蘸药液轻轻擦洗脱出部分，每日2~3次，疗程10~25天。

【主治】 脱肛。治疗30例，治愈率80%。

【来源】 新中医 1984; (4): 34

方五

【组成】 五倍子36克 地榆30克 土黄连30克

【用法】 上药水煎待药液温时坐浴，1日1次，1次20分钟，疗程15~30天。

【主治】 直肠脱垂。

【来源】 广西卫生 1975; (3): 60

方六

【组成】 新鲜苦叶苗根60~80克

【用法】 将苦叶苗根洗净，置锅内加水500毫升文火煎至200毫升左右，去渣，继续熬水收膏，随即摊于白布上薄贴于患儿囟门。视患儿年龄，布块可剪成直径为5~7厘米的圆形。贴前剪去患儿囟门处长发，洗净污垢。3日换药1次，7次为1疗程。

【主治】 小儿脱肛。

【来源】 赤脚医生杂志 1976; (10): 21

痔 疮

痔是指直肠末端粘膜下和肛管皮下的静脉丛发生扩大曲张所形成的柔软静脉团。临床根据症状不同分“内痔”、“外痔”、“混合痔”。临床以便血、疼痛肿胀为特点。中医也称为痔。

方一

【组成】 田螺3个 地龙20克 芙蓉叶12克 石菖蒲3克

【用法】 将药物研细末，调拌蜂蜜和鸡蛋清，外敷贴患处。1日1次。3天1疗程。

【主治】 分痔。

【来源】 中国民间草药方

方二

【组成】 麝香2克 牛黄2克 龙脑5克 珍珠2克 炉甘石10克 羊毛脂100克

【用法】 上药均研极细末，与油性基质混匀，制成油膏后密封备用。用时涂擦肛门，1日2次，10天1疗程。

【主治】 外痔发炎，Ⅰ～Ⅱ期内痔。

【来源】 中医杂志 1984；25（9）：52

方三

【组成】 生杉树根500克

【用法】 上药加水1500克，煎至1000克左右，将药水

倒入盆内，待水温降至40℃左右时坐浴。1日2~3次，每次10分钟。

【主治】 外痔和混合痔。

【来源】 新中医 1984；（7）：23

方四

【组成】 无花果树叶50克

【用法】 上药水煎，待温度适宜，皮肤可耐受时再浸洗患处，1日2次，7天1疗程。

【主治】 痔疮。

【来源】 浙江中医杂志 1989；24（10）：477

方五

【组成】 枯矾、黄蜡各50克

【用法】 将上药和匀做成药条，纳入孔肉深处管化脓出，再上生肌软膏。

【主治】 痔瘻。

【来源】 验方研究参考资料

方六

【组成】 藜芦、大黄、黄连各25克 川楝子14枚 桃仁14枚 巴豆4枚 蓖麻子4枚 猪脂1000克

【用法】 同煎三沸去渣，外敷患处。

【主治】 痔疮。

【来源】 外台秘要

血栓闭塞性脉管炎

血栓闭塞性脉管炎是指周围血管的慢性闭塞性炎症病变。病变可累及四肢的中小动脉和静脉，以下肢为多见。属于中医学“脱疽”、“脱痈”范畴。

方一

【组成】 生石膏250克

【用法】 上药研细末，用桐油100毫升，调成糊状均匀敷于患处包扎，1日1次，10次为1疗程。

【主治】 血栓闭塞性脉管炎。

【来源】 上海中医药杂志 1984；（2）：23

方二

【组成】 桂枝、附片、伸筋草、苦参各15克

【用法】 上药用水煎后趁热浸洗患肢，1日2次，10天为1疗程。

【主治】 寒湿阻络型脉管炎。

【来源】 中西医结合杂志 1986；9（6）：563

方三

【组成】 红矾、水银、麝香各2克 轻粉3克 乳香15克 没药15克 白芷15克 锡适量

【用法】 将白芷等植物药烘干，过120目筛。用坩锅将锡溶化后入水银，冷却后用钢锉锉成细末，与红矾、轻粉、乳香、没药、麝香一并研细末，与植物类混匀备用。同

时取药5克，加艾绒适量，制成直径1厘米，长10厘米药卷，局部消毒，点燃药卷置溃疡面下方约3厘米处，进行烟熏，熏后溃疡面上留有的黑色烟尘不必去掉。常规包扎，1日1次。每次用药1支，7次为1疗程。疗程间隔7日。

【主治】 脱疽坏死期已破溃者。

【注意】 本熏药中含有一些有毒药物，每次熏治时间及疗程不宜过长，以免中毒。

【来源】 辽宁中医杂志 1989；13（5）：16

方四

【组成】 苏木30克 红花15克 银花30克 蒲公英30克 芒硝15克 当归30克 葱胡30克 桑枝30克 明乳香15克 明没药15克

【用法】 上药共为细末，加水2500～3000毫升，煎汤去渣，熏洗患处，每日1～2次，每次90分钟。

【主治】 浅静脉炎初期。

【来源】 精选八百外治验方

方五

【组成】 桑枝30克 芒硝30克 苦参30克 红花15克 苏木30克 当归30克 透骨草30克

【用法】 上药为粗末，加水2500～3000毫升，煎汤去渣，熏洗患处。每日1～2次，每次30分钟左右。

【主治】 深静脉炎，肿胀甚者。

【加减】 若患肢红肿者，加蒲公英、地丁；若患肢紫暗发凉者，去苦参加桂枝、艾叶。

【来源】 精选八百外治验方

方六

【组成】 附子、干姜、桂枝、当归、花椒、赤芍、细辛、麻黄、红花各30克 毛皮树根120克

【用法】 放大锅内，加水10碗，去渣煎至5碗，洗患处。

【主治】 脉管炎。

【来源】 张八卦外科新编

关节脓肿

本病属中医流注范围，发病多见于儿童。现代医学认为本病是化脓性细菌所引起的关节内感染化脓。常见致病菌多为金黄色葡萄球菌、肺炎球菌、大肠杆菌等，感染途径多为血行性感染所致，少数由邻近软组织感染蔓延或局部直接继发感染造成。

方一

【组成】 夏枯草30克 公英60克 地丁40克 金银花30克 丹皮15克 黄连12克 白芷15克 黄芪20克

【用法】 水煎外洗，每日熏洗1~2次，5~7次为1疗程。

【主治】 关节脓肿已化脓者。有效率达98%。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 大黄、黄柏、姜黄、白芷各250克 南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各100克 天花粉500克

【用法】 上药共研细末，取适量用白酒调敷患处，每日1次，5~7次为1疗程。

【主治】 关节脓肿初起。有效率达97%。

【来源】 中医外科学

方三

【组成】 玄参、白芷、归身、肉桂、赤芍、大黄、生地、土鳖虫各6克 阿魏1克 轻粉1.2克 柳槐枝各100段 血余3克 东丹120克 乳香1.5克 没药1.5克 麻油2500克

【用法】 除东丹外，将余药用油煎，熬至药枯，滤去渣滓，再加入东丹（一般每500克油加东丹20克），充分搅匀成膏。同时将膏摊于牛皮纸上，随疮口大小贴于患处，每日1次，3~5次为1疗程。

【主治】 关节脓肿。有效率达100%。

【来源】 中医外科学

腱鞘炎

腱鞘炎是一种腱鞘损伤的疾病。常发生于腕及手指等部位，多见于青壮年。本病临床主要表现为病变局部皮肤微红、轻度肿胀疼痛，患肢活动受限等。若发于肘部者，用力握拳及作前臂旋转动作时，肱骨外上髁等处疼痛加剧；若发于手腕部，握拳外展时桡骨茎突部疼痛加剧，并向手部或前臂放散，拇指运动无力，且有摩擦感；若发生于手指部，当手指伸屈时，其疼痛可向腕部放散，常可发出弹响。在其病变局部，均可找到明显压痛点。本病属祖国医学“伤筋”、“筋痹”范畴。

方一

【组成】 白芥子（干品）

【用法】 选用白芥子（干品），捣成碎末，内放砂糖少许（约占药量的1/10），混匀加温水调成糊状贮瓶备用。贴药视发生炎症大小，取一块胶布，在中央剪一类似炎症范围大小的圆孔，把胶布贴在皮肤上，然后取适量药糊放入胶布孔内阿是穴上，上盖敷料，外用胶布固定。贴敷3~4小时，待局部有烧灼或蚁行感时，将药去掉，一般再过3个小时局部就有水泡。嘱病人保护好水泡。1~10天水泡吸收后，再次敷药治疗。

【主治】 腱鞘炎寒凝气滞血瘀型。

【注意】 水泡可以挑破，也可以不挑破，但要注意清洁，要用消毒纱布包扎，预防感染。如果一旦感染，可外涂或外敷消炎药物。

【来源】 四川中医 1988，（3）：47

方二

【组成】 川乌、草乌、艾叶、薄荷各20克 川芎、续断、当归、伸筋草、威灵仙、青风藤各30克 桂枝25克 姜黄30克

【用法】 上方加水3500毫升煎煮，开锅后再煎15~20分钟，然后将药液倒入盆内，先熏后浸洗，每次30分钟，1日2次。患部不易熏洗者，可将上药装入布袋内加少量水煎煮。开锅后15分钟，将布袋拿出待温和时置于患处热熨，药液用纱布蘸洗患部，每次15~20分钟，1日3次，5剂为1疗程。

【主治】 腱鞘炎寒凝血瘀型。

【来源】 中医杂志 1988；（1）：36

方三

【组成】 生栀子10克 生石膏30克 桃仁9克 红花12克 土鳖虫6克

【用法】 将上药研成末，用75%酒精浸湿，1小时后加适量的蓖麻油调成糊状备用。将备用的栀红膏涂于纱布敷贴患处，用胶布固定即可，隔日换药1次。一般1~2次可有明显疗效，5~6次痊愈。

【主治】 腱鞘炎。

【来源】 中西医结合杂志 1984；（4）7：437

腱鞘囊肿

腱鞘囊肿是指发生在关节或肌腱附近的囊肿。以腕关节背面和掌面为多见，足背、膝关节内外侧及腘窝内亦有发生。本病可为单囊或多囊，囊肿局部隆起，不与皮肤粘连，触诊边界光滑，呈饱胀感，囊内充满液体，而张力很大时，则显得坚硬，局部一般不痛或酸痛乏力。临床上多见于青壮年。本病属祖国医学“胶瘤”范畴。

方一

【组成】 红花3克 桃仁2克 山栀4克 川芎3克 赤芍3克 皂角3克 乳香3克 没药3克 三棱2克 莪术2克 桂枝2克 当归2克

【用法】 诸药晒干或焙干，研极细粉末过筛，视肿块

大小，取适当粉末，加少许白面粉及适量白酒，共调拌均匀呈稠浆糊状，将糊剂外敷于肿块上，以遮盖整个肿块；厚度约为1~2毫米为好，外加一小块塑料薄膜覆盖，再以绷带包扎固定，松紧适宜，以每晚换药1次为妥。

【主治】 腱鞘囊肿气滞血瘀湿聚型。

【来源】 中西医结合杂志 1987；（4）：246

方二

【组成】 芒硝60克 大蒜60克

【用法】 将大蒜剥皮后与芒硝加入钵内捣如泥备用。囊肿在腕关节及手背者，芒硝分量大于大蒜（6：4）发于肘窝处及膝关节者，芒硝分量小于大蒜（4：6）。同时先在囊肿皮肤处（约6×8平方厘米）涂上一层凡士林防止皮肤损害，然后将药敷囊肿处，用布包扎。如敷2~4小时后皮肤觉有发热灼痛者，去除敷药，抹去凡士林，隔半小时重新敷药。

【主治】 腱鞘囊肿塞凝痰湿瘀阻型。

【来源】 中医杂志 1985；（4）：75

方三

【组成】 徐长卿全草（干品）200克 50%酒精500毫升

【用法】 将徐长卿浸入50%酒精中，10天后即可使用。局部常规消毒，然后用不锈钢针穿刺囊肿如梅花样，力求把囊肿刺透，接着将徐长卿酊剂棉球湿敷，加盖敷料并用胶布固定，如果将要干燥则再加入药液，并经常使棉球保持一定湿度。隔日针刺囊肿1次，依上法湿敷，7日之内囊肿即可完

全消失，皮肤不留任何痕迹。

【主治】 腱鞘囊肿寒凝痰湿瘀阻型。

【来源】 广西中医药 1987；（6）：15

急性乳腺炎

急性乳腺炎是乳腺的急性化脓性感染疾病。临床上以乳腺局部有肿块疼痛，继而发热、发红为特征。脓肿形成则触之有波动感。发病后多伴有恶寒发热，周身不适，头痛等全身症状。属中医学“乳痈”范畴。多见于哺乳期妇女，以产后3~4周多发。

方一

【组成】 半夏6克 大葱10克 冰片3克

【用法】 半夏研细末，大葱捣如膏，调匀，分成7份，用塑料薄膜卷成长筒状，按压健侧鼻孔，以患侧鼻孔嗅嗅，或装瓶嗅之。如法将7份药膏嗅完为1次，约需30分钟左右。1日1次，3天1疗程。

【主治】 乳腺炎初期。山东省冠县药材公司门诊部治52例，痊愈，总有效率达100%。

【来源】 中医外治法集要

方二

【组成】 葱白15~250克

【用法】 葱白切细后加入适量热水，先熏后洗患侧乳房，每日3~5次，2天1疗程。

【主治】 乳腺炎初期。

【来源】 中医杂志 1983; 24(10), 15

方三

【组成】 五倍子

【用法】 取适量五倍子碾细过筛成粉末，加食用醋适量调和，稍置片刻即成深褐色粘膏，瓷罐贮存。用时将药摊于不吸水纸上，约2~3毫米厚，敷患处，外用绷带包扎，2~3天换药1次，10天为1疗程。

【主治】 非溃脓的乳腺炎。

【注意】 个别用药后偶有接触性皮炎，停药后即愈。

【用法】 中医杂志 1981; 22(6): 15

方四

【组成】 蒲公英30克 连翘12克 乳香8克

【用法】 上方研细末，调拌醋或白酒，炒热后外敷患处，每2~3小时换1次，3天1疗程。

【主治】 乳腺炎初期。

【来源】 民间中草药验方选

方五

【组成】 大黄、芥草、生姜各0.6克 伏龙肝32克

【用法】 上4药捣末，以醋调和涂乳房患处。1日3次，3天1疗程或病愈为止。

【主治】 乳腺炎初期。

【来源】 中药贴敷疗法

方六

【组成】 当归 瓜蒌 甘草 泽兰 青皮 乳香 没药 白芷 贝母各等份

【用法】 上方加醋、水各半，熬入半胶成膏涂患处。或加白芨可束根。

【主治】 乳腺炎初期。

【来源】 中医外治法类编

方七

【组成】 紫荆皮250克 独活150克 赤芍100克 菖蒲75克 白芷50克

【用法】 上药共研极细末，葱汤或热酒调和，同时外敷患处。

【主治】 乳腺炎初期。

【来源】 妇科病中医治疗法

方八

【组成】 威灵仙（干根）500克 白蜡250克 麻油1250克

【用法】 先将威灵仙干根放麻油内浸泡3天，用文武火煎熬至有枯焦气味，过滤去渣，乘热投入白蜡，再加热至蜡溶化，不断搅拌，待冷成膏备用。用时视其乳房炎症范围大小，厚涂软膏于纱布上，外敷固定即可。每日换药1次。

【主治】 急性乳腺炎早期。

【来源】 中药制剂汇编

乳腺增生病

乳腺增生病是一种乳腺组织增生性疾病，既非炎症，亦非肿瘤，是内分泌功能紊乱致使乳腺结构不正常的一种妇女常见病。本病属于中医学“乳癖”范围。

方一

【组成】 乳香、没药、黄柏、大黄各等份 冰片少量

【用法】 诸药共研细末，鸡蛋清调敷患处，外盖纱布，胶布固定。

【主治】 乳腺增生。

【来源】 陕西中医 1982；（6）：41

方二

【组成】 王不留行20克 白花蛇舌草20克 赤芍21克 土贝母21克 穿山甲30克 昆布30克 木鳖子18克 莪术18克 丝瓜络15克 乳香10克 没药10克 血竭10克 麻油适量 黄丹适量

【用法】 将前10味药入麻油煎内熬至枯，去渣滤净，加入黄丹充分搅匀，熬至滴水成珠，再加入乳香、没药、血竭各10克，搅匀成膏，倒入凉水中浸泡，半月后取出，隔水烊化，摊于布上，用时将药膏烘热，撕开药布贴于肿块或疼痛部位。7天换药1次，3次为1疗程，疗程间隔3~5天。

【主治】 乳腺增生。

【来源】 河南中医 1988；8（5）：26

方三

【组成】 瓜蒌、连翘、川芎、红花、桑寄生、泽兰、大黄、芒硝、鸡血藤、丝瓜络各等份

【用法】 将上药装入布袋蒸熟后，外洒酒精或烧酒热敷。

【主治】 乳腺增生病。

【来源】 福建中医药 1982；（1）：30

方四

【组成】 香附子120克 陈酒适量 米醋适量

【用法】 香附子研末，陈酒 米醋酌量以拌湿为度，捣烂后制成饼蒸熟，1日1次，干燥后复蒸，轮流外敷患处，5日换药再敷。

【主治】 乳腺增生。

【来源】 浙江中医杂志 1986；（1）：20

方五

【组成】 煅蚶子壳粉适量

【用法】 将煅蚶子粉以酒调涂患处。

【主治】 乳腺增生病。

【来源】 理渝骈文

前列腺炎

前列腺炎是男性成人因泌尿道多种细菌感染而致的一种常见疾病。属于中医学“淋证”、“遗精”、“阳痿”范

疝。

方一

【组成】 地锦草、公英、地丁各30克 茅根、石苇各20克 皂刺12克 穿山甲9克

【用法】 上药水煎成150毫升(40℃)，保留灌肠，每日1剂，连用1月。

【主治】 湿热下注的急性前列腺炎。

【来源】 四川中医 1989；(9)：27

方二

【组成】 麝香0.15克 白胡椒7粒

【用法】 上药分别研末，洗净脐部，常规消毒，先把麝香纳入神阙穴，再用胡椒填满神阙穴，盖上塑料薄膜，胶布固定，四周不能透气，7~10天换药1次，10次为1疗程，每疗程间隔5~7天。

【主治】 慢性前列腺炎。治11例，痊愈6例，好转3例，因故中断治疗2例。

【来源】 江西中医药 1984；(2)：36

方三

【组成】 野菊花栓(成药)

【用法】 肛门用药，每次1粒，每日2次，1月1疗程。

【主治】 急性前列腺炎。

【来源】 中国中药杂志 1990；(5)：44

尿路结石

尿路结石多由肾及输尿管结石下降而来，也可原发于尿道，以老年人和10岁以下的男童为多见。由于结石对尿道的刺激、损伤，可引起血尿，因此血尿是其主要症状。尿路结石多呈“终末血尿”，有时滴下数滴鲜血。此外病人常伴有耻骨上部或会阴部钝痛或剧痛，明显的尿频、尿急、尿痛。有时出现尿流中断，甚至排尿困难，尿道排出小石等。本病属祖国医学“石淋”范畴。

方一

【组成】 白豆蔻、砂仁、胡椒、川椒各1钱

【用法】 上药共研末装入小布袋内，以好烧酒熬极滚热，冲入布袋内，即套上龟头熏之。

【主治】 尿道结石气滞血瘀及脾肾虚型。

【来源】 中医外治法类编

方二

【组成】 生葱白3~5茎 生白盐少许

【用法】 上方共捣融如膏。取药膏如枣大一块，放胶布中间，贴敷神阙、小肠俞、膀胱俞穴位，每穴1张，1日换药1次。

【主治】 石淋。

【来源】 穴敷疗法聚方镜

方三

【组成】 地榆

【用法】 用地榆适量煎汤，熏洗腰部，一般每天熏洗1~3次，每次20~30分钟。疗程视病情而定，以病瘥为准。

【主治】 砂石淋（湿热、气滞血瘀型）。

【来源】 中国民间疗法

肋 软 骨 炎

肋软骨炎是一种比较常见的疾病，好发于青年，女性略多，主要表现为肋软骨增粗，伴有疼痛，其病因尚不明确。追溯病史，多数病人有流行性感冒或其它病毒感染史，因此有人认为病毒感染可能是肋软骨炎的病因。本病属于祖国医学的“胸痹”范畴。

方一

【组成】 生大黄、黄连、黄柏各30克 乳香、没药各15克

【用法】 诸药共研细末，加米醋适量调成糊状，每日1料，分2次外敷患处。一般1~2日疼痛消失，4~6日肿胀压痛消失。

【主治】 肋软骨炎热毒瘀结型。

【来源】 浙江中医杂志 1984；（7）：324

方二

【组成】 伸筋草60克 透骨草80克 川乌20克 草乌

20克 水蛭15克 廔虫15克

【用法】 上药煎汁，趁热浸透多层纱布，敷于压痛点明显部位，每日2~3次，每次不少于半小时，2日1剂，若同时以热水袋置于纱布上熨，可提高疗效。

【主治】 肋软骨炎（寒凝瘀血阻滞）。

【来源】 四川中医 1985；（9）：39

方三

【组成】 荆芥10克 防风10克 乳香10克 没药10克
胡椒面10克

【用法】 上药共研细末，装布袋内，布袋面喷洒食醋适量。将布袋置患处，袋上加一个热水袋。每次热敷1小时，每日1次。

【主治】 毒热，瘀血瘀结之肋软骨炎。

【来源】 中医杂志 1981；（4）：24

鹤 膝 风

鹤膝风以单侧或双侧膝关节肿大疼痛，而股胫的肌肉消瘦，形如鹤膝为特征。多由三阳亏虚，风邪外袭，阴寒凝滞而成。本病包括现代医学风湿性、类风湿性关节炎。

方一

【组成】 大戟100克 甘遂100克 大黄末适量

【用法】 上二味共为细末，蜂蜜调敷双膝，并盖上鲜菜叶以保持敷药湿润，每天2次。敷8小时，肿痛减轻。3天后在原方余末中按15%的比例加入生大黄末，再敷如前法，

一星期肿消。

【主治】 鹤膝风，病久不愈，肝肾阴亏，湿热下注。

【来源】 四川中医 1984；（5）：60

方二

【组成】 白芥子60克 大葱30克 生姜30克

【用法】 白芥子微炒先捣，然后与生姜、大葱共捣绒，摊布上，包敷膝关节肿痛处，以局部发泡为度，一般2~3天患处起皮。

【主治】 鹤膝风关节肿痛初起或久病。

【注意】 保持患部清洁，预防感染。如泡破干痛，可以涂以豚油。

【来源】 陕西中医 1985；（4）：170

方三

【组成】 黑鱼1条、羌活、防风、当归、桂枝、川乌、麻黄、钻地风、透骨草各15克 木瓜酒2500克

【用法】 黑鱼1条 去肠杂切块同上方隔水煮1周时，蘸抹患处。

【主治】 鹤膝风寒凝湿聚型。

【来源】 外科证治全书

鞘膜积液

鞘膜积液俗称“偏坠”或“偏气”，是指睾丸鞘膜囊内积聚的浆液多于正常量而形成的囊肿。本病临床主要表现是阴囊局部肿物，逐渐增大；肿物表面光滑，有波动感，透光

试验可以透过，阴囊皮肤正常。肿物多呈卵圆形，一般不引起疼痛。肿物较大时有下坠感，过大则影响行动。临床上常为一侧性病变，亦可有双侧发生者。本病属祖国医学“水疝”范畴。

方一

【组成】 肉桂6克 煅龙骨15克 五倍子15克 枯矾15克

【用法】 上药捣碎加水约700毫升，煎煮30分钟，取过滤液，待冷却到与皮肤温度相近时，将阴囊浸泡于药液内约30分钟，每2日1剂，连用8剂。

【主治】 鞘膜积液寒湿内结型。

【来源】 新中医 1982；（9）：22

方二

【组成】 金银花30克 蝉蜕30克 苏叶15克

【用法】 上3味药水煎2次，去渣，混合。以纱布蘸药液外洗或热敷患处，每次30分钟，每日2~3次。每剂可用1~2天。

【主治】 鞘膜积液湿热下注型。

【来源】 浙江中医杂志 1979；（12）：466

方三

【组成】 八角茴香7粒 大枣7枚 小茴香50克 屋梁上老尘土50克

【用法】 ①八角茴香、大枣研细面；先将蜂蜜烧开去沫把药粉和成厚1厘米、直径5厘米大小药饼，肚脐常规消毒后

贴上药饼，用胶布固定。②小茴香、屋梁上老尘土掺匀后装入一个长4寸、宽3寸白布袋内，熨热敷于睾丸上，凉了再热，每次敷20分钟，每日1次。同时内服黄芪荔枝核汤，15日为1疗程。

【主治】 鞘膜积液寒凝、气滞、湿聚型。

【来源】 河北中医 1989；2：47

方四

【组成】 大黄30克 芒硝60克

【用法】 加开水一小盆，将药物浸渍搅和5分钟后，先熏洗后坐浴，1日2次。

【主治】 鞘膜积液。

【来源】 中医杂志 1983；3：19

方五

【组成】 肉桂6克 煅龙骨15克 五倍子15克 枯矾15克 艾条

【用法】 将艾条点燃时对准水道穴，气冲穴，距离保持1寸左右，交替施灸20分钟左右，每晚1次，每周1疗程。同时取上药捣碎加水约500毫升煎煮，水沸后30分钟滤出液，待温度适宜，泡洗局部30分钟左右，每日1次，每剂2~3次，连用5~8剂。

【主治】 睾丸鞘膜积液（寒凝气滞湿聚型）。

【来源】 山东中医杂志 1988；1：51

第四章 皮肤科

白 癜 风

白癜风是一种后天性的因皮肤色素脱失而发生的局限性白色斑片。与祖国医学文献中记载的“白驳风”相类似。

方一

【组成】 雄黄3.5克 密陀僧10克 白芷6克 白附子6克 鲜黄瓜适量。

【用法】 将上述中药（黄瓜除外）研细，筛去粗末，用切为片状的黄瓜趁湿蘸药末用力擦患处，1日2次，疗程5~10天。

【主治】 白癜风。治疗34例，总有效率达100%。

【来源】 山东中医杂志 1985，（3）：29

方二

【组成】 硫磺6克 冰片3克 密陀僧6克 枯矾6克 雄黄6克 蛇床子6克 凡士林适量

【用法】 将上述中药共为末，用凡士林调搽患处，1日1次，10次为1疗程。

【主治】 白癜风。治疗30例，总有效率达96.67%。

【来源】 云南中医杂志 1987，（5）：10

方三

【组成】 雄黄10克 硫磺10克 雌黄2.5克 白附子25克 密陀僧10克 白芨15克 麝香1.5克 冰片1.5克 朱砂10克

【用法】 上药共为细末用牛奶或蜂蜜水调和外敷患处。

【主治】 白癜风。

【来源】 赵炳南临床经验集

方四

【组成】 细辛6克 白芷、雄黄各3克

【用法】 将上药研细末，用醋调匀外搽。

【主治】 白癜风。

【来源】 古今名方

银 屑 病

银屑病又称牛皮癣，为常见慢性炎症性皮肤病。病因尚无确切定论，主要有遗传、感染、代谢障碍、内分泌影响、神经精神因素及免疫紊乱等学说。临床以覆盖白色鳞屑、大小不等的红斑、薄膜现象及点状出血为主要皮损特征。属祖国医学的“白疔”、“松皮癣”、“蛇虱”、“疔风”等范畴。

方一

【组成】 生川乌 生草乌 雄黄 辛夷 蛇床子各20克 斑蝥 巴豆各10克

【用法】 将上药放入250克白酒和250克陈醋内浸泡7天后，每日涂擦1次，可连续用药。

【主治】 银屑病。

【来源】 中医杂志 1983；24（2）：41

方二

【组成】 升汞5克 水杨酸50克 蓖麻油20克 甲醛溶液5克 聚乙烯醇40克 蒸馏水400毫升 75%酒精适量

【用法】 先将聚乙烯醇溶于水（稍加热至溶），水杨酸、升汞分别加入适量酒精，溶解后过滤，并加入蓖麻油、甲醛溶液不断搅拌，缓缓加入酒精至1000毫升，装瓶备用。外搽于皮损之上，每日2次，连续1月为1疗程。

【主治】 银屑病。

【注意】 先以少量涂搽小片皮损，如有刺激反应，应立即停用。

【来源】 临床皮肤科杂志 1986；15（3）：152

方三

【组成】 川槿皮、大枫子、黑虱子、百部、白藓皮、苦参、蛇床子各60克 生川乌、生草乌各30克 雄黄末60克 白砒末30克 黄蜡1000克 麻油2500克

【用法】 前9味药入麻油内浸泡5~7天，放火上熬至药枯，滤渣再加热，下黄蜡熔化，离火后再下雄黄末、白砒末，调和成膏。每日取少许药膏涂擦在皮损上，并用手揉搓局部5~10分钟。每日1~2次，可连续使用。

【主治】 银屑病。

【来源】 浙江中医杂志 1985；20（4）：166

方四

【组成】 蜈蚣5条 乌梢蛇、乌梅、石榴皮、红花、三棱、莪术、木香各20克 紫草、黄柏、银花藤各30克 菜油500克

【用法】 将上药浸泡2小时后，用文火煎熬至药枯，纱布过滤，取药液贮瓶备用。每日1~2次取药液涂于皮损处，再反复摩擦局部5~10分钟，1月为1疗程。

【主治】 银屑病。

【来源】 辽宁中医杂志 1989；13（5）：27

方五

【组成】 蛇床子、生大黄、大枫子、白藓皮、鹤虱草各15克 苦参30克 黄柏、生杏仁、枯矾、朴硝、蝉衣、蜂房各9克 丹皮12克

【用法】 将上药煎汤，趁热熏洗患处，每日1~2次。视皮损情况可连续使用。

【主治】 银屑病。

【来源】 山东中医学院学报 1980；4：47

方六

【组成】 柳蘑 蜂蜡

【用法】 涂于患处，每日1~3次。

【主治】 银屑病。

【注意】 忌辛辣刺激食物。

【来源】 天津市药品标准（1978年）

方七

【组成】 侧柏叶200克 苏叶200克 蒺藜秧400克

【用法】 上药共碾粗末，装入纱布袋内，用水2500～3000毫升煮沸30分钟。用时以软毛巾蘸汤湿洗，或湿洗后加热水浸浴。

【主治】 银屑病。

【来源】 赵炳南临床经验集

方八

【组成】 土槿皮100克 苦参50克 斑蝥5克 土木鳖15克 槟榔2.5克 生矾25克 生南星25克 生半夏15克

【用法】 取水酒各1碗。将前6味浸1宿，临睡时入南星、半夏，加水酒各1碗，煎1炷香去渣，培在土中7日可用。用时涂搽患处。

【主治】 银屑病。

【来源】 公选良方

头 癣

头癣是发生于头皮的一种浅部真菌病。主要见于儿童，传染性大，由于致病菌种的不同和病情表现差异，一般分为黄癣及白癣。与祖国医学文献中记载的“秃疮”、“癞头疮”、“肥粘疮”、“白秃”、“蛀发癣”等相类似。

方一

【组成】 苦参、黄柏各500克 烟胶500克 枯矾、木

鳖肉、大枫子肉、蛇床子、点红椒、潮脑、硫磺、明矾、水银 轻粉各90克 白砒15克

【用法】 上药共研细末，熟猪油1120克化开，入药搅匀成膏。将病发连根拔去，以药膏敷贴其上。1日1次，10次为1疗程。

【主治】 头癣。

【来源】 外科正宗

方二

【组成】 硫磺5~10克 凡士林90~95克

【用法】 将硫磺研为细末，与凡士林混合搅拌均匀成膏。先在头部寻找病区及可疑病区，然后将该区周围1厘米处的头皮剃光或剪平，每日以明矾水或热水洗头后，即在该区敷药，用油纸盖上，嘱患者包扎或戴帽子固定，每日换药1次，10次为1疗程，涂药必须较厚为宜。

【主治】 头癣。

【注意】 用药1周，头发比较松动，即可用镊子拔去病发，并争取在3天内全部拔完。如果头发尚未松动，更需多上一些药膏，不能间断，一直至病变头发拔光为止。

【来源】 中医外科手册

方三

【组成】 木鳖子适量

【用法】 将木鳖子去外壳，蘸醋在粗瓷器上（如碗底）磨药汁，临睡前用棉花或毛笔蘸药汁涂擦患处，每日或隔日1次，贴药前患处须先用盐水洗净。

【主治】 头癣。

【注意】 一般3克木鳖子仁需用10毫升醋研磨，其药汁可涂贴3×2平方厘米癣皮5～7处。

【来源】 中药外贴治百病

方四

【组成】 煅白矾30克 青矾30克（生用） 石硫磺15克（生用） 生石膏15克 食油脚（即麻油、豆油等沉淀物）120克

【用法】 先将前4味各研极细末，混合后入食油脚中调匀，然后再在锅中蒸之即可。用时以棉签蘸上药涂棉患处，1日2次。

【主治】 头癣。

【来源】 中医外科学

方五

【组成】 紫草、黄蜡各60克 百部125克 麻油370克 朴硝50克 硫磺15克 樟脑6克

【用法】 先将麻油加入铜锅内，然后加入百部、紫草熬至半枯去棉，离火，逐渐加入朴硝（起泡沫时应慢慢加），后加入硫磺、樟脑搅和，最后加入黄蜡调和成膏。先剃光患处头发，然后将药敷在患处，每日1次，当头发长出时，再剃光，再上药，直至痊愈。

【主治】 头癣。

【来源】 外科正宗

方六

【组成】 蛇床子60克

【用法】 上药加水煎成汤液，待温度不热不凉时冲洗头部，每日1次，亦可冲洗完毕，再敷药膏。

【主治】 头癣。

【来源】 实用皮肤科学

斑 秃

斑秃是一种毛发骤然成片脱落的皮肤附属器官疾病。其特点是：起病迅猛，头发骤然发生面积大小不等，形状不一，圆形或不规则形的脱落，脱发处无炎症，亦无任何自觉症状。本病原因不清，属中医学之“油风”、“鬼剃头”范围。

方一

【组成】 人参、黄芪、当归、川芎、干姜、桃仁、红花、丹参、酒精等

【用法】 以上方为主药配成章光101毛发再生精，每日涂擦患处2~3次，15日为1疗程，连用4~6个疗程。

【主治】 斑秃。

【来源】 中医杂志 1988；29（9）：53~54

方二

【组成】 雄黄、硫磺、凤凰衣各15克 炮甲珠9克
滑石粉30克 猪板油30克

【用法】 先将诸药研极细末，以猪板油和之，然后再兑入适量猪苦胆汁，共调成软膏，贴敷于患处，或以纱布包好反复外擦患处，每日2~3次，10日为1疗程。

【主治】 斑秃（气血两虚证和肝肾阴虚证）。

【来源】 新医药学杂志 1974；（1）：33

方三

【组成】 艾叶、菊花、藁本、荆芥、防风、薄荷、藿香、甘松、蔓荆子各6克

【用法】 上药加水煎成药液，趁热熏洗患处，每日1次，连用2~3日，以后每隔半月左右重复熏洗。

【主治】 斑秃。

【来源】 河南中医 1983；（2）：42

方四

【组成】 苦参、黄柏、苍术、白芷、地肤子、白藓皮、百部、防风、甘草各15克

【用法】 上方加水煎成药液约1000毫升，将脱发区浸入药液中10~30分钟，取出后再以清水洗净，每日1次，10日为1疗程。

【主治】 斑秃。

【来源】 中西医结合杂志 1978；（2）：108

粉刺

粉刺是青春期常见的皮肤病，其特点是颜面发生散在的针头或米粒大小的粟疹，或见黑头，能挤出粉渣样物，多见于青年男女。过食肥甘厚味，脾胃湿热内蕴上蒸；肺经蕴热，外受风邪；或冷水渍洗，使血热蕴结，均成本病。相当于现代医学之“青年痤疮”。

方一

【组成】 野菊花240克 朴硝480克 花椒120克 枯矾120克

【用法】 上药分作7份，每次1份，加适量水煮沸后倾入容器内，容器以能适于患部体位熏洗者为宜（一般可用搪瓷面盆），趁热将病损部位放于盛药容器之上，使蒸气直达患处，周围的空隙以布单包绕严密。俟水变温时（接近体温），即以药水浸洗患处，每日1~2次，每次20分钟，7日为1疗程。

【主治】 痤疮。

【来源】 实用皮肤科学

方二

【组成】 黄芩15 黄柏15克 苦参15克 黄连5克

【用法】 上药加水煎成150毫升的药汤，过滤，将药物温度降至40℃左右，倒进装有300克特级熟石膏粉的器皿内，搅拌成糊状。让患者平卧，用纱巾扎好头发后用洗面奶清洁皮肤，个别有脓疱者，常规消毒后，用痤疮挤压器挤压有感染处，用脱脂棉将眉、眼、口遮盖，然后用药糊均匀地覆盖在整个面部，仅留鼻孔，5分钟后患者自觉微热，持续20分钟后转冷，即可揭去，用温水洗净面部，每周2次，5次为1疗程。

【主治】 痤疮。

【来源】 临床皮肤科杂志 1990; (4) : 21

方三

【组成】 刺猬脂肪15克

【用法】 取刺猬脂肪，入锅，文火熬油，凉后微凝为浅黄色，敷在患处，每晚1次。

【主治】 痤疮（肺胃壅滞证）。

【来源】 四川中医 1989；（4）：15

方四

【组成】 新鲜芦荟60克

【用法】 把芦荟捣烂取汁，涂擦患处，1日2~3次，10日为1疗程。

【主治】 痤疮。

【来源】 中医皮肤病诊疗

酒 皴 鼻

酒皴鼻是一种以鼻部发红、上起粟疹脓疮、状若酒渣为特征的皮肤病，又称“鼻皴”、“赤鼻”、“酒皴鼻”等。多发于中年人，因肺胃积热，血瘀凝结所致，相当于现代医学之“酒渣鼻”。

方一

【组成】 桃仁9克 珍珠1~1.5克 麻仁6~9克 轻粉0.15克 红粉0.15克

【用法】 上药共研细末，加入凝固之猪板油适量，搅拌均匀，贮瓶备用。用时先用温热水将鼻部洗净擦干，后用

涂于患处，每日1~2次，10次为1疗程。

【主治】 酒皰鼻。

【来源】 山东医药 1979；（2）：21

方二

【组成】 土槿皮150克 斑蝥、地肤子、白藓皮、大枫子、硫磺各50克 蜈蚣20条 烟膏30克 松香20克 雄黄、百部各25克 蛇床子、冰片各15克 蟾酥10克 镇江醋2500克 95%酒精若干

【用法】 将斑蝥、蟾酥、雄黄用布袋装好，其余10味先放入镇江醋中浸泡10天，10天后再将布袋装好的药放入再浸泡3~5天，然后取出布袋，将袋内的药物捣碎后再入袋，放入酒精内泡2~3星期，弃药取液，二液合并，装瓶备用。用时用毛笔蘸药液在皮损处连续涂抹，每次用量不超过8毫升，隔2星期涂1次。涂后局部痛、麻、起泡、流水（流出的水不要让其流经好的皮肤；以免起泡）。流水后待其自然结痂，脱落后再行第二次涂药，如此涂抹，直至痊愈。

【主治】 酒皰鼻。

【注意】 药液剧毒，禁内服及入口眼。

【来源】 上海中医杂志 1982；（11）：29

方三

【组成】 升华硫磺10克 滑石粉20克 氧化锌20克 甘油10克 肥皂、75%酒精适量

【用法】 按以上比例将各药落入酒精中，配成硫磺洗剂，擦患处，每日1次，10次为1疗程。

【主治】 酒皰鼻。

【来源】 实用皮肤科学

方四

【组成】 绿豆750克 荷花瓣(晒干)60克 滑石15克 白芷15克 白附子15克 冰片6克 密陀僧6克

【用法】 上药共研细末，用时先将患处洗净，白天以药粉扑患处，晚上可用温开水将药调成糊状，封涂于患处，晨起洗去。如此用药，至痊愈为止。

【主治】 酒皰鼻。

【来源】 新中医 1974；(3)：47

方五

【组成】 大枫子(去外壳)30个 水银3克 胡桃仁15个

【用法】 将大枫子、胡桃仁放在瓷钵内捣研成糊状，再加水银3克，搅拌均匀后，用两层纱布包住药糊呈梨头样，用手指压向患处揉擦，1日3次，每次揉擦5分钟，次日换新纱布裹药再揉擦，每擦3天停10天，直至痊愈为止。

【主治】 酒皰鼻。

【注意】 初次揉擦，局部皮肤可有潮红、丘疹、水泡等反应，仍可继续使用，3~4天后即能适应。

【来源】 中医外科学

方六

【组成】 大黄、硫磺各等份

【用法】 上药共为细末。用时取药末适量，以开水调敷患处。

【主治】 酒皰鼻。

【来源】 医宗金鉴

系统性红斑狼疮

系统性红斑狼疮是红斑狼疮中较重的一型，是一种较严重的自身免疫性疾病。除皮肤损害外，常累及肾、肝、心等多个脏器，有明显的全身症状，血液中亦有许多自身抗体，好发于青年女性。中医文献中有“红蝴蝶”、“鬼脸疮”、“马缨丹”之称。

方一

【组成】 白矾0.5克 枯矾0.5克 五倍子2克

【用法】 将上药共为细末，过细筛后，在糜烂或溃疡处直接以药粉扑之，一般用药1~2周后即有好转。

【主治】 系统性红斑狼疮。

【来源】 中华口腔科杂志 1982；17（2）：110

方二

【组成】 尿浸石膏90% 制炉甘石10% 甘草粉少许

【用法】 此方石膏必须先尿浸半年（或用熟石膏），洗净，再进行漂净，然后煅熟研粉，再加入制炉甘石粉、甘草粉和匀，以麻油少许调成药膏，再加入凡士林适量搅拌和匀（药粉约3/10，油类约7/10），将膏少许均匀涂纱布上，敷贴患处。

【主治】 系统性红斑狼疮。

【来源】 中医外科学

方三

【组成】 生大黄12克 熟附子10克 牡蛎30克

【用法】 上药加水500~800毫升，文火煎至200毫升，每日晚上用灌肠注射器将药汁1次推入直肠内，保留30~60分钟后再排除。

【主治】 系统性红斑狼疮肾脏受损而出现早期尿毒症。

【来源】 中医外科学

疥 疮

疥疮是一种由疥虫引起的慢性接触性传染性皮肤病。多发于皮肤细嫩、皱褶处，奇痒难忍，传染性极强，蔓延迅速，常为集体流行。根据其发病特点，祖国医学中又有“疥疮”、“虫疥”、“脓疥”、“湿疥”、“脓窝疥”等名。

方一

【组成】 鱼藤15克 食醋100毫升

【用法】 将鱼藤加水500毫升，浸泡2小时，然后将鱼藤捶烂，洗出乳白色之液体（边捶边洗，反复多次），用纱布过滤去渣，再加入食醋100毫升，装瓶备用。嘱患者洗澡后，在患部皮肤外擦鱼藤水，每日2~3次，连用3~4天为1疗程。

【主治】 干疥。

【注意】 凡皮损处糜烂渗液较多者，脓液结痂较重者，均禁用。

【来源】 新中医 1978; (2): 5

方二

【组成】 藜芦、大枫子、蛇床子、硫磺各20~30克
川椒8~10克

【用法】 上药加水约4000毫升，煎2次，至药液3000毫升左右，以桶盛之，先用清水、肥皂洗澡，后将药液稍用力擦洗患处，以致将皮疹擦破，每次约洗20分钟，每日1次，一般连洗2~4天即可见效。

【主治】 疥疮。

【加减】 若有感染而成脓疥者，去川椒加鱼腥草、蒲公英各20~30克；有结节者，加皂刺、刺蒺藜各20~30克

【来源】 广西中医药 1987; 10(4): 3

方三

【组成】 闹羊花250克

【用法】 将闹羊花全株洗净切碎，加水2500克，煎至1000克，再用热水稀释至10000克，盆浴，每天1次，3天为1疗程，间歇2天后再进行第二疗程。衣服亦可泡在该液中灭疥。

【主治】 疥疮。

【注意】 在沐浴时，冬月宜保暖，夏月应避风，以免感冒加重病变。

【来源】 湖南医药杂志 1981; (1): 8

方四

【组成】 硫磺12克 黄柏12克 枯矾9克 雄黄9克

花椒9克 一扫光12克 轻粉3克 猪油30克

【用法】 将上药共研细末，以猪油混合调匀，杵成泥状，用青布包扎紧，揉擦患处，1日3次，每次揉擦5~10分钟，10次为1疗程。

【主治】 疥疮。

【注意】 切忌入口眼及粘膜处。

【来源】 四川中医 1987；（7）：38

方五

【组成】 苦参250克 猪胆（汁）4~5枚

【用法】 上方共煎取液，以药液淋洗患处，3日1次，可洗3~5次。

【主治】 疥疮。

【来源】 外科正宗

方六

【组成】 白芷9克 细辛9克 硫磺15克 花椒15克 水银30克

【用法】 上药共研细末，将药粉装入粗布口袋，滴入菜油适量，以浸湿药粉为宜，捆好布袋口备用。将患者患处以温热盐水洗净，再将药袋在炉上烤，其热度以皮肤能耐受为佳，速将药袋在患处热熨，早晚各1次，治愈为止。

【主治】 干疥（未抓破者）。

【来源】 四川中医 1987；（12）：48

方七

【组成】 老黑醋2500克 五倍子粉625克 蜈蚣10条

蜂蜜3000克 冰片5克

【用法】 将醋入沙锅加蜂蜜熬沸，入五倍子粉，搅拌，改文火熬成糊状，待冷加蜈蚣、冰片调匀备用。用时外敷患处，3~5天换药1次。

【主治】 疥疮。

【来源】 皮肤病方剂药物手册

体、股癣

体癣是发生于头皮、毛发、手足及指（趾）甲以外部位的皮肤真菌病。与祖国医学文献记载的“圆癣”、“金钱癣”相类似。股癣是发生于股内侧、肛门附近的浅部真菌病，属体癣范畴。祖国医学称之为“阴癣”。

方一

【组成】 硫磺30克 明矾、大蒜各10克 炉甘石、氧化锌各6克 食醋适量

【用法】 将硫磺、明矾、大蒜（隔年者）3味研细末，加后2味于前药中，置搪瓷盆内加食醋调匀，用火煮沸10分钟，冷后涂擦患处。1日2次，3日为1疗程。

【主治】 体癣。

【来源】 新中医 1983，（4）：51

方二

【组成】 枯矾 斑蝥各15克 砒霜10克 白蜡 500 毫升

【用法】 将前3味药物入白蜡中浸泡1周，蘸药蜡擦患

处，3日1次，连用3次见效。

【主治】 各种顽癣。治疗100例，总有效率为90%。

【来源】 浙江中医杂志 1982；（11~12）：558

方三

【组成】 川椒（焙干） 硫磺各32克

【用法】 上药共研细末，过120目筛，装瓶备用。用时取生姜1块，斜行切断，以断面蘸药粉搓擦患处，每次3~5分钟，每天早、晚各1次，晚上洗澡后用药，至愈为止。

【主治】 儿童体癣。

【来源】 新中医 1985；（7）：16

方四 羊蹄根酒

【组成】 羊蹄根300克 75%酒精600克

【用法】 将羊蹄根碾碎置酒精内，浸泡7昼夜，过滤去渣备用。以棉球或毛刷蘸药水涂于患处。

【主治】 体癣。

【注意】 慎勿入目。

【来源】 赵炳南临床经验集

方五

【组成】 斑蝥15克 百部60克 槟榔、土槿皮、大枫子肉、白芨、川椒各30克

【用法】 上药浸于750毫升烧酒中备用，用棉签蘸药液擦患处，每日2~3次。

【主治】 体癣。

【注意】 本方有很强的刺激性，皮肤糜烂者忌用。

【来源】 何鹤亭集方

黄 水 疮

黄水疮是一种皮肤起脓疱、浸淫成疮为特征的皮肤病。夏秋季多见，小儿易患此症，好发于暴露部位。多由于肺卫有热，脾胃蕴湿，湿热怫郁，或心火积盛熏蒸腠理，感受暑湿毒邪，湿热毒邪交结，发于肌肤而成。西医称之为脓疱疮。

方一

【组成】 雄黄1份 枯矾2份 生明矾3份

【用法】 将上药共研细末，用时以此药粉干擦皮损处约1毫米厚，略加按压，以不掉为度，不必包扎。如有流黄水或药痂漂起，应随时用无菌棉球拭去，重复上药。1日1次，一般4~6天即可痊愈。

【主治】 黄水疮。治疗1300例，总有效率为97.7%。

【来源】 贵阳中医学院学报 1988，11（2）：7

方二

【组成】 蛇床子30克 苦参30克 苍术15克 黄柏15克 川椒15克 轻粉0.5克 蝉蜕10克

【用法】 将上药（非红疹期去蝉蜕）水煎3次，趁热取药汁分早、中、晚3次熏洗患处，每次时间10分钟左右。一般3~5天可愈。

【主治】 黄水疮。治疗64例，治愈率为100%。

【来源】 浙江中医杂志 1984，（4）：166

方三

【组成】 大黄10克 黄芩10克 黄柏10克 银花10克
连翘10克 苦参10克 艾叶10克 蛇床子15克 马齿苋 20克

【用法】 将上药水煎待温后轻擦洗患处，1日1剂，1日2次，疗程2~7天。

【主治】 黄水疮。治150例，有效率为100%。

【来源】 江苏中医杂志 1987；8（6）：2

方四

【组成】 马齿苋50克 五倍子25克 枯矾25克

【用法】 将上药加水1000毫升文火煎煮30分钟，弃药渣取药液，凉至37℃备用。用煮沸过的软布蘸药液涂擦事先消毒过的病损处，每次30分钟，1日2~3次，一般疗程3天。

【主治】 黄水疮。治疗212例，总有效率为98.11%。

【来源】 中西医结合杂志 1988；8（7）：442

方五

【组成】 黄柏30克 生大黄30克 苦参30克 蒲公英20克 银花20克 百部20克

【用法】 将上药水煎反复淋洗患处，有粘稠渗出液或结痂时，宜先以温热淡盐水轻洗清除后再用本法。1日3~5次，一般4~7天可愈。

【主治】 黄水疮。治疗60例，总有效率为100%。

【来源】 新中医 1985；17（7）：10

方六

【组成】 白头翁30克 蚤休30克 白藓皮30克

【用法】 将上述中药煎汤，分2次外洗，将脓液、脓疱清除干净。

【主治】 黄水疮。

【来源】 浙江中医杂志 1984；（4）：160

手 癣

手癣是由于真菌侵犯手部表皮所引起的浅部真菌病。往往由足癣传染而来，但也可只有手癣而无足癣。此症初起紫白斑点，叠起白皮，坚硬且厚，干枯燥裂，延及遍手。与祖国医学文献中记载的“鹅掌风”相类似。

方一

【组成】 大枫子、川楝子、蛇床子、地肤子、苦参、黄柏、土槿皮、白矾各30克

【用法】 上药加水适量煎后滤渣，倾入盆中，稍温浸泡患处，每日2次，每次30~40分钟，2天1剂药，一般3~5天愈。

【主治】 水疱型、糜烂型、鳞屑型手癣。

【来源】 四川中医 1989；（7）：42

方二

【组成】 生百部50克 鸦胆子10克

【用法】 上药加白酒、陈醋各250克中，泡10日后

用。每日外擦2次，7天为1疗程。

【主治】 各种手癣。

【来源】 中医函授通讯 1989；（5）：35

方三

【组成】 枯矾、斑蝥各15克 砒霜30克 白醋500毫升

【用法】 上3味药入白醋中浸泡1周，用时蘸药醋擦患处，3日1次，连用3次见效。

【主治】 顽癣。治疗100例，总有效率90%。

【来源】 浙江中医杂志 1982；（11~12）：558

方四

【组成】 轻粉1份 冰片2份 硫磺3份 龙骨4份 炉甘石5份

【用法】 先将冰片、轻粉、龙骨研极细末，过120目筛，再与硫磺、炉甘石混匀，用凡士林（醋亦可）调膏备用。用时先将患处用生理盐水擦干净，外涂上药，1日3次，15天为1疗程。

【主治】 各种手癣。

【来源】 四川中医 1986；（6）：39

方五

【组成】 薏苡仁3~4份 甘草1份

【用法】 上药共煎浓水，乘热蘸药擦洗患部，1日数次，至愈为止。

【主治】 各种手癣。

【来源】 四川中医 1986；（10）：55

方六

【组成】 黄丹、枯矾、明矾各12克 五倍子、百部各15克 雄黄、白芷、白藓皮、硫磺各6克 朱砂、轻粉各3克 蛇床子 白附子、白凤仙花各9克 陈米醋1500毫升

【用法】 分别研末，将陈米醋放入铁锅中煮沸后，加入黄丹，用筷子搅匀，再下五倍子、百部、蛇床子、白附子、白芷、白藓皮、白凤仙花等细末搅匀，然后徐徐入枯矾等其余6味药末，搅匀后，离火即得。使用前先用西杉木、或杉木叶、或松木片、或松叶，选其中一种置火上烧烟，以手掌烤薰之。然后取药液10~20毫升，擦手或泡手（泡后药液留下再用），泡后不要用水洗，1日3次。

【主治】 鹅掌风。

【来源】 古今名方

方七

【组成】 鸦胆子20克（打碎） 生百部30克 白酒醋各25克 （此为1只手用量，如患双手时则药量加倍）

【用法】 将药酒、醋共放入大口瓶内，密闭，浸泡10天后备用。用时将患手插入瓶中浸泡，每次30~60分钟，每日2~3次，约11~12天药液泡完即愈。

【主治】 鹅掌风。

【来源】 古今名方

足 癣

足癣是极常见的皮肤病，俗称“脚气”，是由于真菌侵

犯足部表皮所引起的浅部真菌病。通常发生于两侧足底及趾间，初生形如豆粒，黄疱闷胀，连生数泡，皮厚难于自破，与祖国医学文献记载的“臭田螺”、“田螺疱”相类似。

方一

【组成】 苦参、菊花各60克 蛇床子、银花各30克
白芷、黄柏、地肤子、大菖蒲各20克 射干、胡黄连、白藓皮各15克

【用法】 上药混合煎汁适量，先熏后洗30分钟，连用15~20天为1疗程，一般3~5天后见效，1~2周痊愈。

【主治】 以皮损、瘙痒为主的足癣。治疗66例，总效率为100%。

【来源】 中西医结合杂志 1990；（1）：53

方二

【组成】 苍耳草（全草）31克 蛇床子、蜂房、苦参、白矾、黄柏各15克

【用法】 上药放瓦罐或瓷器内，加入水约1000毫升，煎至800毫升，弃渣，再加入约40℃温水4~5倍，临睡前洗脚15~20分钟，每晚1次，连洗3天，诸症消失，近期痊愈。

【主治】 水疱、糜烂型足癣。治50例，总效率为100%。

【来源】 中医杂志 1984；（3）：34

方三

【组成】 生黄精、生首乌各50克 陈醋30克

【用法】 药物轧碎，加入陈醋中，连同容器置入60~

80℃热水中，加温6～8小时取出备用。用时先以淡盐水洗脚，早中晚各用棉球蘸药醋涂搽患处1次，15天为1疗程，未愈可进行第二、三疗程。

【主治】 无明显渗出的足癣。治疗55例，总有效率96.3%。

【来源】 中医杂志 1984；（9）：29

方四

【组成】 土槿皮15克 白酒（或黄酒）90克

【用法】 药物浸泡白酒中24小时后，以棉签蘸药酒涂擦患处，1日数次。

【主治】 轻度脱屑或起水疱的足癣。

【来源】 中医外治方药手册

方五

【组成】 川椒（去籽）25克 紫皮大蒜100克

【用法】 先将川椒研粉，再与大蒜混合捣成药泥装瓶备用。用时温水洗净，擦干患处，涂一薄层药泥，用棉球反复揉搓，使药物渗入皮肤，每天1～2次，10天1疗程。皮损基本痊愈，即用羊蹄根（土大黄）煎液（羊蹄根50克加水煎成1000毫升）洗擦患处，每周2～3次，坚持2～3个月，巩固疗效。皮损处如有糜烂，先用黄连煎液（黄连20克加水煎成500毫升）湿敷，待疮面愈合后再用上法敷药。

【主治】 顽癣。治45例，有效率为100%。

【来源】 中西医结合杂志 1990；（1）：53

方六

【组成】 枯矾100克 黄柏、白藓皮、苦参各 50 克
冰片10克 氧化锌粉 呋喃西林粉各100克 乌洛托品 粉 50
克 强的松粉0.5克

【用法】 分别研极细末，过120目筛，混合研匀，装
瓶备用。先将脚洗净揩干，随即撒药于患处，初擦奇痒，继
则痒止。日擦2~3次，连续3~4天。隔7天再重复1次。连续
4次，一般不易再发。

【主治】 足癣。

【来源】 古今名方

方七

【组成】 炉甘石、黄丹、白矾、密陀僧 锌 氧 粉 各
0.5克

【用法】 上药混合研成细粉，过100目筛，混匀即成，
用时撒于患处。

【主治】 脚气病。

【来源】 精选八百外治验方

甲 癣

甲癣是手足指（趾）甲的一种真菌病，多发生在手足癣
之后，亦可同时出现，俗称“灰指甲”。与祖国医学文献记
载的“鹅爪风”、“油灰指甲”相类似。著名皮肤病专家赵
炳南老医生称之为“油炸甲”。

方一

【组成】 枯矾、白矾各30克 地骨皮60克 猪牙皂、侧柏叶 花椒 雄黄各15克 冰醋酸10毫升（或米醋50毫升）

【用法】 先将猪牙皂、地骨皮、侧柏叶、花椒加水1000毫升，煎至600毫升，滤液取渣再煎取400毫升，将两次滤液加热投入枯矾、白矾、雄黄、冰醋酸搅溶，待温浸泡病甲20~30分钟，然后用刀削除肥厚病甲至甲床，外用纱布、胶布固定。每周2~3次，至新甲正常生长。

【主治】 甲癣。

【注意】 削甲后病甲可涂克霉唑软膏及作硬塑指甲套保护。

【来源】 新中医 1989；（6）：5

方二

【组成】 川楝子10枚

【用法】 将川楝子去皮加水浸泡至软，捣成糊状后加凡士林适量包敷患指（趾），2天后取下，一般连用2次见效。

【主治】 甲癣。

【来源】 浙江中医杂志 1987；（8）：371

方三

【组成】 鸦胆子若干

【用法】 先将病趾或指甲用温热盐水浸泡20~30分钟，使其发软，再用小刀将趾、指甲的萎缩松软部分去掉，并

用另一手拇、食指隔以塑料薄膜捏住去壳的鸦胆子仁，用力挤压，压出油来涂整个病甲，每甲1~2粒，每日1次，外用胶布或伤湿膏固定，连治2~3个月。

【主治】 甲癣。

【来源】 中药贴敷疗法

方四

【组成】 风仙花150克 蜂蜜150克

【用法】 上药调匀成膏，厚厚涂于病甲下，外用油纸盖，纱布包扎，每日换药1次，连用至愈。

【主治】 甲癣。

【来源】 外科证治全生集

方五

【组成】 土槿皮、大枫子肉、花椒、百部、皂刺、黄精、生川乌、生姜、明矾、五加皮各15克 米醋750克

【用法】 用醋浸泡药液，擦洗或浸泡局部。

【主治】 甲癣。

【来源】 精选八百外治验方

花 斑 癣

花斑癣俗称“汗斑”，是浅表的皮肤真菌病，传染性小，常由接触患者衣物所致。多生面项，斑点游走，延蔓成片，初无痛痒，久之微痒。与祖国医学文献中记载的“紫白癜风”相类似。

方一

【组成】 轻粉、海螵蛸各等份

【用法】 先将海螵蛸置瓦片上焙干研粉，再入轻粉和匀，瓶装备用。用时先洗患部，再扑擦该粉适量（若微汗后擦之更佳）。

【主治】 花斑癣。治31例，1~3次均愈，无复发。

【来源】 新中医 1988；（10）：11

方二

【组成】 紫皮蒜2枚

【用法】 上药捣烂涂擦患处，以局部发热伴轻微刺痛为度。

【主治】 花斑癣。治疗17例，均擦1~3次治愈。

【来源】 中医杂志 1984；（10）：15

方三

【组成】 土槿皮10克 丁香10克 50~75%酒精100毫升

【用法】 上药浸入酒精中，1周后外涂局部，每日2~3次，至愈为止。

【主治】 花斑癣。

【来源】 简明中医皮肤病学

方四

【组成】 雌黄、石硫磺各9克 煅明矾、海浮石各5克
密陀僧 蛇床子各6克 水银粉3克 红砒石1.5克

【用法】 上药共研细末备用。患处先用净毛巾浸泡开水热敷，再用老姜去皮，放火上烘热，擦患处呈红色，自觉热感，然后取上药以煤油调匀，用棉签蘸药液外涂患处，每日1~2次，5~7天见效。

【主治】 花斑癣。

【来源】 中药贴敷疗法

方五

【组成】 雄黄、硫磺、密陀僧、轻粉、地肤子各0.5克

【用法】 地肤子干燥后研成碎粉，过100目筛，余药品混合研成细粉过100目筛与地肤子混合均匀（等量逐增法）。用时用醋调和敷患处。

【主治】 花斑癣。

【来源】 精选八百外治验方

脚 湿 气

脚湿气是由水湿浸渍，坐卧湿地，或地处潮湿，外染湿毒，浸淫肌肤，或接触患者的鞋袜等用品，以致虫毒之邪染著而成。病变常限于足部趾缝间皮肤，少数抓破染毒，可并发红丝疔或丹毒。与现代医学的足癣相似。

方一

【组成】 葛根、白矾、千里光各等份

【用法】 上药烘干研为细末，密封包装，每袋40克，患者每晚取药粉1袋倒入盆中，加温水约3000毫升混匀，浸

洗患足20分钟，7日为1疗程。

【主治】 脚湿气。总有效率为98.7%。

【来源】 江西中医药 1988；19（5）：40

方二

【组成】 苍术、黄柏各15克 川牛膝10克 龙胆草30克 明矾40克

【用法】 上药煎水约1000毫升，浸洗患足，每日2～3次，每次30分钟，浸泡后任其自然干燥。3天为1疗程。

【主治】 脚湿气继发感染者。有效率为100%。

【来源】 湖北中医杂志 1985；（2）：15

方三

【组成】 苦参、黄柏各50克 烟胶100克 枯矾30克 木鳖子肉3克 蛇床子5克 点红椒、潮脑、硫磺、明矾、水银、轻粉各3克 白矾1.5克

【用法】 上药共研细末，用熟猪油628克加热化开，与药粉徐徐搅匀，收贮于瓶中，备用，用时可用消毒干棉签挑少许药膏稍用力在疮面上反复涂擦，1日2次，连用3日为疗程。

【主治】 脚湿气。有效率为100%。

【来源】 四川中医 1985；（5）：26

方四

【组成】 朱砂52克 煅甘石150克 冰片50克 滑石粉500克 淀粉100克

【用法】 以上诸药，共研细末，调匀备用。用时用香

油调成膏状，敷于患处，轻者日2次，重者日3~4次，3天为1疗程。

【主治】 脚湿气。有效率达98%。

【来源】 辽宁中医 1987；（2）：11

方五

【组成】 白槐树皮500克 青盐1500克

【用法】 将槐树皮切碎，与青盐同炒至50℃，装入布袋，分装2包，患处敷1包，脚底踏1包，药袋冷则换，每日1~3次，每次以脚底微汗为度，3~5次为1疗程。

【主治】 脚湿气。有效率达100%。

【来源】 中国民间疗法

痱 子

痱子又名汗疹及红粟疹，多发生于夏季，主要由于外界气温增高，湿度大，分泌的汗液不能畅快的由汗腺口排出而发生的小水疱或丘疹。与祖国医学文献记载的“痱瘤”、“痱痹”相类似。

方一

【组成】 黄柏、徐长卿、野菊花、地肤子各30克 明矾1克

【用法】 上方加水1000毫升，煎至400毫升，洗涤患处或湿敷，1日2~3次。每次5~10分钟或取200毫升加金黄散15克调匀，外擦患处。每日3~4次，3天1疗程，一般2疗程痊愈。

【主治】 痱子及暑疖。有效率为100%。

【来源】 上海中医杂志 1986年；（7）：13。

方二

【组成】 苦参20克 冰片10克 生大黄20克 雄黄10克 黄连10克

【用法】 上药浸泡于75%酒精300毫升中，2~3天后即可取药液涂擦患处，每日数次，至愈为止。

【主治】 痱子及暑疖。

【来源】 简明中医皮肤病学

方三

【组成】 鲜车前草 鲜马齿苋 蒲公英 败酱草

【用法】 上药任选一种，取60克洗净加食盐少许，捣烂外敷患处。每日2~4次至愈为止。

【主治】 痱子伴化脓的“暑疖”、“痱毒”。

【来源】 常见病简易疗法手册

带状疱疹

带状疱疹是由带状疱疹病毒感染所引起的一种急性疱疹性皮肤病。其临床特点为数个簇集水疱群，排列成带状，沿周围神经分布，常为单侧性，伴有神经痛。可发生于任何部位，多见于腰部。与祖国医学文献记载的“缠腰火丹”、“蛇串疮”、“蜘蛛疮”等相类似。

方一

【组成】 柿油100毫升 沸雄黄5~8克

【用法】 将两药混合调匀后备用，或现调现用，用时以鹅毛或软的小刷子蘸药涂搽在患处，第一天6~10次，次日可减少，一般用药4~7天。

【主治】 带状疱疹。治疗216例，治愈率为100%。

【来源】 中西医结合杂志 1989；9（10）：629

方二

【组成】 黄连30克 七叶一枝花50克 明雄黄60克
琥珀90克 明矾90克 蜈蚣20克

【用法】 先将蜈蚣放焙箱内烤黄，然后取上药研为细粉，经100目筛选过，混匀装瓶备用。用时取药粉适量，用麻油调成糊状，将药涂在纱布上敷贴患处，1日1次，一般连用3~6天。

【主治】 带状疱疹。治疗560例，治愈率为100%。

【来源】 江苏中医杂志 1989；10（8）：33

方三

【组成】 七叶一枝花30克 金银花10克 雄黄30克
儿茶60克 半边莲60克 蛇床子90克 白藓皮60克 白英90克
75%酒精100毫升

【用法】 将上述中药浸入酒精中浸泡1周后，过滤装瓶备用。用时取此药液湿敷患处，1日4次，一般4~6天。

【主治】 带状疱疹，疱疹溃破糜烂渗出者。治愈率达100%。

【来源】 福建医药杂志 1986, 8(3): 63

方四

【组成】 灯芯草适量

【用法】 将灯芯草蘸香油点燃后，炙灼疱疹顶端，见疱疹顶部结痂即停止，灸1次即可。

【主治】 带状疱疹。

【来源】 河南中医 1982, (1): 44

面部色斑

面部色斑是指颜面部色素加深性皮肤病。其临床特征为淡褐至深褐色斑片，大小不定，形状不规则，境界明显，常对称分布于面部，无自觉症状。与祖国医学文献记载的“面尘”、“黧黑斑”、“黧黑肝黯”、“肝斑”相类似。

方一

【组成】 青嫩柿树叶适量，凡士林50克

【用法】 将青嫩柿树叶晒干研成细面，取50克与凡士林调匀，睡前搽于患处，早起洗去，一般连搽15~30日，斑即消退。

【主治】 棕褐斑。

【来源】 上海中医药杂志 1982, (3): 29

方二

【组成】 当归、荆芎、沙参、柴胡、防风、天花粉各20克 冬瓜仁、白芷、白芨、绿豆各10克

【用法】 将上述中药混合研末过220目筛，取药粉10克，蜜糖、3%过氧化氢各3毫升，10%枸橼酸钠5毫升，精面粉及40℃水少许混合成糊状。将中药糊剂敷于面部，温热棉垫覆盖，30分钟后清除作地仓、迎香、太阳、瞳子髎、承泣、印堂、听宫等六按摩。1周治疗1次，10次为1疗程。

【主治】 黄褐斑。治20例，有效率100%。

【来源】 临床皮肤科杂志 1989；18（6）：316

方三

【组成】 乳香、没药、穿山甲、葛根、山楂、厚朴、鸡矢藤各100克 桂枝、甘草各30克 细辛、冰片各15克 白芍150克

【用法】 制法：①将山楂、葛根、甘草、白芍加水煎2次，浓缩成膏；②乳香、没药共溶于95%乙醇中；③其余诸药（冰片除外）共研细粉；④将①②制的药混合烘干，研细粉；合③药粉加冰片混匀，放瓶中密闭贮存。取药粉200毫克敷于脐窝中，上盖软纸，再用药棉压紧，外以胶布固定。3~7日换药1次，一般治疗3~7次。

【主治】 面部色斑。

【来源】 辽宁中医杂志 1984；8（1）：11

方四

【组成】 甘松、山奈、茅香各15克 白僵蚕、白芨、白蔹、白附子、天花粉、绿豆粉各30克 防风、零陵香、藁本各9克 肥皂9克 香白芷30克

【用法】 上药共研细末，每日早晚蘸药末摩擦患部，可常用。

【主治】 黄褐斑。

【来源】 外科证治全书

皮肤瘙痒症

皮肤搔痒症是一种自觉搔痒而无原发损害的皮肤病。其临床特征是初起并无皮肤损害，由于经常搔抓，患处可出现抓痕、血痂、色素沉着及苔藓样化或湿疹样变，有时可继发感染。搔痒是本病的主要症状，多呈阵发性，痒之轻重不一，有时难以忍耐，可引起失眠及神经衰弱等症。与祖国医学文献中记载的“痒风”相类似。

方一

【组成】 苦参30克 地肤子 蛇床子各16克 黄柏、蝉衣各10克

【用法】 上药水煎，熏洗局部，1日2次，每次20分钟，5~7天为1疗程。

【主治】 肛门搔痒。

【来源】 北京中医，1986，（3）：64

方二

【组成】 苍耳草 艾叶各50克 蜂房、白藓皮 苦参 地肤子 川槿皮各30克 川椒、白矾各20克

【用法】 上药水煎滤渣，集药液趁热外洗，每天1剂，1日洗1~2次，每次搓擦15~20分钟，7天为1疗程，一般2~3疗程即效。

【主治】 瘙痒明显的皮肤搔痒症。治疗37例，总有发

率为94.6%。

【来源】 新中医 1986; (10): 45

方三

【组成】 红花 桃仁 杏仁 生栀子 荆芥 地肤子
各等量

【用法】 上药共研细末，蜂蜜调为糊状，摊成 $3 \times 3 \times 1$ 立方厘米大之药饼，敷贴脐部，外用伤湿膏或胶布固定。1月1次，5天为1个疗程。

【主治】 小儿瘙痒症。

【来源】 中医外治方药手册

方四

【组成】 苦参、土茯苓、蛇床子、生百部各30克 龙胆草、紫槿皮、黄柏、川椒、苍术各15克 地肤子24克

【用法】 上药加水2000~3000毫升，煮沸10~15分钟，去渣取汁热熏，待药温时坐浴。每日1剂，早晚各洗1次。每次20~30分钟，10天为1疗程。

【主治】 女阴瘙痒症。治疗326例，总有效率为97.85%。

【来源】 安徽中医学院学报 1986; (1): 39

方五

【组成】 硫磺 雄黄粉末各10克

【用法】 取一铁罐，底部留有通气孔，内撒一层干锯末，点燃后再放入上药，上覆一层硬纸片（中间剪一直径3~5厘米的圆口），1日1次，每次熏大约半小时，10次为1个疗程。

程。

【主治】 肛门瘙痒。

【来源】 浙江中医杂志 1980, (2): 64

方六

【组成】 止痒粉50克 凡士林450克

【用法】 上药混匀成膏, 外敷患处。

【主治】 皮肤瘙痒症。

【注意】 此药有一定刺激作用, 对于急性炎症性皮肤病禁用。

【来源】 赵炳南临床经验集

方七

【组成】 稀莖草 苦参各30克 地肤子15克 明矾9克

【用法】 煎水洗患处, 每次洗10~15分钟。

【主治】 阴囊、肛门、女阴瘙痒症。

【来源】 古今名方

冻 疮

冻疮是由于寒冷刺激引起局部血管痉挛, 瘀血而致。其临床特征为局限性充血性红斑, 继而肿胀, 自觉局部痒痛, 遇热尤甚, 严重时可生水疱, 疱破后形成溃疡, 治愈后可遗留疤痕及色素沉着或色素脱失。每年冬季易复发。好发于手足及面部。祖国医学亦称为“冻疮”。

方一

【组成】 芒硝适量 黄柏适量

【用法】 冻疮未溃破者，芒硝用量大于黄柏1倍，已溃破者，黄柏用量大于芒硝1倍，两药共为细末，用时以冰水或雪水调敷患处。局部症状轻微者，可按未溃破者用药比例，将黄柏水煎化芒硝外洗患处。1日1次，未溃破者4~7天1疗程，已溃破者8~11天1疗程。

【主治】 冻疮。治疗70例，治愈率100%。

【来源】 中医杂志 1984；（2）：84

方二

【组成】 当归浸膏20克 干姜粉20克 薄荷脑0.5克
甘油10克 凡士林29.5克 羊毛脂20克

【用法】 当归浸膏制法：当归切碎水浸渍48小时后，煎熬30分钟，过滤，反复3~4次，收集滤液，60℃以下蒸发至稠膏状即成。复方当归软膏I号制法：取当归浸膏、凡士林、羊毛脂置容器中，水浴加热熔化，冷凝前加姜粉、薄荷脑（研细末）搅匀即成。用温水洗净患部擦干后，涂上I号软膏，轻轻搓擦。

【主治】 冻疮。治疗166例，治愈率100%。

【来源】 中西医结合杂志 1984；4（12）：735

方三

【组成】 茺花15克 甘草15克

【用法】 将上药水煎成200毫升，乘热时浸洗患处，每次20分钟，1日2次。浸洗后药液不必倒掉，继续加温可应

用2~3天，疗程3~6天。

【主治】 各期冻疮。

【来源】 中成药研究 1981；（2）：44

方四

【组成】 樟脑10克 花椒50克 干辣椒3克 甘油20毫升 95%酒精100毫升

【用法】 将花椒、干辣椒（籽勿取出），泡入95%酒精中，7天后滤出，再加樟脑、甘油混匀即成，用此药液反复摩擦患处，1日5~7次，疗程4~7天。

【主治】 未溃冻疮。治疗20例，治愈率为100%。

【来源】 中西医结合杂志 1987；7（12）：56

方五

【组成】 沙田楼皮1个（晒干或新鲜均可）

【用法】 将沙田楼皮加水约2000克，煮沸30分钟后倒入盆中；用其蒸气熏患处，直至适当温度时，再浸泡患处，同时用沙田楼皮来回摩擦患处约20分钟，隔2天再按此法治疗1~2次即可。宜在晚间睡前用。

【主治】 未溃冻疮。治疗40例，总有效率为97.5%。

【来源】 新中医 1989；21（12）：23

方六

【组成】 当归50克 紫草10克 犬黄面7.5克 香油500克 黄蜡200克

【用法】 以香油浸泡当归、紫草，3日后用微火熬至焦黄，离火将油滤净去渣，再入黄蜡加火熔匀，待冷后加大

黄面（每500克油膏加大黄7.5克），搅匀成膏备用。用时外敷患处。

【主治】 冻疮（清洁疮面）。

【来源】 赵炳南临床经验集

方七

【组成】 95%酒精100毫升 鲜红辣椒5~10克 甘油20毫升 纯樟脑10克

【用法】 将樟脑溶于酒精，再将辣椒洗净切碎放入，浸5~7天后再加甘油即成，用时以油擦局部。

【主治】 冻疮。

【来源】 经方研究参考资料

方八

【组成】 紫草 当归 防风 地黄 白芷 乳香 没药

【用法】 将上药制成软膏涂于与患部大小相近的纱布块上，不宜太厚，敷贴于患部。隔日换1次。

【主治】 冻疮。

【来源】 中华人民共和国药典，1985年版。

荨 麻 疹

荨麻疹是一种常见的过敏性皮肤病，其临床表现为局限性风疹块样损害，骤然发生并迅速消退，愈后不留任何痕迹，有剧烈瘙痒及烧灼感。与祖国医学文献中记载的“痞瘤”、“瘾疹”相类似。

方一

【组成】 夜交藤200克 苍耳子、白蒺藜各100克 白藓皮、蛇床子各50克 蝉蜕20克

【用法】 上药加水5000毫升，煎煮20分钟，乘热先薰患处，待温后，用毛巾或干净旧布浸药液外洗患处；每剂可洗3~5次，一般薰洗2小时后全身风团消退。

【主治】 各型荨麻疹。近期效果显著。

【来源】 中医杂志 1983；24（2）：77

方二

【组成】 蛇床子20克 明矾12克 花椒6克 土茯苓30克 白藓皮15克 苦参30克 荆芥12克 食盐20克

【用法】 诸药加水2000毫升，煎煮至1000毫升，将药液倾入盆内，加温水适量，入盆浸浴，用毛巾边擦边洗，至药液渐凉为度。每日1次，每剂药可煎用2~3次。

【主治】 周身起风团、剧痒之荨麻疹。

【来源】 云南中医杂志 1986；7（1）：20

方三

【组成】 蛇床子 百部各25克 50%酒精100毫升

【用法】 酒精浸泡诸药24小时，过滤装瓶备用。每日涂擦患处3~5次。

【主治】 荨麻疹。

【来源】 常见皮肤病中医治疗简编

方四

【组成】 麦麸250克 醋500毫升

【用法】 将上药混合并搅拌均匀，入铁锅内炒热，装入布袋，搓擦患处。

【主治】 风寒型荨麻疹。

【来源】 中国民间疗法

方五

【组成】 苦参30克 防风15克 扑尔敏30克

【用法】 将上药各自单独研为细末，分别用瓶装贮藏，密封备用。临用前各取10克混合均匀，装入脐窝，以纱布覆盖，胶布固定。每天1次，10天为1疗程，连续至痊愈为止。

【主治】 荨麻疹。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方六

【组成】 沙姜片、香附、苍术、山奈、白芷、雄黄、硫磺、艾叶各10克 丁香19克

【用法】 上药研细末，加入适量冰片混匀，密封备用。取20克装1小布袋中，挂于颈项部或放衣袋内，另装1袋放枕头或床单下。1装可使用3个月。

【主治】 预防丘疹性荨麻疹。

【来源】 中华皮肤科杂志 1983；16（3）：178

神经性皮炎

神经性皮炎是一种皮肤神经功能障碍性皮肤病。临床特征是皮损呈苔藓样变，不倾向湿润化和阵发性剧痒。分局限性和播散性两种。局限性好发于颈、项、膝、肘及骶部，播散性可泛发全身。多见于成年，精神焦虑，神经衰弱者。与祖国医学文献中记载的“牛皮癣”、“摄领疮”相类似。

方一

【组成】 黄柏、白芷、轻粉各25克 煅石膏、蛤粉、五倍子各30克 硫磺、雄黄、铜绿、樟丹各15克 枯矾、胆矾各6克

【用法】 以上各药均取净末，研和极匀，加凡士林500克，调和成膏。每日1~2次，涂搽患处。视皮损情况可连续使用。

【主治】 神经性皮炎。

【来源】 朱仁康临床经验集

方二

【组成】 木鳖子30克（去外壳） 陈醋250毫升

【用法】 先把木鳖子研成细末，放陈醋内浸泡7天，每天摇动1次。用棉签或毛刷浸蘸药液涂擦皮肤，每日2次，7天为1疗程。一般1~2个疗程即愈。

【主治】 神经性皮炎。

【来源】 陕西中医 1988；9（7）：320

方三

【组成】 雄黄3克 巴豆（去外壳）30克

【用法】 上药捣碎拌和，用4层纱布包扎后，反复擦患处，每日3~4次，每次1~2分钟，直至痒感消退为止。

【主治】 神经性皮炎。

【来源】 上海中医药杂志 1982；6：31

方四

【组成】 生半夏 斑蝥 白狼毒各等份

【用法】 上药共研成极细末，适量米醋调成糊状涂擦患处，敷药后局部有刺激感，逐渐起水泡，24小时左右水泡消失，继而结痂，痂掉后皮损痊愈。

【主治】 神经性皮炎。

【来源】 中西医结合杂志 1984；4（8）：498

方五

【组成】 斑蝥20只 土槿皮24克 马钱子（打成粒状或切片） 槟榔各18克 川蜈蚣14条

【用法】 将上药浸于75%酒精中，7日后过滤去渣，再将酒精加至1000毫升。常规消毒后，以梅花针在皮损表面由里向外叩打，至局部皮肤发红，并有轻微出血，将药液涂于表面，每日或隔日1次，至愈为止。

【主治】 神经性皮炎。

【来源】 浙江中医学院学报 1985；9（6）：54

方六

【组成】 细辛250克 鲜羊蹄根60克 土槿皮、生半夏、生南星、生川乌、生草乌各30克 闹羊花、革拨、蟾酥各24克 酒精适量

【用法】 20毫升瓶装，每瓶约含生药2克，用时洗净患处，日涂2~3次。

【主治】 神经性皮炎。

【注意】 皮肤有糜烂破溃处及阴部、肛门周围不宜涂敷，切不可入口。

【来源】 上海中药制药二厂

方七

【组成】 梔子50克 雄黄20克 朱砂20克 轻粉20克

【用法】 上药共为细末备用。用时用黄瓜把、茄子皮或生姜皮蘸药外用，或配成10%的软膏外用。

【主治】 神经性皮炎。

【注意】 溃疡面勿用。

【来源】 赵炳南临床经验集

方八

【组成】 硫磺粉50克 止痒药膏450克

【用法】 上药调匀备用，外敷患处。

【主治】 神经性皮炎。

【注意】 新鲜肉芽疮面勿用。

【来源】 赵炳南临床经验集

方九

【组成】 炉甘石20克 环磷酰胺600克 冰片3克 凡士林250克

【用法】 将凡士林溶化后把上药搅入即可，用时涂于局部，另加热风吹更佳，每日2次。

【来源】 精选八百外用验方

阴部湿疹

阴部湿疹是湿疹的一种特殊表现，其病变范围可累及肛门及男性阴囊、女性外阴，属于过敏性、炎症性皮肤病。因其更易发生剧烈瘙痒、糜烂、渗出及肥厚增生，故列专篇论述。中医学“肾囊风”、“绣球风”属本病范畴。

方一

【组成】 生甘草6克 五倍子、蛇床子各30克 紫草、土槿皮、白藓皮、石榴皮各15克 黄柏、赤石脂各10克

【用法】 药物置纱布袋中扎紧，放入锅中，加水5000毫升，煎成3000毫升，将药汁倾入浴盆中，趁热熏洗，每日早、晚各1次，每次20~30分钟，轻者1周，重者1~2月愈。

【主治】 肛门湿疹属顽固性者。治疗20例，总有效率100%。

【来源】 新中医 1984；（9）：23

方二

【组成】 桉树叶、麻柳树叶、艾叶各100克

【用法】 上药加水500毫升，煎沸20分钟，弃渣备用，用时以干净纱布蘸洗患部皮肤，每日早、晚各1次，每剂药可煎用3次，连用7~15天可痊愈。

【主治】 急性阴囊湿疹。治54例，总有效率96.3%。

【来源】 中医杂志 1984；（7）：26

方三

【组成】 苦参、白藓皮、蛇床子、露蜂房各30克 大黄、白芷、紫草各15克 五倍子12克 花椒10克 冰片、芒硝各6克

【用法】 上药除冰片、芒硝外，水煎至1000毫升，加冰片、芒硝搅匀，坐浴20分钟，1日2次，10天1疗程。

【主治】 肛门湿疹。治123例，总有效率94.5%，3年内复发5例，再治仍有效。

【来源】 上海中医药杂志 1989；（9）：21

方四

【组成】 大枫子、苦参各50克 苍耳子30克 蛇床子 浮萍、薤白各15克

【用法】 上药加水2000~3000毫升，煮沸15~20分钟倒盆中，熏蒸患部，待水湿用纱布浸药湿敷3~5分钟，1日2~3次，每次20~30分钟，至愈为止。

【主治】 肛门湿疹。治61例，总有效率93%。

【来源】 福建中医药 1983；（5）：42

方五

【组成】 硫磺20克 黄丹4克 朱砂3克 炉甘石39克

煅石膏200克

【用法】 上药共碾成极细末，过细罗筛后加冰片适量和匀，瓷瓶收贮。用时将肛门清洗干净后，棉签蘸粉涂擦患处，1日2~3次，至愈为止。

【主治】 肛门湿疹。

【来源】 辽宁中医杂志 1988；（7）：41

方六

【组成】 煅蛤粉5克 樟丹7克 冰片2克

【用法】 上药研成细粉，用液体石蜡调成药膏。用时先将1：1000新洁而灭清洗患部后，再将药膏涂于患部，表面覆盖纱布，每天涂药2次。

【主治】 阴部湿疹。

【来源】 全国中草药新医疗法展览会资料选编

扁平疣

扁平疣亦名青年扁平疣，是一种较常见的病毒性赘生物。临床主要表现为好发于青年人的颜面、手背和前臂的米粒至高粱粒大的扁平丘疹，颜色呈黄褐色或正常皮色，表面光滑发亮，无炎症，多数散在也可密集。一般无自觉症状，偶有痒感，病程缓慢，有时可自愈。在祖国医学中统属于疣类。

方一

【组成】 当归60克 板蓝根60克 紫草60克 木贼60克 薏米60克 红花30克 牡蛎30克 三甲基亚砷40毫升

【用法】 将上述中药水煎，熬30分钟后过滤，反复

2次，然后收集此滤液温火煎成约200毫升，待凉后加入二甲基亚矾摇匀，用纱布或棉球浸沾药液，适当用力摩擦患处30分钟，使局部灼热及微痛，每日2~3次，每剂药液可用3~4天，一般4~5剂可愈。

【主治】 扁平疣。治疗143例，治愈率达100%。

【来源】 实用外科杂志 1987；7（3）：144。

方二

【组成】 苍术9克 细辛6克 陈皮12克 白芷12克
板蓝根30克 贯众30克

【用法】 上药煎水500毫升，趁热擦洗患处，每日3次，每次洗至皮损发红或局部感灼痛为度，每日用药1剂，一般4~6剂可愈。

【主治】 扁平疣。治疗378例，总有效率达63.4%。

【来源】 临床皮肤科杂志 1985；14（6）：335

方三

【组成】 香附30克 木贼30克 大青叶30克 板蓝根30克

【用法】 上药加水至500毫升，煎沸3~5分钟，先熏待温后洗患处，每晚1次，每次20分钟。每剂可用3天，将药煎沸后，依上法续用。9天为1疗程。

【主治】 扁平疣。治疗50例，总有效率达80%。

【来源】 陕西中医 1986；7（9）：412

方四

【组成】 鸦胆子适量 小艾炷适量

【用法】 主穴取养老、外关、丘墟、外踝点，配穴取疣体局部。鸦胆子5粒捣烂贴敷穴位上，艾炷灸。每日施灸2~3次，每3~5壮。一般治疗3~5日可愈。

【主治】 扁平疣。

【来源】 中国灸疗学

方五

【组成】 冰片10克 玄明粉10克 苦参30克 板蓝根30克 大青叶30克 鱼腥草30克 桃仁10克 红花10克

【用法】 将冰片、玄明粉共研细末备用。其它药物浓煎，待冷却至皮肤可耐受时，用毛巾或棉球蘸药液于患处反复涂敷、擦洗15~20分钟；再将备用之冰片、玄明粉用冷开水调成糊状，并反复涂搽患处15~20分钟，1日2次。5日为1个疗程，一般用1个疗程即可治愈。

【主治】 扁平疣。治疗117例，总有效率达95.73%。

【来源】 浙江中医杂志 1988；4（23）：160

方六

【组成】 朱砂、雄黄各15克 火硝125克 水银、白矾各30克 皂矾18克

【用法】 用升华方法制成散剂。每用少许撒疮口。或捻成药捻，或配成软膏外用。外涂患处，以膏药敷贴。

【主治】 扁平疣。

【注意】 本方有剧毒，切不可入口；对汞过敏忌用。

【来源】 医宗金鉴

传染性软疣

传染性软疣是一种病毒性传染性皮肤病，以儿童及青年人多见。其临床特征是初起为粟粒大半球形丘疹，以后逐渐增至豆大，呈灰白、乳白、微红或正常皮肤色，自觉微痒，好发于躯干及四肢近端。与祖国医学文献中记载的“鼠乳”相类似。

方一

【组成】 五倍子5份 乌梅1份 枯矾1份 雄黄2份
大黄1份

【用法】 上药共研细末，取适量香醋调成软膏备用。取少许药膏，涂疣表面2~3毫米厚，以胶布覆盖。每3日换药1次。平均疗程7.3天。

【主治】 传染性软疣。

【来源】 广西中医药 1988；11（6）：21

方二

【组成】 板蓝根30克 紫草、香附各15克 桃仁9克

【用法】 上药加水1000毫升，煎汤擦洗疣体，每日3次，每剂可洗1~3天，平均疗程7.4天。

【主治】 传染性软疣。

【来源】 临床皮肤科杂志 1981；（2）：85

方三

【组成】 斑蝥12.5克 雄黄2克 蜂蜜适量

【用法】 取上2味药研细末，加蜂蜜调制成膏。把疣体表面角化层剥去，以碘酒消毒，然后取少许药膏，搓成与疣体大小相等的扁圆片，置于疣表面，胶布固定。10~15小时后患部起水泡，疣体剥离而愈。

【主治】 传染性软疣。

【来源】 中医药信息 1988；2：20

虱 病

虱病是由虱子长期寄生人体，反复叮刺，吸吮人血所引起的一种瘙痒性皮肤病。虱属兽虱目、虱科。虱是永久性体外寄生虫，根据其形态、习性和寄生的部位不同，可分为头虱、体虱、阴虱。祖国医学文献亦称虱。

方一

【组成】 蛇床子、大枫子各30克 川椒、藜芦各15克 硫磺60克

【用法】 上药煎液，浸洗患部，每日1~2次，连用3天，可杀虫止痒。

【主治】 虱病瘙痒。有效率为98%。

【来源】 湖南中医学院学报 1985；5（4）：10~11

方二

【组成】 百部适量 白酒适量

【用法】 将适量的百部浸于白酒中，泡3天，制成50%百部酒备用。用百部酒擦洗头皮及毛发，每日2次，然后用热肥皂水洗头。

【主治】 杀灭虫体。

【来源】 简明中医皮肤病学

方三

【组成】 蛇床子、百部各25克 50%酒精100毫升

【用法】 以酒精浸泡诸药24小时后过滤即成，外搽患处，日数次。

【主治】 虱病。

【来源】 常见皮肤病中医治疗简编

方四

【组成】 水银（铅制）、轻粉、北杏（去皮尖捣膏）、芦荟、雄黄、狼毒各10克 麝香1克

【用法】 除水银、杏仁膏外，上药共研细末，再加入水银、杏仁膏研匀，先以石菖蒲适量煎汤洗患处，洗后用冷水调药粉涂患处。

【主治】 杀灭阴虱。

【来源】 常见皮肤病中医治疗简编

方五

【组成】 百部、雄黄、明矾各10克

【用法】 将上药研末，加醋适量，调成稀糊状，外涂患处。

【主治】 衣虱。

【来源】 中医外科学

方六

【组成】 百部、明矾各30克

【用法】 以水适量，入诸药煎汤洗头，每日1次，连用7~10月。

【主治】 杀灭虱虫。

【来源】 中医外科学

方七

【组成】 百部、苍术各30克 槟榔15克

【用法】 以水适量煎汤熏洗患处，3~4次可愈。

【主治】 虱病。

【来源】 常见病验方研究参考

手足皲裂

手足皲裂是冬季常见的一种皮肤病，由于经常受机械性或化学性刺激，致使皮肤弹性减低而发生燥裂。其临床特征是初起手足微紧，逐渐皮肤变粗糙增厚，最后出现裂隙，在皮肤较厚处更深，疼痛难忍，并可伴有出血。与祖国医学文献中记载的“手足皲裂”相类似。

方一

【组成】 珍珠粉 广地龙粉 煅月石 白凡士林按4:20:6:70投药

【用法】 广地龙洗净，晒干，低温干燥后研细粉过120目筛，密封在容器内，经高压消毒待用。将煅月石研

末，与地龙粉、珍珠粉和匀，配入凡士林，加温至80℃左右，调匀成膏。先以温水洗净皲裂处，涂药膏适量，每日2次，直至痊愈。平均疗程10天。

【主治】 手足皲裂。

【来源】 中医杂志 1983；24（11）：6

方二

【组成】 当归60克 紫草60克 忍冬藤10克 麻油500克

【用法】 将诸药浸入麻油内，24小时后，文火煎至药枯，滤出药渣，留油待凉，棉棒沾涂患处，每日数次，至愈为止。

【主治】 手足皲裂。

【来源】 常见病简易疗法手册

方三

【组成】 轻粉4.5克 东丹（广丹）3克 飞朱砂3克 麻油120毫升 黄蜡30克

【用法】 患处涂上一层麻油膏，用电吹风机热烘，每日2次，每次30分钟，15天为1疗程，2~3个疗程获效。

【主治】 手足皲裂。

【来源】 中医外科学

方四

【组成】 糯米1500克 明矾60克 樟脑15克 青黛30克

【用法】 将糯米洗净滤干，入石臼捣成细粉，筛去粗

粒杂质，置于1500毫升沸水锅内，缓火熬成糊状，再加入明矾末、樟脑、青黛，和匀即成，贮入罐内待用。用时将药膏涂于布上贴患处。

【主治】 手足皲裂。

【来源】 常见病中草药外治疗法

方五

【组成】 大枫子仁250克 蓖麻子120克 红粉9克
冰片1克 凡士林500克 樟脑12克

【用法】 共熬成膏，外敷患处。

【主治】 手足皲裂。

【来源】 精选八百外用验方

方六

【组成】 黄连9克 当归15克 黄柏9克 姜黄3克
黄蜡120克 香油360克

【用法】 将香油入锅内，黄连、当归、生地、黄柏、姜黄入油内炼枯，去渣，下黄蜡化尽，用纱布过滤，倒入瓷罐内，以柳枝不时搅之，候凝备用。用时外敷患处，亦可将纱布入油膏内，做成黄连油布，贴于疮面。

【主治】 手足皲裂。

【来源】 医宋金鉴

夏季皮炎

夏季皮炎是指由于外感暑热，复受风邪郁于肌肤所致的一种皮肤病，多见于成年人，容易反复发作，以四肢多见，局部

潮红、丘疹、剧痒，秋凉后可自行消失。

方一

【组成】 艾叶 摇竹消 路路通各30克 蚕砂60克

【用法】 上药共煎汁，以纱布蘸药液湿敷痒处，日2次，可连续应用，次数不限。

【主治】 夏季皮炎。有效率100%。

【来源】 湖南中医学院学报 1985；5（4）：10～11

方二

【组成】 蛇床子、地肤子、苦参、花椒、白矾各20克

【用法】 上药煎汁，先熏后洗患部，每日1剂，可熏洗2～3次，每次20分钟，连用10天。

【主治】 夏季皮炎。有效率为100%。

【来源】 辽宁中医杂志 1985；9（4）：21～22

方三

【组成】 千里光500克 大黄300克

【用法】 上药浸于70%酒精4000毫升中，浸泡1周。用时，棉签蘸取药液涂于患部，每日2～4次，7天为1疗程。

【主治】 夏季皮炎。治疗50例，38例痊愈，显效10例，见效1例，无效1例，总有效率为98%。

【来源】 临床皮肤科杂志 1985；（4）：219

方四

【组成】 松香400克 雄黄200克 乳香150克 铜绿150克 轻粉、枯矾、红粉、樟丹各50克 没药150克

【用法】 各药共为细面，过罗，用凡士林油调匀成膏。外敷患处。

【主治】 夏季皮炎。

【来源】 精选八百外用验方

鸡 眼

鸡眼是一种局限性圆锥状角质增生物，尖端深入皮内，基底露于表面，呈圆形似鸡眼故有其名。本病好发于足底及足趾，多单发，其颜色为灰黄色或蜡黄色，压之疼痛。与祖国医学文献中记载的“肉刺”、“鸡眼”相类似。

方一

【组成】 大蒜头1个 葱白10厘米 花椒3~5粒

【用法】 将上药共捣烂如泥，视鸡眼大小取不同量药泥敷于鸡眼上。用卫生纸搓1细条围绕药泥，以便药泥集中于病变部位。用纱布包扎，密封，勿使漏气。24小时后除去胶布及药泥，3日后鸡眼开始变黑，逐渐脱落，最多半月即完全脱落。有时1次使用不当，可再用1次，最多2次即可痊愈。

【主治】 鸡眼。治疗158例共192个鸡眼，治愈率为100%。

【来源】 中西医结合杂志 1989，9（8）：490

方二

【组成】 蜂胶适量

【用法】 先将患处用热水浸泡，并以刀削去表层病变

组织，然后将1块稍大于患部的小饼状蜂胶紧贴患处，用胶布固定。隔6~7天后鸡眼自行脱落。鸡眼脱落后还需再贴药6~7天，待患处皮肤长好为止。

【主治】 鸡眼。治疗90个鸡眼，总有效率为98.71%。

【来源】 中华皮肤科杂志 1959；（4）：21

方三

【组成】 艾卷适量

【用法】 选用温热水浸泡患处15分钟，待鸡眼角质软化后，用毛巾拭净，点燃艾卷灸阿是穴，以患者略感疼痛，皮肤红润为度，每次约20分钟，1日1次，7次为1疗程，疗程间隔2~3日。

【主治】 鸡眼。36例经2~3个疗程治疗，总有效率为100%。

【来源】 江西中医药 1988；（6）：37

方四

【组成】 水银30克 火硝、白矾、食盐、皂矾各45克 硼砂15克 朱砂、雄黄各6克

【用法】 升华制成散剂。每用少许撒疮口，或用油纸条（或纱布条）蘸药插入疮口内，外用膏药敷盖。

【主治】 鸡眼。

【注意】 ①本方有剧毒，仅供外用，切不可入口。②对汞过敏者忌用。

【来源】 医宗金鉴

剥脱性皮炎

剥脱性皮炎又称红皮病，是一种累及全身或广大皮肤面，以弥漫性潮红，持续性大量脱屑为主要特征的慢性炎症性皮肤病。目前其病因尚不明确，分为原发性与继发性两种。病情比较严重，常可引起死亡。祖国医学文献中记载的“红皮病”属本病范畴。

方一

【组成】 当归30克 白芷9克 姜黄90克 甘草30克
轻粉6克 冰片6克 蜂白蜡90~120克

【用法】 先将前4种药，浸泡于麻油内3天，然后于炉火上熬至枯黄，离火去渣，加入轻粉、冰片（预先研末），最后加蜂白蜡融化（夏天加125克，冬天加90克），调匀至冷成药膏，敷贴患处。

【主治】 皮肤干燥皴裂脱屑之毒热伤阴证期和血虚风燥证期。

【来源】 朱仁康临床经验集

方二

【组成】 生甘草90克

【用法】 上药加水煎成药液，然后以毛巾或纱布蘸药液湿敷患处，每日1次，10日为1疗程。

【主治】 剥脱性皮炎。

【来源】 实用中医皮肤病学

方三

- 【组成】 金银花10克 生甘草10克
【用法】 上药加水煎煮后冷却，含漱口腔。
【主治】 剥脱性皮炎之口腔糜烂者。
【来源】 中医外科学。

狐 臭

狐臭是一种以腋下汗出、带有狐臊臭味为特征的皮肤病。多见于青壮年，具有遗传性，好发于腋窝、乳晕、脐部、会阴等处，以腋窝为最常见。多由先天禀赋所致，也可因湿热内蕴、秽浊外壅引起，又称“体气”、“狐气”等，相当于现代医学之腋臭。

方一

- 【组成】 白芷10克 丁香20克 密陀僧15克
【用法】 将各药分别研为细末，和匀。用纱布包药粉扑患处，每日1次，10次为1疗程。
【主治】 狐臭。
【来源】 中医外科学

方二

- 【组成】 枯矾60克 雄黄、赤石脂、血竭各26.8克
黄连31.3克 朱砂8.9克 注射用水1000毫升
【用法】 普鲁卡因皮试阴性者，腋窝备皮，消毒后用注射器抽取枯痔液10毫升和1%普鲁卡因30毫升，接5~7号

针头，自腋毛分布区，外侧缘中点，以15°度角刺入真皮深层和皮下浅筋膜内，边进针边注药，作扇形浸润注射，使全部毛发分布区皮肤隆起，注射后用无菌纱布按揉使药液均匀分布，休息15分钟无反应即可离去，3周后重复注射1次，再过1月复查，必要时可做第3次注射。

【主治】 狐臭。有效率达99.9%。

【来源】 临床皮肤科杂志 1987；（1）：43

方三

【组成】 川椒、陈皮、枯矾、白芷各6克 冰片0.5克

【用药】 先将前4味药共研为细末，再加入冰片，研成极细粉，装入小口瓶内备用。先将腋臭部位用温水洗净擦干，用细纱布撒上药，在腋窝处揉擦按摩，1日2~3次，10日为1疗程，一般2~3个疗程即愈。

【主治】 狐臭。

【来源】 四川中医 1990；（3）：42

方四

【组成】 青木香 枫香 丁香 薰陆香 各100克 阳起石 橘皮各150克 矾石200克 石灰1000

【用法】 上药共为细末备用，用时绢包擦或挟患处。

【主治】 狐臭。

【来源】 外台秘要

硬 皮 病

硬皮病是一种以皮肤肿胀、硬化、小血管痉挛狭窄为特

征的结缔组织疾病。一般分为局限性和系统性两型。经过红肿、硬化及萎缩三个阶段，受累皮肤常与深部组织固着，不易移动，因而可造成面貌变形和相应器官的功能障碍，属祖国医学的“皮痹”、“血痹”范畴。

方一

【组成】 当归、肉桂各60克 干姜、红花、山花椒各30克 樟脑、细辛各15克

【用法】 将上药加入到95%的酒精1000毫升中，浸泡1周后，以手蘸药液揉擦按摩患处，至发热为度，每日2~3次。

【主治】 硬皮病。

【来源】 四川中医 1987；（5）：30

方二

【组成】 ①群药类：鲜羊蹄根、梗、叶 大枫子 百部 皂刺各60克 群凤仙花 羊蹄躑花 透骨草 马钱子 苦杏仁 银杏 蜂房 苦参子各30克 山甲 川乌 草乌 全蝎 斑蝥各15克 金头蜈蚣15条 ②药面类：白芨面30克 藤黄面 轻粉各15克 硃砂面10克

【用法】 香油4000克，生桐油1000克，倾入铁锅内，浸泡群药后，文火炼成深黄色，离火后过滤；再将药油置武火炼至滴水成珠（温度大约24℃左右），每1000克药油加官粉420克，樟丹60克，药面60克，松香60克，制成脱色拔膏棍，外贴于患处，每隔3~4日更换1次。

【主治】 硬皮病。

【来源】 简明中医皮肤病学

方三

【组成】 大黄 桂枝 川芎 细辛 苏术 红花

【用法】 上方药量当视病变部位的大小而定，然后加适量的水浸泡患处，每次20～30分钟，保持药温，每天或隔天1次。

【主治】 硬皮病。

【注意】 浸洗后应避风寒，冬天应注意保暖。

【来源】 中医皮肤病诊疗。

方四

【组成】 川楝子60克 花椒30克

【用法】 上药食盐炒后布包，乘热熨患处，每日2～3次，10日为1疗程。

【主治】 硬皮病。

【来源】 实用中医外科学

方五

【组成】 附子 川乌 草乌 细辛 桂枝 乳香 没药各适量 艾炷适量

【用法】 将上药做成药饼待用。选穴：①曲池，足三里，三阴交，血海，阳池；②大椎，肾俞，命门，脾俞，膏肓俞，中脘；③神阙，气海，关元，肺俞，膈俞，阳池。将药饼置于上述穴位，每日1次，行子午补法隔药饼灸，三组穴位交替使用，每穴3～5壮。

【主治】 硬皮病。

【来源】 中西医结合研究丛书·皮肤病研究

粘膜白斑

粘膜白斑是粘膜发生过度角化而形成的疾病，属癌前期病。其基本损害为粘膜呈白色或灰白色增厚，可为线状或斑块状。临床最常见者为口腔粘膜白斑和女阴粘膜白斑。其病因尚未明了，可能与长期的反复刺激、维生素B缺乏、女性激素水平降低有关。相当于中医之阴疮、狐惑病之类。

方一

【组成】 仙灵脾30克 一支黄花30克 白藓皮30克
苦参30克 泽泻15克 艾叶15克 花椒12克 冰片1克 土
槿皮30克 鸡血藤30克 野菊花30克

【用法】 上药布包，温开水浸泡15分钟后，煎数沸，
倾入盆中，趁热熏洗，早晚各1次，每次5~10分钟。

【主治】 外阴粘膜白斑。

【注意】 经期停用。

【来源】 中医外科学

方二

【组成】 苦参、黄柏、蛇床子、白藓皮、鲜衣、蜂房
花椒、荆芥各12克

【用法】 上药布包，温开水浸泡15分钟后，煎数沸，
倾入盆中，趁热熏洗，早晚各1次，每次5~10分钟，洗后可
拭下外阴。

【主治】 外阴粘膜白斑。

【注意】 经期停用。糜烂明显者忌用。

【来源】 辽宁中医杂志 1983; (9): 封底

方三

【组成】 仙灵脾、川椒、蛇床子、苦参、土茯苓、艾叶、荆芥、防风、黄柏、紫草各12克

【用法】 上方加水煎成药液，然后以干净毛巾或纱布蘸取药液擦洗患处，1日1~2次，10日为1疗程。

【主治】 女阴白斑。

【加减】 外阴萎缩加补骨脂、麦冬各12克；炎症破裂及不典型增生加莪术、三棱、农吉利或山慈菇等适量。

【来源】 中华妇产科杂志 1984; (4): 17

方四

【组成】 煅炉甘石6克 黄丹1.5克 三黄粉3克 煅硼砂1.5克 冰片0.9克

【用法】 用时先用清水洗净创面，再将药粉撒布于外阴溃疡上，用消毒纱布包裹阴部溃疡处。每日或隔日换药1次。

【主治】 外阴粘膜白斑。

【来源】 古今名方

稻田皮炎

稻田皮炎是指从事水稻（也包括其它水田）作业过程中所发生的皮肤病，是水稻种植地区常见病多发病。其真正病因尚不完全清楚，长时间浸于温度较高的水田或机械摩擦可能是发病的主因。本病一般分为三型：（1）浸渍糜烂型皮炎，俗称烂手烂脚、水毒，中医称水渍疮；（2）禽兽类血

吸虫尾蚴皮炎，俗称鸭怪或鸭屎风，（3）其它因素所致的接触性皮炎。

方一

【组成】 土花椒60克 食盐少许

【用法】 以土花椒加食盐少许煎成汤液，然后将患处浸放其中进行清洗，1日2次，5次为1疗程。

【主治】 禽兽类血吸虫尾蚴型皮炎。

【来源】 实用皮肤科学

方二

【组成】 鲜墨旱莲4000克 明矾75克 冰片少许 凡士林1500克

【用法】 将各药共研细末，与凡士林调和拌匀成药膏，敷贴患处。

【主治】 稻田皮炎有糜烂面者。

【来源】 新医药学杂志 1974；（6）：42

方三

【组成】 青黛15克 雄黄20克 氧化锌15克 枯矾30克 滑石20克 密陀僧10克

【用法】 将各药研为细末，过细筛后密封备用。用时先以温开水洗净患处，然后将药粉撒布于上，若患处干痛或痒痛，则用菜油调涂之。每日2~3次，5日为1疗程。

【主治】 稻田皮炎。

【来源】 广西中医药 1985；（4）：19

皮肤猪囊虫病

皮肤猪囊虫病是由于猪囊尾蚴（猪囊虫的幼虫）寄居在皮肤所引起的一种皮肤病。其主要特点是表现为皮下或肌肉内结节，呈囊包状，触之有海绵感，久则质硬且坚，中医称此囊包为“疱肉”。

方一

【组成】 雷丸粉、槟榔粉、浙贝粉各6克 使君子粉2~3克

【用法】 上药混合，加水100~150毫升，或用文火煎片刻（不宜过长），进行高位保留灌肠，连用5天为1疗程。

【主治】 杀死囊虫虫体。

【来源】 临床皮肤科杂志 1986；（2）：73

方二

【组成】 雷丸 槟榔 浙贝各等份

【用法】 将上药混合，制成2、4、6、8克重栓剂，便后放入肛内，每日量6~8克。

【主治】 杀死囊虫虫体。

【来源】 临床皮肤科杂志 1986；（2）：73

疱疹样皮炎

疱疹样皮炎是一种慢性、复发性皮肤病，其特点为多形性皮疹，皮疹可有红斑、水疱、丘疹、丘疱疹，水疱常沿红

斑呈环状排列，好发于四肢及腰部等处，剧烈瘙痒。皮疹成批出现，愈后残留色素沉着。祖国医学文献中并无明确记载，按其临床特点似属于“天疱疮”、“火赤疮”的范畴。

方一

【组成】 祛湿散（川连24 川黄柏24 黄芩144 槟榔96）30克 雄黄3克 冰片1.5克 明矾3克 鲜芦荟60克

【用法】 上药共为细末，将鲜芦荟捣烂取汁，调和药末，然后用其涂擦患处，每日2~3次，10次为1疗程。

【主治】 疱疹样皮炎。

【来源】 简明中医皮肤病学

方二

【组成】 青黛60克 石膏120克 滑石120克 黄柏60克 煅海螵蛸30克 煅牡蛎粉30克

【用法】 上方各研细末，先在患处用麻油湿润后，以药粉干扑。

【主治】 心火脾湿之疱疹样皮炎。

【来源】 中医外科临床手册。

方三

【组成】 雄黄解毒散（雄黄30 寒水石30 白矾120）30克 百部酒（百部20克加入到75%酒精100毫升中浸泡）100毫升

【用法】 将雄黄解毒散加入到百部酒中，混匀后蘸取药液擦洗患处，1日1~2次，5次为1疗程。

【主治】 疱疹样皮炎。

【来源】 中西医结合研究丛书·皮肤病分册

方四

【组成】 煅石膏 轻粉各50克 青黛 黄柏末各15克

【用法】 将药末调匀备用。用时先以甘草汤清洗患处，再取药末外敷患处。

【主治】 天疱疮。

【来源】 外科正宗

毛 囊 炎

毛囊炎是毛囊部发生的急性、亚急性和慢性化脓性或非化脓性炎症。化脓性者主要由葡萄球菌侵入毛囊而致，非化脓性多与职业或某些治疗因素有关。祖国医学因其发病部位不同而名称亦异。发于头部者谓“发际疮”，发于臀部者谓“坐板疮”，以及“肉龟”、“羊须疮”等名称。

方一

【组成】 藤黄15克 苦参10克 75%酒精200毫升

【用法】 上方共研细末，浸泡于75%酒精200毫升中，5~7天后蘸取药液，涂擦患处，每日2~3次。

【主治】 毛囊炎。

【来源】 广西中医药 1985；8（4）：43

方二

【组成】 芫花 川椒各15克 黄柏30克

【用法】 将上药碾成粗末，装纱布袋内，加水2500~

3000毫升，煮沸30分钟，用小毛巾蘸药汤塌洗患处，每日1~2次，10日为1疗程。

【主治】 毛囊炎热毒挟风证。

【注意】 芫花有毒，勿入口服。

【来源】 医宗金鉴

方三

【组成】 黄柏15克 雄黄10克 苍耳子10克

【用法】 上方水煎为液，趁热熏洗患处，每日1次，10次为1疗程。

【主治】 毛囊炎热毒挟风证。

【来源】 皮科便览

方四

【组成】 青黛30克 海螺蛸末90克 煅石膏末370克
冰片3克

【用法】 先将青黛研细，次加海螺蛸末研和，冰片研细，加入上药末少许研匀后，再加全部药末研细调匀，直接以药末扑患处。

【主治】 毛囊炎渗水。

【来源】 实用皮肤科学

第五章 骨伤科

骨 折

骨折是指骨质的完整性或连续性被破坏者。古代称之为“折伤”、“折骨”。多因外力作用，跌扑、坠堕、撞击、闪挫、压轧、负重、劳损等引起骨折。症见在正常的骨中出现断裂，或粉碎性骨片，或断折骨重叠，出血红肿，骨折处疼痛难忍。

方一

【组成】 大黄100克 川芎50克 当归50克 生地50克 川连50克 甘草25克 荆芥15克 肉桂15克 白芨15克 白薇15克

【用法】 用麻油熬枯去渣加白蜡、黄蜡各150克，再取鳖虫50克，血竭25克，象皮25克，龙骨25克，海螵15克，珍珠10克，乳香25克，没药25克，人参10克，共研细面加入油膏中搅匀备用，用时外敷患处。

【主治】 骨折。

【来源】 精选八百外用验方

方二

【组成】 黄桷刺树根125克（或用五加皮代之） 小

雄鸡1只（重200～250克，去毛）糯米饭1盞

【用法】 共同捣糊，贴在断骨处，外包好。若夏天再加莲早树根少许，可避免生虫。

【主治】 新鲜骨折。

【来源】 古今名方。

方三

【组成】 葱白125克 桃仁、生姜、当归各90克 五加皮60克 赤芍30克 白芥子、樟脑、冰片各15克

【用法】 共捣烂炒熟，同荞麦粉调成膏，包伤处。

【主治】 新鲜骨折。

【来源】 古今名方

方四

【组成】 自然铜6克 乳香12克 没药12克 桃仁10克 大黄6克 骨碎补20克 当归20克 薄荷3克 红花12克 黄柏10克 赤芍8克 透骨草12克 土鳖6克

【用法】 将药物研细末，调拌凡士林或麻油，或熬炼成膏剂。凡肢体骨折或躯干部、头部骨折，应首先进行复位手术，然后外敷药物，并用夹板固定骨折处，不得随意活动，用纱布包扎。

【主治】 骨折。

【注意】 ①凡骨折损伤严重时，在搬动送医院过程中，应好好护理，尽量减少不必要损伤、充血或失血。②在外敷药物以前，必须正确判断骨折严重与否和整形复位是否正确，然后外敷固定。③有条件的情况下，可配合照片和X线透视进行整形接骨。④包扎固定后，不宜活动，应静养休

息，加强营养，防止伤风、伤寒。

【来源】 中国民间敷药疗法

颈 椎 病

颈椎病亦称颈椎综合征，是由于损伤或颈椎及其软组织退变，压迫或刺激颈部血管、神经根和脊髓而引起颈、肩、臂痛伴手指麻木，甚至合并头昏、头痛、肢体功能失常等综合症状，是临床常见的疾病，多见于40岁以上的成年人。

方一

【组成】 防风、荆芥、海桐皮、乳香、没药、鸡血藤、生草乌、闹洋花、寻骨风、伸筋草、透骨草、续断各40克
红花、当归、川椒各30克

【用法】 上药用95%酒精拌湿，3天后加红食醋3000克浸泡3天备用。在颈椎牵引的同时，将醋浸药液浸湿纱布，敷于后颈部，用红外线照射半小时，取下牵引和纱布，进行推拿（镇痉、松筋和展筋手法）。2周为1疗程，少数未愈者，延长治疗1~2周。

【主治】 颈椎病。治疗100例，治愈72例，有效21例，无效7例。

【来源】 湖北中医杂志 1981；（5）：21

方二

【组成】 金毛狗脊、穿山龙、红花、当归、甘草各5000克 独活、防风、桂枝各250克

【用法】 将上药共制成针剂，共5000毫升。以颈部压

痛点或病变部位为治疗点，每个痛点注射0.5~1毫升，每日或间隔1日1次，20次为1疗程，疗程间休息1周。一般5~7次疼痛减轻，重者最多3个疗程。

【主治】 颈椎病。治疗100例，症状完全缓解31例，显著缓解37例，缓解19例，无效13例。

【来源】 辽宁中医杂志 1982；（8）：42

方三

【组成】 白花蛇10克（焙黄） 乳香、没药各5克（去油） 麝香1.5克 肉桂、川乌、草乌、川椒、白芥子各5克

【用法】 将上药与冰片少许，共为细末，瓶装封闭备用。用时取药粉少许撒在约3×4平方厘米的胶布上，并贴于颈部压痛最明显处，如大椎穴（双）、肩井、肩髃。每周换药2次，4周为1疗程。贴敷后除局部有灼热感外，无明显副作用。内服汤剂含葛根、威灵仙各30克，全虫9克，透骨草、仙灵脾、白芍、狗脊、鸡血藤、木瓜各15克，桑枝10克，青风藤12克。

【主治】 颈椎病。经3个疗程治疗，观察1年痊愈者45例，观察6月显效者24例，观察3月有效者15例，无效9例。

【来源】 辽宁中医杂志 1988；12（6）：24

肩关节周围炎

肩关节周围炎是肩部关节囊和关节周围软组织损伤、退变而引起的关节囊和关节周围软组织的一种慢性炎症反应，又称“漏肩风”、“冻结肩”、“肩凝症”等；因该病多发

于50岁以上患者而称“五十肩”。

方一

【组成】 乳香、没药、麻黄、马钱子各取适量

【用法】 将以上药物水煎汤熏洗上肢，每日1次，每次30分钟。并用伤湿膏药贴患处。同时配合内服舒筋活络丸，每天1粒。

【主治】 肩关节周围炎。

【来源】 医案选编

方二

【组成】 生川乌、生草乌、生南星、威灵仙各150克 附子、生半夏、地龙、桂枝、红花、紫荆皮、桃仁、穿山甲 木瓜、牛膝、赤芍各100克 归尾、川芎各200克 苏木、独活、青皮、防风、王不留行、莪术、羌活各50克 黄荆子40克 乳香、没药、白芥子各30克

【用法】 以上药物用青油10千克浸10~30天，用文火熬枯去渣，加炒铅粉3千克，用桃木边熬边拌匀，至滴水成珠时拌入老碱适量即成。用时将药膏放入铁锅加热，浸入冷开水内立即取出，取适量捏成药饼，厚约2厘米，贴敷患处，5分钟换药膏1次，以患者有温暖舒适感为度，日敷2~3次，7~8日为1疗程。

【主治】 肩关节周围炎。

【来源】 浙江中医杂志 1984：19（1）：22

方三

【组成】 斑蝥、大蒜汁各适量

【用法】 取肩髃、天宗、肩井、巨骨、肩贞、肩前、曲池、条口等穴，每次选2~3穴，先贴肩部、后贴远端穴。将斑蝥研为细末，取0.01~0.02克，用大蒜汁调和成饼置于穴位并盖贴约8~10平方毫米的胶布，一般4~9小时患者即觉局部有热辣感或微痛感，此时除去胶布和药物即见皮肤发起红泡（若泡大、疼痛，可刺破使流出泡液），再盖以消毒纱布，2~4日即愈；若未起泡则盖贴1次。每周发泡1次，3次为1疗程。

【主治】 肩关节周围炎。治疗40例，痊愈29例，显效9例，无效2例。

【来源】 陕西中医 1989；10（7），318

方四

【组成】 川乌、草乌、樟脑各90克

【用法】 上药共研为末，装瓶备用。根据疼痛部位大小取药末适量，用醋调成糊状，均匀敷于压痛点，约0.5厘米厚，外裹纱布，用热水袋热敷30分钟，日1次。

【主治】 肩关节周围炎。治疗35例，治愈22例，显效8例，好转4例，无效1例，多数在5次以下治愈。

【来源】 山西中医 1986，2（2），144

骨 髓 炎

骨髓炎多因热毒注骨，聚毒为病，或外伤感染，邪毒由伤口传导而成，或正气虚弱，毒邪侵袭，正不胜邪，内毒不能外散而深窜入骨等。症见患肢疼痛剧烈，不能活动，皮红掀热，成脓肿胀。

方一

【组成】 大黄12克 黄柏20克 姜黄6克 白芷12克
南星12克 陈皮10克 苍术12克 厚朴10克 甘草6克
天花粉3克

【用法】 将药物共研细末，调拌凡士林或白酒，外敷患处。

【主治】 骨髓炎。

【注意】 ①锻炼身体，增强机体的抵抗力；②对开放性骨折，要及时彻底清理创伤，防止感染。③注意天气变化，避免风寒湿热火毒之邪入里。

【来源】 中国民间敷药疗法

方二

【组成】 南瓜藤炭150克 土楝子炭30克 芒硝120克
地脚粉500克 饴糖1000克 甘油150克

【用法】 上药共熬制成膏，用时外敷患处。

【主治】 骨髓炎初起、溃破。

【来源】 精选八百外用验方

方三

【组成】 南瓜藤炭50克 血竭10克 乳香、没药、白芷各15克 蜈蚣2条 平贝10克 金银花10克

【用法】 上药共为细末，加入适量饴糖调成膏备用。用时外敷患处，每日1次。

【主治】 骨髓炎。

【来源】 精选八百外用验方

足 跟 痛

足跟痛主要指跟骨底面由于慢性损伤所引起的疼痛，常伴有跟骨结节部前缘骨刺。

方一

【组成】 当归12克 没药12克 五加皮12克 皮硝10克 青皮10克 川椒6克 香附子12克 丁香6克 地骨皮12克 丹皮10克 老葱6克 麝香0.6克

【用法】 将药物研细末，调拌醋或白酒，敷贴患处，配合针灸推拿术。

【主治】 足跟痛。

【加减】 肝肾不足加五味子12克，菟丝子20克；疼痛剧烈加穿山甲12克，川乌12克。

【注意】 ①患者以穿布鞋或海绵鞋为宜。②用适量的醋、盐、姜煎水，熏熨双足。③行走时间不宜太长，少跳动，特别是不宜作直立足跟落地的跳动。

【来源】 中国民间敷药疗法

方二

【组成】 威灵仙30克 苏木屑30克 香樟木30克 藏红花10克 米醋500克

【用法】 先将上药加水浸泡，再煎煮取汁，稍浓缩，然后加入米醋拌匀，盛于盆内备用。用时将药温热，浸洗患处，每日1~2次，每次15分钟。

【主治】 足跟痛。

【来源】 中国当代名医验方大全

方三

【组成】 地鳖虫40克 五灵脂、白芥子、制草乌、三棱各30克 威灵仙、楮实子、马鞭草、苏木、海带、皂角刺、蒲公英、延胡索、汉防己各60克

【用法】 上药加水2倍量，用旺火煎沸后再煎3~5分钟，取出热药液和渣，加鲜葱100克、食醋100毫升，置盆中，温热时浸患足跟，每次不少于30分钟，日2次。每剂药用2日。

【主治】 足跟痛。治疗33例，治1次后不痛者13例，2~4次不痛者5例，有进步者10例，无效5例。

【注意】 本方孕妇禁用。其它部位之骨刺可用本药液湿敷。

【来源】 陕西中医 1984；5（10）：19

方四

【组成】 麻黄、制川乌、制草乌、制乳香、制没药、地龙、赤芍、白芍各10克 红藤30克 延胡索10克 桂枝 紫丹参各15克

【用法】 上药加水3000毫升浓缩至1500毫升，先以一半药液浸足，同时用药渣擦洗患部，再将余药分次倒入浸洗患足，在药液尚有余热时擦干患足穿上鞋袜。每日2次，每剂药用2日，10日为1疗程。

【主治】 足跟痛。治疗78例，经10~70日治疗，痊愈22例，显效38例，好转14例，无效4例，总有效率为94.87%。

【加减】 若为骨刺型加寻骨风、透骨草各15克；外伤型无红肿者加桃仁10克，红花6克，忍冬藤15克；寒湿型加附子、干姜、细辛各10克，薏苡仁15克。

： 【来源】 江苏中医 1988，9（9）：31。

损 伤

损伤主要是软组织损伤，多因人体各关节筋络肌肉遭受外来暴力撞击，或因强力扭转，或因牵拉压迫行走等造成。临床上分为急性损伤和慢性损伤两种。症见瘀血红肿，疼痛难忍，关节损伤处用力时疼痛加剧。

方一

【组成】 老材香（即松香由黄转黑，代琥珀用）、象皮、血竭、胆南星、藏红花、防风、白芷、马钱子、海螵蛸、升麻各15克 乳香24克（去油） 没药30克（去油） 雄土元12克 生龙骨、当归、菖蒲、蟹骨、麝香各9克

【用法】 上药共为细面，研至无声为度，装入瓶内，勿使泄气。血流不止者，将药面撒敷在伤处，立即止痛止血，未破溃者，用冷开水调和涂于患处。

【主治】 跌打损伤，流血不止或未破而皮肤黑紫者，或被重物折压而致瘀肿疼痛难忍者。

【来源】 古今名方

方二

【组成】 大黄6克 栀子12克 木瓜20克 姜黄3克 黄柏12克 乳香20克 鸡血藤30克 桃仁12克 红花9克

【用法】 将药物研细末，调拌凡士林，敷贴损伤处。根据病情，可配合拔罐、刺血、推拿或温灸穴位。

【主治】 损伤。

【注意】 包扎敷药后，不宜过分活动患处，应适当休息，防止感冒，防止风寒侵袭。

【来源】 中国民间敷药疗法

方三

【组成】 三七、大黄、儿茶、天竺黄、血竭、制乳香、制没药、制藤黄各60克 阿魏 雄黄各30克 冰片 牛黄、麝香各7.5克

【用法】 上药研末，炼蜜为丸。外用：用醋磨敷患处。内服：每服3克，开水送下。

【主治】 损伤。

【注意】 本方有毒性药物，服用下可过量，孕妇忌内服。

【来源】 古今名方

方四

【组成】 阿魏90克 萆澄茄30克 桃仁15克 胡椒、乳香、没药、三棱、青皮、莪术、五灵脂各9克 血竭6克 白信1.8克 冰片1.2克 麝香0.6克

【用法】 上药熬膏贴于布上，敷贴患处。

【主治】 跌打损伤。

【注意】 孕妇忌贴腹部。

【来源】 通行方

方五

【组成】 血竭30克 麝香0.15克 冰片 0.36克 乳香、没药、红花各4.5克 朱砂3.6克 儿茶7.2克

【用法】 上药共研为极细末，密贮。用时烧酒调敷患处，或冲服或开水送服，每服0.21克（七厘）。

【主治】 跌打损伤、骨折、血瘀肿痛、金刃折伤等证。

【注意】 孕妇不可内服。

【来源】 古今名方

伤 筋

各种暴力或慢性劳损等原因所造成的筋的损伤，统称为伤筋。筋的范围比较广泛，主要是指筋膜、肌腱、韧带，还包括皮下组织、部分肌肉、关节囊、关节软骨等组织。因此在四肢及腰背部位，除了坚硬的骨骼外，各种软组织都属筋的范畴。

方一

【组成】 红花、鸡血藤、川乌、威灵仙、防风、蛇蜕、延胡索、首乌、续断、冰片、樟脑、陈醋、薄荷脑、冬青油、颠茄流浸膏各适量

【用法】 上药共制成膏药。用时将皮肤洗净擦干，贴于患处。每日更换1次。

【主治】 伤筋（膝部伤筋、足踝部伤筋等）。

【注意】 皮肤糜烂，见渗液、出血、化脓者均不宜贴

用。密闭贮藏，置阴凉干燥处。

【来源】 辽宁省药品标准（1986年）

方二

【组成】 生川乌 麻黄 当归 土鳖虫 羌花 猪牙皂

【用法】 上药共制成膏药。用时先将患处用生姜擦净，然后将膏药加温软化贴于患处或穴位上。

【主治】 伤筋（躯体、肌肉、筋骨酸麻胀痛、行动艰难者）。

【注意】 孕妇忌贴于脐腹部。

【来源】 北京市药品标准（1980年）

腰部急性扭挫伤

多因腰部突然遭受间接外力所致，如搬运重物时用力不当，或扭转腰部时突然损挫，或跌仆倒地时腰部扭挫伤。症见腰部屈伸、扭转困难，疼痛难忍。

方一

【组成】 羌活、麻黄、当归、独活、生附子、苍术、草乌、升麻、半夏、川乌、白芷、姜皮、桂枝、菖蒲各50克
公丁香100克 香油1500克

【用法】 香油浸上药7日，熬枯去渣，炼至滴水成珠，下黄丹3000克，搅匀待冷备用，外敷患处。

【主治】 急性扭挫伤。如闪腰、岔气，跌打损伤等。

【来源】 疡医大全

方二

【组成】 金刚莲、甘草各300克 当归、五加皮各250克 川芎、紫草茸各180克 三棱、莪术、苏木、枳壳、青皮各90克 见血清红毛藤根各120克 桂枝150克 大血藤60克 白酒30000克

【用法】 以上各药为饮片，均放入有盖大缸中，再入白酒20000克，密封浸渍一周后，用纱布滤过，另放缸中密闭贮存。其残渣再用白酒10000克浸渍一周，如法用纱布滤过，将上两次浸渍溶液混合待用。成人每晚睡前10~20毫升。外擦兼内服。

【主治】 扭挫伤和风湿病患者。

【来源】 古今名方

方三

【组成】 马前子12克 骨碎补20克 生南星10克 三七20克 威灵仙12克 羌活10克 独活10克 乳香12克

【用法】 将药物研细末，调拌凡士林。在配合针灸、推拿施术后，敷贴患处。

【主治】 腰部急性扭挫伤。

【注意】 一旦腰伤，防止感冒和外寒入里，忌房事，配合内服中成药。

【来源】 中国民间敷药疗法

第六章 儿 科

鹅 口 疮

鹅口疮为口腔舌上满布白屑，状如鹅口，故名，多为口腔不洁、感染邪毒（白色念珠菌所致。本病多发于新生儿、久病体弱、营养不良的婴幼儿，长期应用广谱抗菌素，引起菌群失调，也可继发本病。重病患者，白屑可蔓延鼻道、咽喉或气管，影响呼吸和吮乳。

方一

【组成】 米醋适量 吴茱萸1.6~4.7克

【用法】 用吴茱萸研末，取半醋（加温）适量调匀，每天晚上布包敷患儿足底涌泉穴1次。连服3次痊愈，可消肿止痛。

【主治】 鹅口疮。

【注意】 本方适用于全身发热不明显者。如有起泡者可停用。

【来源】 浙江中医药 1977；3（1）：15

方二

【组成】 莱菔子、白芥子、地肤子各10克 食醋适量

【用法】 上药用沙锅文火炒至微黄，共研为细末。调成

膏状。把药膏分涂于2厘米见方的纱布或白布上，膏厚2毫米，1厘米见方将其贴于患儿两侧涌泉穴，胶布固定。可消炎止痛，每日1次，可连用3~5天。

【主治】 鹅口疮。

【来源】 湖北中医杂志 1984；（2）：21

方三

【组成】 五倍子、明矾各等份 冰片少许

【用法】 将五倍子、明矾分别捣碎如米粒，和匀，放于沙锅内用文火炙炒，并以竹筷不停搅拌，溶合释放水分如枯矾状，离火冷固取出，研极细粉末，另研冰片少许加入拌匀，贮瓶备用，以净指蘸冷开水粘药粉少许涂患处，每日1—3次。可解毒、燥湿、生肌、疗疮。

【主治】 鹅口疮。

【来源】 新中医 1981；（10）：30

方四

【组成】 乌梅炭、枯矾、儿茶各9克 硼砂1.5克

【用法】 先将乌梅放置锅内，用烈火煨，使乌梅肉变成褐色即可（不要煨制过火），备用。再把枯矾研末，然后按剂量将乌梅炭等混合研为细末，最后加冰片1.5克即成。将口腔溃疡面清洗后，把药粉均匀撒布疮面上。3次为1疗程。可解毒、收湿、敛疮、生肌。

【主治】 鹅口疮。

【来源】 新中医 1974；（1）：21

方五

【组成】 细辛6克

【用法】 研为细末，分作5包，先用1包，以米醋调成糊状，外敷脐部。每天用1包，连用4~5天。

【主治】 鹅口疮。

【来源】 新中医 1974；（1）：12

方六

【组成】 米粽箬100克 甘草10克 冰片2克 早稻秆灰适量

【用法】 将米粽箬100克，用早稻秆灰汤浸煮烧成灰，和甘草、冰片共研细末，用时拿棉棒蘸药扑于患处，每日3~6次，治疗1~3天。

【主治】 鹅口疮。治疗78例全部治愈。

【来源】 浙江中医杂志 1986；（7）：295

方七

【组成】 板蓝根10克

【用法】 上药煎浓汁，用棉花团蘸药液反复擦洗患处，1日5~6次，10次为1疗程。

【主治】 鹅口疮。治疗21例，最短半天，最长4天全部治愈。

【来源】 新中医 1974；（3）：21

胎 黄

胎黄，是指婴儿出生后全身皮肤、两目、小便发黄，因与胎孕等因素有关，故古代医家称之为“胎黄”或“胎疸”。本病多为湿热之邪所致，或小儿脾气虚弱，郁久成疸，或小儿先天禀赋不足，胆汁不循常道运行而外溢出现黄疸。与西医学的新生儿生理性黄疸、溶血性黄疸、乳幼儿肝炎、胆汁粘稠综合征、胆道畸形类似。

方一

【组成】 茵陈、栀子、大黄、芒硝各30克 杏仁6克
常山、鳖甲、巴豆霜各12克 豆豉60克

【用法】 上药共煎汁，用纱布蘸药热敷脐部，每日3~4次，每次15~30分钟，3天为1疗程。

【主治】 初生胎儿黄疸。有效率达100%。

【来源】 辽宁中医杂志 1980；（1）：39

方二

【组成】 大黄、硝石、黄柏、山栀各10克

【用法】 上药共煎汤1000毫升，擦洗患儿全身，每日2次，3次为1疗程。

【主治】 新生儿黄疸。有效率达99%。

【来源】 经验方

泄 泻

小儿泄泻乃临床常见疾病。小儿脾胃薄弱，无论内伤乳食、外感六淫均可引起消化、吸收功能障碍，而致泄泻。本病四时皆有，以秋季为多，两岁以下婴幼儿尤为多见。发病后易耗气伤液，重症可伤阴损阳，产生危笃之变。迁延日久，常导致小儿营养不良，生长发育迟缓，疳积等症。本病相当于现代医学的婴幼儿消化不良、脂肪泻、肠吸收不良综合征、病毒性肠炎等病症。

方一

【组成】 干姜、艾叶、小茴香各20克 川椒15克 鲜姜30克

【用法】 上药共为细末，以鲜姜30克捣烂拌匀，敷小儿脐上。并用热水袋保持温度，昼夜连续，5日为1疗程，或病愈为止。

【主治】 小儿虚寒及风寒泄泻。治疗98例，痊愈93例。

【加减】 腹胀不矢气者加草拨9克；小便少者加葱白7根；大便黄粘、呕吐痰涎者加大蒜5瓣。

【来源】 中医杂志 1987；28（2）：50

方二

【组成】 肉桂、白头翁、马齿苋、小茴香各等份

【用法】 上药烘干，研末，麻油炼丹后入药粉收膏，每张药膏重3克，用时将膏药用文火烘化后，贴敷于神阙穴

处。3日内效果不明显者可更换1次。

【主治】 小儿各型腹泻。治疗200例，痊愈100例，好转97例；无效3例，总有效率为98.5%。

【来源】 安徽中医学院学报 1989；8（4）：31

方三

【组成】 藿香、苏叶、白芷、桔梗、升麻、柴胡各50克
姜半夏、厚朴、苍术、生山楂、莱菔子、山药、大腹皮子各
60克 猪苓、泽泻、陈皮、枳实、茯苓各40克 桂枝、砂
仁、人参、干姜各30克

【用法】 上药碾为粗末，放入75%酒精中（酒精与药末之比为1：1.5），浸泡1周，去渣取汁，并用蒸馏法提取精制药液，装瓶备用。治疗时，用胶布条将1粒赤豆大之棉球固定于穴位，用滴管滴药使棉球饱含药液。选穴：神阙、天枢、中极、足三里、气海、腋窝。每次取3~4穴，敷贴20分钟，每日3~6次。

【主治】 寒湿泻。治疗67例，痊愈45例，好转21例，总有效率为98.5%。

【来源】 江苏中医杂志 1987；8（10）：27

方四

【组成】 绿豆粉10克 鸡蛋1个

【用法】 将蛋黄去掉，用蛋清调绿豆粉敷于囟门上，泻止去药（亦可用糯米粉10克代替绿豆粉）。

【主治】 婴幼儿消化不良所致之腹泻。

【来源】 中医杂志 1990；31（4）：54

方五

【组成】 苦参 苍术

【用法】 上二味各研细末，以米醋调敷两足心，外用纱布包裹，4~12小时换药1次。

【主治】 小儿湿热泄泻。

【加减】 热重者苦参、苍术之比为3:1；湿重者为1:3。

【来源】 中医杂志 1990；31(4):54

方六

【组成】 葛根50克 白扁豆100克 车前草150克

【用法】 上药加水2000毫升，水煎20~30分钟，取药液入盆，兑温开水以超过足踝为度，水温保持30℃左右，浸泡脚部30~60分钟，每日2~3次。

【主治】 湿热泄泻。治疗97例，痊愈67例；有效26例，有效率为95.8%。年龄最小为3个月。

【加减】 伤食泄泻加莱菔子20克，脾虚泄泻加凤仙花30克或桂枝50克。

【来源】 山东中医杂志 1989；(2):12

方七

【组成】 川椒2份 肉豆蔻1份

【用法】 上药共研成细末，填入脐窝，外贴暖脐膏或伤湿解痛膏，每日换药1次。

【主治】 小儿寒泻，伤食泻。

【来源】 小儿卫生总微论方

麻 疹

麻疹又称“痧子”，是由麻疹病毒引起的一种小儿常见发疹性传染病，在古代被列为儿科四大要证之一。本病多见于半岁以上的婴幼儿，1~5岁发病率尤高，流行于冬春二季，但四季均可发生。本病初起，高热3天，以后遍身出现红色疹点，因稍见隆起，扪之碍手，故名麻疹。解放后，实行了预防接种，降低了本病发病率并控制了流行。

方一

【组成】 朱砂2.5克 牙皂3.5克 枯矾2克 白芷1.5克 雄黄2.5克 防风2克 桔梗2克 半夏2克 麝香0.3克 藿香2克 贯众2克 陈皮2克 薄荷2克 细辛1.5克 甘草2克 苍术3克 苍耳子2克 辛夷2克

【用法】 上方共研细末，加90%凡士林制成软膏备用，用时用棉棒蘸少许软膏，轻轻涂于鼻内前庭，每天涂1次，共涂6次为1疗程。

【主治】 预防麻疹，对于已发者能减轻症状。

【来源】 浙江中医杂志 1958；（1）：48

方二

【组成】 生麻黄9克 桂枝9克 浮萍15克 西河柳15克 樱桃核15克 芫荽子15克

【用法】 上药水煎1000毫升，煎好后用毛巾乘热蘸湿，轻轻擦熨头面、心胸部、皮肤，稍冷即换，如此反复5~10分钟，每日4~5次，每剂药使用2~3次后更换，2~3天

为1疗程。

【主治】 麻疹透出不畅。有效率达100%。

【来源】 赤脚医生杂志 1974；（2）：29

方三

【组成】 活鸡1只 雄黄粉3~9克

【用法】 剖开鸡胸，不去内脏，将雄黄粉撒入，连血和毛一起，乘热敷在患者胸部或患处，待凉后再取下，每日1次，连用2次。

【主治】 小儿麻疹重症。有效率达100%。

【来源】 湖北中医杂志 1982；（2）：21

方四

【组成】 鸡蛋1枚 生葱3株 胡荽2.5克

【用法】 将鸡蛋连壳放入药汤内煮熟，取蛋备用，乘热用蛋搓患者，从头面到躯干，次至上肢、下肢，蛋凉再煮再搓，连续3~4遍后，盖衣被取微汗，每日1次，连用2次为1疗程。

【主治】 疹发不畅。有效率达100%。

【来源】 福建中医药 1963；（6）：20

方五

【组成】 葛根6克 牛蒡子6克 连翘6克 薄荷2克
蝉蜕2克 荆芥5克 桔梗5克 前胡8克

【用法】 上方煎2~3次备用，每次取煎液30毫升，保留15分钟灌肠，每日1次，连续3~5次。

【主治】 麻疹出不透。有效率达100%。

【来源】 江西中医药 1985; (2): 61

方六

【组成】 鲜芫荽（或西河柳、紫背浮萍）60克 生姜
葱白各30克 酒适量

【用法】 上药切碎布包，蘸热酒在全身上下揉擦，重点是疹点未出部位，或上药共煎水，趁热取液，用纱布蘸水擦浴上述部位。

【主治】 麻疹迟迟不出或见受寒隐没者。

【注意】 擦时要避风，擦后盖被。

【来源】 小儿外治疗法

水 痘

水痘又名水疱，是由于水痘病毒引起的一种常见的小儿急性发疹性传染病。症见发热，皮肤疱疹，其形椭圆，其色清莹明亮，内无浓浊痘浆，故名水痘。本病出疹的特点是次序先后不一，参差不齐，皮肤上丘疹、疱疹、干痂，往往此起彼伏，同时并见，为其特征。痂脱后，大多无疤痕，若因搔伤可留下浅痕。本病多流行于冬春季节，以1~4岁小儿为最多见，预后良好，病后大多终生不再感染。

方一

【组成】 银花、连翘、六一散、车前子各10克 紫花地丁、黄花地丁各15克

【用法】 上药共煎汤100毫升，兑入温水中外洗患部（最好用烧开后放温的水），每日1~2次，3天为1疗程。

【主治】 水痘。治疗114例，全部于6~48小时退热，2~4天结痂，无一例出现并发症。

【来源】 中医杂志 1989；30（3）：10

方二

【组成】 青黛30克

【用法】 青黛研末，用脱脂棉蘸之扑于患处，每日3~4次，3~5天为1疗程。

【主治】 小儿水痘。有效率达100%。

【来源】 中医儿科学

方三

【组成】 朱砂、雄黄、没药、血竭各9克 麝香1.5克

【用法】 将前4味研末，入麝香，用棉纸卷之如铅笔粗，蘸麻油用火柴点燃，持之灸患处，每日2~3次，3天为1疗程。

【主治】 水痘。可促使其早日结痂，有效率达100%。

【来源】 中国民间疗法

百 日 咳

百日咳是由百日咳杆菌引起的一种小儿呼吸道传染病。因其病程较长，缠绵难愈，故名百日咳。又因阵发性痉咳可停顿缓解片刻，又再次发作，日达数次至数十次，故又名顿咳。本病多发生于冬末春初，以1~5岁小儿较易感染，10岁以上儿童则渐少见。年龄愈小，病情愈重。若无并发症，

预后一般良好。病后一般可终生不再感染。

方一

【组成】 大蒜适量

【用法】 先将大蒜捣烂备用，再将双足底薄涂上一层猪油或凡士林，然后将大蒜泥敷在涌泉穴，用纱布包扎固定。临睡时敷上，次日清晨去除。

【主治】 百日咳。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 吴茱萸、生大蒜、细辛、葶苈子、檀香、百部各10克 甘遂5克 麝香1克

【用法】 上药研极细末，用时取药粉10克，用胆汁（猪胆汁或鸡胆汁）适量调至稠膏状，分别贴于涌泉、神阙、身柱、膏肓等穴，每日1次，1次贴8~12小时。

【主治】 百日咳。治疗86例，经治3~11次后，显效76例。

【来源】 江苏中医 1988；9（7）：23

方三

【组成】 百部、麻黄、白芨、黄连、甘草各60克 芦根150克

【用法】 用麻油熬枯、去渣、过滤、沉淀，再熬至滴水成珠时，下黄丹收膏备用。用时取药膏贴于气户、库房、风门、肺俞、身柱穴，一次取穴3~4个，轮流贴药，每日1次，每次贴12~24小时，连用7日为1疗程。

【主治】 百日咳。

【来源】 中医外治法集要

方四

【组成】 白芥子、紫苏子、莱菔子各40克 生姜5片
食盐250克

【用法】 上药焙干，混合并共研细末，炒热至50℃左右，装入薄纱布袋，扎紧袋口，在患儿背部两侧及腋下来回熨烫30~40分钟，每日2~3次，1剂药可连续使用2~3天，每次治疗前，药末必须经过再加热。

【主治】 百日咳。治疗118例，治愈率达100%。

【来源】 广西中医药 1990；13（2）：6

白 喉

白喉是由白喉杆菌引起的一种烈性传染病。常流行于秋末冬春之际，在气候干燥的环境更易传播流行，患者以小儿居多。临床表现为全身毒血症及鼻、咽及喉部粘膜有白色假膜形成，并可伴有心肌炎及神经麻痹。中医称本病为白喉，或称“白缠喉”、“疫喉”。

方一

【组成】 牛黄0.6克 珍珠0.9克 冰片0.9克 琥珀0.9克 硃砂0.9克 血竭3克 龙骨3克 儿茶3克 乳香3克 没药3克 五倍子30克 象皮3克

【用法】 上药研细粉，调匀，以棉签蘸药粉，涂于患处，1日3次。

【主治】 风热、火热之白喉。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 黄柏18克

【用法】 加水煎成药液，从喉头雾化喷入，每日3次。

【主治】 火热之白喉。

【来源】 中医外治方剂手册

方三

【组成】 鲜土牛膝根3~4克

【用法】 将上药微剥去粗皮，洗净、捣烂、绞汁，兑入人乳适量（以淹没药物为准），浸泡30分钟，每隔10~20分钟，将药液数滴点入鼻中，使之流入咽喉，吐出痰涎。

【主治】 痰火壅盛之白喉。

【来源】 安徽中医验方第一集

方四

【组成】 赤小豆12克 大黄12克 牛蒡子9克 芙蓉叶12克 文蛤9克 燕窝泥9克

【用法】 上药共研细末，以果汁、陈茶叶泡汁、白酒各适量调匀，微炒加温，待冷后敷颈部痛处。

【主治】 白喉。

【来源】 白喉证治歌诀

方五

【组成】 黄连适量

【用法】 将黄连煎沸30分钟后，去渣，用其黄连浸液热蒸汽口腔吸入。

【主治】 痰热白喉

【来源】 中医咽喉科学

急性腮腺炎

急性腮腺炎是由腮腺炎病毒所引起的一种急性传染病。临床以发病急骤，一侧或两侧腮腺肿痛为特征。中医称之为“炸腮”。多发于冬春两季，以5~9岁小儿最多见。预后一般良好，个别病例可并发脑膜炎和睾丸炎。患病后一般可终生不再感染。

方一

【组成】 相思子适量 鸡蛋清适量

【用法】 将相思子微火炒成黄色，研为细末。用时将药粉加入适量鸡蛋清调成糊状软膏，涂于塑料布或油纸上面敷贴患处，膏药面积要大于病灶部位，每天换药1次，一般敷药2~3次可愈。

【主治】 急性腮腺炎。治疗485例，治愈率达100%。

【来源】 新中医 1974；（6）：48

方二

【组成】 蟾蜍适量

【用法】 取蟾蜍用清水洗净后去头及耳后腺，将皮剥下剪成膏药样，青皮向外直接贴于患处，8小时左右可自然干燥而脱落，脱落后可浸于水中重贴或更换新鲜蟾蜍皮继续贴患处，待肿消为止，一般三日可愈。

【主治】 疔腮。

【来源】 江苏中医杂志 1981；（6）：50

方三

【组成】 新鲜白头蚯蚓5~6条

【用法】 清洁蚯蚓脏泥（勿用水冲洗），将蚯蚓置碗中，加等量白糖搅拌，约半小时后成糊液状。用此糊液浸湿纱布，将纱布敷于患处，约3~4小时换药1次，1日3~4次。换药前用淡盐水洗净患处。一般1~3天可愈，

【主治】 疔腮。治疗170例。治愈率100%。

【来源】 中医杂志 1966；（2）：33

方四

【组成】 吴茱萸9克 冰片2克 青黛30克 米醋适量

【用法】 将吴茱萸、冰片共研为细末，以米醋调成糊状，敷双足涌泉穴，外用纱布包扎，1日换药1次；以米醋调青黛涂搽肿痛处，药干后可重复再涂，1日数次。一般2~4天可愈。

【主治】 疔腮。

【来源】 广西中医药 1987；（2）：2

方五

【组成】 鲜威灵仙根50克 米醋250克

【用法】 将威灵仙浸于米醋中3天，再用棉签蘸取药液涂患处，每2~3小时涂搽1次。

【主治】 炸腮。

【来源】 小儿外治疗法

方六

【组成】 蟾蜍1只

【用法】 将蟾蜍用清水洗净，去头得耳后腺，将皮剥下，围绕耳后腺剪成药样，表皮向外，直接贴于患处，8小时左右自然干燥脱落，可浸水后重贴或更换新皮敷贴，肿消止。

【主治】 炸腮。

【来源】 行篋检秘

遗 尿

遗尿又称遗溺，是指3周岁以上小儿，夜间睡眠中，小便自遗于床上，醒后方觉，故又称“尿床”。本病是由肾气不足，下元虚冷，不能温养膀胱，或久病肺脾气虚，不能通调水道，膀胱制约无权；或肝经湿热，进而影响膀胱，致使疏泄失常所致。亦可因小儿不良习惯，或感染蛲虫等引起。本病可见于西医学神经性膀胱功能障碍，先天性大脑发育不全，泌尿系炎症等疾病。

方一

【组成】 硫磺30克 大葱120克

【用法】 硫磺研末，再和大葱共捣如泥，烘热，装纱

布袋，敷脐，外用纱布包裹，或用胶布固定。每晚1次，连敷7~10天。

【主治】 下元虚寒所致遗尿。

【来源】 中医外治法集要

方二

【组成】 王不留行籽适量

【用法】 耳穴取膀胱、肾、脾、胃、心、神门、脑点。常规消毒一侧耳廓，将王不留行籽粘在 0.3×0.3 平方厘米的胶布上，对准以上所选穴位贴压。嘱其每日按压3次，每次5分钟，睡前必须按压1次。每6日两耳交替贴压1次。治疗期间定时唤醒小儿小便。

【主治】 遗尿。据报道治疗4~6岁小儿100例，治愈74例，显效13例，好转9例，无效4例。效果好的治疗3次即痊愈。

【来源】 中医药学报 1987；（4）：32

方三

【组成】 白降丹少许 圆刃手术刀片1个 无菌棉签1根

【用法】 按白降丹划点法操作，由耻骨联合至左右髂前上棘各划1条线，划点曲骨、中极、关元、气海4个穴，并配合肾俞、膀胱俞、阳陵泉、三阴交。第一次划点后，隔1天作第二次划点，以后每隔2天作1次，10次为1疗程。疗程之间休息10~15天。一般1个疗程即显效，2~3个疗程可痊愈。

【主治】 遗尿。

【来源】 白降丹划点疗法

方四

【组成】 桂枝、麻黄、雄黄、没药、蟾蜍、乳香 各 5 克 麝香 3 克

【用法】 上药共研细末，瓶贮备用。用时取药粉加入适量酒精调成稠膏，做成饼状，贴于所选的穴位上（一般每次选1~2个穴），盖上夹有塑料薄膜的纱布，胶布固定，每天换药1次，连续3次为1疗程，间隔3天再作第2疗程。

【主治】 遗尿。

【来源】 中医儿科学

脑 积 水

脑积水是由于脑脊液循环障碍，颅内脑脊液量增多而产生的病症，患者头颅显得特大，骨缝分裂，颅内压增高，常伴发一定程度的智力落后。临床特点为头颅呈均匀性扩大，骨缝裂开，前囟扩大而饱满，头皮静脉怒张，双目下视如落日状。

方一

【组成】 肉桂、细辛各15克 干姜3克 人乳汁（或猪胆汁）适量

【用法】 取前3味药研细末，用人乳汁或猪胆汁调匀，摊纱布上，按颅裂部位外敷，外以纱布包扎，药干则换，直至痊愈。

【主治】 脑积水。共观察11例，总有效率为81.8%。

【注意】 用时配合内服加味六味地黄汤。

【来源】 浙江中医杂志 1988; (5): 219

方二

【组成】 吴茱萸、附子各等份 醋少许

【用法】 前2味药研细末，用醋调成糊状，敷于涌泉穴，每日1次，10次为1疗程。

【主治】 脑积水。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 苦丁香3克 白丁香0.3克

【用法】 上药共研细末，每次吹入鼻中少许，日3次，1剂为1疗程。

【主治】 脑积水。

【注意】 同时配合内服中药。

【来源】 浙江中医杂志 1989; (12): 568

方四

【组成】 天南星

【用法】 天南星炮去皮为末，淡醋调稀帛上，贴囟门，热物熨之。日2~3次，每次30分钟左右。3~5日为1疗程。

【主治】 脑积水。

【注意】 同时配合内服中药。

【来源】 万病单方大全

小儿肺炎

肺炎是小儿时期常见病、多发病，2岁以下的婴幼儿发病率较高，四季均可发病，以冬春季为多见。临床以发热、咳嗽、气促、鼻煽为主症。其他在麻疹、感冒以及任何疾病过程中，由于正气虚弱，亦可并发或继发本病。本病相当于中医的感冒、咳嗽、喘证以及惊风等病症。

方一

【组成】 天花粉、黄柏、乳香、没药、樟脑、大黄、生南星、白芷各等份

【用法】 上药研为细末，以温食醋调和成膏状，置于纱布上，贴于胸部（上自胸骨上窝、下至剑突，左右以锁骨中线为界），每日12~24小时更换1次，可清热泻火，活血化瘀。1周为1疗程。

【主治】 小儿支气管肺炎。

【来源】 赤脚医生杂志 1978，（1）：26

方二

【组成】 桑叶15克 杏仁10克 知母15克 前胡10克 白前10克 桔梗6克 甘草3克 金银花20克 鱼腥草20克

【用法】 用壶式雾化法，将气雾吸入，1日3次，5~7天为1疗程。

【主治】 支气管肺炎。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 白芥子30克 苏子30克 吴茱萸30克 制香附30克 生姜30克 食盐250克

【用法】 上药共炒至烫手为度，以稍厚的布包扎，立即在患儿背部熨烫，次日更换部位，每次30分钟，使皮肤潮红，出汗为度。每日1次，1剂药可连用6次，6次为1疗程。

【主治】 小儿肺炎。

【来源】 吉林中医药 1986，（4）：7

方四

【组成】 肉桂12克 丁香18克 川乌15克 草乌15克 乳香15克 没药15克 红花30克 当归30克 川芎30克 赤芍30克 透骨草30克

【用法】 上方做成10%油膏敷背，每日2次，5~7天为1疗程。

【主治】 肺炎（湿罗音久不消失）。

【来源】 上海中医药杂志 1980，（2）：31

方五

【组成】 苍术50克 麻黄50克 鸡蛋1个 水500毫升

【用法】 以上成份纳入锅中，文火煎30分钟，趁热以蛋熨肺俞及双涌泉穴，蛋凉再煎，反复滚熨3~5次，5天为1疗程。

【主治】 小儿肺炎。

【注意】 注意不要烫伤皮肤。

【来源】 吉林中医药 1985，（6）：25

方六

【组成】 白芥子（炒）30克 面粉30克

【用法】 将白芥子研为细末，加入面粉，用水调为糊状，以稀纱布包好，敷于背部第三、四胸椎处，每天1次，1次15分钟，敷后检查2次，如见皮肤发红，即可将药去掉。连敷3天。

【主治】 小儿肺炎后期，痰多不净者。

【来源】 民间民间疗法

方七

【组成】 白毛夏枯草、板蓝根各30克 生麻黄3克

【用法】 上药加水煮沸，在药罐盖上留1小洞，对口鼻作蒸汽吸入，每次5~10分钟，每日2次。

【主治】 新生儿肺炎。

【来源】 小儿外治疗法

夜啼

小儿夜啼主要见于初生婴儿，其主要特征是白天比较安静，入夜啼哭，持续不已，甚至通宵达旦，因白天安静，故与小儿疾病所引起的啼哭不同。此外，若因伤食，停食，饥饿，尿布浸湿，皮带过紧，皮肤搔痒等引起的啼哭者，不属于本病的范围。

方一

【组成】 朱砂0.5克 五倍子1.5克

【用法】 将药物共研末，再与适量茶叶拌匀，加入水捏成饼状敷于脐内，每天更换1次。

【主治】 夜啼。

【来源】 山东中医杂志 1984；（5）：46

方二

【组成】 五倍子30克

【用法】 将五倍子烧存性研末，用乳母口水调作饼，外贴患儿脐部，以布固定。

【主治】 小儿夜啼。

【来源】 穴敷疗法聚方捏

方三

【组成】 吴茱萸15克

【用法】 将药物研末，用醋调敷两足涌泉穴，外用纱布固定。

【主治】 脏热心烦之夜啼。

【来源】 中草药外治疗法

方四

【组成】 乌药、香附、紫苏、陈皮、小茴香、食盐各等量

【用法】 上药共炒热布包熨患部。

【主治】 脾寒之夜啼。

【来源】 中草药外治疗法

方五 宁啼散

【组成】 牛蒡子5克 珍珠粉、朱砂各1克

【用法】 上药共研细末，每晚用1克，填脐包扎。

【主治】 夜啼属高热者。

【来源】 小儿外治疗法

小儿麻痹症

小儿麻痹症，又称脊髓灰质炎（简称灰髓炎），是由脊髓灰质炎病毒引起的急性传染病，以发热、呼吸道及消化道症状，继而发热，中枢神经症状及分布不规则的弛缓性瘫痪为特征。本病多见于1~5岁的幼儿，常流行于夏秋季节，在麻痹前期具有较强的传染性。祖国医学有关本病的记载分散在“温病”、“小儿中风”、“婴儿瘫”、“痿证”、“痿痹”、“小儿半身不遂”、“软脚瘟”等范畴。

方一

【组成】 姜黄 羌活 独活 良姜 干姜 豆豉 乳香 樟香 陈皮 风叶 吴萸 薄荷 坤草 商陆 没药 桐皮

【用法】 在小儿麻痹症患病肌体上先涂抹适量药液，用掌推法、掌揉法、轻捶法，由轻至重，按摩10~20分钟，每日3次。

【主治】 小儿麻痹症。

【来源】 广东中医 1962；（6）：34

方二

【组成】 生草乌 干姜 桂枝 伸筋草 川芎 丹参
络石藤 鸡血藤

【用法】 上药煎汁后待稍凉加白酒100~200毫升浸浴患处，每日1次。

【主治】 早期小儿麻痹症。

【来源】 浙江中医杂志 1984；19（8）：365

方三

【组成】 牛耳风150克 过江龙15克 走马胎15克
甘草15克

【用法】 水煎上药后去渣，先熏患肢待药凉后再洗患处，每日1次。

【主治】 小儿麻痹症。

【来源】 广西卫生 1975；（2）：37

小儿脐患

乃初生儿脐部疾患，系指断脐后出现的脐湿、脐疮、脐出血、脐突而言。脐带脱落前后，脐部湿邪浸淫久而不干，称为脐湿；脐周皮肤红肿热痛或形成脓疡，称为脐疮。二者皆由断脐时或断脐后，脐部处理不洁，或护现失宜，或受外邪所引起，相当于现代医学之脐炎。脐出血是指血从脐带创口处溢出，或从底部渗出，多由扎脐线结松脱或勒伤脐带，或胎热内盛迫血交行，禀赋不足，气不摄血引起。脐突是指因小肠或腹膜脂肪入脐中，致使脐部突起而肿大的一种疾

病。多因先天禀赋不足，脐部薄弱，加之断脐之后，婴儿啼哭过度，或较长时间的剧烈咳嗽，或努挣用力，致使脐环松大，小肠、脂膜突入脐中，膨出隆起，形成脐突，现代医学称为脐疝。

方一

【组成】 乌药适量

【用法】 将乌药与冷开水磨成药汁，涂擦于脐突部，不拘时间次数和药量，连续涂擦2~3日。

【主治】 脐突。

【来源】 常见病民间传统外治法

方二

【组成】 大黄、黄柏、姜黄、白芷各10克 南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各5克 天花粉20克

【用法】 上药共研细末，搅拌和匀，即为金黄散剂，然后以凡士林8/10，金黄散2/10的比例混合，调匀成金黄膏备用，用药前先以75%的酒精擦拭疮周皮肤，然后用生理盐水棉球将渗液揩拭干净，将金黄膏敷贴在患处，1日换药次，5次为1疗程。

【主治】 脐疮。

【来源】 医宗金鉴

方三

【组成】 荆芥适量 葱叶适量

【用法】 先将荆芥一味药水煎浓汤，次把葱叶捣烂如泥备用。用时先以荆芥汤液清洁皮肤，然后取葱白泥膏敷在

脐孔上，盖以纱布，胶布固定，每日1次。

【主治】 脐突。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方四

【组成】 黄柏（炒）、苍术（米泔水浸、炒）各等份
槟榔适量

【用法】 将上药研细混匀外用于脐中。

【主治】 脐中生水。

【来源】 古今名方

重 舌

重舌，又称“子舌”、“重舌风”，是指在舌下连根处红肿胀突出形如小舌的病证，为婴幼儿常见病。相当于现代医学舌下粘膜炎症或舌下腺囊肿。

方一

【组成】 枪硝5.4克 蒲黄1.2克 生僵蚕3克 牙皂0.45克 冰片0.3克

【用法】 上药研细末，吹入重舌处。

【主治】 重舌。

【来源】 医碁

方二

【组成】 吴茱萸末适量

【用法】 上药末外敷涌泉穴。

【主治】 火邪上炎之重舌。

【来源】 广西中医药 1989；6（3）：22

方三

【组成】 竹沥青 黄柏末

【用法】 上二味和匀，无时点重舌上。

【主治】 重舌。

【来源】 千金要方

方四

【组成】 蒲黄3克 露蜂房3克（微炙） 白鱼30克

【用法】 上药研细末，用少许酒调，敷重舌上，每天换药3次。

【主治】 重舌。

【来源】 中药外贴法治百病

方五

【组成】 鸡内金末

【用法】 急用上药末，干撒于重舌上。

【主治】 重舌。

【来源】 幼幼新书

方六

【组成】 人中白15克（煨存性） 细柏末9克 青黛18克 玄明粉9克 白硼砂9克 西瓜硝24克 冰片0.9克

【用法】 上为细末，小儿重舌初起针出恶血，搽药末适量。

【主治】 重舌。

【来源】 喉科指掌

方七

【组成】 地鳖虫2个 生薄荷5克

【用法】 上药共研成汁，纱布包敷舌下肿处。

【主治】 重舌。

【来源】 中药外贴治百病

尿布皮炎

尿布皮炎在发生于尿布遮盖部位的局限性皮炎，主要因尿液分解产物的刺激、湿尿布的浸渍等原因所致。临床以与尿布覆盖部位一致的红斑为皮损特征。与中医学的“溼尻疮”、“猴子疳”相类似。

方一

【组成】 苍术3份 青黛2份 黄柏1份 银花炭1份
冰片少量

【用法】 将上药研为极细末，用棉球直接扑于皮损区，每日2~3次，至愈为止。

【主治】 尿布皮炎。

【来源】 临床皮肤科杂志 1989；18（6）：337

方二

【组成】 生地榆10克 紫草10克 冰片1克

【用法】 将上药共入植物油中炸至黄色后去渣，冷却

后涂擦患处，1日数次。

【主治】 尿布皮炎有溃烂者。

【来源】 中医外治方药手册

方三

【组成】 青黛粉9克 儿茶末9克 黄柏9克 马齿苋9克 五倍子4.5克 冰片0.9克

【用法】 上药研细末混合，再入冰片，加凡士林125克，调匀为油膏。每次换药前，用淡生白矾水洗净患处，揩干。取纱布将油膏调匀摊薄，外涂患处，每2~3小时涂1次，至愈止。

【主治】 尿布皮炎。

【来源】 常见病中草药外治疗法

方四

【组成】 野菊花、银花、蒲公英、黄连、黄芩、黄柏各10~15克

【用法】 以上诸药任选2~3味煎汤取汁，湿敷患处。

【主治】 糜烂破溃之尿布皮炎。

【来源】 皮肤病中医诊疗简编

方五

【组成】 紫草、黄柏等量 生菜油适量

【用法】 将紫草、黄柏切碎，浸于加热后的菜油中。密封3天后备用。用时用棉签蘸油涂患处，1日2次。

【主治】 尿布皮炎。

【来源】 子母秘录

小 儿 湿 疹

小儿湿疹是发生于婴儿头面部的急性或亚急性湿疹状皮肤病，近年来认为是异位性皮炎的婴儿型。大多有遗传过敏史，喂养失当，消化不良，环境因素等都可能成为发病诱因。临床以湿疹样皮损为特征。属中医学的“奶癣”、“胎癣疮”范畴。

方一

【组成】 生苍术、生黄柏、雄黄等量

【用法】 上药共研细末，用生鸡蛋或香油适量，将药调成糊状，涂搽患处，一般1~2次即愈。

【主治】 湿热型小儿湿疹。

【来源】 浙江中医杂志 1988；23（11）：499

方二

【组成】 轻粉10克 黄丹10克 枯矾10克 松香10克
烟粉10克

【用法】 上药研细末，放入香油，配成油膏，涂搽患处。

【主治】 脾虚型小儿湿疹。

【来源】 中医皮肤病学简编

方三

【组成】 雄黄、樟脑、冰片、滑石粉各3克

【用法】 诸药混合研成细末，放入用布缝成的小包

内，挂于胸前（直接与皮肤接触），约半月1换，一般用2次即可。

【主治】 小儿湿疹。

【来源】 陕西中医 1985；6（7）：323

方四

【组成】 黄柏30克 豆腐1块

【用法】 将豆腐切成4小块与黄柏一起加水煮半小时以上，去黄柏，将豆腐捣匀敷患处。

【主治】 小儿湿疹。

【来源】 小儿外治疗法

惊 风

惊风是小儿时期常见的一种以抽搐伴神昏为特征的证候。又称惊厥，俗名“抽风”。起病急暴，属阳、属实者，统称“急惊风”；病久属阴、属虚者，统称“慢惊风”。类似于现代医学的惊厥，散见于高热、中枢神经系统感染、非感染性中枢神经系统疾患、中枢神经功能异常、中毒、维生素D缺乏而引起的疾病中。

方一

【组成】 安宫牛黄丸1粒 大黄苏打片10片

【用法】 将上述中药以温水100毫升溶解，注射器直接推入肛门，保留15分钟，肠鸣腹泻，燥屎排尽，热退抽止。

【主治】 小儿急惊风。

【来源】 陕西中医 1990, 11 (4) 号 183 页

方二

【组成】 银花20克 薄荷15克

【用法】 上药放入清水中浸润，蒸馏收集馏液，药渣加水适量，温浸1小时，浸液沉淀并浓缩至适量，合并馏液加入乙醇15毫升，加蒸馏水至100毫升。重点擦洗曲池、大椎、风池、风府及腋下。

【主治】 外感发热所致高热惊厥。

【来源】 中医杂志 1988; 29 (1) : 19

方三

【组成】 牙皂1克 麝香0.1克

【用法】 将上药共研细末吹鼻，每日3次。

【主治】 小儿惊风。

【来源】 中医药研究 1988; (1) : 25

方四

【组成】 全蝎7个 僵蚕14个 天南星10克 川乌6克

【用法】 将上药共研细末和匀，取少许吹入鼻中。

【主治】 慢惊风。

【来源】 婴童百问

方五

【组成】 大蒜头7个 僵蚕30克

【用法】 先将地面烧红，然后再将大蒜在地上磨成膏，将僵蚕去头皮安在蒜上，碗盖一夜，勿令泄气，取僵蚕

研末，用时取药末吹鼻。

【主治】 惊风。

【来源】 中藏经

小儿佝偻病

佝偻病是一种小儿常见病，是体内维生素D不足引起的全身性钙、磷代谢失常和骨骼改变。早期表现为易惊烦躁，或神志淡漠，多汗厌食，腹大背凸，晚期以骨骼系统病变为特征。现代医学将小儿佝偻病分为两大类：①维生素D缺乏性佝偻病。②致原细胞异常性佝偻病。本书主要谈及维生素D缺乏性佝偻病，至于后者之中药外治法的治疗方法也可参考。属祖国医学的疳证，五迟证、五软证、鸡胸、龟背、背偻、解颅等范畴。

方一

【组成】 鹿茸15克 炙生地、当归各9克 雄鼠骨3克
(微炒)

【用法】 上药研细末，日擦牙3~4次，直至牙齿长出。

【主治】 齿迟症。

【来源】 幼幼新书

方二

【组成】 草乌头、当归、地龙、木鳖子、紫贝草、椒目、葱须、荆芥各30克

【用法】 将上药煎汤。露脚趾甲从上淋浴至下。

【主治】 五六岁不行。

【注意】 连服续命丹3日后，方洗。

【来源】 吉氏家传方

方三

【组成】 海马6克 猴骨6克 王不留行12克 威灵仙20克 核桃20克

【用法】 上药研细末，调拌白酒或凡士林，或熬炼成膏外敷贴穴位。

【主治】 五迟证。

【来源】 民间单验方

方四

【组成】 山楂、生栀子、桃仁、大枣（去核）各7个 葱头9个 芒硝50克

【用法】 上药共为末，加适量面、酒调制成 $3 \times 3 \times 1$ 立方厘米大小薄贴外敷脐部，用伤湿膏面定。

【主治】 小儿疳积。

【来源】 陕西中医 1985；6（6）：261

凶 陷

婴儿的前凶部一般于1岁至 $1\frac{1}{2}$ 岁时闭合，如前凶发生明显陷下者，则称为凶陷。此证可见于现代医学的“婴幼儿腹泻”、“佝偻病”等大量丧失体液及营养不良性疾病之中。

方一

【组成】 雄黄6克 川乌、生附子各15克

【用法】 上药共为末，用生葱和根叶细切，杵烂，入前药末同煎做成膏，每早空心贴囟陷处。

【主治】 囟陷。对先天禀赋不足，或久泻脾胃虚寒者效果较好。

【来源】 中医儿科学

方二

【组成】 生南星6克 北细辛1.5克

【用法】 上药共捣为末，寒证者，葱汤加生姜汁调敷；泄泻下陷者，醋调敷；热症者，薄荷、甘草油调敷。贴囟陷处。

【主治】 囟陷。

【来源】 婴童类萃

方三

【组成】 生半夏

【用法】 取上药研细末，水调如糊状，分别涂布于囟门、涌泉穴（双），而后固定，1日换药1次。

【主治】 囟陷。

【来源】 穴贴

方四

【组成】 防风45克 柏子仁30克

【用法】 上药共研为细末，乳汁调匀，涂于囟门。

10日自合。

【主治】 小儿囟门不合。

【来源】 薛氏医案

方五

【组成】 柏子仁120克 防风120克 天南星120克

【用法】 上药共研为细末。以猪胆汁调匀，摊在绛绢帛上，视囟门大小剪贴。用时敷贴囟门，每日1换，不得令干，时时以汤润之。

【主治】 小儿解颅。

【来源】 医宗金鉴

厌食

厌食是指小儿较长时期食欲不振，甚则拒食，经久如此，而无外感、内伤疾病的一种常见病证。近年来，此病日渐增多，尤以城市更为常见。独生子女的发病率较高。1~6岁儿童尤为多见。患儿进食虽少，而精神如常，体型不丰满，但还不消瘦，一般预后良好。但长期不愈者亦可转为疳症。本病与现代医学的“神经性厌食”相类似。

方一

【组成】 槟榔2份 良姜1份

【用法】 将以上药物共研细末，装瓶备用。将药物填充脐中，以纱布（盖住肚脐为度）覆盖，用胶布固定。

【主治】 小儿厌食症。

【来源】 河南中医 1987，（3）：22

方二

【组成】 炒神曲、炒麦芽、焦山楂各10克 炒莱菔子6克 炒鸡内金5克

【用法】 上述诸药共研细末，加淀粉少许，白开水调成稠糊，睡前敷于患儿脐上，外用绷带固定，次晨取下，每日1次，5次为1疗程。

【主治】 小儿厌食症。

【来源】 中医杂志 1986，（2）：31

方三

【组成】 藿香、吴茱萸、山药、车前子各10克 木香、丁香各5克

【用法】 将上药共研细末，温开水调成膏状，做成三角形的药饼，敷贴在神阙、天枢、气海穴上，三角形药饼的三个角，要敷盖在脐两侧的天枢穴和脐下的气海穴上，盖上纱布，再用腰带或纱布固定。每晚睡时敷贴，次日早晨取下。每个药饼可连敷3夜，即为1个疗程。药饼在使用过程中如见有干燥现象，可加温水重调。

【主治】 小儿厌食症。

【来源】 小儿外治法

疳 证

疳证是指小儿脾胃虚损，运化失常，形体消瘦，腹部膨大，青筋暴露，皮毛憔悴，影响生长发育，病程较长的一种慢性消耗性疾病。其病主要在脾胃，病理变化主要为脾胃受

损，日久累及诸脏，为儿科四大证之一。本病包括现代医学的营养不良和维生素缺乏症等。

方一

【组成】 桃仁、杏仁、生山栀各等份

【用法】 上述药晒干研末，加冰片、樟脑少许贮藏备用。取药末15~20克用鸡蛋清调拌成糊状，干湿适宜，敷于双侧内关穴，然后用纱布包扎，不宜太紧，24小时后去之。一般1次多见效，少数患儿2次，最多不超过3次，每次间隔2~3天。

【主治】 疳证初、中期。

【来源】 中药贴敷疗法

方二

【组成】 生栀子30粒 杏仁9克 白胡椒6克 鸡蛋1个去黄，葱头7个 面粉1匙 丁香30粒

【用法】 将上述药物研为细末，用高粱酒烧，蛋清调匀，荷叶为托，贴敷两足心，小儿较大者，酌情增加剂量。

【主治】 小儿疳症。

【注意】 忌生冷、油腻、鱼腥、点心。

【来源】 中药贴敷疗法

方三

【组成】 黄芪、茯苓、白术、炙甘草、制厚朴、槟榔、山楂、麦芽、神曲、陈皮、益智、木香、砂仁、山药、莪术、使君子、川楝肉、胡黄连、茺莢各15克

【用法】 麻油熬，黄丹收，朱砂3克拌，贴肚脐上。有

补脾消积之作用。

【主治】 虚中有积，肿胀泄泻之痞证。

【来源】 中医外治法类编

方四

【组成】 巴豆100粒 蓖麻仁100粒 五灵脂200克
阿魏50克 当归50克 两头尖25克 穿山甲25克 乳香25克
没药25克 麝香3克 松香750克 芝麻油250克

【用法】 除乳香、没药、麝香、松香、阿魏外，余药俱切片浸油内3日，用沙锅煎药至焦黑色，去渣，入松香煎1饭时再入乳香、没药、麝香、阿魏，然后取出，入水中抽洗，以金黄色为度，煎时以桃柳枝搅匀，勿令枯，用时以狗皮摊贴患处，每日须热熨，令药气深入为妙。

【主治】 积滞。

【来源】 串雅内编

流 涎

流涎，又称滞颐，俗称“流口水”，指儿童口涎不自觉地由口内流溢出来的病症，以3岁以下的幼儿最为多见，由于长期流出口水，致使口周潮红、糜烂，尤其是两侧口角为著。流涎现代医学称为“流涎症”，常因口、咽粘膜炎症、面神经麻痹，脑炎后遗症或小儿呆小病等神经系统疾病引起。

方一

【组成】 白矾9克

【用法】 每晚临睡前取热水一盆，加入白矾，溶化

后，泡洗双足。

【主治】 流涎。

【来源】 古今偏方精选

方二

【组成】 制南星30克 生蒲黄12克 府醋（保宁醋）
适量

【用法】 将前2味药共研细末，用府醋适量制成饼，
包足涌泉穴，男左女右，12小时易之。

【主治】 流涎，治疗患儿132例，痊愈118例，占89.4%；
好转（有时尚有少许涎液流出）11例，占8.3%；无效（病
情毫无变化）3例，占2.3%。

【来源】 四川中医 1986；4（10）：13

方三

【组成】 牛黄3克 青黛、上朱砂、冰片、元明粉各
10克 煅硼砂30克 珍珠母5克 人中白15克

【用法】 上药共研细末，掺于患儿口腔及颌部。

【主治】 流涎。

【来源】 幼科条辨

撮 口

撮口又名撮口脐风，民间又称四六风、七日风、锁口
风。系因初生断脐不洁及助产人员双手不净，毒邪由脐带创
口入经络、侵脏腑，引起聚面撮口，四肢强直，阵阵抽搐的
一种疾病。相当于西医之“新生儿破伤风。”

方一

【组成】 鸡蛋清适量 生香附、生半夏各半

【用法】 先将生香附、生半夏研为细末，加入鸡蛋清搅拌均匀，制为薄饼，贴双足心，1日1次，10次为1疗程。

【主治】 邪犯肝脾之撮口。

【来源】 中医外治法简编

方二

【组成】 麻黄120克 甘草60克 蝉蜕、僵蚕、全蝎各21个 陈胆星30克 白附子、防风、川乌、天麻、川芎、白芷、党参、南薄荷、白术、木香各15克 干姜12克 蜂蜜60克 牛黄、冰片、轻粉各9克 麝香3克 朱砂、雄黄各24克

【用法】 上药和捏为锭，临用前以淡姜汤同白蜜调和摩擦胸背，每日1次。

【主治】 撮口。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 枯矾、硼砂各8克 朱砂2克 冰片0.2克 麝香0.2克

【用法】 诸药混合研为细末，筛过后贮瓶备用。临用时取药末2克扑入患婴肚脐窝内，盖以纱布，以胶布固定之，每天换药1~2次（如麝香缺药，可用公丁香代之）。

【主治】 撮口。

【来源】 中医药物贴脐疗法

方四

【组成】 蜈蚣2条 全蝎、僵蚕各10克 钩藤15克
麝香0.5克 竹沥10毫升

【用法】 将前四药煎成80毫升，冲入麝香、竹沥，分2~3次灌肠。

【主治】 脐风。

【来源】 证治准绳

口 吻 疮

口吻疮，古代又名“肥疮”、“燕口”、“口角疮”、“燕口疮”，常因脾胃湿热上攻口唇或先天遗毒所致。相当于现代医学的“口角疮”、核黄素缺乏性口角炎。

方一

【组成】 白矾适量 猪胆十个

【用法】 将白矾研细末过筛，于猪胆上部剪开一口，将白矾从口塞进，以塞满为度，用线将猪胆开口扎紧，悬挂于屋檐（时间至少1年左右），取下研成细末，装消毒净瓶中备用。用时将药末少许涂于口腔患处，每日3次。直到痊愈为止。

【主治】 小儿口疮。

【来源】 民间方

方二

【组成】 槟榔

【用法】 将上药烧灰入轻粉少许，同研细末，干撒之于患处。

【主治】 小儿口疮。

【来源】 得效方

方三

【组成】 香附 半夏 鸡蛋清

【用法】 将香附、半夏各半，以鸡蛋清适量和之作饼贴足心。

【主治】 小儿口疮。

【来源】 中医外治法简编

木 舌

木舌是一种以舌体肿大，伸缩、翻转动作不灵，状若僵木为特征的疾病。轻者妨碍乳食，重者舌体肿大充满口腔，梗阻气道，妨碍呼吸。此病多因胎毒蕴结脏腑，生后发于心脾，日久生风结痰，风热痰湿相搏则舌肿而木强。西医无类似的病名，多为许多疾病过程中的一个症状。

方一

【组成】 吴茱萸粉10~15克 面粉适量

【用法】 将吴茱萸粉用温水调和匀，作成薄饼状，贴于两脚心，外用纱布包绕固定，每日更换1次。

【主治】 木舌。

【来源】 中医儿科学

方二

【组成】 大黄9克 芒硝5克 甘草9克 栀子5克 黄芩5克 薄荷9克 连翘5克 竹叶5克

【用法】 上方各研为细粉后，混合拌匀，扑于患处，日扑4～5次，5日为1疗程。

【主治】 木舌。

【来源】 太平惠民和剂局方

第七章 妇 产 科

痛 经

妇女正值经期或行经前后发生以小腹疼痛为主，或痛引腰骶，甚至昏厥，影响正常工作和生活者称为痛经或经行腹痛。西医亦称为痛经，经行腹痛。并有原发性、继发性之分。

方一

【组成】 肉桂、公丁香、樟脑（可用冰片代）各30克。

【用法】 上药压碎，以南昌酒厂出品的三花酒500毫升浸泡，1月后去渣。置眼药或滴鼻液瓶中备用。用时将药5~10滴点舌面，先含后咽。3~15分钟内痛减。

【主治】 寒湿凝滞型痛经。

【来源】 中医杂志 1985；（6）：21

方二

【组成】 山楂、乳香、没药、葛根、穿山甲、川厚朴各100克 白芍150克 甘草、桂枝各30克 细辛挥发油、鸡矢藤挥发油、冰片各适量

【用法】 先将山楂、葛根、白芍、甘草水煎2次，煎

液浓缩成稠状，混入溶于适量的95% 乙醇的乳香、没药液，烘干后与穿山甲、川厚朴、桂枝共研细末，再加入适量的细辛挥发油、鸡矢藤挥发油、冰片，充分混合过100目筛，贮藏备用，患者经前3~5天用混水洗擦脐部后，取土药0.2~0.25克，气滞血瘀者用食醋调糊、寒湿凝滞者用姜汁或酒调糊，敷于脐中，外用胶布固定。待经来即止或经净第三天去药。

【主治】 痛经。治38例，有效33例。

【来源】 浙江中医杂志 1980，（11）：517

方三

【组成】 食盐、葱白各250克 生薑125克

【用法】 上药共炒热，装布袋熨下腹部，药凉后可再炒热再熨。1日数次，每次30分钟。

【主治】 虚寒为主的痛经。

【来源】 内病外治

方四

【组成】 香附12克 元胡10克 桂枝8克 官桂8克
木香6克 鸡血藤20克

【用法】 将药物捣烂、炒热后外敷贴丹田穴，然后按揉或熨灸。

【主治】 痛经。

【加减】 若气滞血瘀加桃仁12克，赤芍10克；寒湿凝滞加茴香12克，蒲黄6克。

【注意】 经期应忌用辛辣温燥之物及忌房事；在外敷贴部物时，可用热熨方法熨揉小腹部。

【来源】 中国民间效药疗法

闭 经

女子年逾18周岁月经尚未初潮，或已行经而又中断达3个月以上者，称为闭经。前者为原发性闭经，后者为继发性闭经，中医亦称为“经闭”。

方一

【组成】 麝香、龙骨、虎骨、蛇骨、木香、雄黄、朱砂、乳香、没药、丁香、胡椒、青盐、夜明砂、五灵脂、小茴香、两头尖各等份

【用法】 麝香另研备用，余药共研细末，瓷罐贮藏切勿泄气。用时麝香先放脐心，再用面粉作一圆圆套在脐周，然后装满适量药粉，外盖槐树皮或生姜片，用艾灸之，每岁1壮，间日1次，3次1疗程。

【主治】 继发性闭经。

【来源】 新中医 1986；（1）：31

方二

【组成】 关元穴、艾条

【用法】 用胡椒饼加丁香粉，肉桂粉，隔灸关元穴，共6壮，每日1次，7次1疗程。

【主治】 寒邪所致的虚、实闭经。

【来源】 常见病简易疗法手册

方三

【组成】 益母草125克

【用法】 上药加水1000毫升，煎水先温洗小腹，再取蚕砂适量炒热，布包熨小腹。

【主治】 闭经。

【来源】 中医外治方药手册

方四

【组成】 生地、当归、赤芍、桃仁、五灵脂、大黄、丹皮、茜草、木通各15克

【用法】 上药加水1500毫升，共煎，取汤淋洗脐下，1日1次，每次30分钟，7天1疗程。

【主治】 热结血闭的实证闭经。

【来源】 中医外治法类编

方五

【组成】 蛭螂1只（焙干） 威灵仙10克（烤干）

【用法】 上药共研细末，填神阙穴，膏药贴盖，约1小时后去药，1日1~2次，连用至愈。

【主治】 血瘀的实证闭经。

【来源】 中医外治方药手册

方六

【组成】 柴胡12克 白术10克 白芍10克 当归12克 茯苓10克 薄荷3克 三棱6克 牛膝20克

【用法】 将药物研细末，药拌凡士林，然后外敷贴关

元穴。

【主治】 闭经。

【加减】 虚证加香附12克、陈皮10克、牛膝12克；实证加半夏12克、红花6克、桃仁12克。

【来源】 中国民间敷药疗法

月经不调

月经不调是指月经失去正常规律性，期、量、色、质等发生异常变化。与西医学的“月经失调”相类似，西医的有排卵性功能失调性子宫出血，子宫肌瘤，生殖道炎症和计划生育措施等所致的月经紊乱，属本病范畴。

方一

【组成】 红蓖麻子仁15克

【用法】 上药捣如泥，敷百会穴（剪去头发），绷带上下包扎，血止后洗去。

【主治】 月经过多的月经不调。

【来源】 中医外治方药手册

方二

【组成】 大黄128克 玄参、生地、当归、赤芍、白芷、肉桂各64克

【用法】 以小磨麻油1000克熬，黄丹448克收，贴关元处，每日1次，月经前后10天用，3月1疗程。

【主治】 血瘀化热的月经不调。

【来源】 中药贴敷疗法

方三

【组成】 当归30克 川芎15克 白芍9克 五灵脂9克
元胡（醋浸）9克 肉苁蓉9克 苍术9克 白术9克 乌药
9克 小茴香9克 陈皮9克 半夏9克 白芷9克 柴胡6克
黄连同吴茱萸炒各3克

【用法】 月经先期加黄芩、丹参、地骨皮各6克，月
经后期加肉桂、干姜、艾叶各6克，干血癆加桃仁、红花、大
黄、生姜、大枣（血癆再加马鞭草）各6克。上药烘干，研
为细末，过筛，瓶装备用。临证取药粉适量，醋或酒调成
膏，纱布包裹，敷于神阙、丹田穴，外敷塑料薄膜，纱布、
胶布固定，再加热熨，1次30分钟，1日2~3次，以调为度。

【主治】 经期不准，或痛或不痛者。

【来源】 中医外治法类编

方四

【组成】 乳香、没药、白芍、牛膝、丹参、山楂 广
木香、红花各15克 冰片1克

【用法】 除冰片外，余药烘干，研为细末，过筛，再
将冰片末调入重研一遍，装瓶备用。临床用药末20克，以生
姜汁或黄酒适量，调为稠膏，敷神阙穴及子宫穴，上置塑料
薄膜，纱布覆盖，胶布固定，2日换药1次，连用至月经干
净，3日1疗程。

【主治】 血瘀型月经不调。

【来源】 中医外治法集要

方五

【组成】 当归、川附片、小茴香、良姜、川芎、木香各500克

【用法】 上药用香油7500克炸枯去渣，熬至滴水成珠，入丹5000克，搅匀收膏。另配细料：青毛鹿茸40克，肉桂50克，沉香40克，混合研成细粉。每800克膏药兑细料15克，搅匀摊贴。大张药重35克，小张药重22.5克。用时微火化开贴脐上。

【主治】 妇女宫寒，月经不调。

【来源】 中国膏药学

方六

【组成】 香附20克 牡蛎10克 白芍12克 三棱10克 木通12克 鸡血藤20克 牛膝12克

【用法】 将药物研细末，调拌凡士林或熬炼成膏剂。外敷贴关元穴。也可在该穴位先进行推拿点按或热熨，然后外敷贴。

【主治】 月经不调。

【加减】 若月经提前可加益母草60克、生地12克、五味子12克；月经延后加桂枝10克、艾叶12克、穿山甲6克

【注意】 房事不可过度，讲究卫生，勤换衣裤，适当配合内服药治疗。

【来源】 中国民间敷药疗法

带 下 病

妇女阴道内有少量白色无臭的分泌物，滑润阴道，为生理性带下。若带下量过多，色、质、味异常，或伴有腰痠，小腹疼痛者，为带下病。西医诊断为阴道炎、宫颈糜烂、盆腔炎等急、慢性炎症疾病及宫颈癌、宫体癌等均可出现带下病的症状。

方一

【组成】 苦参60克 蛇床子、黄柏各30克 苍术、薏苡仁各15克

【用法】 上药水煎1小时后滤渣，洗涤外阴周围及阴道。每日2~3次，7日为1疗程，连用3疗程。

【主治】 阴道炎所致的带下。治疗35例，有效率为100%。症状消失最短2天，最长18天。

【来源】 陕西中医学院学报 1989；（4）：37

方二

【组成】 黄柏、蒲黄、甘草、雄黄各0.6克 薄荷、龙胆草各0.3克 青黛、冰片各0.9克 生石膏3克 珍珠粉0.1克

【用法】 上药研细末，过120目筛，混匀装瓶密封备用。用窥器暴露宫颈后，以0.1%新洁尔灭清洗阴道及宫颈分泌物（宫颈炎症明显，脓性分泌物多，可用75%酒精擦洗）。然后用喉头喷粉器将药粉均匀喷撒于患部，每日1次，7次为1疗程。

【主治】 宫颈糜烂所致的带下。治疗30例，有效率为100%。

【来源】 江西中医药 1990；（1）：32

方三

【组成】 蛇床子、白藓皮、黄柏各50克 荆芥、防风、苦参、龙胆草各15克 薄荷10克（后下）

【用法】 上药水煎后熏洗外阴，每日2次，10～15天为1疗程。

【主治】 滴虫或霉菌所致的湿热型带下症。

【来源】 内病外治

方四

【组成】 狼毒90克

【用法】 上药加水煎至500毫升，冲洗阴道。每日1～2次，7次1疗程。

【主治】 宫颈炎所致的带下症。

【来源】 中医外治方药手册

方五

【组成】 芡实、桑螵蛸各30克 白芷20克

【用法】 上药共研细末，醋调后敷神阙穴，1日换药次，1周即可痊愈。

【主治】 带下症。

【来源】 中医外治法集要

方六

【组成】 全蝎、升麻、甘松各1克 花椒、三柰子、草拨、枯矾各2.5克 草乌头、羌活各1.5克 川乌头、柴胡各3.5克 大蒜、补骨脂各10克 水蛭(炒焦)、虻虫(去翅足炒)各3枚 沙黄盐5克

【用法】 上药研极细末，炼蜜丸如指尖大。同时以绵裹药丸纳阴户中，觉脐下暖为效。

【主治】 下焦虚冷，脐腹疼痛，带下五色，月水崩漏所致的带下病。

【来源】 医部全录

方七

【组成】 生杏仁(去皮尖)30个 枯矾15克 蛇床子1个

【用法】 上药共研为末，炼蜜为丸，要软硬适宜，每丸重10克，用细绢包好，再用丝线扎紧绢口，留线35毫米。用时纳入阴道深部，外留线头，以便更换。

【主治】 白带多年不愈，兼两目不明。

【来源】 妇科病中医治疗法

阴 痒

阴痒指妇女外阴部或阴道内瘙痒。其特点是痒痛难忍或时出黄水，坐卧不安。亦称“阴蚀”、“阴门瘙痒”，“阴蠹”，“阴疮”。本病多因湿热蕴积或血虚生风化燥所致。是现代医学滴虫性阴道炎、霉菌性阴道炎、老年性阴道炎、幼女

性阴道炎、外阴白斑等患者常并发的一个症状。

方一

【组成】 蛇床子、地肤子、苦参各20~30克 花椒、黄柏各12克 苍术、防风各15克

【用法】 上方诸药，用纱布包扎加水2000毫升，煎至1500毫升，待温热适度时先熏后洗，1日2次，10次1疗程。

【主治】 阴痒。

【来源】 中西医结合杂志 1986；11（6）：697

方二

【组成】 蛇床子30克

【用法】 上药研末，以白粉（米粉）少许，和令相得，团如枣大，以绵裹纳入阴道内，1日1次，10次1疗程。

【主治】 阴痒。

【来源】 女科方萃

方三

【组成】 苦参30克 生百部30克 蛇床子30克 地肤子30克 白藓皮30克 紫槿皮30克 龙胆草10克 川黄柏30克 川花椒10克 苍术10克 枯矾10克

【用法】 上方诸药加水2000~2500毫升煎煮10~15分钟后，用核桃大小消毒棉球缚以长线，饱吸药液，于睡前塞入阴道并于次晨取出。1日1次，10次1疗程。

【主治】 老年性阴痒。治疗100例，用药1个疗程，痊愈55例，好转11例，治疗2个疗程，仍无效者仅4例，总有效率96%。

【来源】 陕西中药 1987；8（12）：555

方四

【组成】 野菊花15克 桃树叶30克 苦参10克 白芷10克 蛇床子15克

【用法】 上药煎水，待药水温度适宜时冲洗外阴部，1日2次，10天1疗程。

【主治】 阻痒。

【来源】 内病外治

方五

【组成】 白藓皮20克 龙胆草20克 金银花30克 荆芥20克

【用法】 将上药水煎后，外擦洗阴部，1日2次，1次30分钟，10天1疗程

【主治】 湿热阴痒

【来源】 中国民间草药方

方六

【组成】 蝮蛇胆、雄黄、硫磺、朱砂、硝石、茺莢各25克 藜芦12.5克

【用法】 上药共研细末，以腊月猪脂和如膏。同时以故布作缠子，如指长5毫米，以药涂上，纳阴中。日换1次，换药时宜用猪椒根150~250克，水煮稍热洗阴部，干拭，再用药。

【主治】 阴痒。

【来源】 济阴纲目

方七

【组成】 蛇床子30克 野菊花15克 苦参片12克

【用法】 水煎，外洗患部。

【主治】 阴痒。

【注意】 根据患者不同表现，酌情配合内服药。

【来源】 古今名方

方八

【组成】 山红石、大枫艾各50克 柚皮荆芥、青萆、香茅各25克

【用法】 将上药水煎煮去渣。熏洗患处，每天1~2次，症状严重者3~4次。

【主治】 阴痒。

【来源】 全国中草药新医疗法展览会资料汇编

阴 蚀

阴蚀是指妇人阴部肿痛，甚或化脓溃疡，黄水淋漓的病症。其病因以热毒为多。类似于现代医学的外阴炎或急性外阴溃疡。

方一

【组成】 蛇床子9克 黄柏6克 淡吴萸3克

【用法】 诸药布包，温水浸泡15分钟后煎数沸，倾入盆中，趁热熏洗、坐浴，晨晚各1次，每次5~10分钟，洗后可拭干外阴部，内阴部待其自然吸收。

【主治】 毒热型阴蚀及寒凝型阴蚀。

【来源】 哈荔田妇科医案医话集

方二

【组成】 鹤虱30克 苦参15克 狼毒15克 蛇床子15克 归尾15克 威灵仙15克

【用法】 诸药水煎、滤渣，熏洗外阴部，每日3次。

【主治】 外阴部溃烂，脓血淋漓，或痛或痒，多伴有赤白带下。

【来源】 妇科病中医治疗法

方三

【组成】 樟丹30克 蛤粉30克 冰片少许

【用法】 诸药共研细末，香油调匀，搽患处。

【主治】 阴蚀。

【注意】 擦药前用温水洗净外阴部。

【来源】 中医外治法

胎位不正

胎位不正指妊娠30周后胎儿在子宫体内的位置不正常。多见于经产妇或腹壁松弛者，胎儿多呈横形或臀位、斜位、足位。

方一

【组成】 生姜

【用法】 取生姜适量，捣成泥状，分别贴敷双侧至阴

穴，然后用塑料薄膜包裹，使姜泥始终保持潮湿状态，如干燥可重新更换，自贴24小时后，B超检查，如果未转正，可继续2~3天。至胎位转正为止。

【主治】 胎位不正。

【来源】 中西医结合杂志 1989；6（9）：357

方二

【组成】 子宫、交感、皮质下、肝、脾、腹等耳穴
王不留行籽

【用法】 用火柴头或毫针柄在相应穴位探求敏感点，将王不留行籽用胶布贴压穴处，3~4日1次，双耳交替。每日3次，饭后30分钟按压15分钟，至胎位转正为止。

【主治】 胎位不正。适用于妊娠7~8个月胎位不正者，治疗169例，成功率81.66%。

【来源】 江苏中医杂志 1986；（8）：31

胞衣不下

胞衣不下是指胎儿娩出后，胎盘经过较长时间不能娩出者。其主要原因是元气亏损，无力送出；或产时感寒，血液凝滞。类似于现代医学的胎盘滞留。

方一

【组成】 蓖麻子仁60克

【用法】 将蓖麻子仁捣烂，敷两足心涌泉穴，外盖纱布，胶布固定。胞衣下后立即洗去。

【主治】 胞衣不下。

【来源】 妇人大全良方

方二

【组成】 灶心土50克 甘草15克 醋适量

【用法】 将灶心土研为细末，以醋调成糊状，敷神阙、关元穴，外盖纱布，胶布固定，再将甘草煎汤，乘热饮下。

【主治】 胞衣不下。

【来源】 中医外治法集要

方三

【组成】 艾叶适量

【用法】 艾叶炒热敷少腹。

【主治】 胞衣不下。

【来源】 中医妇科学

方四

【组成】 附子15克 丹皮30克 干漆30克 大黄30克

【用法】 以上诸药醋熬成膏，贴关元穴。

【主治】 胞衣不下。

【来源】 理渝骈文

方五

【组成】 川芎60克 当归60克

【用法】 以上诸药水煎熏洗外阴。

【主治】 胞衣不下。

【来源】 中医外治法简编

方六

【组成】 皂角适量，细辛适量

【用法】 上药研细末，取少许，吹鼻中取嚏，使产妇反复多次地打喷嚏。

【主治】 胞衣不下

【来源】 中医外治法集要

难 产

难产是指妊娠足月到分娩时，胎儿不能顺利娩出的病证。引起难产的因素有产力异常，产道异常，胎儿、胎位异常等。本节重点讨论产力异常。气血虚弱和气滞血瘀是产力异常的主要原因，本病类似于现代医学的异常分娩。

方一

【组成】 生龟板60克 当归30克 川芎30克 头发炭5克 蝉蜕7个 蛇蜕1个 车前子30克

【用法】 诸药烘干，共研细末，过筛，以葱汁、麻油适量各半，调药末如糊状，下垫纱布一层，敷脐，可同时敷关元穴，外盖玻璃纸、纱布、胶布固定。

【主治】 产力异常的难产。

【来源】 中医外治法集要

方二

【组成】 寒水石120克（其中60克生用，60克煅赤）
朱砂15克

【用法】 将上药研如桃红色，每用0.9克，以井水调如薄糊，敷脐，可同时敷关元穴，外盖玻璃纸、纱布，胶布固定。

【主治】 难产。

【来源】 中医外治法简编

方三

【组成】 乌梅（去核）1个 胡椒7粒 巴豆仁3粒

【用法】 诸药研细末，白酒调匀，敷两侧三阴交穴，外盖纱布，胶布固定。

【主治】 难产。

【来源】 中医外治法

方四

【组成】 蓖麻子7粒

【用法】 将蓖麻子去壳，细研成膏，用时将药膏涂于脚心。

【主治】 难产。胎死腹中，胞衣不下。

【注意】 产下后，速将膏洗去。不洗肠出，再用此膏涂顶上，肠自缩入。

【来源】 丸散膏丹集成

方五

【组成】 寒水石200克（其中生用100克，煅赤100克，均研细）朱砂少许

【用法】 上药共研如深桃红色。同时每取药1.5克，用井华水调如薄糊，以纸花剪如杏叶大，摊上，贴脐心，候

干再易，不过3次便产。

【主治】 难产横逆恶候，死胎不下。

【来源】 济阴纲目

产 后 血 晕

产后血晕是指产妇分娩后，突然头晕眼花，不能坐起或心胸满闷，恶心呕吐，痰涌气急，心烦不安，甚则口噤神昏、不省人事的病证。本病有虚实两端，多因产后失血过多，或瘀血上攻所致，类似于现代医学的产后休克。

方一

【组成】 干漆适量

【用法】 烧干漆使产妇闻其烟味。

【主治】 产后血晕实证昏迷不省人事者。

【注意】 应用本法后，可先在患者口鼻周围涂以凡士林，以防熏烫伤。

【来源】 中医妇科学

方二

【组成】 半夏6克 牙皂6克 丁香5克

【用法】 上药共研细末，吹少许入鼻中取嚏。

【主治】 产后血晕。

【注意】 ①有鼻衄史，脑出血及脑外伤史者禁用。

②无喷嚏反应者，效果往往不好，应及时采取其它方法，以免延误病情。

【来源】 妇科学

方三

【组成】 葱白、蜂蜜各适量

【用法】 上药共捣烂敷脐。

【主治】 产后血晕。

【来源】 中医外治法

缺 乳

产后或哺乳期乳汁甚少或全无，称为缺乳。亦称“乳汁不行”或“乳汁不足”。多因身体虚弱，气血不足或肝郁气滞所致。相当于现代医学的“乳汁减少”。

方一

【组成】 金针花根30克 通草20克 当归6克 芙蓉花叶60克

【用法】 上药捣烂，外敷贴患处或乳房胀痛部位，1日2次，3天1疗程。

【主治】 缺乳。

【来源】 中国民间草药方

方二

【组成】 艾条

【用法】 以艾条灸膻中穴、乳根穴，每次10~20分钟，每日2次，3天1疗程。

【主治】 缺乳。

【来源】 常见病简易疗法手册

方三

【组成】 三棱15克

【用法】 水煎后，用布浸药液外敷乳房上，并同时熏洗乳房，每日2次，3天1疗程。

【主治】 缺乳。

【来源】 中国民间疗法

回 乳

产妇由于疾病或其它原因需要断乳，叫“回乳”。

方一

【组成】 芒硝200~300克

【用法】 将芒硝装入2个布袋中，外敷双侧乳房，胸带固定。24小时后取下，（天热12小时取下）。如1次效果不明显，可连用几天，乳断为止。

【主治】 回乳。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 胆南星10克

【用法】 上药研细末，米醋调敷乳房上（勿涂乳头），过1昼夜洗去，不效再用，至病愈为止。

【主治】 回乳。

【来源】 内病外治

子宫颈炎

子宫颈炎是生育年龄妇女的常见病。有急性与慢性两种，临床上以慢性子宫颈炎多见。症状以白带增多为特点，相当于中医学“带下病”范畴。

方一

【组成】 山慈菇、枯矾条18克 炙砒霜9克 麝香0.9克

【用法】 上药研末，加适量江米粉水调制成钉形或圈钉形，每支长1~1.5厘米，直径0.2厘米。用药前先冲洗阴道，将本品插于颈管或薄贴于宫颈部，一般3~5天上药1次，连续2~3次1疗程。

【主治】 子宫颈炎。

【来源】 北京中医学院学报 1989；18（3）：22

方二

【组成】 青黛20克 硼砂60克 炉甘石60克 黄柏20克 山梔20克 人中黄50克 冰片10克 生石膏100克

【用法】 上方共研末，过80目筛，用胶囊分装，每粒重0.4克，袋装备用。每晚临睡前于阴道清洁后将药物塞入后穹窿。每晚1次，1次2粒。10天1疗程。

【主治】 子宫颈炎。

【来源】 上海中医药杂志 1989；（5）：16

方三

【组成】 硼砂500克 樟脑200克 冰片100克 青黛500克 玄明粉500克 黄柏250克 橡皮50克

【用法】 上药研碎过筛混匀，紫外线照射，常规细菌培养，以无细菌生长为合格，放置瓶内备用。上药前先冲洗阴道，擦净阴道分泌物，用竹板上药，先散布于子宫颈及阴道后穹窿，用带线棉球塞住阴道，以防药粉撒出，嘱病人第二天将棉线取出。隔日上药1次，5天1疗程。

【主治】 子宫颈炎。治疗111例，痊愈106例，总有效率95.5%。

【来源】 中医杂志 1984；25（1）：35

方四

【组成】 仙人掌适量

【用法】 以鲜品全草切碎，每次约100克，加食盐少许煎汤，待温度适宜时坐浴，1日1次，10天1疗程。

【主治】 子宫颈炎。

【来源】 浙江中医杂志 1989；24（1）：2

方五

【组成】 冰片21克 煅龙骨18克 乌贼骨75克 桔梗75克 青皮30克 青黛210克 儿茶63克 血竭78克 延胡索210克 黄柏78克

【用法】 上药共研细末，备用。用时清洁阴道后喷于宫颈糜烂面上，每日1次，10次为1疗程。

【主治】 慢性宫颈炎。

【来源】 中医妇科临床手册

方六

【组成】 金银花、甘草、五倍子各等量。

【用法】 将上药共研细末，备用。用时先擦净阴道及宫颈表面之分泌物，将药粉喷于宫颈糜烂面上。每日1次，10次为1疗程。

【主治】 急性子宫颈炎。

【来源】 中医妇科临床手册

功能性子宫出血

功能性子宫出血（简称宫血），是无周身及生殖器官器质性病变，而由于神经内分泌系统功能障碍所致子宫异常出血的疾病。分为排卵型和无排卵型两类。在中医学分属于“崩漏”、“月经过多”、“月经先期”、“月经先后无定期”、“经期延长”等病证的范畴。

方一

【组成】 益智仁20克 沙苑子20克 焦艾叶30克

【用法】 将两药烘干，研为细末，过筛，取药末适量，用艾叶煎汁调匀、敷脐，每6小时换1次。

【主治】 功能性子宫出血。

【来源】 中级医刊 1987；22（10）：44

方二

【组成】 艾炷

【用法】 艾灸大敦、隐白穴5~7壮，日1次。

【主治】 功能性子宫出血。治疗50例，显效36例，有效12例，总有效率为96%。

【来源】 陕西中医 1988；（4）：77

方三

【组成】 红蓖麻仁15克

【用法】 上药捣烂如泥，贴在百会穴。

【主治】 功能性子宫出血。

【来源】 民间灵验便方

妊娠呕吐

妊娠后出现恶心呕吐，头晕厌食，甚或食入即吐者，称为妊娠呕吐。若仅见恶心，嗜酸，择食，或晨间偶有呕吐痰涎，为妊娠早期的常有反应，一般12周后即可逐渐消失，属中医学“恶阻”的范畴。

方一

【组成】 丁香15克 半夏20克 生姜30克

【用法】 前2味共为细末，以生姜30克煎浓，调为糊状，取适量涂敷脐部，外盖纱布，并用胶布固定。

【主治】 妊娠呕吐

【来源】 中级医刊 1987；22（10）：44

方二

【组成】 生姜6克

【用法】 将生姜烘干，研为细末，过筛，以水调为糊状，敷内关穴，也可敷脐，外用伤湿止痛膏固定。

【主治】 妊娠呕吐。

【来源】 中医外治法集要

盆 腔 炎

盆腔炎是盆腔生殖器官及周围结缔组织、盆腔腹膜发生的炎症。炎症可局限于一个部位，也可几个部位同时发病，分急性、慢性、结核性等。分别属于中医学“痛经”、“月经不调”、“带下病”、“癥瘕”等范畴。

方一

【组成】 炒炮姜30克 草红花20 肉桂15克 白芥子18克 麻黄21克 胆南星18克 生半夏21克 生附子21克 红娘子3克 红芽大戟3克 香油5斤

【用法】 将上药用香油炸枯去渣，先以每斤油兑入樟丹240克，即成油膏，再按每750克油兑入麝香4克，藤黄面30克。摊成膏药，大膏药每张重6克，小膏药每张重3克；下腹痛为主用小膏药，微火温化后贴归来穴、水道穴，两侧穴位交替使用；腰痛为主贴命门穴，肾俞、气海俞、阳关俞；腰骶坠痛贴关元俞、膀胱俞、上髂穴、次髂穴，有炎症包块用大膏药贴敷局部皮肤上。一般夏天1日换药1次，冬天2天换药1次。12次1疗程。

【主治】 慢性盆腔炎。治疗107例，总有效率95.3%。

【来源】 中医杂志 1984；25（1）：38

方二

【组成】 追地风30克 透骨草30克 血竭15克 白芷30克 川椒15克 阿魏20克 乳香20克 没药20克 归尾30克 赤芍30克 茜草30克 莪术20

【用法】 以上诸药共研粗末，布袋包装，在治疗前先将药袋稍用清水透湿后，再隔水蒸热半小时，趁热用毛巾包卷敷下部腹痛侧，1日2次，每次15分钟，敷毕将药袋晒干，次日再用。每袋药可敷10次，20天1疗程。

【主治】 慢性盆腔炎。治疗95例，痊愈36例，显效58例，好转1例，总有效率100%。

【来源】 中西医结合杂志 1985；5（4）：218

方三

【组成】 川椒20克 大茴香20克 乳香20克 没药20克 降香末20克

【用法】 上药共研细末，用干面粉调羹，高粱酒少许，调湿摊于纱布上，置于痛处，上用热水袋热熨，1日2次，10天1疗程。

【主治】 慢性盆腔炎有包块者。

【来源】 中药贴敷疗法

方四

【组成】 鱼腥草30克 黄芪25克 败酱草、益母草、茯苓、公英各20克 桃仁15克 丹参、赤芍、香附、半夏、胆南星、海藻各10克

【用法】 上药加水共煎煮，煎取100毫升，药温50℃时

缓慢灌肠，胸膝卧位，15分钟后改平卧，1小时后起床活动。
1日1次，1个月1疗程。

【主治】 慢性盆腔炎。治疗110例，总有效率80%。

【来源】 中医药学报 1990；（2）：29

方五

【组成】 红藤、败酱草、公英、芙蓉叶各30克 连翘、银花各9克

【用法】 上药兑入共煎煮，煎至150毫升，药温38℃保留灌肠，在30分钟内灌完，卧床休息30分钟，1日1次，至病愈为止。

【主治】 急性盆腔炎。

【来源】 上海中医药杂志 1989；（8）：30

阴 道 炎

阴道炎是由于各种原因使阴道正常状态遭到破坏，使细菌生长繁殖的病症。临床上以阴道分泌物增多为特点，属中医学“阴痒”、“带下”范畴。

方一

【组成】 狼牙适量（即仙鹤草根芽）

【用法】 上药洗净，晒干，剪碎；加水煎煮，浓缩为1克/毫升的汤剂，装瓶高温消毒备用。用时擦净白带，用浸泡过的带线消毒棉球塞于阴道内，保留12小时，1日1次，7天1疗程。

【主治】 滴虫性、细菌性阴道炎。治疗54例，总有效

率92.22%。

【来源】 中国医药学报 1990; (1): 42

方二

【组成】 苍术、百部、蛇床子、黄柏、苦参、连翘各15克 荆芥10克 枯矾5克 土槿皮15克

【用法】 浓煎成250毫升，阴道冲洗，1日2次，6天1疗程。

【主治】 阴道炎。

【来源】 江苏中医杂志 1985; 6(8): 19

方三

【组成】 蔓头回60克 白芷9克 藁本5克

【用法】 将上药研细过筛，装瓶内经高压消毒外用。用药前用双氧水浸湿的棉球充分擦拭阴道壁及穹隆部，然后扑撒药粉，药量每次0.5~0.8克，1日1次，10次1疗程。

【主治】 滴虫性阴道炎。治疗506例，治愈493例，总有效率97.4%。

【来源】 中药贴敷疗法

方四

【组成】 蛇床子30克 百部30克 苦参30克 白藓皮30克 地肤子30克 川黄柏30克 龙胆草10克 川花椒10克 紫槿皮30克 苍术10克 枯矾10克

【用法】 上药加水2000~2500毫升煮10~15分钟，用核桃大消毒棉球，缚以长线，吸饱药液，于睡前塞入阴道内，次晨取出，1日1次，10次1疗程。

【主治】 老年性阴道炎。

【来源】 陕西中医 1987; 8(12): 555

方五

【组成】 桉木、老虎剂、小叶冬青、岗梅各等份。

【用法】 将上药煎煮浓缩成10~20%溶液，装瓶消毒备用。最好先通过脱色处理。用时用线将棉球蘸药溶液塞入阴道内，保留4~6小时后取出，每日1次，7~12天为1疗程。

【主治】 急性阴道炎、宫颈炎。

【来源】 中药制剂汇编

滴虫性阴道炎

由阴道滴虫寄生在阴道内引起。阴道感染滴虫后，一般分泌物较多，质稀薄呈泡沫状，乳白色或黄色，并有臭味，有时呈血性或脓性。外阴瘙痒、灼热、刺痛、性交疼痛。如尿路也受感染，可出现尿痛、尿频，有时血尿。少数且有全身乏力、腰痠及下腹痛。不过，也有感染滴虫而阴道无炎症反应的带虫者。

方一

【组成】 苦参70克 桃树叶50克 柳树叶50克 蛇床子10克 贯众50克

【用法】 将以上5味药加水300毫升，煎煮2次，过滤去渣，将滤液浓缩至80毫升，做14个大棉球，用线扎紧，留线10~15毫米。高压消毒后浸入上述浓缩液中饱吸，即得。用时每晚用1%高锰酸钾水清洗外阴后，取药栓1枚送入阴道内，次日晨取出，连用14天为1疗程（本方为1个疗程量）。

【主治】 滴虫性阴道炎。

【来源】 中药制剂汇编

方二

【组成】 苦参适量

【用法】 取苦参，用95%乙醇浸渍，渗滤，回收乙醇，用生药量约10%的浸膏，以甘油明胶为基质，制成每栓约相当于生药5克的成品。每颗栓剂重约3~3.5克。每用1枚，塞往阴道后穹窿。

【主治】 阴道滴虫病。

【来源】 新药学通讯

方三

【组成】 鲜蛤蟆草适量

【用法】 取蛤蟆草500克，加水1000毫升，煮沸，捞细或捣烂，浓缩至500毫升再过滤。先用温水冲洗阴道，后用干棉球沾蛤蟆草煎剂放入阴道内；每日1次，连用7天为1疗程。

【主治】 滴虫性阴道炎。

【来源】 中药制剂汇编

方四

【组成】 雄黄5克 蛇床子15克

【用法】 共研细末、蜜丸，每丸重5克。用时将药丸用纱布包好，留线15~17厘米，纳阴道内，晚睡时用，晨起取之，连用5日。

【主治】 滴虫性阴道炎。

【来源】 中西医结合治疗常见妇科疾病

宫颈糜烂

宫颈糜烂是指宫颈外口处的宫颈阴道部分局部表面的鳞状上皮因炎症而丧失，很快被颈管的柱状上皮所覆盖，使这部位的组织呈颗粒状的红色区，是子宫颈炎病理过程。临床上以白带增多，接触性出血为主要特点。相当于中医学“带下”范围。

方一

【组成】 儿茶、苦参、黄柏各25克 枯矾20克 冰片5克

【用法】 上药共研细末，用时香油调糊状，以带线棉球敷贴患处，3日1次，10次1疗程。

【主治】 宫颈糜烂。治疗598例，总有效率100%。

【来源】 吉林中医药 1982；（4）：34

方二

【组成】 虎杖、千里光、银花藤、野菊花、蒲公英（去花）各250克 艾叶60克

【用法】 上药水煎后，每次取1/4加温水1倍，冲洗阴道，每日2次，10次1疗程。

【主治】 轻度宫颈糜烂。

【来源】 常见病简易疗法手册

方三

【组成】 人参膏干粉 蛤蚧粉 黄连素 乳香 没药 儿茶 冰片 铅丹

【用法】 上药按5:2:0.2:0.2:0.2:0.3:0.1:2的比例分别研成细末，并过筛，取各药混匀，装入胶囊，每粒重0.5克。用药前先冲洗阴道，然后将药放入阴道后穹窿部。隔日1次，1次2粒，4次1疗程。

【主治】 宫颈糜烂Ⅰ度。治疗311例，治愈率94.1%。总有效率98.7%。

【来源】 中医杂志 1983; 24(11):39

方四

【组成】 紫草200克 香油750克

【用法】 取紫草筛土除杂质，入香油炸枯过滤，呈油浸剂，密封装瓶备用。冲洗外阴、阴道，将紫草油棉球涂擦宫颈及阴道上端，隔日1次，10次1疗程。

【主治】 单纯性Ⅰ度宫颈糜烂。治疗100例，痊愈率95%，总有效率96%。

【来源】 中西医结合杂志 1986; 6(4):237

方五

【组成】 紫草10克 白鲜皮10克 白芨10克 儿茶5克 乌梅2.5克

【用法】 上药研细面混匀，以紫外线消毒，用香油调匀入少量冰片。以制成各种形状的紫铜块焊接自行车条的一端，月经净后一周内查宫颈充血，脓性分泌物及阴道炎者。暴

露宫颈，将小烙铁在酒精上烧红后，自宫颈下唇灼烙并逐渐移至糜烂边缘，灼烙后局部以黄色、焦痂为宜。然后涂紫草油膏的带线棉球紧贴灼烙表面，24小时后抽出，5天换药1次，1个月1个疗程。

【主治】 宫颈糜烂。

【来源】 吉林中医药1985，（4）：19

方六

【组成】 青黛9克 青果核6克 月石60克 炉甘石90克 人中白90克 黄柏70克 西瓜霜30克 甘草30克 石膏15克 冰片1克 黄连1克 硼砂1克

【用法】 上药共研细末，用时先清除子宫颈上粘液，将药粉喷于子宫颈糜烂处，每日1次，10次为1疗程。

【主治】 宫颈糜烂。

【注意】 治疗期禁止性生活。

【来源】 中医妇科临床手册

第八章 五官科

中耳炎

中耳炎是指中耳发生的化脓性或非化脓性（渗出性）炎症，有急性、慢性之分。中医学称为“脓耳”、“聤耳”。

方一

【组成】 黄连12克 枯矾4.5克 冰片0.6克

【用法】 先将黄连焙干压碎，再将三种药混合，共研细末吹耳，每日1~2次，连用5天。

【主治】 非化脓性中耳炎。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 猪胆1个 白矾12克 冰片2克 臭大姐2个

【用法】 猪胆切一小口，余药共研细末盛入，阴干或炙干，取出药末装瓶备用。同时每日吹耳2次，7天1疗程。

【主治】 晚期久治不愈的中耳炎。

【来源】 北京中医 1986；（6）：58

方三

【组成】 核桃仁500克 冰片15克

【用法】 将核桃仁研细，煮熟（半小时），乘热用双层纱布包裹榨油，再加研为极细的冰片粉于油内，加温拌匀，装入消毒瓶内备用，先用3%双氧水洗去耳内分泌物，擦干，以上药点耳2~3滴，每日2~3次，至愈为止。

【主治】 渗出性中耳炎。

【来源】 四川中医 1987；（4）：39

方四

【组成】 红升丹60克 冰片3克 麝香1.5克

【用法】 上药共研细末，装瓶密封，消毒备用。用时先清除患侧外耳道分泌物（最好用吸引器），再以3%双氧水擦净，然后以75%酒精浸湿棉捻（以脱脂棉搓成长2~3厘米、直径1毫米的棉捻，消毒备用），在药末中蘸匀，放置于外耳道底部（应与鼓膜保持约2毫米距离，以防刺激鼓膜产生不适），每1~2日换药1次，2~4次后脓止耳干。

【主治】 化脓性中耳炎。

【注意】 用药捻后，耳内有凉爽感觉，个别有短暂微痛，旋即消失。用药初期脓性分泌物增多。

【来源】 陕西中医 1986；（12）：350

方五

【组成】 冰片适量

【用法】 冰片放瓷碗内，上扣大小相同瓷碗一个，对好后胶布密封，用武火熏烤约3~5分钟，冷却后开封刮霜，用时先清除耳内脓汁，再以棉球沾冰片霜塞入耳内，1日2次，5~7天1疗程。

【主治】 化脓性中耳炎。

【来源】 吉林中医药 1985, (3): 22

方六

【组成】 麝香1克 75%酒精10毫升

【用法】 麝香溶于酒精内，贮于瓶中密封7天后备用。用时先将脓液擦净，取麝香酊1~2滴，用滴管滴入耳内，然后用消毒棉球塞于外耳道。2日1次，3次1疗程。

【主治】 化脓性中耳炎。

【来源】 四川中医 1986, (4): 49

方七

【组成】 胭脂炭9克 蛇蛻炭3克 麝香450毫克 陈皮炭 枯矾各6克 冰片0.3克

【用法】 上药研为细末。先用药棉擦净耳孔，然后将药粉塞入少许。每日2~3次。

【主治】 慢性中耳炎。

【来源】 古今名方

耳鸣、耳聋

耳鸣又称“聊秋”，是指病人自觉耳内鸣响，妨碍听觉；耳聋是指不同程度的听力减退，轻者耳失聪敏，听而不真，称为重听，重者全然不闻外声，则为全聋。耳鸣、耳聋两病往往同时存在，可由肝火上扰，痰火郁结，肾精亏损，脾胃虚弱所致。两病中西医同名。

方一

【组成】 甘遂0.6克 甘草0.6克

【用法】 上药各研细面，左耳用甘遂，右耳用甘草，药末用脱脂棉条缠好，纳入耳中，每晚睡前纳入，早晨取出，疗程10~30天。

【主治】 耳聋。

【来源】 中华耳鼻咽喉科杂志 1959；（2）：19

方二

【组成】 鼠胆汁适量

【用法】 以鼠胆汁0.3毫升滴患耳，1日1次，10次为1疗程。

【主治】 单纯性耳聋。

【来源】 聋哑病概述

方三

【组成】 苍术适量 艾炷适量

【用法】 用小刀将苍术削成圆锥形，底面用针刺数小孔，然后底朝外塞进外耳道，将艾炷置于苍术上点燃施灸。每次施灸5~7壮，隔日或每日灸治1次，10次为1疗程，疗程间隔5~7天。

【主治】 耳鸣。治疗10例，总有效率90%。

【来源】 江苏中医杂志 1983；（2）：62

方四

【组成】 巴仁、川椒、菖蒲各等份 全蝎、松香各少许

【用法】 上药共研细末，用黄蜡为条，放耳内抽之。两耳交替，每日1次，每次抽10次，病愈即可。

【主治】 肾虚耳鸣耳聋。

【注意】 本法一般用于中老年性耳鸣、耳聋，孕妇禁用。临证时还必须视病情轻重，而酌情配合其它疗法，以求速效。有分泌物者慎用。

【来源】 中医外治法类编

方五

【组成】 柴胡、龙胆草、黄芩、青皮、胆星、芦荟、黄连、青黛、大黄、木通、菖蒲、皂角、细辛各50克 全蝎6个

【用法】 诸药共研碎，用布袋装均匀，作枕睡，间日翻动布袋1次。10~15日换药粉1次，病愈即卸下药枕。

【主治】 耳鸣耳聋。

【注意】 使用药枕时，慎防药粉漏出或受潮，降低药物疗效。

【来源】 中医外治法类编

方六

【组成】 丹参15克 白术15克 川芎、附子、蜀椒、大黄、干姜、巴豆、细辛、肉桂各15克

【用法】 诸药切碎，以醋渍一宿，熬枯去渣，用猪脂炼成1500克，同置银器中，微火熬成膏，倾入瓷盆中俟凝，绵裹枣核大，塞入耳中。每日1枚，双耳交替使用。

【主治】 久聋。

【注意】 塞药时，注意耳道深浅适中，勿误将药丸塞

入内耳道。小儿使用本法注意合作，耳内有分泌物时改用它法。

【来源】 中国膏药学

方七

【组成】 巴豆仁、蜀椒、石菖蒲、全蝎、松香各等份

【用法】 上药共研细末，装瓶贮备。用时将黄蜡熔化和诸药做成药条。放入耳内，每日换药1次，7日为1疗程，间隔3~5天再使用。

【主治】 肾虚耳鸣耳聋。

【注意】 纳药条时注意耳道深度，适中为宜，若双侧耳皆患病，交替使用。耳内有分泌物禁用本方。孕妇慎用。

【来源】 中国民间疗法

耳疖（耳疮）

本病多是由于火毒之邪，循经上耳，壅聚耳窍而发的疖疮。或因肝胆郁热，或可因过食膏粱厚味，辛味之品，致胃肠积热，火毒内生。另外，污水染耳，搔挖伤耳，毒邪侵入等亦可为其原因。本病相当于西医之外耳道疖肿，部分外耳道炎。

方一

【组成】 新鲜野菊叶30克 或黄连适量

【用法】 上药任选一种，煎成浓汁澄清，冲洗外耳道。每天3~4次，7~10天为1疗程。

【主治】 风热邪毒型耳疖。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 苍耳子虫 芝麻油 冰片

【用法】 将在8~10月份采到的活苍耳子虫（即苍耳子草杆的寄生虫），放入麻油中浸泡窒息致死，每50毫升芝麻油内加冰片1克，浸苍耳子虫100条左右，7天之后即可使用。将苍耳子虫研成糊状后，涂放于疖肿表面，用小棉球固定。若有空隙，用沾有苍耳子虫浸油的小棉球填满，使苍耳子虫能与疖肿紧密接触。若疖肿在外耳道的下方或肿胀较剧而空隙较小，上药不易移动者，也可不用小棉球固定。直至第二天换药时取出。每日换药1次，5~7日为1疗程。

【主治】 各型的耳疖。

【注意】 使用本品时，一般不用任何药物，若疖肿较重引起周围红肿、淋巴结肿大及全身症状时，应加用抗生素治疗。

【来源】 中西医结合杂志 1986，6（1）：47~48

方三

【组成】 虎杖500克 蒲公英150克 紫花地丁100克 冰片50克

【用法】 上药共研细末，装瓶备用即成虎蒲散。该散用凡士林软膏调和即为虎蒲软膏，用时敷于患处。每天换药1次。对于暴露部位的痈疖，先清洗除去脓痂，再用虎蒲散撒在疖上，外用纱布敷料固定。每日换药1次，以痊愈为止。

【主治】 各型耳疖。

【来源】 当代中医实用临床效验方

方四

【组成】 孩儿茶10克 制乳香10克 制没药10克 冰片3克 麝香0.6克 血竭10克 三七10克

【用法】 将上药用猪脂油（去渣）250克，加黄蜡30克，溶化倾碗内，加上7味调成膏，摊贴疖肿溃破处。每日换药1次，用至腐肉尽消，新肉长出。

【主治】 肝胆湿热型耳疖。

【来源】 医宗金鉴

方五

【组成】 曾青15克 雄黄21克 黄芩7.5克

【用法】 将上药捣为细末，研匀，每用少许纳入耳中，有脓出，即以绵杖子拭干用之。每日1次，用至痊愈。

【主治】 各型耳疮。

【来源】 疡科荟萃。

旋 耳 疮

旋耳疮是耳廓、外耳道等处皮肤搔痒，红肿或疼痛，流黄水，甚至起水疱、糜烂的皮肤病变。病因多是由于风、湿、热邪侵袭肌肤，或因脾虚挟湿而致。本病分虚、实性两种。急性者以湿热为主，慢性多为血虚。相当于西医诊断之耳部湿疹。

方一

【组成】 黄柏30克 石膏30克 枯矾15克

【用法】 上药共研细末，和匀吹耳。每日1次，用至痊愈。

【主治】 风热湿邪袭耳型。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 黄芩、黄柏各12克 枯矾6克 冰片3克 麻油500毫升

【用法】 先将芩、柏放入麻油中，浸泡24小时，然后放入铁锅上煎炸变为黑黄色，取出后研末，与冰片、枯矾细末同时放入麻油中，过滤装瓶备用。用时取适量塞入外耳道，每日换药1~2次，至愈。

【主治】 风热湿邪袭耳型。

【来源】 辽宁中医杂志 1988; 12(3): 48

方三

【组成】 枯矾15克 青黛6克 松香9克

【用法】 将以上诸药混合研细成末，用芝麻油或菜油调成糊状，装入瓶中备用。用药前用3%硼酸水或生理盐水将局部洗净擦干，再薄薄涂一层枯青松散糊剂。每日换药1次，用至痊愈。

【主治】 风热湿邪袭耳型耳疖。

【来源】 临床耳鼻咽喉科杂志 1989; 3(1): 47

断耳疮

断耳疮是指耳壳红肿，溃瘍疼痛，甚至断落而言，多由局部损伤染毒，肝胆经火毒热邪内炽，循经上犯，热灼血肉，软骨融蚀而成。与化脓性耳廓软骨膜炎相类似。

方一

【组成】 轻粉、穿山甲（煨）、铅粉、黄丹各9克
香油少许

【用法】 前4味药研细末，香油调，涂患处，每日1次，5~7日为1疗程。

【主治】 断耳疮。

【来源】 中药贴敷疗法

方二

【组成】 季德胜蛇药 75%酒精

【用法】 用75%酒精调蛇药，外敷患处，每日1次，7日为1疗程。

【主治】 断耳疮。

【来源】 中医耳鼻喉学

方三

【组成】 青木香、防己、芍药、玄参、白薇、大黄、芒硝、黄芩各2.4克 赤小豆3克 紫葛2.4克 榆木白皮适量

【用法】 前10味药研末，以榆木白皮捣汁和之，涂

布帛上，敷贴于患处，每日1次，用至红肿消即可。

【主治】 红肿未溃之时。

【来源】 太平圣惠方

耳廓假性囊肿

本病又称耳廓浆液性软骨膜炎。经对病理组织观察证实，实为假性囊肿。由于耳廓受机械性压迫刺激，使局部循环发生障碍，出现反应性渗出物积聚所导致。常单侧发病，多位于耳廓外侧面上半部。中医称之为耳廓流痰。

方一

【组成】 芙蓉叶、大黄、黄连、黄芩、黄柏、泽兰各80克 冰片2克

【用法】 上药共研细末，与适量凡士林调匀成膏，涂抹患处，纱布包扎。2~3日换药1次。

【主治】 耳廓假性囊肿。

【来源】 山东中医杂志 1986，（4）：3

方二

【组成】 食盐8克 碳酸2毫升 甘油100毫升

【用法】 先将食盐加入盛有甘油的烧杯中加温，不断搅拌，至食盐溶解，一般需20~75秒，待冷后，加碳酸，然后消毒局部后，先抽净局部所积聚的液体，再注入枯痔油0.1~0.2毫升。如日后再度隆起，4~7天后，可行第二次治疗。

【主治】 耳廓假性囊肿。

【来源】 新中医 1984; (4) : 46

耳胀、耳闭

外邪客于耳窍，耳内胀痛闭塞，耳鸣耳聋者，称耳胀。邪毒滞留，气血瘀阻，耳窍闭塞、重听，称耳闭。相当于西医所称急、慢性卡他性中耳炎。

方一

【组成】 五倍子30克 枯矾6克

【用法】 以上研细末，同时以喷药器或纸、竹管将药粉吹入耳内。一般1日1~2次。

【主治】 耳内卒然作胀作痛之证。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 楝实10克

【用法】 楝实捣烂如泥，纱布裹适量，塞于耳内。1日1次。

【主治】 急性卡他性中耳炎。

【来源】 太平圣惠方

方三

【组成】 青盐2000克

【用法】 盐装布袋内，蒸热，以耳枕之，冷则另换，1日熨2~3次，1次熨20~30分钟。

【主治】 风热证之耳中卒痛。

【来源】 肘后方

方四

【组成】 黄连120克 枯矾45克 冰片0.6克 甘油1000毫升

【用法】 先将黄连煎水2次，浓缩为1000毫升，滤过液，加入枯矾再滤，然加入冰片、甘油即成。用时取少许滴耳中，每日5次。

【主治】 胀耳，耳内胀闷等。

【来源】 中医耳鼻喉科学

鼻 疔

鼻疔的发病部位为鼻尖、鼻翼及鼻前庭。表现为局部红肿疼痛，形小根硬，或表面有黄白脓点，多因皮肤损伤，风热邪毒外袭，或膏粱厚味，火毒结聚，循经上犯鼻窍而生。相当于西医的鼻疖肿。糖尿病及便秘患者以及对葡萄球菌高度敏感者易患此症。有反复发作和迁延不愈的特点。

方一

【组成】 蟾酥6克(酒化) 轻粉1.5克 麝香、枯矾、寒水石(煨)、制乳香、制没药、铜绿、胆矾各3克 雄黄6克 蜗牛21个 朱砂9克

【用法】 将上药研为细末，吹入鼻孔患处。每日1~2次，用至肿消痛止。

【主治】 风热邪毒外袭及热毒壅盛型鼻疔。

【来源】 外科正宗

方二

【组成】 元参

【用法】 将上药泡软，取大小适中者塞鼻。每日换药2次，至红肿消失。

【主治】 风热邪毒外袭型鼻疔。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 五虎丹18克 蟾酥0.5克 米饭少许

【用法】 将上药调匀和熟，作为颗粒大小的钉状物，阴干备用。用时研成细末，用浆糊调成糊状，取绿豆大小1粒，紧贴在皮肤上，用万应膏贴紧，12~24小时后，此时就出现红肿坏死，而患疔部位则在1~2天内红肿逐渐消失。其严重性也随之减轻。

【主治】 热毒壅盛型。

（五虎丹：水银、白矾、毒矾、牙硝各90克 食盐30克按降丹法烧炼，炼成白色结晶者佳。）

【来源】 湖南中医学院学报 1982，（4）：31

鼻 疔

本病有急、慢性两种。以鼻孔附近皮肤红肿疼痛，或发痒、糜烂、结痂为主要表现。多由肺经郁热上攻鼻窍所致。相当于西医所称“鼻前庭炎”。中医又称“鼻疮”。

方一

【组成】 硫磺80克 雄黄20克 樟丹10克 凡士林200克

【用法】 前3味药研细粉，加入白凡士林调匀成膏。每日用消毒棉签蘸药膏涂布患处1~2次，重症3~5次。

【主治】 鼻疳。有效率达100%。

【注意】 涂药时尽量不要深及鼻腔粘膜，以免刺激产生不适。

【来源】 陕西中医 1988；9（12）：545

方二

【组成】 乌贼骨、白芨各3克 轻粉2克

【用法】 上药同研末，敷布于患处，每日2次。

【主治】 流脓痂之湿热证。

【来源】 本草纲目

方三

【组成】 漆大姑、苦楝树叶、桉树叶各30克

【用法】 以上药水煎，棉棒蘸药液反复擦洗患处，也可淋洗。1日3~5次。

【主治】 患处糜烂、溢水之证（可清热解毒，收敛止痒）。

【来源】 中医耳鼻喉科学

鼻 室

鼻塞，为一常见病，多发病，相当于西医之慢性鼻炎，常年均可发病。主要症状是鼻塞，呈间歇性或交替性，或夜卧时下侧鼻塞。时有分泌物，粘稠或清稀，伴有头痛头胀，咽干口燥等不适。常是由于脏腑虚弱，气血不调而致。

方一

【组成】 露蜂房90克 辛荑花60克 苍耳子、射干、藿香各45克

【用法】 取露蜂房90克用95%酒精回流提取活性物质转溶于注射用水中，再取辛荑花90克，苍耳子、射干、藿香各45克用水蒸气蒸馏法制成过饱和挥发油水溶液，将上述药液混合至500毫升，加防腐剂，使 $\text{pH} < 7$ ，然后分装成针剂，每支10毫升，高压灭菌。临用时将药液抽入滴鼻管中滴鼻。每日3次，每次滴鼻2~3滴。治疗期间停用其他滴鼻药，疗程2~4周。

【主治】 各型鼻塞。

【来源】 安徽中医学院学报 1986；8（3）：45

方二

【组成】 辛荑10克 细辛3克 檀香3克 藁本10克 白芷10克 川芎10克 鲜松针3克

【用法】 将上药水煎，汤药煎成后，用药液热气熏鼻1~2分钟，并用热毛巾敷鼻梁、前额、顶门等处，每日2~3次，至症状减轻或消失。

【主治】 脾虚肺寒型鼻塞。

【来源】 上海中医药杂志 1982; (10): 21

方三

【组成】 皂角刺3克 蔓荆子10克 石榴皮10克 苍术10克

【用法】 将上药水煎后，以汤药蒸气熏入鼻腔。每日3次，每次10~25分钟，7~14日为1疗程。

【主治】 气滞血瘀型鼻塞。

【来源】 江西中医药 1988; (1): 2

方四

【组成】 辛荑花200克

【用法】 将上药粉碎后入蒸馏瓶中，加水过药面，蒸馏3~4小时，取出蒸馏液用分层漏斗分层，可得辛荑花挥发油3毫升，芳香水500毫升，芳香水内加0.5%尼泊金防腐，加0.9%氯化钠调至等渗过滤，取滤液加上原挥发油，用5%吐温助溶分装于小瓶中，高压灭菌后备用。用时将棉片浸湿塞入鼻腔，保留15~20分钟后取出。每日1次，7次为1疗程。

【主治】 各型鼻塞。

【来源】 中西医结合杂志 1989; 9(8): 501

方五

【组成】 生葱20克 辛荑5克 冰片2克

【用法】 将辛荑、冰片二药，共研极细末，装瓶备用。用时取生葱一把约20克，放入搪瓷杯注入沸水500毫升，再取一把葱管约3.3厘米半长，洗净晾干，一半插入鼻

孔内吸取杯中葱水蒸气，两鼻孔交替使用，每次约5分钟左右，至鼻塞通畅为止。然后再用辛荑、冰片细末少许置于指头上，按于鼻孔吸入，每日早晚各1次，7日1疗程。配合内服中药，10日为1疗程。一般用药5日即获初效，1~2疗程可以痊愈或获得显效。

【主治】 肺经郁热及脾虚肺寒型鼻塞。

【来源】 河南中医 1987；（1）：34

鼻 炎

鼻炎是指鼻腔及鼻窦粘膜的急、慢性炎症而言。属中医学之“伤风鼻塞”、“鼻塞”、“鼻渊”等范畴。另有萎缩性鼻炎和过敏性鼻炎，分别属“鼻槁”、“鼻鼽”范围。

方一

【组成】 辛荑、白芷、百部、牛蒡子、蒺藜、鱼腥草、地肤子、鹅不食草各100克 荆芥120克 薄荷70克

【用法】 除薄荷后下外，将上药放入沙锅内，加清水700毫升，浸泡4~6小时，煮沸后改文火煮1.5~2小时后加入薄荷，继续煎半小时后，用纱布将药液滤出，待冷却后，用生硼砂粉调节pH至8，再按3%加入苯甲酸钠防腐剂静置2~3天，取澄清（即鼻敏水）分装滴鼻瓶备用。每日滴鼻4~5次，每次2~3滴。

【主治】 过敏性鼻炎。观察172例，痊愈49例（28.49%），显效84例（48.83%），好转33例（19.18%），总有效率为96.5%。

【来源】 广西中医药 1980；（2）：12

方二

【组成】 桃树嫩尖叶1~2支

【用法】 用手揉绒成棉球状塞入患鼻，停留10~20分钟，待鼻内分泌大量清涕，不能忍受时，弃掉塞药。每日4次，一般连用1周左右。

【主治】 萎缩性鼻炎。观察治疗40例，痊愈37例，好转3例，总有效率为100%。

【来源】 广西中医药 1981；4（6）：15

方三

【组成】 苍耳子（砸裂纹）、白芷、辛夷各60克 冰片粉6克 薄荷霜5克 芝麻油500毫升 液体石蜡1000毫升

【用法】 将芝麻油、苍耳子、白芷、辛夷同放沙锅内，浸泡24小时，加热，待苍耳子、白芷、辛夷炸成黑黄色捞出，再下冰片粉、薄荷霜、液状石蜡，搅匀，冷却后过滤，分装眼药水瓶内备用。用时仰头滴鼻，每次滴1~2滴，日滴1~2次。

【主治】 各种鼻炎及鼻窦炎之鼻粘膜充血，或干燥萎缩，鼻塞流涕，嗅觉失灵等。共治疗360例患者：慢性鼻炎者87例，萎缩性鼻炎者138例，过敏性鼻炎者78例，鼻窦炎者57例。共痊愈207例（57.5%），好转114例（31.7%），中断滴药者21例（5.8%），无效18例（5%）。

【来源】 新中医 1981；（11）：10

方三

【组成】 川芎、鹅不食草各30克 细辛、辛夷各6克

青黛3克

【用法】 上药共研细末，取少许搐鼻。每日1次。

【主治】 鼻炎。

【来源】 古今名方

急性鼻炎

急性鼻炎为鼻腔粘膜的急性感染性炎症，多称为伤风或普通感冒。临床表现以鼻塞、流涕、鼻痒、喷嚏等局部症状为特征。中医称之为伤风鼻塞。

方一

【组成】 苍耳子、辛荑、白芷、银花、连翘、野菊花、黄芩、丹皮、鹅不食草各150克 薄荷100克 细辛50克 鲜大叶桉叶300克

【用法】 将上药放入适当的沙锅或搪锅内，加水约7500毫升，煮沸后泡浸4~6小时，再用文火煮沸1小时后加入薄荷，续煮20分钟停火，过10分钟后用纱布将药水滤出，约得2000毫升为宜。待药冷却后加入生硼砂粉约20克，以调节pH至7~8之间，静放1~2天，使其自然沉渣，取澄清药水按3‰加苯甲酸钠防腐备用。装滴瓶内，每支10毫升，日滴3~5次，每次2~3滴。初滴可引起喷嚏或鼻涕较多，一般2~3分钟即止，无其它副作用。

【主治】 急性鼻炎。治疗74例，有效率97.3%，治愈率89.18%。

【来源】 广西中医药 1978；（3）：27

方二

【组成】 辛荑花30克

【用法】 将辛荑花研末，瓶贮密封。用时取药适量吹鼻。1日3~5次，3日为1疗程。

【主治】 急性鼻炎。

【来源】 中医耳鼻喉科学

方三

【组成】 辛荑花200克

【用法】 上药粉碎后装入蒸馏瓶中，加水过药面，蒸馏3~4小时。取出蒸馏液用分层漏斗分层，取得辛荑花挥发油3毫升，芳香水500毫升。芳香水内加0.5%尼伯金防腐，加0.9%氯化钠调至等渗过滤，取滤液加上原挥发油，用50%吐温助溶分装于小瓶中，高压灭菌后备用。用时将棉片浸湿塞入鼻腔，保留15~20秒后取出。每日1次，用药1~2次分泌物增多，排出后通气立即改善。

【主治】 急、慢性鼻炎。

【来源】 中西医结合杂志 1989；（8）：501

过敏性鼻炎

过敏性鼻炎，又称变态反应性鼻炎，为机体对某些变应原(亦称过敏原)敏感性增高而呈现以鼻腔粘膜病变为主的I型超敏反应，并常伴发过敏性鼻炎。有长年性发作和季节性发作两型。临床表现以突然和反复发作鼻内奇痒，连续喷嚏，多量水样鼻涕为特征。相当于中医学之“鼻鼽”。

方一

【组成】 辛荇花1000克 苍耳子、黄芩各1000克 青黛250克

【用法】 ①取辛荇花蒸馏，收集等量的蒸馏液，另器保存。②辛荇蒸馏后的药渣与他药合并，煎煮2次后以水醇法处理。③将蒸馏液于水上加热至60℃左右，加入1~3%吐温80，与已经活性炭处理过的煎煮液合并、摇匀，加适量新鲜注射用水，以氯化钠调节等渗，再加入0.5~1%苯甲醇，调pH值为6.5~7.0后，加注射用水20000毫升，用3号垂熔滤器减压过滤至澄清，分装于已清洁处理的盐水瓶中密塞，经115℃灭菌30分钟。临用前装于滴鼻管中，每支10毫升。每日3次，每次3~4滴，连滴1周为1疗程。

【主治】 治疗鼻部疾病1194例，疗效以过敏性鼻炎最好，显效率60%，好转率28%。

【来源】 中西医结合杂志 1985；（12）：750

方二

【组成】 细辛5克 白芷、辛荇、川芎各15克 薄荷10克

【用法】 各药共研细末，以10克生药面加7根6厘米长洗净带须葱白。先将葱白捣烂，除去粗纤维后与药面搅拌，加香油调成糊状，以自然滴下为度，不可过稀。每日3~4次洗鼻，每次3~5滴。

【主治】 过敏性鼻炎。治疗10例，治愈3个月以上未发5例，2个月复发3例，2例有效但不能停药。

【来源】 新中医 1989；（10）：6

方三

【组成】 辛荑、苍耳子、白芷、丝瓜藤各100克 绿矾50克 薄荷60克

【用法】 将上药研成细粉，过120目筛，将细粉装入胶囊内备用，用鼻吸入或将药末吹入鼻腔，每日3次，每次0.1克，10日为1疗程，隔3~5天再行第2疗程。一般用药4~6次后，症状即可减轻。

【主治】 过敏性鼻炎。治疗156例患者。显效占62.2%，有效32.7%，8例未坚持治疗。

【注意】 初次使用，鼻腔有轻微痛感且稀涕增多，约10分钟后缓解，用几次后可适应。

【来源】 人民军医 1986；（7）：61

方四

【组成】 白芥子50% 细辛30% 甘遂20%

【用法】 上药烘干，共研细末，过筛，用鲜生姜汁或蜜糖调成药膏，于每个伏天的第一天敷贴。取穴：肺俞、风门、大杼、膏肓、肾俞、脾俞。每次3个穴位，贴1~3小时，病人感觉灼热难受，可提前将药物自行除去。

【主治】 过敏性鼻炎。治疗556例，临床治愈10.4%，有效72.8%，无效16.7%。

【注意】 血证及明显实热证者禁用。治疗期间，禁食生冷，避免感冒，谨慎房事，嘱其多做鼻部按摩，以疏通经络，提高疗效。

【来源】 中国针灸 1989；（3）：1

方五

【组成】 斑蝥 白芥子各20克

【用法】 将药研极细末，以50%二甲基亚砷调成软膏状。用时取麦粒大一团置于2×2平方厘米的胶布中心，贴于穴位上，取穴为内关、外关（均双侧），交替贴治，每周次，4次1疗程。必要时可连贴2~3个疗程。一般贴后3小时（儿童2小时）揭去。

【主治】 过敏性鼻炎。治疗64例，显效39例，有效19例。

【来源】 中医杂志 1983；（9）：684

方六

【组成】 王不留行籽10克

【用法】 主穴：过敏点、肺、内鼻、外鼻。配穴：肾、脾、肾上腺、皮质下等。用王不留行籽常规方法贴于选择的穴位上，要求有痛感，嘱病人每日压3~5次，每次约5分钟，压完后耳朵发热，外表发红为度。隔日换对侧耳，同时去掉旧的，4周1疗程。

【主治】 过敏性鼻炎。治疗21例，显效8例，改善12例。

【来源】 中西医结合杂志 1989；（11）：684

萎缩性鼻炎

萎缩性鼻炎又称臭鼻症、慢性臭性鼻炎、硬化性鼻炎，是一种慢性鼻腔疾患。其主要表现为鼻腔粘膜、骨膜和鼻甲

骨（主要是下鼻甲骨）萎缩，鼻腔宽大，有大量黄绿色脓性分泌物积存，形成痂皮、发生恶臭，并有明显嗅觉障碍。相当于中医之“鼻槁”。

方一

【组成】 冰片3克 蜂蜜100克

【用法】 取冰片3克研末，溶于蜂蜜100克中搅匀，即成冰蜜擦剂。用棉签粉涂双侧鼻腔，1日3~5次，连续涂至病愈。结合内服养阴育肺汤加味，5剂1疗程，间隔2~8个疗程。

【主治】 萎缩性鼻炎。治疗23例，总有效率78.2%。

【来源】 四川中医 1987；（10）：37

方二

【组成】 苍耳子160克 辛荑16克 麻油1000毫升

【用法】 先将麻油温热后加入研碎的苍耳子和辛荑，浸泡24小时，再用文火煎至800毫升，冷却过滤，装瓶备用。每日滴3次，1个月1疗程。

【主治】 萎缩性、慢性鼻炎。

【来源】 常见病简易疗法手册

方三

【组成】 桃树嫩尖叶1~2枝

【用法】 用手揉绒成棉球状塞入患鼻达10~20分钟，待鼻内分泌大量清涕，不能忍受时才弃掉塞药。每日4次，一般连用1周左右。

【主治】 萎缩性鼻炎。治疗40例，37例痊愈，3例好

转，总有效率100%。

【来源】 广西中医药 1981；4（16）：15

方四

【组成】 王不留行籽10克

【用法】 用探棒在耳穴的肺、内鼻、外鼻、脾、肾、皮质下、内分泌、神门、风溪（过敏区）寻找压痛点或探感阳性反应点。用王不留行籽贴在0.7平方厘米的胶布上，然后再贴到探好的穴位上，要求有痛感，嘱病人每日压3~5次，每次约5分钟，压完后耳朵发热，外表发红为度。隔日换对侧耳，施法同上，同时去掉旧的，10次为1疗程。

【主治】 各种慢性鼻炎。治疗45例，总有效率达86.7%。

【来源】 广西中医药 1990；13（1）：30

鼻旁窦炎

鼻旁窦炎是由于某种致病因素引起鼻旁窦发生炎症的疾病。主要症状：头痛、发热、鼻阻塞、鼻溢液，嗅觉障碍。临床上分急性和慢性炎症。相当于中医的“鼻渊”，又称“脑漏”，“脑渗”，“历脑”，“控脑痧”等。

方一

【组成】 当归、黄芩、冰片、辛荑、白芷、苍耳子、荆芥、麝香、地胆、蟑螂

【用法】 经过炮制，煎熬浓缩，再加胡麻油稀释而成。每日3次点鼻，7天为1疗程。

【主治】 鼻旁窦炎。共治105例，总有效率达90.5%。

【来源】 中医杂志 1989；（1）：42

方二

【组成】 新鲜青苔适量（以能填塞1侧鼻腔为度）

【用法】 将药物洗净，然后用纱布包好，塞入鼻腔，12~24小时另换新鲜青苔。凡患单侧者，塞患侧鼻孔，双侧者交替使用。

【主治】 鼻旁窦炎。治疗169例，总有效率96.5%。

【来源】 浙江中医药杂志 1984；（6）：257

方三

【组成】 当归、赤芍、银花、红花、贝母、桔梗、黄芩

【用法】 上药依法制成灭菌水溶雾化剂，10毫升为单位。通过雾化管吸入鼻腔，每次15分钟，每日1~2次，10天为1疗程。

【主治】 鼻旁窦炎。治疗60例，总有效率为90%。

【来源】 江苏中医杂志 1989；（3）：19

方四

【组成】 芙蓉叶、香白芷、辛荑花各15克 细辛3克 冰片1克

【用法】 将上药共研细末，先用药棉将鼻腔内涕液擦干净后，再取适量用鼻吸入，1日3次，每次2~3下，连用3~5天。

【主治】 鼻旁窦炎。

【注意】 ①嗜鼻时可口含水以防药物灌入气道；②嗜鼻后若鼻发干，可涂芝麻油以润之；③嗜鼻药物皆有刺激性，若用后病情加重则应停用。

【来源】 四川中医杂志 1984，（2）：46

方五

【组成】 绿豆、王不留行籽

【用法】 取耳穴内鼻、肺、肾上腺、额，用75%酒精局部消毒，取绿豆分成两半，将绿豆的平面或王不留行籽贴在0.7平方厘米的胶布中间，可将绿豆的光滑面或王不留行籽对准穴位贴覆，并让患者用手指按压，每日压3~5次，每次10分钟左右，贴覆1次可持续5天，休息3~5天，再进行第二次压豆，5次无效者可改用其他疗法治疗。

【主治】 鼻旁窦炎。

【来源】 中国民间疗法

方六

【组成】 薄荷脑、樟脑、薰衣草油 1%麻黄素

【用法】 取前3味药，依法制成白花油，取1%麻黄素，滴患侧鼻腔，在额窦底壁压痛最明显处，涂少许白花油，并以拇指轻按揉5分钟以下，用毛巾湿热敷30分钟，每日2次，7日为1疗程。

【主治】 额窦炎。治疗36例，总有效率为100%。

【来源】 中西医结合杂志 1990，10（2）：102

鼻 息 肉

鼻息肉赘生于鼻腔内，常呈进行性增生，出现渐进性鼻塞、嗅觉障碍、脓涕等症状。息肉可突出于鼻孔，或内垂于咽部。中医称之为鼻痔。

方一

【组成】 霜梅1个 蓖麻仁7个 生矾少许

【用法】 诸药同捣烂如膏，用纱布包药膏适量塞于鼻腔。1日1换，10天为1疗程。

【主治】 鼻息肉。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 细辛、白芷、辛夷、苦丁香各6克 僵蚕10克 冰片0.3克

【用法】 诸药研细成粉，以棉球蘸之少许，塞于鼻腔。每日1次，10天为1疗程。

【主治】 鼻息肉。

【注意】 塞鼻深浅要适度，以不引起喷嚏为宜。如引起喷嚏，可将药棉向外退回一些。塞鼻剂所含药物刺激性较强，最好用纱布包之塞入，并应减少塞鼻时间。塞鼻剂大小要合适，切不可过小，以防误入气道。

【来源】 中医外治方药手册

方三

【组成】 苦丁香、细辛、苍耳子、辛荑各6克 僵蚕9克 冰片0.5克

【用法】 诸药研细末后，再加冰片合研成极细末。以药粉少许吹撒于息肉处，1日2次。

【主治】 鼻息肉。据对36例本病患者的治疗观察，配合服药，痊愈19例，显效与好转15例。

【来源】 中国医药学报 1988，6（1）：41

方四

【组成】 苍术、白芷、乌梅 五味子各适量

【用法】 药物置壶内煎煮，鼻孔凑近壶嘴，以雾气熏吸。每日1次，10天为1疗程。

【主治】 鼻息肉。

【来源】 辽宁中医杂志 1984，（7）：25

方五

【组成】 白芷、辛荑、杏仁、甘遂各20克 芝麻油250毫升

【用法】 将药与油同入锅内浸24小时后，加火将药炸成黑黄色为度。离火除去药渣，加液状石蜡500毫升，冰片1.5克，薄荷霜1克，搅匀过滤，分装入瓶内备用。用时仰头滴鼻或用棉球滴药塞鼻，每日2～3次。

【主治】 鼻息肉。

【来源】 中医耳鼻喉科学

急性扁扁桃体炎

急性扁扁桃体炎是腭扁桃体的非特异性急性炎症，也可伴有一定程度的咽粘膜及其他淋巴组织的炎症，但以腭扁桃体的炎症为主。可分为急性充血性扁扁桃体炎和急性化脓性扁扁桃体炎两类。临床表现咽痛、吞咽困难。相当于中医的“风热乳蛾”。

方一

【组成】 马鞭草750克 瓜子金 1000克 七叶一枝花 250克（均为鲜品）

【用法】 上药洗净切碎，用蒸馏水浸泡1小时，再补充水浸过药面，煎煮2次纱布过滤，两次滤液浓缩至10000毫升，加防腐剂，放置3~5天，滤除沉淀，加糖后煮沸，再用三层纱布过滤，冷却后慢慢加入薄荷油（先用酒精溶解）适量，不断搅拌，放置2~3天，用布袋吊滤，分装备用。每次5~8毫升，每日8次含服。3天为1疗程。

【主治】 急性扁扁桃体炎。治疗150例，显效72例，有效66例，总有效率92%。

【来源】 中西医结合杂志 1983；3（1）：13

方二

【组成】 双花、菊花各300克 红花、赤芍各350克 寸冬250克 玄参150克

【用法】 上药制成水剂，每次用量15~20毫升，加水10~15毫升，经吸入器直接喷入咽喉部。每日1次或隔日1

次，5天1疗程。

【主治】 治疗急性扁桃炎等咽喉炎症100例，显效43例，有效55例，无效2例。

【来源】 黑龙江中医药 1985；（16）：28

方三：

【组成】 珍珠、麝香、蟾酥、僵蚕各30克

【用法】 诸药共研细末，混匀后装瓶，密封备用。轻型者，将药粉置于5分钱币大小的医用胶布中心，贴于下颌角处，5天取下可见多量淡黄色分泌物即可。一次用药不超过0.5克。重型者，先用三棱针浅刺扁桃体红肿处，使其出血，将喉症散均匀吹于患部，再按上法贴药。贴1次，5天痊愈。

【主治】 急性扁桃体炎。治疗631例，全部有效，远期治愈率93%。

【来源】 新中医 1989；21(9)：3

方四

【组成】 斑蝥12克 冰片、乳香、没药、全蝎、血蝎、玄参、樟脑各1.8克

【用法】 上药共研极细末，装瓶备用。取药末少许置小块伤湿止痛膏或医用胶布上，贴列缺穴（左右均可），2~3小时后揭下。共治80余例，一般1~2次即可痊愈，贴药2小时左右咽痛明显减轻。

【主治】 急、慢性扁桃体炎。

【来源】 新医学 1986；17（2）：72

方五

【组成】 硼砂、金银花各15克 荆芥、防风、薄荷、连翘各6克 甘草3克

【用法】 煎水含漱或用皮球吹管吸药水喷射患处。每日3~4次。

【主治】 急性扁桃体炎。

【来源】 易玉泉家传方

方六

【组成】 薄荷、僵蚕、青黛、朴硝、白矾、火硝、黄连、硼砂各1.5克

【用法】 诸药研为细末，与猪胆汁搅匀，阴干。每30克加冰片0.9克，研细末，取少许吹入患处。

【主治】 急性扁桃体炎、喉炎。

【来源】 外科正宗

方七

【组成】 苦瓜霜 硼砂各20克 朱砂（水飞）、冰片、胆矾、雄黄精、人中黄各5克 麝香、制僵蚕各3克

【用法】 共研极细末，以喉枪或三用吹粉器吹布患处。应用本药时，再配合内服方及漱涤剂疗效更佳。

【主治】 急性扁桃体炎。

【来源】 易玉泉家传方

方八

【组成】 象牙屑、珍珠、青黛、冰片、壁钱、牛黄。

人指甲各等量

【用法】 上药共研极细末，用时取少许吹喉中。

【主治】 急性扁桃体炎。

【来源】 中医耳鼻喉科学

慢性扁桃体炎

慢性扁桃体炎是因机体抵抗力下降及变态反应引起的腭扁桃体的慢性非特异性炎症。临床表现咽部不适、发痒、微痛、口臭。类似于中医的虚火乳蛾。

方一

【组成】 玄明粉15克 朱砂1.8克 硼砂9克 冰片1.2克

【用法】 上药研为细末，装瓶密封。用时取少量吹入咽喉，每日3次，10日1疗程。

【主治】 慢性扁桃体炎。

【来源】 耳鼻咽喉科全书·咽科学

方二

【组成】 麝香1.5克 陈皮10克 白芷10克 桔梗10克 梅片10克 硼砂12克 僵蚕12克 黄连8克 儿茶10克 朱砂12克 连翘10克 玄明粉12克 牛蒡子10克 豆根10克 甘草8克

【用法】 上药共研极细末，密封瓶内。同时取少许放入患处，久含后可吞下。每日3次。

【主治】 一切咽喉病。

【来源】 上海中医药杂志 1980; (3): 34

方三

【组成】 筋骨草12克 菊花20克 金果榄20克 金银花20克 (均为鲜品)

【用法】 将上述药物捣烂，外敷喉部痛处。每日1次，10次为1疗程。

【主治】 咽喉炎。

【来源】 中国民间草药方

方四

【组成】 硼砂、朱砂、西瓜霜各6克 熊胆3克 牛黄0.9克 麝香0.3克 冰片1.5克 飞滑石0.6克

【用法】 研为细末，饭后吹患处，每日3次。病轻者只吹此散即可，病重者配合内服清咽散。

【主治】 咽喉炎。

【来源】 中医验方汇选

方五

【组成】 人中白3克 马勃粉15克 青黛3克 儿茶3克 玄明粉1.5克 硼砂3克 薄荷1.5克 黄连1.5克 牛黄0.9克 珍珠粉0.9克 梅片0.9克

【用法】 上药共研极细末，每次吹药少许，每隔1~2小时1次。

【主治】 急、慢性扁桃体炎。

【来源】 中医耳鼻喉科学

方六

【组成】 大青叶1000克

【用法】 取大青叶1000克，洗净，装入纱布袋内，加清水至药面2厘米，至水煮沸后需30多分钟，倾出药液，用纱布过滤，药渣依法煎2次。将3次药液合并直至浓缩，大约5000毫升（采用隔水浓缩或小火浓缩至2000~5000毫升）。用棉花过滤，加入尼泊金1克防腐（需加热溶解）。分装、消毒、备用。用直流感应电疗机，让患者仰卧，将大青叶浸湿8×12平方厘米的四层纱布（以不滴水为限），平铺100厘米的绒布垫上，此为有效极，接机器的阴极，置咽喉部，另150~200平方厘米电极接机器的阴极，放在后颈部，用量4~8毫安，每日1次，每次20分钟，10次为1疗程。

【主治】 慢性咽喉炎和扁桃体炎。

【来源】 新医药 1971；（1）：20

喉 痛

发于咽喉的痈疡即称喉痛。以发病迅速、咽喉肿痛显著、吞咽困难，甚至阻碍呼吸、语言难出为其临床特点。可因发病部位不同而异名，如发于喉关称喉关痛，类似于西医所称“扁桃腺周围脓肿”；发于喉底称里喉痛，即西医所称“咽后脓肿”。

方一

【组成】 银花、菊花、蒲公英各适量

【用法】 上药适量，煎取药液，新鲜草药则可捣汁，将药汁含漱，1日10数次。

【主治】 初期、成脓期喉痹。

【来源】 中医耳鼻喉口腔科临床手册

方二

【组成】 玄参20克 大青叶15克 牛蒡子10克 金银花15克 桔梗、甘草各6克 薄荷9克

【用法】 将药物置有嘴壶中，加水适量，盖好壶盖，加热煮沸，蒸气由壶嘴冒出时，病人凑近将气吸入。1日2~4次，1次15~20分钟。

【主治】 初期喉痹。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 大黄30克 文蛤10克（炒） 露蜂房10克（蜜炙） 芙蓉叶、白芨、羌活、黄柏各30克

【用法】 上药共研末、蜜水调和，敷颈前疼痛处，每日1次。

【主治】 初期、成脓期喉痹。

【来源】 中医外治方药手册

方四

【组成】 元参、白芍、熟地、当归、川芎、黄柏、知母、天花粉、桔梗、荆芥、甘草各等份

【用法】 上药研末，竹沥调匀涂。同时再用生草乌、生南星末各等份，醋调敷足心。

【主治】 喉痛、喉闭、喉疮。

【来源】 中医外治法类编

方五

【组成】 黄芩30克 射干15克 金银花20克 硼砂10克

【用法】 将上药加水300毫升，煎煮去渣后剩1000毫升备用。用雾化吸入法。每日2~3次。

【主治】 喉痛及各种咽喉病。

【来源】 精选八百外治验方

方六

【组成】 青黛6克 山豆根10克 硼砂10克 元明粉10克 牛黄3克 胆矾3克 冰片2克

【用法】 诸药研极细末。用时局部吹撒，每日3~4次。

【主治】 喉痛、咽部溃疡及急性咽炎

【来源】 咽喉经验秘传

方七

【组成】 朱砂、冰片、煅壁虎各3克 硼砂1.5克 川黄连2.1克 凤凰衣、熊胆各1克 麝香0.3克 青黛4.5克

【用法】 凤凰衣微火焙，川黄连切碎晒干，勿见火，壁虎微火煅，各药研细末，再加入熊胆、麝香、冰片研至无声，密贮固封。用时吹喉。每日3~5次。

【主治】 喉炎、喉痛等。本方若与解毒养阴药配合，疗效尤捷。

【来源】 喉科秘传十二方

慢性咽炎

慢性咽炎为慢性感染所引起的弥漫性咽部病变，常伴有其它上呼吸道疾病，为咽科中的常见症。临床上多将此病分作三型：慢性单纯性咽炎、慢性增生咽炎和慢性干燥性咽炎，但也有人认为以上各型属同一疾病的不同病期。此病多发于成年人，病因复杂，治疗棘手且易复发。相当于中医的虚火喉痹。

方一

【组成】 玄参20克 大青叶15克 牛蒡子10克 金银花15克 桔梗6克 甘草6克 薄荷9克

【用法】 用壶式、杯式或瓶式雾化法，将气雾吸入，每日数次。

【主治】 慢性咽炎。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 生地10克 元参、大青叶各15克。

【用法】 上药煎水，放冷，喝一口含在口中，停半分钟漱口吐出，再含第二口，如此反复数次可连续应用，直至病愈。

【主治】 慢性咽炎。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 紫金錠30克 参三七15克 米醋适量

【用法】 上药共研极细末，分3次醋调敷于颈前喉结上方凹陷处，以纱布覆盖，胶布固定，并用醋经常保持湿润，隔日换药1次。

【主治】 慢性咽炎。治疗7例，用药2~6次后，痊愈5例，显效2例。

【来源】 浙江中医杂志 1986；21（2）：562

方四

【组成】 斑蝥12个（去翅足，糯米炒），净乳香、净没药、黑元参、上血竭、淡全蝎各1.8克 麝香、冰片各0.9克

【用法】 上药共研极细末，备用。取此散如豆大，放膏药上，贴喉外耳下软骨处，约10小时去膏药，皮上起泡，用针刺破，一次即可起到消肿止痛功效。隔日1次，连用3次。

【主治】 慢性咽炎。

【来源】 新中医 1955；（7）：15

方五

【组成】 黄连、黄柏、玄明粉（风化）各3克 冰片1.2克 麝香0.3克 明矾、甘草各1.5克 鹿角霜（刮去皮、髓）15克 硼砂7.5克

【用法】 先研前三味，再入其他药，共研极细末。吹入患处。

【主治】 咽喉炎、口腔粘膜溃疡肿痛等。

【来源】 中医喉科学讲义

方六

【组成】 珍珠粉3克 麝香、地龙、手指甲各0.6克
地虱婆0.3克（焙黄） 琥珀、玛瑙、珊瑚各3克（同入沙锅内文火煨半小时） 蚕茧2只（烧灰存性） 朱砂3克 冰片1.2克 马勃0.03克

【用法】 研为极细面，过细筛，频吹患处。

【主治】 咽喉炎。

【来源】 刑锡波医案选

失 音

凡语声嘶哑，甚则不能发出声音，统谓之失音。感受外邪，壅遏肺气；或虚火炼金，肺气受损，均可出现失音。大致包括西医所指急、慢性喉炎，喉头结核，声带息肉、结节、创伤等病。

方一

【组成】 鱼腥草液

【用法】 以超声雾化器吸入鱼腥草液，每日2次，每次20毫升。

【主治】 声带息肉、结节。配合内服中药，治疗各类失音，有效率达95%。

【来源】 陕西医学杂志 1987；16（6）：50

方二

【组成】 冰片3克 硼砂3克 青黛1.5克

【用法】 上药研细粉,以纸管或喷药器,吹入于咽喉,每日3~5次。

【主治】 急性喉炎及痰热闭阻证。

【来源】 中国民间疗法

方三

【组成】 双花、菊花各300克 红花、赤芍各350克
麦冬250克 玄参150克

【用法】 上药制成水剂,每次以药液20毫升,加水15毫升,用吸入器直接喷射至咽喉部。每日或隔日1次。5日1疗程。

【主治】 急性咽喉炎、急性会厌炎、扁桃腺炎等,有效率达98%。

【来源】 黑龙江中医药 1985; 6:23

方四

【组成】 桑叶、菊花、杏仁、薄荷、枇杷叶各5克
黄柏、黄芩各10克 芦根15克 板蓝根30克

【用法】 上药装入布袋,置普通高压锅蒸煮,将蒸汽通过160厘米胶管接T型玻璃喷头,对患者颈前、咽喉部喷射,温度40~43℃。

【主治】 失音。

【来源】 中华护理杂志 1984; 7(4):213

方五

【组成】 玉蝴蝶15克 苦桔梗12克 胖大海7枚 甘草9克

【用法】 将药物装入暖水瓶中，倒入滚开水1杯，盖紧，10分钟后可用。用时取药液含漱，1日10数次以上。

【主治】 失音。

【来源】 常见病简易疗法手册

方六

【组成】 防风、甘草、荆芥各4.5克 金银花15克 连翘1.5克 薄荷3克

【用法】 上药煎煮15分钟，待凉后含漱，每日5~6次。

【主治】 咽喉炎、失音、口腔溃疡。

【来源】 古今名方

天行赤眼生翳

天行赤眼生翳是指天行时气毒邪侵袭双目引起白睛红赤肿胀，黑睛生翳如星点的眼部疾病。又称天行赤热暴翳。与西医学之流行性角膜结膜炎相类似。

方一

【组成】 川连5克 西瓜霜5克 月石0.2克 硝苯汞0.004克 蒸馏水100毫升

【用法】 将川连放在水内加热煮沸30分钟，过滤后如

入西瓜霜等药，再加热待烊化后过滤，再加蒸馏水至100毫升。每日点眼4次。

【主治】 外感风热之症。

【来源】 简明中医眼科学

方二

【组成】 蒲公英120克

【用法】 为鲜者用量，根、茎、叶、花皆用，花开残者去之。如无鲜者可以干者60克代之，煎汤二碗，温服一碗，余一碗乘热薰洗。

【主治】 病之初期。

【来源】 医学衷中参西录

方三

【组成】 代赭石4克 生石膏2克

【用法】 上药共研细末，加新汲水调匀，涂布太阳穴，眼内、外眦，干后再涂。

【主治】 肺胃积热证。

【来源】 穴位贴药疗法

方四

【组成】 炉甘石（炼过）60克 黄丹（制过）60克
川乌45克 犀角30克 乳香、没药、硃砂、青盐各4.5克
硼砂、血竭、轻粉、麝香各6克 片脑1.5克 麝香1.5克
蕤仁（去壳）4.5克

【用法】 上药共研和匀极细末，收贮。用时，每夜临卧时点眼，点2次。

【主治】 天行赤眼生翳。

【来源】 银海精微

天行赤眼

天行赤眼俗称红眼，为风热毒邪，时行疔气所致的一种白睛红赤肿痛的眼病。其临床特点为发病急剧，多累及双眼，往往一人发病，迅速传染，广为流传，常见于春夏暖和季节。相当于现代医学的急性卡他性结膜炎，流行性出血性结膜炎。

方一

【组成】 春茶叶（干品）20克 黄连（研末）5克

【用法】 上药加开水200毫升，于沙锅内煮沸10分钟，用消毒纱布过滤后静置于消毒玻璃杯中，沉淀后取澄清液装入滴管瓶或注射器内备用。每只眼点2滴，每天4次，连续3天或至愈；用于预防时，每只眼点1滴，每天点4次，连点3天。

【主治】 急性结膜炎。

【注意】 配制药液应在3天内用完，过期勿用。

【来源】 福建中医药 1989；20（4）：17

方二

【组成】 黄柏30克 菊花15克

【用法】 上药加开水500毫升浸泡2小时，用纱布过滤，以此药汁外敷或洗眼，每次约10分钟，每日2次，连用1~2天或病愈停用。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 新中医 1975; (4): 8

方三

【组成】 茶叶、烟丝各适量

【用法】 先用开水浸泡茶叶1小杯，待冷后倒出茶水，将烟丝放入茶水中浸渍1小时左右，然后倒尽烟水，取出烟丝轻捏至不滴水为止。患者于临睡前用温开水清洗双眼，然后以烟丝敷双眼眼皮，用纱布覆盖，绷带固定（注意避免烟丝误入眼内）。翌日清晨打开绷带，弃除烟丝。轻者1次即可，重者次日再用。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 广西中医药 1990; 13(3): 26

方四

【组成】 黄柏、大黄、生地各2份 红花、白芷各1.5份 薄荷叶0.8份 冰片0.2份

【用法】 先将生地竹刀切片晒干研粉，再将红花、大黄、黄柏、白芷、薄荷叶研极细末，后加冰片混和研匀，瓶装密封备用。用时取药末适量，以冷开水调成糊状，平摊于二层消毒纱布中央，让患者取平卧位，平敷于患处，上盖二层消毒纱布，胶布固定。敷贴时间每次2~3小时，一般1~3次即可。

【主治】 急、慢性结膜炎和麦粒肿。

【来源】 中医杂志 1986; 27(10): 45

方五

【组成】 千里光（又名九里明） 木贼各9克 银花、陈艾各6克 花椒10粒

【用法】 上方加水800毫升煎后，滤去药渣，趁热倒入暖水瓶内，患眼对准瓶口，利用药物热气熏蒸；待药汤温度不高时，用消毒棉花或纱布蘸洗患眼，每次约10分钟，每天2次，连用1~2天或至愈。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 广西中医药 1981；（增刊）：105

方六

【组成】 薄荷、鹅不食草各15克 青黛、川芎各30克

【用法】 上药共研细末，密贮备用。使用时令患者口含温开水，取药末少许吹鼻（或让患者用鼻吸之），左痛吹右，右痛吹左，双眼俱痛，左右均吹。吹药以泪出为度（如不流泪，可再吹之），流泪以后吐出所含之水。每日2~3次，3日为1疗程或病愈停用。

【主治】 风火眼痛。

【来源】 浙江中医杂志 1983；18（6）：253

方七

【组成】 皮硝、红枣各500克 黄连100克

【用法】 黄连洗净，研为粗末，用适量蒸馏水煎煮提取3次，提取液适当浓缩后入皮硝溶化，过滤，再以去核红枣吸收药液，半天后取出烘干，又放入药液内吸收，反复至吸尽为度，烘干，每3个红枣一袋分装于塑料袋中备用。治疗时

取药枣1枚用开水约300毫升泡之，片刻即呈淡黄色溶液，用此液热敷或冷敷患眼，每日3~4次，3天为1疗程或病愈停用。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 新中医 1983；（9）：35

方八

【组成】 千里光（九里明）120克 秦皮30克

【用法】 取千里光、秦皮洗净，加适量蒸馏水煎煮2次，合并煎液，略浓缩（或加水）使至1000毫升，过滤至澄明，分装于盐水瓶中，灭菌（100℃，30分钟）备用。治疗时取适量溶液冲洗结膜囊，亦可作湿敷或置于喉头喷雾器中作喷眼，每日2~3次，3天为1疗程或至愈。

【主治】 急性结膜炎。

【来源】 新中医 1983；（9）：34

角 膜 炎

角膜炎是角膜受微生物的侵袭，外伤或化学物理性刺激所引起的炎症。属中医学之“花翳白陷”、“聚星障”、“白睛干涩”、“混睛障”等范畴。

方一

【组成】 青鱼胆

【用法】 将青鱼胆阴干，研碎过筛取极细研末，点于眼角上，早晚各1次，3日即愈。

【主治】 肝经风热型角膜炎。

【来源】 偏方大全

方二

【组成】 鸡蛋1个 冰片少许（约0.1克）

【用法】 鸡蛋去白留黄熬油，冰片研极细，二者混合，再用凡士林10克调匀。每日3次挑少许涂入眼内。

【主治】 腑实热盛型角膜炎。

【来源】 眼科证治经验

方三

【组成】 黄连、细辛、当归、杏仁（去皮尖，为霜）防风、松脂各15克 白芷、黄蜡各30克 麻油120克

【用法】 先将蜡、油熔化，前药共研为细末，慢火熬膏。贴太阳穴。

【主治】 虚热稽留型角膜炎。

【来源】 医宗金鉴

方四

【组成】 珍珠、水晶、贝齿各50克 石决明、琥珀各1.5克 空青、玛瑙、龙脑各25克

【用法】 共研为细末，加水浓煎，入蜜15克研和为膏。每夜临睡时点眼，早晨不点。

【主治】 角膜炎症。

【来源】 秘传眼科龙木论

麦粒肿

麦粒肿又称睑腺炎，是眼睑腺组织的一种急性化脓性炎症。临床上以眼睑缘皮肤局限性红肿、胀痛，3~5日后化脓溃破而肿痛渐消为特点。相当于中医的“针眼”。

方一

【组成】 新鲜鸭跖草茎3.3厘米长许1段

【用法】 上药洗净，用手挟持呈45°角，置于酒精灯（或矿烛）火上燃烧上段草茎，即可见下段有水珠泡沫液体滴出，将此液体涂于患处及其周围，每日3~5次，2天为1疗程。

【主治】 麦粒肿。

【来源】 浙江中医杂志 1983；18（1）：43

方二

【组成】 黄连3克 乳汁适量

【用法】 将黄连捣碎置于瓶内，加入乳汁，以浸没药物为度。浸泡1日后，滤出其汁，以此药汁点涂患处，每日3~4次，2~3天为1疗程。

【主治】 麦粒肿。

【来源】 临床验方集锦

方三

【组成】 天花粉、天南星、生地黄、蒲公英各等量

【用法】 将上药焙干研成细末，用食醋和液体石蜡油

调成膏状，经高压消毒后备用。治疗时根据麦粒肿的大小，用不同量的膏剂，涂在纱布或胶布上敷贴患眼局部，每日换药1次，3次为1疗程或病愈停用。

【主治】 麦粒肿。

【来源】 新中医 1981；（8）：7

方四

【组成】 桑叶、菊花、金银花各15克 黄连、防风归尾、赤芍各9克

【用法】 上药加水煎熬后，过滤去渣，用此药汁按熏洗法操作，熏洗患眼，每次15~20分钟，每天2~3次，3天为1疗程或病愈停用。

【主治】 麦粒肿。

【来源】 熏洗疗法

方五

【组成】 石胆（研如粉）0.3克 黄连（去须捣）、黄柏（去粗皮捣）各1克 蕤仁（去皮研）、铜青（研）芒硝各15克

【用法】 将上药入乳钵中，重研令极细匀，瓶装备用。治疗时取黍米大药粉，点患目眦头，每日2~3次，3天为1疗程。

【主治】 针眼暴肿痛不得开。

【来源】 中医眼科历代方剂汇编

方六

【组成】 ①蒲公英30克 苦参、黄柏、连翘、木鳖子

各12克 金银花、白芷、赤芍、丹皮、生甘草各9克 ②芙蓉叶120克 生大黄、赤小豆各60克

【用法】 先把方②诸药共研细末，用凡士林调和成膏，备用；再将方①诸药共为粗末，用纱布包扎好，加水煎煮后，过滤去渣，用此药液按薰洗法操作，薰洗患处，每次15~20分钟；薰洗后取上述药膏适量摊于消毒纱布上，外敷患处。每日2~3次，2天为1疗程或病愈停用。

【主治】 麦粒肿。

【来源】 薰洗疗法

方七

【组成】 龙胆草、生大黄、黄柏、知母、黄芩、银花、甘草各等份

【用法】 上药共研细末，加入榆皮粉20%拌和。用时用冷开水调成糊状，涂一层纸上，贴在患处。约7~8小时换药1次。

【主治】 麦粒肿尚未破溃者。

【注意】 勿入眼内，已溃者勿用。

【来源】 眼科临证录

沙 眼

沙眼是一种慢性结膜炎症，具有传染性。因病变的结膜面有细胞浸润，乳头增生和滤泡形成面变粗糙，故称沙眼。是致盲的主要眼病之一。其临床特点：初起时可无症状，或有痒感、烧灼、干燥、异物感和视力模糊等症。病程长，易伴发急性结膜炎和角膜溃疡。属中医学“椒疮”、“粟疮”

范畴。

方一

【组成】 白芷、羊蹄躑花（减半）、鹅不食草（洗净晒干）、当归、雄黄（另研加入）各等份 麝香少许

【用法】 上药共为细末，每用少许，含水嚙鼻内，去尽浊涕，泪出为度。

【主治】 浸润进行期沙眼。

【来源】 医宗金鉴

方二

【组成】 取炉甘石150克 黄连120克（锉豆大） 片脑5克

【用法】 将上药前2味入银石器内，加水2碗，煮2沸时，去黄连为末，入片脑研匀罐收。每点少许，频用取效。

【主治】 瘢痕出现期沙眼。

【来源】 李时珍濒湖集简方

方三

【组成】 霜桑叶10克 元明粉5克

【用法】 将上药煮沸5分钟后，去渣，澄清过滤，取汁备用，每日洗眼两次。

【主治】 浸润进行期沙眼。

【来源】 韦文贵眼科临床经验选

方四

【组成】 明矾、胆矾、黄连各3克 木贼6克

【用法】 上药水煎薰洗，每晚1次。1剂可薰洗1周，下次薰洗需要加热，如患者感觉刺激强，可酌加适量开水再用。

【主治】 浸润进行期沙眼。

【来源】 红医手册

方五

【组成】 制甘石30克 月石6克 琥珀6克 东丹1.5克 朱砂4.5克 珠粉1.5克 牛黄1.5克

【用法】 以上各药精制研极细，逐个混合，再研均匀，然后加入适量石蜡油薄糊状，然后再与白凡士林60克混合均匀即成，每日3次，挑药少许涂入眼内。

【主治】 瘢痕出现期沙眼。

【来源】 眼科证治经验

方六

【组成】 西月石粉60克（将生月石粉研细，沙锅内微炒至松为度，用纸包裹，放在土上去火毒，10天即成） 冰片10克 麝香、犀牛黄各1克

【用法】 先用月石15克，冰片10克，麝香、犀黄各1克和匀共研约2小时，然后加入月石45克共研，研至无声、无粘、无渣为度。用时每日点眼2次，分早、晚点。每次半粒芝麻大为度。点于内眦部，点后闭眼5~10分钟。

【主治】 沙眼，急、慢性结膜炎。

【来源】 韦文贵眼科临床经验选

胬肉攀睛

胬肉攀睛是指眼眦部长出大片红肉，其状如蝇翅，横贯白睛，攀侵黑睛，甚或遮盖瞳神的眼部疾病。相当于西医学之“翼状胬肉”。

方一

【组成】 人乳10克 川连2克

【用法】 先将川连与开水30克煎沸过滤，再将其水与人乳调匀装眼药水瓶，每日点眼6次（夏季，人乳与川连水每晚煮开后贮放，第2日可再用，以防变质）。

【主治】 进行性胬肉。

【来源】 中医简易外治法

方二

【组成】 珍珠末、龙脑、熊胆各0.3克 石决明、琥珀各0.9克 水晶、龙齿各15克

【用法】 诸药共捣碎为末，研令极匀。以水5升，石器内煎至1升，去粗煎至1盏，入蜜15克和为膏，每晚入卧点之，早晨不可点。

【主治】 进行性胬肉。

【来源】 秘传眼科龙木论

方三

【组成】 羌活、防风、黄芩、菊花、蔓荆子各9克
川芎、白芷各6克 炉甘石15克 火硝2.4克 冰片0.3克

【用法】 将上7味用纱布包裹，用水煮20分钟，取出药汁，入水少许，再煮沸20分钟，去渣取汁，将两次药汁用小瓦罐文火蒸之，使成糊状，然后将冰片、炉甘石、火硝等研成细末，渐渐加入调匀，即可使用。用前先点1%地卡因2次，每次隔5分钟，然后取药少许，涂擦胬肉表面，每日2次，5日为1疗程。

【主治】 进行性胬肉。

【来源】 简明中医眼科学

方四

【组成】 羌活、防风、荆芥、川芎、白芷、细辛、蔓荆子、薄荷、踯躅花各3克 熟石膏、风化硝、黄连、青黛各9克 鹅不食草15克

【用法】 上药共研细末，过细筛封贮备用。用时口含冷开水1口，不可咽下与吐掉，随取药0.2~0.3克吹入鼻内。嗜后待眼自觉症状轻快，方可把口含开水吐掉，1日可行2~3次。5日为1疗程。

【主治】 各种进行性胬肉。

【来源】 中医外治法简编

方五

【组成】 胡黄连130克 密陀僧15克 蜂蜜120克

【用法】 先将胡黄连于蜂蜜内浸1宿，次日入密陀僧末和匀，用白瓷碗盛。再用黑豆10毫升，于锅内以水煮，候熟，将药碗放在豆上，勿令豆汁入内，候豆熟为度。将药过滤，龙脑0.75克入内，搅匀，停3日后再用。点眼，每日数次。

【主治】 目赤生胬肉。

【来源】 普济方

方六

【组成】 矾石不拘多少（上白者）

【用法】 将矾石研成极细末，点于粟米大于翳及胬肉上，即冷泪出，以手帕拭之，令恶汁尽。每日1次，其病逐恶汁出尽，翳日渐变薄便落。

【主治】 目翳及胬肉攀睛。

【来源】 眼科外用中药与临床

赤膜下垂

赤膜下垂是白睛赤膜贯下，由黑睛上缘侵入，簇集似膜，状如垂帘，又名垂帘翳。多因肝肺风热壅盛，或肝火上乘于目，热郁脉络致成本病。多见于椒疮、粟疮之后期，与西医之沙眼血管翳相似。

方一

【组成】 炉甘石 冰片 硼砂 黄连素 白芷

【用法】 上药适量研极细加基质为膏。1日3次或睡前涂眼。

【主治】 肝肺风热上壅型赤膜下垂。

【来源】 中医眼科学

方二

【组成】 川连5克 西瓜霜5克 月石0.2克 硝苯汞0.004克 蒸馏水100毫升

【用法】 先将川连放在水内加热煮沸半小时，过滤后加入西瓜霜等药，再加热，待烊后过滤，再加水至100毫升即成。每日点眼3~4次。

【主治】 肝肺风热上壅型赤膜下垂。

【来源】 著名中医学家的学术经验

方三

【组成】 制炉甘石60克 煅珊瑚、琥珀各4.5克 冰片18克 麝香、珍珠各1.2克 朱砂3克 煅硼砂6克 熊胆7.5克

【用法】 共研极细末，将药粉少许点入眼角内。

【主治】 目赤肿痛，翳障遮睛等。

【来源】 古今名方

方四

【组成】 龙脑、膩粉、马牙硝、秦皮各50克 防风、黄连各1.5克

【用法】 除龙脑外，研末，以水2碗，浸药2日后，煎取2大盏，滤去渣，再煎3~5沸，用瓷盒盛，入龙脑搅匀密封。点眼，每日3~4次。

【主治】 赤膜下垂。

【来源】 秘传眼科龙术论

花翳白陷

花翳白陷是以黑睛生翳，表面溃陷，形如花瓣，或似鱼鳞，其色灰白为特征的眼部疾病，与西医学之单纯疱疹性角

膜炎的地图状溃疡相类似。

方一

【组成】 蒲公英、四季青、黄芩、野菊花各30克

【用法】 将诸药加蒸馏水1600毫升，加热煮沸1小时，取药汁过滤。再入水800毫升，加热煮沸30分钟，取药汁过滤。将两次药液混合，放冰箱内3天过滤去除沉淀，再放入冰箱冷藏，再去沉淀，如此反复，令沉淀去尽，然后加热浓缩至320毫升，再以1%氢氧化钠调节酸碱度至8左右，再过滤1次即可。每隔1~2小时点眼1次。

【主治】 病之各期。

【来源】 眼科证治经验

方二

【组成】 白矾9克 川椒3克 艾叶6克 青盐3克

【用法】 将诸药放沙锅内，兑水500毫升，煎水200毫升，过滤，去尽沉淀，用消毒棉花蘸药水洗眼。每日可反复温之，熏洗数次。

【主治】 病之初期。

【来源】 眼科临床笔记

方三

【组成】 鹅不食草10克 青黛、川芎各3克

【用法】 先将鹅不食草洗净晒干再与青黛、川芎共研细末，过细筛，固封备用。用时口含冷开水1口（冷天改用微温开水），不可咽下与吐掉，取上药0.2~0.3克吹入患眼一侧鼻内，两眼有病则药量加倍喷入两鼻孔，喷后即眼泪鼻涕

交流，待眼自觉症状轻快，方可把口含开水吐掉，鼻内药亦可搽掉，1日2～3次。

【主治】 肝胆积热症。

【来源】 敷药疗法

牙 痛

牙痛是多种牙齿疾病和牙周疾病常见症状之一。因其疼痛性质和部位不同，因而牙痛的类型和治疗也不同。包括西医学“急性牙髓炎”、“牙龈炎”、“牙周炎”等疾病。

方一

【组成】 新鲜地骨皮适量

【用法】 将地骨皮洗净，刮嫩皮，在石器中捣碎，用河水半碗，井水半碗，入地骨皮，以碗盖浸片刻，将水含漱，口热即吐。

【主治】 虚火牙痛。

【来源】 奇方类编

方二

【组成】 露蜂房9克 野菊花9克 薄荷叶9克 香白芷6克 川花椒2克

【用法】 将上药以清水300毫升煎至约200毫升时过滤，待微温后，取适量含漱，每隔1小时1次。通常含漱后痛即止。

【主治】 风火牙痛。

【来源】 中草药外治验方选

方三

【组成】 革拨(杵碎)、辽细辛、露蜂房、公丁香(杵碎)各6克

【用法】 将上药放入沙锅中，加清水300毫升，文火煎至约剩汁200毫升时过滤，瓶贮备用。每用温药汁适量含漱，通常频频含漱牙痛即止。

【主治】 风寒牙痛。

【来源】 中草药外治经验方选

方四

【组成】 革拨、甘松、白芷各10克 生草乌4克 冰片3克 鹅不食草6克 细辛5克

【用法】 共研细末过筛后，装瓶密封备用。用时以本品0.3克噤鼻。

【主治】 各种牙痛。

【来源】 中级医刊 1983，(6)：29

方五

【组成】 细辛(去苗叶)、川芎 藁本(去苗土)各30克 地骨皮15克 蒺藜子0.9克 独活(去芦头)30克

【用法】 上药共为细末，用时先用油涂头顶，以手摩擦一二百遍，再用上药粉涂头顶摩擦数遍。

【主治】 牙痛。

【来源】 普济方

方六

【组成】 苍耳子仁（焙黄，研末）60克 生竹叶（去梗）500克 生姜120克 食用盐180克

【用法】 小铁锅一口（洗净），将竹叶投入，盛清水，以浸淹竹叶为度；用木炭火煮熬成浓汁后，再将生姜捣汁入锅内，煮沸过滤去渣。药汁仍回入锅内，煮沸，将白盐徐徐投入，拌匀，熬干，熄灭取去药层，与苍耳子仁共研细末，和匀，入瓶密封，备用。凡牙痛，无论何型，立即取牙盐散少许涂搽患处，日涂3次，每次数遍，数次必效。

【主治】 牙痛。

【来源】 上海中医药杂志 1983；（7）：34

方七

【组成】 川乌、草乌、良姜、细辛、白芷各3克 白酒60克

【用法】 将药与酒共置酒壶内，稍浸片刻，煨热，用酒含漱，连用二、三次即可。

【主治】 风火、肾虚或痰热所致牙痛。

【来源】 民间秘传效方

方八

【组成】 樟脑3克 川椒3克 细辛2克

【用法】 上药研为极细末，放锅勺内，用茶盅盖严，糊面封固四周，勿令透气。放入数火上煨烧，约15~20分钟，移地候冷，揭开则霜药俱在茶盅底，入瓷器收贮。取少许霜药塞痛处。

【主治】 龋齿牙痛，风火牙痛。

【来源】 验方选编

方九

【组成】 草拨5克 蟾蜍1克 川椒2.5克 盐1.5克

【用法】 上药共研细末备用。用时用药点搽痛牙根处。

【主治】 牙痛。

【来源】 外科正宗

方十

【组成】 生川乌、生草乌、草拨各10克 白芷10克
细辛5克 冰片3克 白酒250毫升

【用法】 上药酒浸10~14天去渣备用。用时外涂牙根部。

【主治】 牙齿肿痛。

【来源】 精选八百外用验方

方十一

【组成】 硼砂、樟脑、火硝、青盐各等份

【用法】 共研极细末，疼时用少许涂患处。涂药后，口中流涎，可随时吐出。

【主治】 风火、虫蚀牙痛及其他各种牙痛。

【来源】 医书效方

龋 齿

龋齿是牙体组织被龋蚀，逐渐毁坏崩解的一种疾病，是

口腔的常见病和多发病。如不及时治疗，龋坏继续向深部发展，可致牙髓病、牙痛、牙槽风等症。中医学亦称“龋齿”。

方一

【组成】 露蜂房适量

【用法】 将露蜂房适量放于纯酒精中（酌量），点火燃烧，待露蜂房烧成黑灰后，用此灰涂擦患牙，一般4~5分钟止痛。

【主治】 龋齿牙痛。

【来源】 新中医 1982；（12）：51

方二

【组成】 山柰、细辛、薄荷、韭菜子各6克 陈米醋90克

【用法】 将各药切碎，浸入醋内，经36小时，取出过滤，瓶贮备用。每用冷漱3分钟，连续3次，如此1日3次，为1疗程。

【主治】 龋齿牙痛。

【来源】 浙江中医杂志 1964；7（3）：25

方三

【组成】 乳香15克

【用法】 用火烧燃乳香，就有油出，急取油滴入龋齿内。

【主治】 龋齿牙痛。

【来源】 简易中医疗法

方四

【组成】 轻粉0.03克 独蒜1头（或去膜蒜瓣5克）

【用法】 将蒜捣烂如泥和轻粉搅均匀，嘱病人左右两手虎口交叉，一手的拇指指押在另一手的虎口两叉骨上，当拇指头到达之处，敷上药膏（男左女右），用贝壳盖上，并用细带固定。俟敷药处略有烧灼感时，揭去贝壳与药膏，随即起一水泡。

【主治】 龋齿牙痛。

【来源】 福建中医药 1966；（2）：40

方五

【组成】 肥赤马肉500克 硼砂100克 粉霜25克

【用法】 肉与硼砂拌和，以器物盛之，于有日处顿放。晒出蛆，令自干。研为细末，每蛆末50克，入粉霜25克，同研匀。用时先以针拨动牙根，四畔空虚，次用灯心蘸药少许，点牙根下。良久，其牙自动落。

【主治】 龋齿。

【来源】 普济方

牙 衄

牙衄，乃指非外伤性从牙缝中或牙龈上渗出血液而言。又称“牙龈出血”、“齿衄”等。属西医学的“牙周炎”、“牙龈炎”等。

方一

【组成】 茅根30克（鲜茅根80克） 天花粉15克 生石膏45克

【用法】 先煎生石膏半小时，然后入它药，水煎取汁450毫升，凉后含漱，每日4~6次，1日1剂，2~6天为1疗程。

【主治】 牙衄。

【来源】 中医杂志 1984；25（3）：9

方二

【组成】 大黄炭90克 地骨皮150克

【用法】 加水1000毫升，浸泡2小时，煎15分钟，取药液；再加水500毫升煎10分钟。两煎合并过滤，共得滤液约600毫升，加食醋200毫升，混匀。每日3~5次，每次40~50毫升含漱。

【主治】 牙龈出血。

【来源】 陕西中龋 1983；4（4）：封四

方三

【组成】 人中白30克 儿茶30克 黄柏9克 薄荷9克 青黛9克 冰片1克

【用法】 上药共研细末过筛，贮瓶备用。用时取少许涂擦患处。

【主治】 牙龈出血。

【来源】 中医口腔学概要

方四

【组成】 地锦草15克 仙桃草12克 地骨皮15克 大生地15克 炒蒲黄9克 三七粉6克 五倍子6克 煨枯矾3克

【用法】 先将前4种药用清水300毫升煎至约剩药汁200毫升时离火，过滤备用；再将后4种药碾成极细粉，瓶贮备用。用时先取前4种药汁适量含漱，漱后取所碾之药粉适量涂擦出血之牙龈。通常于漱、涂后出血即止。

【主治】 牙龈出血。

【来源】 中草药外治验方选

牙 痛

牙痛，又名牙棋风。发于牙龈，肿起一块，疼痛溢脓。相当于西医学的“牙根周病”。

方一

【组成】 雄黄1.5克 五倍子3克

【用法】 将雄黄入五倍子内，以火煨之，研末，装瓶备用。用时取药粉少许涂擦患处。

【主治】 牙痛。

【来源】 家庭中医灵验便方

方二

【组成】 黄蜀葵花15克 地骨皮15克 野菊花、骨碎补、薄荷叶各15克

【用法】 将上药共入陶土罐中加清水300毫升，放在

文火煎至约剩200毫升时，离火待温过滤，瓶贮备用。用时取微温药汁适量含漱，每隔2小时含漱1次。

【主治】 牙痛。

【来源】 中草药外治验方选

方三

【组成】 香椿叶、红糟各适量

【用法】 上二药共捣如泥，敷患处外侧。

【主治】 牙痛。

【来源】 常见病验方研究参考资料

骨 槽 风

骨槽风是起于耳前腮项间，肿硬如小核隐于皮肉，渐大如核桃，最后牙床腐坏的疾病。多因手少阳三焦、足阳明胃二经风火邪毒上灼，或脾阳虚衰，无力托毒外出所致。临床上以腮颊肿痛，继之溃破流脓难愈，下唇麻木，口噤，日久有多骨脱出等症为特点。相当于现代医学的颌骨骨髓炎。

方一

【组成】 草乌、干姜各90克 赤芍、白芷、制南星各30克 肉桂15克

【用法】 上药共研细末，取药粉适量，用陈酒调成糊状，按箍围药法涂敷腮颊肿处，外用纱布固定。敷药略干后，宜用陈酒湿润，以助药力。每日换药1次。

【主治】 阴寒证未溃者。

【来源】 外科正宗

方二

【组成】 风化硝3克 白矾3克 食盐3克

【用法】 将上药加水200毫升，煎开待凉，口含漱涤。轻者每日3~4次，重者每日5~6次。口腔吹药前漱涤口腔，亦可作食前饭后的漱口剂。

【主治】 颌骨骨髓炎。

【来源】 中医外科临床手册

方三

【组成】 炙推车虫（即滚矢蜣螂）3克 干姜1.5克

【用法】 上药各研细末，和匀，取药粉适量吹入溃孔内。

【主治】 溃脓后坚肿不消，牙关紧闭不解，在牙床部或颊部溃孔内可探及多骨，日久不脱出者。

【注意】 如有多量，吹药次日其骨当不痛自出。若吹过周时无骨松，则知内无多骨，可换用收口药治疗。

【来源】 外科证治全书

方四

【组成】 当归、白蜡各60克 甘草36克 白芷15克 轻粉、血竭各12克 紫草5克 麻油500克

【用法】 先将当归、甘草、白芷、紫草4味，放麻油内浸3日，入大勺内慢火熬微枯，细绢滤清，复入勺内煎滚，入血竭化尽，次入白蜡，微火化开。用茶盅4个，预放水中，将膏分作4处，倾入盅内，候片时，下研细轻粉，每盅3克，搅匀备用。治疗时取药膏适量，匀涂消毒纱布上，

敷贴患处，每日换药1次。

【主治】 骨槽风溃后无多骨，腐肉已尽，肉芽生长缓慢者。

【来源】 外科正宗

方五

【组成】 胡椒37.3克 明矾、火硝、黄丹 各11.19克
麝香3.73克

【用法】 上药共研细末，用蜜调作2丸。取药1丸，病在左握左手，病在右握右手，用布包扎，松紧适度，不可移动。12小时换药1次。

【主治】 骨槽风肿痛溃烂者。

【注意】 忌茶水和房事。

【来源】 中医外治法简编

牙齿动摇

牙齿动摇又称牙齿浮动。手阳明之脉入下齿，足阳明之脉入上齿，齿为骨之余，寄龈以为养，所以齿动与手足阳明和肾关系密切。属西医学的“牙周病”。

方一

【组成】 升麻、骨碎补、生石膏各等份

【用法】 上药共研细末，然后制成合剂，含漱良久，1日3次。一般用药3天即见效，用药1周有明显效果。

【主治】 牙齿动摇。

【来源】 浙江中医杂志 1982；（8）：368

方二

【组成】 白矾、风化硝、食盐各15克

【用法】 上药加蒸馏水1000毫升溶解过滤，刷牙用。

【主治】 阳明热壅型牙齿动摇。

【来源】 中级医刊 1980；（3）：49

方三

【组成】 乌贼骨粉50克 槐花炭5克 地榆炭5克 儿茶5克 薄荷脑0.6克

【用法】 诸药研末兑匀，装瓷瓶备用。每用时取少许刷牙，每日3次。

【主治】 肾阴虚型牙齿动摇。

【来源】 中级医刊 1980；（3）：49

方四

【组成】 滑石粉18克 甘草末3克 朱砂末0.9克 雄黄末1.5克 冰片末1.5克

【用法】 诸药研末，装瓶备用。用时取牙刷蘸药刷患处，取药末30克、生蜜60克，调匀，涂患处，每日早晚各1次。

【主治】 各型牙齿动摇。

【来源】 新中医 1982；（2）：39

方五

【组成】 旱莲草31克 骨碎补31克 青盐3克

【用法】 诸药共研细末，用时少许药粉摩擦牙龈，1

日3次。

【主治】 肾阴虚型牙齿动摇。

【来源】 中级医刊 1980; (3): 49

口 疮

口疮又称口疡，其特点是口舌浅表溃烂，形如黄豆，多见于唇、舌、颊粘膜、齿龈、硬腭等部位。青壮年多见，常反复发作。西医称之为复发性口腔溃疡，亦称阿弗他性口炎。

方一

【组成】 黄连10克 加开水100毫升浸 柿霜10克
儿茶5克 硼砂、青黛各3克 冰片、血竭各1克 共研细末

【用法】 以消毒棉签蘸黄连浸液溃洗口腔内患处，然后撒涂药末。每日4次。

【主治】 心、胃火盛之证。配合内服清心泄火剂，治疗800例，2周内痊愈100%。

【来源】 四川医学 1981; 2(3): 160

方二

【组成】 黄连5克 黄柏、乌梅各10克 玄明粉5克

【用法】 前3味药水煎2次，去渣，兑入玄明粉，溶化后，频频含漱，1日10余次。

【主治】 火证口疮。

【来源】 新中医 1983; (8): 20

方三

【组成】 吴茱萸末3克 醋适量

【用法】 以醋调药末如膏，敷于双足心涌泉穴，每日换药1次。分别有引火下降或引虚浮之火归元的作用。

【主治】 各种证型，尤其是反复发作性的尤佳。治愈率可达96%。

【来源】 中医外治法集要

方四

【组成】 煅人中白、白芷各100克 冰片15克

【用法】 将药物研细末，用时以细玻璃管或麦杆撮取药末，均匀吹布于疮面，也可以消毒棉签涂抹患处，1日2~3次。

【主治】 心胃火证。有效率达98%以上。

【来源】 四川中医 1989；7（1）：19

方五

【组成】 明腰黄0.6克 真黄0.3克 青黛 甘草 冰片各0.6克 黄柏、龙胆草各0.3克

【用法】 在应用该方治疗复发性口疮有效的基础上，将散剂制成药膜贴敷。按溃疡面积决定药膜大小，每日3~6次。贴后药膜缓慢溶解。

【主治】 口疮。治疗62例，有效率达85.5%。

【来源】 中西医结合杂志 1987；7（8）：490

方六

【组成】 柏叶炭6克 冰片、五倍子各0.6克

【用法】 共研细末，加生蜜30克，调成糊状，每饭后漱口涂药。

【主治】 复发性口疮。

【来源】 古今名方

方七

【组成】 珍珠粉、犀牛黄、麝香各4.5克 雄黄、蟾酥、冰片各3克

【用法】 各研细末，用酒化蟾酥，与前药末调匀为丸，如芥子大，百草霜为衣。可外用，亦可内服，每服5~10丸，每日2~3次。

【主治】 咽喉肿痛或溃疡，扁桃体炎，口疮痈疽等。

【注意】 孕妇慎用。

【来源】 雷允上涌芬堂方

方八

【组成】 珍珠 牛黄

【用法】 将上药适量研细末，外用取少许，吹于患处，每日2~3次。

【主治】 口疮。

【注意】 忌辛辣、腥热之物。

【来源】 绛囊撮要

口 臭

口臭是指口内出气臭秽。是某些口腔疾病（如口糜、口疮、龋齿）、鼻咽喉疾病（如鼻渊、乳蛾）和其他疾病（如肺病、胃火、食滞）所致的一個症狀。类似于西医学口腔溃疡、各种口炎、龋齿、鼻窦炎、扁桃体炎及肺脓疡等所致的口臭。

方一

【组成】 木香10克 公丁香6克 藿香12克 粉葛根30克 白芷12克

【用法】 每日1剂，冷水煎汤代水，分多次漱口。以口臭消失为度。不宜久煎。

【主治】 各型口臭。

【注意】 口腔及牙龈有破损者，须待药液冷却后再漱口。口腔溃疡者不宜采用。

【来源】 云南中医杂志 1984；5（6）：60

方二

【组成】 枯矾0.3克 田螺6克 薄荷12克 石菖蒲12克

【用法】 将药物水煎后，或浸泡白水后，外用擦洗口腔。每日3次，至症状消失。

【主治】 脾胃火盛型（口腔溃烂口臭）。

【来源】 中国民间草药方

方三

【组成】 大黄 生地

【用法】 将上药切片，贴出血处。每日换药1次，至症状消失。

【主治】 胃热口臭、齿衄。

【来源】 理瀾骈文

方四

【组成】 薄荷脑

【用法】 脐部局部清洗，常规消毒。薄荷脑研为细末，纳入神阙穴，外用胶布固定。次日，口腔有清凉爽适的感觉。3~6天换药1次，连用2~3次。

【主治】 各型口臭。

【来源】 中医外治法集要

口 疳

口疳，又称口糜、口破、脾瘡。是一种以口舌反复生疮、疼痛溃烂为主要特征的口腔疾病。可发于口腔内的颊、舌、腭及唇等任何部位。病程较久，可以自愈，亦能长期反复发作，此起彼伏，经久不已。西医之阿弗他性口炎可参考本病辨证论治。

方一

【组成】 银花12克 连翘、白茅根各20克 入地金牛15克

【用法】 上药水煎，漱口，每日6次，每次含3~5分钟，重者可延长含漱时间，增加含漱次数，5~7天为1疗程。

【主治】 口疳。有效率达100%。

【来源】 新中医 1990；（3）：27

方二

【组成】 黄连12克 黄柏20克 甘草10克 海螵、白芨各30克 青黛26克 龙骨12克 轻粉、冰片各4克 雄黄8克 朱砂14克 硼砂30克

【用法】 上药共研细末，和匀备用，用时先用清水或生理盐水漱口，再将本药少许扑于患处，每日2~3次，用后可立即止痛，3~5日可痊愈。

【主治】 口疳。有效率达100%。

【来源】 中华口腔科杂志 1983；18（2）：113

方三

【组成】 黄芪30克 两面针15克 血竭3克 朱砂1克 硼砂1.5克 甘草2克

【用法】 上药共研细末，经灭菌处理，调芝麻油，饭后涂搽口腔疮面，每日3次，连用3~5天为1疗程。

【主治】 口疳。经治40例，愈29例，好转10例，有效率100%。

【来源】 新中医 1990；（8）：31

唇 疔

本病是指发生于唇部的疔疮，具有发病急骤，初起如粟，痒痛相兼，毒重根深，容易造成毒邪走散的特点。可发于任何季节，一般预后良好。少数患者可因病重或失治而发生疔毒走黄，甚至造成死亡。本病类似于现代医学所称的唇部疖、痈疽、蜂窝组织炎。

方一

【组成】 苍耳虫 麻油

【用法】 将自行采到的活苍耳虫，浸泡于麻油内窒息死亡，每40毫升麻油中浸泡苍耳虫100条，并加冰片1克，密封备用。临用时，用碘酒、酒精消毒局部后，按其病变范围大小，取苍耳虫4~6条，捣烂如泥，敷于疮顶，外盖纱布。一般每日换药1次，用至局部及全身症状全部消失。

【主治】 各型唇疔。

【注意】 为了保证疗效，在应用本药时，应注意忌口，如多食肥甘厚味或鱼腥发物，则会明显地影响效果。

【来源】 中医药学报 1987；（5）：29转20

方二

【组成】 鲜蒲公英

【用法】 将上药捣烂数患处，干则更换。配合内治法，直至全身及局部症状全部消失。

【主治】 疔疮走黄。

【来源】 江苏中医杂志 1984；5（4）：11

方三

【组成】 硫磺 蟾酥

【用法】 将上药等分为末，葱汁和蜜捣丸如小米大，呈长形，插入疔疮内。每日换药1~2次，使肿消脓尽为度。

【主治】 唇疔热毒炽盛将溃时。

【来源】 外科证治全书

方四

【组成】 苍耳虫150克 明矾末15克 朱砂2克 黄升丹15克

【用法】 以明矾末、朱砂末与苍耳虫研匀后，阴干或石灰收干，再加黄升丹研成细末，扑撒于疮口；外贴玉露膏、黄连膏等以聚毒提脓。每日换药1次，直至脓毒溃尽。

【主治】 脓成未溃，切开排脓后。

【来源】 临诊一得录

唇 疮

唇疮，又名唇疹，乃脾胃有热，热气循经而外发于唇引起的病变。亦称唇痈。

方一

【组成】 白芷30克 白芨30克 白蜡90克 黄芪0.3克 麝香0.3克 乳香0.3克 丹皮0.3克 芍药0.3克 丁香0.3克 麻油250克

【用法】 上药为末，麻油熬膏，入麝香搅匀，涂患

处。每日2次，直至痊愈。

【主治】 唇疮。

【来源】 中医口腔科学概要

方二

【组成】 硼砂 川军 川柏 黄芩 东丹 雄黄 熟石膏

【用法】 上药适量，共研为末，以凡士林调末为膏药，敷于疮面。每日2次，直至肿痛消失。

【主治】 唇疮。

【来源】 上海中医杂志 1989，（2）：32

方三

【组成】 八月蓝叶500克

【用法】 将上药捣烂取汁，擦洗疮面，每日2次，直至疮面愈合。

【主治】 唇上生疮，连年不瘥。

【来源】 疡科荟萃

紧唇

本病以唇肿湿烂为主要特征。因唇肿绷紧，开口则痛剧，以致饮食困难，故名紧唇。据其临床表现红肿、糜烂、疼痛、流水、脱屑、结痂等症状的轻重不一，医籍中又有“溜唇”、“口唇湿烂”、“唇燥紧裂”、“唇风”等病名。相当于西医所称“光化性唇炎”、“糜烂性唇炎”、“湿疹糜烂性唇炎”、“剥脱性唇炎”等病。

方一

【组成】 白藓皮15克 蛇床子10克 川槿皮10克 地肤子30克 苦参30克

【用法】 上药加水煎汤，以纱布块浸吸药液，湿敷唇上。每次20～30分钟，1日3次。

【主治】 风热、湿热证。可清热祛湿，疏风解毒。治疗20例，痊愈17例，好转3例。

【来源】 中医杂志 1980；（6）：32

方二

【组成】 五倍子、诃子各等份

【用法】 将药物共研极细末，敷于患处，盖以消毒纱布。1日1次。

【主治】 唇肿湿烂。

【来源】 本草纲目

方三

【组成】 赤石脂30克 乳香30克 没药10克 轻粉7克 硼砂7克 煅龙骨30克 儿茶7克 梅片1克

【用法】 将药物共研细末，敷于患处，覆盖上消毒纱布。1日1次。

【主治】 脓尽而燥裂者。

【来源】 重楼玉钥

舌 疮

本病表现为舌体出现溃疡面，色红，疼痛，甚则有裂纹。古人认为属心火、胃火、肾阴虚之火所生。一般多继发于贫血、银屑病、消化系统病症等，相当于西医所称游走性舌炎、剥脱性舌炎。

方一

【组成】 牛膝30克 白酒30克

【用法】 牛膝浸酒内，取药酒，频频含漱，1日10次。

【主治】 阳虚型舌疮。

【来源】 肘后方

方二

【组成】 生甘草60克

【用法】 生甘草煎汤，以药液漱口，反复多次。

【主治】 实热证。

【来源】 圣济总录

方三

【组成】 西瓜皮30克（炒焦研末） 冰片3克 蜂蜜
适量

【用法】 将药物研细，调蜂蜜为膏。将药膏涂抹溃疡处。1日2~3次。

【主治】 虚热证。

【来源】 常见病验方研究参考资料

方四

【组成】 黄连、干姜各等份

【用法】 研细，用药粉末吹敷于舌之溃疡面上。1日2次。

【主治】 热证。

【来源】 肘后方

方五

【组成】 黄柏30克 青黛9克 肉桂3克 冰片0.6克

【用法】 上药研细末，和匀，涂搽患处。

【主治】 口舌生疮。

【来源】 古今名方

面部疔疮

面部疔疮是指生于颜面的形小，根深如钉，病势急剧，易造成毒邪走散，有危险性的外疡。本病因脏腑积热，复经时令毒邪袭于肌肤，客于经脉，致使气血凝滞，火毒郁结而发。包括西医的颜面部疖、痈、蜂窝组织炎等急性化脓性感染等。

方一

【组成】 水银60克 火硝、皂矾、白矾各180克 食盐90克

【用法】 上药共研末，入罐，置炭炉上熔化，待冷，

将罐口倒置磁盘内，用16.5厘米宽桑皮纸搓条涂上浆糊围合盘罐接合处，外用煅石膏粉调糊围住，勿令泄气，将盘罐置于装满黄沙之大罐钵中，留罐底于沙外约2厘米。先置1~2块燃板炭于罐底上文火烧1小时，继用5~6块燃板炭，文武火烧1小时半，再用武火烧1小时，灭火。取盘罐，见盘内如雪花样银针白霜即为五虎丹，装瓶备用。再将五虎丹研极细，取熟面少许放在玻璃板上，用布片将丹面拌匀，轻搓成寸许细条，放纸上阴干，备用。用时，常规消毒患处，用手术刀直刺疔疮中心，使之流出恶血，纳入“五虎丹”引条。外敷黑膏药。3日后取下，一般可见疔头有小螺丝样毒物脱落，不脱落时，可用手术刀或镊子除去毒物。伤口点撒提毒散，1日1块，外盖玉红膏。待毒去脓尽，改用生肌散，促其早日愈合。

【主治】 面部疮疖。可清热解毒，以其治疗30例，全部获愈，平均治疗3.9天。

【来源】 湖北中医杂志 1984；（4）：20

方二

【组成】 生麻黄、生半夏、生南星、生川乌、生草乌、桂枝梢、吴茱萸各30克 僵蚕、白芥子、白蔹、白芨、川断、白芷各45克 生大黄、赤芍、当归、川芎、黄柏各60克 忍冬藤100克 陈皮、木鳖子各40克 东丹（每1000克加料油30克） 铜绿（每1000克加料油10克） 松香适量 新鲜榆、槐、桑、柳、桃树枝各250克 麻油5000克

【用法】 上药制成膏药，根据疔疮性质不同选用掺药（如四消散、红灵散、阴毒内消散、阳毒内消散等），使掺药对准疮顶贴于患处。2日1次，连用2~3次为1疗程。一般

1个疗程可获痊愈。

【主治】 颜面部及其他部位疔疮。

【注意】 若无掺药，亦可直接将膏药贴于患处。

【来源】 安徽中医学院学报 1988；7（2）：32

方三

【组成】 木芙蓉叶8份 莲钱草11份 天仙子3份

【用法】 将前2味洗净晒干，然后将3味药分别在低温下烘干，研为细末，过100目筛，分别放置。用时，分别称取各药混匀灭菌，以温开水调匀成糊状，涂在纱布上，贴于患处，每日换药1次。3~5日为1疗程。

【主治】 面部疔疮。治疗26例，治愈24例，有效1例，无效1例。

【来源】 湖南中医杂志 1989；5（4）：41

颜面痈肿

颜面痈肿是一种发生于颜面部的急性化脓性皮肤病，其特点是：发于皮肉之间，一般不损害筋骨，也不会造成陷证。相当于西医的面部疔与疖病。

方一

【组成】 藤黄10克 马前子6克 龙脑6克 鲜猪胆汁100克

【用法】 马前子用沙拌炒软，去毛，研成粉末，然后将藤黄、龙脑分别研成粉末，将上药掺在胆汁中，备用。用时，以棉签或小毛刷蘸药汁涂在患处，涂药范围要比红肿范

围大0.5厘米，每日涂药2~3次，5~7天为1疗程。

【主治】 颜面痈肿，有效率100%。

【来源】 新中医 1981；（3）：21

方二

【组成】 黄芩、黄柏、黄连各10克

【用法】 将上药放入容器内，煎沸后5~20分钟，待冷却到40℃左右，视病灶大小，取敷料块及毛巾折4~5层，面积稍大于病灶范围，浸透药液敷于患部。每次1小时左右，1日3~4次，3天为1疗程。

【主治】 颜面痈肿未溃者。有效率99%。

【来源】 湖北中医杂志 1985；（1）：20

方三

【组成】 人参茎叶及杂根

【用法】 上药洗净，放适量水中煎煮1小时，去渣，再用文火煎至较稠之浸膏，装入宽口瓶中，高压灭菌30分钟后，将浸膏涂于消毒好的厚纸上贴于患处，2日换药1次，3次为1疗程。

【主治】 颜面痈肿属气血虚弱者。有效率达100%。

【来源】 新中医 1985；（1）：3

方四

【组成】 羌活15克 防风15克 赤芍15克 吴萸15克
细辛15克 肉桂15克 羌花15克 当归15克 白芷15克

【用法】 上药共为粗末，加连须、赤皮葱250克切碎，用好醋拌匀，炒烫后装入布袋，在痈肿处熨烫，冷却换

之，遂痛遂熨，以痛解为度，次数不限。

【主治】 肿痛疼痛严重者，有效率100%。

【来源】 中国民间疗法

颌关节功能紊乱症

颌关节功能紊乱症是口腔科常见病之一，目前一般认为其发病与患者神经功能状况有关，神经衰弱是其发病的重要因素。颌关节紊乱，下颌关节咀嚼肌解剖异常，机械、物理、创伤、寒冷刺激等可诱发和加重此病。临床以下颌关节运动障碍，活动时关节区及其周围肌群疼痛，关节运动时发出杂音或弹响为特征。祖国医学认为该病与痹证相似。肾主骨、肝主筋，肝肾亏虚，风寒湿等邪侵袭，气血痹阻不畅，筋骨、肌肉、筋腱失养而发本病。

方一

【组成】 当归6克 白芷、乳香、没药、细辛、薄荷各6克 香附15克 红花15克 丝瓜络15克

【用法】 将上药浸于95%乙醇100毫升中2周，过滤备用。把青霉素小瓶磨去瓶底，制成药罐。治疗时把药液倒入瓶中，扣于患部压痛处，继用注射器吸出瓶中空气，药罐即吸附于患部，同时头偏向对侧，使药液浸润患部皮肤。每日1次，每次20~30分钟，7次为1疗程。

【主治】 颌关节功能紊乱症初、中期，开口运动障碍，以疼痛为主者。

【注意】 治疗期间患者忌咬硬物，避免张口过大；对青霉素易敏者，应选用其它药罐，有病灶牙时应及时处理。

必要时可配合西药治疗。

【来源】 中华理疗杂志 1990; 13(3):181

方二

【组成】 三七4.5克 地龙5克 白芷3克 红花3克
乳香5克 没药5克 血竭6克 桃仁10克 钻地风6克 市售
黑膏药500克

【用法】 先将上药共研细末，把药粉和入溶解在膏药
内，然后用绒布和油纸制成长2厘米，宽1.5厘米大小膏药备
用。用时应把制成之膏药在饭锅内烊化（切勿火烤）后，敷
贴于患侧下关穴处，7天换药1次，可连续用3~6张膏药。该
法对颌关节功能紊乱症具有活血止痛作用。

【主治】 各阶段颌关节功能紊乱症。

【注意】 膏药温度不可太高，避免伤及面部皮肤，如
皮肤烫伤应即停用此法，待皮肤伤好后酌情治疗。

【来源】 中药贴敷疗法

方三

【组成】 当归、白芷、薄荷、丝瓜络各15克 乳没各
9克 田三七、红花、香附、川芎9克

【用法】 将上药碎为粗末分成2包，用小布袋装好密
封，入蒸笼加热，趁热敷于关节区肌肉处。每日1次，每次
15分钟，10次为1疗程。

【主治】 该法具有活血舒筋、散寒止痛作用，用于各
种咀嚼肌疼痛，及关节盘后区损伤。

【注意事项】 药包温度应控制在56~60℃之间，以病
人能耐受为好。

【来源】 颞下颌关节病

颞颌关节风湿症

颞颌关节风湿症为具有关节炎变的变态反应性疾病。临床以颞颌关节出现疼痛、酸楚、麻木或关节活动障碍为特点。属于祖国医学“痹证”、“历节风”范畴。

方一

【组成】 透骨草、元胡、当归、姜黄、川椒、海桐皮、威灵仙、牛膝、乳香、没药、姜活、香白芷、五加皮、苏木、红花、土茯苓各10克

【用法】 上药共研粗末，用纱布包妥，加水煎煮，乘热熏洗患处，每日2次，每次1小时，20天为1疗程。每次熏洗毕将药液存阴凉清洁处或冰箱中，下次加热再用。

【主治】 颞颌关节风湿症风寒偏胜者。

【注意】 高血压、心衰、体虚自汗者慎用。

【来源】 中国民间疗法

方二

【组成】 防风、独活、秦艽、威灵仙、海桐皮、川椒、川芎、赤芍、白芷、全当归、马前子、甘草各10克

【用法】 将药研末混匀，用陶器加水适量调成糊状，煮沸3~5分钟，将药平铺于白布上包好，敷药布袋上加油适量，使其成一层油状，敷于患部皮肤。1日1次，1次1~2小时，15天为1疗程。

【主治】 颞颌关节风湿症疼痛甚者。

【注意】 用药后病人感到灼热者，可暂时去之，如皮肤起泡，可用酒精消毒，待愈后再敷贴。

【来源】 中药外治法简编

方三

【组成】 肉桂、当归、川芎、羌活、白芷、天南星、泽兰、乳香、干姜各6克 赤芍10克

【用法】 上药碎成粗末，用布包好，入笼蒸热，趁热熨关节区部位，1日2次，每次1小时。

【主治】 风寒湿邪偏胜或阳虚寒胜者。

【注意】 药包温度宜在40~46℃之间，熨后避风寒，忌冷水洗脸。

【来源】 中医口腔科学概要

颌 骨 瘤

颌骨瘤包括上颌骨骨瘤，下颌骨骨瘤，颌骨囊肿和颌骨血管瘤等，属于良性肿瘤范畴。祖国医学对骨瘤形成的病因、病机有深刻的认识，宋《圣济总录·瘰瘤门》说：“瘤之为义，留滞而不去也”。《三因极一病证方论》载有六瘤，并明确提出了“骨瘤”的名称。

方一

【组成】 大葱60克 蜂蜜15克

【用法】 上药共捣成泥，敷于肿瘤部位，1日1换，30日为1疗程。

【主治】 颌骨瘤初起或颌骨囊肿。

【注意】 保持心情舒畅，注意口腔卫生，忌食肥甘厚味。

【来源】 中医口腔科学概要

方二

【组成】 当归60克 白芷15克 白蜡60克 轻粉12克
甘草36克 紫草6克 血竭12克 麻油250克

【用法】 先将当归、白芷、紫草、甘草4味入油内浸3天，慢火熬微枯，滤清后再将油煎沸，入血竭溶化，次入白蜡微火化，然后将膏倾入预放水中的容器内，候片刻，入研细的轻粉，用时将药膏匀涂纱布上，贴患处，2天换药1次。

【主治】 颌骨瘤或囊肿溃破者。

【注意】 保持心情舒畅，戒除烟酒。

【来源】 外科正宗

方三

【组成】 腰黄12克 冰片1.2克 蝉衣（去翅足）6克
蜈蚣（炙）10条 全虫（炙）10个 五倍子（炙）24克 穿山甲（炙）9克 麝香1克

【用法】 上药研极细末，取适量掺在万应膏（市售成药）上，贴于肿瘤处。2日换药1次，1月为1疗程。

【主治】 颌骨瘤初中期。

【注意】 如贴药后，局部皮肤损伤溃破，暂停用此法。

【来源】 药薮启秘

甲状舌骨囊肿

甲状舌骨囊肿为胎儿发育期，甲状舌管退化不全，残余上皮及其分泌物聚积而形成的先天性疾病。属祖国医学“癰瘰”、“积聚”、“脓瘰”范畴。

方一

【组成】 生南星、生半夏、生川乌、生草乌、白芨、白蔹、白芷、土贝母、川黄柏、薄荷、川大黄、姜黄片、黄芩、猪牙皂、荆芥穗各30克

【用法】 上药共研细面，取60克加蜂蜜120克和调成膏。用时取适量敷于囊肿部位，用油纸盖贴外加胶布固定，2天换药7次，1月1疗程。

【主治】 囊肿期。

【来源】 中西医结合临床外科手册

方二

【组成】 黄连、黄芩、大黄、芙蓉叶、泽兰叶各20克

【用法】 上药共研细末，另加冰片6克、凡士林500克，共调和成膏，涂抹囊肿处，1日2次，1月1疗程。本法具有清热解毒，消肿止痛作用。

【主治】 甲状舌骨囊肿蕴毒期。

【注意】 用药期间，忌食辛甘厚味，免助火化毒，每次涂药前用淡盐水擦洗局部皮肤，避免感染。

【来源】 新编中医学概要

方三

【组成】 京红粉15克 利马锥15克 乳香6克 轻粉45克

【用法】 各药混合研粉，用棉纸卷成纸捻，按需剪成小段。用镊子夹持入伤口内，至底部稍提出0.5厘米。外敷化毒散软膏（化毒散20克，凡士林80克，混匀调和成膏）外用敷料包扎。2天1换，至愈为止。

【主治】 囊肿瘻管期。

【注意】 ①溃破成瘻后，切忌挤压；忌食肥甘厚味辛辣之品；②制药捻时应注意无菌操作，囊免交叉感染。

【来源】 中西医结合临床外科手册

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名= 古今中药外治高效验方1000首

作者= 张庆伟 韩建涛 马晓昌

页数= 458

S S 号= 10031685

出版日期= 1992年05月第1版